M. Demazure – A. Grothendieck

合作者

M. Artin – J. E. Bertin – P. Gabriel – J. P. Serre

群概形

Schémas en Groupes

I

简体中文原生重建工作稿

本检查点收录导言及第 I–IV 篇；分配范围为第 I–XII 篇.

S.G.A. 3

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie

1962/64

英文底本的重建、来源与权利说明

译者说明: 以下为英文底本版本说明的完整译文. 其中“本累积读本”指英文完整读本; 本中文工作稿的实际覆盖见 PROGRESS.json.

本累积读本包含导言及第 I–XXVI 篇的完整英文重建, 并收录第一卷主题索引、第三卷数学导读和书末索引. 所交付的所有数学图均为原生 TEX 构造; 当前使用的源码不包含光栅图形调用.

现行 Polo–Gille 重版 PDF 是法文文字、数学、编号、注释及图形外观的依据. 开展本次重建时, 尚无公开的可编辑 Polo–Gille 源码, 因而英文文字、公式、文档结构及图形均以这些权威 PDF 为依据在 LATEX 中重建. 已有 OCR 仅作为只读定位及拟稿材料, 并不构成底本依据.

Jacob Reinhold 的 CC BY 4.0 英文 Markdown 在此作为比对和拟稿的传承来源予以致谢. 它不是底本依据. CC BY 4.0 声明适用于该比对译文, 本身并不授予基础法文版本或本累积重建的权利. 这是一个内部原生源码检查点, 尚待重新进行累积引用、隐私、权利、打包和独立发布审查; 此处不作已出版或公共许可的声明.

目录

英文底本的重建、来源与权利说明 **i**

编者告示 **1**

导言 **3**

第 I 篇. 代数结构. 群上同调 **6**
1. 一般性论述 6
2. 代数结构 16
3. O-模范畴与 G-O-模范畴 21
4. 概形范畴中的代数结构 23
5. 群上同调 34
6. G-等变对象和模 40
参考文献 49

第 II 篇. 切丛与 Lie 代数 **50**
1. 函子 Hom Z/S (X,Y) 50
2. 概形 I S (M) 52
3. 切丛与条件 (E) 55
4. 群的切空间—Lie 代数 70
5. 若干 Lie 代数的计算 91
6. 杂注 98
参考文献 100

第 III 篇. 无穷小扩张 **101**
0. SGA 1 第 III 篇的回顾 101
1. 扩张与上同调 123
2. 群概形态射的无穷小扩张 131
3. 群概形的无穷小扩张 136
4. 闭子群的无穷小扩张 139
参考文献 172

第 IV 篇. 拓扑与层 **173**
1. 普遍有效满态射 173
2. 下降态射 177
3. 普遍有效等价关系 179
3.1. 等价关系: 定义 179
3.2. 群的自由作用定义的等价关系 181
3.3. 普遍有效等价关系 183
3.4. (M)-有效性 184

3.5. 用下降构造商 . . . 186
4. 拓扑与层 . . . 186
4.1. 筛 . . . 187
4.2. 拓扑: 定义 . . . 189
4.3. 预层、层以及预层的伴随层 . . . 191
4.4. 层范畴的正合性质 . . . 197
4.5. 比典范拓扑更粗的拓扑 . . . 204
4.6. 层关于等价关系的商 . . . 208
4.7. 有效性判别法的应用: 同构定理 . . . 212
5. 取商与代数结构 . . . 213
5.1. 主齐性丛 . . . 213
5.2. 群结构与取商 . . . 215
5.3. 有效性判据的应用: Noether 定理 . . . 217
6. 概形范畴中的拓扑 . . . 217
6.1. Zariski 拓扑 . . . 217
6.2. 一种构造拓扑的方法 . . . 217
6.3. 在概形范畴中的应用 . . . 220
6.4. 有效性条件 . . . 223
6.5. 主齐性丛 . . . 223
6.6. 其他拓扑 . . . 223
6.7. 齐性空间 . . . 224
参考文献 . . . 226

编者告示

这里呈现的是原研讨班讲义的略作修订的版本, 其宗旨与内容见导言. 修订工作主要包括改正排印错误, 在脚注中增添少量补充说明或参考文献, 将本书按现有形式分为三卷, 每卷附详细目录和记号索引, 并在第 3 卷末增设术语索引. 此外, J.-E. Bertin 撰写的第 VI_{B} 篇由作者作了部分重写, 尤其是第 5 节和第 10 节, 因而某些对该篇的引用与原版本中的引用有所不同. 本卷卷首列有本研讨班各篇的篇目.

自本研讨班讲义第一版问世以来, *Éléments de Géométrie Algébrique* 第 IV 章已全部出版, 因而讲义中的某些段落已无必要. 我们有时在脚注中指明 EGA IV 的有关出处, 读者据此可以略过这些段落.

关于另一种系统使用概形语言的代数群论述, 可参阅 M. Demazure 和 P. Gabriel 的 *Groupes Algébriques* (North-Holland & Masson et Cie). 该书与本研讨班讲义不同, 不以代数几何知识为先修要求, 而是包含所需的全部概形论预备知识; 因此, 它可以作为学习本研讨班讲义的入门读物. (该书还讨论了一些本研讨班未涉及的主题, 例如交换仿射代数群的 Dieudonné 式结构理论, 见*该书*第 V 章.)

Bures-sur-Yvette, 1970 年 3 月

导言

1. 本研讨班有两个目的.

一方面, 我们希望为一般群概形 (group scheme) 理论提供便于使用的基础. 第 I–IV 篇将提供概形与范畴语言方面不可或缺的预备练习. 为了获得一种自然契合几何直观的语言, 并避免那些长此以往令人难以忍受的迂回说法, 我们总将一个预概形 S 上的预概形 X 与它所代表的函子

$$(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

等同*. 因此, 许多定义必须表述为适用于任意函子的形式, 而不论这些函子是否可表. 此外, 我们所用的函子几乎全都是“层”(关于“忠实平坦拟紧拓扑”). 第 IV 篇仅附带讨论群, 它勾勒出“局部化”和层的语言; 在涉及函子可表性的问题中, 这种语言也十分方便. 尤其是, 该篇将为后面出现的取商问题提供最便于使用的框架.

第 V 篇给出若干关于商的存在性的一般结果. 第 VI_{A} 篇又研究这些结果, 讨论域上 (更一般地, Artin 环上) 的代数群对子群取商的问题 **. 该篇以及随后的第 VI_{B} 篇还包含域上代数群所特有的各种初等结果, 这些结果在后文中经常用到.

第 VII 篇研究与底域的特征有关的某些现象, 特别是以适当的一般性建立高度为 1 的根性群概形 (radicial group scheme) 与限制 p-Lie 代数之间的对应.

最后, 第 XVIII 篇给出了 Weil 关于代数群“双有理”定义的定理的概形论推广.

另一方面, 我们希望将仿射代数群的 Borel–Chevalley 结构理论推广到任意底预概形上的群. 事实上, 在撰写研讨班讲义的过程中, 我们发现这一理论的许多结果不需要仿射性假设. 当然, 最完备的结果是在“半单群概形”, 或更一般的“约化群概形”情形下获得的; 从第 XIX 篇起, 我们将只讨论这些群. Chevalley 本人已经在整数环上构造了“Tôhoku 群”, 本研讨班将重新研究这一构造. 主要的唯一性定理 (2) 简洁地刻画了这些 Tôhoku 群在底预概形 S 上的“扭曲”变体: 它们恰好是 S 上的仿射平滑群概形, 其几何纤维是通常意义下的连通半单群 ***(2).

2.

与熟悉的代数闭域上的理论一样, 所研究的群概形的子环面发挥着关键作用. 因此, 对环面 (torus), 更一般地对“乘法型群概形”的预备研究, 无论研究其本身, 还是将它作为给定群的

*看来, 这种观点最早是 P. Cartier 在八九年前研究形式群理论时考虑到的; 遗憾的是, 他没有着手将这一观点确切表述并作系统整理, 而它本来值得如此对待.

**关于取商, 尤其是对约化群取商的更深入研究, 可参阅 D. Mumford 的重要著作 *Geometric Invariant Theory*, Ergebnisse der Mathematik, 第 34 卷, Springer, 1965. 我们指出, 该书的术语有一处重要之处与本书不同: 在特征为 $p > 0$ 的域上, Mumford 称为“约化”的群(1), 是本研讨班意义下的平滑乘法型群 (参见第 IX 篇). 可以合理地认为, Mumford 采用“约化”的这种含义只是暂时的权宜之计, 因为当底不再是域时, 这一含义便失去了意义 (Mumford 早在其前言第二段中就出于其他理由作了大致这样的解释). (1) *编者注:* 见本导言末增补的说明.

(2)*编者注:* 这里指推论 XXIII.5.6, 它容易由分裂约化群的唯一性定理推出 (参见 XXIII, 定理 4.1 和推论 5.2), 因为每个半单 S-群都是某个 Tôhoku 群的“扭曲形式”(关于平展 (étale) 拓扑) (参见 XXII, 推论 2.3).

***这是 M. Demazure 博士论文 *Schémas en groupes réductifs*, Bull. Soc. Math. France **93** (1965), 369–413 的主要结果.

乘法型子群来研究, 都占据本研讨班相当大的篇幅 (第 VIII–XII 篇). 它们出色的刚性 (在某些方面甚至强于 Abel 概形或半单群概形的刚性) 使其成为研究某些更一般的群的有力工具.

3.

从第 XII 篇起 (除去前面已提到的第 XVIII 篇), 我们将经常使用代数闭域上的仿射代数群理论. 读者可在 1956 年 Chevalley 研讨班讲义中找到这些内容, 尤其是其中的第 IV–IX 篇. 我们也会用到 Chevalley 研讨班讲义中后面讨论半单代数群结构的各篇, 不过用得较少. 事实上, 我们将直接在概形框架中重新建立 Chevalley 理论; 读者将看到, 即使在底为域的情形下, 这种做法也使论述更加简单而精确.

4.

当然, 本研讨班的主要目的是发展适用于任意底上的群概形研究的技术, 也就是主要用于研究代数群族的技术. 因而, 这种族的无穷小性质, 特别是底概形为 Artin 概形的情形, 发挥着重要作用. 即使研究域 k 上的代数群, 当该域不完全时, 尤其在非 Galois 情形下应用下降时, 也会出现这些性质. 在这一背景下得到的新结果中, 可以提到任意平滑代数群中极大环面和 Cartan 子群的存在性, 极大环面簇的有理性, 以及各种相关结果 (第 XIV 篇 [(3)]); 另一个例子是半单群的“形式”与适当的半单代数群 (通常不连通) 下的齐性主丛之间的对应 (第 XXIV 篇, 1.16–1.20). 一般说来, 在不完全底域上工作所需的方法, 本质上就是在任意底预概形上所用的方法, 因而超出了经典代数几何的框架.

5.

我们认为没有必要在书面讲义各篇的开头注明研讨班中相应口头报告的日期. 这里只说明, 油印各篇 (I–XXVI) 的次序确实与口头报告的次序一致. 此外, 最终书面文本有时是在口头报告之后相当久才写成的, 而且往往与报告有很大差别: 书面文本通常更详细、更完整 (如第 IV 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇), 甚至更为一般 (如第 XII 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇). 另一些书面讲义则没有相应的口头报告 ($\mathrm{VI_B}$, $\mathrm{VII_A}$, XV, XVI, XVII, 以及 XXVI 的大部分); 撰写这些讲义并将其插入油印研讨班讲义中, 或是为了给其他各篇提供便于使用的参考资料 (尤其是 $\mathrm{VI_B}$ 的情形), 或是因为它们是已经展开的概念和技术的自然延续. 因此, 为了学习研讨班的其余部分, 特别是约化群概形部分, 不必阅读第 $\mathrm{VII_A}$, $\mathrm{VII_B}$, XV, XVI 和 XVII 篇.

6.

在概形论方面, 我们主要使用 EGA I 中阐述的概形的一般语言; SGA 1, I–V 中阐述的平坦、平展 (*é*tale) 及平滑态射的概念; 以及 SGA 1, VIII 中的忠实平坦下降理论. 我们尽可能避免施加不必要的 Noether 假设. 相应地, 这就要求我们把通常的“有限型”假设替换为“有限呈示”假设. 关于有限呈示态射的概念, 读者应参阅 EGA IV, 1.4 和 1.6. SGA 1, I–IV 中的结果大多在 Noether 情形下陈述, EGA IV 将在一般情形下建立这些结果 [****]; 该章还将详细介绍把涉及有限呈示假设的某些类型的命题化归到 Noether 情形的标准方法 (EGA IV, 第 8, 9 和 11 节). 不愿预先承认 EGA IV 中这些结果的读者, 可以假定底预概形局部 Noether, 从而简化某些陈述或其证明. 不过, 当证明要从 $\widehat{A}$ 下降到 A 时, 这种做法会带来困难, 其中 $\widehat{A}$ 是 Noether 局部环 A 的完备化, 因为这种方法引入的环

$$\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}.$$

一般不是 Noether 环.

[(3)] *编者注:* 特别见定理 1.1 和 6.1.

[****] 自本导言写成以来, EGA IV 的全部四个部分 (第 1–21 节) 均已出版.

7.

引用遵循通常的十进制编号体系: 引用 5.7.11 表示同一篇中具有该编号的命题 (或引理、定义等); 在 XVII 7.8 这样的引用中, 罗马数字表示篇号. 对于经常引用的文献, 我们采用下列缩写:

Bible Chevalley 研讨班, *Groupes de Lie algébriques*, 1956/58.

EGA X**,** $x.y.z$ J. Dieudonné 和 A. Grothendieck, *Éléments de Géométrie Algébrique*, 第 X 章, 编号为 $x.y.z$ 的陈述 (或第 $x.y$ 小节, 等等).

SGA n**,** X $y.z$ *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie*, 第 n 年, 第 X 篇中编号为 $y.z$ 的陈述.

TDTE A. Grothendieck, *Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, 1959 至 1962 年间在 Bourbaki 研讨班所作的各篇报告.

(1) *编者注.* 关于对约化群取商的理论, 自 A. Grothendieck 写下脚注 (∗∗) 以来, 情况已经有了很大变化. 对任意域 k 上的仿射代数群, 恰当的概念是 Mumford 引入的“几何约化”群. (另一方面, 若 G 的每个有理表示都完全可约, 则称 G 为“线性约化”的; 但是, 如脚注 (∗∗) 所指出的, 当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时, 这一条件过于苛刻.) 由 M. Nagata 和 W. J. Haboush 的结果 ([Na64], [NM64], [Ha75]), 几何约化 k-群恰好就是本研讨班意义下的约化 k-群. 关于这些内容, 可参阅 Mumford 著作的后续版本 ([MF82]). C. S. Seshadri 将几何约化性的概念推广到任意底的情形, 并研究了它对取商的推论 ([Se77]); J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc 的文章 [CTS79] 中载有 M. Raynaud 的补充结果. 最后, 关于对代数群取商, 或更一般地对群胚取商 (参见本研讨班第 V 篇) 的较新进展, 我们推荐 J. Kollár 的文章 [Ko97] 以及 S. Keel 和 S. Mori 的文章 [KM97].

参考文献

[**CTS79**] J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc, *Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*, Math. Ann. **244** (1979), 105–134.

[**Ha75**] W. J. Haboush, *Reductive groups are geometrically reductive*, Ann. of Math. **102** (1975), 第 1 期, 67–83.

[**KM97**] S. Keel 和 S. Mori, *Quotient by groupoids*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 193–213.

[**Ko97**] J. Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 33–79.

[**MF82**] D. Mumford 和 J. Fogarty, *Geometric invariant theory*, 第 2 版, Springer-Verlag, 1982; 第 3 版, 与 F. Kirwan 合著, 1994.

[**Na64**] M. Nagata, *Invariants of a group in an affine ring*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 369–377.

[**NM64**] M. Nagata 和 T. Miyata, *Note on semi-reductive groups*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 379–382.

[**Se77**] C. S. Seshadri, *Geometric reductivity over an arbitrary base*, Adv. Math. **26** (1977), 第 3 期, 225–274.

第 I 篇
代数结构. 群上同调

M. Demazure 著

本篇分为两部分: 第一部分汇集若干一般定义, 并确立后文经常使用的记号; 第二部分讨论群上同调 (group cohomology), 最后得到关于可对角化群的上同调消没的 定理 5.3.3. [1]

我们一次选定一个宇宙 (Universe).[2] 所有定义和构造均相对于这一宇宙进行. 我们将经常采用以下不严格的说法. 在定义函子 (functor) $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 时, 只要对 $\mathscr{C}$ 的箭头 h, $f(h)$ 的定义没有歧义, 我们便只给出 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 所对应的 $\mathscr{C}'$ 的对象 $f(S)$. 实际使用时, 我们会说: 设 $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 为由 $f(S) = \cdots$ 定义的函子.

1. 一般性论述

1.1.

设 $\mathscr{C}$ 为一个范畴 (category). 用 $\widehat{\mathscr{C}}$ 表示从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴 **Set** 的反变函子所成的范畴

$$\mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

[3] 有一个典范函子

$$\mathbf{h} : \mathscr{C} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

它将每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 对应到满足

$$\mathbf{h}_X(S) = \mathrm{Hom}(S, X).$$

的函子 $\mathbf{h}_X$. 对于每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 都有一个双射 (例如参见 EGA 0_{III}, 8.1.4)

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_X, \mathbf{F}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{F}(X).$$

[4]

特别地, 对 $\mathscr{C}$ 的任意两个对象 X, Y, 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{h}_X, \mathbf{h}_Y)$$

是双射; 即函子 $\mathbf{h}$ 是全忠实的 (fully faithful). 因此它给出 $\mathscr{C}$ 到 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个满子范畴的同构, 以及 $\mathscr{C}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中由可表函子 (representable functors) 组成的满子范畴之间的等价 (所谓可表函子, 就是同构于某个形如 $\mathbf{h}_X$ 的函子). 后文常把 X 与 $\mathbf{h}_X$ 等同. 以下各段旨在说明, 这样等同不会产生问题.

---

[1] 编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.
[2] 编者注: 参见 SGA 4, 第 I 篇, §0 及附录; 另见 [DG70], 第 xxvi 页的讨论.
[3] 编者注: 这称为 $\mathscr{C}$ 上的预层范畴 (category of presheaves); 参见 IV, 4.3.1.
[4] 编者注: 这个结果通常称为 Yoneda 引理; 我们在其他编者注中采用这一名称.

注 1.1.1.[5] 我们有时需要以下变式. 设 $\mathscr{D}$ 为 $\mathscr{C}$ 的一个满子范畴, 且 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$. 用 $\mathbf{h}'_X$ 和 $\mathbf{h}'_Y$ 表示 $\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{h}_Y$ 在 $\mathscr{D}$ 上的限制. 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{D}}}(\mathbf{h}'_X, \mathbf{h}'_Y).$$

因此, 给定一个态射 (morphism) $X \to Y$, 与对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ 给定一个关于 T 函子性的映射

$$\phi(T) : \mathrm{Hom}(T,X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T,Y)$$

是“同一回事”.

1.2.

若对每个 S, $\mathbf{F}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的子集, 就称 $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$ 的*子对象* (subobject, 或子函子). [6]

在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中, 任意逆极限都存在, 且可逐点计算:

$$\left(\varprojlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varprojlim_i \mathbf{F}_i(S).$$

[7] 特别地, 纤维积 (fiber product) 定义为

$$(\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}')(S) = \mathbf{F}(S) \times_{\mathbf{G}(S)} \mathbf{F}'(S).$$

[8]

选取满足 $\underline{\mathbf{e}}(S) = \{\varnothing\}$ 的函子 $\underline{\mathbf{e}}$ 作为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的终对象 (final object). [9] 每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 都有唯一的态射到 $\underline{\mathbf{e}}$, 并置

$$\mathbf{F} \times \mathbf{F}' = \mathbf{F} \times_{\underline{\mathbf{e}}} \mathbf{F}'.$$

函子 $\mathbf{h}$ 与逆极限交换. 特别地, 对 $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $X \times X'$ 存在的充要条件是 $\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'}$ 可表; 相应地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e 的充要条件是 $\underline{\mathbf{e}}$ 可表; 在这些情形下有

$$\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'} \simeq \mathbf{h}_{X \times X'}, \qquad \mathbf{h}_e \simeq \underline{\mathbf{e}}.$$

$\widehat{\mathscr{C}}$ 中的单态射 (monomorphism) 恰好是这样的态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 相应的集合映射 $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射. [10]

函子 Γ. 对每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 置

$$\Gamma(\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{F}).$$

因此 $\Gamma(\mathbf{F})$ 的一个元素是一个族 $(\gamma_S)_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})}$, 其中 $\gamma_S \in \mathbf{F}(S)$, 并且对 $\mathscr{C}$ 的每个箭头 $f : S' \to S''$ 都有

$$\mathbf{F}(f)(\gamma_{S''}) = \gamma_{S'}.$$

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $\Gamma(X) = \Gamma(\mathbf{h}_X)$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$\Gamma(X) \simeq \mathrm{Hom}(e, X).$$

---

[5] 编者注: 此注为新增.

[6] 编者注: 此处调整了顺序, 使纤维积在单态射之前引入; 参见编者注 (9).

[7] 编者注: 同样, 任意正向极限都存在, 且可逐点计算: $\left(\varinjlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varinjlim_i \mathbf{F}_i(S)$. 然而一般而言, 函子 $\mathbf{h}$ 不与正向极限交换.

[8] 编者注: 特别地, 一对态射 $u, v : \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{G}$ 的等化子是 $\mathbf{F}$ 的子函子 $\mathrm{Ker}(u,v)$, 定义为 $\mathrm{Ker}(u,v)(S) = \{x \in \mathbf{F}(S) \mid u(x) = v(x)\}$.

[9] 编者注: $\{\varnothing\}$ 是空集的幂集, 这是一个单元素集合.

[10] 编者注: 若对每个 S, $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射, 则 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 显然是单态射. 反过来, 考虑 $\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 即得结论. 因此, $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 是单态射的充要条件是对角态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}$ 为同构 (参见 EGA I, 5.3.8). 同样, 逐点满射的态射是满态射; 考虑推出 $\mathbf{G} \amalg_{\mathbf{F}} \mathbf{G}$ 可知其逆命题也成立; 参见第 IV 篇中引理 4.4.4 的证明.

1.3.

设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 用 $\mathscr{C}_{/S}$ 表示 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴: 它的对象是 $\mathscr{C}$ 的箭头 $f : T \to S$, 而 $\mathrm{Hom}(f, f')$ 是 $\mathrm{Hom}(T, T')$ 中由满足 $f = f' \circ u$ 的箭头 u 组成的子集. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则 $\mathscr{C}_{/e}$ 同构于 $\mathscr{C}$. 范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 有终对象, 即恒等箭头 $S \to S$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则可构造范畴 $(\mathscr{C}_{/S})_{/f}$; 我们略不严格地将其记为 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$, 并且有典范同构

$$\mathscr{C}_{/T} \simeq (\mathscr{C}_{/S})_{/T}.$$

这一构造同样适用于 $\widehat{\mathscr{C}}$; 特别地得到范畴 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$. 另一方面, 也可构造范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\Gamma(f)$ 可等同于 T 在 S 上的截面集合 $\Gamma(T/S)$, 即由 f 的右逆箭头 $S \to T$ 组成的集合. 此外, $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 此时是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象, 并且

$$\Gamma(\mathbf{h}_f) \simeq \Gamma(\mathbf{h}_T/\mathbf{h}_S) \simeq \Gamma(T/S) \simeq \Gamma(f).$$

1.4.

现在定义范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 之间的一个等价. 换言之, 我们将证明, 在 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴上给定一个函子, 与在 $\mathscr{C}$ 上给定一个带有到 $\mathbf{h}_S$ 的态射的函子, 是“同一回事”.

(i) 构造 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$**.**

首先设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象. 需要在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上定义函子 $\alpha_S(H)$. 对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象 $f : T \to S$, 定义 $\alpha_S(H)(f)$ 为 $f \in \mathbf{h}_S(T)$ 在映射

$$H(T) : \mathbf{F}(T) \longrightarrow \mathbf{h}_S(T).$$


下的逆像. [11]

其次, 设 $u : f \to f'$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个箭头. 则 $\mathbf{F}(u) : \mathbf{F}(T') \to \mathbf{F}(T)$ 诱导从 $\alpha_S(H)(f')$ 到 $\alpha_S(H)(f)$ 的映射, 记为 $\alpha_S(H)(u)$. 立即可见, 对应

$$f \longmapsto \alpha_S(H)(f), \qquad u \longmapsto \alpha_S(H)(u)$$

定义了 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的一个函子, 因而给出 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的对象 $\alpha_S(H)$.

最后, 设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 与 $H' : \mathbf{F}' \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的两个对象, 且 $U : H \to H'$ 是该范畴中的一个态射:



.

对每个 $f : T \to S$, 映射 $U(T) : \mathbf{F}(T) \to \mathbf{F}'(T)$ 诱导映射

$$\alpha_S(U)(f) : \alpha_S(H)(f) \longrightarrow \alpha_S(H')(f),$$

从而定义函子间的态射

$$\alpha_S(U) : \alpha_S(H) \longrightarrow \alpha_S(H').$$

容易验证, 对应

$$H \longmapsto \alpha_S(H), \qquad U \longmapsto \alpha_S(U)$$

[11]编者注: 例如, 若 $\mathbf{F} = \mathbf{h}_X$, 则 H 对应于一个态射 $h : X \to S$, 且 $H(T) : \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, S)$ 是映射 $g \mapsto h \circ g$. 因此 $\alpha_S(\mathbf{h}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(-, X)$.

定义了函子

$$\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

(ii) 命题 1.4.1. *函子 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 是范畴等价.*

这里只说明构造一个拟逆函子

$$\beta_S : \widehat{\mathscr{C}_{/S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}.$$

的原理. 设 $\mathbf{G}$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的函子. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 置

$$\beta_S(\mathbf{G})(T) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(T,S)} \mathbf{G}(f), \qquad \mathrm{Hom}(T,S) = \mathbf{h}_S(T).$$

这就在 $\mathscr{C}$ 上定义了函子 $\beta_S(\mathbf{G})$, 它带有显然的到 $\mathbf{h}_S$ 的投影.

1.5.

等价 α_S 与函子 Γ 交换. 换言之, 若 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 且 $\alpha_S(H)$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 中的相应对象, 则

$$\Gamma(\alpha_S(H)) \simeq \Gamma(H) \simeq \Gamma(\mathbf{F}/\mathbf{h}_S).$$

等价 α_S 也与函子 $\mathbf{h}$ 交换. 也就是说, 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 而它在 α_S 下的像恰为 $\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}}(f)$, 其中

$$\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}} : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$$

是典范函子.[12] 因此:

命题 1.5.1. *设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象. 函子*

$$\alpha_S(H) : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表的充要条件是 $\mathbf{F} : \mathscr{C}^\circ \to \mathbf{Set}$ 可表. 若 $\mathbf{F} \simeq \mathbf{h}_T$, 则 $\alpha_S(H)$ 由 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \to S$ 表示.

等价 α_S 对 S 具有传递性. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则有由等价构成的交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
(\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_{S/\mathbf{h}_T}} & (\widehat{\mathscr{C}_{/S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_f} & \widehat{(\mathscr{C}_{/S})_{/T}} \\
& \searrow^{\simeq} & & \swarrow_{\simeq} & \\
& & \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_T}} & \xrightarrow{\alpha_T} & \widehat{\mathscr{C}_{/T}}
\end{array} ,$$

这里 $\alpha_{S/\mathbf{h}_T}$ 暂表示函子 α_S 在 $\mathbf{h}_T$ 上的对象上的限制 (参见 1.6).

1.6. 函子中的基变换

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有典范函子


$$i_S : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \mathscr{C}$$

其定义为: 当 f 是箭头 $T \to S$ 时, $i_S(f) = T$. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象, 我们用 $i_{T/S} = i_f$ 表示函子

$$i_{T/S} : (\mathscr{C}_{/S})_{/T} \longrightarrow \mathscr{C}_{/S},$$

并且有交换图:

[12] 编者注: 参见编者注 (10).



,

因此, 将 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$ 与 $\mathscr{C}_{/T}$ 等同 (今后我们都这样做), 就有

$$i_S \circ i_{T/S} = i_T.$$

同样, 当 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 且将 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}_{/e}$ 等同时, $i_{S/e} : \mathscr{C}_{/S} \to \mathscr{C}_{/e}$ 便与 i_S 等同.

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ (分别地, $Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$), 用 $p_S(X)$ (分别地, $p_{T/S}(Y)$) 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 中如下定义的对象 (只要它存在): $X \times S$ (分别地, $Y \times_S T$) 配备其第二投影:

$$\begin{array}{ccc} X \times S \\ {\scriptstyle p_S(X)}\downarrow \\ S \end{array} \qquad \text{resp.} \qquad \begin{array}{ccc} Y \times_S T \\ \downarrow{\scriptstyle p_{T/S}(Y)} \\ T \end{array} .$$

部分定义的函子 p_S (分别地, $p_{T/S}$) 称为 *基变换函子 (base-change functor).* 由积 (分别地, 纤维积) 的定义, 它是 i_S (分别地, $i_{T/S}$) 的右伴随. [13] 我们也记

$$p_S(X) = X_S, \qquad p_{T/S}(Y) = Y_T.$$

函子 i_S 定义了一个限制函子

$$i_S^* : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

我们记

$$\mathbf{F}_S = i_S^*(\mathbf{F}) = \mathbf{F} \circ i_S.$$

显然,

$$i_{T/S}^* \circ i_S^* = i_T^*,$$

即对每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$,

$$(\mathbf{F}_S)_T = \mathbf{F}_T.$$

下面的结果说明这一记号是合理的.

命题 1.6.1. *函子*

$$(\mathbf{h}_X)_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表当且仅当积 $X \times S$ 存在. 此时

$$(\mathbf{h}_X)_S \simeq \mathbf{h}_{X_S}.$$


这说明 $\mathbf{F}_S$ 有两种解释: 它既是 $\mathbf{F}$ 在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的限制, 也是由基变换 $e \leftarrow S$ 得到的函子. 因此采用如下记号:

[13] 编者注: 即若 $g : U \to S$ (分别地, $h : V \to T$) 是 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 的一个对象, 则 $i_S(g) = U$, 而 $i_{T/S}(h)$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的对象 $f \circ h : V \to S$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(U, X \times S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(U, X),$$

分别地,

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/T}}(V, X \times_S T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(V, X).$$



此图同时体现了前面的两种解释. 注意

$$\Gamma(\mathbf{F}_S) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{h}_S, \mathbf{F}) \simeq \mathbf{F}(S),$$

特别地,

$$\Gamma(X_S) \simeq \mathrm{Hom}(S, X).$$

1.7.0.

设 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象. [14] 考虑 $\mathbf{E}$ 上的 $\mathscr{C}$ *的对象*所成的范畴 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 其对象是二元组 (V, ρ), 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象 V 和 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射 $\rho : \mathbf{h}_V \to \mathbf{E}$, 即 $\rho \in \mathbf{E}(V)$ 组成. 从 (V, ρ) 到 (V', ρ') 的态射是 $\mathscr{C}$ 中满足

$$\rho' \circ f = \rho, \qquad \text{即} \qquad \mathbf{E}(f)(\rho') = \rho.$$

的态射 $f : V \to V'$. 设 $\mathbf{L}$ 为函子

$$\mathbf{L} = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V.$$

因此, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\mathbf{L}(S) = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V(S)$$

是三元组 (V, ρ, v) 的等价类所成的集合, 其中 $v : S \to V$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射; 对每个满足 $\rho' \circ f = \rho$ 的 $\mathscr{C}$ 中的态射 $f : V \to V'$, 将 (V, ρ, v) 与 $(V', \rho', f \circ v)$ 等同.

将 (V, ρ, v) 的类映到 $\mathbf{E}(S)$ 中的元素 $\rho \circ v$ 的映射 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是良定义的, 并给出一个函子态射

$$\phi_{\mathbf{E}} : \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V \longrightarrow \mathbf{E}.$$

引理. *态射 $\phi_{\mathbf{E}}$ 是同构.*

事实上, 设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 每个 $x \in \mathbf{E}(S)$ 都是三元组 (S, x, id_S) 在 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 下的像; 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是满射. 反过来, 设 $\ell_1 = (V_1, \rho_1, v_1)$ 和 $\ell_2 = (V_2, \rho_2, v_2)$ 是 $\mathbf{L}(S)$ 的两个元素, 它们在 $\mathbf{E}(S)$ 中具有相同的像, 并置

$$\gamma = \rho_1 \circ v_1 = \rho_2 \circ v_2.$$

那么 ℓ_1 和 ℓ_2 在 $\mathbf{L}(S)$ 中都等于 $(S, \gamma, \mathrm{id}_S)$ 的类. 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是单射.

推论. *对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{F}$, 有*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) = \varprojlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{F}(V).$$

[14] 编者注: 下面的引理是新增的 (见 SGA 4, I.3.4); 它用于 1.7.1 的证明, 并且在后文中会多次用到.

1.7. 对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$ 等

设 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象如下:

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}\times\mathbf{h}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 有如下性质:

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$. [15]

(ii) $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的构造与基扩张可交换:

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})_S.$$

(iii) $(\mathbf{F},\mathbf{G})\mapsto\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 是双函子, 对 $\mathbf{F}$ 反变, 对 $\mathbf{G}$ 协变.

这三个性质由定义立即可得.

我们将证明, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$,

$$\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

设 $\phi:\mathbf{E}\times\mathbf{F}\to\mathbf{G}$. 我们要为它配一个从 $\mathbf{E}$ 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的态射. 对 $\mathscr{C}$ 的一个箭头 $S'\to S$, 有映射

$$\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S')\longrightarrow\mathbf{E}(S')\times\mathbf{F}(S')\xrightarrow{\phi(S')}\mathbf{G}(S').$$

因此, $\mathbf{E}(S)$ 的每个元素 e 对每个 $S'\to S$ 定义一个关于 S' 函子性的映射 $\mathbf{F}(S')\to\mathbf{G}(S')$; 这便是 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)$ 的一个元素 $\theta_\phi(e)$. 由此得到映射

$$\phi\longmapsto\theta_\phi,\qquad\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big),$$

它关于 $\mathbf{E}$ 是函子性的.

命题 1.7.1. [16] *设 $\mathbf{E},\mathbf{F},\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$.*

(a) 映射 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是双射:

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big).$$

(b) 此外, 有函子同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

对于 (a), 将两端都看成 $\mathbf{E}$ 的函子. 当 $\mathbf{E}=\mathbf{h}_X$ 时, 所述结果成立, 因为这时它恰好是函子 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的定义. 此外, 两端作为 $\mathbf{E}$ 的函子, 都将正向极限变成逆向极限. 最后, 由 引理 1.7.0, $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$ 都同构于 $\mathbf{h}_X$ 的正向极限, 其中 X 遍历 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 这就证明了 (a).

我们还给出 (a) 的一个直接证明的梗概. 对每个

$$\theta\in\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)$$

[15]编者注: 若 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的第三个对象, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F}\times\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G}).$$

[16]编者注: 新增的 (b) 项将在 II.1 和 II.3.11 中用到. 还补写了 (a) 项的另一种更直接的证明梗概.

如下配一个 $\phi_\theta \in \mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})$. 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有关于 S 函子性的映射

$$\theta(S):\mathbf{E}(S)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{F}\times S,\mathbf{G}),$$

若 $(e,f)\in\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S)$, 则 f 是态射 $S\to\mathbf{F}$, 所以 $f\times\mathrm{id}_S$ 是态射 $S\to\mathbf{F}\times S$. 另一方面, $\theta(S)(e)$ 是态射 $\mathbf{F}\times S\to\mathbf{G}$. 因此复合给出态射

$$\theta(S)(e)\circ(f\times\mathrm{id}_S):S\longrightarrow\mathbf{G},$$

即 $\mathbf{G}(S)$ 的一个元素 $\phi_\theta(S)(e,f)$. 容易验证, $S\mapsto\phi_\theta(S)$ 关于 S 是函子性的, 因而定义了从 $\mathbf{E}\times\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的态射 ϕ_θ. 映射 $\theta\mapsto\phi_\theta$ 和 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是互逆双射的验证留给读者.

对于 (b), 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 则由 1.7(ii), 以及将 (a) 项应用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 有

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))(S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S,\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S))\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S\times_S\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F}\times S,\mathbf{G})\\&\quad\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})(S),\end{aligned}$$

并且这些同构关于 S 是函子性的.

推论 1.7.2. *有同构*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})),$$

以及

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})).$$

特别地, 取 $\mathbf{E}=\underline{\mathbf{e}}$, 并利用 $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$, 得到

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

复合运算给出函子性的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{H})\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{H}).$$

若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象, 用 $\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 表示 $\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 中由从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的同构组成的子集. 定义 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的子对象 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 如下:

$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)=\mathrm{Isom}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S).$$

则

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G}),\qquad\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{G},\mathbf{F}).$$

在 $\mathbf{F}=\mathbf{G}$ 的特殊情形下, 置

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{End}(\mathbf{F})&=\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\big),\\\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{Aut}(\mathbf{F})&=\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})\big).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$, $\underline{\mathrm{Aut}}$ 和 $\underline{\mathrm{End}}$ 的构造都与基变换可交换.

注 1.7.3. [17] 也可以如下构造一个与 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 同构的对象. 有态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}).$$

[17]编者注: 为便于后文引用, 增加了编号 1.7.3.

交换 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$, 得到态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

另一方面, $\mathbf{F}$ 的恒等态射是 $\mathrm{End}(\mathbf{F})$ 的一个元素, 因而定义了态射 $\underline{\mathbf{e}}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})$. 对 $\mathbf{G}$ 作同样处理, 再取积, 得到态射

$$\underline{\mathbf{e}}\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

于是立即可见, $\underline{\mathbf{e}}$ 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

在 $\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G})$ 上的纤维积同构于 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$.

所有这些定义特别适用于 $\mathbf{F}=\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_Y$ 的情形. 若 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{h}_X,\mathbf{h}_Y)$ 可由 $\mathscr{C}$ 的某个对象表示, 则将该对象记为 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$. 它具有如下性质: 若 $Z\times X$ 存在, 则

$$\mathrm{Hom}\big(Z,\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)\big)\simeq\mathrm{Hom}(Z\times X,Y).$$

当 $\mathscr{C}$ 中的积存在时, 这一性质刻画了该对象.

同样, 当下列对象存在时, 定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y),\qquad\underline{\mathrm{End}}(X),\qquad\underline{\mathrm{Aut}}(X).$$

我们只指出, 上述构造表明, 只要 $\mathscr{C}$ 中的纤维积存在, 并且对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y),\quad\underline{\mathrm{Hom}}(Y,X),\quad\underline{\mathrm{End}}(X),\quad\text{以及}\quad\underline{\mathrm{End}}(Y)$$

存在, 则 $\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y)$ 存在.

以上一切也适用于形如 $\mathscr{C}_{/S}$ 的范畴. 我们将尽可能用适当的符号明确表示相应的对象. 例如, 若 T 和 T' 是 $\mathscr{C}$ 中 S 上的两个对象, 则用 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(T,T')$ 表示对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}}(T/S,T'/S).$$

1.8. 常对象

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, 其中存在直和与纤维积, 且直和与基变换可交换 (例如概形范畴).[18] 对每个集合 E 和 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 置

$$E_S=\begin{cases}\text{对象族}(S_i)_{i\in E}\text{ 的直和,}\\ \text{其中各对象属于}\mathscr{C}\text{ 且均同构于}S.\end{cases}\tag{1.8.1}$$

这个对象由下式刻画:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(E_S,T)=\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\big(E,\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(S,T)\big),\tag{1.8.2}$$

其中 $T\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 任意.

对象 E_S 有一个到 S 的典范投影, 因而 $E\mapsto E_S$ 实际上是从 $\mathbf{Set}$ 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子.[19] 若 $S'\to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的箭头, 则由于直和与基变换可交换, 有

$$E_{S'}=(E_S)_{S'}.$$

特别地, 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$E_S=(E_e)_S.$$

[18]编者注: 旧术语“预概形/概形”已替换为现行术语“概形/分离概形”.

[19]编者注: 以下三段调整了语句次序, 并增补了关于下述条件 $(*)$ 所起作用的若干细节.

从 **Set** 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子 $E \mapsto E_S/S$ 与有限积可交换. 只需证明

$$E_S \times_S F_S = (E \times F)_S. \tag{$\times$}$$

事实上, 将 1.7 的结果用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 可知对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$ 都有自然同构 (所有未注明下标的 Hom 均在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中取):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}((E \times F)_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E \times F, \mathrm{Hom}(S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(F, \mathrm{Hom}(S, T))) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(F_S, T)),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(E_S \times_S F_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}(E_S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T))).\end{aligned}$$

但

$$\mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \simeq \mathrm{Hom}(F_S, T),$$

这就证明了 $(\times)$.

设以 $\varnothing$ 表示 $\mathscr{C}$ 的一个始对象, 且下图是笛卡尔图:

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \varnothing & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S \amalg S \end{array}$$

概形范畴满足这一条件.[20] 那么函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换.

事实上, 由 $(\times)$ 可知, 只需证明 $E \mapsto E_S$ 与纤维积可交换. 设 $u : E \to G$ 和 $v : F \to G$ 是两个集合映射. 由于 $\mathscr{C}$ 中的直和与基变换可交换, 有

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{f \in F} (S_f \times_{G_S} E_S) \simeq \coprod_{\substack{f \in F \\ x \in E}} (S_f \times_{G_S} S_x). \tag{1}$$

若 $v(f) \neq u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S_f \times_{G_S} S_x \longrightarrow S_f \times_{S_{v(f)} \coprod S_{u(x)}} S_x.$$

由条件 $(*)$, 右端为 $\varnothing$. 因此

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq \varnothing \qquad \text{当} v(f) \neq u(x). \tag{2}$$

另一方面, 若 $v(f) = u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S \longrightarrow S_f \times_{G_S} S_x.$$

由于 $S \xrightarrow{\mathrm{id}} S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的终对象, 可得

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq S \qquad \text{当} v(f) = u(x). \tag{3}$$

[20]编者注: 若 $\mathscr{C}$ 是仅有箭头 $A \to B$, id_A 和 id_B 的范畴, 则条件 $(*)$ 不成立. 此时有 $B \coprod B = B$ 和 $B \times_B B = B \not\simeq A$.

结合 (1), (2) 及 (3), 得到关于 S 函子性的同构:

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{F\times_G E} S = (F \times_G E)_S.$$

形如 E_S 的对象称为*常对象 (constant object)*. 存在一个关于 E 函子性的态射

$$E \longrightarrow \Gamma(E_S/S),$$

它把每个 $i \in E$ 对应到由 S 到 S_i 的同构所定义的 E_S 在 S 上的截面. 设条件 $(*)$ 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 均成立. 那么只要 $S \neq \varnothing$, $E \to \Gamma(E_S/S)$ 就是单态射.

若 $\mathscr{C}$ 是概形范畴, 则 $\Gamma(E_S/S)$ 等同于从拓扑空间 S 到集合 E 的局部常值映射的集合; 上述映射把 E 的每个元素对应到相应的常值映射. 因此, 也可以等价地将 E_S 定义为下述函子的代表对象: 该函子把每个 S 上的 S' 对应到从拓扑空间 S' 到 E 的局部常值函数的集合.[21]

2. 代数结构

给定集合范畴中的一种代数结构, 我们要将它推广到范畴 $\mathscr{C}$. 先讨论群的例子.

2.1. 群结构

沿用上一段的记号.

定义 2.1.1. 设 $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. $\mathbf{G}$ 上的一个$\widehat{\mathscr{C}}$*-群结构*是指: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定集合 $\mathbf{G}(S)$ 上的一个群结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $f : S' \to S''$, 映射

$$\mathbf{G}(f) : \mathbf{G}(S'') \longrightarrow \mathbf{G}(S')$$

是群同态. 若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则从 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{H}$ 的$\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射*是指满足下述条件的态射 $u \in \mathrm{Hom}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $u(S) : \mathbf{G}(S) \to \mathbf{H}(S)$ 都是群同态.

以 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ 表示这些态射的集合, 并以 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 表示它们构成的范畴.

例. 对 $\mathbf{E} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 对象 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 显然具有 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 终对象 $\underline{\mathbf{e}}$ 有唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使它成为 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 的终对象.

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 设 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 为 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这些元素 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 组成的族定义了

$$e_{\mathbf{G}} \in \Gamma(\mathbf{G}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G}).$$

它是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\underline{\mathbf{e}} \to \mathbf{G}$, 称为 $\mathbf{G}$ 的*单位截面 (unit section)*.

给定 $\mathbf{G}$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 等价于给定 $\mathbf{G}$ 上的一个合成律, 即一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-态射

$$\pi_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\pi_{\mathbf{G}}(S)$ 都赋予 $\mathbf{G}(S)$ 一个群结构.

同样, $f : \mathbf{G} \to \mathbf{H}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射, 当且仅当下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G}\times\mathbf{G} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{G}}} & \mathbf{G} \\ {\scriptstyle (f,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathbf{H}\times\mathbf{H} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{H}}} & \mathbf{H} \end{array} .$$

[21] 编者注: 对角态射 $E_S \to E_S \times_S E_S = (E \times E)_S$ 也是闭浸入; 换言之, E_S 在 S 上分离.

若 $\mathbf{G}$ 的子对象 $\mathbf{H}$ 满足: 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 均为 $\mathbf{G}(S)$ 的子群, 则它显然具有由 $\mathbf{G}$ 的结构诱导出的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 这是使单态射 $\mathbf{H}\to\mathbf{G}$ 成为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射的唯一结构. 配备这一结构后, 称 $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的一个子 *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*.

若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则 $\mathbf{G}\times\mathbf{H}$ 具有显然的积结构: 对每个 S, 在集合 $\mathbf{G}(S)\times\mathbf{H}(S)$ 上赋予所给群结构的积. 所得对象称为 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 的*积* *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*; 它是它们在 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴中的积.

若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{G}_S$ 都是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群. 对两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{H}$, 以下式定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})(S)=\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}_S,\mathbf{H}_S).$$

注意, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}$ 一般不是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 更不是范畴 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 中的内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象.

类似地定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H}),\qquad \underline{\mathrm{End}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}),\qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}).$$

定义 2.1.2. 设 $G\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. G 上的一个 *$\mathscr{C}$-群结构*是指 $\mathbf{h}_G\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 从 $\mathscr{C}$-群 G 到 $\mathscr{C}$-群 H 的态射是指一个元素

$$u\in\mathrm{Hom}(G,H)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_G,\mathbf{h}_H)$$

它定义了从 $\mathbf{h}_G$ 到 $\mathbf{h}_H$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射.

以 ($\mathscr{C}$-Gr) 表示 $\mathscr{C}$-群的范畴. 在 **Cat** 中有一个笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccc}(\mathscr{C}\text{-Gr.}) & \longrightarrow & (\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathscr{C} & \xrightarrow{\ \mathbf{h}\ } & \widehat{\mathscr{C}}\end{array}\quad .$$

因此, 只要上述定义和构造所用的函子 (积, 内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象等等) 可表, 这些定义和构造就立即适用于 ($\mathscr{C}$-Gr). 它们也适用于范畴 $\mathscr{C}_{/S}$. 此时将 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}\text{-Gr}}$ 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr}}$, 其他对象也采用类似记号.

2.2.

更一般地, 设 (T) 是由有限逆极限定义的、以 n 个集合为基集的一种结构 —例如用笛卡尔积构成的交换图来定义的结构, 如幺半群、群、带算子的集合、环上的模或环上的 Lie 代数结构. 上述构造定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的 n 个对象 $\mathbf{F}_1,\dots,\mathbf{F}_n$ 上的 "(T) 类结构" 的概念. 这种结构是指: 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在集合 $\mathbf{F}_1(S),\dots,\mathbf{F}_n(S)$ 上给定一个 (T) 类结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 映射族

$$\big(\mathbf{F}_i(S'')\big)_i\longrightarrow\big(\mathbf{F}_i(S')\big)_i$$

是关于结构种类 (T) 的多重同态 (polyhomomorphism).

类似地定义 (T) 类结构的态射, 得到一个范畴

$$(\widehat{\mathscr{C}}\times\cdots\times\widehat{\mathscr{C}})^{(T)}.$$

于是全忠实函子 $\mathbf{h}\times\cdots\times\mathbf{h}$ 通过逆像定义了范畴

$$(\mathscr{C}\times\cdots\times\mathscr{C})^{(T)}.$$

由于它与逆极限可交换, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中引入的所有函子性性质、概念和记号都可以移用于这一范畴.

现设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 并设 (T) 是这样一种代数结构: 它由笛卡尔积之间的某些态射指定, 所满足的公理由这些态射构成的交换图给出. 于是, $\mathscr{C}$ 中一族对象上的一个 (T) 类结构, 就由笛卡尔积之间满足相应交换性条件的相应态射来定义. 因此, 若 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}'$ 是有积的范畴, $f:\mathscr{C}\to\mathscr{C}'$ 是与积可交换的函子, 则 $\mathscr{C}$ 的一族对象 (F_i) 上的 (T) 类结构, 在 $\mathscr{C}'$ 的对象族 $(f(F_i))$ 上诱导出一个同类结构. 这样, 每个 $\mathscr{C}$-群都成为一个 $\mathscr{C}'$-群, 由一个 $\mathscr{C}$-环和该环上的一个模组成的每一对对象, 都成为 $\mathscr{C}'$ 中相应的一对对象, 依此类推.

特别地, 设 $\mathscr{C}$ 满足 1.8 的条件. [22] 该处定义的函子 $E\mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 因此, 它把群变成 S-群 (即 $\mathscr{C}_{/S}$-群), 把环变成 S-环, 等等.

注. 应当注意, 将上述构造用于 $\widehat{\mathscr{C}}$, 得到的恰好是该范畴中已经定义的那些概念. 换言之, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象上, 将它视为 $\mathscr{C}$ 上的函子而给定 (T) 类结构, 等价于在这个对象所定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$ 上的可表函子上给定 (T) 类结构. [23]

我们还要讨论这一构造的另外两个特殊情形: 带算子群的结构与模.

2.3. 带算子群的结构

定义 2.3.1. 设 $\mathbf{E}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 且 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr})$. 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构 (或称 $\mathbf{G}$-对象结构), 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予以 $\mathbf{G}(S)$ 为算子群的集合结构, 使得对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 集合映射 $\mathbf{E}(S'')\to\mathbf{E}(S')$ 与算子群同态 $\mathbf{G}(S'')\to\mathbf{G}(S')$ 相容.

照常, 这等价于给定一个态射

$$\mu:\mathbf{G}\times\mathbf{E}\longrightarrow\mathbf{E}$$

使其对每个 S 都在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予一个 $\mathbf{G}(S)$ 作用的集合结构. 然而,

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{G}\times\mathbf{E},\mathbf{E})\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{G},\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})),$$

所以 μ 定义了一个态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})$. 显然, 这个态射将 $\mathbf{G}$ 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$, 并且是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 因此, 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E}).$$

特别地, 每个元素 $g\in\mathbf{G}(S)$ 都定义了函子 $\mathbf{E}_S$ 的一个自同构 $\rho(g)$, 即 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S$ 的一个与投影 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S\to\mathbf{h}_S$ 可交换的自同构; 因而特别地, 对每个 $S'\to S$, 都定义了集合 $\mathbf{E}(S')$ 的一个自同构.

定义 2.3.2. 以 $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$ 表示 $\mathbf{E}$ 的如下子对象:

$$\mathbf{E}^{\mathbf{G}}(S)=\{x\in\mathbf{E}(S)\mid x_{S'}\text{ 在}\mathbf{G}(S')\text{ 的作用下不变, 对每个}S'\to S\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在 $\mathbf{E}(S)\to\mathbf{E}(S')$ 下的像.

于是, $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, 即 "$\mathbf{G}$ 的不变量子对象", 是 $\mathbf{E}$ 的一个最大子对象, 其上 $\mathbf{G}$ 平凡作用.

---

[22] 编者注: 包括条件 $(*)$.

[23] 编者注: 例如, 对于群结构, 设 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. 若函子

$$\widehat{\mathscr{C}}\longrightarrow\mathbf{Set},\qquad\mathbf{F}\longmapsto\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$$

具有群结构, 则它在 $\mathscr{C}$ 上的限制, 即 $X\mapsto\mathbf{G}(X)$, 也具有群结构. 反之, 若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则其乘法态射 $\pi_{\mathbf{G}}:\mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 对每个 $\mathbf{F}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 上诱导出一个群结构, 而且这关于 $\mathbf{F}$ 是函子性的.

定义 2.3.3. 设 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个子对象. 以 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$\begin{aligned}(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}_S = \mathbf{F}_S\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}(S') = \mathbf{F}(S') \text{ 对每个} S' \to S\},\\ (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}_S} = \mathrm{id}\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}(S')} = \mathrm{id} \text{ 对每个} S' \to S\}.\end{aligned}$$

这里, $\rho(g)$ 后的竖线表示限制. [24]

附论 2.3.3.1. [25] 特别地, 设 $x \in \Gamma(\mathbf{E})$, 即 (参见 1.2) 一族元素 $x_S \in \mathbf{E}(S)$, $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 使得对于每个箭头 $f : S' \to S$, 都有 $\mathbf{E}(f)(x_S) = x_{S'}$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 则 $\Gamma(\mathbf{E}) = \mathbf{E}(S_0)$. 元素 x 于是定义了 $\mathbf{E}$ 的一个子函子, 记作 $\mathbf{x}$, 并且

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x}.$$

将这个函子记作 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$, 并称其为 x 的 *稳定子 (stabilizer)*; 于是, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)(S) = \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)x_S = x_S\}.$$

假设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积. 若 $\mathbf{G} = \mathbf{h}_G$ (分别地, $\mathbf{E} = \mathbf{h}_E$), 其中 G 是一个 $\mathscr{C}$-群 (分别地, $E \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), 且 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 从而 x 是一个态射 $S_0 \to E$, 则 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$ 由纤维积 $G \times_E S_0$ 表出, 其中态射 $G \to E$ 是

$$\mathrm{id}_G \times x : G = G \times S_0 \longrightarrow G \times E$$

与

$$\mu : G \times E \longrightarrow E.$$

的复合.

注 2.3.3.2.[25] $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 的构造与基变换可交换; 即对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$(\mathbf{E}^{\mathbf{G}})_S = (\mathbf{E}_S)^{\mathbf{G}_S}, \qquad (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S, \qquad (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S.$$

定义 2.3.4. 若 G 是一个 $\mathscr{C}$-群, $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 (分别地, E 是 $\mathscr{C}$ 的对象), 则 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, E 上) 的 G-对象结构, 是指 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, $\mathbf{h}_E$ 上) 的 $\mathbf{h}_G$-对象结构.

根据这个定义, 以上定义的所有概念和记号, 只要仅涉及可表函子, 都可移用到 $\mathscr{C}$ 中. 例如, 若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{h}_G}(\mathbf{h}_F)$ 可表, 则有唯一的 G 的子对象表出它; 该子对象于是成为 G 的一个子 $\mathscr{C}$-群, 记作 $\mathrm{Norm}_G(F)$, 其余类推.

定义 2.3.5.

(a) 若 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 配备了一个 $\mathbf{G}$-对象结构, 并且对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{H}(S)$ 的自同构都是群自同构, 则称 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 作用于群 $\mathbf{H}$.

等价地, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, $\mathbf{H}_S$ 的自同构 $\rho(g)$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群自同构; 或者等价地, $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{H})$ 将 $\mathbf{G}$ 映入

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{H}).$$

[24]编者注: 原文已作修正, 将包含关系 $\rho(g)\mathbf{F}_S \subset \mathbf{F}_S$ 改为等式, 以保证 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{F})$ 确实是一个群. 关于 "输运子 (transporter)" 与 "严格输运子 (strict transporter)" 重合的条件, 见 VI_{B}, 6.4.

[25]编者注: 附论 2.3.3.1 和 注 2.3.3.2 为新增内容.

(b) 在上述情形中, $\mathbf{H}\times\mathbf{G}$ 上存在唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使得对每个 S, $(\mathbf{H}\times\mathbf{G})(S)$ 都是群 $\mathbf{H}(S)$ 与 $\mathbf{G}(S)$ 关于给定的 $\mathbf{G}(S)$ 在 $\mathbf{H}(S)$ 上的作用的半直积. 将这个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群记作 $\mathbf{H}\cdot\mathbf{G}$, 称为**H** *与* **G** *的半直积 (semidirect product).* 于是, 按定义,

$$(\mathbf{H}\cdot\mathbf{G})(S)=\mathbf{H}(S)\cdot\mathbf{G}(S).$$

设 $\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S$ 以及每个 $g\in\mathbf{G}(S)$, 以 $\mathrm{Int}(g)$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}(S')$ 的自同构:

$$\mathrm{Int}(g)h=ghg^{-1}.$$

这个定义延拓为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\mathrm{Int}:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{G})\subset\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{G}).$$

因此可应用定义 2.3.3; 对于 $\mathbf{G}$ 的每个子对象 $\mathbf{E}$, 都有 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E})\qquad\text{及}\qquad\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E}).$$

定义 2.3.6. $\mathbf{G}$ 的*中心 (center)* 记作 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})$, 是指 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})$. 若 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{G}(S)$ 都是交换群, 则称 $\mathbf{G}$ 是交换的.

若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的正规子群, 则称 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中正规. [26]

定义 2.3.6.1. [27] 设 $f:\mathbf{G}\to\mathbf{G}'$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. f 的*核 (kernel)* 记作 $\mathrm{Ker}\,f$, 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$(\mathrm{Ker}\,f)(S)=\{x\in\mathbf{G}(S)\mid f(S)(x)=1\}=\mathrm{Ker}\,f(S)$$

它是一个正规子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

注意, 若 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_G$, $\mathbf{G}'=\mathbf{h}_{G'}$, $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 且 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 则 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $S_0\times_{G'}G$ 表出.

定义 2.3.6.2.[27] 设 $\mathbf{E}\in\widehat{\mathscr{C}}$, 而 $\mathbf{G}$ 是一个作用于 $\mathbf{E}$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 若态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 的核平凡, 则称 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{E}$ 上的作用是 *忠实的 (faithful)*; 即对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g\in\mathbf{G}(S)$, 条件

$$g_{S'}\cdot x=x\qquad\text{对每个}S'\to S\text{及每个}x\in\mathbf{E}(S')$$

蕴含 $g=1$.

初等群论中的许多定义和命题都很容易移用于这里. 我们只记下以下将要用到的命题.

命题 2.3.7. *设 $f:\mathbf{W}\to\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 置 $\mathbf{H}(S)=\mathrm{Ker}\,f(S)$. 设 $u:\mathbf{G}\to\mathbf{W}$ 是一个作为 f 的截面的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 (所以必为单态射). 则 $\mathbf{W}$ 可等同于 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{G}$ 关于如下 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{H}$ 上的作用的半直积:*

$$(g,h)\longmapsto\mathrm{Int}(u(g))h$$

其中 $g\in\mathbf{G}(S)$, $h\in\mathbf{H}(S)$, $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

照常, 所有这些定义和命题都可移用于 $\mathscr{C}$. 特别地, 若 G 作用于 H, 则只要笛卡尔积 $H\times G$ 存在, 两个 $\mathscr{C}$-群 H 与 G 的半直积便有定义; 而命题 2.3.7 的类似命题如下.

命题 2.3.8. *设*

$$H\xrightarrow{i}W\xrightarrow{f}G$$

是一个 $\mathscr{C}$-群态射序列, 使得对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $(H(S),i(S))$ 都是 $f(S):W(S)\to G(S)$ 的一个核. 设 $u:G\to W$ 是一个作为 f 的截面的 $\mathscr{C}$-群态射. 则 W 可等同于 H 与 G 关于如下 G 在 H 上的作用的半直积: 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g\in G(S)$, $h\in H(S)$, 则

$$\mathrm{Int}(u(g))i(h)=i({}^gh).$$

[26]编者注: 此外, 若 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都包含于 $\mathbf{G}(S)$ 的中心, 则称 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中是*中心的 (central)*.

[27]编者注: 定义 2.3.6.1 和 2.3.6.2 为新增内容.

3. O-模范畴与 G-O-模范畴

定义 3.1. 设 $\mathbf{O}$ 和 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 集合 $\mathbf{O}(S)$ 配备了一个环结构, 而 $\mathbf{F}(S)$ 配备了这个环上的模结构, 并且对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S' \to S''$, 映射 $\mathbf{O}(S'') \to \mathbf{O}(S')$ 都是环同态, 且 $\mathbf{F}(S'') \to \mathbf{F}(S')$ 都是与该环同态相容的阿贝尔群同态, 则称 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 $\mathbf{O}$ 上的一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-模, 或简称为 $\mathbf{O}$-模.

固定 $\mathbf{O}$ 后, 按通常方式定义两个 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{F}'$ 之间的态射, 从而得到阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 以及 $\mathbf{O}$-模范畴, 记作 ($\mathbf{O}$-Mod.).

引理 3.1.1.[28] *范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 具有逐对象定义的阿贝尔范畴结构. 此外, ($\mathbf{O}$-Mod.) 满足公理* (AB 5) *(见* [Gr57, 1.5]*); 即任意直和都存在, 并且若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则*

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) = \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}.$$

事实上, 设 $f : \mathbf{F} \to \mathbf{F}'$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置

$$(\mathrm{Ker}\, f)(S) = \mathrm{Ker}\, f(S)$$

(分别地, 置相应的类似公式), 以此定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Im}\, f$ 和 $\mathrm{Coker}\, f$). 则 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Coker}\, f$) 是 f 的一个核 (分别地, 余核), 并且有 $\mathbf{O}$-模同构

$$\mathbf{F}/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f.$$

这就证明了 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴.

任意直和都存在, 并且是逐对象定义的. 最后, 若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则包含关系

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) \subset \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}$$

实际上是等式. 事实上, 若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 且

$$x \in \mathbf{N}(S) \cap \bigcup_i \mathbf{F}_i(S),$$

则存在一个 $i \in I$, 使得 $x \in \mathbf{N}(S) \cap \mathbf{F}_i(S)$.

命题 3.1.2.[28] *假设范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 即 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合. 则 ($\mathbf{O}$-Mod.) 有一个生成元, 因而有足够多的内射对象.*

证明. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 如下定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{O}_S$. 对每个对象 S', 令 $\mathbf{O}_S(S')$ 为以 $\mathrm{Hom}(S', S)$ 为指标的 $\mathbf{O}(S')$ 的若干副本的直和, 即

$$\mathbf{O}_S(S') = \bigoplus_{g:S'\to S} \mathbf{O}(S')g.$$

对每个态射 $f : S'' \to S'$, 以 f^* 表示环同态 $\mathbf{O}(S') \to \mathbf{O}(S'')$, 则态射

$$\mathbf{O}_S(f) : \mathbf{O}_S(S') \longrightarrow \mathbf{O}_S(S'')$$

[28]编者注: 新增断言 3.1.1 与 3.1.2, 是为了说明范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴且满足公理 (AB 5), 并且当范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴时, 还有足够多的内射对象. 此处修正了 Linyuan Liu 于 2016 年指出的 3.1.2 中的一个错误.

将 $\mathbf{O}_S(S')$ 的每个元素 ag, 其中 $a \in \mathbf{O}(S')$ 且 $g : S' \to S$, 映到 $\mathbf{O}_S(S'')$ 的元素 $f^*(a)(g \circ f)$. 容易验证, 这定义了一个取值于 $\mathbf{O}$-模的函子.

由于假设 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合, 可以构造直和

$$\mathbf{G} = \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{O}_S.$$

引理 3.1.2.1. *设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 每个元素 $x \in \mathbf{F}(S)$ 都定义了唯一的 $\mathbf{O}$-模态射*

$$\mathbf{x} : \mathbf{O}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得 $\mathbf{x}(1\,\mathrm{id}_S) = x$.

证明. 设 $\phi : \mathbf{O}_S \to \mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射, 满足 $\phi(1\,\mathrm{id}_S) = x$. 设 $g : S' \to S$ 且 $a \in \mathbf{O}(S')$. 由 $\mathbf{O}(S')$-线性以及下图的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S) & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S) \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(g)} \\ \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \end{array}$$

可得

$$\phi(ag) = a\phi(1g) = a\mathbf{F}(g)\big(\phi(1\,\mathrm{id}_S)\big) = a\mathbf{F}(g)(x).$$

因此, 若 ϕ 存在, 则它由上述等式确定. 反之, 若如此定义 ϕ, 则对每个 $f : S'' \to S'$, 都有

$$\begin{aligned} \phi \circ \mathbf{O}_S(f)(ag) &= \phi\big(f^*(a)(g \circ f)\big) \\ &= f^*(a)\mathbf{F}(g \circ f)(x) \\ &= \mathbf{F}(f)\big(a\mathbf{F}(g)(x)\big) \\ &= \mathbf{F}(f) \circ \phi(ag), \end{aligned}$$

即下图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(f)} \\ \mathbf{O}_S(S'') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S'') \end{array}$$

是交换的. 引理得证.

现在设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 令 $F_0(S)$ 为 $\mathbf{O}(S)$-模 $\mathbf{F}(S)$ 的一个生成元集, 并令 $\mathbf{L}_S$ 为以 $F_0(S)$ 为指标的 $\mathbf{O}_S$ 的若干副本的直和. 由引理, 得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得态射 $\mathbf{L}_S(S) \to \mathbf{F}(S)$ 是满射, 因而是 $\mathbf{O}(S)$-模范畴中的满态射.

置

$$I = \bigsqcup_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} F_0(S).$$

于是得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{G}^{\oplus I} \longrightarrow \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

它逐对象为满态射, 因而是 (**O**-Mod.) 中的满态射. 这表明 **G** 是 (**O**-Mod.) 的一个生成元 (见 [Gr57, 1.9.1]). 由于 (**O**-Mod.) 满足 (AB 5), 由 [Gr57, 1.10.1] 可知, (**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

注 3.1.3. 若 $\mathbf{O}_0$ 是由

$$\mathbf{O}_0(S) = \mathbb{Z}$$

定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 (不能将它与常对象 $\mathbb{Z}$ 所对应的函子混淆), 则 $\mathbf{O}_0$-模范畴同构于交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴.

定义 3.1.4. 注意, 若 **F** 是一个 **O**-模, 则对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{F}_S$ 都是一个 $\mathbf{O}_S$-模. 因此可由

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')(S) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}_S, \mathbf{F}'_S).$$

定义一个阿贝尔 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$. 同样可以定义对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}'), \qquad \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}), \qquad 及 \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}),$$

其中最后一个对象在由自同构复合所诱导的结构下是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

定义 3.2. 设 **O** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, **F** 是一个 **O**-模, 而 **G** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. **F** 上的 **G**-**O**-模结构是指一个 **G**-对象结构, 使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{F}(S)$ 的自同构都是其 $\mathbf{O}(S)$-模结构的自同构.

等价地, 2.3 中定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$$

将 **G** 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-子群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F})$. 因此, 在 **O**-模 **F** 上赋予一个 **G**-**O**-模结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}).$$

自然可以定义阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 从而得到 **G**-**O**-模的加性范畴, 记作 (**G**-**O**-Mod.).

注 3.2.1. 读者会注意到, (**G**-**O**-Mod.) 也可以定义为 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$-模范畴, 其中 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 **G** 在 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 **O** 上的代数, 其定义是清楚的. [29] 因此, 由 3.1.1 和 3.1.2, (**G**-**O**-Mod.) 是一个满足公理 (AB 5) 的阿贝尔范畴; 此外, 若 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 则 (**G**-**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

本节的所有构造都立即适用于 **G** (或 **O**, 或两者) 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象表出的情形, 该对象于是配备了相应的代数结构.

我们已简要讨论了本讨论班后文中出现的主要代数结构. 对于其他结构 (例如 **O**-Lie 代数结构), 相信本节已为读者提供了足够多的例子, 使读者能在每个具体情形中运用 2.2 中勾画的一般机制.

现在将以上所做的工作应用于概形范畴, 记作 (**Sch**), 更一般地, 应用于范畴 $(\mathbf{Sch})_{/S}$, 也记作 $(\mathbf{Sch}_{/S})$.

4. 概形范畴中的代数结构

在没有歧义时, 我们允许采用下述术语滥用. 用 T 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \xrightarrow{f} S$, 而将 f (即 T 的结构态射) 视为不言明的给定数据; 并将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个子范畴. 根据前几节所述的相容性, 这些等同不会造成问题.

我们也按照下述方式简化术语: 将 (**Sch**)-群也称为 *群概形*; 将 $(\mathbf{Sch})_{/S}$-群称为 *S 上的群概形*, *S-群概形*或 *S-群*; 当 S 是环 A 的谱时, 也称之为 *A-群*.

[29] 编者注: 以下句子为新增内容, 将用于第 5 节.

4.1. 常概形

概形范畴满足 1.8 中要求的条件. 因此可以在其中定义常对象. 对每个集合 E, 有一个概形 $E_{\mathbb{Z}}$; 对每个概形 S, 有一个 S-概形

$$E_S = (E_{\mathbb{Z}})_S.$$

回顾一下 (参见*上述文献*), 对每个 S-概形 T,

$$\mathrm{Hom}_S(T, E_S)$$

是从 T 的底拓扑空间到 E 的局部常值映射组成的集合.

函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 特别地, 若 G 是群, 则 G_S 是 S-群概形; 若 O 是环, 则 O_S 是 S-环概形; 其他代数结构亦然.

4.2. 仿射 S-群

先回顾关于仿射 S-概形的一些事实 (EGA II, 第 1 节). 若 S 的每个仿射开子集的逆像都是仿射的, 就称 S-概形 T *在 S 上仿射*. 此时 $\mathcal{O}_S$-代数 $f_*\mathcal{O}_T$ 是拟凝聚的, 记为 $\mathscr{A}(T)$, 其中 f 表示 T 的结构态射. 反之, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathscr{A}$, 都可以关联一个在 S 上仿射的 S-概形, 记为 $\mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 函子

$$T \longmapsto \mathscr{A}(T), \qquad \mathscr{A} \longmapsto \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$$

是在 S 上仿射的 S-概形范畴与拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴之间的互为拟逆的等价.

由此可知, 在 S 上仿射的 S-概形 T 上给定代数结构, 等价于在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴中, 在 $\mathscr{A}(T)$ 上给定相应的结构. 特别地, 若 G 是在 S 上仿射的 S-群, 则 $\mathscr{A}(G)$ 带有增广 $\mathcal{O}_S$-双代数结构: 有两个 $\mathcal{O}_S$-代数态射


$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G), \qquad \varepsilon : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

它们分别对应于 S-概形态射

$$\pi : G \times G \longrightarrow G, \qquad e_G : S \longrightarrow G.$$

映射 Δ 与 ε 满足以下条件, 这些条件表达了 G 是 S-幺半群. [30]

(HA 1) Δ 是余结合的: 下图交换.



(HA 2) Δ 与 ε 相容: 以下两个复合均为恒等映射:

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes \varepsilon} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G),$$

[30] 编者注: 当然, 取逆态射 $G \to G$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\tau : \mathscr{A}(G) \to \mathscr{A}(G)$, 它与 Δ, ε 一起使 $\mathscr{A}(G)$ 成为 Hopf $\mathcal{O}_S$-代数.

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{Id}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G).$$

借此机会再强调一次, 根据 S-群结构的定义, 要在 S 上仿射的 S-概形 G 上给定这样的结构, 无须对 $\mathscr{A}(G)$ 作任何验证; 只须对每个 S 上的 S', 在 $G(S')$ 上赋予关于 S' 具有函子性的群结构. 作相应变通后, 这个观察也适用于态射.

4.3. 群 $\mathbb{G}_a$ 与 $\mathbb{G}_m$. 环 O

4.3.1.

令 $\mathbb{G}_a$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_a(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S),$$

并赋予由环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的加法群结构定义的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 这个概形也记为 $\mathbb{G}_a$, 因而是一个群概形:

$$\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T].$$

事实上,

$$\mathbb{G}_a(S) = \operatorname{Hom}(S, \mathbb{G}_a) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{a,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[T]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(T) = T \otimes 1 + 1 \otimes T, \qquad \varepsilon(T) = 0.$$

4.3.2.

令 $\mathbb{G}_m$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_m(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times,$$

其中 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$ 表示环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的可逆元组成的乘法群, 并赋予其自然的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 记为 $\mathbb{G}_m$:

$$\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T, T^{-1}] = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}],$$

其中 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 表示 $\mathbb{Z}$ 在环 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 事实上,

$$\mathbb{G}_m(S) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times.$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{m,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[\mathbb{Z}]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in \mathbb{Z}.$$

4.3.3.

令 **O** 为赋予了 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-环结构的函子 $\mathbb{G}_a$. 它由概形 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T]$ 表示; 在将该概形视为带有环概形结构时, 我们将其记为 **O**.

因此, 对每个概形 S,

$$\mathbf{O}_S = S \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T] = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$$

是在 S 上仿射的 S-环概形. (注意: 在 EGA II, 1.7.13 中, $\mathbf{O}_S$ 记为 $S[T]$.)

4.3.3.1. [31] 对 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 的每个对象 X,

$$\mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathbf{O})$$

都带有关于 X 具有函子性的环结构. 特别地, 若 X' 是一个概形, 并给定态射 $x : X' \to X$ 和 $f : X \to \mathbf{O}$ (即 $f \in \mathbf{O}(X)$), 则

$$f(x) = f \circ x \in \mathbf{O}(X') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}).$$

定义. 设 $\pi : M \to X$ 是 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 中的态射, 并令

$$\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X.$$

若对每个 X-概形 X', 集合

$$\mathrm{Hom}_X(X', M)$$

都赋予了关于 X' 具有函子性的 $\mathbf{O}(X')$-模结构, 则称 M 为 $\mathbf{O}_X$-模.

这等价于给定一个 X-交换群运算

$$\mu : M \times_X M \longrightarrow M$$

和一个*外运算*

$$\mathbf{O} \times M = \mathbf{O}_X \times_X M \longrightarrow M, \qquad (f, m) \longmapsto f \cdot m,$$

后者是 X-态射, 即满足 $\pi(f \cdot m) = \pi(m)$, 且对每个 $x \in X(S)$, 它赋予

$$M(x) = \{m \in M(S) \mid \pi(m) = x\}$$

以 $\mathbf{O}(S)$-模结构.

在此情形下, 对每个不一定可表的 $Y \in \mathrm{Ob}(\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/X})$,

$$\mathrm{Hom}_X(Y, M) = \Gamma(M_Y/Y)$$

都是一个关于 Y 具有函子性的 $\mathbf{O}(Y)$-模.

4.4. 可对角化群

4.4.1. $\mathbb{G}_m$ 的构造可以推广如下. 设 M 是一个交换群, $M_{\mathbb{Z}}$ 是按照 4.1 的方法与之关联的群概形. 考虑下式定义的函子:

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \mathbb{G}_m(S)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

这是一个交换 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群, 由一个记为 $D(M)$ 的群概形表示; 因而按照定义,

$$D(M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m).$$

事实上, 令

$$D(M) = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}[M],$$

其中 $\mathbb{Z}[M]$ 是 M 在 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 由代数 $\mathbb{Z}[M]$ 的定义本身可知

$$D(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[M], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^{\times})$$

[31] 编者注: 本段为新增内容; 后文将会用到 (参见 II, 1.3).

成立.

4.4.2. 因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群概形,

$$D_S(M) = D(M)_S = \left(\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m)\right)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[M]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in M.$$

4.4.3. 若 $f : M \to N$ 是交换群同态, 则可用显然的方式定义 S-群态射

$$D_S(f) : D_S(N) \longrightarrow D_S(M),$$

从而得到一个从交换群范畴到在 S 上仿射的 S-群范畴的函子

$$D_S : M \longmapsto D_S(M)$$

它也可定义为函子 $M \mapsto M_S$ 与函子

$$M_S \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

的复合. 这个函子与基扩张可交换.

与形如 $D_S(M)$ 的群同构的 S-群称为*可对角化群*. 注意, M 的元素可解释为 $D_S(M)$ 的某些特征标, 即下列集合的某些元素:

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(D_S(M), \mathbb{G}_{m,S}).$$

(比较 VIII, 1.)

4.4.4. 下面给出一些可对角化群的例子. 首先,

$$D(\mathbb{Z}) = \mathbb{G}_m, \qquad D(\mathbb{Z}^r) = (\mathbb{G}_m)^r.$$

令

$$\boldsymbol{\mu}_n = D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

并称之为 n *次单位根群*. 事实上,

$$\boldsymbol{\mu}_n(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times) = \{f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \mid f^n = 1\}.$$

S-群 $\boldsymbol{\mu}_{n,S}$ 对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[T]/(T^n - 1)$. 特别地, 假设 S 是一个特征为 $p = n$ 的域 k 的谱. 令 $T - 1 = s$, 得到

$$k[T]/(T^p - 1) = k[s]/(s^p),$$

这表明 $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$ 的底拓扑空间只有一个点, 其局部环为 Artin k-代数 $k[s]/(s^p)$. 同样地, 注意 S-概形 $\mathbb{G}_{a,S}$, $\mathbb{G}_{m,S}$ 和 $\mathbf{O}_S$ 都在 S 上平滑, 而 $D_S(M)$ 在

S 上平坦. 此外, 它在 S 上形式平滑 (分别地, 平滑) 当且仅当 S 的任何剩余特征都不整除 M 的挠元的阶 (分别地, 并且还要求 M 为有限型); 参见 第 VIII 篇, 2.1.

4.5. 群的其他例子

前述方法适用于 "典型群" (线性群 GL_n, 辛群 Sp_n, 正交群 O_n 等). 例如, 将 GL_n 定义为表示下述函子 $\mathbf{GL}_n$ 的群概形:

$$\mathbf{GL}_n(S) = \mathrm{GL}\big(n, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)\big) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n).$$

例如, 可将其构造为 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}]$, $1 \le i, j \le n$, 中由函数

$$f = \det\big((T_{ij})_{i,j=1}^n\big),$$

定义的开子概形, 即 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}, f^{-1}]$.

4.6. 概形范畴中的函子模

对概形 S 上的每个 $\mathcal{O}_S$-模, 我们都要关联一个 $\mathbf{O}_S$-模, 其中 $\mathbf{O}_S$ 表示在 4.3.3 中引入的函子环. 这有以下两种不同的做法.

定义 4.6.1. 设 S 是一个概形. 对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 用 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 表示 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上由下式定义的反变函子:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}, \mathcal{O}_{S'}),$$
$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}),$$

其中 $\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 在 S' 上的逆像.

于是 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 以显然的方式带有 $\mathbf{O}_S$-模结构 (回顾 $\mathbf{O}_S(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}) = \mathbf{W}(\mathcal{O}_S)(S')$). 因而实际上已经定义了两个从 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 $\mathbf{O}_S$-模范畴的函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$, 其中 $\mathbf{V}$ 反变, $\mathbf{W}$ 协变.

在本段余下部分中, 我们限于所涉及的 $\mathcal{O}_S$-模都是拟凝聚的情形. 因此将 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 视为以下函子:

$$\mathbf{V} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.})^\circ \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}), \qquad \mathbf{W} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}).$$

注 4.6.1.1. [32] 读者会注意到, 在下文中, 仅涉及函子 $\mathbf{W}$ 的每个命题对任意 $\mathcal{O}_S$-模仍成立, 而不必要求其拟凝聚.

命题 4.6.2.

(i) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 与基扩张可交换: 若 S' 在 S 上, 且 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F})_{S'}, \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F})_{S'}.$$

(ii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是全忠实的: 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F})),$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))$$

都是双射.

(iii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是加性的:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{V}(\mathscr{F}'), \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{W}(\mathscr{F}').$$

(i) 与 (iii) 由定义立即可得. 对于 (ii), 取 S' 为 S 的开子概形即可. 证明留给读者 (对于 $\mathbf{V}$, 使用 EGA II, 1.7.14).

回顾一下 (参见 3.1.4), 若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 是 $\mathbf{O}_S$-模, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$ 表示取值于交换群的 S-函子, 它对每个 $S' \to S$ 赋予群

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}}(\mathbf{F}_{S'}, \mathbf{F}'_{S'}).$$

命题 4.6.3. *在* $(\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.})$ *中有以下典范态射:* [33]

[32]编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 4.6.1.1.

[33]编者注: 新增了同构 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}')) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))$.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}')) & = & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F})) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')) & \end{array} .$$

这由 4.6.2(i) 和 (ii) 立即可得.

记号 4.6.3.1. 设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 根据 EGA II, 1.7.8, S-函子 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 可由一个在 S 上仿射的 S-概形表示, 记为 $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, 并称为由 $\mathscr{F}$ 定义的*向量纤维化 (vector fibration)*: [34]

$$\mathbb{V}(\mathscr{F}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}(\mathscr{F})),$$

其中 $\mathcal{S}(\mathscr{F})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 的对称代数. [35]

命题 4.6.4. *设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, $\mathscr{A}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数. 有一个具有函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \mathscr{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathscr{A}).$$

事实上, 令 $X = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 左端典范同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))(X),$$

即按照定义, 典范同构于

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}')_X, \mathbf{W}(\mathscr{F})_X) \\ &\quad \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X), \mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X)) \end{aligned}$$

(参见 4.6.2(i)). 由 4.6.2(ii), 这也可写为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X, \mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \pi_*\pi^*(\mathscr{F})),$$

其中 $\pi : X \to S$ 是结构态射. 而由 EGA II, 1.4.7, 有

$$\pi_*\pi^*(\mathscr{F}) \simeq \mathscr{F}\otimes\mathscr{A},$$

证明完毕.

推论 4.6.4.1. *有一个典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathscr{A}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

事实上, [36] 设 $f : S' \to S$ 是一个 S-概形, 并令 $X' = X\times_S S'$. 有一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle\pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

[34]编者注: 已将 "向量丛" 替换为 "向量纤维化". 按照现行用法, 秩为 r 的局部平凡向量纤维化称为 "秩为 r 的向量丛", 即其截面层局部同构于 $\mathcal{O}_S^{\oplus r}$.

[35]编者注: 文章 [Ni04] 和 [Ni02] 分别表明, 若 S 是 Noether 概形, $\mathscr{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$, 分别地, 对每个 $T\to S$ 赋予 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_T}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_T)$ 的 S-群, 可表当且仅当 $\mathscr{F}$ 局部自由.

[36]编者注: 以下对原文作了展开.

由 EGA II, 1.5.2, X' 在 S' 上仿射, 并且 $\pi'_*\mathcal{O}_{X'} = f^*(\mathscr{A})$. 因此

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(S')\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{S'}\big(\mathrm{Spec}(f^*\mathscr{A}), \mathbf{W}(f^*\mathscr{F})\big).\end{aligned}$$

将 4.6.4 应用于 $f^*\mathscr{F}$, $\mathscr{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 和 $f^*\mathscr{A}$, 得知上式等于

$$\begin{aligned}\Gamma(S', f^*\mathscr{F} \otimes f^*\mathscr{A}) &= \Gamma(S', f^*(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}))\\ &= \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A})(S').\end{aligned}$$

命题 4.6.5. *若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 则 4.6.3 中的态射都是同构.*

事实上, 对每个 $S' \to S$,

$$\begin{aligned}&\mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}'))(S')\\ &\quad = \Gamma\big(S', \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \otimes \mathcal{O}_{S'}\big)\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}, \mathscr{F}' \otimes \mathcal{O}_{S'}).\end{aligned}$$

根据 4.6.2(i) 和 (ii), 最后一项既同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))(S')$$

也同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))(S')$$

推论 4.6.5.1. *设 $\mathscr{F}$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 令 $\mathscr{F}^\vee = \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathcal{O}_S)$. 有以下典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}),$$

$$\mathbf{V}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}).$$

最后, 我们有如下命题.

命题 4.6.6. *设 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的态射. 态射*

$$\mathbf{W}(f) : \mathbf{W}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}')$$

为单态射当且仅当 f 局部地将 $\mathscr{F}$ 等同于 $\mathscr{F}'$ 的一个直和因子.

正向断言实质上已包含于 EGA 0_{I}, 5.5.5 中. [37] 反之, 若 $\mathscr{F}$ 局部为 $\mathscr{F}'$ 的直和因子, 则对每个 $\pi : S' \to S$, 模 $\pi^*\mathscr{F}$ 都是 $\pi^*\mathscr{F}'$ 的子模, 因为局部作为直和因子时结论成立. 因此

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F})$$

是

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}')(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F}').$$

的子模.

[37] 编者注: 下面一句作了展开.

4.7. G-$\mathcal{O}_S$-模范畴

设 G 是一个 S-群, $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-模; $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 带有 $\mathbf{O}_S$-模结构.

定义 4.7.1. $\mathscr{F}$ 上的一个 *G-$\mathcal{O}_S$-模结构*, 是指 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构 (参见 3.2). G-$\mathcal{O}_S$-模的态射按定义是相应的 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模的态射. 由此得到范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.); 我们用 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 G-$\mathcal{O}_S$-模组成的全子范畴.

由 3.2, 在 $\mathscr{F}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构因而等价于给定一个 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

注 4.7.1.0. [38] 由于 4.6.2 给出取值于群的 S-函子之间的一个反同构

$$(\dagger) \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F})),$$

所以在 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 或 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上给定 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构是等价的. 事实上, 设

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

如上所述. 对每个 $T \to S$ 和 $g \in G(T)$, 用 $\rho^*(g)$ 表示 $\rho(g)$ 在反同构 (†) 下的像. 则

$$\rho^*(gh) = \rho^*(h) \circ \rho^*(g),$$

因此 ρ^* 定义了 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 *右* $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构. 令

$$\rho^\vee(g) = \rho^*(g^{-1}),$$

就得到 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构, 给定这一结构等价于给定 ρ.

注 4.7.1.1. 可以说, 刚才定义的范畴是由下面的笛卡尔方块构造出来的.

$$\begin{array}{ccccc}
(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \longrightarrow & (\mathbf{h}_G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{遗忘} \\
(\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \xrightarrow{\mathbf{W}} & (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.)
\end{array} .$$

范畴 ($\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 和 ($\mathbf{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴, 但须记住, 一般来说函子 $\mathbf{W}$ 既非左正合, 也非右正合. [39]

注 4.7.1.2. [40] 设 $\mathscr{F}$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 其不变量子层 $\mathscr{F}^G$ 定义如下: 对 S 的每个开子集 U,

$$\mathscr{F}^G(U) = \mathbf{W}(\mathscr{F})^G(U) = \{x \in \mathscr{F}(U) \mid g \cdot x_{S'} = x_{S'} \text{ 对每个} S' \xrightarrow{f} U,\ g \in G(S')\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在

$$\Gamma(S', f^*\mathscr{F}) = \Gamma(U, f_*f^*\mathscr{F}).$$

中的像. 应当注意, 自然态射

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^G) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F})^G$$

一般不是同构. 例如, 令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, 并令 G 是常群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \tau\}$, 在 $\mathscr{F} = \mathcal{O}_S$ 上通过 $\tau \cdot 1 = -1$ 作用. 则 $\mathscr{F}^G = 0$, 但若 R 是一个 $\mathbb{F}_2$-代数, 则

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})^G(\mathrm{Spec}(R)) = R.$$

---

[38] 编者注: 此注由 [DG], II, 第 2 节, 1.1 补入.
[39] 编者注: 原文中关于范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴的断言已被删去, 以作更正; 参见下面的 4.7.2.1.
[40] 编者注: 此注为新增内容.

4.7.2. 从现在起直到 4.7 结束, 假设 G 在 S 上仿射. [41] 由 4.6.4, 给定 S-函子态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

等价于给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

此时, ρ 为 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射等价于 μ 满足下述公理.

(CM 1) 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ {\scriptstyle\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}\otimes\Delta} \\ \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\mu\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

(CM 2) 下面的复合是恒等映射.

$$\mathscr{F} \xrightarrow{\ \mu\ } \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\ \mathrm{Id}\otimes\varepsilon\ } \mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\ \sim\ } \mathscr{F} \quad .$$

这些公理 (CM 1) 和 (CM 2) 就是双代数 $\mathscr{A}(G)$ 上的右*余模 (comodule)* 结构的公理. [42]

令 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模, 则余模态射 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是使下图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad f\quad} & \mathscr{F}' \\ {\scriptstyle\mu_{\mathscr{F}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{F}'}} \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} & \xrightarrow{f\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F}' \otimes \mathscr{A} \end{array} .$$

由此得到范畴 ($\mathscr{A}$-**Comod**.); 我们用 ($\mathscr{A}$-**Comod.q.c.**) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 $\mathscr{A}$-余模组成的全子范畴. 因而我们已证明如下陈述.

命题 4.7.2. *设 G 是在 S 上仿射的 S-群. 有以下范畴等价*

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod}.),$$

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}).$$

此外, 若 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 仿射, 并令 $\Lambda[G] = \Gamma(S, \mathscr{A}(G))$, 则有一个范畴等价

$$(\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}) \simeq (\Lambda[G]\text{-}\mathbf{Comod}.).$$

[43]

进一步假设 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模. [44] 设 $\mathscr{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-余模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{E}$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 由于 $\mathscr{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦, 可以将 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 等同于 $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 假设 $\mu_{\mathscr{E}}$ 将 $\mathscr{F}$ 映到 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ 中. 则其限制

$$\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$$

[41]编者注: 将 4.7.2 的结果推广到 G 未必仿射, 但假设 G 与 $\mathscr{F}$ 在 S 上平坦的情形, 参见 $\mathrm{VI_B}$, 11.1–11.6 节.
[42]编者注: 左 G-$\mathcal{O}_S$-模自然对应于右 $\mathscr{A}(G)$-余模.
[43]编者注: 上面一句为新增内容.
[44]编者注: 下面一段由 [Se68, 第 1.3 节] 补入.

赋予 $\mathscr{F}$ 一个 $\mathscr{A}$-余模结构; 称 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{E}$ 的子余模. 取商后, $\mu_{\mathscr{E}}$ 定义了一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathscr{E}/\mathscr{F} \longrightarrow (\mathscr{E}/\mathscr{F}) \otimes \mathscr{A},$$

从而赋予 $\mathscr{E}/\mathscr{F}$ 以 $\mathscr{A}$-余模结构. 若 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{E}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模态射, 则 $\operatorname{Ker} f$ (分别地, $\operatorname{Im} f$) 是 $\mathscr{E}$ (分别地, $\mathscr{E}'$) 的 $\mathscr{A}$-子余模, 并且 f 诱导一个 $\mathscr{A}$-余模同构

$$\mathscr{E}/\operatorname{Ker} f \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} f.$$

此外, 若 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{E}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\operatorname{Ker} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 也都是拟凝聚的. 因此, ($\mathscr{A}$-**Comod**.) 与 ($\mathscr{A}$-**Comod**.**q**.**c**.) 都是阿贝尔范畴.

推论 4.7.2.1. *假设 G 在 S 上仿射且平坦. 那么, 范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) (分别地, (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.)) 等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上拟凝聚的 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 (分别地, 所有 $\mathscr{A}(G)$-余模的范畴), 因而是阿贝尔范畴.*

4.7.3. 现假设 G 是*可对角化群*, 即 $\mathscr{A}(G)$ 是交换群 M 在环层 $\mathcal{O}_S$ 上的群代数. 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) = \coprod_{m \in M} \mathscr{F} \otimes m\mathcal{O}_S.$$

因此, 给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

等价于给定 $\mathscr{F}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同态族 $(\mu_m)_{m \in M}$, 使得对 $\mathscr{F}$ 在 S 的一个开子集上的每个截面 x, 族 $(\mu_m(x))$ 都是直和 $\coprod_{m \in M} \mathscr{F}$ 的截面. 这意味着, 在每个充分小的开子集上, $\mu_m(x)$ 的限制只有有限多个非零.

对于由

$$\mu(x) = \sum_{m \in M} \mu_m(x) \otimes m,$$

定义的 μ, 条件 (CM 1), 分别地 (CM 2), 成立当且仅当

$$\mu_m \circ \mu_{m'} = \delta_{mm'}\mu_m, \qquad \left(\text{分别地}, \sum_{m \in M} \mu_m = \mathrm{Id}_{\mathscr{F}}\right).$$

因此 μ_m 是两两正交的投影算子, 且其和为恒等映射. 我们已经证明下述结果.

命题 4.7.3. *若 $G = D_S(M)$ 是可对角化 S-群, 则拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有 G-$\mathcal{O}_S$-模的范畴) 等价于按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有这样分次的 $\mathcal{O}_S$-模的范畴).*

注. 若 $\mathscr{F}$ 带有在 G 的作用下保持不变的 $\mathcal{O}_S$-代数结构, 则 $\mathscr{F}$ 的分次是代数分次. 更确切地说:

推论 4.7.3.1. *函子 $\mathscr{A} \mapsto \operatorname{Spec}(\mathscr{A})$ 诱导了按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴与如下范畴的反范畴之间的等价: 带有 S-算子群 $G = D_S(M)$ 且在 S 上仿射的 S-概形的范畴.*

命题 4.7.4. *设 G 是可对角化 S-群. 若*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模的正合列, 并且作为 $\mathcal{O}_S$-模的列是分裂的, 则它作为 G-$\mathcal{O}_S$-模的列也是分裂的.

事实上, 若 $G = D_S(M)$, 则每个 $\mathscr{F}_i$ 都由 $(\mathscr{F}_i)_m$ 给出分次, 且对每个 $m \in M$, $\mathcal{O}_S$-模的列

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}_1)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_2)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_3)_m \longrightarrow 0$$

都是分裂的. 由前一命题即得结论.

5. 群上同调

5.1. 标准复形

设 $\mathscr{C}$ 为范畴, $\mathbf{G}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\mathbf{O}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模.[45] 对 $n \geq 0$, 令

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}),$$

其中 $\mathbf{G}^0$ 为终对象 $\underline{\mathbf{e}}$. 于是 $\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 以显然的方式具有 $\mathbf{O}$-模结构 (相应地, $\Gamma(\mathbf{O})$-模结构), 并且

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \simeq \Gamma\big(\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})\big), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S).$$

给定 $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ 的一个元素, 就是对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定 $\mathbf{G}(S)$ 的一个取值于 $\mathbf{F}(S)$ 的 n-余链 (cochain), 且它关于 S 具有函子性. 回顾余边界算子

$$\partial : C^n\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big) \longrightarrow C^{n+1}\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big)$$

由下式给出

$$\begin{aligned}\partial f(g_1,\ldots,g_{n+1}) = {} & g_1 f(g_2,\ldots,g_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\ldots,g_ig_{i+1},\ldots,g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(g_1,\ldots,g_n).\end{aligned}$$

它关于 S 具有函子性, 因而定义同态

$$\partial : C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \longrightarrow C^{n+1}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

使得 $\partial\circ\partial = 0$. 这样就定义了一个交换群复形 (实际上是 $\Gamma(\mathbf{O})$-模复形), 记为 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$. 同样可定义 $\mathbf{O}$-模复形 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$, 并且

$$C^*(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma\big(\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})\big).$$

我们用 $H^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{H}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 表示 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 的上同调群 (相应地, 上同调 $\widehat{\mathscr{C}}$-群). 特别地,

$$\underline{H}^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathbf{F}^{\mathbf{G}}, \qquad H^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma(\mathbf{F}^{\mathbf{G}}).$$

注 5.1.1. 上面对 ∂ 的 "集合论" 描述便于验证 $\partial\circ\partial = 0$. 也可以利用乘法 $m : \mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 和作用 $\mu : \mathbf{G}\times\mathbf{F}\to\mathbf{F}$, 如下定义 ∂: 对每个 $f \in C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$,

$$\partial f = \mu\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{i-1}}\times m\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 $\mathrm{pr}_{[1,n]}$ 表示 $\mathbf{G}^{n+1} = \mathbf{G}^n\times\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}^n$ 的投影. 同样, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $f \in \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S)$,

$$\partial f = \mu_S\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{i-1}}\times m_S\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 m_S 和 μ_S 由 m 和 μ 经基变换得到. [46]

[45] 编者注: 此复形常称为 Hochschild 复形; 例如, 见 [DG70] 第 II.3 节.
[46] 编者注: 此注为新增内容.

5.2.

回顾 (见第 3 节), (**G**-**O**-Mod.) 是阿贝尔范畴, 其结构逐对象定义. 因此,

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 **G**-**O**-模的正合列, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 交换群序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(S) \longrightarrow \mathbf{F}(S) \longrightarrow \mathbf{F}''(S) \longrightarrow 0$$

正合. [47]

假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴. 则由3.2.1, (**G**-**O**-Mod.) 有足够的内射对象, 故左正合函子 $\underline{H}^0$ 和 H^0 的导出函子有定义. 下面证明, 函子 $\underline{H}^n$ (相应地, H^n) 确实是 $\underline{H}^0$ (相应地, H^0) 的导出函子. [48]

定义 5.2.0. 对每个 **O**-模 **P**, 用 $E(\mathbf{P})$ 表示 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})$, 并赋予它如下的 **G**-**O**-模结构. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})(S) = \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S),$$

而 $g \in \mathbf{G}(S)$ 和 $a \in \mathbf{O}(S)$ 在 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 上的作用由下式给出:

$$(g \cdot \phi)(h) = \phi(hg), \qquad (a \cdot \phi)(h) = a\phi(h),$$

其中 $h \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$ 任意. 此外, 对每个 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 令

$$\varepsilon(\phi) = \phi(1) \in \mathbf{P}(S),$$

其中 1 表示 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这就定义了函子

$$E : (\mathbf{O}\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.})$$

以及自然变换 $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$, 其中 Id 表示 (**O**-Mod.) 的恒等函子. [49]

注 5.2.0.1. 在下文中, 用 $\mathbf{G}_1$ 和 $\mathbf{G}_2$ 表示 **G** 的两个副本. 态射

$$\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}) \longrightarrow E(\mathbf{P}), \qquad (g_1, \phi) \longmapsto (g_2 \longmapsto \phi(g_2 g_1))$$

经由同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}), E(\mathbf{P})\big) &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}_1, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2, \mathbf{P})\big)\Big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})\Big),\end{aligned}$$

对应于态射

$$\phi \longmapsto \big((g_2, g_1) \longmapsto \phi(g_2 g_1)\big),$$

即对应于态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})$$

此态射由如下乘法诱导:

$$\mu_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}, \qquad (g_2, g_1) \longmapsto g_2 g_1.$$

[47]编者注: 上述回顾为新增内容.
[48]编者注: 上一句为新增内容.
[49]编者注: 对原文作了修改, 引入 5.2.0.1 和5.2.0.2, 它们将在定理 5.3.1 的证明中用到.

引理 5.2.0.2. *(i) 函子 E 是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.) \longrightarrow (\mathbf{O}\text{-}Mod.).$$

更确切地, 对每个 $\mathbf{M} \in (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 和 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$$

它关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{P}$ 具有函子性.

(ii) 因此, 若 $\mathbf{I}$ 为 $(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象, 则 $E(\mathbf{I})$ 为 $(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象.

证明. 对每个 $\mathbf{O}$-态射 $f : \mathbf{M} \to \mathbf{P}$, 关联如下定义的 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$ 的元素 ϕ_f. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $m \in \mathbf{M}(S)$, 元素 $\phi_f(m)$ 属于 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$, 定义为

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) \in \mathbf{P}(S').$$

于是, 对每个 $h \in \mathbf{G}(S)$, 有 $\phi_f(hm) = h \cdot f(m)$; 即 ϕ_f 是下列集合的元素:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})).$$

若 $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$, 且对每个 $m \in \mathbf{M}(S)$, 记 $f(m) = \phi(m)(1)$, 则

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) = \phi(gm)(1) = (g \cdot \phi(m))(1) = \phi(m)(g);$$

故 $\phi_f = \phi$. 反之, 显然有 $\phi_f(m)(1) = f(m)$. 这就证明了(i), 而(ii) 随即成立.

定义 5.2.0.3. 设 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模. 将 $\mathbf{M}$ 视为 $\mathbf{O}$-模时, 它的恒等映射在该伴随下对应于 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模态射

$$\mu_{\mathbf{M}} : \mathbf{M} \longrightarrow E(\mathbf{M})$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $m \in \mathbf{M}(S)$, $\mu_{\mathbf{M}}(m)$ 为如下定义的态射 $\mathbf{G}_S \to \mathbf{M}_S$: 对每个 $S' \to S$ 和 $g \in \mathbf{G}(S')$,

$$\mu_{\mathbf{M}}(m)(g) = g \cdot m_{S'} \in \mathbf{M}(S').$$

注意 $\mu_{\mathbf{M}}$ 是单态射. 事实上, $\varepsilon_{\mathbf{M}} : E(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}$ 是 $\mathbf{O}$-模态射, 且满足 $\varepsilon_{\mathbf{M}} \circ \mu_{\mathbf{M}} = \mathrm{id}_{\mathbf{M}}$. 因此, 作为 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{M}$ 是 $E(\mathbf{M})$ 的直和因子.

命题 5.2.1. *假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴, $\mathscr{C}$ 中存在有限积, 且 $\mathbf{G}$ 可表. 则函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 是 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模范畴上左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 的导出函子.*

由众所周知的一般结果, [50] 只需验证 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子. 设

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模的正合列, 并设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 由假设, $\mathbf{G}$ 由对象 $G \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 表出, 且 $\mathscr{C}$ 中存在有限积; 特别地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e. 因此, 每个 $\mathbf{G}^n \times \mathbf{h}_S$ 都由 $G^n \times S$ 表出 (其中 $G^0 = e$), 而序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}''(G^n \times S) \longrightarrow 0$$

正合. 这表明下列 $\mathbf{O}$-模序列

$$0 \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}') \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}'') \longrightarrow 0$$

正合. 从而, 将 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, -)$ 视为 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 上取值于 ($\mathbf{O}$-Mod.) 的复形范畴的函子时, 它是正合的. 所以函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ 构成上同调函子.

由于 Γ 正合, 函子 $H^n(\mathbf{G}, -)$ 也有同样的性质. 现在只需证明下述引理.

引理 5.2.2. *对每个 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, 有*

$$\underline{H}^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad H^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad n > 0.$$

只需证明 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 和 $C^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 在次数 > 0 时是同伦平凡的. 实际上, 只需对第二个复形证明这一点, 因为第一个复形的相应结果可由基变换推出. [51] 对每个

[50] 编者注: 见 [Gr57, 2.2.1] 和 [Gr57, 2.3]. 下文也对原文作了扩充.

[51] 编者注: 下文对原文作了扩充.

$n \geq 0$, 如下定义态射

$$\sigma : C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) \longrightarrow C^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$$

设 $f \in C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g_1, \ldots, g_n \in \mathbf{G}(S)$, $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 的元素 $\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)$ 对每个 $S' \to S$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$ 定义为

$$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)(x) = f(x, g_1, \ldots, g_n)(e) \in \mathbf{P}(S'),$$

其中 e 表示 $\mathbf{G}(S')$ 的单位元. 于是 σ 是在次数 > 0 时的同伦算子. 事实上, 对每个 $g_1, \ldots, g_{n+1} \in \mathbf{G}(S)$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$, 一方面,

$$\begin{aligned}\partial\sigma(f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + (-1)^{n+1} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e),\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\sigma(\partial f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & \big(xf(g_1, g_2, \ldots, g_{n+1})\big)(e) - f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+2} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e).\end{aligned}$$

因此,

$$(\partial\sigma(f) + \sigma(\partial f))(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = f(g_1, \ldots, g_{n+1})(x);$$

即对每个 $n \geq 0$, $\partial\sigma + \sigma\partial$ 是 $C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 的恒等映射.

注 5.2.3. 假设 $\mathscr{C}$ 为小范畴, 仅用于保证导出函子 $R^n\underline{H}^0$ 和 R^nH^0 的存在性. 在任何情形下, 上述论证均表明函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子, 因而是左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 在 [Gr57, 2.2] 意义下的 (右) 卫星函子. 若 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 有足够的内射对象 (当 $\mathscr{C}$ 为小范畴时确实如此), 则它们与导出函子一致 (*同上*, 2.3). [52]

5.3. G-$\mathscr{O}_S$-模的上同调

设 S 为概形, G 为 S-群, $\mathscr{F}$ 为拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模. G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调群定义为

$$H^n(G, \mathscr{F}) = H^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

(记号见4.6).

假设 G 在 S 上仿射. 由命题 4.6.4, 可如下计算该上同调: $H^n(G, \mathscr{F})$ 是复形 $C^*(G, \mathscr{F})$ 的第 n 个上同调群, 该复形的第 n 项为

$$C^n(G, \mathscr{F}) = \Gamma\Big(S, \mathscr{F} \otimes \underbrace{\mathscr{A}(G) \otimes \cdots \otimes \mathscr{A}(G)}_{n\text{ 次}}\Big).$$

若 f (相应地, a_i) 是 $\mathscr{F}$ (相应地, $\mathscr{A}(G)$) 在 S 的某开子集上的截面, 则

$$\begin{aligned}\partial(f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & \mu_{\mathscr{F}}(f) \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes \Delta a_i \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + (-1)^{n+1} f \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1,\end{aligned}$$

[52]编者注: 此注为新增内容.

其中

$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes \mathscr{A}(G), \qquad \mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

描述 $\mathscr{A}(G)$ 的余代数结构和 $\mathscr{F}$ 的余模结构. 顺便指出, G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调因而仅依赖于 $\mathscr{F}$ 的余模结构, 特别地, 仅依赖于 G 的 S-幺半群结构.

特别地,

$$H^0(G, \mathscr{F}) = \Gamma(S, \mathscr{F}^G),$$

其中 $\mathscr{F}^G$ 是 $\mathscr{F}$ *的不变量层*, 其在 S 的开子集 U 上的截面, 为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的那些截面, 这些截面在每个 U 上的 S' 中的逆像都在 $G(S')$ 的作用下不变 (见4.7.1.2).

定理 5.3.1. *设 S 为仿射概形, G 为在 S 上仿射且平坦的 S-群. 函子 $H^n(G, -)$ 是拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模范畴上 $H^0(G, -)$ 的导出函子.*

证明. 由于 G 在 S 上仿射且平坦, 4.7.2.1 表明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 等价于 $\mathscr{O}_S$ 上的拟凝聚 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 ($\mathscr{A}(G)$-Comod.q.c.), 因而是阿贝尔范畴. 此外, 由于 $\mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathscr{O}_S$-模, 每个函子

$$\mathscr{F} \longmapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)^{\otimes n}$$

都正合; 由于 S 仿射, 从而 $C^*(G, -)$ 是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 上的正合函子. [53]

用 Δ (相应地, η) 表示 $\mathscr{A}(G)$ 的余乘法 (相应地, 增广). 对每个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{P}$, 令

$$\mathrm{Ind}(\mathscr{P}) = \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G),$$

并赋予它由下式定义的 $\mathscr{A}(G)$-余模结构:

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta : \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

这就定义了函子

$$\mathrm{Ind} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

由4.6.4.1, 5.2.0 和5.2.0.1, 存在 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}_S$-模同构

$$\mathbf{W}\big(\mathrm{Ind}(\mathscr{P})\big) \simeq E\big(\mathbf{W}(\mathscr{P})\big) = \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{P})\big). \tag{*}$$

在此等同下, 态射 $\varepsilon : E(\mathbf{W}(\mathscr{P})) \to \mathbf{W}(\mathscr{P})$ 对应于 $\mathscr{O}_S$-模态射

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \longrightarrow \mathscr{P}.$$

我们已经用过如下事实: 函子

$$\mathbf{W} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-Mod.})$$

完全忠实. 由定义 4.7.1, 它在 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.) 上的限制也有同样的性质: 若 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{M}'$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, 则存在具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathscr{M}') \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}}\big(\mathbf{W}(\mathscr{M}), \mathbf{W}(\mathscr{M}')\big).$$

因此, 由引理 5.2.0.2 得到如下结果.

推论 5.3.1.1. *(i) 函子* Ind *是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

[53]编者注: 对原文作了修改, 以说明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 是阿贝尔范畴且有足够的内射对象. 参照 [Ja03], 第 I 部分, 3.3–3.4, 3.9, 4.2 以及 4.14–4.16 (注意其中的 "k-群概形" 是指 "仿射 k-群概形"; 见*同上*, 2.1).

更确切地, 对每个 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的对象 $\mathscr{M}$, 映射 $\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \to \mathscr{P}$ *诱导双射*

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M}, \mathscr{P}).$$

(ii) 因此, 若 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象, 则 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ *是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象.*

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 为定义其 $\mathscr{A}(G)$-余模结构的映射. 由5.2.0.3 (或直接由4.7.2 的公理 (CM 1) 和 (CM 2)) 可知, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是 G-$\mathscr{O}_S$-模态射, 且

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{F}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{F}} = \mathrm{id}_{\mathscr{F}}\,.$$

所以, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 的直和因子; 特别地, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是单态射. 由 (*) 和5.2.2,

$$H^n(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{F}))) \simeq H^n\Big(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{F}))\Big) = 0 \qquad (n > 0).$$

因此, 当 $n > 0$ 时 $H^n(G, -)$ 可消去.

最后, 由于 S 仿射, ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象. 设 $\mathscr{F} \hookrightarrow \mathscr{I}$ 为 $\mathscr{O}_S$-模的单态射, 其中 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 中的内射对象. 由于 $\mathscr{A}(G)$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦, $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ 的 G-$\mathscr{O}_S$-子模. 因此:

推论 5.3.1.2. *阿贝尔范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象.*

结合5.2.1 的证明中已用过的 [Gr57, 2.2.1 和2.3], 即完成了定理 5.3.1 的证明.

注 5.3.1.3. 推论 5.3.1.1 也可用如下计算证明. 对每个 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$\phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$$

关联 $\mathscr{O}_S$-态射

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P}.$$

反之, 对每个 $\mathscr{O}_S$-态射 $f : \mathscr{M} \to \mathscr{P}$, 关联 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$(f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

立即可见

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} = (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_S}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{M}} = f.$$

另一方面, 对每个 ϕ, 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M} & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{M}}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta} \\ \mathscr{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\phi \otimes \mathrm{Id}_{\mathscr{A}(G)}} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

从而

$$\begin{aligned} &\Big(((\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi) \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}\Big) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\phi \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta) \circ \phi = \phi. \end{aligned}$$

这就证明了推论 5.3.1.1(i), 而(ii) 随之成立.

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模. 上面已经看到, 由4.7.2 的公理 (CM 2) 可知, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子. 由此得到:

命题 5.3.2. *设 S 为仿射概形, G 为仿射且平坦的 S-群. 假设拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模的每个正合列*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

只要作为 $\mathscr{O}_S$-模序列分裂, 就也作为 G-$\mathscr{O}_S$-模序列分裂. 则当 $n>0$ 时函子 $H^n(G,-)$ 消失 (或等价地, 函子 $H^0(G,-)$ 正合).

事实上, 由假设, 下列 G-$\mathscr{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow E(\mathscr{F}) \longrightarrow E(\mathscr{F})/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

分裂. 因此, 作为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子, 而后者的上同调消失.

将此与命题 4.7.4 结合, 立即得到:

定理 5.3.3. *设 S 为仿射概形, G 为可对角化 S-群. 对每个拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 有*

$$H^n(G,\mathscr{F}) = 0 \qquad (n>0).$$

注. 当 G 在 S 上未必平坦时, 命题 5.3.2 仍然成立; 此时证明使用相对上同调. [54]

6. G-等变对象和模

设 $\mathscr{C}$ 是一个具有终对象且存在纤维积的范畴. [55] 设 G 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\pi: M \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, $\lambda = \lambda_X : G\times X \to X$ 是 G 在 X 上的一个作用. 以下以 $Y \times_f M$ 表示 $\pi: M\to X$ 与 X-函子 $f: Y\to X$ 的纤维积.

对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 和 $x \in X(U)$, 记 $M_x = U \times_x M$; 因而对每个 $\phi: U' \to U$, 有

$$M_x(U') = \{m \in M(U') \mid \pi(m) = x_{U'} = \phi^*(x)\}.$$

最后, 若 $g \in G(U)$, 我们也以 gx 表示 $X(U)$ 的元素 $\lambda(g,x)$.

定义 6.1. *(a) 若给定了 G 在 M 上提升 λ 的作用 $\Lambda: G\times M \to M$, 就称 M 是一个 G-等变 (equivariant) X-对象; 也就是说, 下列方块交换.*

$$\begin{array}{ccc} G\times M & \xrightarrow{\Lambda} & M \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_G\times\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G\times X & \xrightarrow{\lambda} & X \end{array}$$

等价地, 对每个态射 $(g,x): U \to G\times X$, 给定映射

$$\Lambda_x^U(g): M_x(U) \longrightarrow M_{gx}(U), \qquad m \longmapsto g\cdot m,$$

满足 $1\cdot m = m$ 和 $g\cdot(h\cdot m) = (gh)\cdot m$, 且关于 $(G\times X)$-对象 U 具有函子性. 另一种等价的说法是, 给定 U-对象的态射

$$\Lambda_x(g): M_x \longrightarrow M_{gx}$$

满足 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$.

[54] 编者注: 编者未尝试展开此注.

[55] 编者注: 本节为新增内容.

(b) 现设 $\mathbf{O}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, 并置 $\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X$. 在 (a) 的假设下, 若 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模 (参见定义 4.3.3.1, 该定义对范畴 $\mathscr{C}$ 上的任意环函子均适用), 且作用 Λ 与 M 上的 $\mathbf{O}_X$-模结构相容, 就称之为一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 因而, 对每个 $(g,x) \in G(U) \times X(U)$, $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 映射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射.

注 6.2. (i) 在 (a) 中, 条件 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 显然蕴含每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 其逆为 $\Lambda_{gx}(g^{-1})$. 反之, 若每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在第二个条件中取 $h = 1$, 就得到 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$.

(ii) 设 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模. 给定一个使定义 6.1 中的图交换的态射 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个态射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的同构, 等价于给定一个 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模的同构

$$\theta : G \times M = (G \times X) \times_{\mathrm{pr}_X} M \xrightarrow{\sim} (G \times X) \times_{\lambda} M, \qquad (g,x,m) \longmapsto (g,x,g \cdot m).$$

由于已假设每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 中取 $h = 1$, 就得到等式 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$. 因此, Λ 是 G 在 M 上的作用, 即满足 $g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m$, 当且仅当下列 $(G \times G \times X)$-同构图交换. 这里 μ 表示 G 的乘法, $f^*(\theta)$ 是由 θ 沿 $f : G \times G \times X \to G \times X$ 作基变换而得到的.

$$\begin{array}{ccc}
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M \\
\| & & \| \\
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & & (G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M \\
{\scriptstyle (\mu\times\mathrm{id}_X)^*(\theta)}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & {\scriptstyle \sim}\downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*(\theta)} \\
(G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & = & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M
\end{array} .$$

所以, 在 M 上给定 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模结构, 等价于给定一个如上所述的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模同构 θ, 并使此图交换.

(iii) 以上各点都可推广到 G 仅为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-幺半群的情形. 此时, 给定提升 λ 的作用 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个 $\Lambda_x(g) : M_x \to M_{gx}$ 都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射, 等价于给定一个如 (ii) 中的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模态射 θ, 使得将上图各箭头下的同构符号去掉后该图交换, 且满足

$$p_M \circ \theta \circ (\varepsilon_G \times \mathrm{id}_M) = \mathrm{id}_M,$$

其中 ε_G 是 G 的单位截面, p_M 是到 M 的投影.

6.3. G-等变态射

设 Y 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象, 其上赋予了作用 $\lambda_Y : G \times Y \to Y$; 又设 N 是另一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射 $f : Y \to X$ (分别地, $\mathbf{O}_X$-模的态射 $\phi : M \to N$) 若与 G 的作用交换, 就称为 *G-等变的*. 用集合论记号表示, 这就是说

$$f(g \cdot y) = g \cdot f(y) \qquad (\text{分别地, } \phi(g \cdot m) = g \cdot \phi(m)),$$

或者等价地,

$$f \circ \lambda_Y = \lambda_X \circ (\mathrm{id}_G \times f), \qquad \phi \circ \Lambda_M = \Lambda_N \circ (\mathrm{id}_G \times \phi).$$

下列引理是直接的.

引理 6.3.1. *设 $f : Y \to X$ 是一个 G-等变态射, M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 则逆像 $f^*(M) = Y \times_f M$ 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_Y$-模.*

另一方面, G 作用在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, X)$ 上. 事实上, 设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g \in G(T)$, 且 ϕ 是一个 T-态射 $Y_T \to X_T$. 则 g 给出 Y_T 和 X_T 的自同构 $\lambda_Y(g)$ 和 $\lambda_X(g)$, 我们以 $g \cdot \phi$ 或 $g\phi g^{-1}$ 表示态射

$$\lambda_X(g) \circ \phi \circ \lambda_Y(g^{-1}).$$

这就给出了 $G(T)$ 在 $\mathrm{Hom}_T(Y_T, X_T)$ 上的作用, 且关于 T 具有函子性.

定义 6.3.2. *因此, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中任意态射 $\phi : Y \to X$, 可以考虑它的稳定子 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ (参见 2.3.3.1). 对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathrm{Stab}_G(\phi)(T)$ 是 $G(T)$ 中所有满足 $g \circ \phi_T = \phi_T \circ g$ 的 g 所组成的子群, 也就是说, 它们使下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \end{array}$$

于是 $\phi : Y \to X$ 关于 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 等变.

6.4. 整体截面

设 M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 以 S_0 表示 $\mathscr{C}$ 的终对象, 并以 $\prod_{X/S_0} M$ 表示M *在 X 上的截面函子*（参见第 II 篇, 1.1）: 它将每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 映为

$$\mathrm{Hom}_X(X_T, M) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, M_T) = \Gamma(M_T/X_T).$$

还要回顾, X 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象的每个态射 $g : Z \to Y$ 都诱导一个阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Z),$$

它与环同态 $g^* : \mathbf{O}(Y) \to \mathbf{O}(Z)$ 相容. 特别地, 当 $Z = Y$, 即 g 是 Y 的一个 X-自同态时, 就得到阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Y)$$

它一般不是 $\mathbf{O}(Y)$-模的态射, 但对每个 $m \in M(Y)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(Y)$, 满足

$$M(g)(\alpha \cdot m) = g^*(\alpha) \cdot M(g)(m)$$

. 以下简单地以 g^* 代替 $M(g)$.

设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $X_T = X \times T$, 并设 $\mathrm{pr}_X : X_T \to X$ 是投影. 对 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$ 和 $g \in G(T)$, 置

$$g(\alpha) = (g^{-1})^*(\alpha).$$

用集合论语言来说, $\mathbf{O}(X_T)$ 的这个元素由如下等式定义: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $x \in X(S)$ 和 $t \in T(S)$, 有

$$g(\alpha)(x, t) = \alpha(g^{-1}x, t).$$

这给出了 $G(T)$ 通过环自同构在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的左作用, 且关于 T 具有函子性; 当 α 是 $\mathbf{O}(T)$ 中某个元素在 $\mathbf{O}(X_T)$ 中的像时, 有 $g(\alpha) = \alpha$.

现设 ϕ 为 X_T 的恒等态射（参见 6.3 以及下面对态射 $\phi : Y \to X$ 的推广）. 根据分别是通过 $\mathrm{pr}_X \circ \lambda(g^{-1})_T$ 还是通过 pr_X 将 X_T 视为 X-对象, 将 $\mathrm{Hom}_X(X_T, M)$ 分别记为 $M(\phi g^{-1})$ 或 $M(\phi)$.

于是 $\lambda(g^{-1})_T$ 是这两个 X-对象之间的 X-态射. 因而有阿贝尔群态射

$$(g^{-1})^* : M(\phi) \longrightarrow M(\phi g^{-1}), \qquad m \longmapsto m \circ \lambda(g^{-1})_T,$$

且对 $m \in M(\phi)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$, 有

$$(g^{-1})^*(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot (g^{-1})^*(m)$$

. 若 m 是 M_T 在 X_T 上的截面, 则 $(g^{-1})^*(m)$ 是用集合论方式由 $(x,t) \mapsto m(g^{-1}x, t)$ 定义的截面. 特别地, $(g^{-1})^*$ 是 $\mathbf{O}(T)$-模的态射.

$\mathbf{O}(X_T)$-模态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} M(\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(\phi g^{-1}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_\phi(g)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_{\phi g^{-1}}(g)} \\ M(g\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(g\phi g^{-1}) \end{array}$$

此外, 由于 ϕ 是恒等态射, 有 $g\phi g^{-1} = \phi$. 记

$$A(g) = (g^{-1})^* \circ \Lambda_\phi(g),$$


则得到阿贝尔群态射

$$A(g) : M(\phi) \longrightarrow M(\phi)$$

它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容, 即

$$A(g)(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot A(g)(m).$$

最后, 若 h 是 $G(T)$ 的另一个元素, 则 M 及态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.



由此得 $A(h) \circ A(g) = A(hg)$, 因而有:

命题 6.4.1. *对每个 T, $\mathbf{O}(X_T)$-模*

$$\left(\prod_{X/S_0} M \right)(T) = \Gamma(M_T/X_T)$$

都赋有关于 T 具函子性的 $G(T)$ 的作用, 它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容; 也就是说,

$$A(g)(\alpha \cdot m) = g(\alpha) \cdot A(g)(m).$$

由于对 $\alpha \in \mathbf{O}(T)$ 有 $g(\alpha) = \alpha$, 特别地, $\prod_{X/S_0} M$ 是一个 G-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.

更一般地, 设 Y 是另一个 G-等变 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象, $\phi : Y \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, 并如 6.3 中那样置 $H = \mathrm{Stab}_G(\phi)$. 则

$$M_\phi = Y \times_\phi M$$

是一个 H-等变 $\mathbf{O}_Y$-模. 我们得到:

推论 6.4.2. *函子 $\prod_{Y/S_0} M_\phi$ 是一个 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.*

6.5. G-等变 $\mathcal{O}_X$-模

将前面的讨论用于下述情形. 设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个未必拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模.

定义 6.5.1. *若 $\mathbf{O}_X$-模 $M = W(\mathcal{F})$ 是 G-等变的, 就称 $\mathcal{F}$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 因而, 对每个态射 $(g, x) : U \to G \times_S X$, 给定 $\mathcal{O}_U$-模的同构*

$$\Lambda_x(g) : W\big(x^*(\mathcal{F})\big) \xrightarrow{\sim} W\big((gx)^*(\mathcal{F})\big),$$

它们关于 U 具有函子性, 且满足 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$. 由于 W 是全忠实的（参见 4.6.1.1 和 4.6.2）, 由此得到 $\mathcal{O}_U$-模的同构

$$\Lambda_x(g) : x^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (gx)^*(\mathcal{F}),$$

其中 gx 表示 $\lambda \circ (g, x) : U \to X$. 将这一点用于 $G \times_S X$ 的恒等态射, 就得到 $\mathcal{O}_{G \times_S X}$-模的同构

$$(\star) \qquad \theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

它使下列 $G \times_S G \times_S X$ 上的层态射图 $(\star\star)$ 交换.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & \mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times \lambda)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \\
\| & & & & \sim \downarrow (\mathrm{id}_G \times \lambda)^*(\theta) \\
(\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{(\mu \times \mathrm{id}_X)^*(\theta)} & (\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times \lambda)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F})
\end{array} .$$

若 $\mathcal{E}$ 是另一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 则 $\mathcal{O}_X$-模的态射 $\phi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 若使 $W(\phi) : W(\mathcal{E}) \to W(\mathcal{F})$ 为 G-等变的, 就称为*G-等变的*. 用上述记号表示, 这等价于

$$\theta_{\mathcal{F}} \circ \mathrm{pr}_X^*(\phi) = \lambda^*(\phi) \circ \theta_{\mathcal{E}}.$$

注 6.5.2. 若 $f : Y \to X$ 是 G-等变的, 则引理 6.3.1 表明 $f^*(\mathcal{F})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.

注 6.5.3. 再假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的. 此时, 在 $M = W(\mathcal{F})$ 上给定 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构, 等价于在 $V(\mathcal{F})$ 上给定这样的结构, 而这又等价于给定 G 在向量纤维化 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 并在各纤维上是线性的.

事实上, 设

$$\varphi : \lambda^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})$$

是 θ 的逆. 对每个态射 $(g,x):U\to G\times_S X$, 从 $(gx)^*(\mathcal{F})$ 到 $x^*(\mathcal{F})$ 的 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$\varphi_x(g)=\Lambda_x(g)^{-1}=\Lambda_{gx}(g^{-1})$$

诱导一个 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$V\big((gx)^*(\mathcal{F})\big)\xrightarrow{\sim}V\big(x^*(\mathcal{F})\big).$$

将后者记为 ${}^t\varphi_x(g)$. 则

$${}^t\varphi_{gx}(h)\circ{}^t\varphi_x(g)={}^t\big(\Lambda_{gx}(h)\circ\varphi_x(g)\big)^{-1}=\Lambda_x(hg)^{-1}={}^t\varphi_x(hg).$$

对每个 X-概形 $f:Y\to X$, 有

$$V(\mathcal{F})\times_f Y\simeq V\big(f^*(\mathcal{F})\big)\qquad\text{（参见 4.6.2）.}$$

因此, 同构

$$\begin{aligned}{}^t\varphi:\quad G\times_S V(\mathcal{F})&=(G\times_S X)\times_{\mathrm{pr}_X}V(\mathcal{F})=V\big(\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})\big)\\&\xrightarrow{\sim}V\big(\lambda^*(\mathcal{F})\big)=(G\times_S X)\times_\lambda V(\mathcal{F})\end{aligned}$$

赋予 $V(\mathcal{F})$ 一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构. 将每个函子 $V(-)$ 与表示它的向量纤维化等同, 再将 ${}^t\varphi$ 与到 $V(\mathcal{F})$ 的投影复合, 就得到 G 在 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 且在各纤维上是线性的.

这样就得到了 [GIT, 第 1 章, 第 3 节] 中的定义, 不同之处在于 Mumford 在那里考虑一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$, 并定义了 G 在 $V(\mathcal{E})=W(\mathcal{E}^\vee)$ 上的作用. 事实上, 将前图 $(\star\star)$ 中的 θ 换成 φ, 并反转各箭头的方向, 所得正是*同上*定义 1.6 中的图; 上述同构 ${}^t\varphi$ 与*同上*第 31 页的同构 Φ 一致.

注 6.5.4. 特别考虑 $X=S$ 且 G 的作用平凡的情形. 此时, 一个 G-等变 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 就是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模（参见 4.7.1）. 若以 $f:G\to S$ 表示此时同时等于 pr_X 和 λ 的态射, 则同构

$$(\star)\qquad\theta:f^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}f^*(\mathcal{F})$$

是下述集合的一个元素:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(f^*(\mathcal{F}),f^*(\mathcal{F})\big)&=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(W(f^*(\mathcal{F})),W(f^*(\mathcal{F}))\big)\\&=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)(G).\end{aligned}$$

它正是定义 G 在 $W(\mathcal{F})$ 上的作用的态射

$$\rho:G\longrightarrow\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)$$

. 此外, 由伴随关系, θ 对应于 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$f_*(\theta)\circ\tau:\mathcal{F}\longrightarrow f_*f^*(\mathcal{F}),$$

其中 $\tau:\mathcal{F}\to f_*f^*(\mathcal{F})$ 是伴随关系的单位态射. 这一点将在第 $\mathrm{VI_B}$ 篇的 11.10 bis 中用到.

6.6. 函子 $\prod_{X/S}W(\mathcal{F})$ 和 $W(p_*(\mathcal{F}))$

设 S 是一个概形, G 是一个 S-群概形, 通过

$$\lambda:G\times_S X\to X,\qquad\mu:G\times_S Y\to Y,$$

作用在 S-概形 X 和 Y 上, 且 $p:X\to Y$ 是一个 G-等变态射. 假设 $p:X\to Y$ 和 $\nu_Y:Y\to S$ 都是拟紧且拟分离的, 而 $\pi:G\to S$ 是平坦的.

于是投影 $\mathrm{pr}_Y : G \times_S Y \to Y$ 是平坦的, μ 也是平坦的, 因为 μ 是 pr_Y 与自同构 $(g, y) \mapsto (g, gy)$ 的复合. 对变动的 S-概形 $f : T \to S$, 以 $p_T : X_T \to T$ 和 $f_X : X_T \to X$ 表示由 p 和 f 作基变换所得的态射.

设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 并设

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

是 6.5.1 ($\star$) 中的同构. 由于 p 是拟紧且拟分离的, $p_*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的（参见 EGA I, 9.2.1）.

引理 6.6.1. *拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $p_*(\mathcal{F})$ 是 G-等变的.*

事实上, 有下列两个笛卡尔方块.

$$\begin{array}{ccccc} G \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X & \xleftarrow{\lambda} & G \times_S X \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G \times_S Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} & Y & \xleftarrow{\mu} & G \times_S Y \end{array} \quad .$$

由于 p 是拟紧且拟分离的, 而 pr_Y 和 μ 是平坦的, 由 EGA III, 1.4.15 以及补充它的 EGA IV_1, 1.7.21, 得

$$q_*\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) = \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}), \qquad q_*\lambda^*(\mathcal{F}) = \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

所以 θ 诱导一个同构

$$\theta_Y : \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

同样的论证表明, θ_Y 满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 因为所涉及的态射 $G \times_S G \times_S Y \to G \times_S Y$ 都是平坦的. 引理得证.

特别地, 取 $Y = S$, 其上 G 的作用为平凡作用. 由注 6.5.4, 此时 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且

$$\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则由 4.7.2, $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(G)$-余模.

另一方面, 根据命题 6.4.1, 将每个 $f : T \to S$ 映为

$$W\big(f_X^*(\mathcal{F})\big)(X_T) = \Gamma\big(X_T, f_X^*(\mathcal{F})\big) = \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big),$$

的函子 $\prod_{X/S} W(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外还有一个典范态射

$$\tau : W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F}),$$

对每个 $f : T \to S$, 它由典范态射

$$\Gamma\big(T, f^* p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big).$$

给出. 将其限制到由 S 上平坦的概形 T 组成的全子范畴, 就得到同构; 而 τ 显然是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射. 于是我们证明了下列命题; 对于 (ii), 可比较 [GIT], 第 32 页.

命题 6.6.2. *设 S 是一个概形, G 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 是平坦的, $p : X \to S$ 是拟紧且拟分离的.*

(i) 则 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 G-$\mathcal{O}_S$-模. 典范态射

$$W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F})$$

是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射, 且这两个函子在平坦 S-概形范畴上相同.

(ii) 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且 $\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G)$, 则 $p_*(\mathcal{F})$ 具有一个 $\mathscr{A}(G)$-余模结构.[56]

6.7. 稳定子

设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 设 Y 是另一个带有 G 的作用的 S-概形, 该作用可以是平凡作用; 设 $\phi : Y \to X$ 是一个未必 G-等变的 S-态射, 并设 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 是 ϕ 在 G 中的稳定子（参见 6.3.2）.

先指出（见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 第 6 节）, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示（参见*同上*, 定义 6.2.1）. 事实上, 考虑

$$r : G \times_S Y \longrightarrow X \times_S X, \qquad r(g, y) = (\phi(y), g\phi(g^{-1}y)),$$

置 $P = G \times_S Y$, 并设 P' 是对角线 $\Delta_{X/S}$ 在 r 下的逆像. 则（参见*同上*, 6.2.4(a)）

$$\mathrm{Stab}_G(\phi) = \prod_{P/G} P'.$$

由此可知, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示. 后一条件在 S 是一个域的谱或 $Y = S$ 时自动成立. 在这些假设下, $\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-等变 $\mathcal{O}_Y$-模（参见 6.5.2）.

此外, 若 $\pi : G \to S$ 和 $p : Y \to S$ 在 S 上拟紧且拟分离, 且 π 平坦, 则由命题 6.6.2, $p_*\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个 H-$\mathcal{O}_S$-模. 特别地:

推论 6.7.1. *设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 平坦, $X \to S$ 拟紧且分离. 设 $\tau : S \to X$ 是 X 在 S 上的一个截面.*

(i) 稳定子 $H = \mathrm{Stab}_G(\tau)$ 是 G 的闭子群概形, 且 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模.

(ii) 若 H 还在 S 上仿射(例如 G 如此), 且 $\mathscr{A}(H) = \pi_*(\mathcal{O}_H)$, 则 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(H)$-余模.

6.8. G 上的 G-等变层

最后给出两个结果 6.8.1 和 6.8.6, 它们将在第 II 篇与第 III 篇中用到, 特别是 III, 4.25 中.

命题 6.8.1. *设 S 是一个概形, $\pi : G \to S$ 是一个 S-群概形, $\varepsilon : S \to G$ 是单位截面. 考虑 G 通过左平移在自身上的作用. 函子*

$$\mathcal{E} \longmapsto \pi^*(\mathcal{E}), \qquad \mathcal{F} \longmapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$$

在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴与拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴之间诱导互为拟逆的等价.

证明. 以 μ 表示 G 的乘法, 并设 $\mathrm{pr}_2 : G \times_S G \to G$ 是第二投影. 由于 $\pi \circ \mu = \pi \circ \mathrm{pr}_2$, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 都有典范同构

$$\mu^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathrm{pr}_2^*\pi^*(\mathcal{E}).$$

此同构显然满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 所以 $\pi^*(\mathcal{E})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模. 由于 $\varepsilon^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$, 函子 $\mathcal{E} \mapsto \pi^*(\mathcal{E})$ 是

全忠实的. 只须再证明, 对每个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模 $\mathcal{F}$, 有

$$\mathcal{F} \simeq \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F}).$$

[56]编者注: 若 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离, 而 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 则同样成立; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 11.6.1(ii).

由假设, 存在同构

$$\theta : \mathrm{pr}_2^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^*(\mathcal{F}).$$

将 θ 沿态射

$$\tau : G \longrightarrow G \times_S G, \qquad \tau = (\mathrm{id}_G, \varepsilon \circ \pi),$$

拉回, 就得到同构 $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F})$.

注 6.8.2. (a) 考虑由

$$(g_1, g_2) \cdot g = g_1 g g_2^{-1}.$$

定义的 $G \times_S G$ 在 G 上的作用. 单位截面 $\varepsilon : S \to G$ 的稳定子是 $G \times_S G$ 的对角子群 H. 因此, 若 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模, 则由 6.5.2, $\mathcal{E} = \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 具有一个 H-$\mathcal{O}_S$-模结构.

(b) 可以证明, $\mathcal{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴与拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模范畴之间的一个等价. 这是更一般的下降结果的一个特例（参见第 IV 篇, 第 2 节, 以及 SGA 1, VIII）; 例如可见 [Th87], 1.2–1.3.

注 6.8.3. 沿用 6.8.1 的记号. 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 以 $\pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$ 表示 $\pi_*\pi^*(\mathcal{E})$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模, 它在 S 的开子集 V 上的截面是所有满足如下条件的元素

$$\gamma \in \Gamma\big(\pi^{-1}(V), \pi^*(\mathcal{E})\big)$$

: 对每个 $S' \to V$ 和 $g \in G(S')$, 有 $g \cdot \gamma_{S'} = \gamma_{S'}$. 则自然态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow \pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$$

是同构. 若

$$\pi_*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则这一点是直接的; 例如 $G \to S$ 仿射时, 或 $G \to S$ 拟紧且拟分离而 $\mathcal{E}$ 平坦时就是如此. 一般情形也不难验证.

注 6.8.4. 设 S 是一个概形, H 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 H 在 S 上平坦, 以 $W_P(\mathcal{F})$ 表示 $W(\mathcal{F})$ 在平坦 S-概形全子范畴上的限制. 由 6.5.1, 赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 等价于给定 $H \times_S X$ 上的一个满足余循环条件 $(\star\star)$ 的层同构

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \longrightarrow \lambda^*(\mathcal{F})$$

. 因此, 要赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 只须赋予 $W_P(\mathcal{F})$ 一个这样的结构.

回顾 6.8.5. 设 X 是一个 S-概形, Y 是 X 的一个闭 S-子概形. 以 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 表示浸入 $i : Y \hookrightarrow X$ 的余法层（参见 EGA IV_4, 16.1.2）. 若 $S' \to S$ 平坦, 且 $i' : Y' \hookrightarrow X'$ 由 i 作基变换得到, 则由*同上*, 16.2.2(iii), 得

$$\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{N}_{Y'/X'}.$$

命题 6.8.6. *设 S 是一个概形, X 是一个 S-群概形, Y 是 X 的一个 S-子群概形. 假设 Y 在 S 上平坦. 则余法层 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 是一个 $(Y \times_S Y)$-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.*

事实上, $H = Y \times_S Y$ 在 S 上平坦. 因此, 根据注 6.8.4, 只须赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构. 设 S' 是一个平坦 S-概形, $Y' \hookrightarrow X'$ 是作基变换得到的浸入, 并置

$$\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}.$$

根据 6.8.5, $\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y'/X'}$. 每个 $h \in H(S')$ 都诱导 Y' 的一个自同构, 从而对每个 $y \in Y'(S')$, 诱导同构

$$\Gamma(S', y^*(\mathcal{N}')) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S', y^*h^*(\mathcal{N}'))$$

这些同构赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构（参见 6.1）.

参考文献

[57]

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Gr57**] A. Grothendieck, "Sur quelques points d'algèbre homologique," *Tôhoku Math. J.* **9** (1957), 119–221.

[**Ja03**] J. C. Jantzen, *Representations of Algebraic Groups*, Academic Press, 1987; 第 2 版, American Mathematical Society, 2003.

[**GIT**] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965; 与 J. Fogarty 合著的第 2 版, 1982; 与 J. Fogarty 和 F. Kirwan 合著的第 3 版, 1994.

[**Ni02**] N. Nitsure, "Representability of $\mathrm{GL}_{\mathcal{E}}$," *Proc. Indian Acad. Sci.* **112** (2002), 第 4 期, 539–542.

[**Ni04**] N. Nitsure, "Representability of Hom implies flatness," *Proc. Indian Acad. Sci.* **114** (2004), 第 1 期, 7–14.

[**Se68**] J.-P. Serre, "Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés," *Publ. Math. I.H.É.S.* **34** (1968), 37–52.

[**Th87**] R. W. Thomason, "Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes," *Adv. Math.* **65** (1987), 16–34.

[57]编者注: 这些是本篇所引用的补充参考文献.

第 II 篇
切丛与 Lie 代数

M. Demazure 著

本篇拟在概形理论中构造经典理论中的切丛 (tangent bundle) 和 Lie 代数 (Lie algebra) 的对应物. 不过, 不把讨论局限于概形本身, 而也考虑概形范畴上某些未必可表的函子 (例如函子 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}$ 等), 将是有益的. 正如前篇所说 (参见 I 1.1), 我们将概形与其相应的函子等同.[0]

另一方面, 下述构造超出了概形理论的范围. 例如, 只需作一些细节上的改动, 这些构造就同样适用于带有幂零元的解析空间理论.

在开始这一构造之前, 必须先给出几个一般定义, 以补充 I 1.7 中的定义.

1. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$

沿用 I 1.1 的记号. 将范畴 $\mathscr{C}$ 与

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

的一个满子范畴等同 (特别地, 省去用来在书写上区分 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象与 $\mathscr{C}$ 的对象的下划线). [1]

考虑如下情形: $\widehat{\mathscr{C}}$ 的四个对象 S, X, Y, Z, 其中第一个实际上是 $\mathscr{C}$ 的对象, 而 X 和 Y 在 Z 上, Z 在 S 上.




图 1: 对象 X 和 Y 在 Z 上, 而 Z 在 S 上.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 2 页; 合订本第 60 页.

定义 1.1.

对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的每个对象 S', 如下定义 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的一个对象, 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}}(X_{S'}, Y_{S'}) = \mathrm{Hom}_Z(X \times_S S', Y), \tag{1}$$

[0]编者注: 2024 年 10 月 14 日版本.

[1]编者注: 在本版中, 这些用黑体字母 $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{V}, \mathbf{W}$ 表示; 参见第 I 篇. 但对于 $\underline{\mathrm{Norm}}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}$ 等函子 (参见 5.2), 则保留了原文的下划线, 并且在函子 $\underline{\mathrm{Lie}}$ 下也加上下划线, 以区分函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$; 例如, 第 VII_A 篇中就用到了后者.

立即可见, $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 就是 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)$ 中与 p_X 和 p_Y 相容的态射所成的子对象; 也就是态射对

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y) \rightrightarrows \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Z),$$

的核, 其中第一个态射由与 p_Y 的复合定义, 第二个则是以 p_X 为 "像" 的常值态射.

与 I 1.7 中一样, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 S 上的每个对象 T, 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)\big) \simeq \mathrm{Hom}_Z(X \times_S T, Y). \tag{2}$$

此外, 由 I 1.7.1, 若 E, F 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 Z 上的对象, 则

$$\mathrm{Hom}_Z\big(E, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(F,Y)\big) \simeq \mathrm{Hom}_Z(E \times_Z F, Y) \simeq \mathrm{Hom}_Z\big(F, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(E,Y)\big).$$

将其用于 $E = X$ 和 $F = Z \times_S T$, 得到对 $\widehat{\mathscr{C}}_{/S}$ 的每个对象 T 的自然双射

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_S\big(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)\big) &\simeq \mathrm{Hom}_Z(X \times_S T, Y) \\ &\simeq \begin{cases} \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S T, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(X,Y)), \\ \mathrm{Hom}_Z(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T, Y)). \end{cases} \end{aligned} \tag{3}$$

这些双射关于 T 是函子性的, 因而给出 S-函子的同构. [2]

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_S(T, \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S T, Y)) \\ & \searrow^{\sim} \quad \nearrow_{\sim} & \\ & \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X \times_S T, Y) & \end{array} \tag{4}$$

图 2: 函子性同构 (4).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 2 页; 合订本第 60 页.

指出定义的两个特殊情形. 若 $Z = S$, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S/S}(X,Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y).$$

另一方面, 当 $X = Z$ 时, 置

$$\prod_{Z/S} Y = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(Z,Y), \tag{5}$$

于是, 由定义,

$$\left(\prod_{Z/S} Y\right)(S') = \mathrm{Hom}_Z(Z \times_S S', Y) \simeq \Gamma(Y_{S'}/Z_{S'}).$$

函子 $\prod_{Z/S} : \widehat{\mathscr{C}}_{/Z} \to \widehat{\mathscr{C}}_{/S}$ 是从 S 到 Z 的基变换函子的右伴随: 对每个 S-函子 U,

$$\mathrm{Hom}_S\left(U, \prod_{Z/S} Y\right) = \mathrm{Hom}_Z(U \times_S Z, Y).$$

若 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 且 Z 是 S-概形, 则称函子 $\prod_{Z/S}$ 为 "Weil 标量限制 (Weil restriction of scalars)". [3] 还有同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, Y \times_Z X) = \prod_{X/S} (Y \times_Z X), \tag{6}$$

[2]编者注: 已扩充了 (2), (3) 和 (4); 特别地, (4) 将用于 3.11.
[3]编者注: 前面两句话是新增的.

特别地, 当 $Z = S$ 时, 由此得到同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y) \simeq \prod_{X/S} Y_X. \tag{7}$$

注 1.2.

函子 $Y \mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 在如下意义下与积可交换: 有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y \times_Z Y') \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y) \times_S \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y'). \tag{*}$$

因此, 若 Y 是 Z-群, 分别地, 是 Z-环, 等等, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 是 S-群, 分别地, 是 S-环, 等等.

注 1.3.

设 $\pi : M \to Y$ 是取值于 $\mathcal{O}_Y$-模的 Y-函子 (参见 I 4.3.3.1), 并置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$. 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 有自然的 $\mathcal{O}_H$-模结构; 更确切地说, 对 H 上的每个 H', 集合

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

有自然的 $\mathcal{O}(X \times_S H')$-模结构. [4]

事实上, 设 $m : M \times_Y M \to M$ 和 $\lambda : \mathcal{O}_Y \times_Y M \to M$ 表示定义 Y-交换群结构和 $\mathcal{O}_Y$-模结构的态射. 设 H' 是 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的 S-概形; 等价地, 给定了一个 Z-态射 $f : X \times_S H' \to Y$, 它使 $X \times_S H'$ 成为 Y-对象. 于是

$$\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$$

是满足 $\pi \circ \phi = f$ 的 Z-态射 $\phi : X \times_S H' \to M$ 所成的集合, 即 Y-态射 $X \times_S H' \to M$ 所成的集合.

若 ϕ, ψ 是两个这样的态射, 则定义 $\phi + \psi$ 为复合 Y-态射

$$X \times_S H' \xrightarrow{\phi \times \psi} M \times_Y M \xrightarrow{m} M.$$

这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 成为 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的交换群. [5]

同样, 若 $a \in \mathcal{O}(X \times_S H')$, 即 $a : X \times_S H' \to \mathcal{O}_S$ 是 S-态射, 则定义 $a\phi$ 为复合 $\lambda \circ (a \times \phi)$, 其中 $a \times \phi$ 是从 $X \times_S H'$ 到 $\mathcal{O}_Y \times_Y M \simeq \mathcal{O}_S \times_S M$ 的 Y-态射, 其分量为 a 和 ϕ. 这就赋予 $\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M))$ 一个 $\mathcal{O}(X \times_S H')$-模结构, 它关于 H-对象 H' 是函子性的.

2. 概形 $I_S(\mathcal{M})$

定义 2.1.

设 S 是概形, $\mathcal{M}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 用 $\mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 表示拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S \oplus \mathcal{M}$, 其中把 $\mathcal{M}$ 看作平方为零的理想. 用

$$I_S(\mathcal{M}) = \mathrm{Spec}\, \mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$$

[4]编者注: 此注是新增的; 将用于推论 3.11.1.

[5]编者注: 若 M 是一个未必交换的 Y-群, 并置 $\phi \cdot \psi = m \circ (\phi \times \psi)$, 则这使 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, M)$ 成为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 上的群.

表示相应的 S-概形.[6] 特别地, 置

$$\mathscr{D}_{\mathcal{O}_S} = \mathscr{D}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S), \qquad I_S = I_S(\mathcal{O}_S),$$

并分别称它们为 S 上的对偶数代数和 S 上的对偶数概形 (dual numbers).

对应 $\mathcal{M} \mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模到 S-概形的反变函子. 特别地, 态射 $0 \to \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \to 0$ 分别定义结构态射

$$\rho : I_S(\mathcal{M}) \longrightarrow I_S(0) = S$$

及其一个截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}}$, 称为 *零截面 (zero section).*[7]

2.1.1.

由于 $\mathcal{M} \mapsto I_S(\mathcal{M})$ 是反变的, 每个 $a \in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 定义了 $I_S(\mathcal{M})$ 的一个 S-自同态 a^*, 且

$$1^* = \mathrm{id}, \qquad (ab)^* = b^* \circ a^*, \qquad 0^* = \varepsilon_{\mathcal{M}} \circ \rho, \qquad a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}.$$

因此, $I_S(\mathcal{M})$ 带有 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 的乘法幺半群的右作用, 它与由态射 $\mathcal{M}' \to \mathcal{M}$ 导出的 S-态射 $I_S(\mathcal{M}) \to I_S(\mathcal{M}')$ 可交换; 特别地, 算子 a^* 保持零截面. [8]

对每个 $a \in \mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$, 每个 $f : S' \to S$, 以及每个 $m \in I_S(\mathcal{M})(S')$, 记 $m \cdot a = a^*(m)$. 则

$$m \cdot 1 = m, \qquad (m \cdot a) \cdot b = m \cdot (ab), \qquad m \cdot 0 = \varepsilon_{\mathcal{M}}(\rho(m)),$$

而若 $m = \varepsilon_{\mathcal{M}}(f)$, 则 $m \cdot a = m$. [9]

注 2.1.2.

$I_S(\mathcal{M})$ 的构造与基扩张可交换: 有典范同构

$$I_S(\mathcal{M})_{S'} \simeq I_{S'}(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}).$$

为简便起见, 记 $I_{S'}(\mathcal{M}) = I_S(\mathcal{M})_{S'}$. 更一般地, 若 X 是未必可表的 S-函子, 则记 $I_X(\mathcal{M}) = I_S(\mathcal{M}) \times_S X$.

2.1.3.

由前面的讨论, $\mathcal{O}(S')$ 的乘法幺半群作用于 S'-概形 $I_{S'}(\mathcal{M})$, 且关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 换言之, S-概形 $I_S(\mathcal{M})$ 是一个带有算子幺半群 $\mathcal{O}_S$ 的对象, 且关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 因此, 有满足显然条件的 S-概形态射

$$\lambda : I_S(\mathcal{M}) \times_S \mathcal{O}_S \longrightarrow I_S(\mathcal{M}),$$

对每个 S-函子 X, 基变换给出 X-函子的态射

$$\lambda_X : I_X(\mathcal{M}) \times_S \mathcal{O}_S \longrightarrow I_X(\mathcal{M}),$$

使 $I_X(\mathcal{M})$ 成为带有算子幺半群 $\mathcal{O}(X)$ 的对象. 每个 $a \in \mathcal{O}(X) = \mathrm{Hom}_S(X, \mathcal{O}_S)$ 定义了 X-自同态

$$a^* = \lambda_X \circ \big(\mathrm{id}_{I_X(\mathcal{M})} \times (a \circ \mathrm{pr}_X)\big).$$

---

[6]编者注: $I_S(\mathcal{M})$ 的底空间与 S 的底空间相同.

[7]编者注: 比较 3.1.1.

[8]编者注: 下面的内容扩充了原文; 编号 2.1.1–2.1.3 也是新增的.

[9]编者注: 后面我们主要关心的是 $a \in \mathcal{O}(S)$, 它以位似变换作用于 $\mathcal{M}$. 例如, 若 $\mathcal{M}$ 是秩为 r 的自由模, 则对每个 $S' \to S$, $\mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}))$ 与满足对所有 i, j 均有 $\epsilon_i \epsilon_j = 0$ 的 r-元组 $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_r) \in \mathcal{O}(S')^r$ 所成的集合等同, 并且对每个 $a \in \mathcal{O}(S)$, 有 $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_r) \cdot a = (a\epsilon_1, \ldots, a\epsilon_r)$.

明确地说, 若 $x \in X(S')$ 且 $m \in I_S(\mathcal{M})(S') = I_{S'}(\mathcal{M})(S')$, 则 $a(x) = a \circ x \in \mathcal{O}(S')$, 且

$$(m, x) \cdot a = (m \cdot a(x), x).$$

此运算关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的, 并保持零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : X \to I_X(\mathcal{M})$; 因而 $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$. [10]

该运算还在如下意义下 "关于 X 是函子性的": 若 $\pi : Y \to X$ 是 S-函子的态射, $u : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(Y)$ 是相应的环态射, 从而 $u(a) = a \circ \pi$, 则下图交换.

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{a^*} & I_X(\mathcal{M}) \\ \uparrow{\scriptstyle \pi} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ I_Y(\mathcal{M}) & \xrightarrow{u(a)^*} & I_Y(\mathcal{M}) \end{array} .$$

图 3: 算子作用在 $Y \to X$ 下的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 5 页; 合订本第 63 页.

2.2.

设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 下面的交换图导出下一页上相应的 S-概形图.




图 4: $\mathcal{O}_S$-模的直和图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 5 页; 合订本第 63 页.




图 5: 导出的 S-概形交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

命题 2.2.

对每个 S-概形 X, 将 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(-, X)$ 应用于前图所得的 S 上的函子图是笛卡尔图.

[10] 编者注: 此段是新增的; 将用于 3.4.2 和 4.6.2.




图 6: $\underline{\mathrm{Hom}}_S$-函子的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

事实上, 对每个 $S' \to S$, 必须验证在 S' 上取函子值所得的集合图是笛卡尔图. 由于 $I_S(\mathcal{P})$ 的构造与基扩张可交换, 只需取 $S' = S$, 因而只需验证下面的集合图是笛卡尔图.




图 7: 在 S 上取值后的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 6 页; 合订本第 64 页.

若 $x \in X(S)$, 由 SGA 1, III 5.1 可知, $X(\varepsilon_{\mathcal{M}})^{-1}(x)$ 关于 $\mathcal{M}$ 函子性地同构于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(x^*(\Omega^1_{X/S}), \mathcal{M}),$$

其中 $\Omega^1_{X/S}$ 表示 X 在 S 上的相对微分层. 后一个关于 $\mathcal{M}$ 的函子显然将 $\mathcal{O}_S$-模的直和变为相应集合的积, 这就证明了命题. [11]

推论 2.2.1.

设 X 是 S-概形, $\mathcal{M}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模. 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X)$ 作为 X 上的函子, 同构于有限多个 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ 在 X 上的积.

附注 2.2.2.

由命题的证明可知, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X)$ 作为 X-函子, 同构于 $\mathbf{V}(\Omega^1_{X/S})$ (I 4.6.1), 因而由向量纤维化[12]

$$V(\Omega^1_{X/S}).$$

表示.

3. 切丛与条件 (E)

本节中, 除非另有说明, 字母 $\mathcal{M}, \mathcal{M}', \mathcal{N}, \ldots$ 都表示有限自由 $\mathcal{O}_S$-模 (即同构于有限个 $\mathcal{O}_S$ 的副本之直和的模).

[11]编者注: 也可参见第 III 篇中增补的 0.1.8.
[12]编者注: 参见第 I 篇编者注 (33).

我们将系统地使用第 I 篇中建立的等同. 因此, 所谓 "S 上的函子", 既可指配备了一个到 $S = h_S$ 的态射的函子, 也可指 S 上的对象范畴上的函子, 两种说法不作区别. "S 上的群函子" 等类似表述也按相同方式使用.

定义 3.1.

设 S 是概形, $\mathcal{M}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模, 而 X 是 S 上的函子. *X 在 S 上关于 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M}$ 的切丛 (tangent bundle)* 是指 S-函子

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X).$$

特别地, *X 在 S 上的切丛*是指 [13]

$$T_{X/S} = T_{X/S}(\mathcal{O}_S) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S, X).$$

对应 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 S-函子的协变函子. 特别地, 态射 $\mathcal{M} \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{M}$ 分别定义了一个 S-态射

$$\pi_{\mathcal{M}} : T_{X/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T_{X/S}(0) \simeq X$$

及其一个截面 τ_0, 称为*零截面 (zero section)*. [14]

注 3.1.1.

[15] 投影 $\pi_{\mathcal{M}} : T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 由零截面 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 诱导, 而零截面 $\tau_0 : X \to T_{X/S}(\mathcal{M})$ 由结构态射 $\rho : I_S(\mathcal{M}) \to S$ 诱导. 更明确地说, 设 $t \in T_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 对应于 S-态射 $f : S' \times_S I_S(\mathcal{M}) \to X$, 并设 $x \in X(S')$ 对应于 $g : S' \to X$. 则

$$\pi(t) = f \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \varepsilon_{\mathcal{M}}), \qquad \tau_0(x) = g \circ (\mathrm{id}_{S'} \times \rho).$$

由 3.1 可知, $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 X 上的函子的协变函子. 特别地, $\mathcal{O}(S)$ 是 X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子幺半群, 且与关于 $\mathcal{M}$ 的函子性相容.

附论 3.1.2.

[15] 以上讨论特别包含如下含义. 对每个 S-态射 $\varphi : X' \to X$, 置

$$\Sigma(X', \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_X\big(X', T_{X/S}(\mathcal{M})\big).$$

乘法幺半群 $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M})$ 作用于 $\Sigma(X', \mathcal{M})$; 将此作用写作 $(\lambda, x) \mapsto \lambda * x$. 则

$$\lambda * (\mu * x) = (\lambda\mu) * x, \qquad 1 * x = x, \qquad 0 * x = \tau_0 \circ \varphi.$$

同样, $\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$ 也作用于 $\Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$. [16]

设 $m : \mathcal{M} \oplus \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 是加法, $\delta : \mathcal{M} \to \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}$ 是对角映射. 将其诱导的映射记作

$$m_{X'} : \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \to \Sigma(X', \mathcal{M}), \qquad \delta_{X'} : \Sigma(X', \mathcal{M}) \to \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$$

对 $\lambda, \mu \in \mathcal{O}(S)$, 以 ℓ_λ 表示 $\mathcal{M}$ 上的数乘 λ, 以 $\ell_{\lambda,\mu}$ 表示 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}$ 上的数乘 (λ, μ). 由于

$$m \circ \ell_{\lambda,\lambda} = \ell_\lambda \circ m, \qquad m \circ \ell_{\lambda,\mu} \circ \delta = \ell_{\lambda+\mu},$$

对每个 $z \in \Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$ 和 $x \in \Sigma(X', \mathcal{M})$, 都有

$$\lambda * m(z) = m((\lambda, \lambda) * z), \qquad m((\lambda, \mu) * \delta(x)) = (\lambda + \mu) * x. \tag{†}$$

---

[13] 编者注: 当 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 且 X 是一个 k-概形时, 有 $T_{X/S}(S') = \mathrm{Hom}_S(S' \otimes_k k[\epsilon], X) = X(S' \otimes_k k[\epsilon])$; 这就得到切丛的一个通常定义.

[14] 编者注: 原文中的次序 "$0 \to \mathcal{M}$ 和 $\mathcal{M} \to 0$" 已改正为 "$\mathcal{M} \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{M}$".

[15] 编者注: 3.1.1 段和 3.1.2 段为新增内容.

[16] 编者注: 实际上, 我们只会用到 $\mathcal{O}(S)$ (分别地, $\mathcal{O}(S) \times \mathcal{O}(S)$) 在 $\Sigma(X', \mathcal{M})$ (分别地, $\Sigma(X', \mathcal{M} \oplus \mathcal{M})$) 上的作用; 见下文及 3.6 的证明.

定义 3.2.

设 $u \in X(S) = \mathrm{Hom}_S(S, X) = \Gamma(X/S)$. *$X$ 在 S 上于 u 处关于 $\mathcal{M}$ 的切空间 (tangent space)* 记作 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$, 是将 X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 沿 $u : S \to X$ 拉回所得的 S-函子.

$$\begin{array}{ccc} L^u_{X/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ S & \xrightarrow[u]{} & X \end{array}$$

图 8: 定义 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的笛卡尔方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 66 页.

特别地, 将 $L^u_{X/S}(\mathcal{O}_S)$ 记作 $L^u_{X/S}$, 称为*X 在 S 上于 u 处的切空间*.

注 3.2.1.

[17] 由 3.1.1 可知, 对每个 $t : S' \to S$, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 是满足 $f \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $f : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 的集合, 其中 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S' \to I_{S'}(\mathcal{M})$ 是零截面.

命题 3.3.

若 X 由一个 S-概形 $\widetilde{X}$ 表出, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 都可表. 特别地, $T_{X/S}$ 和 $L^u_{X/S}$ 分别由 $\widetilde{X}$ 上和 S 上的向量纤维化

$$V(\Omega^1_{\widetilde{X}/S}) \qquad \text{和} \qquad V(u^*\Omega^1_{\widetilde{X}/S})$$

表出.

显然, 只需对 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 证明该断言, 因为关于 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的相应断言由拉回即得. 由推论 2.2.1, 甚至只需处理 $T_{X/S}$; 在此情形中, 所得结果正是 附注 2.2.2.

注 3.3.1.

此命题特别简单地描述了表出 $L^u_{X/S}$ 的向量纤维化. X 在 S 上的截面 u 的像是局部闭的, [18] 因而在 X 的某个开子概形上所诱导的概形中, 由一个拟凝聚理想 $\mathfrak{m}$ 定义. 商 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 可视为 S 上的拟凝聚模; 正是此模定义了上述向量纤维化.

例如, 设 X 是域 k 上的代数概形, u 是 X 的一个 k-有理点. 设 $\mathfrak{m}$ 是局部环 $\mathcal{O}_{X,u}$ 的极大理想, $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的对偶 k-向量空间; 这就是 $\mathcal{O}_{X,u}$ 在 u 处的 Zariski 切空间. 按 I 4.6.5.1 的记号,

$$L^u_{X/k} = V(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = W(\mathfrak{t}).$$

回到一般情形, 首先注意到 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 从有限自由 $\mathcal{O}_S$-模到 S 上的函子是协变的. 特别地, $\mathcal{O}(S)$ 是 S-函子 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的一个算子集, 且与关于 $\mathcal{M}$ 的函子性相容. [19]

[17]编者注: 此注为新增内容.
[18]编者注: 参见 EGA I, 5.3.11.
[19]编者注: 参见 3.1.2.

命题 3.4.

$T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 的构造与基扩张可交换. 对每个 S-概形 S', 都有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} T_{X/S}(\mathcal{M})_{S'},$$

$$L^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}) \xrightarrow{\sim} L^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'}, \qquad u' = u_{S'}.$$

这立即由 Hom 与基扩张的相容性得到.

推论 3.4.1.

X-函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ (分别地, S-函子 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$) 自然地是以 $\mathcal{O}_X$ (分别地, $\mathcal{O}_S$) 为算子的对象, 且这些结构关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性.

对于 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$, 这是直接的. 对 S 上的每个 S', 环 $\mathcal{O}(S')$ 作用于 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}$, 从而作用于

$$L^{u'}_{X_{S'}/S'}(\mathcal{M}\otimes\mathcal{O}_{S'}) = L^u_{X/S}(\mathcal{M})_{S'};$$

此作用关于 S' 具有函子性.

$T_{X/S}(\mathcal{M})$ 的情形需要稍作说明. 对一个 X-对象 $f : X' \to X$, 置 $T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'} = T_{X/S}(\mathcal{M})\times_X X'$. 必须在

$$T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X') = \mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$$

上赋予 $\mathcal{O}(X')$ 的一个作用, 且关于 X' 具有函子性. 设 $X_{X'} = X\times_S X'$, 并设 f' 是由 f 定义的 $X_{X'}$ 在 X' 上的截面. 下图给出所需的等同.




图 9: 用于定义 $\mathcal{O}_X$-算子结构的基变换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 10 页; 合卷第 68 页.

结合 3.2.1, 此图将 $T_{X/S}(\mathcal{M})_{X'}(X')$ 等同于

$$L^{f'}_{X_{X'}/X'}(\mathcal{M})(X') = \left\{\ X'\text{-态射}\psi : I_{X'}(\mathcal{M}) \to X_{X'} \ \middle|\ \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = f'\ \right\}.$$

每个 $a\in\mathcal{O}(X')$ 都通过其在 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 上的作用而作用: 按 2.1.1 的记号,

$$a\psi = \psi\circ a^*, \qquad (a\psi)(x) = \psi(x\cdot a)$$

对每个 $X''\to X'$ 以及每个 $x\in I_{X'}(\mathcal{M})(X'')$ 都成立. 这个构造显然关于 X' 具有函子性. [20] 因此, 按照构造, 命题 3.4 中的同构都是相应的 $\mathcal{O}_{X_{S'}}$-算子结构和 $\mathcal{O}_{S'}$-算子结构的同构.

[20]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

注 3.4.2.

[21] $\mathcal{O}_X$ 在 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用也可更直接地说明如下. 对每个 $f : X' \to X$,

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M})) = \{\varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_{X'}(\mathcal{M}), X) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f\}.$$

由 2.1.3, S-函子 $I_{X'}(\mathcal{M})$ 带有保持零截面的幺半群 $\mathcal{O}(X')$ 的作用. 因此, 若 a^* 表示由 $a \in \mathcal{O}(X')$ 定义的 X'-自同态, 则

$$a\varphi = \varphi \circ a^*, \qquad (a\varphi)(m, x') = \varphi(m \cdot a(x'), x')$$

对每个 $S' \to S$ 以及每个 $(m, x') \in \mathrm{Hom}_S(S', I_S(\mathcal{M}) \times_S X')$ 都成立. 注意, $a^* \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \varepsilon_{\mathcal{M}}$, 因而 $(a\varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = f$.

同样, 对 $t : S' \to S$, 集合 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})(S')$ 由满足 $\varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = u \circ t$ 的 S-态射 $\varphi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to X$ 组成, 而对 $a \in \mathcal{O}(S')$, 有 $a\varphi = \varphi \circ a^*$.

注 3.4.3.

[21] 3.1.2 中的讨论同样适用于 $\mathcal{O}_S$ 在 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用, 以及 $\mathcal{O}_X$ 在 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的作用.

定义 3.5.

设 S 是概形, X 是一个 S-函子. 若对 S 上的每个 S', 以及每对有限自由 $\mathcal{O}_{S'}$-模 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$, 将 X 应用于 2.1 的图 $(*)$ 所得的集合图都是笛卡尔图, 则称 X *关于* S *满足条件 (E).* [22]




图 10: 条件 (E) 中的笛卡尔图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 69 页.

3.5.1.

[23] 等价地, 函子 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 将有限自由 $\mathcal{O}_S$-模的直和映为 X-函子的积. 此时, 对每个 $u \in \Gamma(X/S)$,

$$\mathcal{M} \longmapsto L^u_{X/S}(\mathcal{M}) = S \times_X T_{X/S}(\mathcal{M})$$

也具有相同的性质.

命题 2.2 表明, 每个可表函子都满足条件 (E). 我们有时将 "X 关于 S 满足条件 (E)" 简写为 "X/S 满足条件 (E)".

若 X/S 满足 (E), 则 $\mathcal{M} \mapsto T_{X/S}(\mathcal{M})$ 与积可交换, 因而将群映为群. 特别地, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个交换 X-群; 同理, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 是一个交换 S-群.

[21]编者注: 注 3.4.2 和 3.4.3 为新增内容.
[22]编者注: 不满足 (E) 的 S-函子及 S-群的例子, 见 6.2 和 6.3.
[23]编者注: 以下内容为新增内容.

命题 3.6.

若 X/S 满足 (E), 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ (分别地, $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$) 上的阿贝尔群结构, 连同 $\mathcal{O}_X$ (分别地, $\mathcal{O}_S$) 的作用, 使其成为一个 $\mathcal{O}_X$-模 (分别地, $\mathcal{O}_S$-模).

算子作用关于 $\mathcal{M}$ 具有函子性, 因而保持由 $\mathcal{M}$ 的阿贝尔群结构通过函子性所得的阿贝尔群结构. [24] 事实上, 沿用 3.1.2 的记号, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 上的阿贝尔 X-群法则是复合

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X T_{X/S}(\mathcal{M}) \simeq T_{X/S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \xrightarrow{m} T_{X/S}(\mathcal{M}),$$

而

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\delta} T_{X/S}(\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}) \simeq T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X T_{X/S}(\mathcal{M})$$

是对角态射.

由注 3.4.3 及 3.1.2 中的恒等式 (†),

$$\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y, \qquad (\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x$$

对每个 $f : X' \to X$, 每个 $x, y \in \mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$, 以及每个 $\lambda, \mu \in \mathcal{O}(X')$ 都成立.

注 3.6.1.

若 X 可表, 则它满足 (E), 且 $T_{X/S}$ 和 $L^u_{X/S}$ 由向量纤维化表出. 此时, 上述法则恰好就是向量纤维化结构所诱导的法则 (参见 I 4.6). [25]

命题 3.4 bis.

若 X/S 满足 (E), 则 $X_{S'}/S'$ 满足 (E), 且 3.4 中的同构分别保持 $\mathcal{O}_{X_{S'}}$-模结构及 $\mathcal{O}_{S'}$-模结构.

无需进一步说明.

命题 3.7.

函子 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $L^u_{X/S}(\mathcal{M})$ 关于 X 具有函子性. 因此, 若 $f : X \to X'$ 是一个 S-态射, 则下图交换.




图 11: 切丛与切空间关于 X 的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 70 页.

此外, 若 f 是单态射, 则 $T(f)$ 与 $L(f)$ 也是单态射. [26] $T(f)$ 与 $L(f)$ 的存在性及最后一个断言立即由定义得到. 交换性则由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性及 $T_{X/S}(0) = X$ 得到.

---

[24] 编者注: 以下内容作了扩充.

[25] 编者注: 明确地说, 对每个 S-态射 $f : X' \to X$, 在等同

$$\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M})) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(f^*\Omega^1_{X/S}, \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{X'}),$$

下, $\mathcal{O}(X')$ 在 $\mathrm{Hom}_X(X', T_{X/S}(\mathcal{M}))$ 上的作用对应于右边的自然作用. 这由 SGA 1, III 5.1 的证明得到; 另见第 III 篇的新增段落 0.1.8.

[26] 编者注: 前一句为新增内容.

注 3.7.1.

[27] 假设 X 与 X' 可表, 设 r 是 $\mathcal{M}$ 的秩. 由 2.2.2, $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 同构于 r 个 $V(\Omega^1_{X/S})$ 的副本在 X 上的积; $T_{X'/S}(\mathcal{M})$ 同理. 所以, 当 f 是开浸入, 或更一般地, 当 $f^*\Omega^1_{X'/S} = \Omega^1_{X/S}$, 例如当 f 平展时, 3.7 中的方块是笛卡尔方块. 在这些条件下, 有 S-函子同构

$$L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}).$$

一般地, 3.7 中的方块定义了如下 X-函子态射.




图 12: 一般情形中诱导的 X 上的态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 71 页.

命题 3.7 bis.

设 $f : X \to X'$ 是一个 S-态射. 若 X 与 X' 关于 S 满足 (E), 则

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{T(f)} T_{X'/S}(\mathcal{M})_X, \qquad \text{分别地} \qquad L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{L(f)} L^{f\circ u}_{X'/S}(\mathcal{M}),$$

是一个 $\mathcal{O}_X$-模态射, 分别地, 是一个 $\mathcal{O}_S$-模态射.

这由命题 3.7 及关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到.

命题 3.8.

对 S 上的两个函子 X, Y, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S T_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} T_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}), \tag{3.8.1}$$

$$L^u_{X/S}(\mathcal{M}) \times_S L^v_{Y/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^{(u,v)}_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{3.8.2}$$

第一个同构由 1.2 $(*)$ 得到; [28] 第二个同构由第一个同构沿 $(u, v) : S \to X \times_S Y$ 作基变换得到.

注 3.8.0.

同构 (3.8.1) 也可解读为 $X \times_S Y$-函子同构

$$\left(T_{X/S}(\mathcal{M}) \times_X (X \times_S Y)\right) \underset{X\times_S Y}{\times} \left(T_{Y/S}(\mathcal{M}) \times_Y (X \times_S Y)\right) \xrightarrow{\sim} T_{(X\times_S Y)/S}(\mathcal{M}).$$

推论 3.8.1.

若 X/S 带有一个由有限笛卡尔积定义的代数结构, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 带有一个同类结构, 且投影 $T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是关于此结构的态射.

[27]编者注: 增加了 X 与 X' 可表的假设, 并扩充了以下内容.

[28]编者注: 以下内容作了扩充.

命题 3.8 bis.

若 X/S 和 Y/S 满足 (E), 则 $(X \times_S Y)/S$ 满足 (E), 且 (3.8.1) (分别地, (3.8.2)) 是一个 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模同构 (分别地, $\mathcal{O}_S$-模同构).

证明. [29] 由 3.5.1 和 (3.8.1), 积 $(X \times_S Y)/S$ 满足 (E). 下面证明关于 (3.8.1) 的断言. 给定一个 S-态射 $(x, y) : Z \to X \times_S Y$, 由注 3.4.2, 只需证明映射

$$\{\varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = x\} \times \{\psi \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), Y) \mid \psi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = y\} \longrightarrow \{\theta \in \mathrm{Hom}_S(I_Z(\mathcal{M}), X \times_S Y) \mid \theta \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = (x, y)\},$$

是 $\mathcal{O}(Z)$-线性的, 此映射将 (φ, ψ) 映到 $\varphi \times \psi$. 这是显然的, 因为对 $a \in \mathcal{O}(Z)$, 有

$$(\varphi \circ a^*) \times (\psi \circ a^*) = (\varphi \times \psi) \circ a^* = a \cdot (\varphi \times \psi).$$

关于 (3.8.2) 的断言同样由 3.2.1 得到.

3.9.0.

[30] 若 X 是单位截面为 $e : S \to X$ 的 S-群, 记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = L^e_{X/S}(\mathcal{M}).$$

于是, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 由下列笛卡尔方块定义.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) & \xrightarrow{\ i\ } & T_{X/S}(\mathcal{M}) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S & \xrightarrow{\ e\ } & X \end{array} .$$

图 13: 定义 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 的笛卡尔方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 14 页; 合卷第 72 页.

由推论 3.8.1, 投影 $p : T_{X/S}(\mathcal{M}) \to X$ 是一个 S-群态射. 所以, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 是一个 S-群, 且通过 i 等同于 p 的核.

若 X/S 还满足 (E), 则命题 3.9 将表明, 这个由 X 的群结构所诱导的群结构, 与由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性所诱导的阿贝尔群结构一致 (参见 3.5.1). 事实上, 在更弱的假设下结果也成立: 只需 X 是取值于幺半群的 S-函子, 或更一般地, 是如下定义的取值于 H-集合的 S-函子.

定义 3.9.0.1.

(a) 一个 H-*集合 (H-set)* 是指配备了一个具有双侧单位元的合成法则的集合 X, 其单位元记作 e_X 或简称为 e. [31] 若 $f : X \to Y$ 是 H-集合态射, 则其核为 $\ker f = f^{-1}(e_Y)$, 它是 X 的一个子 H-集合.

(b) 范畴 $\mathscr{C}$ 中的一个H-*对象 (H-object)* 是指配备了态射 $X \times X \to X$ 以及 X 在终对象上的一个截面的对象 X, 该截面是双侧单位元. 每个 $\mathscr{C}$-幺半群, 特别是每个 $\mathscr{C}$-群, 都是一个 $\mathscr{C}$-H-对象. S 上的函子范畴中的 H-对象称为 S-H-*函子*.

[29]编者注: 此证明为新增内容.
[30]编者注: 此段为新增内容, 旨在说明引入 S-H-函子概念的原因.
[31]编者注: 这个术语源于拓扑中的 H-空间概念.

(c) 若 X 是一个 S-H-函子 (例如一个 S-群), 且 $e : S \to X$ 是其单位截面, 记

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) = L^e_{X/S}(\mathcal{M}), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(X/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{O}_S).$$

现在明确写出 3.8.1 的下列特例. [32]

推论 3.9.0.2.

若 X 是一个 S-H-函子, 分别地, 是一个 S-群, 则 $T_{X/S}(\mathcal{M})$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 同样是 S-H-函子, 分别地, 是 S-群, 并且有如下 S-H-函子态射, 分别地, S-群态射.

$$\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{i} T_{X/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\leftrightarrows}} X,$$

图 14: 切函子的包含映射、投影与零截面.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 15 页; 合卷第 73 页.

这里, i 将 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 等同于 $\ker p$, 而 s 是 p 的一个截面.

命题 3.9.

设 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-H-函子. $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上由 X 的结构所诱导的 S-H-函子结构, 与 3.5.1 中定义的 S-群结构一致.

以上讨论表明, $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 是 $\mathcal{O}_S$-模范畴中的一个 H-对象. 由下列引理即得此命题. [33]

引理 3.10.

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. 设 G 是 $\mathscr{C}$-H-对象范畴中的一个 H-对象. 因此, G 是一个 $\mathscr{C}$-H-对象, 其合成法则记作 $f : G \times G \to G$, 并且配备了一个 $\mathscr{C}$-H-对象态射 $h : G \times G \to G$. [34] 则 $f = h$, 且 f 是交换的.

照常, 将函子在变动的变元上取值, 便将证明归约为 $\mathscr{C}$ 是集合范畴的情形. 此时, 有一个集合 G 及两个映射 $f, h : G \times G \to G$, 满足

$$h(f(x, y), f(z, t)) = f(h(x, z), h(y, t)).$$

设 $e, u \in G$ 分别为 f 与 h 的单位元, 从而

$$f(e, x) = f(x, e) = x, \qquad h(u, x) = h(x, u) = x.$$

首先,

$$h(f(u, y), f(x, u)) = f(x, y) = h(f(x, u), f(u, y)).$$

令 $y = e$, 分别地, 令 $x = e$, 得到

$$x = f(x, e) = h(f(u, e), f(x, u)) = h(u, f(x, u)) = f(x, u),$$
$$y = f(e, y) = h(f(e, u), f(u, y)) = h(u, f(u, y)) = f(u, y).$$

将这些恒等式代入原关系式, 得到

$$h(y, x) = f(x, y) = h(x, y).$$

引理及命题 3.9 得证. 于是由 3.9 得到以下推论.

[32]编者注: 推论 3.9.0.2 为新增内容; 它将用于 4.1.
[33]编者注: 这受到 H-空间的基本群为阿贝尔群的标准证明的启发.
[34]编者注: $G \times G$ 配备的法则为 $(G \times G) \times (G \times G) \to G \times G$, $((x, z), (y, t)) \mapsto (f(x, y), f(z, t))$.

推论 3.9.1.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-H-函子, 则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 中每个映到 $X(S)$ 的单位元的元素都是可逆的.

推论 3.9.2.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-幺半群, 则 $X(I_S(\mathcal{M}))$ 的一个元素可逆, 当且仅当它在 $X(S)$ 中的像可逆.

推论 3.9.3.

若 X 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-群, 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})$ 上的两个 S-群法则重合.

推论 3.9.4.

[35] 设 G 是一个关于 S 满足 (E) 的 S-群. 对 $n \in \mathbb{Z}$, 以 $n_G : G \to G$ 表示由 $g \mapsto g^n$ 定义的 S-函子态射. 则导出态射

$$L(n_G) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$$

是数乘 n; 即它将 $x \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$ 映为 nx.

映射 n_G 一般不是群同态, 但它保持单位截面 $e : S \to G$, 所以它的导映射确实将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = L^e_{G/S}$ 映到自身. 若 i 表示包含映射 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \hookrightarrow T_{G/S}$, 则 $L(n_G)$ 由下式刻画:

$$i(L(n_G)(x)) = i(x)^n.$$

由 3.9, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上由 (E) 和 G 的法则所得的群法则一致. 因而 $i(x)^n = i(nx)$, 所以 $L(n_G)(x) = nx$.

在进一步推导命题 3.9 的推论之前, 先证明另一个函子性结果.

命题 3.11.

在第 1 节 的情形中, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

事实上, 按定义,

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)).$$

在 1.1 的同构 (4) 中取 $T = I_S(\mathcal{M})$, 得到

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(Z \times_S I_S(\mathcal{M}), Y)).$$

由于 $Z \times_S I_S(\mathcal{M}) \simeq I_Z(\mathcal{M})$, 此即

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, \underline{\mathrm{Hom}}_Z(I_Z(\mathcal{M}), Y)) = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

[35] 编者注: 此推论为新增内容, 它扩充了下文注 4.1.1.2.

推论 3.11.1.

若 Y/Z 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)/S$ 满足 (E), 且 3.11 中的同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 上的模结构. [36]

证明. 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模. 若 Y/Z 满足 (E), 则

$$T_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \simeq T_{Y/Z}(\mathcal{M}) \times_Y T_{Y/Z}(\mathcal{N}).$$

右边是 $T_{Y/Z}(\mathcal{M}) \times_S T_{Y/Z}(\mathcal{N})$ 的一个子函子, 因而由 1.2 $(*)$ 得到

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}))\\ &\qquad\simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) \underset{\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)}{\times} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{N})).\end{aligned}$$

结合 3.11, 这就说明 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$ 满足 (E), 从而证明了第一个断言.

对于第二个断言, 置 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$, 并设 $\Delta : H' \to H$ 是一个 S-态射. 等价地, 设 $\delta : H' \times_S X \to Y$ 是相应的 Z-态射; 它使 $H' \times_S X$ 成为一个 Y-对象. 一方面, 有以下交换图.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))) \\
\| & & \| \\
\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y)
\end{array}.$$

图 15: 推论 3.11.1 证明中的第一个比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 17 页; 合卷第 75 页.

由 1.3, $\alpha \in \mathcal{O}(H' \times_S X)$ 在 $\Psi \in \mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))$ 上的作用, 对每个 $U \to S$ 和每个 $(h,x) \in \mathrm{Hom}_S(U, H' \times_S X)$, 由下式给出:

$$(\alpha\Psi)(h,x) = \alpha(h,x)\Psi(h,x),$$

其中通过 $\delta\circ(h,x)$ 将 U 视为 Y 上的对象, 而 $\alpha(h,x) \in \mathcal{O}(U)$ 通过 $T_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 上的 $\mathcal{O}_Y$-模结构而作用. 由 3.4.2, 在等同

$$\mathrm{Hom}_Y(H' \times_S X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})) = \{\psi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \psi\circ\varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\},$$

下, 这个作用对每个 $(m,h,x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$ 由下式给出:

$$(\alpha\psi)(m,h,x) = \psi(m\cdot\alpha(h,x), h, x) \tag{1}$$

另一方面, 考虑 $T_{H/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), H)$. 有第二个交换图.

[36]编者注: 记 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X,Y)$, 这特别蕴含 $T_{H/S}(\mathcal{M})$ 自然地是 $\prod_{X\times_S H/H}\mathcal{O}_H$ 上的一个模. 编者对这一结果略感意外, 因此详细给出了证明.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_H(H', T_{H/S}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(H', T_{H/S}(\mathcal{M})) \\
\| & & \| \\
\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \mid \Phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \Delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H) \\
{\scriptstyle (*)}\| & & \| \\
\{\phi \in \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y) \mid \phi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \delta\} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_Z(I_{H'\times_S X}(\mathcal{M}), Y)
\end{array},$$

图 16: 推论 3.11.1 证明中的第二个比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 18 页; 合卷第 76 页.

图中的双射 $(*)$ 可描述如下 (参见 1.1(2) 和 I 1.7.1). 对每个 $U \to S$ 及 $(m, h, x) \in \mathrm{Hom}_S(U, I_S(\mathcal{M}) \times_S H' \times_S X)$, 其中 U 通过 $U \xrightarrow{x} X \to Z$ 位于 Z 上, 有 $\Phi(m, h) \in \mathrm{Hom}_Z(X \times_S U, Y)$, 且

$$\varphi(m, h, x) = \Phi(m, h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) \in \mathrm{Hom}_Z(U, Y). \tag{†}$$

在 3.4.2 中以 H 代替 X, 以 H' 代替 X', 可知 $a \in \mathcal{O}(H')$ 在 $\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{H'}(\mathcal{M}), H)$ 上的作用为

$$(a\Phi)(m, h) = \Phi(m \cdot a(h), h).$$

因此, 若 φ (分别地, $a\varphi$) 对应于 Φ (分别地, $a\Phi$), 则由 (†) 得到

$$(a\varphi)(m, h, x) = \Phi(m \cdot a(h), h) \circ (x \times \mathrm{id}_U) = \varphi(m \cdot a(h), h, x). \tag{2}$$

结合 (1), 这证明了 3.11.1 的同构

$$T_{H/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M}))$$

是 $\mathcal{O}(H)$-模同构. 此外, 对每个 $H' \to H$, $\mathrm{Hom}_H(H', T_{H/S}(\mathcal{M}))$ 上的 $\mathcal{O}(H')$-模结构可延拓为一个 $\mathcal{O}(H' \times_S X)$-模结构, 且关于 H' 具有函子性.

取 $Z = S$ 便得到以下推论.

推论 3.11.2.

有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y/S 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)/S$ 满足 (E), 且此同构保持 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$ 上的模结构.

设 $u : X \to Y$ 是一个 S-态射, 将其等同于常态射 $u : S \to \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$, 它对每个 $f : S' \to S$ 满足 $u(f) = u$. u 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$$

的纤维积等同于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M}))$, 其中 X 通过 u 位于 Y 上. 所以, 由切空间的定义及推论 3.11.2 得到以下结果. [37]

[37]编者注: 前面几句为新增内容.

推论 3.11.3.

对一个 S-态射 $u : X \to Y$, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^{u}_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})),$$

其中右边的 X 通过 u 位于 Y 上. 若 Y/S 满足 (E), 则这是一个 $\mathcal{O}_S$-模同构. [38]

特别地, 当 $Y = X$ 时, 函子 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 是一个取值于幺半群的 S-函子, 因而是一个 S-H-函子. 回顾记号, $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 表示 $L^{e}_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M})$, 其中 e 是单位截面.

推论 3.11.4.

有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}).$$

若 X/S 满足 (E), 则这是一个 $\mathcal{O}_S$-模同构. [38]

注 3.11.5.

[39] 假设 X/S 满足 (E). 则

$$\prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathcal{M}))$$

是 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$ 上的一个模. 明确地说, 对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{X/S}(X, T_{X/S}(\mathcal{M}))(S') \\ = \{\psi \in \mathrm{Hom}_X(I_{S'}(\mathcal{M}) \times_S X, X) \mid \psi \circ (\varepsilon_{\mathcal{M}} \times \mathrm{id}_X) = \mathrm{pr}_X\}$$

具有关于变元函子性的 $\mathcal{O}(X \times_S S')$-模结构. 这既可由 3.6 及 $\prod_{X/S}$ 的性质 (参见 1.2) 得到, 也可由 3.11.1 的证明得到.

现在给出切丛的几何解释. 设 U 是一个 S-函子. [40] 由 I 1.7.2, 有关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\begin{aligned} T_{X/S}(\mathcal{M})(U) &= \mathrm{Hom}_S\big(U, \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), X)\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_S\big(I_S(\mathcal{M}), \underline{\mathrm{Hom}}_S(U, X)\big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}\big(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}\big). \end{aligned}$$

特别地, 态射 $\mathcal{M} \to 0$ 给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_S(U, T_{X/S}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \\ {\scriptstyle \pi_{\mathcal{M}}}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_S(U, X) & \xrightarrow{\text{identity}} & \mathrm{Hom}_S(U, X) \end{array},$$

图 17: 投影 $\pi_{\mathcal{M}}$ 的几何解释.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 19 页; 合卷第 77 页.

第二个竖直箭头由沿 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S \to I_S(\mathcal{M})$ 的基变换得到. [41]

---

[38] 编者注: 前一句为新增内容.

[39] 编者注: 此注为新增内容.

[40] 编者注: 以下内容对原文作了简化.

[41] 编者注: 通过

$$\mathrm{Hom}_{I_S(\mathcal{M})}(U_{I_S(\mathcal{M})}, X_{I_S(\mathcal{M})}) \simeq \mathrm{Hom}_S(U \times_S I_S(\mathcal{M}), X),$$

命题 3.12.

设 $h_0 : U \to X$ 是一个 S-态射. 则 $\mathrm{Hom}_X(U, T_{X/S}(\mathcal{M}))$ 等同于限制到 U 上为 h_0 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射

$$U_{I_S(\mathcal{M})} \longrightarrow X_{I_S(\mathcal{M})}$$

的集合, 其中通过 $\mathrm{id}_U \times_S \varepsilon_{\mathcal{M}}$ 将 U 视为 $U \times_S I_S(\mathcal{M})$ 的子对象.

取 $U = X$ 及 $h_0 = \mathrm{id}_X$ 得到以下结果. [42]

推论 3.12.1.

集合 $\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于在 X 上诱导恒等映射的 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态 ϕ 的集合; 等价地, 下图交换. [43]

$$\begin{array}{ccc} I_X(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\phi} & I_X(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varepsilon_{\mathcal{M}}} \\ X & \xrightarrow{\mathrm{id}} & X \end{array} .$$

图 18: 在 X 上诱导恒等映射的无穷小自同态.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件第 20 页; 合卷第 78 页.

另一方面, 由 3.11.2,

$$\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M})(S).$$

若 X/S 满足 (E), 则 $\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S$ 满足 (E), 因而由 3.6, 后一个 Lie 函子是一个 $\mathcal{O}_S$-模 (事实上, 由 3.11.5, 它是一个 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$-模). 应用 3.9 便得下一命题. [44]

命题 3.13.

若 X/S 满足 (E), 则阿贝尔群 $\Gamma(T_{X/S}(\mathcal{M})/X)$ 等同于在 X 上诱导恒等映射的 $X_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态的集合. 因此, 每个这样的自同态都是自同构.

推论 3.13.1.

设 $u : X \to Y$ 是一个 S-同构, 且 Y/S 满足 (E). 每个延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射 $X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$ 都是同构.

推论 3.13.2.

若 Y/S 满足 (E), 则单态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)$$

对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$ 都诱导一个同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}).$$

这等价于注 3.1.1. 同样, 3.12 等价于注 3.4.2 的第一部分.

[42]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

[43]编者注: 当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_X$ 时, 它们称为 X 的*无穷小自同态 (infinitesimal endomorphisms)*; 见本篇末尾的 6.2.

[44]编者注: 以下内容对原文作了扩充.

证明. [45] 对每个 $S' \to S$, 必须证明此映射在 S'-值点上是双射. 由基变换 (参见 3.4), 只需取 $S' = S$. 此时, 右边参数化了延拓 u 的 $I_S(\mathcal{M})$-态射 $X_{I_S(\mathcal{M})} \to Y_{I_S(\mathcal{M})}$, 而左边参数化了其中的同构. 因此, 该断言就是推论 3.13.1.

推论 3.13.3.

若 X/S 满足 (E), 则单态射 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X) \to \underline{\mathrm{End}}_S(X)$ 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$ 都诱导一个同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S}(\mathcal{M}).$$

特别地,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_S(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \prod_{X/S} T_{X/S}(\mathcal{M}),$$

因而 $\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S, \mathcal{M})$ 是一个 $\prod_{X/S} \mathcal{O}_X$-模. [46]

3.14.

最后, 假设 X 可表. [47] 由 2.2.2, X-函子 $T_{X/S}$ 由 $V(\Omega^1_{X/S})$ 表出, 从而有双射

$$\Gamma(T_{X/S}/X) \simeq \mathrm{Hom}_X(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X) \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X).$$

这也由以上结果得到. 由 3.13, $\Gamma(T_{X/S}/X)$ 等同于 X 的无穷小自同态的集合, 即在 X 上诱导恒等映射的 X_{I_S} 的 I_S-自同态. 概形 X 与 X_{I_S} 有相同的底拓扑空间, 它们的结构层分别为 $\mathcal{O}_X$ 和

$$\mathscr{D}_{\mathcal{O}_X} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{M}, \qquad \mathcal{M} = \mathcal{O}_X,$$

其中 $\mathcal{M}$ 是一个平方为零的理想. 设 $\pi : \mathscr{D}_{\mathcal{O}_X} \to \mathcal{O}_X$ 是在 $\mathcal{M}$ 上为零的 $\mathcal{O}_X$-代数态射. 给定 X 的一个无穷小自同态, 等价于给定一个满足 $\pi \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathcal{O}_X}$ 的 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\phi : \mathcal{O}_X \to \mathscr{D}_{\mathcal{O}_X}$, 因而等价于给定 $\mathcal{O}_X$ 的一个 $\mathcal{O}_S$-导子.

若 $D, D' \in \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$, 且 ϕ_D 表示对应于 D 的无穷小自同态, 则

$$\phi_{D+D'} = \phi_D \circ \phi_{D'}.$$

所以等同

$$\{X \text{ 的无穷小自同态}\} \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X)$$

是阿贝尔群同构. 由 3.13 和 3.11.5, 我们于是构造了一个阿贝尔群同构, 实际上是一个 $\mathcal{O}(X)$-模同构

$$\Gamma(T_{X/S}/X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X),$$

从而恢复了将切向量场解释为结构层导子的经典解释. [48] 最后,

$$\Gamma(T_{X/S}/X) = H^0(X, \mathfrak{g}_{X/S}),$$

其中 $\mathfrak{g}_{X/S}$ 是 $\Omega^1_{X/S}$ 的对偶.

---

[45] 编者注: 以下证明为新增内容.
[46] 编者注: 前述断言为新增内容.
[47] 编者注: 新增了对 2.2.2 的回顾, 并扩充了后续内容.
[48] 编者注: 此同构还关于 S 具有函子性. 若 $S' \to S$ 且 $X' = X_{S'}$, 则

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)/S)(S') \simeq \Gamma(T_{X'/S'}/X') \simeq \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{O}_{X'}).$$

4. 群的切空间—Lie 代数

4.1.

设 G 是 S 上的群函子. 由 3.9.0.2, $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 均带有 S 上的群结构, 且有群态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{i} T_{G/S}(\mathcal{M}) \underset{s}{\overset{p}{\leftrightarrows}} G;$$

图 19: 群函子 G 的分裂切序列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 22 页; 合卷第 80 页; 印刷页码 70.

由定义, i 将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 等同于 p 的核, 而 s 是 p 的截面. 由 I 2.3.7 可知, 这一序列将 $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 等同于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 与 G 的半直积.

定义 4.1.A.

相应的 G 在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})$ 上的作用记为

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})\big)$$

并称为 G 相对于 $\mathcal{M}$ 的*伴随表示 (adjoint representation)*. 于是, 由定义, 对 $x \in G(S')$ 和 $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S')$, 有

$$\mathrm{Ad}(x)X = i^{-1}\big(s(x)i(X)s(x)^{-1}\big).$$

若 G 交换, 则 $T_{G/S}(\mathcal{M})$ 也交换, 且 $\mathrm{Ad}(x)X = X$. [49]

定义 4.1.B.

设 G, H 是 S 上的群函子, $f : G \to H$ 是群态射. 函子性给出一个与典范截面相容的正合序列态射.

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{G/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\
 & & {\scriptstyle L(f)}\downarrow & & {\scriptstyle T(f)}\downarrow & & {\scriptstyle f}\downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{H/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1
\end{array} \quad ;$$

图 20: 分裂切序列的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 22 页; 合卷第 80 页; 印刷页码 70.

态射 $L(f)$, 也记为 $\underline{\mathrm{Lie}}(f)$, 称为 f 的*导出态射 (derived morphism)*. [50]

注 4.1.C.

若 G/S 和 H/S 满足条件 E, 则 $L(f)$ 保持由“关于 $\mathcal{M}$ 的函子性”得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构 (参见 3.6). [51]

---

[49]编者注: 增添了编号 4.1.A 和 4.1.B, 以突出这两个定义.
[50]编者注: 若 f 为单态射, 则 $L(f)$ 和 $T(f)$ 也为单态射; 参见 3.7.
[51]编者注: 此注为增补内容.

命题 4.1.1.

设 $g \in G(S)$. 则

$$\mathrm{Ad}(g) : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$$

是 $\mathrm{Int}(g) : G \to G$ 的导出态射.

事实上, $\mathrm{Ad}(g)X = i^{-1}(\mathrm{Int}(g)i(X))$, 根据导出态射的定义, 这正是 $L(\mathrm{Int}(g))(X)$.

设 G/S 满足 E. 由命题 3.9, 刚刚在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上定义的群结构, 恰好是由其 $\mathcal{O}_S$-模结构 (由 (E) 定义) 诱导的群结构. 因此, 命题 4.1.1 与 $\mathcal{O}_S$-作用的函子性 (参见 3.6) 给出下述推论.

推论 4.1.1.1.

设 G/S 满足 E. 则 Ad 将 G 映入子群

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})\big)$$

它是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$ 的子群. 换言之, 对每个 $g \in G(S')$, 自同构 $\mathrm{Ad}(g)$ 保持 $\underline{\mathrm{Lie}}(G'/S', \mathcal{M})$ 上的 $\mathcal{O}_{S'}$-模结构, 其中 $G' = G \times_S S'$. 因此, Ad 是 G 在 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上的一个 *线性表示* (参见 I 3.2).

注 4.1.1.2.

a) 函子 G/S 满足 E, 当且仅当对于每一对有限自由 $\mathcal{O}_S$-模 $(\mathcal{M}, \mathcal{N})$, 下图是笛卡尔图; 该图是将 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, -)$ 用于 2.1 的图 $(*)$ 得到的.




图 21: 条件 E 的笛卡尔判据.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 23 页; 合卷第 81 页; 印刷页码 71.

b) 设 G/S 满足 E. 群律 $\pi : G \times_S G \to G$ 的导出态射, 就是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$ 上的加法律. 注意, π 并非群态射, 但 $\pi(e, e) = e$; 因而导出态射 $L(\pi)$ 将

$$T^{(e,e)}_{(G\times_S G)/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$$

映入 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})$; 参见 3.7 和 3.8. 同样, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 以 $n_G : G \to G$ 表示 S-函子态射 $g \mapsto g^n$. 则 $L(n_G)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上的乘以 n 的映射; 参见 3.9.4.

4.1.2.0.

考虑 S-函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))$.[52] 对每个 $S' \to S$, 有 $T_{G/S}(\mathcal{M})_{S'} \simeq T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ (参见 3.4), 因而

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))(S')\\ &\quad\simeq \mathrm{Hom}_{G_{S'}}\big(G_{S'}, T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})\big) = \Gamma\big(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}\big).\end{aligned}$$

[52]编者注: 下文对原文作了扩充, 以明确展示 G 在函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))$ 及 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$ 上的作用.

先注意以下关于 S' 函子性的同构:

$$\mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}), \tag{*}$$

它把 $f : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 对应到截面 $s_f : G_{S'} \to T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$, 后者对每个 $S'' \to S'$ 和 $g \in G(S'')$ 由下式定义:

$$s_f(g) = i(f(g))s(g).$$

设 h 是 S' 上函子 $G_{S'}$ 的一个自同构, 不要求它保持群结构. 对 $T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ 的每个截面 τ, 通过结构迁移得到一个截面 $h(\tau)$: 它是使下图交换的唯一截面.

$$\begin{array}{ccc} G_{S'} & \xrightarrow{\tau} & T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(h)} \\ G_{S'} & \xrightarrow{h(\tau)} & T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M}) \end{array} .$$

图 22: 自同构 h 对切截面的转移.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 24 页; 合卷第 82 页; 印刷页码 72.

特别地, 取 $h = t_x$ 为元素 $x \in G(S')$ 给出的右平移; 于是对所有 $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, 有 $h(g) = t_x(g) = g \cdot x$. 此时有

$$t_x(s_f) = s_{t_x(f)},$$

其中 $t_x(f) : G_{S'} \to \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 由下式给出:

$$t_x(f)(g) = f(g \cdot x^{-1}).$$

让 G 通过右平移按如下方式作用于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M})) \quad \text{和} \quad \underline{\mathrm{Hom}}_S(G, \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M}))$$

对 $S' \to S$ 及 $x \in G(S')$, 设

$$\begin{aligned} &\sigma \in \Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'}), \\ &f \in \mathrm{Hom}_{S'}(G_{S'}, \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})). \end{aligned}$$

对每个 $g \in G(S'')$, $S'' \to S'$, 置

$$(\sigma \cdot x)(g) = \sigma(g \cdot x^{-1}) \cdot s(x), \qquad (f \cdot x)(g) = f(g \cdot x^{-1})$$

同构 $(*)$ 保持这些 G-作用.

因此, 在这一同构下,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))^G(S')$$

的元素对应于从 $G_{S'}$ 到 $\underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S', \mathcal{M})$ 的常态射, 即经过 $G_{S'} \to S'$ 分解的态射; 等价地, 它们对应于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathcal{M})(S')$ 的元素.

术语. $\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G, T_{G/S}(\mathcal{M}))^G(S')$ 的元素称为 $T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})$ 的右平移不变截面.

命题 4.1.2.

映射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)\longrightarrow\Gamma(T_{G/S}(\mathcal{M})/G),\qquad X\longmapsto(x\mapsto X\cdot x),$$

是到右平移不变截面集合的双射. [53]

同样, 让 G 按下式在 $\underline{\mathrm{End}}_{I_S(\mathcal{M})/S}(G_{I_S(\mathcal{M})})$ 上右作用:

$$(u\cdot x)(g)=u(g\cdot x^{-1})\cdot x,$$

其中 $S'\to S$, $x\in G(S')$, $u\in\mathrm{End}_{I_{S'}(\mathcal{M})}(G_{I_{S'}(\mathcal{M})})$, 且 $g\in G(S'')$, $S''\to I_{S'}(\mathcal{M})$. 3.12.1 中的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{G/S}(G,T_{G/S}(\mathcal{M}))\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}_{I_S(\mathcal{M})/S}(G_{I_S(\mathcal{M})})$$

保持 G-作用. 因此, 对每个 $S'\to S$, 它在 $\Gamma(T_{G_{S'}/S'}(\mathcal{M})/G_{S'})$ 与下述自同态的集合之间诱导出一个双射: $G_{I_{S'}(\mathcal{M})}$ 的 $I_{S'}(\mathcal{M})$-自同态 u, 它在 G 上诱导恒等映射, 且“与右平移可交换”, 其含义是对每个 $S''\to S'$ 及 $x\in G(S'')$, 有 $u_{S''}\cdot x=u_{S''}$.

命题 4.1.3.

在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)$ 与下述自同态的集合之间, 存在一个关于 G 函子性的双射: $G_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同态, 它在 G 上诱导恒等映射, 并在刚才说明的意义下与 G 的右平移可交换.

结合 3.13, 得到下述定理.

定理 4.1.4.

设 G 是取值于群的 S-函子, 且 G/S 满足 E. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{M})(S)$ 与下述自同构组成的群关于 G 函子性地等同: $G_{I_S(\mathcal{M})}$ 的 $I_S(\mathcal{M})$-自同构, 它在 G 上诱导恒等映射, 并与 G 的右平移可交换.

当 $\mathcal{M}=\mathcal{O}_S$ 时, 这就得到群的 Lie 代数的一个经典定义.

4.2.0.

在继续讨论之前, 先证明 3.11 的另外一些推论. [54] 如第 1 节, 设 X,Y 在 Z 上, 而 Z 在 S 上. 正如 3.11 所说明的, 同构 1.1(4)




图 23: 1.1(4) 中的伴随同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 25 页; 合卷第 83 页; 印刷页码 73.

诱导下述同构 θ.

[53]只要注意到 G 的右平移不变自同构就是左平移, 便可更简单地得到陈述 4.1.2, 4.1.3 和 4.1.4. 编者注: 例如参见 [DG70], §II.4 中命题 4.6 与 2.5 的证明.

[54]编者注: 4.2.0 段是增补内容; 其结果在原文的 4.2 和 4.7 中被隐含地使用.




图 24: 所诱导的切空间同构 θ.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 25 页; 合卷第 83 页; 印刷页码 73.

由 1.3, 若 Y 是 Z-群, 则对每个 $V \to Z$, $\underline{\mathrm{Hom}}_Z(V, Y)$ 也是 Z-群; 特别地, 可以取 $V = I_Z(\mathcal{M})$. 明确地说, 若 $Z'' \to Z' \to Z$ 且 $\varphi, \psi \in \mathrm{Hom}_Z(V_{Z'}, Y)(Z')$, 则它们的积由下式定义:

$$(\varphi \cdot \psi)(v) = \varphi(v)\psi(v) \qquad (v \in V_{Z'}(Z'')).$$

现设 X 和 Y 都是 Z-群.

定义 4.2.0.1.

以 $\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)$ 表示 $\underline{\mathrm{Hom}}_{Z/S}(X, Y)$ 的下述子函子: 对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, Y)(S') = \mathrm{Hom}_{Z_{S'}\text{-gr.}}(X_{S'}, Y_{S'}). \tag{3}$$

将 Y 换成 Z-群 $T_{Y/Z}(\mathcal{M})$ 时, 也采用同一定义.

在上面的同构 (2) 下, $T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})(S')$ 对应于关于 X 为乘法性的 $Z_{S'}$-态射

$$\varphi : X_{S'} \times_{S'} I_{S'}(\mathcal{M}) \longrightarrow Y_{S'}$$

即

$$\varphi(x_1 x_2, m) = \varphi(x_1, m)\varphi(x_2, m).$$

这些态射又对应于 $Z_{S'}$-群态射 $X_{S'} \to T_{Y/Z}(\mathcal{M})_{S'}$. 因此:

命题 4.2.0.2.

设 X, Y 是 Z-群, 其中 Z 在 S 上. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Z/S)\text{-gr.}}(X, T_{Y/Z}(\mathcal{M})).$$

取 $Z = S$, 得到如下推论. 若 Y 是交换 S-群, 则 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$ 也如此, 因而 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, Y)$, $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M}))$ 及 $T_{H/S}(\mathcal{M})$ 也都如此.

推论 4.2.0.3.

设 X, Y 是 S-群. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

若 Y 交换, 则它们还是交换 S-群的同构.

定义 4.2.0.4.

若 Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则函子 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$, 带有一个由 Y 的结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 配备这一结构后, 将它记为 $T'_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地记为 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$. [55]

因此, 若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $T'_{Y/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), Y)$. 若 $H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M}))$ 和 $T'_{H/S}(\mathcal{M})$ 也带有 $\mathcal{O}_S$-模结构.

[55]编者注: 撇号用来区分由 Y 的结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 与将要从条件 E 得到的模结构.

推论 4.2.0.5.

若 X, Y 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$T'_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M})).$$

定义 4.2.A.

设 X, L 是 S-群, X 通过群自同构作用于 L (参见 I 2.3.5). 以下式定义 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L)$ 的子函子 $\underline{Z}^1_S(X, L)$:

$$\underline{Z}^1_S(X,L)(S') = \{\, \varphi \in \mathrm{Hom}_{S'}(X_{S'}, L_{S'}) \mid \varphi(x_1x_2) = \varphi(x_1)\big(x_1 \cdot \varphi(x_2)\big), \\ x_1, x_2 \in X(S''),\ S'' \to S' \,\}.$$

它称为从 X 到 L 的交叉*同态函子* *(functor of crossed homomorphisms).* [56]

注 4.2.B.

a) 若 L' 是另一个 S-群, 且 X 也通过群自同构作用于它, 则

$$\underline{Z}^1_S(X, L \times_S L') \simeq \underline{Z}^1_S(X, L) \times_S \underline{Z}^1_S(X, L').$$

b) 若 L 是 X-$\mathcal{O}_S$-模, 则 $\underline{Z}^1_S(X, L)$ 是 I 5.1 中定义的微分

$$\partial : \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, L) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_S(X^2, L)$$

的核. 特别地, 此时 $\underline{Z}^1_S(X, L)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模.

4.2.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 我们要描述 $L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})$. 首先, 3.11.3 给出关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, T_{Y/S}(\mathcal{M})). \tag{†}$$

由于 Y 是 S-群,

$$T_{Y/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})_Y,$$

因而得到关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_S(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

对 $S' \to S$, 以 $u' : X' \to Y'$ 表示 u 的基变换. S-函子[57]

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}\big(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y\big)$$

由下式定义:

$$\begin{aligned} &\underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}\big(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y\big)(S') \\ &\quad = \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}\big(X', (\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) \cdot Y)_{S'}\big) \\ &\quad = \mathrm{Hom}_{Y'\text{-gr.}}\big(X', \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S', \mathcal{M}) \cdot Y'\big). \end{aligned}$$

[56]编者注: 下文对原文作了扩充; 特别是增添了定义 4.2.A 与注 4.2.B.
[57]编者注: 这是取 $Z = Y$, 对 Y-群 $u : X \to Y$ 和 $T_{Y/S}(\mathcal{M}) \to Y$ 应用定义 4.2.0.1.

所以 (†) 诱导同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{(Y/S)\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})\cdot Y). \tag{†′}$$

另一方面, 复合态射

$$X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$$

图 25: X 在 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})$ 上的作用.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 27 页; 合卷第 85 页; 印刷页码 75.

定义了 X 在 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})$ 上通过群自同构给出的作用.

设 $\Phi \in \underline{\mathrm{Hom}}_{Y/S}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})\cdot Y)$. 对 $S'' \to S' \to S$ 及 $x \in X(S'')$, 存在唯一的表达式

$$\Phi(S')(x) = \varphi(S')(x)\cdot u'(x), \qquad \varphi(S')(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y'/S',\mathcal{M})(S'').$$

这确定了一个元素 $\varphi \in \underline{\mathrm{Hom}}_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$. 映射 $\Phi(S')$ 为群态射, 当且仅当对所有 $x_1, x_2 \in X(S'')$, 有

$$\begin{aligned}\varphi(S')(x_1x_2) &= \varphi(S')(x_1)(u(x_1)\varphi(S')(x_2)u(x_1)^{-1})\\ &= \varphi(S')(x_1)(x_1\cdot\varphi(S')(x_2)),\end{aligned}$$

也就是说, 恰在 $\varphi \in \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M}))$ 时成立.

命题 4.2.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})).$$

再设 Y/S 满足 E. 由 4.2.0.3, 与 3.11.1 的证明一样, 可得 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S$ 满足 E. 因此 (参见 3.5.1),

$$\begin{aligned}L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \simeq\ & L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M})\\ & \times_S L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{N}).\end{aligned}$$

这也直接由命题 4.2 及 注 4.2.Ba 得到. 因此, 命题 4.2 中同构的两端都带有由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 且该同构保持这些结构.

命题 4.2 bis.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射, 且 Y/S 满足 E. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S,\mathcal{M})).$$

58

当 Y/S 满足 E 时, 3.13.1 也给出如下同构, 正如 3.13.2 的证明中那样: 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)$, 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}). \tag{*}$$

由此得到以下两个推论.

[58]编者注: 从此处起对原文作了扩充; 特别是增添了命题 4.2 bis.

推论 4.2.1.

设 $u : X \to Y$ 是 S-群态射. 若 Y/S 满足 E, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

推论 4.2.2.

设 X 是 S-群. 若 X/S 满足 E, 则存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{Z}^1_S(X, \underline{\mathrm{Lie}}(X/S, \mathcal{M})).$$

若 Y 交换, 则其在 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 上的伴随作用是平凡的, 所以 $\underline{Z}^1_S(X, L) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, L)$. [59]

推论 4.2.3.

设 Y 是交换 S-群. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})).$$

4.3.

现在考虑 X 与 Y 是 $\mathcal{O}_S$-模的情形. 回顾 (参见 4.2.0.4), $T'_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$, 表示函子 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$, 相应地 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$, 并在其上配备由 Y 的模结构诱导的 $\mathcal{O}_S$-模结构.

当 Y/S 满足 E 时, 我们总用 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 表示该函子, 而给它配备的是对每个满足 E 的函子都已定义的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 由 3.9, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 与 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 的底交换群结构相同, 但其模结构未必相同 (见 6.3 的反例). 对 $S' \to S$, $a \in \mathcal{O}(S')$ 和 $m \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})(S')$, 用 $a \cdot' m$, 相应地 $a \cdot m$, 表示来自 Y 的作用, 相应地表示由条件 E 得到的作用. 对 $T_{Y/S}(\mathcal{M})$ 上的这两种作用, 也采用同一约定.

存在 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$T'_{Y/S}(\mathcal{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M}) \oplus Y.$$

因此, 与命题 4.2 和 4.2 bis 完全一样, 得到:

命题 4.3.

设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 S-函子同构

$$L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})). \qquad (*)$$

若 Y/S 满足 E, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)/S$ 满足 E, 而当两端配备由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的结构时, $(*)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模同构. [60] [61]

---

[59] 编者注: 以下这句话为增补内容.

[60] 编者注: 以下这句话为增补内容.

[61] 编者注: 右端的标量作用为 $(a\varphi)(x) = a\varphi(x)$, 其中 $a\varphi(x)$ 表示 a 在 $\varphi(x) \in \underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M})$ 上的作用. 这不同于作用 $(a \cdot' \varphi)(x) = a \cdot' \varphi(x) = \varphi(ax)$, 但当 $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 时, 两者相同.

注 4.3 bis.

设 $u : X \to Y$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射. [62] 以 τ_u 表示将每个 $\mathcal{O}_S$-线性态射 $\varphi : X \to \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})$ 对应到

$$u \oplus \varphi : X \longrightarrow T'_{Y/S}(\mathcal{M}) = Y \oplus \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M}).$$

的映射.

4.3 的同构包含在以下关于 $\mathcal{M}$ 函子性的交换图中.

$$\begin{array}{ccc} L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S, \mathcal{M})) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau_u} \\ T_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, T'_{Y/S}(\mathcal{M})) \end{array} .$$

图 26: 4.3 的同构与 τ_u 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 30 页; 合卷第 88 页; 印刷页码 78.

此外, 当 Y/S 满足 E 时, 与 3.13.2 的证明一样, 3.13.1 给出: 对每个 $u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, Y)$, 有

$$L^u_{\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}) = L^u_{\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X,Y)/S}(\mathcal{M}). \qquad (*)$$

推论 4.3.1.

设 X 是 S 上满足 E 的 $\mathcal{O}_S$-模. 存在关于 $\mathcal{M}$ 函子性的同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X, \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M})),$$

且这一同构保持由关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 特别地, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S$ 满足 E. [63]

证明. 第一个断言由 $(*)$ 和 4.3 得到. 对于第二个断言, 由于 X/S 满足 E, 存在 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}'(X/S, \mathcal{N}).$$

因此,

$$\begin{aligned} &\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}) \\ &\quad \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{M}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(X)/S, \mathcal{N}). \end{aligned}$$

现在由注 4.1.1.2a 即得断言.

4.3.2.

沿这一方向继续讨论之前, 先更仔细地考察 Y, $\underline{\mathrm{Lie}}(Y/S)$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}'(Y/S)$ 之间的关系. 首先,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) = \mathbf{W}(\mathcal{M}), \qquad (1)$$

其中 $\mathbf{W}(\mathcal{M})$ 的定义见 I 4.6. 因此有典范同构

$$d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S). \qquad (2)$$

[62] 编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.5.1 中用到.

[63] 编者注: 比较编者注 (61). 最后一句话及其证明也是增补内容.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个 $S_2 \to S_1 \to S$, 有一个双同态

$$\begin{cases} F(S_1) \longrightarrow F(S_2), \\ \mathcal{O}(S_1) \longrightarrow \mathcal{O}(S_2), \end{cases} \tag{3}$$

因而有 $\mathcal{O}(S_2)$-模态射

$$F(S_1) \otimes_{\mathcal{O}(S_1)} \mathcal{O}(S_2) \longrightarrow F(S_2).$$

64

特别地, 取 $S_1 = S'$ 与 $S_2 = I_{S'}(\mathcal{M})$. 得到关于 $\mathcal{M}$ 函子性的 $\mathcal{O}(S')$-模态射

$$F(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M})(S') \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M})(S').$$

令 S' 改变, 这些态射给出 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M}), \tag{4}$$

它们关于 $\mathcal{M}$ 是函子性的. 由与切丛到底的投影的相容性, 继而得到态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}), \tag{5}$$

且下图交换.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) & \longrightarrow & F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}) & \longrightarrow & T'_{F/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

图 27: 分裂切序列中的态射 (4) 与 (5).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 31 页; 合卷第 89 页; 印刷页码 79.

态射 (5) 可视为交换 S-群态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S, \mathcal{M}). \tag{6}$$

将 F 与同构 $d : \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S)$ 作张量积, 当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S$ 时, 得到交换 S-群态射

$$F \xrightarrow{\sim} F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F/S), \tag{7}$$

也记为 $d : F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$.

注 4.3.3.

当 F/S 满足 E 时, 如果两端均配备由条件 E 从 $\mathcal{M}$ 得到的模结构, 则态射 (6) 和 (7) 未必是 $\mathcal{O}_S$-线性的.

例如, 设 k 是特征为 $p > 0$ 的域, $S = \mathrm{Spec}(k)$, 并设 F 是如下 $\mathcal{O}_S$-模: 它把每个 S-概形 T 对应到集合 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 标量通过 p 次幂作用:

$$r \cdot f = r^p f \qquad (r \in \mathcal{O}(T),\ f \in F(T)).$$

作为取值于群的 S-函子, $F \simeq \mathbf{G}_{a,S}$. 因此 F 满足 E, 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{G}_{a,S}/S) \simeq \mathcal{O}_S$. 对每个 $T \to S$, 典范态射 $d : F(T) \to \mathcal{O}(T)$ 是恒等映射: 它保持交换群结构, 但不保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. [65]

[64]编者注: 这里将 $S' \to S$ 换成 $S_2 \to S_1 \to S$, 因为下文需要同时改变 S_2 和 S_1. 下文还对原文作了扩充.

[65]编者注: 原文断言, 当 F/S 满足 E 时, (6) 以及由此得到的 (7) 都是 $\mathcal{O}_S$-模态射. 6.3 中的反例与此矛盾. 因此删去了这一断言, 插入了前面的例子, 并相应修改了定义 4.4. 这不影响后续内容.

注 4.3.4.

态射 (4) 与 (5) 可明确写成如下形式. 态射

$$\Theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) \longrightarrow T'_{F/S}(\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Hom}}_S(I_S(\mathcal{M}), F)$$

对 $S' \to S$, $\alpha \in \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M}))$ 和 $f : S' \to F$, 由下式定义:

$$\Theta(f \otimes \alpha) = \alpha \cdot (\tau_0 \circ f) = \alpha \cdot (f \circ \rho),$$

其中 $\tau_0 : F \to T'_{F/S}(\mathcal{M})$ 是零截面, $\rho : I_{S'}(\mathcal{M}) \to S'$ 是结构态射.

态射 Θ 诱导

$$\theta : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}).$$

这由 (4) 之后指出的关于 $\mathcal{M}$ 的函子性得出, 也可以直接看出. 事实上,

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M})(S') = \{\, \varphi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{M}), F) \mid \varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e \,\},$$

其中 $e : S' \to F$ 是单位截面. 另一方面, $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M})(S')$ 等于 $\Gamma(S', \mathcal{M})$, 后者是增广映射

$$\eta : \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) \longrightarrow \mathcal{O}(S').$$

的核. 还需说明, 若 $f \in F(S')$ 且 $\alpha \in \Gamma(S', \mathcal{M})$, 则 $\alpha \cdot (f \circ \rho) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e$.

对 S-态射 $\varepsilon_{\mathcal{M}} : S' \to I_{S'}(\mathcal{M})$ 应用双同态 (3), 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} F(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{F(\varepsilon_{\mathcal{M}})} & F(S') \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \eta(\alpha)} \\ F(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{F(\varepsilon_{\mathcal{M}})} & F(S') \end{array} .$$

图 28: 标量作用与 $F(\varepsilon_{\mathcal{M}})$ 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 32 页; 合卷第 90 页; 印刷页码 80.

于是, 对每个 $\varphi : I_{S'}(\mathcal{M}) \to F$,

$$(\alpha \cdot \varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = \eta(\alpha) \cdot (\varphi \circ \varepsilon_{\mathcal{M}}),$$

因此当 $\eta(\alpha) = 0$ 时, $(\alpha \cdot \varphi) \circ \varepsilon_{\mathcal{M}} = e$.

特别地, 取 $\mathcal{M} = t\mathcal{O}_S$, 有 $\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S) = t\mathcal{O}_S$, 而态射 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S)$ 为 $f \mapsto t \cdot (f \circ \rho)$. [66]

注 4.3.5.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模, 置

$$E = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F),$$

并以 d_F 和 d_E 表示 4.3.2(5) 给出的 $\mathcal{O}_S$-线性态射:

$$d_F : F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S, \mathcal{M}),$$
$$d_E : E \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S, \mathcal{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}'(E/S, \mathcal{M}).$$

注 4.3.4 给出下列由 $\mathcal{O}_S$-线性态射组成的交换图.

[66] 编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.6.2 中用到.

$$\begin{array}{ccc} E\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) & \xrightarrow{\quad d_E\quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(E/S,\mathcal{M}) \\ \| & & \sim\uparrow(*) \\ \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})) & \xrightarrow{d_F} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})) \end{array}$$

图 29: d_E 与 d_F 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 32 页; 合卷第 90 页; 印刷页码 80.

右边的竖直箭头是 4.3 的同构 $(*)$. 因此, 由该结果可知, 若 F/S 满足 E, 则 E/S 满足 E, 而当右端各项配备由 E 得到的模结构时, $(*)$ 也是 $\mathcal{O}_S$-模同构. [67]

注 4.4.0.

在 4.3.2 中, 态射 (4) 为同构当且仅当态射 (5) 为同构. 若这些等价条件成立, 则 F/S 满足 E. 事实上, 只需验证

$$\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N})\simeq\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{N}).$$

在假设下, 以下交换图中的水平箭头都是同构.

$$\begin{array}{ccc} F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) \\ \downarrow\wr & & \downarrow \\ F\otimes_{\mathcal{O}_S}(\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{N})) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})\times_S\underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{N}) \end{array};$$

图 30: 用于验证条件 E 的直和比较.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 组件内第 33 页; 合卷第 91 页; 印刷页码 81.

所以第二个竖直箭头也是同构, 这恰好就是 F/S 的条件 E. [68]

定义 4.4.

若态射

$$F\otimes_{\mathcal{O}_S}T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M})\longrightarrow T_{F/S}(\mathcal{M}),$$

或等价地, 态射

$$F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}),$$

是交换 S-群的同构 (从而 F/S 满足 (E)), 且它们还保持由条件 E 得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构, 则称 $\mathcal{O}_S$-模 F 为*良模 (good module)*.

推论 4.4.1.

设 F 是 $\mathcal{O}_S$-模, 考虑以下条件: [69]

(i) F 是良 $\mathcal{O}_S$-模;

(ii) F/S 满足 E, 且 $d:F\to\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$-模同构;

[67]编者注: 此注为增补内容; 它将在 4.5 和 4.7 中用到.
[68]编者注: 鉴于定义 4.4 所作的修改 (参见编者注 (65)), 此处插入了这条注; 它原先出现在 4.4.1 的证明中.
[69]编者注: 原文证明了 (i) 推出 (ii) 和 (iii); 此处增添了 (ii) 推出 (i) 的证明.

(iii) $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})$.

则

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iii)}.$$

证明. 蕴含关系 (i) ⇒ (ii) 由定义得到. 为证明 (ii) ⇒ (i), 还需说明关于 $\mathcal{M}$ 函子性的交换 S-群态射

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M})$$

是 $\mathcal{O}_S$-模同构. 由于 F/S 满足 E, 两端都将 $\mathcal{O}_S$ 的有限个副本的直和变成交换 S-群的有限积. 因此, 归结到 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S$ 的情形, 而这恰好就是假设.

最后, (i) ⇒ (iii) 由定义以及 4.3.2(5) 的同构

$$F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M})$$

为 $\mathcal{O}_S$-线性这一事实得出.

例 4.4.2.

对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, I 4.6 中定义的 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ 和 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$ 都是良模.

事实上, 对每个 $f : S' \to S$, 态射

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) &\longrightarrow T_{\mathbf{V}(\mathcal{E})/S}(\mathcal{M})(S'),\\ \mathbf{W}(\mathcal{E})(S') \otimes_{\mathcal{O}(S')} \mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) &\longrightarrow T_{\mathbf{W}(\mathcal{E})/S}(\mathcal{M})(S')\end{aligned}$$

分别对应于

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}\big(f^*(\mathcal{E}),\mathcal{O}_{S'}\big) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma\big(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big)\\ &\qquad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}\big(f^*(\mathcal{E}), D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big) \qquad \text{(V)}\\ &\Gamma\big(S', f^*(\mathcal{E})\big) \otimes_{\mathcal{O}(S')} \Gamma\big(S', D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big)\\ &\qquad\longrightarrow \Gamma\big(S', f^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})\big) \qquad \text{(W)}.\end{aligned}$$

它们是同构, 因为作为 $\mathcal{O}_{S'}$-模, $D_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathcal{M})$ 同构于 $\mathcal{O}_{S'}$ 的有限个副本的直和. [70]

命题 4.5. *设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 则:*

(i) S-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 满足条件 (E), 且有函子性同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S,\mathcal{M}\big) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(F, \underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M})\big),$$

它保持由条件 (E) 得到的 $\mathcal{O}_S$-模结构. 特别地, 有 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

(ii)[71] *此外, $\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.*

事实上, 由 4.4.1, F/S 满足 (E), 且

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}'(F/S,\mathcal{M}) \simeq F \otimes_{\mathcal{O}_S} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S,\mathcal{M}). \tag{1}$$

现在由 4.3.1 即得断言 (i). 置 $E = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$. 由 (1) 和 注 4.3.5, 有如下由交换 S-群态射组成的交换图.

[70]编者注: 前面的证明是增补内容.

[71]编者注: (ii) 项是前面内容的直接推论, 为本版新增.

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M}) & \xrightarrow{d_E} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S,\mathcal{M}) \\
\| & & \sim\uparrow(*) \\
\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,F\otimes_{\mathcal{O}_S}\underline{\mathrm{Lie}}(\mathcal{O}_S/S,\mathcal{M})) & \xrightarrow{d_F} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(F,\underline{\mathrm{Lie}}(F/S,\mathcal{M}))
\end{array}$$

图 31: 微分 d_E 的比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 34 页; 合订本第 92 页; 印刷页码 82.

这里 d_F 和竖直同构 $(*)$ 都是 $\mathcal{O}_S$-模同构; 因而 d_E 也是. 这就证明了 (ii).

附论 4.5.1. [72] 置 (参见 2.1) $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$, 其中 $t^2=0$, 并设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个 $S'\to S$, 态射

$$F(S')\oplus tF(S')=F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'})\longrightarrow F(I_{S'})=F(S')\oplus\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S'),$$

在 $F(S')$ 上为恒等, 因而导出 $\mathcal{O}(S')$-模同构

$$tF(S')\xrightarrow{\sim}\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)(S').$$

当 S' 变动时, 这给出一个同构, 可写为

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)\simeq tF.$$

因此, 对每个 $S'\to S$, 命题 4.5 给出一个交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'},tF_{S'}) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\,(S') \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}}) & = & T_{\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S}(S')
\end{array}$$

图 32: 对偶数上的自同态与自同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 35 页; 合订本第 93 页; 印刷页码 83.

由 4.3 bis 可知, 每个

$$X\in\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$$

对应于 $\mathrm{id}+tX\in\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$.

定义 4.6. 取值于群的 S-函子 G 称为*良好的 (good)*, 若 G/S 满足条件 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.

[73] 注意, 若 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 则它是良好 S-群: 事实上, F/S 满足 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)\simeq F$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模.

例 4.6.1. *若 G 可表, 则它是良好的. 事实上, G/S 满足 (E), 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 形如 $V(E)$, 因而由 4.4.2 可知它是良模.*

引理 4.6.2. [74] *设 G 是取值于群的 S-函子, 且 G/S 满足 (E), 并置 $F=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. 则 F 满足 (E), 且交换群态射*

$$d:F\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$$

[72]编者注: 此附论隐含于原文, 为在 4.7.1 中使用而补出. 这里及下文中的 t,t' 等表示平方为零的变量; 字母 ε 专用于群的单位截面.

[73]编者注: 下面这句话是新增的.

[74]编者注: 此引理是新增的.

保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. 因此, G 是良好的当且仅当 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是双射.

证明. 假设 G/S 满足 (E). 设 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_S$-模, 记

$$F(\mathcal{N}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathcal{N}),$$

并用 e 表示 G 的单位截面. 对每个 $S' \to S$,

$$F(\mathcal{N})(S') = \{g \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{N}), G) \mid g \circ \varepsilon_{\mathcal{N}} = e\}.$$

此外, $\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M})(S')$ 与如下态射所成的集合等同:

$$\left\{\Phi \in \mathrm{Hom}_S(I_{S'}(\mathcal{N}) \times_{S'} I_{S'}(\mathcal{M}), G) \;\middle|\; \begin{array}{l}\Phi \circ (\varepsilon_{\mathcal{N}} \times \mathrm{id}_{I_{S'}(\mathcal{M})}) = e \in G(I_{S'}(\mathcal{M})),\\ \Phi \circ (\mathrm{id}_{I_{S'}(\mathcal{N})} \times \varepsilon_{\mathcal{M}}) = e \in G(I_{S'}(\mathcal{N})).\end{array}\right\}.$$

这就证明了

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M})/S,\mathcal{N}). \tag{1}$$

由于 G/S 满足 (E), 可知

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2) &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2)/S,\mathcal{N})\\ &\simeq \underline{\mathrm{Lie}}((F(\mathcal{M}_1) \times_S F(\mathcal{M}_2))/S,\mathcal{N}).\end{aligned}$$

由 3.8, 最后一项同构于

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_1)/S,\mathcal{N}) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{M}_2)/S,\mathcal{N})\\ &\quad\simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_2).\end{aligned}$$

因而

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_1) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S,\mathcal{M}_2), \tag{2}$$

所以由注 4.1.1.2(a) 可知, $F(\mathcal{N})/S$ 满足 (E).

还须证明交换群态射

$$d : F(\mathcal{N}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S)$$

保持 $\mathcal{O}_S$-模结构. 考虑自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{M} = t\mathcal{O}_S$. 则

$$\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) = \mathcal{O}(S')[t]/(t^2) = \mathcal{O}(S') \oplus t\mathcal{O}(S'), \qquad \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_S/S) \simeq t\mathcal{O}_S.$$

设 $\rho_t : I_S(\mathcal{M}) \to S$ 是结构态射, 它对应于单射

$$u_t : \mathcal{O}_S \hookrightarrow D_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{M}) = \mathcal{O}_S \oplus t\mathcal{O}_S.$$

回忆 (参见 3.4.2), 对每个 S-函子 X, $F(\mathcal{N})(X)$ 是满足 $\phi \circ \varepsilon_{\mathcal{N}} = e$ 的 S-态射 $\phi : I_X(\mathcal{N}) \to G$ 所成的集合, 而 $a \in \mathcal{O}(X)$ 的作用为

$$a \cdot \phi = \phi \circ a^*,$$

其中 a^* 是与 a 相应的 $I_X(\mathcal{N})$ 的自同态; 见 2.1.3.

因此, 由 4.3.4, 复合

$$d : F(\mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} F(\mathcal{N}) \otimes_{\mathcal{O}_S} t\mathcal{O}_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(F(\mathcal{N})/S)$$

对 $S' \to S$ 和 $f \in \mathrm{Hom}_S(S', F(\mathcal{N}))$ 由下式给出:

$$f \longmapsto f \otimes t \longmapsto t \cdot (f \circ \rho_t) = f \circ \rho_t \circ t^*.$$

这里 $f\circ\rho_t\in F(\mathcal{N})(I_{S'}(\mathcal{M}))$ 看作满足 $\phi\circ\varepsilon_{\mathcal{N}}=e$ 的 S-态射

$$\phi : I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) \longrightarrow G$$

我们必须证明 d 是 $\mathcal{O}_S$-线性的, 等价地,

$$d(a\cdot f)=u_t(a)\cdot d(f)\qquad (a\in\mathcal{O}(S')).$$

将 $f\in F(\mathcal{N})(S')$ 看作态射 $I_{S'}(\mathcal{N})\to G$, 同样有 $a\cdot f=f\circ a^*$. $\mathcal{O}(X)$ 在 $I_X(\mathcal{N})$ 上的作用关于 X 的函子性给出如下交换图.

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(\mathcal{N}) & \xrightarrow{\quad a^*\quad} & I_{S'}(\mathcal{N}) \\ {\scriptstyle\rho_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_t} \\ I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) & \xrightarrow{\ w_t(a)^*\ } & I_{I_{S'}(\mathcal{M})}(\mathcal{N}) \end{array}$$

图 33: 标量作用与结构态射 ρ_t 的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 36 页; 合订本第 94 页; 印刷页码 84.

所以

$$\begin{aligned} d(a\cdot f) &= f\circ a^*\circ\rho_t\circ t^* \\ &= f\circ\rho_t\circ u_t(a)^*\circ t^* \\ &= f\circ\rho_t\circ t^*\circ u_t(a)^* = u_t(a)\cdot d(f). \end{aligned}$$

倒数第二个等号由 $\mathcal{O}$ 的交换性得到. 这就完成了 引理 4.6.2 的证明.

定理 4.7. *若 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 则 S-群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-}mod.}(F)$ 是良好的.*

[75] 事实上, 由 4.5, $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S$ 满足 (E), 而

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big)\simeq\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$$

是良 $\mathcal{O}_S$-模.

4.7.1.

[76] 设 G 是 S-群, F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 假定给定了 G 在 F 中的一个线性表示, 即 (I 4.7.1) 一个 S-群态射

$$\rho : G\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

若 G/S 满足 (E), 则 4.1.C 和 4.5 给出一个 $\mathcal{O}_S$-模态射, 记为 ρ' 或 $d\rho$,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\longrightarrow\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S\big)\simeq\underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

[77] 此外, 置 $\mathcal{O}_{I_S}=\mathcal{O}_S\oplus t\mathcal{O}_S$, 其中 $t^2=0$. 由 4.5.1 可知, 若 $S'\to S$ 且

$$X\in\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')\subset G(I_{S'}),$$

则在 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{I_{S'}}\text{-mod.}}(F_{I_{S'}})$ 中有

$$\rho(X)=\mathrm{id}+t\rho'(X). \qquad (*)$$

[75]编者注: 这里利用 4.3.1 和 4.5 中增加的内容简化了原文.
[76]编者注: 编号 4.7.1, 4.7.2 和 4.7.3 是新增的.
[77]编者注: 下面这句话是新增的.

换言之, 对每个 $S'' \to I_{S'}$ 和 $f \in F(S'')$,

$$\rho(X)(f) = f + t\rho'(X)(f) \quad \text{于} F(S'').$$

定义 4.7.2. 设 G 是良好 S-群. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模, 且有 S-群态射

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\big).$$

由 4.7.1, 它导出一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathrm{ad} : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)\big),$$

等价地, 一个 $\mathcal{O}_S$-双线性态射

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \times_S \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S), \qquad (x, y) \longmapsto [x, y] = \mathrm{ad}(x) \cdot y.$$

这里 x, y 是

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S').$$

中的任意元素. 若 G 交换, 则 $[x, y] = 0$.

4.7.3.

括号运算还有如下等价描述. 只需考虑 S 上的截面, 即

$$x, y \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S).$$

有典范同构 $I_S \times_S I_S \simeq I_{I_S}$. 为避免混淆, 用 I 和 I' 表示 I_S 的两个副本, 并置

$$\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t], \qquad \mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t'], \qquad t^2 = 0 = (t')^2.$$

于是有交换方块

$$\begin{array}{ccc} I \times_S I' & \longrightarrow & I' \\ \downarrow & & \downarrow \\ I & \longrightarrow & S \end{array}$$

图 34: $I \times_S I'$ 上的两个对偶数结构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 37 页; 合订本第 95 页; 印刷页码 85.

其中从 $I \times I'$ 出发的两个箭头分别将其与 I 上或 I' 上的对偶数概形等同. 记 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 得到如下群的交换图.

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L(I') & \longrightarrow & G(I \times I') & \longrightarrow & G(I') & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & L(S) & \longrightarrow & G(I) & \longrightarrow & G(S) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 1 & & 1 & & 1 & & \end{array}$$

图 35: 用于构造括号运算的第一个正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 38 页; 合订本第 96 页; 印刷页码 86.

此图中的第九个对象是 $\underline{\mathrm{Lie}}(L/S)(S)$. 若 G 是良好的, 它就是 $L(S)$, 因而得到下一个交换图. 其行和列都是群的正合列; 记为 $L(-)$ 的五个群都是交换的. [78] 在等同

$$L(I) = L(S) \oplus tL(S), \qquad L(I') = L(S) \oplus t'L(S),$$

之下, 单射 $L(S) \hookrightarrow L(I)$ 和 $L(S) \hookrightarrow L(I')$ 分别为 $u \mapsto tu$ 和 $u \mapsto t'u$.




图 36: 定义 $[x, y]$ 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 38 页; 合订本第 96 页; 印刷页码 86.

在这样的图中, 如图取 x, y, 并任取 x 的提升 $\widetilde{x} \in L(I)$ 和 y 的提升 $y' \in L(I')$. 换位子

$$\widetilde{x}\, y'\, \widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} \quad \text{于} G(I \times I')$$

与所选提升无关, 并且如图所示, 它是一个唯一确定的元素 z 的像. 有 $z = [x, y]$. [79]

事实上, 对 x 和 y 在典范截面 $L(S) \to L(I)$ 和 $L(S) \to L(I')$ 下的像仍用相同的字母表示. 则

$$\widetilde{x} = xu, \qquad y' = yv, \qquad u, v \in L(S) = L(I) \cap L(I').$$

由于 $L(I)$ 和 $L(I')$ 交换,

$$\begin{aligned} \widetilde{x}\, y'\, \widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} &= xuyvu^{-1}x^{-1}v^{-1}y^{-1} \\ &= xuyu^{-1}vx^{-1}v^{-1}y^{-1} \\ &= xyx^{-1}y^{-1}. \end{aligned}$$

此元素在 $G(I)$ 和 $G(I')$ 中的像都是单位元, 因此来自上面所示的唯一的 z. 最后, 将 y 看成 $L_{I'}(I')$ 的元素, 并将 x 看成 $L(S) \subset G(I')$ 的元素, 则 公式 4.7.1 $(*)$ 给出

$$xyx^{-1} = \mathrm{Ad}(x)(y) = (\mathrm{id} + t' \,\mathrm{ad}(x))(y) = y + t'[x, y].$$

所以 $xyx^{-1}y^{-1} \in L(I')$ 是 $z = [x, y] \in L(S)$ 的像.

从这一构造现在可清楚看出两个性质:

(i) 括号运算关于 G 是函子性的. 更确切地说,

$$G \longmapsto \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$$

是从良好 S-群到带有一个 $\mathcal{O}_S$-双线性合成律的良 $\mathcal{O}_S$-模的函子;

(ii) $[x, y] + [y, x] = 0$, 因为此图关于其主对角线对称. [80]

---

[78]编者注: 下面扩充了原文.

[79]编者注: 原文的一条脚注说, 作者应 Gabriel 的要求承认, 这个习题并非显然, 而这也正是没有将它放入正文的原因. 这里考虑了 4.7.1 中的增补, 给出了细节; 另见 [DG70], §II.4, 4.2.

[80]编者注: 即 x 和 y 的地位对称. $[y, x]$ 在 $G(I \times I')$ 中的像是换位子 $y'\widetilde{x}(y')^{-1}\widetilde{x}^{-1}$, 它是 $\widetilde{x}y'\widetilde{x}^{-1}(y')^{-1} = [x, y]$ 的逆元. 另一方面 (参见下面的 4.10), 此时尚不知道是否必有 $[x, x] = 0$: 若 x 由 $\widetilde{x} \in L(I)$ 及 $x' \in L(I')$ 表示, 则先验地并不清楚 $\widetilde{x}$ 和 x' 是否交换.

命题 4.8. *设 F 是良 $\mathcal{O}_S$-模. 在等同*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F),$$

之下, 有

$$\mathrm{Ad}(g)\cdot Y = g\circ Y\circ g^{-1}, \qquad [X,Y] = X\circ Y - Y\circ X,$$

其中 $S'\to S$, $g\in \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'})$ 以及

$$X, Y \in \underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)/S)\,(S') = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_{S'}\text{-mod.}}(F_{S'}).$$

都是任意的.

证明.[81] 作基变换后, 可假设 $S'=S$. 置 $I=I_S$ 及 $\mathcal{O}_I=\mathcal{O}_S[t]$, 其中 $t^2=0$. 回忆 4.5.1 中的包含映射

$$i : \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F) \hookrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_I\text{-mod.}}(F_I)$$

将 Y 映到 $\mathrm{id}+tY$. 由 4.1.A 中 $\mathrm{Ad}(g)$ 的定义,

$$\mathrm{id} + t\,\mathrm{Ad}(g)(Y) = g\circ(\mathrm{id}+tY)\circ g^{-1} = \mathrm{id} + t(g\circ Y\circ g^{-1}),$$

因而 $\mathrm{Ad}(g)(Y) = g\circ Y\circ g^{-1}$.

设 I' 是 I_S 的第二个副本, 并置 $\mathcal{O}_{I'}=\mathcal{O}_S[t']$, 其中 $(t')^2=0$. 将 4.7.3 应用于

$$G = \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F), \qquad L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F).$$

这里 $L=\mathrm{End}(F)$ 是 命题 4.5 中的微分等同. 重版本在此处印作 $\mathrm{Aut}(F)$, 但 $\mathrm{End}(F)$ 才是下文自同态计算所用的类型正确的对象. 将 X 与其在典范截面 $L(S)\hookrightarrow L(I)$ 下的像等同. 它在 $G(I\times I')$ 中的像是 $\mathrm{id}+t'X$, 其逆元为 $\mathrm{id}-t'X$. 同样, Y 提升为 $\mathrm{id}+tY$, 其逆元为 $\mathrm{id}-tY$. 它们的换位子为

$$\begin{aligned}(\mathrm{id}+t'X)\circ(\mathrm{id}+tY)\circ(\mathrm{id}-t'X)\circ(\mathrm{id}-tY)\\ = \mathrm{id} + tt'(X\circ Y - Y\circ X).\end{aligned}$$

这是 $Z = X\circ Y - Y\circ X \in L(S)$ 在 $G(I\times I')$ 中的像: 首先 Z 映到 $tZ\in L(I)$, 再映到 $\mathrm{id}+t'tZ\in G(I\times I')$. 由 4.7.3, $[X,Y]=X\circ Y-Y\circ X$.

推论 4.8.1. *设 G 是良好 S-群, 且 $x,y,z\in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S')$. 则*

$$[x,[y,z]] + [y,[z,x]] + [z,[x,y]] = 0.$$

[82] 事实上, 由于 G 是良好的, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是良 $\mathcal{O}_S$-模; 因此 定理 4.7 表明

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$$

是良好 S-群. 态射

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S))$$

与 4.7.3(i) 中的函子性给出

$$\mathrm{ad}[x,y] = [\mathrm{ad}\,x, \mathrm{ad}\,y].$$

结合 命题 4.8, 得到

$$\mathrm{ad}[x,y] = \mathrm{ad}\,x\circ\mathrm{ad}\,y - \mathrm{ad}\,y\circ\mathrm{ad}\,x.$$

将两端作用于 z, 就得到 Jacobi 恒等式.

[81] 编者注: 下面扩充并简化了原文.
[82] 编者注: 下面扩充了原文.

推论 4.8.2. *设良好 S-群 G 线性作用于良 $\mathcal{O}_S$-模 F; 等价地, 设 F 是 G-$\mathcal{O}_S$-模, 且 G 和 F 分别是良好群和良模. 则线性映射*

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$$

是一个表示; 即

$$\rho'([x,y]) = \rho'(x)\circ\rho'(y) - \rho'(y)\circ\rho'(x).$$

附论 4.9. 对每个良好 S-群 G (例如每个可表的群), 我们已函子性地配给一个良 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 它带有满足

$$[x,y]+[y,x]=0, \qquad [x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0.$$

的双线性映射. 我们将带有这一结构的 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 称为 G 在 S 上的 *Lie 代数*. 这里需要加以限定: 尚不知道它是否是严格意义下的 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数. [83] G 在良 $\mathcal{O}_S$-模 F 中的每个线性表示都导出其 Lie 代数的一个表示. 特别地, G 的伴随表示导出其 Lie 代数的伴随表示.

定义 4.10. 取值于群的 S-函子 G 称为*甚好的 (very good)*, 若它是良好的, 且 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 是 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数, 即恒有 $[x,x]=0$.

例 4.10.1. 下列 S-群是甚好的: 每个良 $\mathcal{O}_S$-模 F 的 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod.}}(F)$ (由 4.7 和 4.8); 每个可表的群 (将在下面证明); 每个容许到某个甚好 S-群的单态射的良好 S-群, 特别是可表群的每个良好子群函子; 以及每个在良 $\mathcal{O}_S$-模中容许忠实线性表示的良好 S-群, 例如每个 Ad 为单态射的良好 S-群.

4.11.

现在假设 G 是 S 上的群概形. 由 4.1.4, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S)$ 与 G/S 的在右平移下不变的无穷小自同构所成的群等同; 由 3.14, 它就是 $\mathcal{O}_G$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的在右平移下不变的导子所成的群. 此等同保持模结构, 并且是 Lie 代数的反同构. [84]

为说明这一点, 如 4.7.3 中那样论证. 置

$$\mathcal{O}_I = \mathcal{O}_S[t], \qquad \mathcal{O}_{I'} = \mathcal{O}_S[t'], \qquad t^2 = 0 = (t')^2,$$

并取 $x \in L(I)$, $y \in L(I')$, 其中 $L = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$. 左平移 λ_x, 分别地, λ_y, 是 $G_{I\times I'}$ 的 S-自同构, 它在 $G_{I'}$, 分别地, 在 G_I 上诱导恒等. 它对应于

$$\mathcal{O}_{G_{I\times I'}} = \mathcal{O}_G[t,t']/(t^2,(t')^2),$$

的 $\mathcal{O}_S$-自同构

$$u = \mathrm{id} + t\,d_x, \qquad \text{分别地} \qquad v = \mathrm{id} + t'\,d_y$$

其中 d_x, d_y 是 $\mathcal{O}_G$ 的在右平移下不变的 $\mathcal{O}_S$-导子. $G_{I\times I'}$ 的 S-自同构与 $\mathcal{O}_{G_{I\times I'}}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同构之间的对应是反变的. 因此

$$\lambda_x\lambda_y\lambda_x^{-1}\lambda_y^{-1}$$

对应于

$$v^{-1}u^{-1}vu = \mathrm{id} + tt'(d_yd_x - d_xd_y).$$

由 4.7.3 可知,

$$x \longmapsto -d_x$$

[83] 编者注: 未解决的一点是是否有 $[x,x]=0$; 见 4.10.

[84] 编者注: 这里改正了原文的一个符号错误; 参见 [DG70], §II.4, 4.4 和 4.6.

是 Lie 代数同构; 更多细节见 [DG70], §II.4, 4.4 和 4.6. 对每个 $S' \to S$, 同一论证也适用于

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \underline{\mathrm{Lie}}(G_{S'}/S')(S')$$

于是重新得到了经典定义. [85]

附论 4.11.1. *通过同构 $x \mapsto -d_x$, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 与如下函子等同: 它将每个 $S' \to S$ 映到 $G_{S'}$ 相对于 S' 的在右平移下不变的导子所成的 $\mathcal{O}(S')$-Lie 代数.*

由 4.6.1, 已知每个可表的群是良好的, 因此前面的讨论给出:

推论 4.11.2. *每个可表的群都是甚好的.*

设 $\varepsilon : S \to G$ 是 G 的单位截面, 并置

$$\omega^1_{G/S} = \varepsilon^*(\Omega^1_{G/S}).$$

回忆 3.3, $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 由向量纤维化 $V(\omega^1_{G/S})$ 表示.

附论 4.11.3. *因此, 对每个 S-群概形 G, 我们已函子性地配给一个 S 上的向量纤维化*

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S})$$

它表示函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 从而带有取值于 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数的 S-概形结构. 此外, 此构造与基扩张及有限积可交换 (参见 3.4 和 3.8).

注 4.11.4. [86] 设 $\pi : G \to S$ 是结构态射.

(a) $\mathcal{O}_G$-模 $\Omega^1_{G/S}$ 自然地是 $(G \times_S G)$-等变的 (参见 I, §6). 因而由 I 6.8.1,

$$\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S}).$$

例如, 若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由, 分别地, 局部自由且为有限型, 则 $\Omega^1_{G/S}$ 也如此. 特别地, 当 S 是域的谱, 分别地, 当 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型时, 就有这种情形.

(b) 由 I 6.8.2, $\omega^1_{G/S}$ 有典范的 G-$\mathcal{O}_S$-模结构, 它导出

$$V(\omega^1_{G/S}) = \mathrm{Lie}(G/S).$$

上的伴随作用. [87]

(c) 由 EGA I, 5.3.11 和 5.4.6, $\varepsilon : S \to G$ 是浸入; 若 G 在 S 上分离, 则它是闭浸入. 因此, $\omega^1_{G/S}$ 与 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 等同, 其中 $\mathcal{I}$ 是在某个开子概形 $U \subset G$ 中定义 $\varepsilon(S)$ 的拟凝聚理想, 并且 $\varepsilon(S)$ 在其中闭. 若 $G \to S$ 分离, 则可取 $U = G$. 若 $G = \mathrm{Spec}\, A(G)$ 在 S 上仿射, 则 $\mathcal{I}$ 是 $A(G)$ 的增广理想, 即

$$\varepsilon^\natural : A(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

的核 (参见 I 4.2). [88]

注 4.11.5. 同构 $\Omega^1_{G/S} \simeq \pi^*(\omega^1_{G/S})$ 将 $\mathcal{O}_S$-模 $\omega^1_{G/S}$ 与 G 相对于 S 的在右平移下不变的微分所成的层

$$\pi_*(\Omega^1_{G/S})^G$$

---

[85]编者注: 下面扩充了原文. 特别是为便于后文引用, 新增了编号 4.11.1–4.11.8.

[86]编者注: 下面的内容考虑了第 I 篇 §6.8 中的增补而作了扩充.

[87]编者注: 因此, G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的线性作用可称为前伴随作用; 由于术语的滥用, 我们仍称它为伴随作用. 第 III 篇 (特别是 III 0.8) 中使用的一个稍一般的构造如下. 假定对每个 $Y \to S$, 配给一个 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}(Y)$, 并对每个 S-态射 $\phi : Z \to Y$, 函子性地配给一个 $\mathcal{O}_Z$-模态射 $\mathcal{N}(\phi) : \phi^*\mathcal{N}(Y) \to \mathcal{N}(Z)$. 例如, 若 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_S$ 的一个拟凝聚理想, 则可取 $\mathcal{N}(Y) = \mathcal{J}\mathcal{O}_Y$. G 在 $\omega^1_{G/S}$ 上的作用便导出 G 在一个取值于交换群的 S-函子上的广义伴随作用, 该函子将 $f : Y \to S$ 映到群 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(f^*\omega^1_{G/S}, \mathcal{N}(Y))$.

[88]编者注: 前面关于 $\omega^1_{G/S}$ 的描述是新增的, 将在后文用到 (例如 $\mathrm{VII_A}$, 5.5).

等同: 它在开集 $U \subset S$ 上的截面就是 $\Omega^1_{G/S}$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上的在右平移下不变的截面 (参见 I 6.8.3; 亦可比较 VII_A, 2.4). [89]

记号 4.11.6. 用 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 表示向量纤维化 $\mathrm{Lie}(G/S) \to S$ 的截面层. 它是 $\mathcal{O}_S$-模

$$\mathscr{L}ie(G/S) = (\omega^1_{G/S})^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\omega^1_{G/S}, \mathcal{O}_S),$$

与 $\omega^1_{G/S}$ 对偶 (参见 EGA II, 1.7.9), 并且带有一个 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数结构.

一般而言, 此构造与基扩张不可交换. 因此, 此模上的 Lie 代数结构并不确定 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 上的取值于 $\mathcal{O}_S$-Lie 代数的 S-概形结构. [90]

不过:

引理 4.11.7. *假设 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由且为有限型. 特别地, 若 G 在 S 上平滑 (参见 EGA IV_4, 17.2.4), 或者若 S 是域的谱且 G 在 S 上局部有限型, 就有这种情形. 则*

$$\mathscr{L}ie(G/S)^\vee \simeq (\omega^1_{G/S})^{\vee\vee} \simeq \omega^1_{G/S},$$

从而

$$\mathrm{Lie}(G/S) = V(\omega^1_{G/S}) = V\big(\mathscr{L}ie(G/S)^\vee\big) = W\big(\mathscr{L}ie(G/S)\big),$$

其中最后一个等号由 I 4.6.5.1 得到.

最后, 设 $G \to H$ 是取值于群的函子的单态射. 则

$$\mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(H/S)$$

也是单态射 (参见 3.7). 向量纤维化之间的每个向量单态射都是闭浸入. [91] 于是得到:

推论 4.11.8. *设 $G \hookrightarrow H$ 是 S-群概形的单态射.*

(i) 态射

$$\mathrm{Lie}(G/S) \longrightarrow \mathrm{Lie}(H/S)$$

是闭浸入; 因此

$$\omega^1_{H/S} \longrightarrow \omega^1_{G/S}$$

是满态射.

(ii) 若 $\omega^1_{G/S}$ 局部自由且为有限型, 则相应的态射

$$\mathscr{L}ie(G/S) \longrightarrow \mathscr{L}ie(H/S)$$

将 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 与 $\mathscr{L}ie(H/S)$ 的一个局部为直和项的 $\mathcal{O}_S$-子模等同.

5. 若干 Lie 代数的计算

5.1. Lie 代数的例子: 可对角化群

设 $G = D_S(M)$ 为 S 上的可对角化群 (I 4.4). 由于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的形成与基扩张可交换, 只需对 $G = D(M)$ 作此构造. 此时有

$$G(I_S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}\big(M, \Gamma(I_S, \mathscr{O}_{I_S})^\times\big) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}\big(M, \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times\big).$$

[89]编者注: 下面不使用这一借助不变微分对 $\omega^1_{G/S}$ 的描述.

[90]编者注: 原因是 $\mathscr{L}ie(G/S) \simeq (\omega^1_{G/S})^\vee$ 未必确定 $\omega^1_{G/S}$. 例如, 设 $S = \mathbb{A}^1_k$, 其中 k 是域, 并设 G 是在 $s = 0$ 处的纤维为 $\mathbb{G}_{a,k}$, 而其他所有纤维均为单位群的 S-群. 则 $\mathscr{L}ie(G/S) = 0$, 但 $\mathrm{Lie}(G_s/k)(k) = k$.

[91]编者注: 设 $f : M \to N$ 是 $\mathcal{O}_S$-模态射, 并设 $P = \mathrm{Coker}(f)$. 若 $V(N) \to V(M)$ 是单态射, 则满态射 $\mathrm{Sym}(N) \to \mathrm{Sym}(P)$ 经过 $\mathcal{O}_S$ 分解; 因而 $P = 0$.

有分裂正合列

$$1 \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S) \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{D}_{\mathscr{O}_S})^\times \longrightarrow \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^\times \longrightarrow 1,$$

由此可见 $\underline{\mathrm{Lie}}(G)(S)$ 可与 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(M, \mathscr{O}(S))$ 等同, 后者赋予显然的 $\mathscr{O}(S)$-模结构. 因此, 经基变换得到:

命题 5.1. *有同构*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(M_S, \mathbf{O}_S) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S)$$

以及

$$\mathscr{H}om_{\mathrm{gr}}(\widetilde{M}_S, \mathscr{O}_S) \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S),$$

其中在第二个同构中, $\widetilde{M}_S$ 表示由 M 定义的 S 上的常群层, 而 $\mathscr{H}om_{\mathrm{gr}}$ 表示群层的同态层.

推论 5.1.1. *若 M 是有限型自由群, 或用后文的术语说, 若 $D_S(M)$ 是分裂环面, 则采用I 4.6.5 中的记号 W, 有*

$$W(\mathscr{L}ie(D_S(M)/S)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(D_S(M)/S), \qquad M^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(D_S(M)/S).$$

这里 $M^\vee$ 表示交换群 M 的对偶. 特别地,

$$\mathbf{O}_S \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{m,S}/S), \qquad \mathscr{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

5.2. 正规化子与中心化子

先证明几个引理. 回顾 (I 3.1.1), $\mathbf{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

称为*正合的*, 若对每个 $S' \to S$, 如下 $\mathbf{O}(S')$-模序列

$$0 \longrightarrow F'(S') \longrightarrow F(S') \longrightarrow F''(S') \longrightarrow 0$$

正合. 同样, S-群序列 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 称为正合的, 若对每个 $S' \to S$, 它在 S'-点上对应的群序列都正合.

引理 5.2.1. *设 $1 \to G' \to G \to G'' \to 1$ 为 S-群的正合列.* [92]

(i) *序列*

$$1 \longrightarrow T_{G'/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{G/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow T_{G''/S}(\mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

以及

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G'/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(G''/S, \mathscr{M}) \longrightarrow 1$$

正合.

(ii) *设 $1 \to H' \to H \to H'' \to 1$ 为另一个群序列. 它正合当且仅当*

$$1 \longrightarrow G' \times_S H' \longrightarrow G \times_S H \longrightarrow G'' \times_S H'' \longrightarrow 1$$

正合.

(iii) *若 G', G, G'' 中的两个满足条件 (E), 则第三个也满足条件 (E).*

(iv) *若 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 正合, 且 $\mathbf{O}_S$-模 F', F, F'' 中的两个是良模, 则第三个也是良模.*

[92]编者注: 此引理的陈述与证明作了扩充; 这将在5.3.1 中用到.

(v) *若 S-群 G', G, G'' 中的两个是良好群, 则第三个也是良好群.*

(i) 的第一部分显然成立, 第二部分由第一部分推出. 同样, (ii) 显然成立. 下面证明 (iii). 为简便起见, 记 $L(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G, \mathscr{M})$, $L'(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G', \mathscr{M})$, 并以类似方式定义 L''. 有如下交换图. [93]

$$\begin{array}{ccccccccc}
1 & \longrightarrow & L'(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & L''(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & 1 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
1 & \longrightarrow & L'(\mathcal{M})\times_S L'(\mathcal{N}) & \longrightarrow & L(\mathcal{M})\times_S L(\mathcal{N}) & \longrightarrow & L''(\mathcal{M})\times_S L''(\mathcal{N}) & \longrightarrow & 1
\end{array}$$

图 37: 用于证明引理 5.2.1(iii) 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 44 页; 合订读本第 102 页.

由 (i), 上行正合; 由 (i) 和 (ii), 下行正合. 由此得到断言 (iii).
下面证明 (iv). 有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F'\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & F''\otimes_{\mathcal{O}_S} T_{\mathcal{O}_S/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & T_{F'/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{F/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & T_{F''/S}(\mathcal{M}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

图 38: 用于证明引理 5.2.1(iv) 的正合列图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 44 页; 合订读本第 102 页.

其中各行正合: 第一行正合是因为 $T_{\mathbf{O}_S/S}(\mathscr{M})$ 是自由的, 因而是平坦的 $\mathbf{O}_S$-模; 第二行正合则由 (i) 得到. 所以, 若 F', F, F'' 中的两个是良模, 则第三个也是良模. 最后, (v) 由 (iii) 和 (iv) 推出.

引理 5.2.2. *设 G 为 S-群, E, H 为两个 G-对象, F 为 G-$\mathbf{O}_S$-模.*

(i) *典范同态 $E^G \times_S H^G \to (E \times_S H)^G$ 是同构.*

(ii) *若 F 是良 $\mathbf{O}_S$-模, 则 F^G 也是良模.*

第一个断言显然成立; 下面证明第二个断言. 对每个 $S' \to S$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
F^G(I_{S'}(\mathcal{M})) & \longrightarrow & F(I_{S'}(\mathcal{M})) \\
\varphi\downarrow & & \sim\uparrow\varphi_1 \\
F^G(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M})) & \xrightarrow{\sim} & F(S')\otimes_{\mathcal{O}(S')}\mathcal{O}(I_{S'}(\mathcal{M}))
\end{array}$$

图 39: 引理 5.2.2 证明中不变量与基变换构成的方图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 45 页; 合订读本第 103 页.

须证明 ϕ 为双射. 它显然是单射. 为证明满射性, 设 $(t_0, \ldots, t_n)$ 为自由 $\mathbf{O}(S')$-模 $\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 的一组基, 并设

$$u = \sum_{i=0}^{n} f_i \otimes t_i$$

[93]编者注: (iii) 和 (v) 的证明为新增内容.

为 $F(S')\otimes_{\mathbf{O}(S')}\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 的元素, 使得 $\phi_1(u)$ 属于 $F^G(I_{S'}(\mathscr{M}))$. 下面证明每个 f_i 都属于 $F^G(S')$.

设 $S''\to S'$. 通过零截面 $\varepsilon_{\mathscr{M}}$, 可以将 S'' 视为 $I_{S'}(\mathscr{M})$ 上的对象. 于是, 对每个 $g\in G(S'')$,

$$u_{S''}=g\cdot u_{S''}=\sum_{i=0}^{n} g\cdot(f_i)_{S''}\otimes(t_i)_{S''}.$$

由于 $(t_i)_{S''}$ 构成

$$\mathbf{O}(I_{S''}(\mathscr{M}))\simeq\mathbf{O}(I_{S'}(\mathscr{M}))\otimes_{\mathbf{O}(S')}\mathbf{O}(S'')$$

作为 $\mathbf{O}(S'')$-模的一组基, 从而有 $g\cdot(f_i)_{S''}=(f_i)_{S''}$, 故对所有 i 均有 $f_i\in F^G(S')$.

记号. 若 E 为 S-群, F 为其子 S-群, 用 E/F 表示将 $S'\to S$ 映到由陪集 $\bar{x}=xF(S')$ 组成的集合 $E(S')/F(S')$ 的 S-函子. 若 E 交换, 则 E/F 是交换 S-群. [94]

现在设 G 为 S-群, K 为其子 S-群, 并令 $E=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 及 $F=\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})$. K 在 E 上的伴随作用保持 F, 因而在 E/F 上诱导作用. 对每个 $S'\to S$,

$$\begin{aligned}(E/F)^K(S')=\{\bar{x}\in E(S')/F(S')\mid{}&\text{对每个}f:S''\to S'\text{ 及}k\in K(S''),\\ &f^*(\bar{x}^{-1})\,\mathrm{Ad}(k)(f^*(\bar{x}))\in F(S'')\},\end{aligned}$$

其中 $f^*(\bar{x})$ 表示 $\bar{x}$ 在 $E(S'')$ 中的像.

定理 5.2.3. *设 G 为 S-群, K 为其子 S-群. 令 (I 2.3.3)*

$$N=\underline{\mathrm{Norm}}_G(K),\qquad Z=\underline{\mathrm{Centr}}_G(K),$$

并让 K 通过 G 的伴随表示作用于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$.

(i) *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 的群运算交换,*[95][96] *则*

$$\frac{\underline{\mathrm{Lie}}(N/S,\mathscr{M})}{\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})}=\left(\frac{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})}{\underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})}\right)^K.$$

(ii) *若同一群运算交换, 则*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(Z/S,\mathscr{M})=\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})^K.$$

(iii) *若 G 满足 (E), 则 Z 满足 (E); 若 G 和 K 满足 (E), 则 N 满足 (E).*

(iv) *若 G 是良好群, 则 Z 是良好群; 此外, 若 G 是甚好群, 则 Z 是甚好群.*

(v) *若 G 和 K 是良好群, 则 N 是良好群; 此外, 若 G 是甚好群, 则 N 是甚好群.*

为证明 (i) 和 (ii),[97] 使用下述引理, 它由4.1.B 中考虑的正合列图, 交换 G 和 H 的角色后得到.

引理 5.2.3.0. *设 G 为 S-群, H 为其子 S-群, $\mathscr{M}$ 为有限型自由 $\mathscr{O}_S$-模. 则 $T_{H/S}(\mathscr{M})$ 和 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 是 $T_{G/S}(\mathscr{M})$ 的子 S-群, 且*

$$T_{H/S}(\mathscr{M})\cap\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})=\underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M}),$$

其中

$$T_{H/S}(\mathscr{M})\cap\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}):=T_{H/S}(\mathscr{M})\times_{T_{G/S}(\mathscr{M})}\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}).$$

---

[94]编者注: 此处的记号说明作了扩充.

[95]当 G 满足 (E) 时, 此条件自动满足, 例如当 G 可表时.

[96]编者注: 关于 S-群 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 不交换的例子, 见6.3.

[97]编者注: 此处的证明作了扩充; 特别地, 新增了原文中隐含的 引理 5.2.3.0.

由于 (i) 和 (ii) 中的函子与基扩张可交换, 只需在 S-点上证明这些等式. 令 $H = N$ (相应地, $H = Z$), 并设 $\alpha = \pm 1$. 由上述引理以及 N 和 Z 的定义 (I 2.3.3),

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M})(S) = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})(S) \subset G(I_S(\mathscr{M})) \ \mid \\ \text{对每个} f : S' \to I_S(\mathscr{M}) \text{ 及} u \in K(S'), \\ f^*(X^\alpha)\, u\, f^*(X^{-\alpha})\, u^{-1} \in K(S'), \\ \text{相应地, } f^*(X)\, u\, f^*(X^{-1})\, u^{-1} = 1\}.\end{aligned} \tag{*}$$

这里 $f^*(X)$ 表示 X 在 $G(S')$ 中的像.

为简便起见, 记

$$\mathfrak{g} = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{k} = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{n} = \underline{\mathrm{Lie}}(N/S,\mathscr{M}), \quad \mathfrak{z} = \underline{\mathrm{Lie}}(Z/S,\mathscr{M}).$$

若 $X \in \underline{\mathrm{Lie}}(H/S,\mathscr{M})(S)$, 则等式 (*) 对每个 $f : S' \to S$ 都成立, 因为 f 经由 $I_S(\mathscr{M})$ 如下分解:

$$f = \rho \circ \varepsilon_{\mathscr{M}} \circ f,$$

其中 $\rho : I_S(\mathscr{M}) \to S$ 为结构态射, $\varepsilon_{\mathscr{M}} : S \to I_S(\mathscr{M})$ 为零截面. 因此,

$$\mathfrak{n}(S)/\mathfrak{k}(S) \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S), \qquad \mathfrak{z}(S) \subset \mathfrak{g}^K(S).$$

为证明反向包含关系, 此后假设 $\mathfrak{g}$ 交换. 于是 $\mathfrak{g}^K$ 和 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是交换 S-群. 设 $X \in \mathfrak{g}(S)$, 并用 $\bar{X}$ 表示它在 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(S)$ 中的像. 假设 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ (相应地, $X \in \mathfrak{g}^K(S)$); 下面证明 $X \in \mathfrak{n}(S)$ (相应地, $X \in \mathfrak{z}(S)$).

设 $f : S' \to I_S(\mathscr{M})$. 考虑笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} I_{S'}(\mathcal{M}) & \xrightarrow{\ p\ } & I_S(\mathcal{M}) \\ {\scriptstyle\rho'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho} \\ S' & \xrightarrow[\rho\circ f]{} & S \end{array}$$

图 40: 证明反向包含关系时使用的笛卡尔方图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 47 页; 合订读本第 105 页.

并令 h 为 f 定义的 ρ' 的截面. 只需证明, 对每个 $v \in K(I_{S'}(\mathscr{M}))$, 有

$$\left.\begin{aligned} & p^*(X^\alpha)\, v\, p^*(X^{-\alpha})\, v^{-1} \in K(I_{S'}(\mathscr{M})), \\ \text{相应地} \qquad & p^*(X)\, v\, p^*(X^{-1})\, v^{-1} = 1. \end{aligned}\right\} \tag{**}$$

事实上, 取 $v = \rho'^*(u)$, 并对 (**) 应用 h^*, 即得 (*), 因为 $\rho' \circ h = \mathrm{id}_{S'}$ 且 $p \circ h = f$.

现在证明 (**), 将 $p^*(X)$ 简记为 X. 每个 $v \in K(I_{S'}(\mathscr{M}))$ 都唯一地具有形式 Yk, 其中 $Y \in \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})(S')$ 及 $k \in K(S')$. 表达式 $X^\alpha v X^{-\alpha} v^{-1}$ 变为

$$X^\alpha Y\big(kX^{-\alpha}k^{-1}\big)Y^{-1} = X^\alpha\, \mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha}),$$

这是因为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})$ 交换. 此元素属于 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S,\mathscr{M})(S')$. 由引理 5.2.3.0, 条件 (**) 因而等价于, 对每个 $k \in K(S')$,

$$\begin{cases} \mathrm{Ad}(k)(X) = X, & H = Z, \\ X^\alpha\, \mathrm{Ad}(k)(X^{-\alpha}) \in \underline{\mathrm{Lie}}(K/S,\mathscr{M})(S'), & H = N. \end{cases}$$

当 $H = Z$ 时, 这由 $X \in \mathfrak{g}^K(S)$ 得到. 当 $H = N$ 时, 此条件也可写为

$$\mathrm{Ad}(k)(\bar{X}) = \bar{X}, \qquad \mathrm{Ad}(k)(\bar{X}^{-1}) = \bar{X}^{-1}. \tag{*'}$$

第二个等式由第一个推出, 因为 K 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 上的作用保持其群结构. 因此, (**) 也由 $\bar{X} \in (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(S)$ 推出, 这就证明了 (i) 和 (ii).

对于 (iii)–(v), 令

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M}) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S, \mathscr{M})$$

并类似地定义 $\mathfrak{k}(\mathscr{M})$, $\mathfrak{z}(\mathscr{M})$ 以及 $\mathfrak{n}(\mathscr{M})$. 若 G/S 满足 (E), 则

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{g}(\mathscr{N}),$$

从而由引理 5.2.2(i),

$$\mathfrak{g}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})^K \simeq \mathfrak{g}(\mathscr{M})^K \times_S \mathfrak{g}(\mathscr{N})^K.$$

从而 $\mathfrak{z}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{z}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{z}(\mathscr{N})$, 故 Z 满足 (E). 若 K/S 也满足 (E), 则

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M}) \times_S (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N}),$$

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{M})^K \times_S (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})(\mathscr{N})^K,$$

且有如下交换图.

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \ell(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & n(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & (n/\ell)(\mathcal{M}\oplus\mathcal{N}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \\
0 & \longrightarrow & \ell(\mathcal{M})\times_S\ell(\mathcal{N}) & \longrightarrow & n(\mathcal{M})\times_S n(\mathcal{N}) & \longrightarrow & (n/\ell)(\mathcal{M})\times_S(n/\ell)(\mathcal{N}) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

图 41: 用于证明 N 满足条件 (E) 的正合列比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp2-14oct24.pdf, 分篇第 48 页; 合订读本第 106 页.

从而

$$\mathfrak{n}(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N}) \simeq \mathfrak{n}(\mathscr{M}) \times_S \mathfrak{n}(\mathscr{N}),$$

故 N 满足 (E).

现在记 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}(\mathscr{O}_S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$, 并类似地记 $\mathfrak{k}, \mathfrak{z}, \mathfrak{n}$. 若 G 是良好群, 则 $\mathfrak{g}$ 是良 $\mathbf{O}_S$-模, 而引理 5.2.2(ii) 表明 $\mathfrak{z} \simeq \mathfrak{g}^K$ 是良模; 由于 Z 满足 (E), Z 是良好群. 若 K 也是良好群, 则 $\mathfrak{k}$ 是良模, 由引理 5.2.1(iv) 和 5.2.2(ii) 可知, $\mathfrak{g}/\mathfrak{k}$ 和 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K$ 是良模. 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k} \longrightarrow \mathfrak{n} \longrightarrow (\mathfrak{g}/\mathfrak{k})^K \longrightarrow 0$$

及引理 5.2.1(iv), 可知 $\mathfrak{n}$ 是良模. 最后, 若 G 是甚好群, 即对 $x \in \mathfrak{g}$ 恒有 $[x, x] = 0$, 则 Z 和 N 显然是甚好群. 这就证明了 (iii)–(v).

推论 5.2.3.1. *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的群运算交换, 则*

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Centr}}(G)/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)^G.$$

推论 5.2.3.2. *若 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的群运算交换, 且 K 是 G 的正规子群, 则*

$$(\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)/\underline{\mathrm{Lie}}(K/S))^K = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)/\underline{\mathrm{Lie}}(K/S).$$

5.3. 线性表示

设 G 为良好 S-群, 它通过

$$\rho : G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod}}(F).$$

线性作用于良 $\mathbf{O}_S$-模 F. 在4.7.1 和4.8.2 中, 我们定义了相应的线性表示

$$\rho' : \underline{\mathrm{Lie}}(G/S) \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S\text{-mod}}(F).$$

对 F 的每个子集 E, 特别地, 对每个 $\mathbf{O}_S$-子模 E, 都定义了子 S-群 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$.

定义 5.3.0. 对每个 $S' \to S$, 令

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} \subset E_{S'}\},$$
$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid \rho'(X)E_{S'} = 0\}.$$

此构造适用于4.9 意义下的 $\mathbf{O}_S$-Lie 代数的每个线性表示, 所得两个子对象都是在括积下稳定的 $\mathbf{O}_S$-子模.

定理 5.3.1. *设 G 为良好 S-群, 它线性作用于良 $\mathbf{O}_S$-模 F, 并设 E 为 F 的 $\mathbf{O}_S$-子模.*

(i) *有*

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)/S\big) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E),$$

且 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(E)$ 为良好 S-群; 若 G 是甚好群, 则它也是甚好群.

(ii) *假设 E 为良 $\mathbf{O}_S$-模. 则*[98]

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S\big) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E),$$

且 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)$ 为良好 S-群; 若 G 是甚好群, 则它也是甚好群.

证明留给读者.

5.3.2. 设 G 为良好 S-群. 上述结果特别适用于伴随表示. 设 E 为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的良 $\mathbf{O}_S$-子模.[99] 它在 G 中有中心化子和正规化子, 由5.3.1, 它们的 Lie 代数是 E 的通常意义下的中心化子和正规化子, 用括积计算如下:

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] = 0\},$$
$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \{X \in \underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') \mid [X, E_{S'}] \subset E_{S'}\}.$$

5.3.3. 设 K 为 G 的子 S-群. 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的 $\mathbf{O}_S$-子模. 假设它是良 $\mathbf{O}_S$-模,[100] 例如当 K 为良好 S-群时即如此. 显然,

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_G\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big),$$

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(K) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big).$$

从而, 由5.3.1,

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)/S\big) \subset \underline{\mathrm{Centr}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big),$$

$$\underline{\mathrm{Lie}}\big(\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)/S\big) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}\big(\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)\big).$$

这四个包含关系一般都不是等式; 后文将给出许多例子. 特别地, 若 K 是 G 的正规子群, 则 $\underline{\mathrm{Lie}}(K/S)$ 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的理想.

---

[98]编者注: 原文陈述下述等式时, 未对 E 作假设; 此处已作修正. 反例见6.5.1.
[99]编者注: 此假设为新增条件; 参见6.5.1.
[100]编者注: 此假设为新增条件; 参见6.5.1.

6. 杂注

6.1.

对未必是群的 S-函子 X, 也可以定义两个无穷小自同构的括积: 只需将本篇的结果应用于 $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$. 为获得方便的形式体系, 自然要假设 X 是良好的, 即 $\mathbf{O}_X$-模 $T_{X/S}$ 是良模. 若 X 为 S-群, 此定义与定义 4.6 一致.

6.2.

存在一些函子, 具有并非自同构的无穷小自同态, 因而更不满足条件 (E). [101] 对带基点集合 (E, x_0), 设 $M_A(E)$ 为由 E 生成的自由交换幺半群, 并设 $M_{A,P}(E, x_0)$ 为 $M_A(E)$ 对由 $m \sim x_0 + m$ 生成的等价关系所取的商. 对应

$$(E, x_0) \longmapsto M_{A,P}(E, x_0)$$

是从交换幺半群到带基点集合的遗忘函子的左伴随; $M_{A,P}(E, x_0)$ 是带基点集合 (E, x_0) 上的自由交换幺半群.

现在设 X 为函子, 它将每个概形 S 映到以零为基点的 $\mathbf{O}(S)$ 上的自由交换幺半群. 每个态射

$$f : S \longrightarrow I_{\mathbb{Z}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\varepsilon])$$

对应于一个平方为零的元素 $u_f \in \mathbf{O}(S)$, 因而通过 $x \mapsto x + u_f$ 定义 $X(S)$ 的一个自同态, 其中的和在 $M_{A,P}(\mathbf{O}(S), 0)$ 中取. 这样就得到

$$X_{I_{\mathbb{Z}}} = X \times_{\mathbb{Z}} I_{\mathbb{Z}}$$

的自同态 ϕ, 对 $f \in I_{\mathbb{Z}}(S)$ 及 $x \in X(S)$, 定义为

$$\phi((x, f)) = (x + u_f, f).$$

若 $f_0 : S \to I_{\mathbb{Z}}$ 为结构态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 与零截面的复合, 则 $u_{f_0} = 0$, 故 $\phi((x, f_0)) = (x, f_0)$. 因此 ϕ 在 X 上诱导恒等态射: 它是 X 的一个无穷小自同态, 显然不是自同构.

6.3.

存在并非良模的模. 首先, 可以对上述反例稍加修改.[102] 设 $F(S)$ 为以 $\mathbf{O}(S)$ 的元素为基的自由 $\mathbf{O}(S)$-模. 则 F 相对于 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 不满足 (E). 此外, 设 G 为由下式定义的 $\mathbb{Z}$-群:

$$G(S) = \mathrm{GL}_n(R(S)), \qquad n \geq 2,$$

其中 $R(S)$ 为交换群 $\mathbf{O}(S)$ 的 $\mathbf{O}(S)$-群代数. 则 $\mathbb{Z}$-群 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/\mathbb{Z})$ 不交换.

还有如下反例.[103] 设 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 是特征 $p > 0$ 的域.

(a) 设 F 为 $\mathbf{O}_S$-模, 它将每个 S-概形 T 映到群

$$F(T) = \Gamma(T, \mathscr{O}_T),$$

其 $\mathbf{O}(T)$-模结构定义为 $r \cdot f = r^p f$. 作为 S-群函子, F 同构于 $\mathbb{G}_{a,S}$. 因此 F/S 满足 (E), 且

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/S) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(\mathbb{G}_{a,S}/S) \simeq \mathbf{O}_S.$$

[101] 编者注: 此处对原文作了扩充. 特别地, O. Gabber 指出了带基点集合上自由交换幺半群的正确定义.
[102] 编者注: 以下观察为新增内容.
[103] 编者注: 扩充了例 (a), 并新增了例 (b).

对每个 $T \to S$, 典范态射 $F \to \underline{\mathrm{Lie}}(F/S)$ 是恒等映射 $F(T) \to \mathbf{O}(T)$. 它保持交换群结构, 但不保持模结构, 所以 F 不是良模 (4.4.1).

(b) 设 $\alpha_{p,k}$ 为由下式定义的 k-群函子:

$$\alpha_{p,k}(T) = \{x \in \mathbf{O}(T) \mid x^p = 0\}.$$

它由 $\mathrm{Spec}(k[X]/(X^p))$ 表出, 因而是甚好 S-群. 它还具有 $\mathbf{O}_S$-模结构, 但不是良 $\mathbf{O}_S$-模, 因为典范态射

$$\alpha_{p,k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Lie}}(\alpha_{p,k}/k) = \mathbb{G}_{a,k}$$

不是双射.

6.4.

对于 S 上的群值函子 G, 由定义有

$$(G/S \text{ 满足 (E)}) \Longleftarrow (G \text{ 是良好群}) \Longleftarrow (G \text{ 是甚好群}).$$

证明或否定反向蕴涵将是有趣的问题. [104]

6.5.

设 Nil 为由下式定义的 $\mathbb{Z}$-群函子:

$$\mathrm{Nil}(S) = \{x \in \mathbf{O}(S) \mid \text{存在} n \in \mathbb{N} \text{ 使} x^n = 0\}.$$

[105] 函子 Nil 是甚好群, 但不可表. 设 Nil^2, $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 和 F 为 $\mathbb{Z}$-群函子, 它们分别将 S 映到理想 $\mathrm{Nil}(S)^2$ 以及群

$$\mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) = \mathbf{O}(S)/\mathrm{Nil}(S), \qquad F(S) = \mathbf{O}(S)/\mathrm{Nil}(S)^2.$$

容易看出

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\mathbf{O}_{\mathrm{red}}/\mathbb{Z}) = 0,$$

故 $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-模 $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 不是良模, 虽然它是良好 $\mathbb{Z}$-群. 若 $\mathscr{M}, \mathscr{N}$ 为有限秩自由 $\mathbb{Z}$-模, 则

$$\begin{aligned}\mathrm{Nil}^2(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq\ & \mathrm{Nil}^2(S) \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \\ & \oplus \mathrm{Nil}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}F(I_S(\mathscr{M} \oplus \mathscr{N})) \simeq\ & F(S) \oplus \mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{M} \\ & \oplus \mathbf{O}_{\mathrm{red}}(S) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathscr{N}.\end{aligned}$$

因此 F 满足条件 (E), 而

$$\underline{\mathrm{Lie}}(F/\mathbb{Z}) = \mathbf{O}_{\mathrm{red}}.$$

由于 $\mathbf{O}_{\mathrm{red}}$ 不是良 $\mathbf{O}_{\mathbb{Z}}$-模, F 是满足 (E) 却不是良好群的 $\mathbb{Z}$-群.

6.5.1. 现在给出5.3.1–5.3.3 中预告的反例. 设 S 为概形, $F = \mathbf{O}_S^{\oplus 2}$ 带有良好 S-群 $G = \mathrm{GL}_{2,S}$ 的自然作用, 并设 E 为 F 中由满足 x_2 幂零的对 (x_1, x_2) 组成的 $\mathbf{O}_S$-子模. 令

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(E).$$

[104]编者注: 可表的 G 是甚好群 (4.11). 关于可表性判据, 例如可见 [MO67]. 关于零特征代数闭域上仿射代数群的自同构, 见 [HM69].

[105]编者注: 此段为新增内容.

则

$$\underline{\mathrm{Lie}}(N/S) = \underline{\mathrm{Lie}}(G/S),$$

而对每个 $S' \to S$,

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E)(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ x & c \end{pmatrix} \middle| a, b, c, x \in \mathbf{O}(S'),\ x \text{ 幂零} \right\}.$$

因此,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(\underline{\mathrm{Norm}}_G(E)/S) \neq \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(E).$$

取半直积 $G_1 = F \rtimes G$, 可得到一个类似的反例, 其中 E 是 $\underline{\mathrm{Lie}}(G_1/S)$ 的 $\mathbf{O}_S$-子模. 此外, 沿用上述记号,

$$E = \underline{\mathrm{Lie}}(K/S),$$

其中 K 为 F 的子群 $\mathbf{O}_S \oplus \mathrm{Nil}^2$; 即 $K(S')$ 由满足 $x_2 \in \mathrm{Nil}(S')^2$ 的对 (x_1, x_2) 组成.

参考文献

106

[**DG70**] M. Demazure and P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**HM69**] G. Hochschild and G. D. Mostow, *Automorphisms of affine algebraic groups*, *J. Algebra* **13** (1969), 535–543.

[**MO67**] H. Matsumura and F. Oort, *Representability of group functors and automorphisms of algebraic schemes*, *Invent. Math.* **4** (1967), 1–25.

[106]编者注: 本篇引用的补充文献.

第 III 篇
无穷小扩张

M. Demazure 著

本篇在以下一般情形下展开讨论. 给定概形 S 和凝聚幂零理想 $\mathscr{I}$, 后者定义在 S 上. 对 $n \geq 0$, 用 S_n 表示 S 中由理想 $\mathscr{I}^{n+1}$ 定义的闭子概形. 特别地, S_0 由 $\mathscr{I}$ 定义. 由于 $\mathscr{I}$ 幂零, 当 n 充分大时, 均有 $S_n = S$, 且各 S_i 有相同的底拓扑空间. 下面是一个典型例子: S 是局部 Artin 环 A 的谱, $\mathscr{I}$ 是由 A 的根基定义的理想, 从而 S_0 是 A 的剩余域的谱.[0]

在这种情形下, 给定 S_0 上的某些数据, 要寻找 S 上提升这些数据的数据, 也就是说, 这些数据从 S 到 S_0 作基变换后恢复为原先的数据. 这通过各概形 S_n 逐步进行. 在每一步中, 我们将定义所出现的障碍, 并在解存在时对得到的解进行分类.

从 S_n 到 S_{n+1} 的过渡可作如下推广. 给定概形 S 及两个理想 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$, 满足 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$. 在前面的情形中, S, $\mathscr{I}$, $\mathscr{J}$ 分别为

$$S_{n+1}, \qquad \mathscr{I}/\mathscr{I}^{n+2}, \qquad \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}.$$

我们用 S_0, 分别地 $S_{\mathscr{J}}$, 表示 S 中由 $\mathscr{I}$, 分别地 $\mathscr{J}$, 定义的闭子概形, 并提出将数据从 $S_{\mathscr{J}}$ 扩张到 S 的问题.

SGA 1 第 III 篇讨论了概形态射的扩张问题和概形的扩张问题. 这里, 我们考虑群态射、群结构和子群的扩张问题.

在 §0 中, 我们汇集了 SGA 1 第 III 篇中将会用到的结果, 将其表述为最适合本篇目的的形式, 使读者不必反复参阅那一篇. [1] 第 1 节汇集了后文将用到的群上同调计算, 这些计算与概形论无关. 第 2 节和第 3 节分别讨论群态射的扩张和群结构的扩张. 在 §4 中, 我们简要回顾 TDTE IV 中陈述的一个关于子概形扩张的结果的证明, 并将其应用于子群的扩张问题. 对于本讨论班的其余部分, 只有 §2 中关于群态射扩张的结果是必不可少的. [2]

将无穷小扩张问题化归为群扩张中的通常上同调计算的想法, 是 J. Giraud 在口头报告期间提出的; 当时报告中的计算明显更复杂, 也更难理解. 遗憾的是, 这一方法似乎仅对所研究的前两个问题有效, 对于子群的扩张, 我们仍无法避免相当繁重的计算.

为简化措辞, 我们将一个带有到函子 Y 的态射的函子、概形等, 分别称为 Y-函子、Y-概形等. 这推广了第 I 篇中仅涉及可表 Y 的定义.

0. SGA 1 第 III 篇的回顾及其他注记

先给出一个一般定义.

[0]编者注: 2024 年 10 月 14 日版本.

[1]编者注: 读者也可以先读 §1, 它更容易, 并可为 §0 的结果提供动机和指引.

[2]编者注: 不过, 3.10 用于 XXIV 1.13. 此外, 4.37 用于 IX 3.2 bis 和 3.6 bis 的证明, 尽管这些结果也可由第 X 篇中不使用 4.37 的结果推出.

定义 0.1. *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, X 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象, G 是作用在 X 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 若以下等价条件成立, 则称 X 在 G 下是*形式主齐性的 (formally principal homogeneous)*:* [3]

(i) *对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 集合 $X(T)$ 或者为空, 或者在 $G(T)$ 下为主齐性集;*

(ii) *函子态射*

$$G \times X \longrightarrow X \times X, \qquad (g, x) \longmapsto (gx, x),$$

是同构.

现在将 SGA 1, III §5[4] 的结果表述为这里最有用的形式. 本节始终使用以下记号. 在概形 S 上给定两个拟凝聚理想 $\mathscr{I}$ 和 $\mathscr{J}$, 满足

$$\mathscr{I} \supset \mathscr{J}, \qquad \mathscr{I}\,\mathscr{J} = 0.$$

特别地, $\mathscr{J}^2 = 0$. 用 S_0, 分别地 $S_{\mathscr{J}}$, 表示 S 中由 $\mathscr{I}$, 分别地 $\mathscr{J}$, 定义的闭子概形. 对每个 S-函子 X, 统一用 X_0 和 $X_{\mathscr{J}}$ 表示从 S 到 S_0 及 $S_{\mathscr{J}}$ 作基变换所得到的函子. 对态射也使用相同记号.

定义 0.1.1. [5] *设 X 是一个 S-函子. 用下式定义 S 上的函子 X^+:*

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X)$$

其中 Y 为变动的 S-概形. 按照第 II 篇 §1 的记号,

$$X^+ \simeq \prod_{S_{\mathscr{J}}/S} X_{\mathscr{J}}.$$

由构造可知, $X_{\mathscr{J}}$ 的恒等态射定义了一个 S-态射

$$p_X : X \longrightarrow X^+.$$

具体地说,[6] 对每个 S-概形 Y, 映射

$$p_X(Y) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X)$$

由态射 $Y_{\mathscr{J}} \to Y$ 诱导.

注 0.1.2. 若 X 是 S-群函子, 则 $X_{\mathscr{J}}$ 是 $S_{\mathscr{J}}$-群函子. 因而 X^+ 的定义公式赋予 X^+ 一个 S-群函子结构, 上述描述还表明

$$p_X : X \longrightarrow X^+$$

是 S-群函子的态射.

注 0.1.3. 对每个 S-群函子 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}\text{-gr}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}).$$

事实上, 设 $f \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$ 对应于 $f_{\mathscr{J}} \in \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}})$. f 为 S-群态射的条件是, 对每个 $T \to S$ 和每个 $y, y' \in Y(T)$, 有

$$f(y \cdot y') = f(y) \cdot f(y'),$$

[3]编者注: 这样的对象也称为*伪挠子 (pseudo-torsor)*; 参见 EGA IV_4, 16.5.15. 不必为主齐性的更一般的形式齐性对象的概念, 定义于 第 IV 篇, 6.7.1.

[4]编者注: 另见 EGA IV_4, 16.5.14–18.

[5]编者注: 添加了从 0.1.1 至 0.1.13 的编号, 以便突出这里包含的定义和结果.

[6]编者注: 下面一句为新增内容, 后续两条注作了展开.

这等价于

$$f_{\mathscr{J}}(y_{\mathscr{J}}) \cdot f_{\mathscr{J}}(y'_{\mathscr{J}}) = f_{\mathscr{J}}((y \cdot y')_{\mathscr{J}}).$$

由于 $(y \cdot y')_{\mathscr{J}} = y_{\mathscr{J}} \cdot y'_{\mathscr{J}}$, 这正是 $f_{\mathscr{J}}$ 为群态射的条件. 将其应用于 $Y = X$, 再次得到: 与 $\mathrm{id}_{X_{\mathscr{J}}}$ 对应的 p_X 是 S-群函子的态射.

现在回到一般情形, 假设 X 是 S-概形. 按照定义, 从变动的 S-概形 Y 到 X^+ 的 S-态射, 就是一个 $S_{\mathscr{J}}$-态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$. 我们如下定义取值于交换群的 X^+-函子 L_X.

附论 0.1.4. [7] 若 $\pi : Y \to S$ 是概形态射, M 是 $\mathscr{O}_S$-模, 则将逆像 π^*M 记为

$$M \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y.$$

若 $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_S$ 的理想, 则用 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 表示 $\mathscr{O}_Y$ 中作为下述映射的像的理想:

$$\pi^*(\mathscr{J}) = \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y \longrightarrow \mathscr{O}_Y.$$

对每个 S-概形态射 $f : Z \to Y$, 有一个 $\mathscr{O}_Z$-模的满态射

$$f^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_Z. \tag{0.1.4}$$

这可由下面的交换图得到.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Y \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_Z & = & \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) = (\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_Z & \longrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_Z. \end{array}$$

图 1: 给出满态射 (0.1.4) 的张量积交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 4 页; 合卷第 114 页.

定义 0.1.5. [8] 设 X 是 S-概形. 对每个由态射

$$g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \longrightarrow X_{\mathscr{J}},$$

给定的 X^+-概形 Y, 令

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, L_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

其中 $\Omega^1_{X_0/S_0}$ 是 X_0 在 S_0 上的相对微分模; 由于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 被 $\mathscr{I}$ 零化, 可将其视为 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模.

于是 L_X 是取值于交换群的 X^+-函子. [9] 事实上, 对每个 X^+-态射 $f : Z \to Y$, 函子 f_0^* 与 (0.1.4) 中的态射

$$f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_Z$$

诱导一个自然同态 $L_X(f)$:

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \\ &\quad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Z_0}}(f_0^* g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_Y)) \\ &\quad\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Z_0}}(f_0^* g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Z). \end{aligned}$$

[7] 编者注: 此附论为新增内容.

[8] 编者注: 引入函子 L_X, 就将 SGA 1, III, 命题 5.1 推广为关于 Y 和 X 具有函子性的形式; 参见下面的 0.1.8 和 0.1.9, 以及 0.1.10 和 0.2. 此外, 当 X 是 S-群函子时, 在某些假设下 L_X 产生一个 S-群函子 L'_X 及一个正合列 $1 \to L'_X \to X \to X^+$; 参见 0.4, 0.9 和 0.11. 这些在本篇中起着关键作用; 参见 定理 2.1, 3.5 和 4.21.

[9] 编者注: 以下为新增内容.

最后, $L_X(f)$ 有如下简单的局部描述. 概形 Y 与 $Y_{\mathscr{J}}$ 有相同的底拓扑空间; 对 Y 的每个开子集 V, V 与 $V_{\mathscr{J}}$ 也如此. 设

$$U = \mathrm{Spec}(A), \qquad V = \mathrm{Spec}(B), \qquad W = \mathrm{Spec}(C)$$

为仿射开集, 满足 U 在 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$ 上, $g_{\mathscr{J}}(V_{\mathscr{J}}) \subset U$, 且 $W \subset f^{-1}(V)$. 用 I, J 表示 Λ 中与 $\mathscr{I}$, $\mathscr{J}$ 对应的理想. 则 f, 分别地 $g_{\mathscr{J}}$, 诱导一个 Λ-代数态射

$$\theta : B \longrightarrow C, \qquad \text{分别地} \qquad \varphi : A \longrightarrow B/JB,$$

且显然有 $\theta(JB) \subset JC$. 另一方面,

$$m \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y)$$

诱导下列集合的一个元素 D:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{V_0}}(g_0^*(\Omega^1_{U/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_V) &= \mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A B/IB, JB)\\ &= \mathrm{Der}_\Lambda(A, JB),\end{aligned}$$

而 $L_X(f)(m)$ 在

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{W_0}}(f_0^* g_0^*(\Omega^1_{U/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Z) &= \mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda} \otimes_A C/IC, JC)\\ &= \mathrm{Der}_\Lambda(A, JC)\end{aligned}$$

中的像就是 $\theta \circ D$.

注 0.1.6. [10] 设 $f : X \to W$ 是 S-态射. 它诱导一个 S-态射

$$f^+ : X^+ \longrightarrow W^+$$

其定义如下. 若 $g \in \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$ 对应于 S-态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X$, 则 $f^+(g)$ 是 $\mathrm{Hom}_S(Y, W^+)$ 中的元素 $f \circ g_{\mathscr{J}}$. 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & W \\ {\scriptstyle p_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_W} \\ X^+ & \xrightarrow[f^+]{} & W^+. \end{array}$$

图 2: 态射 p_X 与 p_W 的自然性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 5 页; 合卷第 115 页.

回顾 0.1.7. [11] 本段对给定的 S-概形 X, "回顾" 微分模 $\Omega^1_{X/S}$ 和对角形的第一无穷小邻域 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 的某些函子性质. 这些性质容易由 EGA IV_4, §§16.1–16.4 得到, 但在那里没有明确表述.

(a) 先回顾以下事实 (参见 EGA II, §§1.2–1.5). 设 $g : Y \to X$ 是概形态射, $\pi : X' \to X$ 是仿射 X-概形, $\mathscr{B} = \pi_*(\mathscr{O}_{X'})$ 是相应的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-代数. 那么 Y-概形 $Y \times_X X'$ 仿射, 并对应于拟凝聚 $\mathscr{O}_Y$-代数 $g^*(\mathscr{B})$, 且有由双射构成的交换图:

[10] 编者注: 此注作了展开.
[11] 编者注: 本段为新增内容 (另见 [DG70], §I.4, 第 1–2 条).

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_X(Y, X') & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{Hom}_Y(Y, Y \times_X X') \\
\wr\downarrow & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(\mathscr{B}, g_*(\mathscr{O}_Y)) & \xrightarrow[\ \sim\ ]{} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*(\mathscr{B}), \mathscr{O}_Y)\,.
\end{array}$$

图 3: 沿 g 作基变换后的仿射概形与代数之间的双射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 5 页; 合卷第 115 页.

此外, 这些双射关于二元组 (X, X') 具有函子性. 更确切地说, 设 W' 是对应于拟凝聚 $\mathscr{O}_W$-代数 $\mathscr{A}$ 的仿射 W-概形, 并假设有以下概形态射构成的交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X' & \xrightarrow{f'} & W' \\
 & \overset{g'}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\
Y & \xrightarrow[g]{} & X & \xrightarrow[f]{} & W
\end{array}$$

图 4: 用以表达关于 (X, X') 的函子性的概形态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 5 页; 合卷第 115 页.

将与 f' 关联的代数态射记为

$$\varphi : \mathscr{A} \longrightarrow f_*(\mathscr{B}), \qquad \varphi^\sharp : f^*(\mathscr{A}) \longrightarrow \mathscr{B}$$

并将与变动的 X-态射 $g' : Y \to X'$ 关联的代数态射记为

$$\theta : \mathscr{B} \longrightarrow g_*(\mathscr{O}_Y), \qquad \theta^\sharp : g^*(\mathscr{B}) \longrightarrow \mathscr{O}_Y$$

则下图交换, 其中 Y 经由 $f \circ g$ 视为 W-概形.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_X(Y, X') & \xrightarrow{g' \mapsto f' \circ g'} & \mathrm{Hom}_W(Y, W') \\
\wr\downarrow & \overset{\theta \mapsto f_*(\theta)\circ\varphi}{\nearrow} & \simeq\searrow \\
 & & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_W\text{-alg.}}(\mathscr{A}, f_*g_*(\mathscr{O}_Y)) \\
 & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(\mathscr{B}, g_*(\mathscr{O}_Y)) & \xrightarrow[\theta \mapsto \theta \circ \varphi^\sharp]{} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X\text{-alg.}}(f^*(\mathscr{A}), g_*(\mathscr{O}_Y)) \\
\wr\downarrow & & \downarrow\wr \\
\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*(\mathscr{B}), \mathscr{O}_Y) & \xrightarrow[\theta^\sharp \mapsto \theta^\sharp \circ g^*(\varphi^\sharp)]{} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg.}}(g^*f^*(\mathscr{A}), \mathscr{O}_Y)\,.
\end{array}$$

图 5: 仿射概形与代数之间的对应的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 6 页; 合卷第 116 页.

(b) 现设 X 是 S-概形. 令 $\Omega^1_{X/S}$ 为 X 在 S 上的微分模, $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 为对角浸入 $\delta_X : X \to X \times_S X$ 的第一无穷小邻域. 它是 $X \times_S X$ 的一个子概形, 对角形 $\Delta_{X/S}$ 是其中的闭子概形. 用 pr^i_X, $i = 1, 2$, 表示两个投影 $X \times_S X \to X$, 并用 π_X 表示 pr^1_X 在 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 上的限制.

一方面, 每个 S-概形态射 $f : X \to W$ 都诱导一个 S-态射

$$\Delta^{(1)} f : \Delta^{(1)}_{X/S} \longrightarrow \Delta^{(1)}_{W/S}$$

使下图交换.

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \xrightarrow{\delta_X} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \longrightarrow & X \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}^i_X} & X \\
\downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta^{(1)} f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
W & \xrightarrow[\delta_W]{} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \longrightarrow & W \times_S W & \xrightarrow[\mathrm{pr}^i_W]{} & W.
\end{array}$$

图 6: 对角形的第一无穷小邻域的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 6 页; 合卷第 116 页.

另一方面, 经由投影 π_X, 概形 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 是一个仿射 X-概形: 它是增广拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-代数

$$\mathscr{P}^1_{X/S} = \mathscr{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S},$$

的谱, 其中 $\Omega^1_{X/S}$ 是一个平方为零的理想. 增广是指在 $\Omega^1_{X/S}$ 上为零的 $\mathscr{O}_X$-代数态射

$$\varepsilon_X : \mathscr{P}^1_{X/S} \longrightarrow \mathscr{O}_X$$

它对应于闭浸入 $\delta_X : X \hookrightarrow \Delta^{(1)}_{X/S}$. 因此, 每个 S-概形态射 $f : X \to W$ 都诱导一个增广 $\mathscr{O}_X$-代数态射

$$f^*(\mathscr{P}^1_{W/S}) = \mathscr{O}_X \oplus f^*(\Omega^1_{W/S}) \longrightarrow \mathscr{P}^1_{X/S} = \mathscr{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S},$$

或者等价地, 诱导一个 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$f_{X/W/S} : f^*(\Omega^1_{W/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S};$$

关于记号 $f_{X/W/S}$, 参见 EGA IV$_4$, (16.4.3.6) 和 (16.4.18.2).

由于 $\pi_X : \Delta^{(1)}_{X/S} \to X$ 仿射, 由 (a) 可知, $\Delta^{(1)} f$ 完全由 $f_{X/W/S}$ 决定. 对每个 X-概形 $g : Y \to X$, 集合

$$\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg}}(\mathscr{O}_Y \oplus g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$$

可等同于 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y)$ 的一个子集, 即

$$\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y),$$

它由那些满足 $\mathrm{Im}(\psi)$ 是 $\mathscr{O}_Y$ 中平方为零的理想的 $\mathscr{O}_Y$-态射 $\psi : g^*(\Omega^1_{X/S}) \to \mathscr{O}_Y$ 组成. [12]

因此, 将 (a) 应用于下图.

[12]编者注: 在 SGA 1, III 5.1 的证明中, “但代数同态 $\mathscr{A} \to \mathscr{O}_Y$ 对应于 …” 这一句必须据此更正; 所引段落的其余部分不变.




图 7: 应用仿射函子性陈述的交换图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 117 页.

考虑到 $\Delta^{(1)}f$ 是 $f \times f$ 在 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 上的限制, 就得到下面关于 X-概形 $g : Y \to X$ 具有函子性的交换图.

图 8: 第一邻域的态射与微分映射之间的函子性比较, 式 0.1.7 (∗).

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 117 页.

注 0.1.7.1. 以如下后文将用到的注结束本段 (参见 0.1.10). 用 $\widetilde{L}_X$ 表示对每个 X-概形 $g : Y \to X$ 赋予集合

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{O}_Y),$$

的 X-函子, 并用 $\widetilde{L}_f : \widetilde{L}_X \to \widetilde{L}_W$ 表示上面定义的函子态射: 它将 $\psi \in \widetilde{L}_X(Y)$ 映到 $\psi \circ g^*(f_{X/W/S})$. 上述讨论给出一个函子交换图.

$$\begin{array}{ccccc}
X \times_X \widetilde{L}_X & \xleftarrow{\sim} & \Delta^{(1)}_{X/S} & \hookrightarrow & X \times_S X \\
\downarrow{\scriptstyle f\times\widetilde{L}_f} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta^{(1)}f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\
W \times_W \widetilde{L}_W & \xleftarrow[\sim]{} & \Delta^{(1)}_{W/S} & \hookrightarrow & W \times_S W.
\end{array}$$

图 9: $\widetilde{L}_X$ 与第一无穷小邻域的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 7 页; 合卷第 117 页.

定理 0.1.8. (SGA 1, III 5.1)[13] *设 Y 与 X 是两个 S-概形, $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_Y$ 的一个平方为零的拟凝聚理想, $Y_{\mathscr{J}}$ 是 Y 中由 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X$ 是一个 S-态射.*

(a) *将 $g_{\mathscr{J}}$ 扩张的 S-态射 $g : Y \to X$ 组成的集合 $P(g_{\mathscr{J}})$, 或者为空, 或者在下列交换群下为主齐性集:*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}(g^*_{\mathscr{J}}(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}).$$

(b) *假设 $i : Y_0 \hookrightarrow Y_{\mathscr{J}}$ 是由拟凝聚理想 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$ 定义的闭浸入, 其中 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$, 并令 $g_0 = g_{\mathscr{J}} \circ i$. 则上述交换群同构于*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}).$$

[13]编者注: 这里重述 SGA 1, III 5.1 的陈述与证明, 因为后文证明 命题 0.2 时将会用到它们; 也可先看下面的推论 0.1.9. 此外, $\mathscr{J}$ (分别地, $\mathscr{I}$) 是字母 J (分别地, I) 的另一种书法体形式. 回到此前的记号, 即 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$ 是 $\mathscr{O}_S$ 的理想, 满足 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$, 应用这一结果时将取 $\mathscr{J} = \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ (分别地, $\mathscr{I} = \mathscr{I}\mathscr{O}_Y$).

证明. (b) 立即由 (a) 得到. 事实上, 由于 $\mathscr{J}$ 被 $\mathscr{I}$ 零化, 可将其视为 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模, 而由伴随性得

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\big(i^*g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big).$$

为证明 (a), 可假设 $P(g_{\mathscr{J}})\neq\emptyset$, 即存在扩张 $g_{\mathscr{J}}$ 的 S-态射 $g:Y\to X$. 用 $j:Y_{\mathscr{J}}\hookrightarrow Y$ 表示该浸入. 则 $P(g_{\mathscr{J}})$ 是满足 $g'\circ j=g_{\mathscr{J}}$ 的 S-态射 $g':Y\to X$ 组成的集合. 给定这样的 g', 等价于给定 S-态射

$$h:Y\longrightarrow X\times_S X$$

使得 $\mathrm{pr}_1\circ h=g$ 及 $h_{\mathscr{J}}=\delta\circ g_{\mathscr{J}}$, 其中 $h_{\mathscr{J}}=h\circ j$, $\delta:X\hookrightarrow X\times_S X$ 是对角浸入.




图 10: 由 $g_{\mathscr{J}}$ 的两个扩张确定的态射 h.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 8 页; 合卷第 118 页.

由于 $h_{\mathscr{J}}$ 经过 δ 分解, 又由于 $\mathscr{J}^2=0$, Y 位于浸入 $j:Y_{\mathscr{J}}\to Y$ 的第一无穷小邻域内, 由函子性 (EGA IV_4, 16.2.2(i)) 可知, 所求态射 h 唯一地经过 $\Delta^{(1)}_{X/S}$ 分解; 参见 0.1.7. 令

$$Y'=\Delta^{(1)}_{X/S}\times_X Y,\qquad Y'_{\mathscr{J}}=Y'\times_Y Y_{\mathscr{J}}=\Delta^{(1)}_{X/S}\times_X Y_{\mathscr{J}}.$$

于是, 所求态射 h 与 $Y'\to Y$ 的那些扩张 $Y'_{\mathscr{J}}\to Y_{\mathscr{J}}$ 的截面 $u_{\mathscr{J}}=(\delta\circ g_{\mathscr{J}},\mathrm{id})$ 的截面 u 一一对应. 另一方面, Y' (分别地, $Y'_{\mathscr{J}}$) 在 Y (分别地, $Y_{\mathscr{J}}$) 上仿射, 并对应于拟凝聚代数

$$\mathscr{A}=\mathscr{O}_Y\oplus g^*(\Omega^1_{X/S}),\qquad \text{分别地}\qquad \mathscr{A}_{\mathscr{J}}=\mathscr{A}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}=\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\oplus g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}).$$

令 $\varepsilon:\mathscr{A}\to\mathscr{O}_Y$ 为典范增广, 即在 $g^*(\Omega^1_{X/S})$ 上为零的 $\mathscr{O}_Y$-代数态射, 并类似地定义 $\varepsilon_{\mathscr{J}}:\mathscr{A}_{\mathscr{J}}\to\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$. 则

$$\Gamma(Y'/Y)\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg}}(\mathscr{A},\mathscr{O}_Y),\qquad \Gamma(Y'_{\mathscr{J}}/Y_{\mathscr{J}})\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\text{-alg}}(\mathscr{A}_{\mathscr{J}},\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}).$$

在这些同构下, 截面 $u=(\delta\circ g,\mathrm{id})$ (分别地, $u_{\mathscr{J}}$) 对应于 ε (分别地, $\varepsilon_{\mathscr{J}}$). 因此, $P(g_{\mathscr{J}})$ 与模去理想后化为 $\varepsilon_{\mathscr{J}}$ 的代数态射 $\mathscr{A}\to\mathscr{O}_Y$ 一一对应; 在此双射下, g 对应于 ε.

令 $M=g^*(\Omega^1_{X/S})$. 则 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y\text{-alg}}(\mathscr{A},\mathscr{O}_Y)$ 可等同于像为平方零理想的 $\mathscr{O}_Y$-态射 $\psi:M\to\mathscr{O}_Y$ 组成的集合. 我们关注其中诱导零态射 $M\to\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}=\mathscr{O}_Y/\mathscr{J}$ 的那些态射, 即将 M 映到 $\mathscr{J}$ 内的态射. 反之, 由于 $\mathscr{J}^2=0$, 每个 $\mathscr{O}_Y$-态射 $\phi:M\to\mathscr{J}$ 都来自唯一一个模去理想后化为 $\varepsilon_{\mathscr{J}}$ 的代数态射 $\mathscr{A}\to\mathscr{O}_Y$. 最后,

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}\big(g^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)$$

这是因为 $\mathscr{J}^2=0$, 如同 (b) 的证明. 从而得到一个双射

$$P(g_{\mathscr{J}})\simeq\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big)$$

在此双射下, g 对应于零态射.

对每个

$$m\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\big(g_{\mathscr{J}}^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\big),$$

用 $m\cdot g$ 表示上述双射中与 g 和 m 关联的 $P(g_{\mathscr{J}})$ 的元素. 我们已经看到 $0\cdot g=g$; 还需证明

$$m'\cdot(m\cdot g)=(m+m')\cdot g. \tag{0.1.8 (*)}$$

这一点可局部验证.[14] 事实上, 上述两个态射 $Y\to X$ 在底拓扑空间上诱导的连续映射都与 g 相同. 因此只须验证: 对 X 的每个在 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上的仿射开集 $U=\mathrm{Spec}(A)$, 以及 $g^{-1}(U)$ 的每个仿射开集 $V=\mathrm{Spec}(B)$, 它们诱导同一个 Λ-代数态射 $A\to B$.

令 $J=\Gamma(V,\mathscr{J})$, 并令 $\varphi,\psi,\eta:A\to B$ 分别为 g, $m\cdot g$ 和 $m'\cdot(m\cdot g)$ 诱导的态射. 它们模去 J 后相同. 有唯一的表达式

$$\psi=\varphi+D,\qquad \eta=\psi+D',$$

其中 D 属于

$$\mathrm{Der}_{\varphi}(A,J)=\{\delta\in\mathrm{Hom}_{\Lambda}(A,J)\mid \delta(ab)=\varphi(a)\delta(b)+\varphi(b)\delta(a)\},$$

而 D' 属于 $\mathrm{Der}_{\psi}(A,J)$. 但由于 $J^2=0$, 有 $\mathrm{Der}_{\varphi}(A,J)=\mathrm{Der}_{\psi}(A,J)$, 且两者都可等同于

$$\mathrm{Hom}_{B/J}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B/J,J).$$

在此等同下, D 对应于 m, D' 对应于 m'. 因此 $\eta=\varphi+D+D'$, 而 $D+D'$ 对应于 $m+m'$, 这就证明了 (0.1.8 (*)).

推论 0.1.9. [15] *设 X 是 S-概形, 沿用 0.1.5 的记号. 则 X 带有交换 X^+-群 L_X 的左作用, 使 X 在 X^+ 上关于 L_X 为形式主齐性的. 换言之, 有一个 X^+-函子同构*

$$L_X\times_{X^+}X\xrightarrow{\sim}X\times_{X^+}X,\qquad (m,x)\longmapsto(x,m\cdot x).$$

证明. 用 $i_0:X_0\hookrightarrow X$ 表示该浸入. 由于 $X_0=X\times_S S_0$, 首先有

$$i_0^*(\Omega^1_{X/S})\simeq\Omega^1_{X_0/S_0}$$

(EGA IV, 16.4.5).

设 Y 是一个由 S-态射 $g_{\mathscr{J}}:Y_{\mathscr{J}}\to X$ 给定的 X^+-概形, $g_0:Y_0\to X_0$ 由基变换得到. 根据 0.1.8, 若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)$ 非空, 则它在

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\big(g_0^*i_0^*(\Omega^1_{X/S}),\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\big),$$

下为主齐性集, 后者可等同于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\big(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\big)=L_X(Y).$$

于是有一个双射

$$L_X(Y)\times\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X\times_{X^+}X),\qquad (m,g)\longmapsto(g,m\cdot g).$$

我们来证明它关于 Y 具有函子性. 设 $f:Z\to Y$ 是 S-概形态射. 只须证明下图交换.

$$\begin{array}{ccc} L_X(Y)\times\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X\times_{X^+}X) \\ \downarrow{\scriptstyle L_X(f)\times f} & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ L_X(Z)\times\mathrm{Hom}_{X^+}(Z,X) & \xrightarrow[\sim]{} & \mathrm{Hom}_{X^+}(Z,X\times_{X^+}X)\,. \end{array}$$

图 11: 主齐性双射关于 Y 的函子性.

[14] 编者注: 前面的论证几乎逐字复述 SGA 1, III 5.1; 以下作了展开.

[15] 编者注: 此推论是在 SGA 1, III 5.1 的基础上补入的; 它证明了下面的 命题 0.2 的 (i).

若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,X)=\emptyset$, 则无须证明. 因此只须证明: 对每个扩张 $g_{\mathscr{J}}$ 的 S-态射 $g:Y\to X$ 和每个 $m\in L_X(Y)$, 有

$$(m\cdot g)\circ f = L_X(f)(m)\cdot(g\circ f). \tag{0.1.9 (*)}$$

这两个 S-态射 $Z\to X$ 在 $Z_{\mathscr{J}}$ 上都与 $g_{\mathscr{J}}\circ f_{\mathscr{J}}$ 相同; 特别地, 它们在底拓扑空间上诱导的连续映射都与 $g\circ f$ 相同. 因此只须在局部环上验证此等式. 设 $z\in Z$, 令 $y=f(z)$, $x=g(y)$, 并用 A,B,C 分别表示局部环 $\mathscr{O}_{X,x},\mathscr{O}_{Y,y},\mathscr{O}_{Z,z}$. 设 s 是 x 在 S 中的像, 令 $\Lambda=\mathscr{O}_{S,s}$, 用 J 和 I 表示 Λ 中分别与 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{I}$ 对应的理想, 并令 $\varphi,\psi:A\to B$ 及 $\theta:B\to C$ 分别为 g, $m\cdot g$, f 诱导的 Λ-代数态射. 则 m 诱导下列集合的一个元素 D:

$$\mathrm{Hom}_{B/IB}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B/IB, JB)=\mathrm{Der}_\Lambda(A,JB),$$

并且 $\psi=\varphi+D$. 因而 $(m\cdot g)\circ f$ 对应于

$$\theta\circ\psi=\theta\circ\varphi+\theta\circ D.$$

根据 0.1.5, $\theta\circ D$ 是 $L_X(f)(m)$ 在

$$\mathrm{Hom}_{C/IC}(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A C/IC, JC)=\mathrm{Der}_\Lambda(A,JC).$$

中的像. 因此, $\theta\circ\varphi+\theta\circ D$ 是 $L_X(f)(m)\cdot(g\circ f)$ 的像. 这就证明了 (0.1.9 (*)).

推论 0.1.10. [16]

(a) *函子 L_X 函子性地依赖于 X. 对每个 S-态射 $f:X\to W$, 有一个 S-态射 $L_f:L_X\to L_W$, 它是 f^+ 上的交换群态射; 也就是说, 下图交换,*

$$\begin{array}{ccc} L_X & \xrightarrow{L_f} & L_W \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^+ & \xrightarrow[f^+]{} & W^+ \end{array}$$

图 12: f^+ 上的态射 L_f.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 121 页.

并且, 对每个 $Y\to X^+$, 映射

$$L_f(Y):\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{W^+}(Y,L_W),$$

是交换群同态, 其中 Y 经由 f^+ 在 W^+ 上.

(b) *此外, 下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} L_X\times_{X^+}X & \xrightarrow{\sim} & X\times_{X^+}X \\ {\scriptstyle L_f\times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times f} \\ L_W\times_{W^+}W & \xrightarrow[\sim]{} & W\times_{W^+}W \end{array}.$$

图 13: L_f 与形式主齐性作用的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 121 页.

[16]编者注: 这里明确表述了 L_X 关于 X 的函子性, 尤其是下面的 (b).

证明. 对于 (a), L_f 由 $\mathscr{O}_{X_0}$-模态射

$$f_{X_0/W_0/S_0} : f_0^*(\Omega^1_{W_0/S_0}) \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0}$$

诱导 (参见 0.1.7(b)). 对每个由 S-态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X$ 给定的 X^+-概形 Y, 有下列关于 Y 具有函子性的交换图.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y\right) & \xrightarrow{L_f(Y)} & \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(g_0^* f_0^*(\Omega^1_{W_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y\right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{g_{\mathscr{J}}\} & \longrightarrow & \{f_{\mathscr{J}} \circ g_{\mathscr{J}}\} \end{array}$$

图 14: 在微分模描述下的同态 $L_f(Y)$.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 11 页; 合卷第 121 页.

这里 $L_f(Y)$ 是映射

$$\psi \longmapsto \psi \circ g_0^*(f_{X_0/W_0/S_0}),$$

它确实是交换群同态.[17]

现在证明 (b). 设 Y 是 X^+-概形. 若 $\mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X) = \emptyset$, 则无须证明. 因而设 $g \in \mathrm{Hom}_{X^+}(Y, X)$. 必须证明, 对每个 $m \in L_X(Y)$, 有

$$f \circ (m \cdot g) = L_f(Y)(m) \cdot (f \circ g). \qquad (0.1.10\,(*))$$

固定 g 后, $\mathrm{Hom}_X(Y, X \times_{X^+} X)$ 是 $\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S})$ 的子集, 且

$$\begin{aligned} L_X(Y) &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Y}(g^*(\Omega^1_{X/S}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y), \end{aligned}$$

它是 $\widetilde{L}_X(Y)$ 的子集; 参见 0.1.7. 此外, $L_f(Y)$ 是 $\widetilde{L}_f(Y)$ 在 $L_X(Y)$ 上的限制. 最后, 双射

$$L_X(Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_X(Y, X \times_{X^+} X), \qquad m \longmapsto (g, m \cdot g),$$

是 0.1.7.1 中考虑的双射

$$\mathrm{Hom}_X(Y, \Delta^{(1)}_{X/S}) \xrightarrow{\sim} \{g\} \times \widetilde{L}_X(Y)$$

在 $L_X(Y) \subset \widetilde{L}_X(Y)$ 上的限制的逆. 因此, 等式 (0.1.10 (*)) 由 (0.1.7 (*)) 得到. 事实上, 令 g' 为由 $(g, m \cdot g)$ 定义的 X-态射 $Y \to \Delta^{(1)}_{X/S}$. 在 $\widetilde{L}_W(Y)$ 中, 与 $(f \circ g, f \circ g')$ 对应的元素是 $\widetilde{L}_f(Y)(m) = L_f(Y)(m)$. 因此

$$L_f(m) \cdot (f \circ g) = f \circ (m \cdot g).$$

引理 0.1.11. *设 X, X' 是两个 S-概形. 有一个交换图*

$$\begin{array}{ccc} L_X \times_S L_{X'} & \xrightarrow{\sim} & L_{X \times_S X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^+ \times_S X'^+ & \xrightarrow[\sim]{} & (X \times_S X')^+ \end{array} .$$

图 15: L_X 与 X^+ 关于乘积的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 122 页.

[17]编者注: 注意, L_f 仅依赖于 $f_0 : X_0 \to W_0$.

证明.[18] 对每个 S-概形 Y,

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_S(Y, X^+ \times_S X'^+) &= \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) \times \mathrm{Hom}_S(Y, X'^+) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X) \times \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X') \\ &= \mathrm{Hom}_S(Y, (X \times_S X')^+).\end{aligned}$$

因此

$$X^+ \times_S X'^+ \simeq (X \times_S X')^+.$$

现设 Y 是 $X^+ \times_S X'^+$ 上的概形, 由态射

$$h : Y_{\mathscr{J}} \longrightarrow X \times_S X'.$$

表示. 设 p, q 为从 $X \times_S X'$ 到 X, X' 的投影, 并令 $f = p \circ h$, $g = q \circ h$. 由于

$$\Omega^1_{(X_0 \times_{S_0} X'_0)/S_0} \simeq p_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}) \oplus q_0^*(\Omega^1_{X'_0/S_0})$$

(EGA IV_4, 16.4.23), 有一个自然同构

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(f_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \times \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X'_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(h_0^*(\Omega^1_{(X_0 \times_{S_0} X'_0)/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_Y).\end{aligned}$$

换言之,

$$L_X(Y) \times L_{X'}(Y) \simeq L_{X \times_S X'}(Y).$$

注 0.1.12. [19] 设 $\mathscr{C}$ 是一个对纤维积稳定的范畴, S 是 $\mathscr{C}$ 的对象, T_1, T_2 是 S 上的两个对象. 对 $i = 1, 2$, 设 L_i 和 X_i 是 T_i 上的两个对象, 如下图所示.




图 16: T_i 上的对象 L_i, X_i, 以及 S 上的 T_i.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 12 页; 合卷第 122 页.

于是有一个自然同构

$$(L_1 \times_{T_1} X_1) \times_S (L_2 \times_{T_2} X_2) \simeq (L_1 \times_S L_2) \times_{T_1 \times_S T_2} (X_1 \times_S X_2).$$

因此, 由前一引理得到:

推论 0.1.13. *设 X_1, X_2 是两个 S-概形. 有一个由同构构成的交换图:*




图 17: 推论 0.1.13 中的乘积同构.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

[18] 编者注: 证明作了展开.
[19] 编者注: 此注及其后的推论为新增内容.

现在可以陈述:

命题 0.2. *对每个 S-概形 X, 都可定义 X^+-交换群 L_X 在 X^+-对象 X 上的一个左作用, 具有以下性质:*

(i) *此作用使 X 在 X^+ 上关于 L_X 为形式主齐性的; 即态射*

$$L_X \times_{X^+} X \longrightarrow X \times_{X^+} X$$

是 X^+-函子同构;

(ii) *此作用关于 S-概形 X 具有函子性: 对每个 S-态射 $f : X \to W$, 下图交换;*

$$\begin{array}{ccc} L_X \times_{X^+} X & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle L_f \times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ L_W \times_{W^+} W & \longrightarrow & W \end{array} ;$$

图 18: 命题 0.2(ii) 中作用的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

(iii) *此作用与纤维积可交换: 对任意 S-概形 X_1, X_2, 下图交换.*

$$\begin{array}{ccccc} L_{X_1\times_S X_2} \times_{(X_1\times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & & \longrightarrow & & X_1 \times_S X_2 \\ \simeq\downarrow & \searrow^{\simeq} & & \nearrow & \\ (L_{X_1} \times_S L_{X_2}) \times_{(X_1\times_S X_2)^+} (X_1 \times_S X_2) & \xrightarrow{\simeq} & (L_{X_1} \times_{X_1^+} X_1) \times_S (L_{X_2} \times_{X_2^+} X_2) & & \end{array} .$$

图 19: 作用与纤维积的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

证明.[20] (i) 和 (ii) 分别由 推论 0.1.9 和 0.1.10 得到. 为证明 (iii), 对每个 S-概形 X, 记

$$P(X) = L_X \times_{X^+} X$$

将 (ii) 应用于投影

$$p_i : X_1 \times_S X_2 \longrightarrow X_i$$

得到以下交换方形.

$$\begin{array}{ccc} P(X_1 \times_S X_2) & \longrightarrow & X_1 \times_S X_2 \\ {\scriptstyle L_{p_i} \times p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ P(X_i) & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

图 20: 每个投影 p_i 诱导的方形.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 13 页; 合卷第 123 页.

[20]编者注: 为计入前面新增的内容, 对原文作了修改和展开; 特别地, 这些新增内容详细纳入了原版第 89 页的内容.

对 $i=1,2$, 由这些方形得到交换方形

$$\begin{array}{ccc} P(X_1\times_S X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2 \\ \downarrow & & \| \\ P(X_1)\times_S P(X_2) & \longrightarrow & X_1\times_S X_2 \end{array} .$$

图 21: 命题 0.2(iii) 证明中的乘积方形.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 组件第 14 页; 合卷第 124 页.

将此方形与 推论 0.1.13 结合, 可知其竖直箭头是同构, 并恰好得到 (iii) 中所述的交换图.

注 0.3. 假设 X^+-概形 Y 在 S 上平坦（参见 SGA 1, IV）. 此时可写成

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(g_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}),\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}).$$

注 0.4. 设 $\pi_0:X_0\to S_0$ 是结构态射, 并假设存在一个 $\mathscr{O}_{S_0}$-模 $\omega^1_{X_0/S_0}$, 使得

$$\Omega^1_{X_0/S_0}\simeq\pi_0^*(\omega^1_{X_0/S_0}).$$

(特别地, 当 X_0 是一个 S_0-群时就是如此; 参见 II 4.11.) 由下式定义 S 上的函子 L'_X:

$$\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\mathscr{O}_Y). \tag{0.4.1}$$

则对每个 X^+-概形 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)$$

; 换言之,

$$L_X=L'_X\times_S X^+.$$

由于 $L_X\times_{X^+}X=L'_X\times_S X$, L_X 在 X 上的作用诱导出 L'_X 在 X 上的作用, 而此作用保持 $p_X:X\to X^+$.[21] 事实上, 若 Y 是一个 S-概形, $h:Y\to X$ 是一个 S-态射, 且 $m\in L'_X(Y)$, 则 h 和 $m\cdot h$ 在 $Y_{\mathscr{J}}$ 上的限制相同; 也就是说,

$$p_X(m\cdot h)=p_X(h).$$

注 0.5. 沿用 0.4 的假设与记号, 并再假设 Y 是 S 上平坦的 S-概形. 则

$$\mathrm{Hom}_{X^+}(Y,L_X)=\mathrm{Hom}_S(Y,L'_X)=\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0,L_{0X}),$$

其中, 取值于阿贝尔群的 S_0-函子 L_{0X} 由下列恒等式定义（这里 T 是变动的 S_0-概形）:

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,L_{0X})=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T,\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_T). \tag{0.5.1}$$

所以, 使用 II 1 的记号, 我们已证明 L'_X 与 $\prod_{S_0/S}L_{0X}$ 在 $(\mathbf{Sch})/S$ 的下述全子范畴上的限制相同: 其对象为 S 上平坦的 S-概形.

注 0.6. 沿用 0.5 的假设与记号, [22] 再假设 $\pi_0:X_0\to S_0$ 有一个截面 ε_0. 则

$$\omega^1_{X_0/S_0}\simeq\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}).$$

[21] 编者注: 以下对原文作了展开.

[22] 编者注: 新增了以下假设, 原文中仅隐含使用了这一假设.

首先, 不依赖于最后这一假设, 有

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \Gamma\Big(T, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T)\Big).$$

现假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 有限呈示（参见 EGA 0_{I}, 5.2.5）; 特别地, 当 X_0 在 S_0 上局部有限呈示时就是如此（参见 EGA IV_4, 16.4.22）. 若 T 在 S_0 上平坦, 则由 EGA 0_{I}, 6.7.6, 得

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_T}(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T) \simeq \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T,$$

从而

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \Gamma\Big(T, \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\Big).$$

使用 I 4.6.1 中的记号 $\mathbf{W}(\,\cdot\,)$, 我们由此证明了: 对每个在 S_0 上平坦的 S_0-概形 T, 有

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_{0X}) = \mathrm{Hom}_{S_0}\Big(T, \mathbf{W}\Big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big)\Big).$$

总之, 若 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 有限呈示, 并限制到 S 上平坦的 S-概形范畴, 则

$$L'_X = \prod_{S_0/S} \mathbf{W}\Big(\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big), \tag{0.6.1}$$

且由 EGA I, 9.1.1, $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模.

最后, 再假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 是有限秩局部自由的, 例如 X_0 在 S_0 上平滑（此时它自动在 S_0 上局部有限呈示）. 则

$$\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \simeq \underline{\mathrm{Lie}}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}, \tag{0.6.2}$$

其中, 采用略不严格的说法（因为 X_0 未必是一个 S_0-群）, 以 $\underline{\mathrm{Lie}}(X_0/S_0)$ 表示 $\mathscr{O}_{S_0}$-模 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 的对偶. [23]

命题 0.2（及其证明）有两个重要的推论. [24]

推论 0.7. *设 X 是一个 S-概形.*

(a) *X 的每个在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等态射的 S-自同态都是自同构.*

(b) *有群的正合列*

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_X) \xrightarrow{i} \mathrm{Aut}_S(X) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S_{\mathscr{J}}}(X_{\mathscr{J}}).$$

(c) *令 $\mathrm{Aut}_S(X)$ 通过结构迁移作用在第一个群上. 则对每个 $u \in \mathrm{Aut}_S(X)$ 和 $m \in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_X)$, 有*

$$i(u \cdot m) = u\, i(m)\, u^{-1}.$$

[23]编者注: 这一说法由 II 3.3 和 4.11 说明. 事实上, 函子 $L^{\varepsilon_0}_{X_0/S_0}$, 即“$X_0$ 在 S_0 上于 ε_0 处的切空间”, 可由 S_0 上的向量丛 $\mathbf{V}(\varepsilon_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0})) = \mathbf{V}(\omega^1_{X_0/S_0})$ 表示. 其截面层是对偶模 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{O}_{S_0})$; 当 X_0 是一个 S_0-群, 且 ε_0 为单位截面时, 它就是 $\underline{\mathrm{Lie}}(X_0/S_0)$.

[24]编者注: 在 0.7 之外, 新增了在 0.8 的证明中隐含使用的 推论 0.7 bis. 我们指出, 0.8–0.12 以及 0.17 都是 0.7 和 0.7 bis 的推论, 它们在本篇后文中起重要的技术性作用.

证明. 由 0.2(i), $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)$ 下的主齐性集, 因为它显然非空: 它包含由 X 的恒等自同构给出的标定点. [25] 因此, 映射 $m \mapsto m \cdot \mathrm{id}_X$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_0}}(\Omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_X) = L_X(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{X^+}(X,X).$$

设 $m \in L_X(X)$, 并设 $f = m' \cdot \mathrm{id}_X$ 是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 的一个元素. 将 0.2(ii) 用于 f, 得

$$f \circ (m \cdot \mathrm{id}_X) = L_f(X)(m) \cdot f = L_f(X)(m) \cdot (m' \cdot \mathrm{id}_X).$$

另一方面, 由于 f 是 X 的一个 X^+-自同态, 有 $f_{\mathscr{J}} = \mathrm{id}_{X_{\mathscr{J}}}$, 从而 $f_0 = \mathrm{id}_{X_0}$. 由于 L_f 仅依赖于 f_0 （参见 0.1.10 中的编者注 (17)）, 可得 $L_f(X)(m) = m$. 因而前面的等式成为

$$(m' \cdot \mathrm{id}_X) \circ (m \cdot \mathrm{id}_X) = m \cdot (m' \cdot \mathrm{id}_X) = (m + m') \cdot \mathrm{id}_X\,.$$

这表明双射 $m \mapsto m \cdot \mathrm{id}_X$ 将 $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X)$ 的群运算对应到 X 的 X^+-自同态的复合.

首先由此可得, $\mathrm{Hom}_{X^+}(X,X)$ 的每个元素均可逆, 这证明了 (a); 其次可得正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) \xrightarrow{i} \mathrm{Aut}_S(X) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S_{\mathscr{J}}}(X_{\mathscr{J}}),$$

这证明了 (b).

刚刚定义的态射 i 关于 X 的同构具有函子性, 因为它通过结构由 L_X 在 X^+ 上对 X 的作用定义, 而由命题 0.2(ii), 这一作用本身就关于 X 具有函子性. [26] 因此, X 在 S 上的每个自同构 u 都通过结构迁移诱导同构

$$h : \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) \quad \text{及} \quad f : \mathrm{Aut}_S(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_S(X)$$

使下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) & \xrightarrow{\quad i \quad} & \mathrm{Aut}_S(X) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle h} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Hom}_{X^+}(X,L_X) & \xrightarrow{\quad i \quad} & \mathrm{Aut}_S(X) \end{array}$$

图 22: i 关于结构迁移的函子性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 16; 合订本页 126; 印刷页 116.

因此 $f \circ i = i \circ h$. 另一方面, f 可由下列交换图描述.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad a \quad} & X \\ \Big\downarrow{\scriptstyle u} & & \Big\downarrow{\scriptstyle u} \\ X & \xrightarrow{\quad f(a) \quad} & X \end{array}$$

图 23: 自同构 f 通过关于 u 的共轭作用.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 16; 合订本页 126; 印刷页 116.

换言之,

$$f(a) = u \circ a \circ u^{-1} \qquad \text{对每个} a \in \mathrm{Aut}_S(X).$$

[25] 编者注: 以下对原文作了展开.
[26] 编者注: 以下对原文作了展开.

现在写出 $i(h(m)) = f(i(m))$, 就得到所述公式.

推论 0.7 bis. *设 X 是一个 S-概形, 使得 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-幺半群. 则 L_X 具有一个 S-幺半群结构, 且有 S-幺半群的分裂正合列:*

$$1 \longrightarrow L'_X \xrightarrow{\ i\ } L_X \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X^+ \longrightarrow 1$$

图 24: 推论 0.7 bis 中 S-幺半群的分裂正合列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 17; 合订本页 127; 印刷页 117.

在 L'_X 上诱导的幺半群运算与其阿贝尔群结构一致. 特别地, 若 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-群, 则 L_X 是一个 S-群, 且为 X^+ 与 L'_X 的半直积.
证明. 由于 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-幺半群,

$$X^+ = \prod_{S_{\mathscr{J}}/S} X_{\mathscr{J}}$$

是一个 S-幺半群; 事实上, 对每个 $Y \to S$, 有 $X^+(Y) = X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$. 对每个 S-概形 Y, 以 $\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}$ 表示对应于拟凝聚 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-代数

$$\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \oplus \mathscr{J}\mathscr{O}_Y,$$

的仿射 $Y_{\mathscr{J}}$-概形; 此代数即与滤过 $\mathscr{O}_Y \supset \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 关联的分次代数. 于是 $L_X(Y)$ 可与 $X_{\mathscr{J}}(\widetilde{Y}_{\mathscr{J}})$ 等同, 而 $L'_X(Y)$ 可与由*零截面* $Y_{\mathscr{J}} \to \widetilde{Y}_{\mathscr{J}}$ 诱导的态射

$$p : X_{\mathscr{J}}(\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}) \longrightarrow X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$$

的核等同. 等价地, 该截面由在理想 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 上为零的 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-代数态射

$$\mathscr{O}_{\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}} \longrightarrow \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$$

诱导. 因此, 对每个 $Y \to S$, 有如下关于 Y 具函子性的幺半群分裂正合列:

$$1 \longrightarrow L'_X(Y) \xrightarrow{\ i\ } L_X(Y) \underset{s}{\overset{p}{\rightleftarrows}} X^+(Y) \longrightarrow 1 \ .$$

图 25: $L_X(Y)$ 的逐点分裂正合列.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 17; 合订本页 127; 印刷页 117.

只须再证明, L'_X 上诱导的幺半群运算与其阿贝尔群结构一致. 设 μ 是 L_X 的幺半群运算, e 是其单位截面. 必须证明, 对每个 $m, m' \in L'_X(Y)$, 有

$$\mu(m \cdot e, m' \cdot e) = (m + m') \cdot e.$$

这有两种证明方法. 第一种方法是重复（0.1.10 $(*)$）的证明, 将其中的态射 $f : X \to W$ 替换为

$$\mu : L_X \times_S L_X \longrightarrow L_X.$$

将 $X^+(Y) = X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$ 与其在 s 下于 $L_X(Y) = X_{\mathscr{J}}(\widetilde{Y}_{\mathscr{J}})$ 中的像等同. 于是对所有 $g, g' \in X_{\mathscr{J}}(Y_{\mathscr{J}})$ 和 $m, m' \in L'_X(Y)$, 得

$$\mu(m \cdot g, m' \cdot g') = L_\mu^{(g,g')}(m, m') \cdot \mu(g, g'). \qquad (\star)$$

这里 $L_\mu^{(g,g')}$ 表示 μ 在点 (g,g') 处的导出态射; 换言之, $\widetilde{Y}_{\mathscr{J}}$ 通过 (g,g') 位于 $L_X \times_S L_X$ 上. 特别地,

$$\mu(m\cdot e, m'\cdot e) = L_\mu^{(e,e)}(m,m')\cdot e.$$

而

$$L_\mu^{(e,e)}(m,m') = L_{\ell_e}(m') + L_{r_e}(m),$$

其中 ℓ_e 和 r_e 分别表示由 e 给出的左平移和右平移. 它们都是 $X_{\mathscr{J}}$ 的恒等映射, 因而 $L_\mu^{(e,e)}(m,m') = m+m'$.

另一种方法是如下论证（参见 [DG70], §II.4, 定理 3.5 的证明）. 由引理 0.1.11, X^+ 与 L_X 的构造都与积可交换, 所以 L'_X 的构造也如此. 由此可知, μ 诱导的态射

$$\mu' : L'_X \times L'_X \longrightarrow L'_X$$

是关于阿贝尔群结构的同态. 此时, 第 II 篇的 引理 3.10 表明, μ' 与阿贝尔群运算一致.

0.8. [27] 现设 X 是一个 S-概形, 使得 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个 $S_{\mathscr{J}}$-群. 假设存在一个 S-态射

$$P : X \times_S X \longrightarrow X$$

其基变换

$$P_{\mathscr{J}} : X_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} X_{\mathscr{J}} \longrightarrow X_{\mathscr{J}}$$

是 $X_{\mathscr{J}}$ 的群运算. 一个重要特例是 X 为 S-群且 P 为其群运算的情形. 我们得到态射

$$L_P : L_X \times_S L_X \simeq L_{X\times_S X} \longrightarrow L_X.$$

事实上, 这一态射不依赖于 P, 因为它可以由 $X_{\mathscr{J}}$ 的群运算 $P_{\mathscr{J}}$ 计算出来, 下面即说明这一点.[28]

由命题 0.2(ii) 和 (iii), 对每个 $Y\to S$, 每个 $x,x'\in X(Y)$ 以及每个 $m,m'\in L'_X(Y)$, 有

$$\begin{aligned} P(m\cdot x, m'\cdot x') &= P\big((m,m')\cdot(x,x')\big) \\ &= L_P^{(x,x')}(m,m')\cdot\mu(g,g'), \end{aligned}$$

其中 g 和 g' 分别为 x 和 x' 在 $X^+(Y)$ 中的像. 此外（参见 0.10 的证明）, $L_P^{(x,x')} = L_\mu^{(g,g')}$, 而由 0.7 bis $(\star)$, 它是在 $L_X(Y)$ 中由等式

$$L_\mu^{(g,g')}(m,m')\cdot\mu(g,g') = \mu(m\cdot g, m'\cdot g')$$

定义的 $L'_X(Y)$ 的元素.

以 $\times$ 代替 μ 表示 L_X 的群运算, 并以 Ad 表示 X^+ 在 L'_X 上的*伴随作用*. 此作用经由 X_0 分解, 且由 X_0 在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随作用诱导. 则

$$\begin{aligned} L_\mu^{(g,g')}(m,m')\times g\times g' &= m\times g\times m'\times g' \\ &= \big(m\times \mathrm{Ad}(g)(m')\big)\times g\times g', \end{aligned}$$

因而

$$L_P^{(x,x')}(m,m') = m\times \mathrm{Ad}(g)(m').$$

我们由此证明了:

[27]编者注: 在此插入编号 0.8, 以标明从这里回到原文.
[28]编者注: 以下对原文作了展开.

命题 0.8. *设 $P : X \times_S X \to X$ 是一个 S-态射, 使得 $P_{\mathscr{J}}$ 赋予 $X_{\mathscr{J}}$ 一个 $S_{\mathscr{J}}$-群结构. 以 $\times$ 表示 L'_X 的群运算, 以 $(m, x) \mapsto m \cdot x$ 表示定义 L'_X 在 X 上的作用的态射 $L'_X \times_S X \to X$, 并设*

$$\mathrm{Ad} : X^+ \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(L'_X)$$

是 X^+ 在 L'_X 上的伴随作用, 它由 X_0 在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随作用诱导. 则对每个 $S' \to S$, 每个 $x, x' \in X(S')$ 和每个 $m, m' \in L'_X(S')$, 有

$$P(m \cdot x, m' \cdot x') = (m \times \mathrm{Ad}(p_X(x))(m')) \cdot P(x, x'). \tag{0.8.1}$$

若 X 是一个 S-群, 我们将以 $*$ 表示其运算, 以 e 表示其单位截面, 以 i 表示由下式定义的 S-态射:

$$i(m) = m \cdot e$$

此式对每个 $S' \to S$ 及每个 $m \in L'_X(S')$ 成立.

推论 0.9. *设 X 是一个 S-群. 则 X^+ 自然成为一个 S-群, 且 p_X 是 S-群态射. 此外, S-态射*

$$i : L'_X \longrightarrow X, \qquad m \longmapsto m \cdot e,$$

是从 L'_X 到 $\mathrm{Ker}(p_X)$ 的 S-群同构, 而且对每个 $S' \to S$, 每个 $x' \in X(S')$ 以及每个 $m \in L'_X(S')$, 有

$$m \cdot x' = (m \cdot e) * x' = i(m) * x'. \tag{0.9.1}$$

前两个断言已经在 0.1.2 中证明. 由于 X 是 X^+ 上关于 $L_X = L'_X \times_S X^+$ 的形式主齐性空间, 态射 i 确实是从 L'_X 到 p_X 的核的 S-函子同构. i 是群态射以及公式（0.9.1）, 分别由（0.8.1）取 $x = x' = e$ 及取 $x = e,\ m' = 1$ 得到.

推论 0.10. *设 X 是一个 S-群. 沿用上述记号, 对每个 $S' \to S$, 每个 $x \in X(S')$ 及每个 $m' \in L'_X(S')$, 有*

$$x * i(m') * x^{-1} = i(\mathrm{Ad}(p_X(x))(m')). \tag{0.10.1}$$

此式由等式 $i(m') * x^{-1} = m' \cdot x^{-1}$ 及（0.8.1）取 $m = 1$ 和 $x' = x^{-1}$ 得到.

因此, 当 X 为 S-群时, 我们已明确确定了 $X \to X^+$ 的核以及 X 的内自同构在此核上的作用. 现在将看到, 对某些未必可表的 S-群函子, 也能做同样的事. 有一种情形将对我们有用, 即第 I 篇, 1.7 中的函子 $\underline{\mathrm{Aut}}$. 我们立刻在下一命题中陈述这一结果.

命题 0.11. *设 E 是一个 S-概形, 并置 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. S-群函子态射*

$$p_X : X \longrightarrow X^+$$

的核可典范地与由下式定义的交换 S-群函子 L'_X 等同:

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}\right),$$

其中 Y 表示一个变动的 S-概形.

事实上, 对变动的 S-概形 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) &= \mathrm{Hom}_S(Y_{\mathscr{J}}, X) \\ &= \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}(E \times_S Y_{\mathscr{J}}) \\ &= \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}((E \times_S Y) \times_Y Y_{\mathscr{J}}).\end{aligned}$$

将 0.7 (b) 用于 Y-概形 $E \times_S Y$, 得到群同构

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) \simeq \mathrm{Ker}\Big(\mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)\Big).$$

容易验证, 此同构关于 S-概形 Y 具有函子性. 因此它给出 S-群同构

$$L'_X \simeq \mathrm{Ker}(X \longrightarrow X^+),$$

这就完成了命题 0.11 的证明.

推论 0.12. [29] *沿用 0.11 的记号: E 是一个 S-概形, 且 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. X 在 L'_X 上有一个自然作用 f, 定义如下. 对每个 S-概形 Y, 有*

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

及

$$\mathrm{Hom}_S(Y, L'_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} Y_0}}\left(\Omega^1_{E_0 \times_{S_0} Y_0/Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E \times_S Y}\right).$$

这里有

$$\Omega^1_{E_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \simeq \Omega^1_{E_0 \times_{S_0} Y_0/Y_0}$$

(见 EGA IV_4, 16.4.5). 第一个群通过结构迁移作用在第二个群上, 且此作用关于 Y 具有函子性. 于是, 对每个 $Y \to S$, $x \in \mathrm{Hom}_S(Y, X)$ 及 $m \in \mathrm{Hom}_S(Y, L'_X)$, 有

$$x\, i(m)\, x^{-1} = i(f(x)m), \tag{0.12.1}$$

事实上, 这是将 0.7 (c) 用于 Y-概形 $E \times_S Y$ 的结果.

回顾 0.13. 拟凝聚模在有限呈示态射下的正像是拟凝聚的. 在相同假设下, 正像的构造与平坦基变换可交换. 在下述情形中,

$$\begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{\ g'\ } & T' = T \times_S S' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{\ g\ } & S' \end{array}$$

图 26: 回顾 0.13 中的平坦基变换方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 20; 合订本页 130; 印刷页 120.

若 f（从而 f'）有限呈示, 且 g（从而 g'）平坦, 则对每个拟凝聚 $\mathscr{O}_T$-模 $\mathscr{F}$, 有

$$f_*(\mathscr{F}) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'} = f'_*(\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}),$$

或者更简洁地写成

$$g^*(f_*\mathscr{F}) = f'_*(g'^*\mathscr{F}).$$

更一般地, 当态射 f 拟紧且拟分离时, 这两个事实仍成立; 见 EGA I, 9.2.1, 以及拟紧分离情形下的 EGA III_1, 1.4.15 （同时考虑 EGA III_2, Err_{III} 25）, 另见 EGA IV_1, 1.7.4 和 1.7.21.

[29] 编者注: 已将“注”改为“推论”.

注 0.14. [30] 回到 0.11 的记号: 设 E 是一个 S-概形, 置 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 并设 L'_X 是由下式定义的交换 S-群函子:

$$\begin{aligned} L'_X(Y) &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0\times_{S_0}Y_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y}\right) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E\times_S Y}}\left(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y}\right) \\ &= \Gamma\Big(E\times_S Y, \widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E\times_S Y}}\left(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y, \mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y}\right)\Big). \end{aligned}$$

假设 Y 在 S 上平坦. 此时有同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y} \xleftarrow{\sim} (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y \xrightarrow{\sim} (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}.$$

再假设 E 在 S 上有限呈示. 则 $\Omega^1_{E/S}$ 是一个有限呈示 $\mathscr{O}_E$-模（EGA IV_4, 16.4.22）, 因而由 EGA 0_I, 6.7.6, 得

$$\begin{aligned} &\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E\times_S Y}}\left(\Omega^1_{E/S}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y, (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y\right) \\ &\quad\simeq \widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_E}\left(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E\right)\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_Y. \end{aligned}$$

设 $\pi : E \to S$ 和 $g : Y \to S$ 是结构态射. 将 0.13 用于下图

$$\begin{array}{ccc} E & \xleftarrow{\ g'\ } & E\times_S Y \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ S & \xleftarrow{\ g\ } & Y \end{array}$$

图 27: 注 0.14 中使用的结构态射基变换方块.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇页 21; 合订本页 131; 印刷页 121.

及 $\mathscr{O}_E$-模

$$\mathscr{F} = \widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_E}\left(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E\right).$$

得到

$$\begin{aligned} \Gamma(E\times_S Y, g'^*\mathscr{F}) &= \Gamma(Y, \pi'_* g'^*\mathscr{F}) \\ &= \Gamma(Y, g^*\pi_*\mathscr{F}) \\ &= W(\pi_*\mathscr{F})(Y). \end{aligned}$$

因此, 若 E 在 S 上有限呈示, 则在 S 上平坦的 S-概形范畴上, 有

$$L'_X = W\left(\pi_*\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\right) \tag{0.14.1}$$

. 还要注意, 由 EGA I, 9.1.1 和 9.2.1, 施以 W 的这个模是拟凝聚的.

设 L_0 是 S_0-函子[31]

$$L_0 = W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\right).$$

回到 $L'_X(Y)$ 的定义, 并使用同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_{E\times_S Y} \simeq (\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},$$

[30]编者注: 本注的第一部分作了展开, 并新增了第二部分.
[31]编者注: 以下为新增内容.

同样的论证给出

$$L'_X(Y) = L_0(Y_0) = L_0(Y \times_S S_0) = \left(\prod_{S_0/S} L_0\right)(Y).$$

所以, 在 S 上平坦的 S-概形范畴上, 有

$$L'_X = \prod_{S_0/S} W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\right).$$

0.12 中定义的 X 在 L'_X 上的作用是否来自 $X_0 = \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0}(E_0)$ 在 L_0 上的作用, 并非显然. 然而, 当 E 还在 S 上平坦时, 情形确实如此.

事实上, 此时有典范同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_E \simeq \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_E \simeq \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0},$$

因而

$$L_0 \simeq W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0}\right)\right),$$

且

$$L'_X = \prod_{S_0/S} W\left(\pi_{0*}\widetilde{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_{E_0}}\left(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0}\right)\right). \tag{0.14.2}$$

于是对每个 S_0-概形 T, 有

$$L_0(T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} T}}\left(\Omega^1_{E_0 \times_{S_0} T/T}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0 \times_{S_0} T}\right).$$

此外,

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, X_0) = \mathrm{Aut}_T(E_0 \times_{S_0} T)$$

通过结构迁移作用在 $L_0(T)$ 上, 且关于 T 具有函子性. 最后, 对每个 S 上平坦的 S-概形 Y,

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X) = \mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y)$$

通过结构迁移在 $L'_X(Y) = L_0(Y_0)$ 上的作用经由 $\mathrm{Aut}_{Y_0}(E_0 \times_{S_0} Y_0)$ 分解.

最后, 从 SGA 1 第 III 篇摘出以下两个命题.

命题 0.15. *(SGA 1, 第 III 篇, 6.8)* [32] *对每个在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑的仿射 $S_{\mathscr{J}}$-概形 Y, 都存在一个在 S 上平滑的 S-概形 X, 使得 $X \times_S S_{\mathscr{J}} \simeq Y$; 这样的 X 在相差一个未必唯一的同构的意义下唯一.*

命题 0.16. *(SGA 1, 第 III 篇, 5.5)* [33] *设 X 是一个在 S 上平滑的 S-概形. 对每个仿射 S-概形 Y, 典范映射*

$$p_X(Y) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) = \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}})$$

是满射.

推论 0.17. *设 E 是一个在 S 上平滑的仿射 S-概形, 并置 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$. 对每个仿射 S-概形 Y, 典范映射*

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}_Y(E \times_S Y) = \mathrm{Hom}_S(Y, X) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+) \\ &= \mathrm{Aut}_{Y_{\mathscr{J}}}(E_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} Y_{\mathscr{J}})\end{aligned}$$

[32]编者注: 这个“整体”提升结果使用了同上 4.1 的“局部”提升结果, 后者是在 S 局部 Noether 的假设下陈述的; 一般情形见 EGA IV$_4$, 18.1.1.

[33]编者注: 这是 EGA IV$_4$, 17.3.1（及 17.1.1）所采用的“(形式) 平滑”定义的直接推论.

是满射.

事实上, $Y \times_S E$ 在仿射概形 Y 上仿射, 因而是仿射的. 应用 0.16, 可知每个 $S_{\mathscr{J}}$-态射

$$Y_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} E_{\mathscr{J}} \longrightarrow E_{\mathscr{J}}$$

都可扩张为一个 S-态射

$$Y \times_S E \longrightarrow E.$$

换言之,[34] $Y_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} E_{\mathscr{J}}$ 的每个 $Y_{\mathscr{J}}$-自同态都可提升为 $Y \times_S E$ 的一个 Y-自同态. 此时 0.7 (a) 表明, $Y_{\mathscr{J}} \times_{S_{\mathscr{J}}} E_{\mathscr{J}}$ 的每个 $Y_{\mathscr{J}}$-自同构都可提升为 $Y \times_S E$ 的一个 Y-自同构, 这正是所断言的性质.

1. 扩张与上同调

1.1.

设 $\mathscr{C}$ 是对纤维积稳定的范畴. [35] 设 S 是 $\mathscr{C}$ 的对象, G 是可表的 S-群, F 是取值于交换群且带有 G 作用的 S-函子. 上同调群 $H^n(G,F)$ 已在 I 5.1 中定义. 回忆它们是记为 $C^*(G,F)$ 的一个复形的上同调群. 记

$$(G/S)^n = G \times_S \cdots \times_S G \qquad (n \text{ 个因子}),$$

则有

$$C^n(G,F) = \mathrm{Hom}_S((G/S)^n, F).$$

由于 G 可表, 因而每个 $(G/S)^n$ 也可表, 故还有

$$C^n(G,F) = F((G/S)^n).$$

由此及余边界算子的定义可知, 复形 $C^*(G,F)$ 仅依赖于 F 在 $\mathscr{C}/S$ 的某个满子范畴上的限制, 其对象是 G 在 S 上的笛卡尔幂. 因此:

引理 1.1.1. *设 $\mathscr{C}$ 是对纤维积稳定的范畴, S 是 $\mathscr{C}$ 的对象, G 是可表的 S-群. 用 $\mathscr{C}(G)$ 表示 $\mathscr{C}/S$ 中以 G 在 S 上的笛卡尔幂为对象的满子范畴. 设 F 和 F' 是两个取值于交换群且带有 G 作用的 S-函子. 若 F 和 F' 在 $\mathscr{C}(G)$ 上的限制相同, 则有典范同构*

$$H^*(G,F) \xrightarrow{\sim} H^*(G,F').$$

1.1.2. 上同调与标量限制.[36]

再记录一个比较结果. 设 $T \to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射. 若 F 是取值于交换群的 T-函子, 则由标量限制得到的函子 (参见 第 II 篇, 1),

$$F_1 = \prod_{T/S} F,$$

是取值于交换群的 S-函子, 并且有取值于群的 S-函子之间的态射[37]

$$u : \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(F_1).$$

---

[34]编者注: 对原文稍作修改, 使 0.7 的假设严格适用.

[35]编者注: $\mathscr{C}$ 对纤维积稳定的假设是新增的. 在应用中, 当 $\mathscr{C}$ 为概形范畴 (**Sch**), 或为函子 $(\mathbf{Sch})^\circ \to (\mathbf{Ens})$ 的范畴时, 这一假设成立. 若不作这一假设, 则必须在下面改为假设纤维积 $G \times_S \cdots \times_S G$ 可表.

[36]编者注: 本段的标题是新增的.

现设 G 是取值于群的 S-函子, 并假设由

$$G_T \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F).$$

给定了 G_T 在 F 上的作用. 由 $\prod_{T/S}$ 的定义, 这给出取值于群的 S-函子之间的态射

$$G \longrightarrow \prod_{T/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{T\text{-gr.}}(F).$$

因此, 与 u 复合就给出 G 在 $F_1 = \prod_{T/S} F$ 上的作用. [38]

引理 1.1.2. *在前述假设下, 有典范同构*

$$H^*\left(G, \prod_{T/S} F\right) \simeq H^*(G_T, F).$$

事实上, 由上同调的定义, 标准复形典范同构.

1.2. 群态射的提升.[39]

遵循一般原则, 作如下定义.

定义 1.2.1. *设*

$$1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

*是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群的态射列. 若下列等价条件成立, 则称此列*正合 (exact)*:*

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 下列通常意义下的群的序列正合:*

$$1 \longrightarrow M(S) \xrightarrow{u(S)} E(S) \xrightarrow{v(S)} G(S);$$

(ii) *对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 H, 下列通常意义下的群的序列正合:*

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}(H, M) \xrightarrow{u(H)} \mathrm{Hom}(H, E) \xrightarrow{v(H)} \mathrm{Hom}(H, G).$$

在 (ii) 中取 $H = G$, 可知 v 的截面 (未必保持群结构) 所成的集合要么为空, 要么在 $\mathrm{Hom}(G, M)$ 下主齐性. 假定它非空, 并设

$$s : G \longrightarrow E$$

[37]编者注: 明确地说, 设 $S' \to S$ 及 $\alpha \in \underline{\mathrm{Aut}}_{(T\times_S S')\text{-gr.}}(F_{T\times_S S'})$. 对每个 $U \to T \times_S S'$, 设 $\alpha_U \in \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(F_{T\times_S S'}(U))$ 是由 α 定义的元素. 则 $u(S')(\alpha)$ 是

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(F_1)(S') = \underline{\mathrm{Aut}}_{S'\text{-gr.}}\left(\prod_{T\times_S S'/S'} F_{T\times_S S'}\right)$$

中对每个 $S'' \to S'$ 都满足 $\beta_{S''} = \alpha_{T\times_S S''}$ 的元素 β.

[38]编者注: 明确地说, 对每个 $S' \to S$, $G(S')$ 在 $F_1(S') = F(T \times_S S')$ 上的作用由 $G_T(T \times_S S') = G(T \times_S S')$ 在 $F(T \times_S S')$ 上的作用, 连同与投影 $T \times_S S' \to S'$ 相应的群态射 $G(S') \to G(T \times_S S')$ 给出. 等价地, G_T 在 F 上的作用是一个态射 $G_T \times_T F \to F$. 应用 $\prod_{T/S}$, 并记 $G_1 = \prod_{T/S} G_T$, 由 II 1.2 得到态射 $G_1 \times_S F_1 \to F_1$, 因而得到 G_1 在 F_1 上的作用. G 的作用通过自然态射 $G \to G_1$ 得到, 此态射通过伴随对应于 id_G.

[39]编者注: 此标题是新增的.

是 v 的一个截面. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个 $x \in G(S)$, 元素 $s(x) \in E(S)$ 定义了 E_S 的一个内自同构, 它正规化 M_S (更确切地说, 正规化 M_S 在 u_S 下的像), 因而定义了 M_S 的一个自同构.

附论 1.2.1.1. [40] *若 M 交换, 从集合论角度可见, 这一自同构与所选截面无关, 仅依赖于 x, 且关于 x 是乘法性的. 总之, 每个 M 交换且 v 容许截面的正合列*

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

都确定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(M),$$

称为由扩张 (E) 定义的 G 在 M 上的作用.

定义 1.2.1.2. 我们在 I 2.3.7 中看到, v 容许作为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射的截面, 当且仅当扩张 (E) 作为扩张同构于 M 与 G 关于前述作用的半直积. 这样的 v 的截面称为 *扩张 (E) 的截面*, 简称 *(E) 的截面*.

若 s 是 (E) 的截面, 且

$$m \in \Gamma(M) \simeq \mathrm{Ker}\big(\Gamma(E) \to \Gamma(G)\big)$$

(Γ 的定义见 I 1.2), 则由

$$x \longmapsto u(m)s(x)u(m)^{-1}$$

定义的态射 $G \to E$ 也是 (E) 的截面. [41] 称它为由 m, 或由 $u(m)$, 所定义的内自同构从 s 导出的截面.

引理 1.2.2. *设*

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群的正合列, 其中 M 交换, 且 v 容许截面. 令 G 按 (E) 所定义的方式作用于 M.

(i) *扩张 (E) 典范地定义一个类 $c(E) \in H^2(G, M)$, 此类为零是 (E) 存在截面的充要条件.*

(ii) *若 $c(E) = 0$, 则 (E) 的截面集在 $Z^1(G, M)$ 下主齐性, 并且将 (E) 的截面集模去由 $\Gamma(M)$ 的元素定义的内自同构的作用, 所得集合在 $H^1(G, M)$ 下主齐性.*

(iii) [42] *设 s 是 (E) 的截面. s 在由 $\Gamma(M)$ 定义的内自同构下的共轭所成的集合与 $\Gamma(M)/H^0(G, M)$ 双射.*

证明与通常群的情形完全相同; 从 v 的一个截面出发, 就保证了集合论计算的函子性. 我们简要指出其主要步骤.

(a) 对 v 的每个截面 s, 配给一个态射

$$D_s : G \times G \longrightarrow M$$

它从集合论角度由

$$u(D_s(x, y)) = s(xy)s(y)^{-1}s(x)^{-1}.$$

定义. 下面的计算表明 D_s 是一个 2-余循环.[43] 由标准复形中微分的定义 (I 5.1),

$$(\partial^2 D_s)(x, y, z) = \big(s(x)D_s(y, z)s(x)^{-1}\big) \cdot D_s(x, y)^{-1} \cdot D_s(xy, z)^{-1} \cdot D_s(x, yz).$$

[40] 编者注: 新增编号 1.2.1.1 和 1.2.1.2, 以突出此处引入的概念.
[41] 编者注: 右端的 x 已改为 $s(x)$.
[42] 编者注: 此项是作为 1.2.4(iii) 的对应项新增的. 此断言对 v 的每个截面都成立; 见证明.
[43] 编者注: 为与 I 5.1 相容, 已改正原文.

将 D_s 的定义代入此式, 不使用交换性就得到

$$D_s \in Z^2(G, M).$$

(b) 若 s 和 s' 是 v 的两个截面, 则有态射 $f : G \to M$, 使 $s(x) = f(x)s'(x)$. 则

$$\begin{aligned} D_{s'}(x, y) &= f^{-1}(xy)D_s(x, y)s(x)f(y)s(x)^{-1}f(x) \\ &= D_s(x, y) \cdot f^{-1}(xy) \cdot \big(s(x)f(y)s(x)^{-1}\big) \cdot f(x), \end{aligned}$$

因而

$$D_{s'} = D_s \cdot \partial^1 f.$$

这说明 D_s 在 $H^2(G, M)$ 中的类与所选的 v 的截面 s 无关; 它就是扩张 (E) 的类 $c(E)$. [44]

(c) 设 s 和 s' 是 v 的两个截面, 并设 $m \in \Gamma(M)$. 等式

$$s(x) = m^{-1}s'(x)m \qquad (x \in G(S),\ S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C})$$

等价于

$$s(x) = m^{-1}s'(x)m\, s'(x)^{-1}s'(x), \qquad \text{即} \qquad s = \partial^0 m \cdot s'.$$

特别地, s 在 $\Gamma(M)$ 中的稳定子是满足 $\partial^0 m = e_M$ 的元素 m 所成的子群, 即 $H^0(G, M)$. 这就已经证明了 (iii).

(d) 现在的论证是熟知的.[45] 设 s_0 是 v 的任意截面. 存在一个必然形如 $s = f \cdot s_0$ 的截面 s 为群态射, 即满足 $D_s = 0$, 当且仅当对某个 $f : G \to M$ 有

$$(D_{s_0})^{-1} = \partial^1 f,$$

等价地, 当且仅当 $c(E) = 0$. 这就证明了 (i).

在此情形下, (E) 的截面恰为截面 $s' = h \cdot s$, 其中 $h : G \to M$ 满足 $\partial^1 h = 0$, 即 $h \in Z^1(G, M)$. 此外, 由 (c), 两个这样的截面 $h_1 \cdot s$ 和 $h_2 \cdot s$ 在 $\Gamma(M)$ 下共轭, 当且仅当 h_1 和 h_2 在 $H^1(G, M)$ 中的像相同. 这就证明了 (ii).

仍设

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} G$$

是 M 交换的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群正合列, 并设

$$f : H \longrightarrow G$$

是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射.

考虑 $E_f = H \times_G E$. 它是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 投影 $v_f : E_f \to H$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射; $e_f : E_f \to E$ 也如此. 将 M 通过 u 映到 E, 通过单位态射映到 H, 也定义一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $u_f : M \to E_f$. 因此我们构造了如下 $\widehat{\mathscr{C}}$-群的交换图.

$$\begin{array}{lccccc} (E) & 1 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{u} & E & \xrightarrow{v} & G \\ & & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle e_f} & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ (E_f) & 1 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{u_f} & E_f & \xrightarrow{v_f} & H \end{array}$$

图 28: 拉回扩张 (E_f) 及其到 (E) 的态射.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇第 27 页; 合订本第 137 页; 印刷页码 127.

[44]编者注: 前面这句话是新增的.

[45]编者注: 下面扩充了原文.

立即得到:

引理 1.2.3.

(i) *列* (E_f) *正合.*

(ii) *映射* $s \mapsto e_f \circ s = f'$ *给出满足* $v_f \circ s = \mathrm{id}$ *的态射*

$$s : H \longrightarrow E_f$$

即 v_f *的截面与满足* $v \circ f' = f$ *的态射*

$$f' : H \longrightarrow E$$

即提升 f *的态射* f' *之间的一一对应.*

(iii) *在此对应下,* (E_f) *的截面对应于提升* f *的群态射* f'*.*

将 引理 1.2.2 应用于扩张 (E_f), 并考虑 1.2.3, 得到下面的命题, 它在形式上包含了 引理 1.2.2.

命题 1.2.4. *设*

$$(E) \qquad 1 \longrightarrow M \longrightarrow E \xrightarrow{v} G$$

是 M *交换的* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群正合列. 设* $f : H \to G$ *是* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射, 并假设它提升为一个未必是群态射的态射* $f' : H \to E$*. 令* H *通过复合态射*

$$H \xrightarrow{f'} E \xrightarrow{\mathrm{int}} \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(M).$$

作用于 M*; 此复合态射是乘法性的, 且与* f' *的选择无关.*

(i) *态射* f *典范地定义一个类* $c(f) \in H^2(H, M)$*, 此类为零是存在提升* f *的* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射*

$$f' : H \longrightarrow E$$

的充要条件.

(ii) *若* $c(f) = 0$*, 则提升* f *的* $\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射* f' *所成的集合, 模去由* $\Gamma(M)$ *的元素 (即满足* $v(m) = e$ *的元素* $m \in \Gamma(E)$*) 定义的内自同构的作用后, 所得集合在* $H^1(H, M)$ *下主齐性.*

(iii) *若* $f' : H \to E$ *是提升* f *的群态射, 则* f' *在由* $\Gamma(M)$ *的元素定义的内自同构下的变换所成的集合同构于*

$$\Gamma(M)/\Gamma(M^H) = \Gamma(M)/H^0(H, M).$$

1.3. 群律的扩张.

考虑如下情形: 有 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射

$$(\dagger) \qquad p : X \longrightarrow Y,$$

和一个作用于 X 的交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 M, 使得 X 在 Y 上关于 M_Y 形式主齐性.

若 $g : Y \to Z$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的任意态射, 则 $g \circ p : X \to Z$ 在 M 下不变: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 映射 $(g \circ p)(S)$ 在 $M(S)$ 对 $X(S)$ 的作用下不变. 反过来, 我们将假设对 $n = 1, 2, 3, 4$ 下列条件成立:

$(+)_n$: *从* X^n *到* M *的每个在* M^n *对* X^n *的作用下不变的态射, 都唯一地经过* $p^n : X^n \to Y^n$ *分解, 其中上标* n *表示笛卡尔幂.*

引理 1.3.1.

(i) *若 h 是从 Y 到 M 的态射, 则从集合论角度由 $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ 定义的 X 的自同构 u_h 保持 p 的纤维, 并且与 M 在 X 上的作用可交换.* [46] *因此, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, $x \in X(S)$ 及 $m \in M(S)$, 有*

$$p\big(h(p(x)) \cdot x\big) = p(x), \qquad m \cdot h(p(x)) \cdot x = h(p(m \cdot x)) \cdot m \cdot x.$$

(ii) *此构造给出从 Y 到 M 的态射与保持 p 的纤维并与 M 的作用可交换的 X 的自同构之间的一一对应.*

第一个断言是显然的, 因为 $p(m \cdot x) = p(x)$, 且 M 交换. 反过来, X 的保持 p 的纤维的自同构 u 可从集合论角度写成 $x \mapsto g(x)x$, 其中 g 是某个从 X 到 M 的态射. 若 u 与 M 的作用可交换, 则 g 在 M 下不变, [47] 于是结论由条件 $(+)_1$ 得到.

现在再假设给定了 Y 上的群律及 Y 在 M 上的作用, 即一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$(\ddagger) \qquad f : Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(M).$$

定义 1.3.2. *X 上的合成律*

$$P : X \times X \longrightarrow X,$$

称为容许的 (admissible)*, 若它满足以下两个条件:*

(i) *P 提升了 Y 的群律; 即下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} X \times X & \xrightarrow{\quad P \quad} & X \\ {\scriptstyle (p,p)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y \times Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

图 29: 容许合成律与 Y 上的群律的相容性.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇第 29 页; 合订本第 139 页; 印刷页码 129.

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 及所有 $x, y \in X(S)$, $m, n \in M(S)$, 有*

$$(++) \qquad P(m \cdot x, n \cdot y) = m \cdot f(p(x))(n) \cdot P(x, y).$$

命题 1.3.3. *X 上的群律 $*$ 容许的充要条件是下列四个条件成立:*

(i) *$p : X \to Y$ 是群态射.*

(ii) *由 $i(m) = m \cdot e_X$ 定义的态射 $i : M \to X$ 是从 M 到 $\ker(p)$ 的群同构; 换言之, 从集合论角度有*

$$(m \cdot e_X) * (n \cdot e_X) = (mn) \cdot e_X.$$

(iii) *对每个 $m \in M(S)$ 和 $x \in X(S)$, 有 $m \cdot x = (m \cdot e_X) * x = i(m) * x$.*

(iv) *X 的内自同构依照集合论公式*

$$x * i(m) * x^{-1} = i\big(f(p(x))m\big).$$

作用于 $\ker(p)$.

[46] 编者注: 这里及下文中, 将 "与 p 及 M 的作用可交换" 改成了 "保持 p 的纤维, 并与 M 的作用可交换". 随后的等式也是新增的.

[47] 编者注: 事实上, $mg(x)x = mu(x) = u(mx) = g(mx)mx$, 因而 $g(mx) = g(x)$.

证明是直接的.

引理 1.3.4. [48] *设 $h : Y \to M$ 是态射, 并设 u_h 是 X 的自同构 $x \mapsto h(p(x)) \cdot x$ (参见 1.3.1). 设 P 是 X 上的容许合成律 (分别地, 容许群律), 并设 P' 是由 P 通过 u_h 得到的 X 上的合成律, 即*

$$P'(x, y) = u_h^{-1}(P(u_h(x), u_h(y))).$$

则:

(i) *P' 是容许合成律 (分别地, 容许群律).*

(ii) *对每个 $x, y \in X(S)$, 其中 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 置 $v = p(x)$ 和 $w = p(y)$. 则*

$$P'(x, y) = h(vw)^{-1} \cdot h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y) = (\partial^1 h)(p(x), p(y)) \cdot P(x, y).$$

证明. 有 $u_h^{-1} = u_{h^\vee}$, 其中 $h^\vee : Y \to M$ 由 $h^\vee(y) = h(y)^{-1}$ 定义. 由 1.3.2(i) 和 (ii),

$$P(h(v) \cdot x, h(w) \cdot y) = h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y), \qquad p(P(x, y)) = vw,$$

因而

$$P'(x, y) = h(vw)^{-1} \cdot h(v) \cdot f(v)(h(w)) \cdot P(x, y) = (\partial^1 h)(p(x), p(y)) \cdot P(x, y).$$

立即可知, P' 满足 1.3.2 的条件 (i) 和 (ii).

定义 1.3.5. *通过 1.3.4 的过程彼此得到的两个容许合成律称为*等价的. [49]

命题 1.3.6. *假定 X 上存在一个容许合成律. 则:*

(i) *存在一个典范确定的类 $c \in H^3(Y, M)$, 此类为零是 X 上存在一个容许的结合合成律的充要条件.*

(ii) *若 $c = 0$, 则 X 上容许的结合合成律所成的集合 (分别地, 它们的等价类所成的集合) 在 $Z^2(Y, M)$ (分别地, $H^2(Y, M)$) 下主齐性.*

证明分为几个步骤.

(a) 设 P 是 X 上的容许合成律. 由于 P 提升了 Y 的结合合成律, 存在唯一的态射 $a : X^3 \to M$, 使得

$$(*) \qquad P(x, P(y, z)) = a(x, y, z) \cdot P(P(x, y), z).$$

应用条件 1.3.2(i) 和 (ii), 立即可见 a 在 M^3 对 X^3 的作用下不变. [50] 因此条件 $(+)_3$ 给出:

(1) 存在唯一的态射 $DP : Y^3 \to M$, 使得

$$P(x, P(y, z)) = DP(p(x), p(y), p(z)) \cdot P(P(x, y), z),$$

[48]编者注: 为用于 1.3.6 证明的步骤 (e), 扩充了陈述及其证明.

[49]编者注: 这确实是等价关系, 因为 $u_h^{-1} = u_{h^\vee}$.

[50]编者注: 对 $x, y, z \in X(S)$, 置 $u = p(x)$, $v = p(y)$ 及 $w = p(z)$. 则

$$\begin{aligned} P(mx, P(m'y, m''z)) &= P(mx, m' f(v)(m'') P(y, z)) \\ &= m f(u)(m') f(uv)(m'') P(x, P(y, z)). \end{aligned}$$

另一方面, 由于 $p(P(x, y)) = uv$, 也有

$$\begin{aligned} P(P(mx, m'y), m''z) &= P(m f(u)(m') P(x, y), m''z) \\ &= m f(u)(m') f(uv)(m'') P(P(x, y), z). \end{aligned}$$

将这些等式与 $(*)$ 比较, 得到 $a(mx, m'y, m''z) = a(x, y, z)$.

且 P 结合当且仅当 $DP = 0$.

(b) 利用前式逐步计算 $P(P(P(x,y),z),t)$. 置

$$p(x) = u, \qquad p(y) = v, \qquad p(z) = w, \qquad p(t) = h.$$

得到[51]如下五边形图, 其中箭头 $a \xrightarrow{m} b$ 表示 $b = m \cdot a$.




图 30: 用于计算结合性障碍的五边形比较图.

原生 TEX 重建; 来源定位: Polo–Gille Exp3-14oct24.pdf, 分篇第 30 页; 合订本第 140 页; 印刷页码 130.

由此得到

$$DP(u,v,w) \cdot DP(u,vw,h) \cdot f(u)(DP(v,w,h)) \cdot DP(u,v,wh)^{-1} \cdot DP(uv,w,h)^{-1} = e_M,$$

即 $\partial^3 DP(u,v,w,h) = e_M$. 此外, 前式左端可借助 P 和 a 表为某个态射 $X^4 \to M$ 在 (x,y,z,t) 处的值.

由 $(+)_4$ 中的唯一性断言可知, 使同一态射分解的 $\partial^3 DP$ 和 e_M 相等. 因而:

(2) DP 是余循环; 即 $DP \in Z^3(Y,M)$.

(c) 若 P 和 P' 是 X 上的两个容许合成律, 则存在唯一的态射

$$b : X^2 \longrightarrow M$$

使 $P'(x,y) = b(x,y)P(x,y)$. 对 P 和 P' 应用 1.3.2(ii), 可知 b 在 M^2 下不变, 因而由 $(+)_2$:

(3) 对每一对容许合成律 (P,P'), 存在唯一的态射 $d(P,P') : Y^2 \to M$, 使得

$$P'(x,y) = d(P,P')(p(x),p(y)) \cdot P(x,y),$$

从而使容许合成律所成的集合在

$$\mathrm{Hom}(Y^2, M) = C^2(Y,M).$$

下主齐性.

(d) 在前述条件下, 有

$$DP' - DP = \partial^2 d(P,P'). \tag{4}$$

(e) 合成律 P 和 P' 等价当且仅当有态射

$$h \in C^1(Y,M) = \mathrm{Hom}(Y,M)$$

使 $d(P,P') = \partial^1 h$. 这由等价的定义和 1.3.4(ii) 得到.

[51]编者注: 下图是新增的.

(f) 现在只须作出结论. 我们寻求一个结合的 P', 即 $DP' = e_M$. 而 DP 是余循环, 由 (3) 和 (4), 它在 $H^3(Y, M)$ 中的类不依赖于所选容许合成律 P. 此类就是所求的障碍 c. 能选取适当的 P' 当且仅当 $c = 0$. 事实上, 任取 P 后, 由 (1), 必须解

$$0 = DP' = DP + \partial^2 d(P, P'),$$

由 (3) 和 (4), 这可能当且仅当 $c = 0$. 再由 (3) 和 (4), 结合合成律 P' 所成的集合在 $Z^2(Y, M)$ 下主齐性. 由 (e), 结合合成律 P' 模等价所成的集合在 $H^2(Y, M)$ 下主齐性.

2. 群概形态射的无穷小扩张

沿用 §0 的记号. 设 Y 和 X 是两个 S-群函子, 并设 M 是群同态 $p_X : X \to X^+$ 的核. 于是有 S-群函子的正合列

$$1 \longrightarrow M \longrightarrow X \xrightarrow{p_X} X^+.$$

由 X^+ 的定义, 有同构

$$\mathrm{Hom}_S(Y, X^+) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}),$$
$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Y, X^+) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S_{\mathscr{J}}\text{-gr}}(Y_{\mathscr{J}}, X_{\mathscr{J}}).$$

映射

$$\mathrm{Hom}_S(Y, p_X) : \mathrm{Hom}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(Y, X^+)$$

将 S-态射 $f : Y \to X$ 映到 S-态射 $f^+ : Y \to X^+$, 后者在这些同构下对应于由 f 作基变换得到的 $S_{\mathscr{J}}$-态射 $f_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$. 若 M 交换, 则 命题 1.2.4 适用于这一情形.

2.0. [52] 以下考虑 Y 在 S 上平坦, 而 X 为下列两类之一的 S-群函子的情形:

a X 是 S-群概形;

b $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 其中 E 是 S 上有限呈示的 S-概形.

用 $(\mathrm{Flat})/S$ 表示在 S 上平坦的 S-概形所成的范畴. 在情形 a, 分别地, 情形 b 中, S-群函子 $M = \mathrm{Ker}(X \to X^+)$, 它在 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的限制 L, 以及 X 的内自同构在 M 上的作用, 已在 0.9, 0.5 和 0.10, 分别地, 在 0.11, 0.14 和 0.12 中算出.

更明确地说, 在情形 a 中, 设 L_0 是取值于交换群的 S_0-函子, 它对每个 S_0-概形 T_0 由下式定义:

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T_0, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}\right).$$

群 X_0 通过它在 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 上的伴随表示作用于此函子, 并且对每个 S-概形 T 有

$$L = \prod_{S_0/S} L_0; \qquad L(T) = L_0(T \times_S S_0)$$

在情形 b 中, 设 $\pi : E \to S$ 是结构态射. 则 L 是 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的交换群函子, 由

$$\mathrm{Hom}_S(T, L) = \Gamma\Big(T, \pi_* \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_T\Big),$$

定义, 而将 X 看成 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的函子时, 它如 0.12 中所述作用于它. 在两种情形中, 都有 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的群函子正合列:

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow X \longrightarrow X^+. \tag{E}$$

[52] 编者注: 为便于后文引用, 新增了编号 2.0.

由于 Y 在 S 上平坦, 引理 1.1.1 表明, 群 $H^i(Y,M)$ 仅依赖于 M 在 $(\mathrm{Flat})/S$ 上的限制 L. 在情形 a 中, $L=\prod_{S_0/S}L_0$, 引理 1.1.2 给出同构

$$H^i(Y,L)\simeq H^i(Y_0,L_0).$$

综合以上各点, 命题 1.2.4 给出如下结果. [53]

定理 2.1. *设 S 是概形, $\mathscr{I}\supset\mathscr{J}$ 是两个满足 $\mathscr{I}\mathscr{J}=0$ 的拟凝聚理想, 分别定义闭子概形 S_0 和 $S_{\mathscr{J}}$. 设*

X 是类型 a 或 b 的 S-群函子, 而 L_0 和 L 如上所述;

Y 是在 S 上平坦的 S-群概形, $f_{\mathscr{J}}:Y_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 是 $S_{\mathscr{J}}$-群态射.

则:

i 态射 $f_{\mathscr{J}}$ 可提升为 S-群态射 $Y\to X$, 当且仅当下列两个条件成立:

- *i_1 $f_{\mathscr{J}}$ 可提升为 S-函子态射 $Y\to X$. 由 命题 1.2.4, 这定义了 Y 在 L 上的作用, 且与所选提升无关. 在情形 a 中, 所得的 Y_0 在 L_0 上的作用来自 $f_0:Y_0\to X_0$ 及 X_0 在 L_0 上的伴随作用.*
- *i_2 典范定义的障碍 $c(f_{\mathscr{J}})\in H^2(Y,L)$ 为零. 在情形 a 中, 此群同构于 $H^2(Y_0,L_0)$.*

(ii) *若 i 中的条件成立, 则延拓 $f_{\mathscr{J}}$ 的 S-群函子态射 $Y\to X$ 所成的集合 $\mathcal{E}$ 在 $Z^1(Y,L)$ 下主齐性, 后者在情形 a 中同构于 $Z^1(Y_0,L_0)$. 此外, 将 $\mathcal{E}$ 模去 X 的由如下截面定义的内自同构的作用: 这些 S 上的截面在 $S_{\mathscr{J}}$ 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面; 所得商集在 $H^1(Y,L)$ 下主齐性, 后者在情形 a 中同构于 $H^1(Y_0,L_0)$.*

(iii) *若 $f:Y\to X$ 是延拓 $f_{\mathscr{J}}$ 的 S-群函子态射, 则通过这些内自同构由 f 得到的态射 $Y\to X$ 所成的集合同构于*

$$\Gamma(L)/H^0(Y,L),$$

并且在情形 a 中同构于 $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0,L_0)$.

注 2.1.1. [54] 若 $f,f':Y\to X$ 是延拓 $f_{\mathscr{J}}$ 的 S-群函子态射, 则得到一个余循环

$$d(f,f')\in Z^1(Y,L)\quad(\simeq Z^1(Y_0,L_0)\text{ 在情形 (a) 中})$$

使得

$$f'=d(f,f')\cdot f. \tag{*}$$

[55] 用 $\bar{d}(f,f')$ 表示 $d(f,f')$ 在 $H^1(Y,L)$ 中的像, 在情形 a 中等价地表示它在 $H^1(Y_0,L_0)$ 中的像.

注 2.2. 沿用前述记号; 特别地, Y 在 S 上平坦. 在情形 b 中, 公式 (0.14.1) 将 L 与

$$\mathbf{W}\Big(\pi_*\operatorname{Hom}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S},\mathscr{J}\mathscr{O}_E)\Big).$$

---

[53]编者注: 原来放在 定理 2.1 陈述中并占据原版第 113 页大部分篇幅的定义, 已移到前面.

[54]编者注: 此注与 4.5.1 类似, 是为引入 4.38 中所用的记号 $d(f,f')$ 及 $\bar{d}(f,f')$ 而新增的. 因此, 2.1(ii) 中关于 $\mathcal{E}$ 本身的部分也是新增的.

[55]编者注: 我们遵循原文的符号约定. 也可以写成 $f'=d(f',f)\cdot f$, 但如此一来, 为对两个浸入 $i,i':Y\hookrightarrow X$ 保留 4.27 中的等式 $d_1(d(i,i'))=d(Y,i'(Y))$, 就必须改变 4.5.1 中引入的类 $d(Y,Y')$ 的符号. 这又会改变 4.8, 4.14 和 4.17 中的符号. 我们选择保留原文的全部符号, 它们是正确的.

在 (Flat)/S 上的限制等同. 在情形 a 中, 再假设 X 在 S 上局部有限呈示. 则公式 (0.6.1) 将 L 与

$$\prod_{S_0/S} \mathbf{W}\Big(\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big).$$

在 (Flat)/S 上的限制等同. 在两种情形中, 由 EGA I, 9.1.1, 用来构造 $\mathbf{W}$ 的模都是拟凝聚的. 再假设 Y 在 S 上仿射. [56] 由 I, 5.3, 得到

$$H^i(Y,L) = H^i(Y_0,L_0) = H^i\Big(Y_0, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})\Big) \qquad \text{在情形 (a) 中,}$$
$$H^i(Y,L) = H^i\Big(Y, \pi_* \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_E}(\Omega^1_{E/S}, \mathscr{J}\mathscr{O}_E)\Big) \qquad \text{在情形 (b) 中.}$$

注 2.3.

(1) 由 0.16 和 0.17, 当 Y 仿射且

$$\begin{cases} X \text{ 在}S \text{ 上平滑}, & \text{在情形 (a) 中,} \\ E \text{ 在}S \text{ 上平滑且仿射}, & \text{在情形 (b) 中.} \end{cases}$$

时, 条件 i_1 自动成立.

(2) 在这些假设下, Y 仍如 2.0 中那样在 S 上平坦, 则 公式 2.2(a) 和 (0.6.2) 在情形 a 中给出

$$H^i(Y,L) = H^i(Y_0,L_0) = H^i\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big),$$

而在情形 b 中, 由 (0.14.2), 1.1.2 和 I, 5.3,

$$H^i(Y,L) = H^i\Big(Y_0, \pi_{0*} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{E_0}}(\Omega^1_{E_0/S_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{E_0})\Big).$$

[57]

现在对可对角化 S-群 Y (I, 4.4) 陈述几个推论. 若 S 仿射, 则由 I, 5.3.3, 对每个 $n > 0$ 及每个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 F, 都有 $H^n(Y,F) = 0$.

推论 2.4. *设 $S_0 \hookrightarrow S$ 是由幂零理想定义的闭子概形, Y 是可对角化 S-群. 设*

a X 是在 S 上局部有限呈示的 S-群, 或者

b $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 其中 E 是局部有限呈示的 S-概形.

若 $f : Y \to X$ 是 S-群态射, 其基变换 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是单位态射, 则 f 是单位态射.

事实上, 问题在 S 上是局部的, 在情形 b 中也在 E 上是局部的. 因此可假设 S 仿射, 并在情形 b 中假设 E 在 S 上有限呈示. 引入闭子概形 $S_n \subset S$, 它们由定义 S_0 的理想的各次幂定义. 这将断言归结为 S_0 由平方为零的理想定义的情形, 此时断言由 定理 2.1 和 注 2.2 得到.

若不要求 f_0 为单位态射, 则有如下陈述.

推论 2.5. *设 S 和 S_0 如 2.4 中所述, 并且 S 仿射. 设 Y 是可对角化 S-群, X 是 S-群函子, $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是 S_0-群函子态射.*

i [58]

[56]编者注: 此假设及对 I, 5.3 的引用是新增的.

[57]编者注: 前面的内容是新增的; 见 0.14 中的编者注 31.

[58]编者注: 原文陈述为: "假设下列两个性质之一成立: a X 是局部有限呈示的 S-群; b $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 其中 E 在 S 上有限呈示. 则 f_0 可延拓为 S-群态射 $Y \to X$, 当且仅当它可延拓为 S-函子态射 $Y \to X$." 原文还说, 这由定理的 (ii) 项逐步推出. 这个论证似乎不充分. 例如, 若 $\mathscr{I}^3 = 0$ 且 $\mathscr{J} = \mathscr{I}^2$, 并且 $f : Y \to X$ 是提升 f_0 的 S-函子态射, 则 f_0 可提升为一个 $S_{\mathscr{J}}$-群态射 $g_{\mathscr{J}} : Y_{\mathscr{J}} \to X_{\mathscr{J}}$; 但 $g_{\mathscr{J}}$ 是否必可再提升为 S-函子态射 $g : Y \to X$? 无论如何, 断言 i 在后文并不使用, 后文始终假定 X 在 S 上平滑.

(ii) *假定 X 是平滑 S-群, 或者 $X = \underline{\mathrm{Aut}}_S(E)$, 且 E 在 S 上平滑且仿射. 则 f_0 可延拓为 S-群态射 $Y \to X$, 且任意两个延拓都在 X 的某个内自同构下共轭, 此内自同构由一个 S 上的截面定义, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.*

如上引入 S_n. [59] 对于 (ii), 在 S 上平滑的概形必然局部有限呈示. 因此, 在情形 b 中, 平滑且仿射的 E/S 为有限呈示, 所以 2.0(b) 的假设确实满足.

由 0.16 和 0.17, 定理 2.1 的条件 i_1 自动成立. 此外, X_{S_n} 在 S_n 上的每个截面均可提升为 $X_{S_{n+1}}$ 在 S_{n+1} 上的截面: 在情形 a 中这由平滑性得到, 在情形 b 中由 0.17 得到. 因此, 若 f 和 f' 是 f_0 的两个提升, 则通过提升 定理 2.1(ii) 所给出的内自同构, 可逐步使 $f_n = f'_n$. 这就证明了断言.

同一论证结合 注 2.3, 给出:

推论 2.6. *设 $\mathscr{I}$ 是定义 S_0 的 S 的幂零理想, Y 是在 S 上平坦的仿射 S-群, X 是平滑 S-群.*

i 若对每个 $n \geq 0$, 有

$$H^2\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则每个 S_0-群态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$ 都可提升为 S-群态射 $f : Y \to X$.

(ii) *若对每个 $n \geq 0$, 有*

$$H^1\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则任意两个这样的提升在 X 的某个内自同构下共轭, 此内自同构由一个 S 上的截面定义, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.

引理 2.7. *设 S 仿射, G 是仿射 S-群, $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{L}$ 是局部自由 $\mathscr{O}_S$-模. 假设 G 按第 I 篇的意义作用于 $\mathscr{F}$, 因而也作用于 $\mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}$. 设 Λ 是 S 的环, L 是定义 $\mathscr{L}$ 的投射 Λ-模. 则有典范同构*

$$H^*(G, \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{L}) \simeq H^*(G, \mathscr{F}) \otimes_\Lambda L.$$

[60]

设 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{O}_S$-代数 $\mathscr{A}(G)$, 并考虑拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模的复形 $\mathscr{C}$

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A} \longrightarrow \cdots.$$

[61]

由 I, 5.3, $H^*(G, \mathscr{F})$, 分别地, $H^*(G, \mathscr{F} \otimes \mathscr{L})$, 是 $\Gamma(S, \mathscr{C})$, 分别地, $\Gamma(S, \mathscr{C} \otimes \mathscr{L})$ 的上同调. 由于 S 仿射, EGA I, 1.3.12 给出

$$\Gamma(S, \mathscr{C} \otimes \mathscr{L}) \simeq \Gamma(S, \mathscr{C}) \otimes_\Lambda L.$$

由于 L 投射, 因而平坦,

$$H^*(\Gamma(S, \mathscr{C}) \otimes_\Lambda L) \simeq H^*(\Gamma(S, \mathscr{C})) \otimes_\Lambda L,$$

这就证明了引理.

利用此引理, 推论 2.6 成为:

推论 2.8. *设 S 仿射, $\mathscr{I}$ 是定义 S_0 的幂零理想. 假定每个 $\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$ 在 S_0 上局部自由. 设 Y 是在 S 上平坦的仿射 S-群, X 是平滑 S-群, $f_0 : Y_0 \to X_0$ 是 S_0-群态射.*

---

[59] 编者注: 下面略微修改并扩充了原文.

[60] 编者注: 这里赋予 $\mathscr{L}$ 平凡的 G 作用.

[61] 编者注: 原证明已扩充并简化. 它还使用了同构 $H^n(\mathscr{C} \otimes \mathscr{L}) \simeq H^n(\mathscr{C}) \otimes \mathscr{L}$ 及 $H_n(\Gamma(-)) \simeq \Gamma(H_n(-))$, 其中 $H^n(\mathscr{C})$ 表示复形 $\mathscr{C}$ 的上同调层.

i 若 $H^2(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则 f_0 可提升为 S-群态射 $Y \to X$.

(ii) *若 $H^1(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则任意两个这样的提升在 X 的某个内自同构下共轭, 此内自同构由一个 S 上的截面定义, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.*

取 $Y = X$, 得到:

推论 2.9. *设 S 和 S_0 如上, X 是平滑仿射 S-群.*

i 若 $H^1(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则 X 在 S 上的每个在 X_0 上诱导恒等的自同态, 都是由一个 S 上的截面定义的内自同构, 该截面在 S_0 上诱导 X_0 的单位截面.

(ii) *若 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则 X_0 的每个 S_0-自同构都可延拓为 X 的 S-自同构.* [62]

注 2.10. 由 定理 2.1, 涉及 H^1 的断言具有逆命题. 例如, 设 $S = I_{S_0}$ 是 S_0 上的对偶数概形 (II, 2.1), 并设 X 是平坦 S-群, 使得每个 S 上的在 S_0 上诱导恒等的自同构, 都是由一个 S 上的截面定义的内自同构, 该截面诱导 X_0 的单位截面. 则

$$H^1(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0.$$

[63]

推论 2.11. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如 2.1 中所述. 设 Y 是在 S 上平坦的 S-群概形, X 是 S-群概形, $f : Y \to X$ 是 S-群态射. 从 f 通过与如下元素 $x \in X(S)$ 共轭而得到的从 Y 到 X 的态射所成的集合, 同构于下面的商集; 这些元素诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元:*

$$\mathcal{E} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) / \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J})^{\mathrm{ad}(Y_0)}.$$

这里第二个群由如下 $\mathscr{O}_{S_0}$-态射 $\omega^1_{X_0/S_0} \to \mathscr{J}$ 组成: 它们在每个基变换 $S' \to S_0$ 后给出的态射

$$\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{S'} \longrightarrow \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{S'}$$

在 $Y_0(S')$ 对第一个因子的作用下不变.

由 定理 2.1(iii), 此集合为 $\Gamma(L_0)/H^0(Y_0, L_0)$. 而

$$\Gamma(L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}),$$

且 $H^0(Y_0, L_0)$ 恰好是刚才所述意义下的 $\Gamma(L_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$.

推论 2.12. *在 2.11 的假设下, 再假设 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 局部自由且秩有限. 则*

$$\mathcal{E} \simeq \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big) / H^0\Big(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

事实上,[64] 由局部自由且秩有限得到

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \simeq \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}.$$

推论 2.13. *再假设 Y_0 可对角化. 则*

$$\mathcal{E} \simeq \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big) / \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big),$$

[62]编者注: 设 f_0 是 X_0 的 S_0-自同构, 其逆为 g_0. 由 2.8(i), 将 f_0 和 g_0 提升为 X 的 S-自同态 f 和 g. 则 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 在 X_0 上诱导恒等, 所以由 0.7, 它们是 S-自同构. 因而 f 和 g 也都是 S-自同构.

[63]编者注: 这用于 第 XXIV 篇, 1.13.

[64]编者注: 下面这句话是新增的.

其中 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}$ *是 I, 4.7.3 的分解中与* Y_0 *的零特征标对应的因子.*

事实上, 若 $Y_0 \simeq D_{S_0}(M)$, 则所引结果给出直和分解

$$\mathrm{Lie}(X_0/S_0) = \mathrm{Lie}(X_0/S_0)_0 \oplus \bigoplus_{\substack{m\in M\\ m\neq 0}} \mathrm{Lie}(X_0/S_0)_m.$$

与 $\mathscr{J}$ 作张量积, 得到 $\mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes\mathscr{J}$ 的类似分解, 因而

$$H^0(Y_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)\otimes\mathscr{J}) \simeq \Gamma\Big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

推论 2.14. *再假设* S_0 *仿射. 则*

$$\mathcal{E} \simeq \Gamma\Big(S_0, \Big[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}\Big] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

3. 群概形的无穷小扩张

仍沿用 §0 的记号 $(S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 等), 设 X 是一个 S-概形, 并假设 $X_{\mathscr{J}}$ 配备了一个群结构. 我们要确定 X 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定结构的 S-群结构.

从现在起, 假设 X 在 S 上平坦. 设 $\mathscr{C}$ 是在 S 上平坦的 S-概形所构成的范畴; 于是 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 以 Y (分别地, M) 表示 $\mathscr{C}$ 上由 X^+ (分别地, L'_X) 定义的函子. 典范态射 $p_X : X \to X^+$ 定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射

$$p : X \longrightarrow Y,$$

而 $\widehat{(\mathrm{Sch})/S}$ 中 L'_X 在 X 上的作用, 定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 M 在 X 上的作用. 立即可验证, X 由此成为 Y 上关于 M_Y 的形式主齐性对象 (参见 0.2(i) 和 0.4).

0.8 中定义的 X^+ 在 L'_X 上的作用 (彼处记作 Ad), 定义了 Y 在 M 上的一个作用, 记作 $\widetilde{f}$. 另一方面, 由 0.5,

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Z, M) \simeq \mathrm{Hom}_{S_0}(Z_0, L_0), \qquad Z \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C},$$

其中 L_0 是 0.5 中定义的函子.

引理 3.1.

(i) *1.3 的条件* $(+)_n$ *对每个正整数* n *都成立.*

(ii) *令* S_0*-群* X_0 *通过其伴随表示作用于* S_0*-函子* L_0*. 则有典范同构*

$$H^*(X_0, L_0) \simeq H^*(Y, M),$$

其中第一个上同调在 $(\mathrm{Sch})/S_0$ *中计算, 第二个上同调在* $\mathscr{C}$ *中计算.*

引理的两部分都由关系式

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, M) &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{(\mathrm{Sch})/S_0}}(X^+ \times_S S_0, L_0)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{S_0}(X_0, L_0)\\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(X, M),\end{aligned}$$

得到, 而该关系立即由 M 作为 $\prod_{S_0/S} L_0$ 的定义得到. 更一般地, 用 X^n, Y^n 代替 X, Y 后同样的关系仍成立. 因此, 每个态射 $X^n \to M$ 都唯一地通过 Y^n 分解, 这就给出 $(+)_n$. 它还给出关系式 $C^*(Y, M) = C^*(X_0, L_0)$, 从而得到 (ii).

因此可以应用 1.3 中的构造. 特别地:

引理 3.2. *设 $P : X \times_S X \to X$ 是一个态射. 则 P 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则, 当且仅当 P 是 X 上的一个容许合成法则 (参见 1.3.2).*

事实上, P 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则, 当且仅当它提升了 X^+ 的群法则, 或等价地提升了 Y 的群法则. 所以只需证明, 每个提升 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则的态射 P 都满足 1.3.2(ii) 的恒等式 ((++)), 而这恰好就是 0.8 中证明的内容.

命题 3.3. *设 S 是一个概形, S_0 是由幂零理想定义的闭子概形. 设 X 是一个在 S 上平坦, 且在 S 上拟紧或局部有限呈示的 S-概形. 设 $P : X \times_S X \to X$ 是 X 上的合成法则. 则 P 是群法则, 当且仅当满足以下两个条件:*

(i) *P 是结合的;*

(ii) *P 在 $X_0 = X \times_S S_0$ 上诱导一个群法则.*

这些条件显然是必要的. 下面证明其充分性. 先假设 $X \to S$ 有一个截面. 此时, 对每个 $S' \to S$, $X(S')$ 都非空, 所以只需 [65] 证明, 对每个 $x \in X(S')$, 由 x 给出的左、右平移都是 $X_{S'}$ 的同构. [66]

显然可以假设 $S' = S$. 所讨论的平移 t 在 X_0 上诱导一个平移 t_0, 由于 X_0 是群, 它是一个自同构. 由平坦性即得结论 (SGA 1 III, 4.2). [67]

现在去掉 X 在 S 上有截面的假设, 并假设存在 $S' \to S$, 使得 $X_{S'}$ 在 S' 上有一个截面. 由刚刚证明的结果, $X_{S'}$ 是一个 S'-群; 设 e' 是其单位截面. e' 在 $\mathrm{pr}_i : S' \times_S S' \to S'$, $i = 1, 2$ 下的逆像, 是 $X_{S''}$ 关于将 $P_{S'}$ 沿 pr_i 拉回所得的群法则的单位截面. 然而, 由于 P "定义在 S 上", 这两个群法则一致, 其单位截面也一致. 因而

$$\mathrm{pr}_1^*(e') = \mathrm{pr}_2^*(e').$$

若 $S' \to S$ 是下降态射 (参见第 IV 篇, 第 2 号), 则存在 X 的一个截面, 其基扩张为 e', 证明即告完成. 由于 X_X 在 X 上有一个截面, 即对角截面, 现在只需证明 $X \to S$ 是下降态射. 它是平坦满射, 且拟紧或局部有限呈示; 因此它是一个 (fpqc) 覆盖, 从而是下降态射 (第 IV 篇, 第 6 号).

注. 事实上, 由以下结果可知, $X \to S$ 拟紧或局部有限呈示的假设是多余的. 读者可将这一结果作为第 IV 篇的一道习题来证明:

在对 S 和 S_0 所作的上述假设下, 若 $X \to S$ 平坦且 $X_0 \to S_0$ 是一个 (fpqc) 覆盖, 则 $X \to S$ 是下降态射.

引理 3.4. *X 上的两个容许合成法则等价 (参见 1.3.5), 当且仅当其中一个由另一个通过 X 的某个 S-自同构得到, 该自同构在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射.*

事实上, 由 0.7, 1.3.1 中构造的态射恰好就是上述断言中的态射. [68]

综合以上所有结果, 由命题 1.3.6 得到:

---

[65]编者注: 原文已作修正, 删去了对 Bourbaki 关于半群的一道习题的不恰当引用 (参见 [BAlg], §I.2, 习题 9–13), 并说明了左、右平移的作用; 见下一条编者注.

[66]编者注: 设 E 是一个带有结合合成法则的非空集合, 并且每个左平移 ℓ_x 都是双射. 固定 $x_0 \in E$. 存在唯一的 $e \in E$ 使得 $x_0 e = x_0$; 于是 $x_0 ex = x_0 x$ 蕴含对每个 $x \in E$ 都有 $ex = x$. 此外, 对每个 x, 存在唯一的 x' 使得 $xx' = e$. 再假设存在一个 $b \in E$, 使得右平移 r_b 是单射. 则由 $xeb = xb$ 得到 $xe = x$, 所以 e 是单位元; 由 $xx'x = x = xe$ 得到 $x'x = e$. 因此 x' 同时为 x 的左逆元和右逆元, 而 E 是一个群.

r_b 为单射的假设是必要的: 在任意集合 E 上, 对所有 $x, y \in E$ 定义 $xy = y$. 此时每个左平移都是恒等映射 (且该法则是结合的), 而对每个 y, 有 $r_y(E) = \{y\}$; 所以当 $|E| > 1$ 时, E 不是群.

[67]编者注: 由于 X 与 X_0 有相同的底拓扑空间, 且 t_0 是自同构, 所以 t 是同胚, 从而是仿射态射; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 2.9.1, 或 EGA $\mathrm{IV_4}$, 18.12.7.1. 因此只需证明如下断言. 设 $\mathscr{J}$ 是环 Λ 的幂零理想, $\varphi : A \to B$ 是一个 Λ-代数态射, 其中 B 在 Λ 上平坦, 且 $\varphi \otimes_\Lambda (\Lambda/\mathscr{J})$ 是双射. 则 φ 是双射. 由 "幂零 Nakayama 引理", φ 是满射; 此外, 由于 B 在 Λ 上平坦, 还有 $\mathrm{Ker}(\varphi) \otimes_\Lambda (\Lambda/\mathscr{J}) = 0$, 从而 $\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$. 因此 φ 是双射.

[68]编者注: 事实上, 由 0.7 的证明, X 上在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-自同态, 是形如 $m \cdot \mathrm{id}_X$ 的自同构, 其中 m 遍历 $M(X) = \mathrm{Hom}_S(X, M)$. 对每个 $S' \to S$ 及每个 $x \in X(S')$, 有 $(m \cdot \mathrm{id}_X)(x) = m(x) \cdot x$. 由 3.1 的证明, 每个 $m : X \to M$ 都唯一地通过某个态射 $h : Y = X^+ \to M$ 分解; 所以 $m \cdot \mathrm{id}_X$ 就是 1.3.1 中引入的自同构 u_h. 由等价关系的定义便得此引理; 参见 1.3.4 和 1.3.5.

定理 3.5. *设 S 是一个概形, $\mathscr{I}$ 与 $\mathscr{J}$ 是 S 上的两个理想, 使得 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$ 且 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$. 设 S_0 与 $S_{\mathscr{J}}$ 是它们定义的闭子概形. 设 X 是一个在 S 上平坦 (且在 S 上局部有限呈示或拟紧) 的 S-概形, 以 X_0 和 $X_{\mathscr{J}}$ 表示基变换所得的概形. 假设 $X_{\mathscr{J}}$ 配备了一个 $S_{\mathscr{J}}$-群结构, 以 L_0 表示由下式定义的取值于交换群的 S_0-函子:*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right),$$

X_0 通过其伴随表示作用于该函子.

(i) *X 上存在诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定结构的 S-群结构, 当且仅当满足以下条件:*

  (i_1) *存在一个 S-概形态射 $X \times_S X \to X$, 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则;*

  (i_2) *由 X 及 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则典范定义的 $H^3(X_0, L_0)$ 中的某个障碍类为零.*

(ii) *若 (i) 中的条件成立, 则 X 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定法则的群法则所成的集合 $\mathcal{E}$, 是 $Z^2(X_0, L_0)$ 下的主齐性集合. 此外, $\mathcal{E}$ 关于 X 的那些在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-自同构的商, 是 $H^2(X_0, L_0)$ 下的主齐性集合.*

[69] 事实上, 由 3.2, 每个诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的群法则的 S-概形态射 $f : X \times_S X \to X$ 都是 X 上的容许合成法则. 由 1.3.6(i), 存在一个结合的容许合成法则 $P : X \times_S X \to X$, 等价于某个类 $c(f) \in H^3(X_0, L_0)$ 消失; 此时, 3.3 表明 P 是群法则. 这证明了 (i), 而 (ii) 由 3.3 及 1.3.6(ii) 得到.

注 3.5.1. [70] 若 μ 与 μ' 是 X 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 上给定法则的群法则, 则得到一个上闭链 $\delta(\mu, \mu') \in Z^2(X_0, L_0)$. 采用的符号约定为 $\mu' = \delta(\mu, \mu') \cdot \mu$; 即对每个 $S' \to S$ 及 $x, y \in X(S')$,

$$\mu'(x, y) = \delta(\mu, \mu')(x_0, y_0) \cdot \mu(x, y).$$

[71]

以 $\bar{\delta}(\mu, \mu')$ 表示 $\delta(\mu, \mu')$ 在 $H^2(X_0, L_0)$ 中的像. 最后, 若将配备 μ (分别地, μ') 的 X 简记为 X (分别地, X'), 则用 $\delta(X, X')$ 代替 $\delta(\mu, \mu')$, 对 $\bar{\delta}(X, X')$ 也作类似约定.

注 3.6. 设 $X_{\mathscr{J}}$ 是一个平滑仿射 $S_{\mathscr{J}}$-概形. 由 0.15, 在同构意义下, 存在唯一的在 S 上平滑的 S-概形 X, 其模 $\mathscr{J}$ 的约化为 $X_{\mathscr{J}}$. 若 $X_{\mathscr{J}}$ 配备了一个 $S_{\mathscr{J}}$-群结构, 则由 0.16, 条件 (i_1) 自动成立. 此外, 0.6 简化了 L_0 的定义, 并给出:

推论 3.7. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如 3.1 中所述, $X_{\mathscr{J}}$ 是一个平滑仿射 $S_{\mathscr{J}}$-群.*

(i) *模 $\mathscr{J}$ 的约化为 $X_{\mathscr{J}}$ 的平滑 S-群, 模去在 $X_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的同构后, 其集合或者为空, 或者是下列群的主齐性集合:*

$$H^2\left(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right).$$

(ii) *存在一个模 $\mathscr{J}$ 的约化为 $X_{\mathscr{J}}$ 的平滑 S-群, 当且仅当下列群中的某个障碍*

$$H^3\left(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right)$$

为零.

---

[69] 编者注: 以下论证为新增内容.

[70] 编者注: 此注与 4.5.1 类似, 为新增内容, 用以引入 4.38 中使用的记号 $\delta(\mu, \mu')$ 或 $\delta(X, X')$. 因此, 3.5(ii) 中关于 $\mathcal{E}$ 本身的部分也是新增的.

[71] 编者注: 我们沿用原文的符号约定, 以便在 4.38(5) 中有等式 $\partial^1 \bar{d}(X, X') = \bar{\delta}(X, X')$; 另见编者注 54.

照常, 得到以下推论.

推论 3.8. *设 S 是一个概形, S_0 是由幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 设 X_0 是一个平滑仿射 S_0-群.*

(i) *若对每个 $n \geq 0$, 有*

$$H^2\Big(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则约化为 X_0 的任意两个平滑 S-群, 通过一个在 X_0 上诱导恒等映射的同构而同构.

(ii) *若对每个 $n \geq 0$, 有*

$$H^3\Big(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0,$$

则存在一个约化为 X_0 的平滑 S-群.

推论 3.9. *设 S 仿射, S_0 是由幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 假设每个 $\mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$ 在 S_0 上局部自由. 设 X_0 是一个平滑仿射 S_0-群.*

(i) *若 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则约化为 X_0 的任意两个平滑 S-群都同构.*

(ii) *若 $H^3(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0$, 则存在一个约化为 X_0 的平滑 S-群.*

推论 3.10. *设 S_0 是一个概形, $S = I_{S_0}$ 是 S_0 上的对偶数概形. 设 X_0 是一个平滑 S_0-群. 则对于每个满足 Y_0 与 X_0 在 S_0 上同构的平滑 S-群 Y, 它都与 $X = X_0 \times_{S_0} S$ 在 S 上同构, 当且仅当*

$$H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = 0.$$

[72]

事实上, 由 3.5, 将这样的群 Y 模去在 X_0 上诱导恒等映射的 S-群同构所得的类的集合, 与 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))$ 之间有双射. 因此, 模去任意 S-群同构所得的类, 与

$$H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))/\Gamma_0,$$

之间有双射, 其中

$$\Gamma_0 = \mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0),$$

它以显然的方式作用于 H^2. 立即可得结论. [73]

4. 闭子群的无穷小扩张

先陈述一个对任意阿贝尔范畴成立的结果.

引理 4.1. *设*

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{i} A \xrightarrow{p} A'' \longrightarrow 0$$

是一个正合列, $\phi : A' \to Q$ 是一个态射, 而 $\pi : A'' \to P$ 是核为 C 的满态射. 设 E 是模去同构后的四元组 (B, f, g, h) 的集合, 其中序列

$$0 \longrightarrow Q \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$$

正合, 且下图交换:

[72]编者注: 此结果用于 XXIV, 1.13.

[73]编者注: 事实上, $\mathrm{Aut}_{S_0\text{-gr.}}(X_0)$ 通过群自同构作用于阿贝尔群 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0))$, 因此 0 的轨道是单元素集 $\{0\}$. 所以, 商集是单元素集, 当且仅当 $H^2(X_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0)) = \{0\}$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & P & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

(i) *集合 E 非空, 当且仅当 $\mathrm{Ext}^1(A'', A')$ 的元素 A 在 $\mathrm{Ext}^1(C, Q)$ 中的像为零.*

(ii) *在这些条件下, E 是阿贝尔群 $\mathrm{Hom}(C, Q)$ 下的主齐性集合.*

引入并合和

$$B' = A \underset{A'}{\sqcup} Q.$$

于是有一个行正合的交换图: [74]

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{i} & A & \xrightarrow{p} & A'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \phi} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Q & \xrightarrow{j} & B' & \longrightarrow & A'' & \longrightarrow & 0 \end{array} ,$$

显然, 该问题的解所构成的范畴, 典范同构于对序列

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow B' \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

以及态射 id_Q 与 $\pi : A'' \to P$ 所提出的相应问题的解范畴. [75] 此时, E 与 B' 的那些子对象 N 的集合有双射, 其中 $B' \to A''$ 诱导 N 与 $A'' \to P$ 的核 C 之间的同构; 等价地, 它是提升典范态射 $C \to A''$ 的态射 $e : C \to B'$ 的集合. 阿贝尔群 $G = \mathrm{Hom}(C, Q)$ 通过 $g \cdot e = g + e$ 作用于 E, 其中加法取于 $\mathrm{Hom}(C, B')$; 若 $E \neq \varnothing$, 则这使 E 成为 G 下的主齐性集合.

由此得到以下结果.

命题 4.2. [76] *设 S 是一个概形, $S_{\mathscr{J}}$ 是由平方为零的拟凝聚理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, X 是一个 S-概形, 而 $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$-模. 置*

$$X_{\mathscr{J}} = X \times_S S_{\mathscr{J}}, \qquad \mathscr{F}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}},$$

并设 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F}_{\mathscr{J}} / \mathscr{H}_{\mathscr{J}}$ 是 $\mathscr{F}_{\mathscr{J}}$ 的一个商模. 假设给定了一个 $\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$-模态射

$$f : \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}} \longrightarrow \mathscr{Q}.$$

设 $\mathcal{E}$ 是 X 上如下定义的集合层: 对 X 的每个开子集 U, $\mathcal{E}(U)$ 是 $\mathscr{F}|_U$ 的商模 $\mathscr{G}$ 的集合, 其中 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$, 并且存在一个同构


$$h : \mathscr{J}\mathscr{G} \xrightarrow{\sim} \mathscr{Q}|_U$$

使下图交换:

[74]编者注: 有 $\mathrm{Coker}(j) = B' \underset{Q}{\sqcup} 0 = A \underset{A'}{\sqcup} 0 = A''$, 以及 $\mathrm{Ker}(j) \simeq \mathrm{Ker}(i) = 0$, 只需 "如同该范畴是一个模范畴那样" 推理即可看出. 完全用箭头表述的证明, 例如可见 [Fr64], 定理 2.5.4 (*).

[75]编者注: 以下将 A 替换为 B', 并扩充了论证的结尾.


[76]编者注: 已改写此陈述, 使它恰好适用于 4.3 中的应用; 遵循 M. Demazure 提供的提示, 也扩充了证明.



此时同构 h 是唯一的, 因为 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U) \to \mathscr{J}\mathscr{G}$ 是满态射. 则 $\mathcal{E}$ 是下列交换群层下的形式主齐性层:

$$\mathscr{A} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q}).$$


证明. 若 $\mathcal{E}(U) = \varnothing$, 则无需证明; 因而可以假设 $\mathcal{E}(U)$ 含有一个元素 $\widetilde{\mathscr{G}}$. 在下图中, h 是同构, 且所有箭头都是满态射:



所以态射

$$\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} (\mathscr{F}_{\mathscr{J}}|_U) \longrightarrow \mathscr{Q}|_U$$

诱导一个必然唯一的满态射 $\phi : \mathscr{J}\mathscr{F}|_U \to \mathscr{Q}|_U$. 若 $\mathscr{G}$ 是一个 $\mathscr{O}_U$-模, 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$, 并且有一个行正合的交换图



(其中 $p_{\mathscr{J}}$ 是投影 $\mathscr{G} \to \mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} = \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$, 因而 $\mathscr{Q}|_U = \mathrm{Ker}(p_{\mathscr{J}}) = \mathscr{J}\mathscr{G}$), 则 $\mathscr{G}$ 可以等同于 $\mathscr{F}|_U$ 的一个商模. 所以, 由 4.1(ii), 集合 $\mathcal{E}(U)$ 是下列阿贝尔群的主齐性集合:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q})(U) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{Q})(U).$$

命题 4.3. *(TDTE IV 5.1) 设 S 是一个概形, $S_{\mathscr{J}}$ 是由平方为零的拟凝聚理想 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, X 是一个 S-概形, 而 $\mathscr{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模. 置*

$$X_{\mathscr{J}} = X \times_S S_{\mathscr{J}}, \qquad \mathscr{F}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}.$$

设 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{F}_{\mathscr{J}}/\mathscr{H}_{\mathscr{J}}$ 是 $\mathscr{F}_{\mathscr{J}}$ 的一个拟凝聚商模, 且在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 对 X 的每个开子集 U, 以 $\mathcal{E}(U)$ 表示 $\mathscr{F}|_U$ 的那些在 S 上平坦的拟凝聚商模 $\mathscr{G}$[77] 的集合, 其中 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$. 则这些 $\mathcal{E}(U)$ 构成 X 上的一个集合层 $\mathcal{E}$, 它是下列交换群层下的形式主齐性层:

$$\mathscr{A} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{H}_{\mathscr{J}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}}\right).$$

[77]编者注: 为使陈述简洁, 此处增加了 $\mathscr{G}$ 拟凝聚的假设; 这一假设自动满足的说明已移到证明中, 并相应扩充了证明.

证明. 设 $\pi : X \to S$ 是结构态射. 设 U 是 X 的一个开子集, $\mathscr{G}$ 是一个在 S 上平坦的 $\mathscr{O}_U$-模, 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$. 对每个 $x \in U$, 茎 $\mathscr{G}_x$ 是局部环 $\mathscr{O}_{S,s}$ 上的平坦模, 其中 $s = \pi(x)$. 所以态射

$$\mathscr{J}_s \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} (\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G})_x = \mathscr{J}_s \otimes_{\mathscr{O}_{S,s}} \mathscr{G}_x \longrightarrow (\mathscr{J}\mathscr{G})_x$$

是双射. 因此有正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U) \longrightarrow \mathscr{G} \longrightarrow \mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U \longrightarrow 0.$$

由于 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_S} (\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U)$ 和 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}}|_U$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模, $\mathscr{G}$ 也拟凝聚 (EGA III, 1.4.17).

反之, 由于 $\mathscr{G}_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦, 若 $\mathscr{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathscr{O}_U$-模, 满足 $\mathscr{G}/\mathscr{J}\mathscr{G} \simeq \mathscr{G}_{\mathscr{J}}$, 且态射

$$\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}} \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{G}$$

是双射, 则由 "平坦性基本判别法" (SGA 1, IV, 5.5), $\mathscr{G}$ 在 S 上平坦. [78]

因此, 此处所考虑的集合 $\mathcal{E}(U)$, 正是 4.2 中当 f 为 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{G}_{\mathscr{J}}$ 的恒等态射时所考虑的集合; 故结论由 4.2 得到. □

沿用以上记号. [79] 设 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 的一个闭子概形, 由拟凝聚理想 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 定义, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 将 4.3 应用于 $\mathscr{F} = \mathscr{O}_X$ 和

$$\mathscr{G}_{\mathscr{J}} = \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} = \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}},$$

便得到下列推论.

推论 4.3.1. *设 $S, S_{\mathscr{J}}, \mathscr{J}, X, X_{\mathscr{J}}, Y_{\mathscr{J}}$ 及 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 如上, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 设 $\mathscr{A}_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 上的交换群层*

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}} \left(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \right)$$

并置 $\mathscr{A} = i_*(\mathscr{A}_{\mathscr{J}})$, 其中 $i : X_{\mathscr{J}} \hookrightarrow X$ 是浸入. 对 X 的每个开子集 U, 以 $\mathcal{E}(U)$ 表示 U 的那些在 S 上平坦的闭子概形 Y 的集合, 其中

$$Y \times_S S_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}} \cap U.$$

则 $\mathcal{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-伪挠子.

此外, 若这样的 Y 局部存在, 即每个 $x \in X$ 都有一个开邻域 U 使得 $\mathcal{E}(U) \neq \varnothing$, 则 $\mathcal{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-挠子 (torsor). X 上的 $\mathscr{A}$-挠子由

$$H^1(X, \mathscr{A}) = H^1(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}})$$

参数化 (例如见 EGA IV_4, 16.5.15), 且 $\mathcal{E}$ 有整体截面, 即 $\mathcal{E}(X) \neq \varnothing$, 当且仅当其对应的上同调类为零. 由此得到:

推论 4.4. *设 $S, S_{\mathscr{J}}, \mathscr{J}, X, X_{\mathscr{J}}, Y_{\mathscr{J}}$ 及 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 如上, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 设 E 是 X 的那些在 S 上平坦的闭子概形 Y 的集合, 其中 $Y \times_S S_{\mathscr{J}} = Y_{\mathscr{J}}$.*

(i) *集合 E 或者为空, 或者是下列阿贝尔群下的主齐性集合:*

$$H^0(X, \mathscr{A}) = H^0(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}}) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}} \left(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} \right).$$

(ii) *集合 E 非空, 当且仅当以下两个条件同时成立:*

[78] 编者注: 另见 [BAC], §III.5, 定理 1.

[79] 编者注: 以下讨论作了扩充, 并新增了 推论 4.3.1. 还须记住, "伪挠子 (pseudo-torsor)" 与 "形式主齐性" 同义.

(a) *该问题在 X 上局部有解.*

(b) *下列群中的某个障碍消失:*

$$H^1\Big(X_{\mathscr{J}}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}\Big(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\Big)\Big).$$

补充 4.4.1. [80] 沿用 4.4 的记号, 并假设 E 含有一个元素 Y. 设 $\mathscr{I}_Y$ 是定义 Y 的 $\mathscr{O}_X$ 的理想, 以 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 表示它在 $\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$ 中的像. 如 4.2 的证明中所见, 有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}} & \twoheadrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_X \\
\downarrow & \swarrow & \downarrow \\
\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{J}\mathscr{O}_Y
\end{array}$$

因而有 $\mathscr{O}_X$-模满态射

$$\phi : \mathscr{J}\mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}.$$

设 $\mathscr{K}$ 为其核. 于是, 对 E 的每个元素 Y', 态射 $\mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_{Y'}$ 通过 $\mathscr{O}_X/\mathscr{K}$ 分解, 后者正是引理 4.1 证明中的并合和 B'. 若 $\mathscr{I}_{Y'}$ 表示 Y' 在 $\mathscr{O}_X$ 中的理想, 则有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & 0 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{K} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & (\mathscr{J}\mathscr{O}_X)/\mathscr{K} & \longrightarrow & \mathscr{O}_X/\mathscr{K} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow\wr & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

以 $\mathscr{K}$ 定义的闭子概形代替 X, 便归约到 $\mathscr{K}=0$ 的情形. 此时, 给定 Y' 等价于给定 $\mathscr{O}_X$ 的一个 $\mathscr{O}_X$-子模 $\mathscr{I}_{Y'}$, 它在投影 $p:\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$ 下双射地映到 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$. 以

$$f' : \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{I}_{Y'}, \qquad f : \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} \xrightarrow{\sim} \mathscr{I}_Y$$

分别表示其逆同构. 则 $f'-f$ 是

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}\Big(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\Big) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}}(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J}\mathscr{O}_Y),$$

中的一个元素, 将其记作 $d(Y',Y)$. 注意到 $d(Y,Y')=-d(Y',Y)$.

[80] 编者注: 此补充为新增内容; 它有助于证明命题 4.8(ii).

固定 Y, 令 Y' 变动, 考虑态射

$$\mathscr{I}_{Y'} \longrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_Y = \mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y.$$

由于它与 $\mathscr{O}_Y \to \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 的复合为零, 它取值于

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_Y = \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}.$$

更明确地说, 设 V 是 X 的一个开子集, x' 是 $\mathscr{I}_{Y'}$ 在 V 上的一个截面, 以 $x_{\mathscr{J}}$ 表示它在 $\Gamma(V, \mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}})$ 中的像. 则

$$x' = f'(x_{\mathscr{J}}) = f(x_{\mathscr{J}}) + (f' - f)(x_{\mathscr{J}}) = f(x_{\mathscr{J}}) + d(Y', Y)(x_{\mathscr{J}}).$$

所以, 态射 $\mathscr{I}_{Y'} \to \mathscr{J}\mathscr{O}_Y$ 由 $d(Y', Y)$ 给出.

4.5.0. [81] 沿用 4.3.1 和 4.4 的记号, 并作如下变换. 拟凝聚 $\mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}}$-模

$$\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}^2$$

被 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 零化, 因而是某个拟凝聚 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-模的正像. 将此模记作 $\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}$, 称为 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $X_{\mathscr{J}}$ 中的 *余法层 (conormal sheaf)*.[82] 由于 $\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 被 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 零化, 4.3.1 中的交换群层 $\mathscr{A}_{\mathscr{J}}$ 等同于

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}/\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}^2, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right),\end{aligned}$$

因而对每个 $i \geq 0$,

$$H^i(X_{\mathscr{J}}, \mathscr{A}_{\mathscr{J}}) = H^i\Big(Y_{\mathscr{J}}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\Big).$$

[83] 现在可按如下方式去掉 Y 为闭的假设. 首先注意, $X_{\mathscr{J}}$ 的每个开子集 $U_{\mathscr{J}}$, 都由 X 的那个与 $U_{\mathscr{J}}$ 有相同底拓扑空间的开子概形 U 经基变换得到. 现在设 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $U_{\mathscr{J}}$ 的一个闭子概形, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦, 以 $\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 表示定义 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 $\mathscr{O}_{U_{\mathscr{J}}}$ 的拟凝聚理想. 若 $Y_{\mathscr{J}}$ 提升为 X 的一个子概形 Y, 则因 Y 与 $Y_{\mathscr{J}}$ 有相同的底拓扑空间, 它是 U 的一个闭子概形. 所以, 将 $Y_{\mathscr{J}}$ 提升为 X 或 U 的一个在 S 上平坦的子概形, 所遇到的障碍相同; 它位于

$$H^1\Big(Y_{\mathscr{J}}, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\Big).$$

最后, 回到 §0 的记号. 设 $\mathscr{J}$ 是 $\mathscr{O}_S$ 的一个拟凝聚理想, 满足 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$ 和 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$, 并设 S_0 是 $S_{\mathscr{J}}$ 的由 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 对每个 S-概形 Z, 记

$$Z_{\mathscr{J}} = Z \times_S S_{\mathscr{J}}, \qquad Z_0 = Z \times_S S_0.$$

由于 $\mathscr{J}$ 被 $\mathscr{I}$ 零化, 按 4.4 的记号有

$$\mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}} = \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},$$

[81] 编者注: 新增编号 4.5.0, 以标明此处返回原文.
[82] 编者注: 下一句已作修正.
[83] 编者注: 以下讨论作了扩充.

以及

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\right)\\&\quad=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\right),\end{aligned}$$

其余各项也类似. 由此得到:

命题 4.5. *设 S 是一个概形, S_0 与 $S_{\mathscr{J}}$ 分别为拟凝聚理想 $\mathscr{I}$ 和 $\mathscr{J}$ 定义的闭子概形, 其中 $\mathscr{I}\supset\mathscr{J}$ 且 $\mathscr{I}\mathscr{J}=0$. 设 X 是一个 S-概形, $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 的一个子概形, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦. 定义 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模*

$$\mathscr{A}_0=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\right).$$

则:

(i) *存在一个约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦的 X 的子概形 Y, 当且仅当以下两个条件成立:*

  (a) *这样的 Y 在 X 上局部存在.*

  (b) *$R^1\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 中的某个障碍消失.* [84]

(ii) *在这些条件下, 满足上述要求的子概形 Y 的集合, 是阿贝尔群 $\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 下的主齐性集合.*

注 4.5.1. [85] 由 4.5(ii) 可知, 对 X 的每对子概形[86] (Y,Y'), 若它们在 S 上平坦且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$, 则存在一个 "偏差 (deviation)"

$$\begin{aligned}&d(Y',Y)\in\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)\\&\qquad=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0},\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\right).\end{aligned}$$

按照 4.4.1 采用的符号约定, $d(Y',Y)$ 对应于 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$\mathscr{I}_{Y'}\hookrightarrow\mathscr{O}_X\longrightarrow\mathscr{O}_Y,$$

它取值于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\simeq\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}$, 且通过 $\mathscr{I}_{Y'_{\mathscr{J}}}=\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}}$ 分解, 再通过 $\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}$ 分解.

注 4.6. [87] *若 X 在 S 上平坦, 且 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 中的局部完全交, 则条件 (a) 总是满足; 而每个在 S 上平坦并提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 Y, 都是 X 中的局部完全交. 此外, 若 Y_0 仿射, 则条件 (b) 也满足.*

定义 4.6.1. *(参见 SGA 6, VII 1.1) 设 B 是交换环, $f:E\to B$ 是一个 B-线性态射, 其中 E 是秩为有限数 d 的自由 B-模, 并令 $I=f(E)$. 选定 E 的一组基后, f 由 B 的元素组成的一个 d-元组 $(f_1,\dots,f_d)$ 给出, 而 I 是由这些 f_i 生成的理想.* Koszul 复形 (Koszul complex) *$K_\bullet(f)$ 是分次 B-模 $\bigwedge_B^\bullet E$, 配备如下次数为 -1 的微分:*

$$x_1\wedge\cdots\wedge x_i\longmapsto\sum_{j=1}^{i}(-1)^{j-1}f(x_j)x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{x_j}\wedge\cdots\wedge x_i.$$

[84]编者注: 此处 $R^1\Gamma(Y_0,\mathscr{A}_0)$ 表示 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模 $\mathscr{A}_0$ 的 "凝聚" 上同调群 $H^1(Y_0,\mathscr{A}_0)$, 用以区别于自 4.16 起将考虑的 "Hochschild" 上同调群 $H^i(Y_0,M_0)$, 其中 Y_0 是一个 S_0-群, M_0 是一个 $\mathscr{O}_{S_0}$-模.

[85]编者注: 此注置于此处, 代替原文的 注 4.7.

[86]编者注: 已将 "闭子概形" 改为 "子概形".

[87]编者注: 为便于查阅, 保留了原文的注 4.6, 其中没有给出 "局部完全交" 的定义. 随后给出取自 SGA 6, VII 1.4 的 "正确" 定义 (取代 EGA IV_4, 16.9.2 的定义), 并给出此注所作的三个断言的证明.

于是有一个以 B/I 为 -1 次项的增广链复形

$$\cdots \longrightarrow \bigwedge^2 E \longrightarrow E \xrightarrow{f} B \longrightarrow B/I \longrightarrow 0,$$

由于 $I = f(E)$, 按定义它在 0 次正合. 若 $K_\bullet(f)$ 在 > 0 次无同调, 即上述增广复形是 $C = B/I$ 的一个解消, 则称态射 f 是*正则的 (regular)*.

此时, SGA 6, VII 1.2(b) 的证明表明, 对 $n \in \mathbb{N}$, C-模 I^n/I^{n+1} 都是自由的, 其中 I/I^2 的秩为 d.

定义 4.6.2. *(参见 SGA 6, VII 1.4) 设 X 是概形, Y 是子概形, U 是 X 的一个开子集, 使得 Y 是 U 的由拟凝聚理想 $\mathscr{I}_Y$ 定义的闭子概形.*

若 $Y \hookrightarrow X$ 是 SGA 6, VII 1.4 意义下的正则浸入, 则称子概形 Y 是 X 中的*局部完全交 (locally complete intersection)*; 即对每个 $y \in Y$, 存在 y 在 U 中的一个仿射开邻域 V, 一个有限自由 $\mathscr{O}_V$-模 $\mathscr{E}$, 以及一个像为 $\mathscr{I}_Y|_V$ 的正则态射 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{O}_V$, 使得 $K_\bullet(f)$ 是 $\mathscr{O}_{Y\cap V}$ 的一个解消.

这蕴含浸入 $Y \hookrightarrow X$ 局部有限呈示, 且由 4.6.1, 余法层

$$\mathscr{N}_{Y/X} = \mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2$$

是一个有限局部自由 $\mathscr{O}_Y$-模.

引理 4.6.3. [88] *设 A 是一个环, J 是 A 的一个平方为零的理想, 置 $\overline{A} = A/J$. 设 B 是一个平坦 A-代数, E 是一个有限秩自由 B-模, $f : E \to B$ 是一个 B-模态射. 假设由 f 诱导的态射*

$$g : \overline{E} = E \otimes_A \overline{A} \longrightarrow \overline{B} = B \otimes_A \overline{A}$$

正则, 且 $\overline{B}/g(\overline{E})$ 在 $\overline{A}$ 上平坦. 则 f 正则, 且 $B/f(E)$ 在 A 上平坦.

证明. 置

$$C = B/f(E), \qquad \overline{C} = C \otimes_A \overline{A} = \overline{B}/g(\overline{E}).$$

首先, 各 $\bigwedge_B^i E$ 都是自由 B-模, 因而由于 B 在 A 上平坦, 它们是平坦 A-模. 由于

$$\bigwedge_B^\bullet E \otimes_A \overline{A} \simeq \bigwedge_{\overline{B}}^\bullet \overline{E},$$

有复形正合列


$$0 \longrightarrow J \otimes_A \bigwedge_B^\bullet E \longrightarrow \bigwedge_B^\bullet E \longrightarrow \bigwedge_{\overline{B}}^\bullet \overline{E} \longrightarrow 0.$$

此外, 由于 $J^2 = 0$, 对每个 A-模 M 都有

$$J \otimes_A M \simeq J \otimes_{\overline{A}} (\overline{A} \otimes_A M).$$

将增广箭头画成虚线, 并将 E 的秩记为 d, 便得到下列各行正合的双复形.

[88] 编者注: 为证明注 4.6 中陈述的结果, 新增了引理 4.6.3 和 4.6.4, 命题 4.6.5, 以及注 4.6.6.



左、右两列也正合, 因为 $K_\bullet(g)$ 是 $\overline{C}$ 的一个解消, 且 $\overline{C}$ 在 $\overline{A}$ 上平坦. 因此, 与不带增广的复形正合列相伴的同调长正合列表明, $K_\bullet(f)$ 在 >0 次无同调, 并且在 0 次给出正合列

$$0 \longrightarrow J \otimes_{\overline{A}} \overline{C} \longrightarrow C \longrightarrow \overline{C} \longrightarrow 0.$$

由 "平坦性基本判别法", C 在 A 上平坦 (参见 [BAC], §III.5, 定理 1). □

引理 4.6.4.[88] *设 A 是交换环, J 是一个幂零理想, $N \subset M$ 是 A-模, 使得 M/N 在 A 上平坦. 若 $x_1, \dots, x_n$ 是 N 中的元素, 其像生成 N 在 M/JM 中的像 $\overline{N}$, 则它们生成 N.*

事实上, 设 N' 是由这些 x_i 生成的 N 的子模, 并置 $Q = N/N'$. 态射 $N' \otimes_A (A/J) \to \overline{N}$ 是满射. 另一方面, 由于 M/N 在 A 上平坦, 态射 $N \otimes_A (A/J) \to \overline{N}$ 是双射. 因此 $Q \otimes_A (A/J) = 0$, 从而由 "幂零 Nakayama 引理" 得到 $Q = 0$:

$$Q = JQ = J^2Q = \cdots = 0.$$

现在可以证明以下命题.

命题 4.6.5.[88] *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 及 $X, Y_{\mathscr{J}}$ 如 4.5 中所述. 再假设 X 在 S 上平坦, 且 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 中的局部完全交.*

(a) *则 4.5(i) 中的条件 (a) 满足; 此外, 每个在 S 上平坦并提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 Y, 都是 X 中的局部完全交.*

(b) *若 Y_0 还仿射, 则上述结果中的条件 (b) 也满足.*

证明. (a) 的第一个断言由 引理 4.6.3 得到, 第二个断言随后由引理 4.6.4 得到. 此外, 假设蕴含 (参见 4.6.2) $\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}$ 是一个有限局部自由 $\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}$-模. 所以 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模

$$\mathscr{A}_0 = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}} \otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}} \mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0}\right)$$

拟凝聚 (参见 EGA I, 1.3.12), 因而当 Y_0 仿射时, 有 $R^1\Gamma(Y_0, \mathscr{A}_0) = 0$. □

注 4.6.6.[88] 以一个例子结束本段. 此例表明, 在引理 4.6.3 的假设下, 生成理想 $\overline{I} = g(\overline{E})$ 的正则序列 $(\overline{g}_1, \overline{g}_2)$, 未必能够提升为 B 中的正则序列.

设 k 是一个域, 置 $\overline{A} = k[X, Y]$, 以 $k\varepsilon$ 表示 $\overline{A}$-模 $\overline{A}/(X, Y)$, 从而

$$P\varepsilon = P(0,0)\varepsilon \qquad (P \in \overline{A}),$$

并令 $A = \overline{A} \oplus k\varepsilon$, 其中 $J = k\varepsilon$ 是平方为零的理想. 于是 $A/J = \overline{A}$.

代数 $B = A \otimes_k k[Z, T]$ 在 A 上自由, 因而平坦, 且 $\overline{B} = k[X, Y, Z, T]$. 置

$$\overline{g}_1 = XZ - YT, \qquad \overline{g}_2 = XZ - 1.$$

由于 $\overline{g}_1$ 不可约, $\overline{B}/(\overline{g}_1)$ 是整环; 所以 $(\overline{g}_1, \overline{g}_2)$ 是 $\overline{B}$ 中的一个正则序列, 它生成理想

$$\overline{I} = (XZ - 1, YT - 1).$$

因此

$$\overline{C} = \overline{B}/\overline{I} = k[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}] = \overline{A}[X^{-1}, Y^{-1}]$$

是平坦 $\overline{A}$-代数, 也是平坦 A-代数. 但是, $\overline{g}_1$ 到 B 的每个提升都形如

$$XZ - YT + \lambda\varepsilon, \qquad \lambda \in k[Z, T],$$

因而都零化 ε.

来源说明. Polo–Gille PDF 将此提升印为 $XY - ZT + \lambda\varepsilon$. 由于所提升的元素是 $\overline{g}_1 = XZ - YT$, 上述提升公式在加上 $\lambda\varepsilon$ 之前恢复了同一个多项式.

4.7. 注 4.7 已从此处移去, 置于 4.5.1.

注 4.8.0.[89] *设 S 为概形, S' 为 S 的闭子概形, X 为 S-概形, Y 为 X 的 S-子概形, 并令 $X' = X \times_S S'$ 及 $Y' = Y \times_S S'$. 则存在 $\mathscr{O}_{Y'}$-模的满态射*

$$\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \twoheadrightarrow \mathscr{N}_{Y'/X'}.$$

事实上, 将 X 换为适当的开子概形后, 可假设 Y 是闭的, 由 $\mathscr{O}_X$ 的理想 $\mathscr{I}_Y$ 定义. 于是 $\mathscr{I}_Y$ 在 $\mathscr{O}_{X'}$ 中的像是定义 Y' 的理想 $\mathscr{I}_{Y'}$, 且存在 $\mathscr{O}_{Y'}$-模的满态射

$$\pi : (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} \twoheadrightarrow \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2.$$

再假设 $\mathscr{O}_Y = \mathscr{O}_X/\mathscr{I}_Y$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦. 则自然态射

$$\mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} \longrightarrow \mathscr{I}_{Y'}$$

为双射 (参见 EGA IV_2, 2.1.8).

因此有如下各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & \mathscr{I}_Y^2 \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_Y \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X'} & \longrightarrow & (\mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2) \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y'} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \text{surj.}} & & \downarrow{\scriptstyle \wr} & & \downarrow{\scriptstyle \pi\ \text{surj.}} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'} & \longrightarrow & \mathscr{I}_{Y'}/\mathscr{I}_{Y'}^2 & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

[89]编者注: 此注用于下面的命题, 现插入此处; 它原见于原版4.10.

由蛇引理可得[90]

$$\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y'}\xrightarrow{\sim}\mathscr{N}_{Y'/X'}\qquad \text{若 } Y \text{ 在 } S \text{ 上平坦.} \tag{4.8.0}$$

命题 4.8. *设 $S, S_0, S_{\mathscr{J}}$ 及 $\mathscr{I}, \mathscr{J}$ 如4.5 所述.*[91] *设 X 为 S-概形, Y 为 X 的子概形, $i: Y\hookrightarrow X$ 为该浸入.*

(i) *对每个满足 $f_{\mathscr{J}}: T_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}$ 分解的 S-态射 $f: T\to X$, 可定义障碍*

$$c(X,Y,f)\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right) \tag{*}$$

它消失当且仅当 f 存在经由 Y 的分解.

(ii) *设 Y' 为 X 的另一个子概形. 假设 $Y'_{\mathscr{J}}=Y_{\mathscr{J}}$, 且 Y 和 Y' 在 S 上平坦. 则存在同构 (参见4.8.0)*

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_Y\simeq \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\simeq \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'},\qquad \mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}\xrightarrow{\sim}\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}},$$

从而存在同构

$$\begin{aligned} u:\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_Y\right)\\ &\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}\left(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}\right).\end{aligned}$$

用 $i': Y'\hookrightarrow X$ 表示典范浸入, 用 $d(Y,Y')$ 表示4.5.1 中的偏差, 则有[92]

$$c(X,Y,i')=u\big(d(Y,Y')\big). \tag{**}$$

(iii) *典范态射*

$$\mathscr{N}_{Y/X}\xrightarrow{D} i^*(\Omega^1_{X/S})$$

(参见 SGA 1, II, 公式 4.3)[93] *诱导态射*

$$D_0:\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}\longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0}\otimes_{\mathscr{O}_{X_0}}\mathscr{O}_{Y_0},$$

从而对(i) 中的每个 S-态射 $f: T\to X$, 诱导态射

$$\begin{aligned} v_{f_0}:\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(f_0^*(\Omega^1_{X_0/S_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right),\\ &\qquad a\longmapsto a\circ f_0^*(D_0),\end{aligned}$$

其中上面的第一个群是 $\mathrm{Hom}_{X^+}(T, L_X)$, 参见0.1.5. 对 $a\in \mathrm{Hom}_{X^+}(T,L_X)$, 有

$$c(X,Y,a\cdot f)-c(X,Y,f)=v_{f_0}(a), \tag{***}$$

其中 $a\cdot f$ 表示复合态射

$$T\xrightarrow{a\times f} L_X\times_{X^+}X\longrightarrow X.$$

[90]编者注: 原版注 4.10 中陈述此结果时, 附加了 Y' 在 X' 中为局部完全交的假设. 因此, 这一假设也出现在4.12–4.14 的陈述中; 事实上它似乎是多余的, 故已从这些陈述中删除.

[91]编者注: 已删除 $\mathscr{I}$ 幂零的假设, 因为它似乎是多余的 (参见证明).

[92]编者注: 亦见下文4.27.

[93]编者注: 亦见 EGA IV$_4$, 16.4.21. 回顾, 若 U 为 X 的仿射开子集, 使得 $Y\cap U$ 由 $A=\mathscr{O}_X(U)$ 的理想 I 定义, d 表示微分 $A\to\Gamma(U,\Omega^1_{X/S})$, 且 $x\in I$, 则 $D(x+I^2)$ 是 $\Gamma(U,\Omega^1_{X/S})\otimes_A(A/I)$ 的元素 $d(x)\otimes 1$.

我们将证明命题的 (i), 把断言 (ii) 和 (iii) 留给读者 (不) 验证; 验证时先归结为仿射情形, 再比较显式定义.[94]

现在证明(i). 态射 $f : T \to X$ 定义环层态射[95]

$$\phi : \mathscr{O}_X \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_T).$$

设 U 为 X 的开子概形, 使 Y 在其中为闭的. 由于 T 与 $T_{\mathscr{J}}$, 相应地 $Y_{\mathscr{J}}$ 与 Y, 具有相同的底空间, f 的底连续映射将 T 映入 U. 由于 U 在 X 中开, 态射 ϕ 诱导环层态射

$$\mathscr{O}_U = \mathscr{O}_X|_U \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_T),$$

即 f 经由 U 分解.


因此, 可以只考虑 Y 为闭的情形, 这时它由理想层 $\mathscr{I}_Y$ 定义. 态射 f 经由 Y 分解当且仅当复合

$$\mathscr{I}_Y \longrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_T)$$

为零. 由于 $f_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}$ 分解, 复合

$$\mathscr{I}_{Y_{\mathscr{J}}} \longrightarrow \mathscr{O}_{X_{\mathscr{J}}} \longrightarrow f_*(\mathscr{O}_{T_{\mathscr{J}}})$$

为零. 考虑如下交换图, 其中第一行正合:



从而 ϕ 将 $\mathscr{I}_Y$ 映入 $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$.[96] 由于 $\mathscr{J}^2 = 0$, $\mathscr{O}_X$-模 $f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T)$ 被 $\mathscr{I}_Y$ 零化, 其中 $\mathscr{O}_X$-模结构由 ϕ 诱导. 因此 ϕ 诱导 $\mathscr{O}_X$-模态射

$$h : i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) = \mathscr{I}_Y/\mathscr{I}_Y^2 \longrightarrow f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

另一方面, 有如下笛卡尔方图:

$$\begin{array}{ccccc} T_0 & \xrightarrow{f_0} & X_0 & \xleftarrow{i_0} & Y_0 \\ \downarrow{\scriptstyle \tau_{T_0}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{X_0}} & & \downarrow{\scriptstyle \tau_{Y_0}} \\ T & \xrightarrow{f} & X & \xleftarrow{i} & Y \end{array}.$$

这里 $\tau_{T_0}, \tau_{X_0}, \tau_{Y_0}$ 是由 $S_0 \hookrightarrow S$ 经基变换得到的闭浸入. 由于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_T$ 是被 $\mathscr{J}$ 零化的拟凝聚 $\mathscr{O}_T$-模, 存在同构

$$\mathscr{J}\mathscr{O}_T \simeq (\tau_{T_0})_*\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T),$$

[94]编者注: 下文补出了这些验证.

[95]编者注: 一方面, 已删除 $\mathscr{J}$ 幂零的假设, 即 X_0 与 X 有相同底拓扑空间的假设; 另一方面, 扩充了下面的一句话.

[96]编者注: 下面的论证作了扩充.

从而

$$f_*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) \simeq (\tau_{X_0})_*(f_0)_*\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

因此, 由伴随性, h 对应于 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$h_0 : f_0^*\tau_{X_0}^* i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) \longrightarrow \tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

底本记号说明. Polo–Gille 版的正文以及此处关于 h_0 的公式, 将笛卡尔方图和前面的基变换公式中标为 τ_{T_0} 的闭浸入印作 i_{T_0}. 我们统一使用 τ_{T_0}.

现在

$$\tau_{X_0}^* i_*(\mathscr{N}_{Y/X}) \simeq (i_0)_*\tau_{Y_0}^*(\mathscr{N}_{Y/X}) = \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}.$$

回到通常的记号滥用 $\tau_{T_0}^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_T) = \mathscr{J}\mathscr{O}_T$, 态射 h_0 可等同于 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$h_0 : f_0^*(\mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0}) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_T,$$

这就是所求障碍 $c(X, Y, f)$. 这就证明了(i).

当 f 为浸入 $i' : Y' \hookrightarrow X$ 时, 可见 $c(X, Y, i')$ 来自同态

$$\mathscr{I}_Y \hookrightarrow \mathscr{O}_X \longrightarrow \mathscr{O}_{Y'},$$

因而由4.4.1 和4.5.1, 它对应于类 $d(Y, Y')$. 这就证明了 (ii).

底本记号说明. 在此处, Polo–Gille 版的证明印作 $i' : Y \hookrightarrow X$, 但(ii) 将 i' 定义为 Y' 的浸入. 这里使用后者作为定义域.

下面证明 (iii). 首先, $D : \mathscr{N}_{Y/X} \to i^*(\Omega^1_{X/S})$ 诱导态射

$$\begin{aligned} D_0 : \quad \tau_{Y_0}^*(\mathscr{N}_{Y/X}) &\longrightarrow \tau_{Y_0}^* i^*(\Omega^1_{X/S}) \\ &= i_0^*\tau_{X_0}^*(\Omega^1_{X/S}). \end{aligned}$$

由于 $X_0 = X \times_S S_0$, 有

$$\tau_{X_0}^*(\Omega^1_{X/S}) \simeq \Omega^1_{X_0/S_0} \qquad (\text{参见 EGA IV}_4, 16.4.5).$$

这就给出了所述态射

$$D_0 : \mathscr{N}_{Y/X} \otimes_{\mathscr{O}_Y} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0}.$$

在下述注之后, 我们将验证等式 $(***)$.

注 4.9. 障碍 $c(X, Y, f)$ 可在 T 上局部计算. 设 $U = \mathrm{Spec}(C)$ 为 T 的仿射开子集, 位于 X 的仿射开子集 $\mathrm{Spec}(A)$ 之上, 而后者又位于 S 的仿射开子集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 之上. 设 $J \subset I \subset \Lambda$, 相应地 $I_Y \subset A$, 为对应于 $\mathscr{J} \subset \mathscr{I}$, 相应地 $\mathscr{I}_Y$ 的理想, 令 $B = A/I_Y$, 并设 $\phi : A \to C$ 为对应于 $f : T \to X$ 的 Λ-代数态射. 由于 $f(T_{\mathscr{J}}) \subset Y_{\mathscr{J}}$, 有 $\phi(I_Y) \subset JC$, 因而 ϕ 诱导 Λ-代数态射

$$B \longrightarrow C/JC \longrightarrow C_0 = C/IC.$$

于是障碍 $c = c(X, Y, f)$ 由下述交换图计算:

$$\begin{array}{ccccc} I_Y & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\phi} & C \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ I_Y/I_Y^2 & \longrightarrow & (I_Y/I_Y^2) \otimes_B C_0 & \xrightarrow{c} & JC \end{array},$$

即在 U 上, 它是下列集合中满足随后条件的唯一元素:

$$\mathrm{Hom}_{C_0}\left(I_Y/I_Y^2\otimes_B C_0, JC\right)=\mathrm{Hom}_{B_0}\left(I_Y/I_Y^2\otimes_B B_0, JC\right)$$

采用显然的记号, 该条件为

$$c(\overline{x}\otimes_B 1)=\phi(x)\qquad \text{对每个 } x\in I_Y.$$

[97] 现在可以完成4.8(iii) 的证明. 等式 $(***)$ 可在 T 上局部验证, 故归结为上述仿射情形. 用 $d_{A/\Lambda}: A\to\Omega^1_{A/\Lambda}$ 表示微分. 在 U 上, 元素 a 对应于下列集合的元素 a_U:

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{C_0}\left(\Omega^1_{A_0/\Lambda_0}\otimes_{A_0} C_0, JC\right)\\ &\quad\simeq \mathrm{Hom}_{B_0}\left(\Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B_0, JC\right)\simeq \mathrm{Hom}_A(\Omega^1_{A/\Lambda}, JC).\end{aligned}$$

一方面, $v_{f_0}(a)$ 在 U 上对应于 $a_U\circ D_0$, 其中 D_0 为如下 B-模态射:[98]

$$\begin{aligned}I_Y/I_Y^2 &\longrightarrow \Omega^1_{A/\Lambda}\otimes_A B_0,\\ x+I_Y^2 &\longmapsto d_{A/\Lambda}(x)\otimes 1.\end{aligned}$$

另一方面 (参见0.1.8 和0.1.9 的证明), 对应于 $a\cdot f$ 的 Λ-代数态射 $\phi': A\to C$ 与 ϕ 之差为由 a_U 关联的 Λ-导子 $A\to JC$; 即

$$\phi'=\phi+a_U\circ d_{A/\Lambda}=\phi+a_U\circ(d_{A/\Lambda}\otimes 1).$$


因此, 记 $c'=c(X,Y,a\cdot f)$, 对每个 $x\in I_Y$, 用 $\overline{x}$ 表示其在 I_Y/I_Y^2 中的像, 则有

$$\begin{aligned}(c'-c)(\overline{x}\otimes 1) &= a_U\big(d_{A/\Lambda}(x)\otimes 1\big)\\ &= (a_U\circ D_0)(\overline{x})=v_{f_0}(a)(\overline{x}).\end{aligned}$$


这就证明了 $c'-c=v_{f_0}(a)$.

4.10. 原版的注 4.10 已删除, 因为加入注 4.8.0 后, 它已无必要.

4.11. 现在研究如下情形. 设 S, $S_{\mathscr{J}}$ 和 S_0 如4.8 所述. 给定三个 S-概形 X, X', T, X 的子概形 Y (相应地, X' 的子概形 Y'), 以及态射 $f: T\to X'$ 和 $g: X'\to X$.



假设模 $\mathscr{J}$ 约化后, 此图可以补成交换图



[97]编者注: 以下内容为新增内容.
[98]编者注: 参见编者注 93.

因此, 由4.8, 有障碍

$$\begin{aligned} c(X,Y,g\circ i') &\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'_0}}\big(i_0'^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}\big),\\ c(X',Y',f) &\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big),\\ c(X,Y,g\circ f) &\in \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big), \end{aligned}$$

我们要计算它们之间的关系. [99]

引理 4.12. *假设 Y' 在 S 上平坦, 因而*

$$\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y'_0}=\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}.$$

则:

(i) *存在自然态射*

$$\begin{aligned} b_{f_0}:\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y'_0}}\big(i_0'^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}\big)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big). \end{aligned}$$

(ii) *还存在关于 T 具有函子性的自然态射,* [100]

$$\begin{aligned} a_{g_0}(f_0):\ &\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big). \end{aligned}$$

证明. [101] 首先注意, 固定 X,X',Y,Y' 后, 给定上述 T 等价于给定态射 $(f,f_{\mathscr{J}}):T\to X'\times_{X'^{+}}Y'^{+}$. 令 $Z=X'\times_{X'^{+}}Y'^{+}$, 并设 M 和 M' 为如下定义的 Z-函子: 对每个 $f:T\to Z$, 令

$$\begin{aligned} M(T)&=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}g_0^{*}(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big),\\ M'(T)&=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^{*}(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}),\mathscr{J}\mathscr{O}_{T}\big). \end{aligned}$$

[102]

在任何情形下都有交换图

$$\begin{array}{ccc} f_0^{*}\big(\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y'_0}\big) & = & \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}\\ \downarrow & & \downarrow\\ f_0^{*}(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}) & \dashrightarrow & \mathscr{J}\mathscr{O}_{T} \end{array}$$

[99]编者注: 从4.17 起, 将此结果应用于如下情形: X 为 S-群, $g:X\times_S X\to X$ 为乘法, Y 为 X 的子概形, 使得 $Y_{\mathscr{J}}$ 是 $X_{\mathscr{J}}$ 的子群, $Y'=Y\times_S Y$, 而两个态射 $Y^3\to X^2$ 分别将 (y_1,y_2,y_3) 映到 (y_1y_2,y_3) 及 (y_1,y_2y_3). 此时比较上述障碍将表明, Y 成为 X 的子群的障碍属于某个 Hochschild 上同调群 $H^2(Y_0,N_0)$.

[100]编者注: 已删除 Y'_0 在 X'_0 中为局部完全交的假设, 由4.8.0 可知它是多余的. 还补充说明 $a_{g_0}(f_0)$ "关于 T 具有函子性", 这一事实在4.17 的证明中起关键作用.

[101]编者注: 此证明作了扩充, 以明确说明 a_{g_0} "关于 T 的函子性".

[102]编者注: 从4.16 起, 情形会简化: 我们将只考虑在 S 上平坦的概形, Y 将是平坦的 S-群, 且 $Y'=Y\times_S Y$; 这将给出 S_0-函子 N_0 和 N'_0.

由于 Y' 在 S 上平坦, 左侧竖直箭头是同构, 从而得到 $\mathscr{O}_{T_0}$-模态射

$$f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'}) \longrightarrow \mathscr{J}\mathscr{O}_T.$$

它诱导交换群态射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'})\big) \longrightarrow M(T),$$

将它与下列由 f_0^* 诱导的态射

$$M(Y') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), f_0^*(\mathscr{J}\mathscr{O}_{Y'})\big)$$

复合, 就得到态射 $b_{f_0}: M(Y')\to M(T)$.

同样, 在任何情形下都有图

$$\begin{array}{ccc} g_0^*\big(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}\big) & \dashrightarrow & \mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}) & \longrightarrow & \mathscr{N}_{Y'_0/X'_0} \end{array}$$

由于 Y' 在 S 上平坦, 由4.8.0, 第二个竖直箭头为同构. 因此得到 $\mathscr{O}_{Y'_0}$-态射

$$i_0'^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}) \longrightarrow \mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}.$$

这诱导态射 $a_{g_0}(\mathrm{id}_{Y'}): M'(Y')\to M(Y')$, 且对每个 $f: T\to Z$, 诱导态射 $a_{g_0}(f): M'(T)\to M(T)$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} M'(Y') & \xrightarrow{a_{g_0}(\mathrm{id}_{Y'_0})} & M(Y') \\ {\scriptstyle b'_{f_0}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_{f_0}} \\ M'(T) & \xrightarrow[a_{g_0}(f_0)]{} & M(T) \end{array}$$

这里 b'_{f_0} 的定义与 b_{f_0} 相同. 证毕.

注 4.12.1. [103] *设 M_0 和 M'_0 为如下定义的 Y'_0-函子: 对每个 $f: T_0\to Y'_0$, 令*

$$M_0(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*g_0^*(\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}), \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}\big),$$
$$M'_0(T) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\big(f_0^*(\mathscr{N}_{Y'/X'}\otimes_{\mathscr{O}_{Y'}}\mathscr{O}_{Y'_0}), \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}\big).$$

立即可见 $Z_0 = Y'_0$, 且在 S 上平坦的 Z-概形 T 所组成的范畴上, 函子 M 和 M' 分别与 $\prod_{S_0/S}M_0$ 和 $\prod_{S_0/S}M'_0$ 一致. 此时, b_{f_0} 就是由 f_0 诱导的态射

$$f_0^*: M_0(Y'_0)\longrightarrow M(T_0)$$

此外, 对每个态射 $u: U\to T$, 若 $h = f\circ u$, 则下图交换:

[103] 编者注: 此注为新增内容, 将用于4.17 的证明.

$$\begin{array}{ccc} M_0'(T_0) & \xrightarrow{a_{g_0}(f_0)} & M_0(T_0) \\ \downarrow{\scriptstyle u_0^*} & & \downarrow{\scriptstyle u_0^*} \\ M_0'(U_0) & \xrightarrow[a_{g_0}(h_0)]{} & M_0(U_0) \end{array}$$

因此 a_{g_0} 成为函子态射

$$\prod_{S_0/S} M_0' \longrightarrow \prod_{S_0/S} M_0.$$

命题 4.13. *假设 Y' 在 S 上平坦. 则*

$$c(X,Y,g\circ f) = a_{g_0}\big(c(X',Y',f)\big) + b_{f_0}\big(c(X,Y,g\circ i')\big).$$

由于各个障碍以及态射 a_{g_0} 和 b_{f_0} 的定义都是局部的, 显然只需在所涉及的概形全为仿射概形时验证此公式. 记

$$\begin{gathered} S=\operatorname{Spec}(\Lambda),\qquad S_{\mathscr{J}}=\operatorname{Spec}(\Lambda/\mathscr{J}),\qquad S_0=\operatorname{Spec}(\Lambda/\mathscr{I}),\\ T=\operatorname{Spec}(C),\qquad X=\operatorname{Spec}(A),\qquad Y=\operatorname{Spec}(A/I_Y)=\operatorname{Spec}(B),\\ X'=\operatorname{Spec}(A'),\qquad Y'=\operatorname{Spec}(A'/I_{Y'})=\operatorname{Spec}(B'). \end{gathered}$$

因此有如下环与理想的图 [104]

$$\begin{array}{ccccc} & & B' & & B \\ & & \uparrow{\scriptstyle \pi'} & & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ C & \xleftarrow{f} & A' & \xleftarrow[g]{} & A \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & I_{Y'} & & I_Y \end{array}$$

考察待证公式中的各项. 下文中, 对 $x\in I_Y$ (相应地, $u\in I_{Y'}$), 用 $\bar{x}$ (相应地, $\bar{u}$) 表示它在 I_Y/I_Y^2 (相应地, $I_{Y'}/I_{Y'}^2$) 中的像. 若 m 属于 Λ-模 M, 则用 $\bar{m}_0$ 表示其在 $M_0=M/\mathscr{I}M$ 中的像.

我们已知 $c=c(X,Y,g\circ f)$ 是满足随后条件的唯一 C_0-态射

$$I_Y/I_Y^2\otimes_B C_0 \longrightarrow \mathscr{J}C$$

该条件为对每个 $x\in I_Y$, 均有 $c(\bar{x}\otimes 1)=f(g(x))$.

固定 $x\in I_Y$. 由于 $g_{\mathscr{J}}(Y'_{\mathscr{J}})\subset Y_{\mathscr{J}}$, 有 $g(x)\in I_{Y'}+\mathscr{J}A'$. 记


$$g(x)=x'+\sum_i \lambda_i a_i',\qquad x'\in I_{Y'},\quad \lambda_i\in\mathscr{J},\quad a_i'\in A'.$$

于是

$$c(X,Y,g\circ f)(\bar{x}\otimes 1)=f(g(x))=f(x')+\sum_i \lambda_i f(a_i'). \tag{1}$$

考虑 $a_{g_0}(c(X',Y',f))$. 根据刚给出的定义, 它由下图定义:

[104]编者注: 沿用原版的记号, 用 $f:A'\to C$ 和 $g:A\to A'$ 表示对应于 $f:T\to X'$ 和 $g:X'\to X$ 的环同态. 这就解释了对 $x\in I_Y$ 的公式 $c(X,Y,g\circ f)(\bar{x}\otimes 1)=f(g(x))$.



因此 $a_{g_0}(c(X',Y',f))(\bar{x}\otimes 1)=f(u)$, 其中 $u\in I_{Y'}$ 在 $I_{Y'_0}/I^2_{Y'_0}$ 中的像 $\bar{u}$ 满足

$$\bar{u}_0\otimes 1=\bar{g}_0(\bar{x}_0)\otimes 1=g_0(\bar{x}_0)\otimes 1.$$


故可取 $u=x'$, 得到

$$a_{g_0}(c(X',Y',f))(\bar{x}\otimes 1)=f(x'). \tag{2}$$

最后考虑 $b_{f_0}(c(X,Y,g\circ i'))$. 根据假设, Λ_0-代数态射 $f_0: A'_0\to C_0$ 经由 B'_0 分解. 由于 Y' 平坦, 因而有

$$\mathscr{J}\otimes_{\Lambda_0} B'_0\xrightarrow{\sim}\mathscr{J}B',$$

于是得到 B'_0-模态射 $\psi:\mathscr{J}B'\to\mathscr{J}C$, 使下图交换:




设

$$\varphi:\mathscr{J}B'\otimes_{B'_0} C_0\longrightarrow\mathscr{J}C$$

为 ψ 诱导的 C_0-模态射. 则对每个 $a'\in A'$ 及 $\lambda\in\mathscr{J}$,

$$\varphi(\lambda\pi'(a')\otimes 1)=\lambda f(a'). \tag{†}$$

于是元素 $b_{f_0}(c(X,Y,g\circ i'))$ 由如下交换图定义:



因此,

$$b_{f_0}(c(X,Y,g\circ i'))(\bar{x}\otimes 1)=\varphi\left(\sum_i \lambda_i\pi'(a_i')\otimes 1\right)=\sum_i \lambda_i f(a_i'), \tag{3}$$

最后一个等式由 (†) 得到. 比较三个显式公式(1), (2) 和(3), 即得所求公式.

推论 4.14. *设 Y,Y' 为 X 的两个平坦子概形, 均约化为 $Y_{\mathscr{J}}$, 并假设 Y_0 在 X_0 中是局部完全交. 若 $f:T\to X$ 为 S-态射, 使得 $f_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 分解, 则*

$$c(X,Y,f)-c(X,Y',f)=b_{f_0}\big(d(Y,Y')\big).$$

事实上, 将上述公式应用于图

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle i'} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ T & \xrightarrow{f} & X & \xrightarrow{\quad\mathrm{id}\quad} & X \end{array}$$

得到 $c(X,Y,f)-c(X,Y',f)=b_{f_0}(c(X,Y,i'))$. 此外, 由4.8(ii), $c(X,Y,i')=d(Y,Y')$.

命题 4.15. *设 X 为在 S 上平滑的 S-群, Y 为其在 S 上平坦且局部有限呈示的子 S-群. 则 Y 在 X 中是局部完全交 (参见4.6.2).*

证明. [105] 我们证明浸入 $Y\to X$ 在 EGA IV_4, 16.9.2 的意义下正则. 由 EGA IV_4, 19.5.1, 这蕴涵它在 4.6.2 的意义下也正则 (事实上, 由同上可知, 当 S 局部 Noether 时, 两个定义等价). 因此这里的 "正则浸入" 将指 EGA IV_4, 16.9.2 意义下的正则浸入. 由于 X 和 Y 在 S 上平坦且局部有限呈示, EGA IV_4, 19.2.4 将此断言归结为证明: 对每个 $s\in S$, $Y_s\to X_s$ 为正则浸入. 由 EGA IV_4, 19.1.5(ii), 只需在 S 的几何纤维上验证, 因而可假设 S 是代数闭域 k 的谱.

由第 VI_A 篇 3.2, 商 X/Y 存在且平滑, 态射 $\pi:X\to X/Y$ 平坦, 且下图为笛卡尔方图:

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \bar{e} & \xrightarrow{i} & X/Y \end{array}$$

这里 $\bar{e}$ 为 X 的单位点在 X/Y 中的像. 由平坦基变换 (参见 EGA IV_4, 19.1.5(iii)), 只需证明 i 为正则浸入. 这显然成立: Noether 局部环 $\mathscr{O}_{X/Y,\bar{e}}$ 平滑 (从而正则), 所以其极大理想由正则序列生成.

4.16. [106] 设 X 为在 S 上平滑的 S-群, 用 $\mu:X\times_S X\to X$ 表示其群运算. 设 $Y_{\mathscr{J}}$ 为 $X_{\mathscr{J}}$ 的子 $S_{\mathscr{J}}$-群, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦且局部有限呈示. 由4.15, $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $X_{\mathscr{J}}$ 中是局部完全交. 从

[105]编者注: 在陈述中加入了 Y 在 S 上局部有限呈示的假设, 并补出了下面的证明, 它比原版所勾画的证明更直接. 为完整起见, 也将后者写出. 与上面的证明一样, 首先归结为 $S=\mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 代数闭的情形. 由 EGA IV_4, 16.9.10 和 19.3.2, 只需证明对每个 $y\in Y$, 局部环 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的完备化是一个完备 Noether 局部环对某个正则序列的商. 由同上 19.3.3, 满足此性质的 $y\in Y$ 所组成的集合是开子集 $U\subset Y$. 由于 Y 在 k 上有限型, 只需证明 U 包含每个闭点. 由于 Y 为 k-群, 经平移可归结为考察 $\mathscr{O}_{Y,e}$ 的完备化, 即 Y 对应的形式群 $\widehat{Y}$ (参见第 VII_B 篇). 由于 X 平滑, 仿射代数 $\mathscr{A}(\widehat{X})$ 是幂级数代数 $k[[X_1,\dots,X_n]]$. Dieudonné 结构定理表明 $\mathscr{A}(\widehat{Y})$ 同构于商

$$k[[X_1,\dots,X_{r+s}]]/(X_1^{p^{n_1}},\dots,X_r^{p^{n_r}}),$$

其中 p 为 k 的特征指数, 且 $r+s\le n$; 参见第 VII_B 篇, 注 5.5.2(b).

[106]编者注: 我们重新组织了4.16, 将4.15 末尾陈述的假设和障碍 DY 的定义集中在此.

而由4.6.5, 每个平坦的 [107] 提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 S-概形 Y 在 X 中都是局部完全交. 对这样的 Y, 由4.8.0 得

$$\mathscr{N}_{Y/X}\otimes_{\mathscr{O}_Y}\mathscr{O}_{Y_0}=\mathscr{N}_{Y_0/X_0}=\mathscr{N}_{Y_{\mathscr{J}}/X_{\mathscr{J}}}\otimes_{\mathscr{O}_{Y_{\mathscr{J}}}}\mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.1}$$

另一方面, 设 $\varepsilon_0: S_0\to Y_0$ 为 Y_0 的单位截面, 并设 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$ 为拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模

$$\mathbf{n}_{Y_0/X_0}=\varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0}).$$

由于 Y_0 和 X_0 都是 S_0-群, 显然 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ 在例如 Y_0 的左平移下不变. 因此, [108] 它是 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$ 在 $Y_0\to S_0$ 下的逆像; 即

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0}=\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}. \tag{4.16.2}$$

结合 (4.16.1) 和 (4.16.2), 首先由4.5 推出, X 中在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y 所组成的集合, 或为空集, 或为下列群下的主齐性空间:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0},\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}). \tag{4.16.3}$$

另一方面, 4.8(i) 表明, 对每个这样的 Y 及每个满足 $f_{\mathscr{J}}: T_{\mathscr{J}}\to X_{\mathscr{J}}$ 经由 $Y_{\mathscr{J}}$ 分解的 S-态射 $f: T\to X$, f 经由 Y 分解的障碍 $c(X,Y,f)$ 属于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0},\ \mathscr{J}\mathscr{O}_T).$$

若 T 也在 S 上平坦, 则最后这个群等于

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0},\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}).$$

这促使我们引入下述群函子 N_0.

定义 4.16.1. *设 N_0 为如下定义的交换群值 S_0-函子: 对每个 $Z\in \mathrm{Ob}(\mathbf{Sch})_{/S_0}$, 令*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Z,N_0)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_Z}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_Z,\ \mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_Z). \tag{*}$$

则 X 中在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y 所组成的集合, 或为空集, 或为下列群下的主齐性空间:

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0,N_0)=C^1(Y_0,N_0).$$

对每个这样的 Y, 考虑图

$$\begin{array}{ccc} Y\times_S Y & & Y \\ {\scriptstyle (i,i)}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle i} \\ X\times_S X & \xrightarrow{\qquad\mu\qquad} & X \end{array}$$

并令

$$DY=c(X,Y,\mu\circ(i,i))$$

为 $\mu\circ(i,i)$ 经由 Y 分解的障碍, 即 Y 在 X 的群运算下稳定的障碍. 由上文, DY 是下列群的元素:

$$N_0(Y_0\times_{S_0}Y_0)=C^2(Y_0,N_0).$$

引理 4.17.[109] *设 X 为在 S 上平滑的 S-群, $Y_{\mathscr{J}}$ 为 $X_{\mathscr{J}}$ 的子 $S_{\mathscr{J}}$-群, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦且局部有限呈示. 对 X 的每个在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y, 考虑4.16.1 中定义的障碍:*

$$DY\in\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0\times_{S_0}Y_0,N_0)=C^2(Y_0,N_0).$$

[107]编者注: 已对原文作了修正, 加入 “平坦” 一词.
[108]编者注: 见下文4.25.
[109]编者注: 已修改4.17 和 4.18, 以纳入4.16 中增补的内容.

(i) *Y 是 X 的子 S-群的充分必要条件为 $DY = 0$.*

(ii) *若通过函子性, 使 Y_0 经由 Y_0 的内自同构作用于 N_0, 则 $DY \in Z^2(Y_0, N_0)$.*

(iii) *若 Y 和 Y' 为 X 的两个在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 (因而偏差 $d(Y, Y') \in C^1(Y_0, N_0)$ 有定义; 参见4.5.1), 则*

$$DY' - DY = \partial^1 d(Y, Y').$$

110

下面依次证明这些断言.

4.18. — **证明 4.17(i).** 由定义, $DY = 0$ 当且仅当 Y 在 X 的群运算下稳定. 因此, 若 Y 为 X 的子群, 则 $DY = 0$. 反之, 若 $DY = 0$, 则 Y 带有诱导的运算 μ_Y, 该运算结合, 且模 $\mathscr{J}$ 约化后为 $X_{\mathscr{J}}$ 上的群运算. 由于 Y 在 S 上平坦且局部有限呈示, 由3.3 可知 μ_Y 为群运算.

4.19. — **证明 4.17(ii).** 比较 $u = c(X, Y, \mu^2 \circ (i,i,i))$ 在下述两个图 (D_j), $j = 1, 2$ 中算得的两个值:

(D_j)

$$\begin{array}{ccccc} Y \times_S Y \times_S Y & & Y \times_S Y & & Y \\ \downarrow{\scriptstyle (i,i,i)} & & \downarrow{\scriptstyle (i,i)} & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X \times_S X \times_S X & \xrightarrow{f_j} & X \times_S X & \xrightarrow{\mu} & X \end{array}$$

这里 $f_1 = (1, \pi)$, $f_2 = (\pi, 1)$, 而 μ^2 表示态射

$$\mu \circ f_1 = \mu \circ f_2 : X \times_S X \times_S X \longrightarrow X.$$

111 令

$$\mu_Y = \mu \circ (i,i), \qquad f_j^Y = f_j \circ (i,i,i), \qquad \mu^{2,Y} = \mu^2 \circ (i,i,i).$$

对 $j = 1, 2$, 设 a_j 和 b_j 为态射

$$a_j = a_{\mu_0}((f_j^Y)_0), \qquad b_j = b_{(f_j^Y)_0},$$

它们由引理 4.12 关联于态射对 (f_j^Y, μ). 因而

$$\begin{cases} a_j : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}\left((f_j^Y)_0^* \mathscr{N}_{Y_0 \times Y_0 / X_0 \times X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}\right) \longrightarrow \\ \qquad\qquad \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}\left((\mu^{2,Y})_0^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}\right), \\ b_j : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^2}}\left((\mu_Y)_0^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^2}\right) \longrightarrow \\ \qquad\qquad \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0^3}}\left((\mu^{2,Y})_0^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_{Y_0^3}\right). \end{cases} \tag{†}$$

由于

$$\mathscr{N}_{Y_0 \times Y_0 / X_0 \times X_0} \simeq \mathrm{pr}_1^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0} \oplus \mathrm{pr}_2^* \mathscr{N}_{Y_0/X_0}$$

(因为 X_0 和 Y_0 在 S_0 上平坦), 且

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \simeq \mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{Y_0},$$

110编者注: 原版作 $DY' - DY = -\partial d(Y, Y')$, 但其中的算子 ∂ 是第 I 篇5.1 所定义的微分 ∂^1 的相反数.
111编者注: 略微修改了记号, 并扩充了论证的开头.

有

$$(f_j^Y)_0^*\mathscr{N}_{Y_0\times Y_0/X_0\times X_0}\simeq(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\oplus\mathbf{n}_{Y_0/X_0})\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3},$$

同样有

$$(\mu^{2,Y})_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}\simeq\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^3},$$
$$(\mu_Y)_0^*\mathscr{N}_{Y_0/X_0}\simeq\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}.$$

此外, 由于 Y_0^2 和 Y_0^3 在 S_0 上平坦, (†) 可改写为

$$\begin{cases}a_j:\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0\oplus N_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0),\\ b_j:\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^2,N_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{S_0}(Y_0^3,N_0).\end{cases}\tag{‡}$$

对 $c(X,Y,\mu^{2,Y})=u$ 两次应用4.13, 得到

$$\begin{aligned}a_1\big(c(X^2,Y^2,f_1)\big)+b_1\big(c(X,Y,\mu_Y)\big)&=u\\&=a_2\big(c(X^2,Y^2,f_2)\big)+b_2\big(c(X,Y,\mu_Y)\big).\end{aligned}$$

现在 $c(X,Y,\mu_Y)=DY$, 且由于 $f_1=(1,\mu)$ 及 $f_2=(\mu,1)$, 采用显然的记号有

$$c(X^2,Y^2,f_1)=(0,DY),\qquad c(X^2,Y^2,f_2)=(DY,0).$$

因此,

$$u=a_1((0,DY))+b_1(DY)=a_2((DY,0))+b_2(DY).$$

首先注意, b_j 就是 $\mathrm{Hom}_{S_0}((f_j^Y)_0,N_0)$, 即由 $(f_j^Y)_0$ 经函子性得到的态射. 因此上述恒等式成为

$$\begin{aligned}a_1((0,DY))-\mathrm{Hom}((\mu,1),N_0)(DY)+\mathrm{Hom}((1,\mu),N_0)(DY)\\-a_2((DY,0))=0.\end{aligned}$$

中间两项就是 2-余边界公式中的 $DY(xy,z)$ 和 $DY(x,yz)$ 两项. 现在只需确定另外两项.

先计算映射 a_j. 它由下列 $\mathscr{O}_{Y_0^2}$-模态射沿 $(f_j^Y)_0$ 拉回得到:

$$P:\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}\longrightarrow(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\oplus\mathbf{n}_{Y_0/X_0})\otimes\mathscr{O}_{Y_0^2}$$

其中此态射由 Y_0 中的乘法诱导. 考虑向量丛 $V=\mathbf{V}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0})$. 由对偶性, P 给出

$$\mathbf{V}(P):V\times_{S_0}V\times_{S_0}Y_0\times_{S_0}Y_0\longrightarrow V\times_{S_0}Y_0\times_{S_0}Y_0,$$

它在集合论意义下表示为

$$\mathbf{V}(P)(u,v,a,b)=(u+\mathrm{Ad}(a)v,ab,b).$$


[112] 证明与 Lie 代数的相应事实, 即关于模 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 的事实的证明完全相同. 首先注意, 由关于 Y_0 的函子性, V 在 S_0 上的向量丛范畴中带有群结构. 由已用于 Lie 代数的引理 (第 II 篇, 3.10), 此结构与其 $\mathscr{O}_S$-模结构的底群结构一致. 其次,

$$\mathbf{V}\big(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{Y_0}\big)=\mathbf{V}(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$$


自身也带有 S_0-群结构, 即 V 上的群结构与 Y_0 上的群结构所给出的半直积. 只需确定 Y_0 在 V 上的作用, 即得所求公式.

现在计算余下两项. 先考虑 $a_1((0,DY))$. 它由下图计算, 其中 $\mathbf{n}$ 表示 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$:

[112]编者注: 已将分量 a,b 换为 ab,b, 以表明 $\mathbf{V}(P)$ 是乘法态射 $V_{Y_0}\times_{S_0}V_{Y_0}\to V_{Y_0}$ 拉回到 Y_0^2 所得.



将这些模定义的向量丛视为 S_0 上的概形, 并取以任意概形为值的点. 若 (u,x,y,z) 表示 $\mathbf{V}(\mathscr{J})\times Y_0^3$ 的一点, 则得到下图:



因此

$$a_1((0,DY))(x,y,z)=\mathrm{Ad}(x)DY(y,z),$$


这正是余边界的第一项. 同样, $a_2((DY,0))(x,y,z)=DY(x,y)$, 因此

$$\begin{aligned}0=&\ \mathrm{Ad}(x)DY(y,z)-DY(xy,z)+DY(x,yz)-DY(x,y)\\=&\ (\partial^2 DY)(x,y,z).\end{aligned}$$


113

4.20. — **证明 4.17(iii).** [114] 比较 $v=c(X,Y,\mu\circ(i',i'))$ 在下述两个图中算得的两个值:

$(*)$



$(\dagger)$



设 $f=\mu\circ(i',i')$. 图 $(*)$ 给出

$$v=DY'+f_0^*\big(c(X,Y,i')\big). \tag{1}$$

[113]编者注: 修改了符号, 使之与第 I 篇5.1 一致.
[114]编者注: 下面的论证在原版基础上作了扩充.

现在 $Y_0' = Y_0$, 且 f_0 为乘法 $Y_0^2 \to Y_0$; 故

$$f_0^*(c(X,Y,i'))(x_0,y_0) = c(X,Y,i')(x_0y_0). \tag{2}$$

令 $c = c(X,Y,i')$. 在等同 $N_0' \simeq N_0 \oplus N_0$ 下, 元素

$$c(X \times_S X, Y \times_S Y, (i',i'))$$

与对 (c,c) 等同. 因此, 令 $h = (i',i')$, 图 (†) 给出

$$v = h_0^*(DY) + a_{\mu_0}(c,c). \tag{3}$$

由于 h_0 是 Y_0^2 上的恒等映射, 有 $h_0^*(DY) = DY$. 最后, 由前面对 a_{μ_0} 的计算, 对每个 $S' \to S$ 及每个 $x_0, y_0 \in Y_0(S_0')$,

$$a_{\mu_0}(c,c)(x_0,y_0) = c(x_0) + \mathrm{Ad}(x_0)(c(y_0)). \tag{4}$$

从而

$$\begin{aligned}(DY' - DY)(x_0,y_0) =& \ \mathrm{Ad}(x_0)(c(X,Y,i')(y_0)) - c(X,Y,i')(x_0y_0) + c(X,Y,i')(x_0) \\ =& \ (\partial^1 c(X,Y,i'))(x_0,y_0).\end{aligned} \tag{5}$$

由于 $c(X,Y,i') = d(Y,Y')$ (参见4.8(iii)), 这就证明了

$$DY' - DY = \partial^1 d(Y,Y').$$

定理 4.21. *设 S 为概形, $\mathscr{I}$ 和 $\mathscr{J}$ 为 S 上的两个理想*[115] *使得 $\mathscr{I} \supset \mathscr{J}$ 且 $\mathscr{I}\mathscr{J} = 0$. 设 X 为在 S 上平滑的 S-群, $Y_{\mathscr{J}}$ 为 $X_{\mathscr{J}}$ 的子 $S_{\mathscr{J}}$-群, 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平坦且局部有限呈示. 考虑由下式定义的交换群值 S_0-函子 N_0:*

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T,N_0) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right), \quad T \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Sch}/S_0),$$

Y_0 通过 X_0 的内自同构作用于它.

(i) *存在 X 的在 S 上平坦且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子 S-群的充分必要条件是下列两个条件成立:*

- (i_1) *存在 X 的在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子概形 Y. 当 Y_0 仿射时, 此条件自动满足 (参见4.6.5).*
- (i_2) *某个属于 $H^2(Y_0,N_0)$ 的典范障碍消失.*

(ii) *若 (i) 中的条件成立, 则 X 的在 S 上平坦且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子 S-群 Y 所组成的集合, 是 $Z^1(Y_0,N_0)$ 下的主齐性集.*[116]

事实上, 条件 (i_1) 是必要的. 假设它成立, 并设 Y 在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$. 须找到同样在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的 Y', 使得 $DY' = 0$,[117] 参见4.17(i). 由4.17(iii), 这等价于找到元素 $d(Y',Y) \in C^1(Y_0,N_0)$ 使得

$$DY = \partial^1 d(Y',Y).$$

[115]编者注: 已删除 $\mathscr{I}$ 幂零的假设, 因为它似乎是多余的.
[116]编者注: 对那些诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元的元素 $x \in X(S)$ 的共轭作用取商后, 此集合是否是 $H^1(Y_0,N_0)$ 下的主齐性集, 这一问题将在4.23–4.36 讨论.
[117]编者注: 已将原版的表达式 $\partial DY'$ 修正为 DY'.

[118] 设 $c \in H^2(Y_0, N_0)$ 为 DY 所代表的类, 由4.17(ii), 后者为余循环. 由4.17(iii), 此类与 Y 的选择无关, 且其消失是存在满足上述方程的 $d(Y', Y)$ 的充分必要条件. 这就证明了 (i).

若现在选定 Y 使 $DY = 0$, 则待解方程成为 $\partial^1 d(Y', Y) = 0$, 这就证明了(ii).

注 4.22. 沿用4.21 的记号. 由4.15, Y_0 在 X_0 中是局部完全交; 故 $\mathscr{N}_{Y_0/X_0}$ 为有限局部自由 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模, 因此

$$\mathbf{n}_{Y_0/X_0} = \varepsilon_0^*(\mathscr{N}_{Y_0/X_0})$$

为有限局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模. 因此, 记

$$\mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{Y_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{O}_{Y_0}),$$

则有

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right)\\ &\simeq \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\end{aligned}$$

其中 $T \to S_0$ 任意.[119] 因此, S_0-函子 N_0 同构于

$$\mathbf{W}\left(\mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right) \simeq \mathbf{W}\left(\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})\right).$$

从而存在同构[120]

$$\begin{aligned}H^2(Y_0, N_0) &\simeq H^2\left(Y_0, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})\right)\\ &\simeq H^2\left(Y_0, \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Z^1(Y_0, N_0) &\simeq Z^1\left(Y_0, \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})\right)\\ &\simeq Z^1\left(Y_0, \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\right).\end{aligned}$$

4.23. — 仍在 4.21 的假设下, 现在研究提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子群 Y 所成的集合在 X 的截面共轭作用下的性质. 若 x 是 X 在 S 上的截面, 且它诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面, 则 x 所定义的内自同构 $\mathrm{Int}(x)$ 将 X 中提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的平坦子群映为 X 中提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的平坦子群. 在 4.21(ii) 的条件下, 这些子群组成的集合是 $Z^1(Y_0, N_0)$ 下的一个主齐性空间. 我们将看到, 此时 $B^1(Y_0, N_0)$ 有一个子群 Γ [121], 使得 X 中两个在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子群, 由一个诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元的 $x \in X(S)$ 共轭, 当且仅当它们在 $Z^1(Y_0, N_0)$ 中的差属于 Γ. 在最好的情形下, 我们将证明 $\Gamma = B^1(Y_0, N_0)$. 因此, X 中提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的平坦子群所成的集合, 模去诱导 $X(S_{\mathscr{J}})$ 的单位元的元素 $x \in X(S)$ 所给的共轭作用后, 或者为空, 或者是 $H^1(Y_0, N_0)$ 下的主齐性空间 (参见 4.29 和 4.36).

4.24. — 沿用 4.21 的记号. 设 Y 是 X 的一个平坦子群, 其约化为 $Y_{\mathscr{J}}$. 回顾在 0.5 中引入的函子 L_0^X (相应地为 L_0^Y): 对可变的 S_0-概形 T, 它由等式

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(\omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T, \mathscr{J} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_T\right),$$

定义; 将 X 换成 Y 时也类似. 同时还引入了函子

$$L'_X = \prod_{S_0/S} L_0^X.$$

---

[118] 编者注: 见4.17(iii) 的编者注.

[119] 编者注: 扩充了上面的论证. 它表明下述同构不需要平坦性假设也成立. 另一方面, 从4.16 起, 讨论限制在 S 上平坦的 S-概形 $f : T \to S$, 以保证障碍 $c(X, Y, f)$ 所在的群

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{T_0}}\left(\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0}, \mathscr{J}\mathscr{O}_T\right),$$

与 $N_0(T_0)$ 一致; 见4.16 末尾.

[120] 编者注: 采用第 I 篇5.3 的记号, 并假设 Y_0 在 S_0 上仿射.

[121] 编者注: 已将 $Z^1(Y_0, N_0)$ 替换为 $B^1(Y_0, N_0)$, 因为证明表明 Γ 是 $B^1(Y_0, N_0)$ 的子群; 参见 4.27–4.29.

于是有:

引理 4.25. *存在典范的 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列*

$$\mathbf{n}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{d} \omega^1_{X_0/S_0} \longrightarrow \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0 \tag{+}$$

具有下述性质:

(i) *拉回到 Y_0 后, d 给出 4.8(iii) 中的态射 $\overline{D}_0$.*

(ii) *若 X_0 和 Y_0 在 S_0 上平滑, 则 d 为单射. 此时两个微分模均为有限型局部自由模, 因此 $\mathbf{n}_{Y_0/X_0}$ 也是有限型局部自由模, 且这一序列局部分裂.*

证明.[122] 以 $\pi_0 : Y_0 \to S_0$ 表示结构态射. 由 SGA 1 II 的公式 (4.3) (另见 EGA IV$_4$, 16.4.21), 存在典范的 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模正合序列

$$\mathscr{N}_{Y_0/X_0} \xrightarrow{\overline{D}_0} \Omega^1_{X_0/S_0} \otimes_{\mathscr{O}_{X_0}} \mathscr{O}_{Y_0} \longrightarrow \Omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0. \tag{†}$$

由于这一序列由 $(Y_0 \times_S Y_0)$-等变模及等变态射组成, 它经 ε_0^* 的拉回 (+) 是一个 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列, 而 (†) 是 (+) 经 π_0^* 的拉回 (参见第 I 篇第 6.8 节). 这就证明了 (i).

再设 X_0 和 Y_0 在 S_0 上平滑. 则由 SGA 1 II, 4.10 (另见 EGA IV$_4$, 17.2.3(i) 和 17.2.5), $\overline{D}_0$ 为单射, 且序列 (†) 由有限型局部自由 $\mathscr{O}_{Y_0}$-模组成 (因此局部分裂). 由范畴等价 I, 6.8.1, d 也为单射, 因此序列 (+) 具有所述性质.

4.26. —[123] 对每个 S_0-概形 $f : T \to S_0$, 序列 (+) 给出 $Y_0(T)$-$\mathscr{O}(T)$-模正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(f^*\omega^1_{Y_0/S_0}, f^*\mathscr{J}\right) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(f^*\omega^1_{X_0/S_0}, f^*\mathscr{J}\right) \\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_T}\left(f^*\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, f^*\mathscr{J}\right). \end{aligned}$$

因此存在 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow L_0^Y \longrightarrow L_0^X \xrightarrow{d} N_0. \tag{4.26.1}$$

它给出一个交换群复形的正合序列

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^Y) \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^X) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0),$$

特别地, 得到以下各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^0} & C^0(Y_0, N_0) \\ & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} & & \downarrow{\scriptstyle\partial} \\ 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0) \end{array}$$

注意到 $C^0(Y_0, L_0^Y)$ (相应地为 $C^0(Y_0, L_0^X)$) 正是

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(S_0, L_0^Y) = \mathrm{Hom}_S(S, L'_Y)$$

(相应地是将 Y 换成 X 所得的类似群); 由 0.9, 这是 Y (相应地为 X) 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的那些截面组成的群. 此外, d^1 恰好是 4.8(iii) 中的态射 $v_{i_{Y_0}}$, 其中 $i_{Y_0} : Y_0 \to X_0$ 为典范浸入. [124]

引理 4.27. *设 S, $\mathscr{I}$, $\mathscr{J}$ 和 X 满足 4.21 的条件, 并设 Y 是 X 的子群, 它在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$. 以 $i : Y \hookrightarrow X$ 表示典范浸入.* [125]

---

[122]编者注: 这一证明已作扩充, 以计入第 I 篇第 6.8 节增补的内容.
[123]编者注: 已扩充原文, 以明确指出这是一个 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列.
[124]编者注: 这由 $d : \mathbf{n}_{Y_0/X_0} \to \Omega^1_{X_0/S_0}$ 的定义 (参见 4.25) 及 $v_{i_{Y_0}}$ 的定义 (参见 4.8) 得到.
[125]编者注: 下面的 (i) 为增补内容; 它将在 4.35.1, 继而在 4.38(4) 及 (5) 中用到.

(i) *设 $i' : Y \to X$ 是提升 i_0 的 S-概形态射 (因而 i' 也是浸入), 置 $Y' = i'(Y)$, 并以 $d(i,i')$ 表示使 $i' = d(i,i') \cdot i$ 成立的 $C^1(Y_0, L_0^X)$ 的元素 (参见 1.2.4). 则偏差 $d(Y,Y') \in C^1(Y_0, N_0)$ (参见 4.5.1) 由下式给出:*

$$d(Y,Y') = d^1\big(d(i,i')\big).$$

(ii) *设 $x \in C^0(Y_0, L_0^X)$ 是 X 在 S 上的一个截面, 它在 $S_{\mathscr{J}}$ 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面. 则偏差 $d(Y, \mathrm{Int}(x)Y) \in C^1(Y_0, N_0)$ (参见 4.5.1) 由下式给出:*

$$-d\big(Y, \mathrm{Int}(x)Y\big) = d^1\partial x = \partial d^0 x.$$

事实上, Y' 是 Y 在复合态射 [126]

$$Y \xrightarrow{(d(i,i'),i)} L'_X \times_S X \longrightarrow X,$$

下的像, 此复合态射在 4.8(iii) 中记为 $d(i,i') \cdot i$. 因此, 由该处的结果及等式 $v_{i_0} = d^1$, 有

$$\begin{aligned} &c\big(X, Y', d(i,i') \cdot i\big) - c(X, Y', i) \\ &\quad = v_{i_0}\big(d(i,i')\big) = d^1\big(d(i,i')\big). \end{aligned}$$

但按定义, $d(i,i') \cdot i = i'$ 经过 Y' 分解, 所以第一项为零. 此外, 由 4.8(ii), 有

$$c(X, Y', i) = d(Y', Y) = -d(Y, Y').$$

因而 $d(Y,Y') = d^1(d(i,i'))$, 这就证明了 (i).

现设 x 如 (ii) 所述. 由公式

$$xyx^{-1} = xyx^{-1}y^{-1}y = (x - \mathrm{Ad}(y)x)y = (-\partial x)(y) \cdot y,$$

可知 Y' 是 Y 在浸入 $i' = (-\partial x) \cdot i_Y$ 下的像. 于是由 (i) 得到

$$-d\big(Y, \mathrm{Int}(x)Y\big) = d^1\partial x = \partial d^0 x.$$

推论 4.28. *设 Y 和 Y' 是 X 的两个子群, 它们在 S 上平坦且提升 $Y_{\mathscr{J}}$. 它们由 X 在 S 上的一个诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面共轭, 当且仅当*

$$d(Y,Y') \in \partial d^0 C^0(Y_0, L_0^X) \subset \partial C^0(Y_0, N_0) = B^1(Y_0, N_0).$$

底本说明. 法文重版本此处印为 G; 本节中的环境群始终是 X.

推论 4.29. *若 d^0 为满射, 则上述 Y 和 Y' 由 X 在 S 上的一个诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面共轭, 当且仅当 $d(Y,Y') \in B^1(Y_0, N_0)$.*

推论 4.30. *设 Y 如 4.27 所述. 用 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面对 Y 作共轭, 所得共轭子群的集合与下列集合同构:*

$$d^1\partial C^0(Y_0, L_0^X) = C^0(Y_0, L_0^X)/\ker(d^1\partial).$$

现在注意到, $C^0(Y_0, L_0^X)/\ker(d^1\partial)$ 的计算, 仅涉及 4.26 的交换图中左边的方块. 特别地, 也可以在任何具有相同左方块的同类图中计算它. 考虑 S_0 上的函子 L_0^X/L_0^Y, 其定义为

$$\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^X/L_0^Y) = \mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^X)/\mathrm{Hom}_{S_0}(T, L_0^Y).$$

存在交换图

[126] 编者注: 回顾 $L'_X = \prod_{S_0/S} L_0^X$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}) & \longrightarrow & C^0(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}/L_{0Y}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由前面的观察得到:

推论 4.31. *设 Y 如 4.27 所述. 用 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面对 Y 作共轭, 所得共轭子群的集合与下列集合同构:*

$$E = \partial C^0(Y_0, L_0^X/L_0^Y) = C^0(Y_0, L_0^X/L_0^Y)/H^0(Y_0, L_0^X/L_0^Y).$$

推论 4.32. *再设 S_0 仿射, 且 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模.* [127] *若*

$$\mathscr{F}_0 = \big(\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J},$$

则 $E = \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0)/H^0(Y_0, \mathscr{F}_0)$.

事实上,[128] 由于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模, 而 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 也是如此 (因为已假设 X 在 S 上平滑), 0.6 给出

$$L_0^Y = \mathbf{W}\big(\mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\big), \qquad L_0^X = \mathbf{W}\big(\mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\big).$$

另一方面, 由 4.25, 有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{K} \longrightarrow \omega^1_{X_0/S_0} \xrightarrow{\varphi} \omega^1_{Y_0/S_0} \longrightarrow 0, \qquad \mathscr{K} = \ker(\varphi).$$

由于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 与 $\omega^1_{X_0/S_0}$ 均为有限局部自由模, 存在局部分裂的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \longrightarrow \mathscr{F}_0 \longrightarrow 0.$$

因此存在 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow L_0^Y \longrightarrow L_0^X \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}_0).$$

由证明 4.31 时所用的论证, 可以将 E 计算为复合映射

$$C^0(Y_0, L_0^X) \xrightarrow{\pi} C^0(Y_0, \mathbf{W}(\mathscr{F}_0)) \xrightarrow{\partial} C^1(Y_0, \mathbf{W}(\mathscr{F}_0)).$$

的像. 而 π 就是映射

$$\Gamma\big(S_0, \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\big) \longrightarrow \Gamma(S_0, \mathscr{F}_0).$$

由于 S_0 仿射, π 为满射, 这就证明了所述断言.

推论 4.33. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 和 X 如 4.21 所述, 并设 Y 是 X 的可对角化子群. 假设 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模, 且 S_0 仿射.* [129] *X 中那些由 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面与 Y 共轭的子群所成的集合, 与下列集合同构:*

$$E = \Gamma\left(S_0, \frac{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)}{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}} \otimes_{\Gamma(S_0, \mathscr{O}_{S_0})} \Gamma(S_0, \mathscr{J})\right),$$

[127]编者注: 已将 $\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)$ 更正为 $\omega^1_{Y_0/S_0}$.
[128]编者注: 下文对原文作了扩充.
[129]编者注: 此处增添了关于 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 的假设, 并将“S 仿射”的假设替换为“S_0 仿射”.

也就是与 $L_0^X(Y_0)/H^0(Y_0, L_0^X)$ 同构. [130]

事实上, 由 I, 4.7.3 (参见 2.13), 写成

$$\mathrm{Lie}(X_0/S_0) = \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)} \oplus \mathscr{R}.$$

由于 Y_0 交换,

$$\mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \subset \mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)},$$

因而

$$\mathscr{F}_0 = \left(\frac{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}}{\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)}\right) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J} \ \oplus \ \mathscr{R} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J},$$

$$\mathscr{F}_0^{\mathrm{ad}(Y_0)} = \left(\frac{\mathrm{Lie}(X_0/S_0)^{\mathrm{ad}(Y_0)}}{\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)}\right) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}.$$

因此, 由 4.32, 有 $E \simeq \Gamma(S_0, \mathscr{R} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J})$. 回到 $\mathscr{R}$ 的定义即完成证明.

推论 4.34. *设 $S, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 和 X 如 4.21 所述, 并设 Y 是 X 的可对角化子群. 假设 $\omega^1_{Y_0/S_0}$ 为有限局部自由模, 且 S_0 仿射.* [131] *若 $x \in X(S)$ 诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面并正规化 Y, 则它中心化 Y.*

比较前一推论与 2.14, 立即得到这一结论. 事实上, 4.33 表明, $C^0(Y_0, L_0^X)$ 中整体保持 Y 的元素正是 $H^0(Y_0, L_0^X)$ 的元素; 而 2.14 表明, 这些元素恰好是平凡地作用于典范浸入 $Y \longrightarrow X$ 的元素.

4.35. — 回到 4.21 的一般情形, 并假设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑. 由 4.25(ii), 此时有 Y_0-$\mathscr{O}_{S_0}$-模正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}(Y_0/S_0) \longrightarrow \mathrm{Lie}(X_0/S_0) \longrightarrow \mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0} \longrightarrow 0, \tag{*}$$

且其中各模均为有限局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模.

另一方面, 由 SGA 1, II, 4.10, X 中每个提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦的子概形 Y, 都在 S 上平滑.[132] 再设 S_0 和 $Y_{\mathscr{J}}$ 仿射. 由于 $\mathbf{n}^\vee_{Y_0/X_0}$ 为局部自由 $\mathscr{O}_{S_0}$-模, 序列 $(*)$ 先在 $\mathscr{O}_{S_0}$ 上与 $\mathscr{J}$ 作张量积, 再拉回到 Y_0^n 后仍保持正合. 由于各 Y_0^n 均仿射, 这给出一个交换群复形的正合序列

$$0 \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^Y) \longrightarrow C^*(Y_0, L_0^X) \xrightarrow{d^*} C^*(Y_0, N_0) \longrightarrow 0,$$

特别地, 得到一个各行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^1(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^1} & C^1(Y_0, N_0) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \downarrow{\scriptstyle \partial} & & \\
0 & \longrightarrow & C^2(Y_0, L_{0Y}) & \longrightarrow & C^2(Y_0, L_{0X}) & \xrightarrow{d^2} & C^2(Y_0, N_0) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

现设 Y 和 Y' 是 X 中两个提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦, 因而平滑的子群. 由于 $Y_{\mathscr{J}}$ 仿射, 0.15 表明, Y 和 Y' 作为提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 的概形同构; 也就是说, 存在一个 S-概形同构

$$f : Y \xrightarrow{\sim} Y'$$

在 $Y_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射. 一方面, 由 1.2.4, f 定义了一个元素 $a \in C^1(Y_0, L_0^X)$, 使得对每个 $y \in Y(S')$, $S' \to S$, 有

$$f(y) = a(y_0)y$$

[130]编者注: 下文为增补内容; 参见 4.34.
[131]编者注: 参见编者注 129.
[132]编者注: 下文及 命题 4.35.1 为增补内容; 原文中已隐含这些内容. 参见 4.38(5).

且由 4.27(i), 有

$$d^1(a) = d(Y, Y').$$

此外, 由于 Y 和 Y' 是 X 的子群, 最后这个元素属于 $Z^1(Y_0, N_0)$ (参见 4.21). 因此 ∂a 是 $Z^2(Y_0, L_0^Y)$ 的元素, 其在 $H^2(Y_0, L_0^Y)$ 中的像 $\overline{\partial a}$ 仅依赖于类 $\overline{d(Y,Y')} \in H^1(Y_0, N_0)$. 这正是连接映射

$$\partial^1 : H^1(Y_0, N_0) \longrightarrow H^2(Y_0, L_0^Y),$$

的定义, 因而

$$\partial^1\big(\overline{d(Y,Y')}\big) = \overline{\partial a}.$$

另一方面, 通过 f 转移 Y' 的群结构, 以 Y_1 表示所得的群, 所以其底概形为 Y. 其群律 μ_1 对每个 $S' \to S$ 和 $x, y \in Y(S')$ 由下式定义:

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}\big(f(x)f(y)\big).$$

由 3.5.1, Y_1 定义了一个余循环

$$\delta(Y, Y_1) \in Z^2\big(Y_0, \mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big)$$

使得对每个 $S' \to S$ 及 $x, y \in Y(S')$,

$$\delta(Y, Y_1)(x_0, y_0)xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}\big(f(x)f(y)\big).$$

置 $b = \delta(Y, Y_1)$. 对每个 $S' \to S$ 和 $x, y \in Y(S')$, 有 $(b(x_0, y_0)xy)_0 = x_0y_0$. 因而, 一方面, $f(b(x_0, y_0)xy)$ 等于

$$a(x_0y_0)b(x_0, y_0)xy,$$

另一方面又等于

$$f(x)f(y) = a(x_0)x\,a(y_0)y = a(x_0)\,\mathrm{Ad}(x_0)\big(a(y_0)\big)xy.$$

比较这两个表达式可知, $b(x_0, y_0)$ 等于

$$\begin{aligned} &a(x_0y_0)^{-1}a(x_0)\,\mathrm{Ad}(x_0)\big(a(y_0)\big) \\ &\quad = \mathrm{Ad}(x_0)\big(a(y_0)\big) - a(x_0y_0) + a(x_0) = (\partial a)(x_0, y_0). \end{aligned}$$

因此 $\delta(Y, Y_1) = \partial a$, 从而我们证明了:

命题 4.35.1.[132] *在 4.21 的假设下, 再设 S_0 仿射, 且 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑并仿射. 设 Y, Y' 是 X 的两个子群, 它们提升 $Y_{\mathscr{J}}$ 且在 S 上平坦 (因而平滑). 设 $f : Y \xrightarrow{\sim} Y'$ 是在 $Y_{\mathscr{J}}$ 上诱导恒等映射的 S-概形同构, 并以 Y_1 表示通过 f 转移 Y' 的群结构而得到的群. 则*

$$\partial^1\big(\overline{d(Y,Y')}\big) = \overline{\delta(Y, Y_1)}.$$

命题 4.36. *在 4.21 的假设下, 再设 $Y_{\mathscr{J}}$ 在 $S_{\mathscr{J}}$ 上平滑, 且 S_0 仿射. X 中在 S 上平坦 (或平滑) 且约化为 $Y_{\mathscr{J}}$ 的子 S-群 Y 所成的集合, 模去 X 在 S 上诱导 $X_{\mathscr{J}}$ 的单位截面的截面所给的共轭作用后, 或者为空, 或者是下述群下的一个主齐性集:*

$$H^1\Big(Y_0, \big[\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\,\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)\big] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}\Big).$$

只需验证推论 4.29 适用, 即

$$d^0 : \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\omega^1_{X_0/S_0}, \mathscr{J}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{J})$$

为满射. 这由 4.25(ii) 的序列 (+) 分裂这一事实得到, 因为 S_0 仿射. [133]

最后陈述一个由 4.21 和 4.36 共同得到的推论. 事实上, 此后我们仅以这一形式使用本节的一般结果. [134]

推论 4.37. *设 S 是概形, S_0 是由幂零理想 $\mathscr{I}$ 定义的闭子概形. 设 X 是在 S 上平滑的 S-群, Y_0 是 X_0 的一个子 S_0-群, 且在 S_0 上平坦.*

(i) *若 S_0 仿射, Y_0 在 S_0 上平滑, 且对每个 $n \geq 0$ 均有*

$$H^1\Big(Y_0, [\mathrm{Lie}(X_0/S_0)/\mathrm{Lie}(Y_0/S_0)] \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0$$

则 X 中任意两个在 S 上平坦 (或平滑) 且约化为 Y_0 的子 S-群, 都由 X 在 S 上的一个诱导 X_0 的单位截面的截面共轭.

(ii) *若 Y_0 仿射且为有限呈示, 并且*[135]

$$H^2\Big(Y_0, \mathbf{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}\Big) = 0$$

对每个 $n \geq 0$ 均成立, 则存在 X 的一个子 S-群, 它在 S 上平坦且约化为 Y_0.

4.38. 还需联系本篇所作的三个构造. 为避免无关紧要的复杂情况, 我们取以下情形: S_0 是域 k 的谱, S 是对偶数环 $D(k)$ 的谱, G 是在 S 上平滑的 S-群, K 是一个在 S 上平滑且仿射的子 S-群. [136]

置

$$\mathfrak{g}_0 = \mathrm{Lie}\, G_0 = \Gamma(S_0, \mathrm{Lie}\, G_0) = \mathrm{Lie}(G_0/S_0)(S_0), \qquad \mathfrak{k}_0 = \mathrm{Lie}\, K_0.$$

有 k-向量空间正合序列 [137]

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k}_0 \xrightarrow{i} \mathfrak{g}_0 \xrightarrow{d} \mathbf{n}^{\vee}_{K_0/G_0} \longrightarrow 0,$$

它诱导出上同调正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) &\xrightarrow{i^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^0} H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) \\ &\xrightarrow{\partial^0} H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) \xrightarrow{i^1} H^1(K_0, \mathfrak{g}_0) \xrightarrow{d^1} H^1(K_0, \mathbf{n}^{\vee}_{K_0/G_0}) \xrightarrow{\partial^1} H^2(K_0, \mathfrak{k}_0). \end{aligned}$$

这些群都有几何意义.

a) 由 II, 5.2.3, $H^0(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\, \underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$. [138]

b) $H^0(K_0, \mathfrak{g}_0) = \mathrm{Lie}\, \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$ [138] (同上).

c) $H^0(K_0, \mathfrak{g}_0/\mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\, \underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0$[138] (同上).

---

[133]编者注: 这也由 4.32 的证明得到.

[134]编者注: 例如, 第 IX 篇用 4.37 证明陈述 3.2 bis 与 3.6 bis.

[135]编者注: 根据注 4.22, 我们将 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathbf{n}_{Y_0/X_0}, \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2})$ 替换为 $\mathbf{n}^{\vee}_{Y_0/X_0} \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{I}^{n+1}/\mathscr{I}^{n+2}$.

[136]编者注: 下文对原文作了少量修改. 特别地, 将 X 换成 G, 将 Y 换成 K, 并将它们的 Lie 代数分别记为 $\mathfrak{g}_0$ 和 $\mathfrak{k}_0$. 还将原文使用的缩写 $H^i(\cdot)$ 明确写为 $H^i(K_0, \cdot)$.

[137]编者注: 配备 K_0 的伴随作用.

[138]编者注: 由于中心化子的形成以及正规化子的形成都与基变换可交换 (参见 I, 2.3.3.1), 这里用 $\underline{\mathrm{Centr}}(K_0)$ 替换了原文中的 $\underline{\mathrm{Centr}}(K)_0$, 同样也用 $\underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0)$ 和 $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)$ 替换了 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(K)_0$ 和 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(K)_0$.

d)

$$H^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\Big(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)\Big) \,/\, \mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0),$$

其中 $\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0)$ 表示 $\mathfrak{k}_0$ 在由

$$\mathrm{Int}_0 : K_0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0).$$

导出的态射 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Int}_0)$ 下的像. 事实上, 将 2.1(ii) 用于 $Y = X = K$ 及 $f_0 = \mathrm{id}_{K_0}$, 可知 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是 S_0-群 K_0 的无穷小自同构组成的群, 而 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 由此群对内无穷小自同构取商得到, 即对 $\mathfrak{k}_0$ 的像取商得到. 此外, 由 II, 4.2.2, 还有

$$Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0) = \mathrm{Lie}\Big(\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)\Big).$$

139

e) 由 2.1(ii), $H^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 是延拓典范浸入 $i_0 : K_0 \to G_0$ 的同态 $K \to G$ 之间的偏差组成的群, 模去由 G 的内自同构作用所得的偏差; 这里的内自同构由 $G(S)$ 中在 $G(S_0)$ 中给出单位元的元素定义 (也就是由 $\mathfrak{g}_0$ 的元素定义).

f) 由 4.36, $H^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$ 是 G 中延拓 K_0 且在 S 上平坦 (因而在 S 上平滑, 参见 SGA 1, II, 4.10) 的子群 K' 之间的偏差组成的群, 模去由上述构造的 G 的内自同构作用所得的偏差.

g) 由 3.5(ii), $H^2(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是定义在 K 上、延拓 K_0 上群结构的各种群结构之间的偏差组成的群, 模去 K 上在 K_0 上诱导恒等映射的 S-自同构.

现在我们要借助刚才给出的几何解释, 明确描述前面正合序列中的六个态射.

1) 态射 i^0 与 d^0 就是对典范单态射

$$\underline{\mathrm{Centr}}(K_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}_{G_0}(K_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0).$$

取 Lie 代数 (对于 d^0, 随后还要取商) 而得到的态射. 这直接由 **a)**, **b)** 与 **c)** 中所作等同的定义得到.

2) 态射 ∂^0 按如下方式构造. 设

$$\bar{x} \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0)/\mathfrak{k}_0.$$

将它提升为元素

$$x \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0) \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(K)(S).$$

则 $\mathrm{Int}(x)$ 定义 K 的一个在 K_0 上诱导恒等映射的自同构, 因而定义 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 的一个元素. 以 $\overline{\mathrm{Int}(x)}$ 表示该元素在

$$\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)/\,\mathrm{Im}(\mathfrak{k}_0).$$

中的像. 则

$$\partial^0(\bar{x}) = -\overline{\mathrm{Int}(x)} = \overline{\mathrm{Int}(x^{-1})}. \qquad (*)$$

事实上, 来计算由 $\mathrm{Int}(x)$ 定义的 $\mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0)$ 的元素. 由定义, 它对应于一个元素 $a \in Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$, 使得

$$xyx^{-1} = a(y_0)y, \qquad y \in K(S'), \quad S' \longrightarrow S.$$

[139]编者注: 这是 $\mathfrak{k}_0$ 的导子组成的 Lie 代数 $\mathrm{Der}_k(\mathfrak{k}_0)$; 因此 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是 $\mathrm{Der}_k(\mathfrak{k}_0)$ 对内导子取商所得的商, 也就是对 $\mathrm{ad} : \mathfrak{k}_0 \to \mathrm{Der}_k(\mathfrak{k}_0)$ 的像取商.

但这也可写成

$$a(y_0) = xyx^{-1}y^{-1} = x - \mathrm{Ad}(y)x = -\partial(x)(y_0),$$

因而 $a = -\partial(x)$.

另一方面,[140] 元素

$$x \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Norm}}_{G_0}(K_0) \subset \mathfrak{g}_0$$

在 ∂ 下的像是 $Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 的一个元素, 其在 $H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 中的像 $\overline{\partial(x)}$ 只依赖于 $\bar{x}$. 根据连接映射 ∂^0 的定义,

$$\partial^0(\bar{x}) = \overline{\partial(x)}.$$

结合 $a = -\partial(x)$, 便证明了 $(*)$.

3) [141] 以 $i : K \to G$ 表示典范浸入. 设 $\bar{u} \in H^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 是元素

$$u \in \mathrm{Lie}\,\underline{\mathrm{Aut}}_{S_0\text{-gr.}}(K_0) \subset \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(K).$$

的像. 则

$$i^1(\bar{u}) = \bar{d}(i, i \circ u), \tag{$**$}$$

其中 $\bar{d}(i, i \circ u)$ 是 2.1.1 中定义的类.

事实上, $\bar{u}$ 是一个元素 $v \in Z^1(K_0, \mathfrak{k}_0)$ 的像, 该元素满足 $u(y) = v(y_0)y$, 而 $i^1(\bar{u})$ 是余循环 $i \circ v \in Z^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 在 $H^1(K_0, \mathfrak{g}_0)$ 中的像. 由于 i 为群态射, 等式 $u(y) = v(y_0)y$ 蕴含

$$i(u(y)) = i(v(y_0))i(y).$$

因此 $i \circ v = d(i, i \circ u)$, 这就证明了 $(**)$.

4) 设 $i' : K \to G$ 是提升 i_0 的群态射, $\bar{d}(i, i')$ 为 2.1.1 中定义的类, 并设

$$d(K, i'(K)) \in C^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$$

为 4.5.1 中定义的偏差. 由 4.21, $d(K, i'(K))$ 属于 $Z^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$. 以 $\bar{d}(K, i'(K))$ 表示它在 $H^1(K_0, \mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0})$ 中的像. 则由 4.27(i), 有

$$d^1(\bar{d}(i, i')) = \bar{d}(K, i'(K)). \tag{$\dagger$}$$

底本说明. 在这三个相邻的出现位置, 法文重版本均印为 $\mathbf{n}_{K_0/X_0}$, 未取对偶. 英文版采用 $\mathbf{n}^\vee_{K_0/G_0}$, 这是 4.38 开头建立的正合序列及上同调序列所要求的.

5) 最后, 设 K' 是 G 中提升 K_0 且在 S 上平坦, 因而平滑的子群. 我们已经假设 K_0 仿射. 因此知道 K 与 K' 作为延拓 K_0 的概形同构 (参见 0.15), 所以存在 S-概形同构

$$f : K \xrightarrow{\sim} K'$$

在 K_0 上诱导恒等映射. 通过 f 转移 K' 的群结构, 以 K_1 表示所得的群 (其底概形因而为 K); 也就是说, K_1 的群律 μ_1 对每个 $S' \to S$ 和每个 $x, y \in K(S')$ 由下式定义:

$$\mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

由 3.5.1, [142] K_1 定义了一个余循环 $\delta(K, K_1) \in Z^2(K_0, \mathfrak{k}_0)$, 使得对每个 $S' \to S$ 和每个 $x, y \in K(S')$, 有

$$\delta(K, K_1)(x_0, y_0)xy = \mu_1(x, y) = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

则由 4.35.1, 有

$$\partial^1 \bar{d}(K, K') = \bar{\delta}(K, K_1). \tag{$\ddagger$}$$

[140]编者注: 以下这句话为增补内容.
[141]编者注: 下文对原文作了扩充, 并在 $(**)$ 中将 $u \circ i$ 更正为 $i \circ u$.
[142]编者注: 下文对原文作了修改, 以计入 3.5.1 与 4.35.1 中增补的内容.

参考文献

143

[**BAlg**] N. Bourbaki, *Algèbre*, 第 I–III 章, Hermann, 1970.

[**BAC**] N. Bourbaki, *Algèbre commutative*, 第 I–IV 章, Masson, 1985.

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Fr64**] P. Freyd, *Abelian categories*, Harper and Row, 1964.

[143]编者注: 本篇引用的补充参考文献.

第 IV 篇
拓扑与层

M. Demazure 著[*]

本篇旨在使读者熟悉拓扑与层的语言的基本内容 (不涉及上同调). 这种语言对于构造商等问题尤其方便. [0]

前三节建立构造商所需的语言. 第四节是本篇的核心, 介绍层论, 主要着眼于它在商的问题中的应用; 第五节将这一理论应用于群中的商的构造以及主齐性丛. 最后一节更具体地研究概形范畴, 定义其上的若干有用拓扑.

读者可以参阅 [AS], [MA], [D] 和 SGA 4; 特别地, 关于拓扑在下降理论中的应用, 可参阅 [D]; 关于宇宙的问题, 可参阅 SGA 4 (本篇对这方面的处理尤其欠妥).

1. 普遍有效满态射

在本篇余下部分中, 固定一个范畴 $\mathscr{C}$.

定义 1.1. *若对每个对象 X, 相应的映射*

$$X(S) = \mathrm{Hom}(S, X) \longrightarrow X(T) = \mathrm{Hom}(T, X)$$

*都是单射, 则称态射 $u : T \to S$ 为*满态射 (epimorphism). [1] *若对每个态射 $S' \to S$, 纤维积 $T' = T \times_S S'$ 存在, 且 $u' : T' \to S'$ 为满态射, 则称它为* 普遍满态射 (universal epimorphism).

定义 1.2. *集合映射构成的图*

$$A \overset{u}{\to} B \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} C$$

*称为*正合的, *是指 u 为单射, 且其像恰由满足 $v_1(b) = v_2(b)$ 的元素 $b \in B$ 组成. $\mathscr{C}$ 中同样形式的图称为*正合的, *是指对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 X, 相应的集合图*

$$A(X) \longrightarrow B(X) \rightrightarrows C(X)$$

都是正合的; 此时也称 u 使 A 成为箭头对 (v_1, v_2) 的一个核. 对偶地, $\mathscr{C}$ 中的图

$$C \underset{v_2}{\overset{v_1}{\rightrightarrows}} B \overset{u}{\to} A$$

称为正合的, 是指它在反范畴 $\mathscr{C}^\circ$ 中作为图是正合的; 即对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 X, 相应的集合图

$$X(A) \longrightarrow X(B) \rightrightarrows X(C)$$

[*]本文展开了 A. Grothendieck 两次讲课的实质内容, 并在若干原先略而未论或仅简略提及的重要之处作了补充.

[0]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.

[1]编者注: 即 u 可右消去.

都是正合的.[2] *此时也称 u 使 A 成为箭头对 (v_1, v_2) 的一个余核.*

定义 1.3. *若纤维平方 $T \times_S T$ 存在, 且图*

$$T \times_S T \overset{\mathrm{pr}_1}{\underset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} T \xrightarrow{u} S$$

*正合, 则称态射 $u : T \to S$ 为*有效满态射 (effective epimorphism)*; 即 u 使 S 成为 $(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2)$ 的余核. 若对每个态射 $S' \to S$, 纤维积 $T' = T \times_S S'$ 都存在, 且态射 $u' : T' \to S'$ 为有效满态射, 则称它为* 普遍有效满态射 (universal effective epimorphism)*.*

显然有以下蕴含关系

$$\begin{array}{ccc} \text{普遍有效满态射} & \Longrightarrow & \text{有效满态射} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{普遍满态射} & \Longrightarrow & \text{满态射,} \end{array}$$

但一般没有其他蕴含关系成立. [3]

定义 1.4.0. [4] 我们 "回顾": 态射 $u : T \to S$ 称为*可平方的 (squarable)*, 是指对每个态射 $S' \to S$, 纤维积 $T \times_S S'$ 都存在.

引理 1.4. *考虑态射 $U \xrightarrow{v} T \xrightarrow{u} S$. 则:*

(a) *若 u 和 v 是满态射, 则 uv 是满态射; 若 uv 是满态射, 则 u 是满态射;*

(b) *若 u 和 v 是普遍满态射, 则 uv 是普遍满态射; 若 uv 是普遍满态射且 u 可平方, 则 u 是普遍满态射.*

引理 1.4 由定义立即可得. 由此推出:

推论 1.5. *设 $u : X \to Y$ 和 $u' : X' \to Y'$ 是普遍满态射, 并假设 $Y \times Y'$ 存在. 则 $X \times X'$ 存在, 且*

$$u \times u' : X \times X' \longrightarrow Y \times Y'$$

是普遍满态射.

还要记下以下定义和引理.

定义 1.6.0. [5] $\mathscr{C}$ 的对象 S 称为*可平方的*, 是指它与 $\mathscr{C}$ 的每个对象的乘积都存在. (若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 这就等价于态射 $S \to e$ 可平方; 参见 1.4.0.)

引理 1.6. *设 $u : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的态射. 它为满态射 (分别地, 普遍满态射、有效满态射或普遍有效满态射) 的充分条件是 $\mathscr{C}$ 中的相应态射具有同一性质; 若假设 S 是 $\mathscr{C}$ 的可平方对象, 则这也是必要条件.*

证明是直接的, 留给读者. S 可平方的假设用来将从 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 Y 到 $\mathscr{C}$ 的对象 Z 的 $\mathscr{C}$-态射, 解释为从 Y 到 $Z \times S$ 的 $\mathscr{C}_{/S}$-态射.

引理 1.7. *沿用 1.4 的记号, 若 u 和 v 是有效满态射, 且 v 是普遍满态射, 则 uv 是有效满态射.*

---

[2] 编者注: 特别地, 这蕴含 u 为满态射.

[3] 编者注: 例如, 若 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 为概形范畴, 容易看出每个普遍满态射都是满射. 令

$$T = \coprod_{p \text{ 素数}} \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p), \qquad S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}).$$

则态射 $u : T \to S$ 是满态射, 却不是普遍满态射. 另一方面, $T \times_S T$ 可等同于 T, 因此两个投影 $T \times_S T \to T$ 相同. 由于 id_T 不能下降为态射 $S \to T$, 可知 u 不是有效满态射.

[4] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 1.4.0.

[5] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 1.6.0.

为此, 考虑下图

$$\begin{array}{ccccc} S & \xleftarrow{u} & T & \leftleftarrows & T\times_S T \\ & & {\scriptstyle v}\uparrow & & {\scriptstyle v\times_S v}\uparrow \\ & & U & \leftleftarrows & U\times_S U \\ & & \uparrow\uparrow & \nearrow & \\ & & U\times_T U & & \end{array} \tag{1.7.1}$$

由假设, 第一行与第一列正合; 此外, 根据 1.5 和 1.6, 由于 v 是普遍满态射, $v\times_S v$ 是满态射. 由显然的图追踪即得结论. 事实上, 若 $X(U)$ 的一个元素在 $X(U\times_S U)$ 中的两个像相同, 则它在 $X(U\times_T U)$ 中的两个像*更*是相同, 从而由第一列的正合性, 它来自 $X(T)$ 的一个元素.

由于第一行正合, 只须验证上述元素在 $X(T\times_S T)$ 中的两个像相同. 由于 $v\times_S v$ 是满态射, 只须验证这两个像在 $X(U\times_S U)$ 中的像相同, 而这确实成立.

命题 1.8. *考虑态射 $U\xrightarrow{v}T\xrightarrow{u}S$. 若 u 和 v 是普遍有效满态射, 则 uv 是普遍有效满态射. 若 uv 是普遍有效满态射且 u 可平方, 则 u 是普遍有效满态射.*

第一个蕴含立即由 1.7 得到. 对于第二个蕴含, 考虑 下图 (具有 "双单纯" 的形式):

$$\begin{array}{ccccccc} S & \xleftarrow{u} & T & \leftleftarrows & T\times_S T \\ {\scriptstyle uv}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ U & \longleftarrow & U\times_S T & \leftleftarrows & U\times_S T\times_S T \\ \uparrow\uparrow & & \uparrow\uparrow & & \uparrow\uparrow \\ U\times_S U & \longleftarrow & U\times_S U\times_S T & \leftleftarrows & U\times_S U\times_S T\times_S T. \end{array} \tag{1.8.1}$$

由 uv 为普遍有效满态射的假设, 第一、第二和第三列正合. 第二行正合, 因为 $U\times_S T\to U$ 是有效满态射 (它在 U 上有截面); 同理, 第三行也正合. 由显然的图追踪可知第一行正合, 即 u 是有效满态射. 由于这些假设在任意基变换 $S'\to S$ 下不变, 可知 u 实际上是普遍有效满态射.

推论 1.9. *设 $u:X\to Y$ 和 $u':X'\to Y'$ 是普遍有效满态射, 并假设 $Y\times Y'$ 存在. 则 $X\times X'$ 存在, 且*

$$u\times u': X\times X'\longrightarrow Y\times Y'$$

是普遍有效满态射.

证明与 1.5 相同, 使用下图

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & \xleftarrow{u'} & X' \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & X\times Y' & \longleftarrow & X\times X' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow & \swarrow_{u\times u'} & \\ Y & \longleftarrow & Y\times Y' & & . \end{array} \tag{1.9.1}$$

推论 1.10. *设 $u:T\to S$ 是可平方态射, $S'\to S$ 是一个为普遍有效满态射的基变换态射. 则 u 为普遍有效满态射当且仅当*

$$u': T'=T\times_S S'\longrightarrow S'$$

为普遍有效满态射:

$$\begin{array}{ccc} T & \xleftarrow{v'} & T' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ S & \xleftarrow{v} & S'. \end{array} \tag{1.10.1}$$

只须证明充分性. 若 u' 是普遍有效满态射, 则由 1.8, vu' 也是普遍有效满态射. 由于 $vu'=uv'$, 再次应用 1.8, 可知 u 是普遍有效满态射.

注 1.11. *同样的推理表明, 在 1.10 中, 可将 "普遍有效满态射" 替换为 "普遍满态射"、"既普遍又有效的满态射", 或者仅仅替换为 "满态射" (在最后一种情形中, u 可平方的假设显然不必要).*

在 1.8 的证明中, 我们使用了值得明确陈述的 下述结果.

命题 1.12. *设 $u : T \to S$ 是有截面的态射. 则 u 是满态射; 若 $T \times_S T$ 存在, 则它是有效满态射; 若此外 u 可平方, 则它是普遍有效满态射.*

第一个断言包含于 1.4(a), 第三个断言立即由第二个得到, 因此只须证明第二个. 实际上, 还有更强的结论: 对每个不一定可表的函子 $F : \mathscr{C}^\circ \to \mathbf{Set}$, 集合图

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

都是正合的. 这可视为 Čech 上同调形式体系的一个特例 (在维数 0!), 这里只作回顾. 仅假设 $T \times_S T$ 存在, 并令

$$\check{H}^0(T/S, F) = \mathrm{Ker}\big(F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)\big).$$

显然可将 $\check{H}^0(T/S, F)$ 视为 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的变动对象 T 的反变函子: 每个 S-态射 $T' \to T$ 都定义一个映射

$$\check{H}^0(T/S, F) \longrightarrow \check{H}^0(T'/S, F). \tag{+}$$

固定 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的 T, T'. 一个熟知的计算表明, 若存在 S-态射 $T' \to T$, 则相应的映射 (+) 与该态射的选择无关. [6]

因此, $\check{H}^0(T/S, F)$ 可视为与集合 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$ 关联的范畴上的函子, 其中以支配关系赋予该集合预序: 若存在 S-态射 $T' \to T$, 则称 T' 支配 T. 特别地, 若 T 和 T' 在后一个范畴中同构, 即两者互相支配, 则 (+) 是集合的同构. 特别地, 这适用于 T' 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的终对象的情形, 其实质上就是 S 自身. 对象 T 总是支配 $T' = S$, 反之成立恰好当 T/S 有截面. 这就证明了 1.12 所宣称的较强形式.

注 1.13. *对于各种应用, 本篇引入的概念和陈述的结果需要进一步推广到有相同目标的态射族 $u_i : T_i \to S$, 而不限于单个态射 $u : T \to S$. 若对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 X, 相应的映射*

$$X(S) \longrightarrow \prod_i X(T_i)$$

都是单射, 则称这样的态射族为满的 (epimorphic)*. 类似地可引入有效满态射族的概念, 以及这些概念的普遍形式. 在下文需要时, 将不再说明地使用本篇结果在这一更一般情形下的推广.*

注 1.14. *既是单态射又是有效满态射的每个态射都是同构.*

事实上, 沿用 1.3 的记号, $T \to S$ 是单态射意味着两个态射

$$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : T \times_S T \rightrightarrows T$$

相等 (并且都是同构). 而图

$$C \overset{v}{\underset{v}{\rightrightarrows}} B \xrightarrow{u} A$$

正合仅当 u 为同构, 这立即由 定义 得到. [7]

---

[6]编者注: 下面是 M. Demazure 告知我们的论证. 设 $f, g : T' \to T$, $\phi : T' \to T \times_S T$ 为分量是 f 和 g 的态射, 从而 $p_1 \circ \phi = f$ 及 $p_2 \circ \phi = g$. 于是 $F(\phi) : F(T \times_S T) \to F(T')$ 满足 $F(\phi) \circ F(p_1) = F(f)$ 及 $F(\phi) \circ F(p_2) = F(g)$. 然而, 对每个 $x \in \check{H}^0(T/S, F)$, 有 $F(p_1)(x) = F(p_2)(x)$. 对等式两边应用 $F(\phi)$, 得到 $F(f)(x) = F(g)(x)$, 这说明 f 和 g 诱导相同的映射.

[7]编者注: 既是单态射又是满态射的态射未必是同构. 例如, 在 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 中, 态射

$$\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p) \amalg \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/p]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$$

是单态射, 也是满射的满态射, 却不是同构.

2. 下降态射

回顾以下定义.

定义 2.1. *设 $f : S' \to S$ 是使 $S'' = S' \times_S S'$ 存在的态射, $u' : X' \to S'$ 是 S' 上的一个对象. X'/S' 上相对于 f 的一个*粘合数据 (gluing datum)*, 是指一个 S''-同构*

$$c : X''_1 \xrightarrow{\sim} X''_2,$$

其中, 对 $i = 1, 2$, 用 X''_i 表示 X'/S' 在投影 $\mathrm{pr}_i : S'' \to S'$ 下的逆像, 并假设该逆像存在. 若粘合数据 c 满足 "余循环条件"

$$\mathrm{pr}^*_{3,1}(c) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(c)\ \mathrm{pr}^*_{2,1}(c),$$

*则称之为一个*下降数据 (descent datum)*. 其中, 对 $1 \leq j < i \leq 3$, $\mathrm{pr}_{i,j}$ 是从*

$$S''' = S' \times_S S' \times_S S'$$

到 S'' 的典范投影 (此时也假设 S''' 存在); $\mathrm{pr}^*_{i,j}(c)$ 是 c 的逆像, 视为从 X'''_j 到 X'''_i 的 S'''-态射; 对从 1 到 3 的每个整数 k, 用 X'''_k 表示 X'/S' 在第 k 个投影 $q_k : S''' \to S'$ 下的逆像, 并假设该逆像存在.

在 定义 的第二部分中, 我们因而使用了通常的等同和记号滥用, [8] 经验表明这些做法没有问题, 但在严格阐述下降理论时显然必须避免; 下降理论本身在某种程度上也必须为这些习惯性的术语滥用提供依据. Giraud 已写出这样的形式化阐述 ([D]), 目的是为 SGA 1 中从未写成的第 VII 篇提供依据并使之精确. 关于本讨论班反复使用的忠实平坦下降结果的详细说明, 可参阅 SGA 1 第 VIII 篇.

仍设 $f : S' \to S$ 为使 $S'' = S' \times_S S'$ 存在的态射, X 为 S 上的对象, 满足 $X' = X \times_S S'$ 和 $X'' = X \times_S S''$ 存在. 于是 X' 在 pr_i, $i = 1, 2$, 下的逆像存在且典范同构; 因此, X'/S' 带有相对于 f 的典范粘合数据. 当 S''' 和 $X''' = X \times_S S'''$ 存在时, 这实际上是一个下降数据. 若 Y 是 S 上另一个满足与 X/S 相同条件的对象, 则对每个 S-态射 $X \to Y$, 相应的 S'-态射 $X' \to Y'$ 与 X' 和 Y' 上的典范粘合数据相容. 特别地, 若 $S' \to S$ 可平方, 则

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

是从 $\mathscr{C}_{/S}$ 到 "S' 上带有相对于 f 的下降数据的对象范畴" 的函子; 这个范畴的定义留给读者, 它是 "S' 上带有相对于 f 的粘合数据的对象范畴" 的全子范畴.

在此约定下, 给出 如下定义.

定义 2.2. *态射 $f : S' \to S$ 称为*下降态射 *(分别地, 有效下降态射), 是指 f 可平方 (即对每个 $X \to S$, $X \times_S S'$ 都存在), 且上述函子*

$$X \longmapsto X' = X \times_S S'$$

从 S 上的对象范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 到 S' 上带有相对于 f 的下降数据的对象范畴, 是全忠实的 (分别地, 是范畴等价).

第一个概念仅用粘合数据即可表述, 因而无须使用三重纤维积 S''': f 是下降态射恰好当它可平方, 且 $X \mapsto X'$ 是从 $\mathscr{C}_{/S}$ 到 S' 上带有相对于 f 的粘合数据的对象范畴的全忠实函子. 展开来说, 这意味着对 S 上的任意两个对象 X, Y, 下面的集合 图 正合:

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(X', Y') \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{S''}(X'', Y''). \tag{x}$$

[8] 编者注: 例如, 我们一方面作了等同 $\mathrm{pr}^*_{2,1}(X''_1) = \mathrm{pr}^*_{3,1}(X''_1)$, 另一方面作了等同 $\mathrm{pr}^*_{2,1}(X''_2) = \mathrm{pr}^*_{3,2}(X''_2)$.

这里, 对 $i=1,2$, $p_i(u')$ 表示 $u'\in \mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')$ 在投影 $\mathrm{pr}_i : S''\to S'$ 下的逆像. 事实上, 按照定义, 箭头对 (p_1,p_2) 的核恰好是与典范粘合数据相容的 S'-态射 $X'\to Y'$ 组成的集合.

由逆像 Y' 和 Y'' 的定义, 有以下典范双射

$$\mathrm{Hom}_{S'}(X',Y')\simeq \mathrm{Hom}_S(X',Y),\qquad \mathrm{Hom}_{S''}(X'',Y'')\simeq \mathrm{Hom}_S(X'',Y).$$

因此 (x) 正合等价于

$$\mathrm{Hom}_S(X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_S(X',Y)\rightrightarrows \mathrm{Hom}_S(X'',Y), \tag{xx}$$

正合; 后者是将 $\mathrm{Hom}_S(-,Y)$ 应用于 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的图

$$X''\rightrightarrows X'\longrightarrow X, \tag{xxx}$$

所得到的, 而这个图本身由

$$S''\rightrightarrows S'\longrightarrow S$$

经基变换 $X\to S$ 得到. 根据 1.6, 这证明了 下面命题 的第一部分.

命题 2.3. *设 $f : S'\to S$ 是态射. 若 f 是普遍有效满态射, 则它是下降态射. 反之, 若 S 是 $\mathscr{C}$ 的可平方对象, 即它与 $\mathscr{C}$ 的每个对象的乘积都存在, 则每个下降态射都是普遍有效满态射.*

只需证明逆命题. 若 f 是下降态射, 须证明它是普遍有效满态射: 对每个态射 $X\to S$, 图 (xxx) 必须正合, 或等价地, 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 Z, 它在 $\mathrm{Hom}(-,Z)$ 下的像必须是正合的集合图. 由假设, $Z\times S$ 存在. 设 Y 是它定义的 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象. 于是 (xxx) 在 $\mathrm{Hom}(-,Z)$ 下的像同构于其在 $\mathrm{Hom}_S(-,Y)$ 下的像, 而后者由关于 f 的假设正合.

因此, 关于下降态射的结果可以应用于普遍有效满态射. 例如:

命题 2.4. *设 $f : S'\to S$ 是下降态射 (例如普遍有效满态射). 则:*

(a) *对每个 S-态射 $u : X\to Y$, 态射 u 为同构 (分别地, 单态射) 当且仅当 $u' : X'\to Y'$ 为同构 (分别地, 单态射).*

(b) *设 X,Y 是 S 的两个子对象, X',Y' 是它们在 S' 中的逆像. 则 X 包含于 Y (分别地, 等于 Y) 当且仅当 X' 和 Y' 具有相同的关系.*

对于 (a), 由 定义 可知, 若 u' 在带粘合数据的对象范畴中是同构, 则 u 是同构. 而 S' 上与粘合数据相容的对象同构, 总是带粘合数据的对象的同构: 其逆也与粘合数据相容. 对于 (b), 只须证明: 若 X' 包含于 Y', 即存在 S'-态射 $X'\to Y'$, 则 S 上的 X,Y 也具有同样性质. 由于 $Y'\to S'$, 因而也包括 $Y''\to S''$, 是单态射, 态射 $X'\to Y'$ 自动与粘合数据相容, 从而来自一个 S-态射 $X\to Y$.

这个证明更一般地适用于 S 上的两个对象 X,Y, 其中 $Y\to S$ 是单态射, 而要判断 $X\to S$ 是否经过 Y 分解: 只须 $X'\to S'$ 经过 Y' 分解即可.

推论 2.5. *设 $f : S'\to S$ 是普遍有效满态射, $g : S\to T$ 是使 $S\times_T S$ 存在的态射. 假设 $S''=S'\times_S S'$ 也是 S' 在 T 上与自身的纤维积, 即典范态射*

$$S'\times_S S'\xrightarrow{\sim} S'\times_T S'$$

为同构. 则 $g : S\to T$ 是单态射 (反之当然也成立).

事实上, 考虑 Cartesian 图

$$\begin{array}{ccc} S'\times_S S' & \xrightarrow{\sim} & S'\times_T S' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S & \longrightarrow & S\times_T S, \end{array} \tag{2.5.1}$$

其中第二个水平箭头是对角态射. 由 1.9, 第二个竖直箭头 f 是普遍有效满态射; 由假设, 第一个水平箭头是同构. 由 2.4(a), 或者同样由 2.4(b), [9] 可知 $S \to S \times_T S$ 也是同构, 这正表示 $g : S \to T$ 是单态射.

注 2.6. *在 2.1 中用某些逆极限之间的态射引入的概念, 显然可用所考虑的对象 S, S', X' 定义的反变函子表述. 在 2.1 所考虑的纤维积存在的条件下, X'/S' 上相对于 $S' \to S$ 的粘合数据 (分别地, 下降数据), 与下列范畴中相应对象的粘合数据 (分别地, 下降数据) 一一对应:*

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set}).$$

因此, 如有需要, 可将这些概念推广到不对 $\mathscr{C}$ 中的纤维积施加存在性假设的情形.

注 2.7. *本节引入的概念可推广到态射族. 借助筛的概念 (4.1), 也可将它们表述得更内在. 关于这些问题, 请读者参阅 [D].*

3. 普遍有效等价关系

3.1. 等价关系: 定义

定义 3.1.1. *对象 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 中的一个 $\mathscr{C}$-等价关系, 是指函子 $X \times X$ 的一个可表子函子 R, 使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $R(S)$ 是 $X(S)$ 上某个等价关系的图像.*

这一定义特别适用于范畴 $\widehat{\mathscr{C}}$. 若将 X 视为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象, 则 X 中的一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系, 就是 $X \times X$ 的一个子函子 R, 满足对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, $R(S)$ 都是 $X(S)$ 上某个等价关系的图像. [10]

若 R 是 X 中的一个 $\mathscr{C}$-等价关系, 用 p_i 表示投影 $\mathrm{pr}_i : X \times X \to X$ 诱导的从 R 到 X 的态射. 于是有图

$$p_1, p_2 : R \rightrightarrows X.$$

定义 3.1.2. *若 $up_1 = up_2$, 则称态射 $u : X \to Z$ 与 R 相容. $\mathscr{C}$ 中作为箭头对 (p_1, p_2) 的余核的对象, 也称为 X 对 R 的商对象, 记为 X/R.*

因而有正合图

$$R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{p} X/R,$$

且 X/R 表示以下协变函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X/R, Z) = \{\text{从 } X \text{ 到 } Z \text{ 且与 } R \text{ 相容的态射}\}.$$

由于商对象在 $\mathscr{C}$ 中取, 商 X/R 只要存在就是唯一的.

这些定义立即推广到 X 中的 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系. 但应当注意, 将 $\mathscr{C}$ 的对象等同于其在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的像, 与商的构造并不交换: 在 $\mathscr{C}$ 中 X 对 R 的商 X/R, 并*不能预先认为是在* $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 X 对 R 的商. 因此, 在涉及取商的问题中, 必须避免不加分辨地将 $\mathscr{C}$ 等同于其在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的像. [11]

---

[9] 编者注: 应用于 $f : S' \times_T S' \to S \times_T S = Y$.

[10] 编者注: 这一条件显然是必要的. 反之, 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $R(S)$ 都是某个等价关系的图像, 则这一等价关系扩张为对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ 定义的 $R(F)$: 规定两个态射 $\varphi, \psi : F \to R$ 等价, 是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和每个 $x \in F(S)$, 元素 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 在 $X(S)$ 中等价.

[11] 编者注: 以下例子也预示了本篇的后续内容. 设 G 为 $\mathscr{C}$-群, H 为一个 $\mathscr{C}$-子群, R 为 G 中由 $G \times H \to G \times G$, $(g, h) \mapsto (g, gh)$ 定义的等价关系 (参见 3.2). 由 $Q(S) = G(S)/H(S)$ 定义的函子 Q 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的商 (将 4.4.9 应用于最粗拓扑; 参见 4.4.2), 但一般不是所希望得到的商. 例如, 当 $\mathscr{C} = \mathbf{Sch}$ 时, 有仿射群概形的正合列

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{p} \mathbf{G}_m \longrightarrow 1$$

将 $\mathbf{G}_m$ 等同于商 $\mathbf{G}_m/\mu_2$. 此外, 由于 p 是有限且局部自由的, 在 fppf 拓扑的层构成的更大范畴中, $\mathbf{G}_m$ 是 $\mathbf{G}_m$ 对 μ_2 的层商; 参见 4.6.6(ii) 和 6.3.2. 而 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的商 Q 不同构于 $\mathbf{G}_m$, 因为例如 $Q(\mathbf{Z}) = \{1\}$, 而 $\mathbf{G}_m(\mathbf{Z}) = \{\pm 1\}$. 因此 Q 不是 fppf 层, *更不可能*可表.

在下文中, 简称等价关系时, 指的是 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系; 必要时, 将明确说明所指的是 $\mathscr{C}$-等价关系. [12]

定义 3.1.3. *若 X 是 $\mathscr{C}$ 中 S 上的对象, 则 S 上 X 中的等价关系 是指 X 中的一个等价关系 R, 使结构态射 $X \to S$ 与 R 相容.*

此时, 典范单态射 $R \to X \times X$ 经过单态射

$$X \times_S X \longrightarrow X \times X$$

分解, 并定义 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $X \to S$ 中的一个等价关系. 商 X/R 只要存在, 就带有到 S 的典范态射, 而 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的相应对象, 就是 $X \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ 对上述等价关系的商. 反之, 若 S 是 $\mathscr{C}$ 的可平方对象, 且 $Y \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中 X 对此等价关系的商, 则 Y 是 $\mathscr{C}$ 中 X 对 R 的商. 无论如何, 我们不必考虑那些在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中是商, 却尚不是 $\mathscr{C}$ 中的商的情形.

定义 3.1.4. *设 X (分别地, X') 是 $\mathscr{C}$ 中带有等价关系 R (分别地, R') 的对象. 若以下等价条件成立, 则称态射*

$$u : X \longrightarrow X'$$

与 R 和 R' 相容:

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $X(S)$ 中模 $R(S)$ 同余的两点, 被 u 映到 $X'(S)$ 中模 $R'(S)$ 同余的两点;*

(ii) *存在一个必然唯一的态射 $R \to R'$, 使图*

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times X & \xrightarrow{u\times u} & X' \times X' \end{array}$$

交换.

由 X/R 的泛性质, 只要 X/R 和 X'/R' 存在, 就有唯一的态射 v 使图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & X/R \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ X' & \xrightarrow{p'} & X'/R' \end{array}$$

交换.

定义 3.1.5. *若以下等价条件成立, 则称 X 的子对象 (即一个可表子函子) Y 在等价关系 R 下稳定:*

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $X(S)$ 的子集 $Y(S)$ 在 $R(S)$ 下稳定;*

(ii) *Y 在 p_1 和 p_2 下的逆像这两个 R 的子对象相同.*

X 的稳定子对象的一个重要特例如下: 商 X/R 存在, 且 Y 是 X/R 的某个子对象在 X 中的逆像.

定义 3.1.6. *设 R 是 X 中的等价关系, $X' \to X$ 是态射. 从 Cartesian 图*

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' \times X' & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

[12]编者注: 即使是 X 中的 $\widehat{\mathscr{C}}$-等价关系, 我们关心的问题也是 $\mathscr{C}$ 中的商是否存在.

得到的 X' 中的等价关系 R', 称为 X 中的等价关系 R 在 X' 中的逆像等价关系. 特别地, 若 X' 是 X 的子对象, 则称之为 R 在 X' 上诱导的等价关系, 并记为 $R_{X'}$.

态射 $X' \to X$ 与 R' 和 R 相容; 因而, 当商存在时, 它诱导态射 $X'/R' \to X/R$ (3.1.4). 若 X' 是 X 的子对象, 后文将会看到, 在某些情形下可以证明 $X'/R' \to X/R$ 为单态射, 因而将 X'/R' 等同于 X/R 的一个子对象. 在这种情形下, 此子对象在 X 中的逆像是一个包含 X' 且在 R 下稳定的子对象: 这就是 X' 关于等价关系 R 的*饱和化 (saturation)*.

命题 3.1.7. *若 X 的子对象 Y 在 R 下稳定, 则对 $i = 1, 2$, 以下两个方形都是 Cartesian 方形:*

$$\begin{array}{ccc} R_Y & \longrightarrow & R \\ {\scriptstyle p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ Y & \longrightarrow & X. \end{array}$$

证明是直接的.

3.2. 群的自由作用定义的等价关系

定义 3.2.1. *设 X 是 $\mathscr{C}$ 的对象, H 是作用在 X 上的 $\mathscr{C}$-群, 即带有一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射*

$$H \longrightarrow \mathrm{Aut}(X).$$

若以下等价条件成立, 则称群 H 在 X 上自由作用:

(i) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 群 $H(S)$ 在 $X(S)$ 上自由作用;*

(ii) *在集合上由 $(h, x) \mapsto (hx, x)$ 定义的函子态射*

$$H \times X \longrightarrow X \times X$$

是单态射.

在前一定义中, 假设群 H 在 X 上左作用. 当然, 对群右作用的情形也有类似概念, 即给定从反群 H° 到 $\mathrm{Aut}(X)$ 的群态射.

若 H 在 X 上自由作用, 则 $H \times X$ 在 (ii) 中的态射下的像, 是 X 中的一个等价关系, 称为*由 H 在 X 上的作用定义的等价关系*. 当 X 对此等价关系的商存在时, 记为 $H\backslash X$ (若 H 右作用, 则记为 X/H). 它表示以下协变函子: 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 Z,

$$\mathrm{Hom}(H\backslash X, Z) = \{\text{从 } X \text{ 到 } Z \text{ 且在 } H \text{ 下不变的态射}\},$$

其中, 称态射 $f : X \to Z$ 在 H 下不变, 是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 相应的态射 $X(S) \to Z(S)$ 在群 $H(S)$ 下不变.

引理 3.2.2. *在 3.2.1 的假设下, 设 Y 是 X 的子对象. 以下条件等价:*

(i) *Y 在 H 定义的等价关系下稳定 (3.1.5);*

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, $X(S)$ 的子集 $Y(S)$ 在 $H(S)$ 下稳定;*

(iii) *存在一个必然唯一的态射 f, 使图*

$$\begin{array}{ccc} H \times Y & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ H \times X & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换.

在这些条件下, f 定义一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$H \longrightarrow \mathrm{Aut}(Y),$$

并且, H 的这一作用在 Y 中定义的等价关系, 恰好是 H 的作用在 X 中定义的等价关系在 Y 上诱导的等价关系.

证明是直接的. 对右作用当然也有类似陈述. 上面定义的 H 在 Y 上的作用, 称为给定的 H 在 X 上的作用在 Y 上诱导的作用.

现考虑两个 $\mathscr{C}$-群 H 和 G, 以及群态射

$$u : H \longrightarrow G.$$

则 H 以平移的方式作用在 G 上 (在集合上, $hg = u(h)g$), 且这一作用自由当且仅当 u 为单态射. 当 G 对 H 的这一作用的商存在时, 记为 $H\backslash G$. 类似地可定义 H 在 G 上的右作用和商 G/H. 这些商关于所涉及的群具有函子性. 更确切地说, 对右商有以下 引理.

引理 3.2.3. *设 $u : H \to G$ 和 $u' : H' \to G'$ 是 $\mathscr{C}$-群的单态射, 并假设给定 $\mathscr{C}$-群态射*

$$f : G \longrightarrow G'$$

则以下条件等价:

(i) *f 与 H 和 H' 在 G 和 G' 中定义的等价关系相容;*

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 有 $fu(H(S)) \subseteq u'(H'(S))$;*

(iii) *存在一个必然唯一的保乘法态射 $g : H \to H'$, 使图*

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{g} & H' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'} \\ G & \xrightarrow{f} & G' \end{array}$$

交换.

在这些条件下, 若商 G/H 和 G'/H' 存在, 则有唯一态射 $\overline{f}$ 使图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ G/H & \xrightarrow{\overline{f}} & G'/H' \end{array}$$

交换.

第一个断言可化归到集合的情形来证明. 第二个立即由 (i) 得到.

前面对于一般等价关系引入的概念, 都可以改述为当前情形中的概念. 这里只记下 如下引理, 其证明化归到集合的情形后是直接的.

引理 3.2.4. *设 $u : H \to G$ 是 $\mathscr{C}$-群的单态射, G' 是 G 的 $\mathscr{C}$-子群. G 的子对象 G' 在 H 定义的等价关系下稳定, 当且仅当 u 经过典范单态射 $G' \to G$ 分解. 在 此条件 下, 由 u 定义的 G 上的作用在 G' 上诱导的 H 的作用, 恰好是 u 所经过的单态射 $H \to G'$ 产生的作用.*

3.3. 普遍有效等价关系

定义 3.3.1. *设 $f : X \to Y$ 是态射. f 在 X 中定义的等价关系, 记为 $\mathscr{R}(f)$, 是 X 中作为典范单态射*

$$X \times_Y X \longrightarrow X \times X.$$

的像的 $\hat{\mathscr{C}}$-等价关系.

定义 3.3.2. *若下列条件成立, 则称 X 中的等价关系 R 为有效的:*

(i) *R 可表, 即它是一个 $\mathscr{C}$-等价关系;*

(ii) *商 $Y = X/R$ 在 $\mathscr{C}$ 中存在;* [13]

(iii) *图*

$$R \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} X \xrightarrow{p} Y$$

使 R 成为 X 在 Y 上的纤维平方, 即 R 是 p 定义的等价关系.

附论 3.3.2.1. [14] *若 R 是 X 中的有效等价关系, 则 p 是有效满态射 (1.3). 若 $f : X \to Y$ 是有效满态射, 则 $\mathscr{R}(f)$ 是 X 中的有效等价关系, 其一个商为 Y. 因此, X 中的有效等价关系与 X 的有效商, 即以 X 为源的有效满态射的等价类之间, 有一个一一对应的 "Galois" 对应.*

定义 3.3.3. *X 中的等价关系 R 称为普遍有效的, 是指商 $Y = X/R$ 存在, 且对每个 $Y' \to Y$, 纤维积 $X' = X \times_Y Y'$ 与 $R' = R \times_Y Y'$ 都存在, 并且 R' 是 X' 在 Y' 上的纤维平方. 等价地, R 有效且 $p : X \to X/R$ 为普遍有效满态射.*

附论 3.3.3.1.[14] *与上面相同, X 中的普遍有效等价关系与 X 的普遍有效商之间存在一一对应.*

注 3.3.3.2.[14] 假设 $\mathscr{C}$ 为 S-概形范畴, 并用 $\mathbf{A}^1_S$ 表示 S 上的仿射直线. 设 $R \subset X \times_S X$ 是普遍有效等价关系, $p : X \to Y$ 为其商. 则对 Y 的每个开子集 U,

$$\mathcal{O}(U) = \mathrm{Hom}_S(U, \mathbf{A}^1_S)$$

是下列集合中满足 $\varphi \circ \mathrm{pr}_1 = \varphi \circ \mathrm{pr}_2$ 的元素 φ 组成的集合:

$$\mathcal{O}(p^{-1}(U)) = \mathrm{Hom}_S(p^{-1}(U), \mathbf{A}^1_S)$$

特别地, 若 R 由群 H 在 X 上的自由右作用定义 (参见 3.2.1), 则 $\mathcal{O}(U)$ 是所有满足下述条件的 $\varphi \in \mathcal{O}(p^{-1}(U))$ 组成的集合:

$$\varphi(xh) = \varphi(x)$$

对每个 $S' \to S$, $x \in X(S')$ 和 $h \in H(S')$ 都成立.

命题 3.3.4. *设 R 是 X 中的普遍有效等价关系. 设 $f : X \to Z$ 是与 R 相容的态射, 因而经过某态射 $g : X/R \to Z$ 分解. 以下条件等价:*

(i) *g 是单态射;*

(ii) *R 是 f 定义的等价关系.*

事实上, (i) 显然蕴含 (ii), 逆命题则恰好是 2.5.

定义 3.3.5. *设 H 是在 X 上自由作用的 $\mathscr{C}$-群. 若 H 的作用在 X 中定义的等价关系是有效的 (分别地, 普遍有效的), 则称 H 有效地作用, 或称 H 在 X 上的作用是有效的 (分别地,* 普遍有效的*).*

---

[13] 编者注: "在 $\mathscr{C}$ 中" 这几个字为新增内容.

[14] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 3.3.2.1 (分别地, 3.3.3.1); 注 3.3.3.2 也是新增的.

3.4. (M)-有效性

在实际应用中, 普遍有效满态射往往难以刻画. 然而, 我们经常已经掌握一些这种态射; 例如在概形论中, 忠实平坦拟紧态射就具有这一性质. 这就引出下面的讨论.

3.4.1. 先对 $\mathscr{C}$ 的一个态射族 (M) 列出若干条件:

(a) (M) 在基变换下稳定: 属于 (M) 的每个 $u : T \to S$ 都可平方 (参见 1.4.0), 且对每个 $S' \to S$, 基变换

$$u' : T \times_S S' \longrightarrow S'$$

属于 (M);

(b) (M) 的两个元素的复合属于 (M);

(c) 每个同构都属于 (M);

(d) (M) 的每个元素都是有效满态射.

条件 (a) 和 (b) 蕴含:

(a′) (M) 的两个元素的 Cartesian 积属于 (M). 更确切地说, 设 $u : X \to Y$ 和 $u' : X' \to Y'$ 是两个属于 (M) 的 S-态射. 若 $Y \times_S Y'$ 存在, 则 $X \times_S X'$ 存在且 $u \times_S u'$ 属于 (M).

这可由下图得到

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & \xleftarrow{u'} & X' \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ X & \longleftarrow & X \times_S Y' & \longleftarrow & X \times_S X' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow & & \swarrow_{u \times_S u'} \\ Y & \longleftarrow & Y \times_S Y' & & \end{array}$$

类似地, (a) 和 (d) 蕴含:

(d′) (M) 的每个元素都是普遍有效满态射.

3.4.2. 普遍有效满态射组成的族 (M_0) 满足 3.4.1 的条件 (a)–(d). 事实上, (a), (c) 和 (d) 由定义成立, (b) 则由 1.8 得到. 以下假设给定 $\mathscr{C}$ 的一个满足这些条件的态射族 (M); 所得结果特别适用于族 (M_0).

定义 3.4.3. X 中的等价关系 R 称为 (M) *型的*, 是指它可表且 $p_1 \in (M)$; 此时条件 (b) 和 (c) 蕴含 $p_2 \in (M)$.
关系 R 称为 (M)-*有效的*, 是指它有效, 且典范态射 $X \to X/R$ 属于 (M).
X 的商 Y 称为 (M)-*有效的*, 是指典范态射 $X \to Y$ 属于 (M).
以下结果立即由 定义 得到. [15]

命题 3.4.3.1.

(i) (M)-*有效等价关系是* (M) *型的, 并且普遍有效.*

(ii) (M)-*有效商是普遍有效的 (参见 3.3.3).*

(iii) *映射* $R \mapsto X/R$ *和* $p \mapsto \mathscr{R}(p)$ *在* X *中的* (M)-*有效等价关系与* X *的* (M)-*有效商之间建立了一一对应.*

(iv) (M_0)-*有效等价于普遍有效.*

[15] 编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 3.4.3.1, 并展开了 (i) 的证明.

证明 (i). 由于 R 是 (M)-有效的, 有 Cartesian 方形

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xrightarrow{p} & X/R, \end{array}$$

且 $p \in (M)$. 由 3.4.1(a), p_1 和 p_2 属于 (M), 故 R 是 (M) 型的.

令 $Y = X/R$, 设 $Y' \to Y$ 为任意态射. 由 3.4.1(a), 纤维积 $X' = X \times_Y Y'$ 和 $R' = R \times_Y Y'$ 存在, 且态射 $X' \to Y'$ 和 $p'_i : R' \to X'$ 属于 (M). 最后, 由于 $R = X \times_Y X$, 由纤维积的结合性得到

$$R' = X \times_Y X \times_Y Y' = X' \times_{Y'} X'.$$

这表明 R' 是 (M)-有效的; 特别地, R 普遍有效. 这就证明了 (i), 也证明了 (iv). 结合定义 3.3.2, 即可得到 (ii) 和 (iii).

3.4.4. 设 H 是结构态射属于 (M) 的 S-群. 若 H 在 S-对象 X 上自由作用, 则它在 X 中定义一个 (M) 型等价关系. 事实上, 由 (a), 纤维积 $H \times_S X$ 存在, 且 $\mathrm{pr}_2 : H \times_S X \to X$ 属于 (M). 若 H 的作用在 X 中定义的等价关系是 (M)-有效的, 则称这一作用为 (M)-*有效的*.

命题 3.4.5 ((M)-有效性与基变换). *设 R 是 S 上 X 中的一个 (M)-有效等价关系, 并令 $Y = X/R$. 设 $S' \to S$ 为使 $Y' = Y \times_S S'$ 存在的基变换. 则 $X' = X \times_S S'$ 存在, $R' = R \times_S S'$ 是 S' 上 X' 中的 (M)-有效等价关系, 并且*

$$X'/R' \simeq (X/R)'.$$

事实上, 典范态射 $X \to Y$ 和 $R \to Y$ 属于 (M); 因此由 (a′), X' 和 R' 可表. 由纤维积的结合性, R' 是 X' 中由典范态射 $X' \to Y'$ 定义的等价关系, 而该态射属于 (M). 这就证明了 所述断言.

命题 3.4.6 ((M)-有效性与 Cartesian 积). *设 R (分别地, R') 是 S 上的 X (分别地, X') 中的 (M)-有效等价关系. 若 $(X/R) \times_S (X'/R')$ 存在, 则 $X \times_S X'$ 存在, $R \times_S R'$ 是 S 上 $X \times_S X'$ 中的 (M)-有效等价关系, 并且*

$$(X \times_S X')/(R \times_S R') \simeq (X/R) \times_S (X'/R').$$

令 $Y = X/R$ 及 $Y' = X'/R'$. 由 (a′), 纤维积 $X \times_S X'$ 存在, 且典范态射

$$q : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$

属于 (M). 公式

$$(X \times_S X') \times_{(Y \times_S Y')} (X \times_S X') \simeq (X \times_Y X) \times_S (X' \times_{Y'} X')$$

(所有未注明基底的纤维积均在 S 上取) 表明 $R \times_S R'$ 是 $X \times_S X'$ 中由 q 定义的等价关系, 证明完毕.

3.4.7. [16] 假设 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, $f : G \to G'$ 是一个属于 (M) 的 $\mathscr{C}$-群态射. 由 3.4.1(a), 核 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $e \times_{G'} G$ 表示, 且态射 $\mathrm{Ker}(f) \to e$ 属于 (M).

另一方面, f 定义的等价关系, 与 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 G 上的作用 (比如右作用) 定义的等价关系相同: 它是由集合映射 $(g, h) \mapsto (g, gh)$ 定义的态射

$$G \times \mathrm{Ker}(f) \longrightarrow G \times G$$

的像. 因此, 由附论 3.3.2.1 得到 如下推论.

推论 3.4.7.1. *假设 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, $f : G \to G'$ 是一个属于 (M) 的 $\mathscr{C}$-群态射. 则 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 G 上的作用是 (M)-有效的, 且 G' 为商 $G/\mathrm{Ker}(f)$.*

[16] 编者注: 本段 为新增内容.

3.5. 用下降构造商

经常遇到的情形是, 不能直接构造商, 但作适当的基变换后就可以. 本小节给出适用于这一情形的有用判别法.

在 2.1 中, 我们定义了 S' 上的对象 X' 上相对于态射 $S' \to S$ 的下降数据.

定义 3.5.1. *X' 上相对于 $S' \to S$ 的下降数据称为有效的, 是指带有此下降数据的 X' 同构于 S 上的某个对象 X 在 S' 上的逆像, 后者带有其典范下降数据.*

若 $S' \to S$ 为下降态射 (2.2), 则 定义 中的对象 X 在唯一同构的意义下唯一. 称 $S' \to S$ 为有效下降态射 (2.2), 就是指它为下降态射, 且相对于它的每个下降数据都是有效的.

现在考虑 S 上的对象 X 中的等价关系 R. 设 X', X'', X''' 分别为 X 在

$$S', \qquad S'' = S' \times_S S', \qquad S''' = S' \times_S S' \times_S S',$$

上的逆像, R', R'', R''' 为由 R 取逆像得到的等价关系. 假设 X' 中的 R' 是 (M)-有效的, 并考虑作为 S' 上的对象的商 $Y' = X'/R'$. 由 3.4.5, 它在 S'' 上的两个逆像都同构于 X''/R''. 因此, S'-对象 Y' 带有典范粘合数据. 同样应用 X'''/R''' 的唯一性, 可知这实际上是下降数据. (此论证隐含假设所列的纤维积都存在. 特别地, 若 $S' \to S$ 可平方, 例如它是下降态射, 则此条件成立.)

命题 3.5.2. *设 R 是 S 上的对象 X 中的等价关系, $S' \to S$ 是普遍有效满态射. 假设每个在 S' 上的逆像属于 (M) 的 S-态射本身也属于 (M). 以下条件等价:*

(i) *R 在 X 中是 (M)-有效的;*

(ii) *R' 在 X' 中是 (M)-有效的, 且 X'/R' 上的典范下降数据有效.*

当这些条件成立时, 由 X'/R' 下降得到的对象典范同构于 X/R.

蕴含 (i)⇒(ii) 仅是将 3.4.4 改述为下降语言. 逆命题证明后, 由普遍有效满态射为下降态射这一事实 (2.3), 下降得到的对象在唯一同构的意义下唯一, 从而得到 本命题 的最后一个断言.

证明 (ii)⇒(i). 令 $Y' = X'/R'$, 设 Y 为下降得到的对象. 典范态射 $p' : X' \to X'/R' = Y'$ 按构造与下降数据相容: 它在 S'' 上的两个逆像都与典范态射 $X'' \to X''/R''$ 相同. 因此, 它是某个 S-态射 $p : X \to Y$ 在 S' 上的逆像. 由于 p' 属于 (M), 关于 $S' \to S$ 的假设蕴含 p 也属于 (M). 此外, 由于 p' 与等价关系 R' 相容, 再次利用普遍有效满态射为下降态射这一事实, 可知态射 p 与 R 相容. 因而有态射

$$R \longrightarrow X \times_Y X.$$

为证明 R 是 (M)-有效的且 Y 同构于 X/R, 只须证明此态射为同构. 从 S 到 S' 作基变换后, 由于 R' 有效, 它成为同构; 因而由与 2.4 相同的理由, 它本身就是同构.

注意, 若 (M) 是普遍有效满态射组成的族 (M_0), 且 $\mathscr{C}$ 有纤维积, 则 本命题 的假设成立 (1.10). 我们得到如下推论.

推论 3.5.3. *假设 $\mathscr{C}$ 有纤维积 (只须 S 上的纤维积存在即可). 设 R 是 S 上 X 中的等价关系, $S' \to S$ 是普遍有效满态射. 以下条件等价:*

(i) *R 在 X 中普遍有效;*

(ii) *R' 在 X' 中普遍有效, 且 X'/R' 上的典范下降数据有效.*

当这些条件成立时, 由 X'/R' 下降得到的对象典范同构于 X/R.

4. 拓扑与层

筛的概念以及这里（4.2.1）采用的拓扑概念的表述, 都由 J. Giraud [AS] 提出; 与 [MA] 中使用覆盖族的表述相比, 这种表述更为内蕴, 并在许多方面更为方便.

4.1. 筛

定义 4.1.1. *范畴 $\mathscr{C}$ 的一个筛* (sieve)*, 是指终函子*

$$e : \mathscr{C}^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

的一个子函子 C.

对 $\mathscr{C}$ 的每个筛 C, 关联一个由 $\mathscr{C}$ 中满足 $C(X) \neq \varnothing$ 的对象 X 组成的集合 $E(C)$; 也就是说, 这些对象使结构态射 $X \to e$ 经由 C 分解. 因此

$$\begin{cases} X \in E(C) & \iff \quad C(X) = e(X) = \{\varnothing\}, \\ X \notin E(C) & \iff \quad C(X) = \varnothing. \end{cases} \tag{+}$$

集合 $E = E(C)$ 具有下述性质:

$$X \in E \text{ 且 } \operatorname{Hom}(Y, X) \neq \varnothing \quad \Longrightarrow \quad Y \in E. \tag{++}$$

(若在集合 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 上赋予自然的预序, 即当存在从 Y 到 X 的箭头时称 Y 支配 X, 则满足 (++) 的集合 E, 恰好是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 中具有以下性质的子集: 它包含支配其某个元素的每个对象.)[17]

反之, 若 E 是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 的一个具有性质 (++) 的子集, 则 E 可唯一地写成 $E(C)$ 的形式, 其中 C 由公式 (+) 定义. 因此, $\mathscr{C}$ 的筛与 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 中满足 (++) 的子集一一对应. 我们有时略不严格地将集合 $E(C)$ 本身也称为 $\mathscr{C}$ 的筛.

设 C 和 C' 是 $\mathscr{C}$ 的两个筛. [18] 由于两者都是终函子 e 的子函子, 以下说法等价: C 支配 C' (相对于 $\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$ 中的支配关系) ; C 是 C' 的子函子; $E(C) \subset E(C')$. 此时称 C 比 C' *更细*. 这在 $\mathscr{C}$ 的筛的集合上定义了一个序关系. 此外,

$$E(C) \cap E(C') = E(C \times C'),$$

所以 $\mathscr{C}$ 的筛的集合对于“更细”这一序关系是滤过的.

$\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个子集 E, 特别是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 的每个子集, 都定义一个筛 $C(E)$: 由满足至少对某个 $F \in E$ 有 $F(X) \neq \varnothing$ 的 $X \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 组成的集合满足 (++), 因而定义了所需的筛.

这个筛也可以定义为态射族 $\{F \to e \mid F \in E\}$ 在下述定义意义下的像.

定义 4.1.2. *设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中具有共同靶 F 的一个态射族. 这个族的像, 是指由下式定义的 F 的子函子:*

$$S \longmapsto \bigcup_i \operatorname{Im} F_i(S) \subset F(S).$$

命题 4.1.3. *像的构造与基变换可交换. 沿用上述记号, 设 I 是族 $\{F_i \to F\}$ 的像. 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的每个态射 $G \to F$, 族*

$$\{F_i \times_F G \longrightarrow G\}$$

的像是 G 的子函子 $I \times_F G$.

定义 4.1.4.0. [19] *设 C 是 $\mathscr{C}$ 的一个筛. 若 E 是 $\mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 中满足 $C(E) = C$ 的一个子集, 就称 E 为 C 的一个基. 每个筛 C 都有一个基, 例如 $E(C)$.*

---

[17] 编者注: 这里的“支配”采用刚才所述预序的意义: 若存在箭头 $Y \to X$, 就称 Y 支配 X. 另一方面, 若 X, Y 是对象 Z 的两个子对象, 当 $X \subset Y$ 时, 称 Y 包含 X (参见 2.4) . 为避免这两种用法产生歧义, 后文在第一种情形中使用“支配”, 在第二种情形中使用“包含”.

[18] 编者注: 下文一句作了展开.

[19] 编者注: 为突出这一定义, 增加了编号 4.1.4.0.

现在借助 C 的一个基 $\{S_i\}$, 描述 $\mathrm{Hom}(C,F)$, 这里 C 是 $\mathscr{C}$ 的一个筛, 而 $F\in\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$. 对每一对 (i,j), 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中有图:

$$\begin{array}{ccc} S_i\times S_j & \longrightarrow & S_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_j & \longrightarrow & e. \end{array}$$

它给出集合的图

$$\Gamma(F)=\mathrm{Hom}(e,F)\xrightarrow{\sigma}\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\overset{\tau_1}{\underset{\tau_2}{\rightrightarrows}}\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F),$$

满足 $\tau_1\sigma=\tau_2\sigma$. 因而有态射

$$\mathrm{Hom}(e,F)\longrightarrow\mathrm{Ker}\left(\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\rightrightarrows\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F)\right).$$

立即可验证:

命题 4.1.4. *有一个关于 F 具函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}(C,F)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ker}\left(\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\rightrightarrows\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F)\right),$$

使下图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}\big(\prod_i\mathrm{Hom}(S_i,F)\rightrightarrows\prod_{i,j}\mathrm{Hom}(S_i\times S_j,F)\big) \\ \| & & \uparrow\sim \\ \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(C,F) \end{array}$$

交换; 下方箭头由典范态射 $C\to e$ 诱导.

推论 4.1.5. *假设纤维积 $S_i\times S_j$ 可表, 例如 S_i 可平方时就是如此. 则对每个 $F\in\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$, 有同构*

$$\mathrm{Hom}(C,F)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Ker}\left(\prod_i F(S_i)\rightrightarrows\prod_{i,j}F(S_i\times S_j)\right).$$

注 4.1.6. 设 R 是 $\mathscr{C}$ 的一个筛, 以 $\overline{R}$ 表示 $\mathscr{C}$ 中对象集为 $E(R)$ 的全子范畴, 并设

$$i_R:\overline{R}\longrightarrow\mathscr{C}$$

是包含函子. 有一个关于 $F\in\mathrm{Ob}\widehat{\mathscr{C}}$ 具函子性的同构

$$\mathrm{Hom}(R,F)\xrightarrow{\sim}\Gamma(F\circ i_R),$$

使下图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(e,F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R,F) \\ \downarrow\sim & & \downarrow\sim \\ \Gamma(F) & \longrightarrow & \Gamma(F\circ i_R) \end{array}$$

交换; 下方箭头由 i_R 诱导.

定义 4.1.7. *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. $\mathscr{C}$ 的对象 S 的一个筛, 是指范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个筛.*

因此, S 的一个筛是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 S 的一个子对象. 它典范地对应于 $\mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ 的一个子集, 该子集一旦包含某箭头的靶, 就也包含该箭头的源. 我们也略不严格地将这种子集称为 S 的筛.

4.2. 拓扑: 定义

定义 4.2.1. *范畴 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑, 是指对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 给定 S 的筛的一个集合 $J(S)$, 其中的筛称为 S 的覆盖筛或加细* (refinement), *并满足下列公理:*

(T 1) *对 S 的每个加细 R 和每个态射 $T \to S$, T 的筛 $R \times_S T$ 都是覆盖筛 (“在基变换下稳定”).*

(T 2) *若 R, C 是 S 的两个筛, R 是覆盖筛, 并且对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个态射 $T \to R$, T 的筛 $C \times_S T$ 都是覆盖筛, 则 C 是 S 的一个加细.* [20]

(T 3) *若 $C \supset R$ 是 S 的两个筛, 且 R 为覆盖筛, 则 C 为覆盖筛.*

(T 4) *对每个 S, S 是 S 的一个加细.*

这些公理可以重新表述如下. 假设给定 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑 $S \mapsto J(S)$. 对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 以 $J(F)$ 表示 F 的下述子函子 R 所成的集合: 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的每个态射 $T \to F$, 其中 T 可表, T 的筛 $R \times_F T$ 都是覆盖筛. 由 (T 1), 此记号与前述记号一致. 仍称 $R \in J(F)$ 为 F 的一个*加细*. 上述公理立即给出:

($T'0$) 若 $F \supset G$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象, 且对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个态射 $S \to F$, 均有 $G \times_F S \in J(S)$, 则 $G \in J(F)$.

($T'1$) 若 $G \in J(F)$, 且 $H \to F$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射, 则 $G \times_F H \in J(H)$.

($T'2$) 若 $F \supset G \supset H$, $G \in J(F)$, 且 $H \in J(G)$, 则 $H \in J(F)$.

($T'3$) 若 $F \supset G \supset H$ 且 $H \in J(F)$, 则 $G \in J(F)$.

($T'4$) 对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 有 $F \in J(F)$.

反之, 若对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 给定 F 的一个子对象集 $J(F)$, 满足 $T'0$–$T'4$, 则 $S \mapsto J(S)$ 定义 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑, 且这两种构造互为逆构造.

性质 $T'1$, $T'2$ 和 $T'3$ 还蕴含下述性质 [21]:

($T'5$) 若 G 和 H 是 F 的两个子对象, 且 $G, H \in J(F)$, 则 $G \cap H \in J(F)$.

因此, 按 $\supset$ 排序的 $J(F)$ 是滤过的. 这一观察将在下面用到.

4.2.2. 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 均有 $J(S) \supset J'(S)$, 就称由 J 定义的拓扑比由 J' 定义的拓扑*更细*. 等价地, 对每个 $F \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$, 有 $J(F) \supset J'(F)$.

$\mathscr{C}$ 上的任意一个拓扑集都有最大下界. 更确切地说, 设 I 是指标集, 对每个 $i \in I$, 设 $S \mapsto J_i(S)$ 是 $\mathscr{C}$ 上的拓扑. 则

$$J(S) = \bigcap_{i \in I} J_i(S)$$

定义一个拓扑, 它是所给拓扑集的最大下界.

特别地, 假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定 S 的筛的一个集合 $E(S)$. *这些集合生成的拓扑*, 是指使 $E(S)$ 的每个元素成为 S 的加细的最粗拓扑.

定义 4.2.3. *设 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射族, $G \subset F$ 是它的像 (4.1.2). 若 $G \in J(F)$, 就称该族是覆盖族. 若只含一个态射的族为覆盖族, 就称该态射为覆盖态射.*

这一定义特别适用于包含态射: S 的一个筛 C 是覆盖筛, 当且仅当典范态射 $C \to S$ 是覆盖态射.

公理 $T'0$–$T'5$ 给出覆盖族的下列性质:

[20] 编者注: 换言之, 若 C “相对于覆盖筛 R 局部为覆盖筛”, 则 C 为覆盖筛.

[21] 编者注: $T'1$ 和 $T'2$ 已经足够: 由 $T'1$, $G \cap H = G \times_F H$ 属于 $J(H)$, 进而由 $T'2$ 属于 $J(F)$.

(C 0) 若 $\{F_i \to F\}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个族, 且每个可表基变换 $\{F_i \times_F S \to S\}$ 都是覆盖族, 则原族是覆盖族.

(C 1) 若 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族, 而 $G \to F$ 是任意态射, 则 $\{F_i \times_F G \to G\}$ 是覆盖族（“在基变换下稳定”）.

(C 2) 若 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族, 且对每个 i, $\{F_{ij} \to F_i\}$ 是覆盖族, 则复合族 $\{F_{ij} \to F\}$ 是覆盖族（“在复合下稳定”）.

(C 3) 若 $\{G_j \to F\}$ 是覆盖族, 而 $\{F_i \to F\}$ 是满足下述条件的族: 对每个 j, 存在一个 i, 使 $G_j \to F$ 经由 $F_i \to F$ 分解, 则 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族（“饱和性”）.

(C 4) 每个仅含一个同构的族都是覆盖族.

注意, (C 2) 和 (C 3) 还蕴含:

(C 5) 若对族 $\{F_i \to F\}$, 存在覆盖族 $\{G_j \to F\}$, 使得对每个 j, $\{F_i \times_F G_j \to G_j\}$ 都是覆盖族, 则 $\{F_i \to F\}$ 是覆盖族（“局部覆盖的族是覆盖族”）.

4.2.4. 反之, 设 $\mathscr{C}$ 是具有纤维积的范畴, 并假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定 $\mathscr{C}$ 中以 S 为靶的某些态射族组成的集合, 称其中各族为覆盖族; 它们满足 (C 1)–(C 4), 从而也满足 (C 5). 以 $J(S)$ 表示 S 的具有覆盖基的筛所成的集合（由 (C 3), 这等价于其所有基均为覆盖族）. 则 $S \mapsto J(S)$ 定义 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑, 且上述两种构造互为逆构造.

在应用中, 考虑所有覆盖族很不方便, 因为往往可以相当简单地描述其中“足够多”的一些族. 这就引出下列定义.

定义 4.2.5.0. [22] *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, 并假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定 $\mathscr{C}$ 中以 S 为靶的态射族的一个集合 $P(S)$. 由 P 生成的拓扑, 是指使这些给定族均为覆盖族的最粗拓扑.*

定义 4.2.5. *范畴 $\mathscr{C}$ 上的一个*预拓扑 (pretopology)*, 是指对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 给定族 $\{S_i \to S\}$ 的一个集合 $R(S)$, 称其中各族为该预拓扑的覆盖族, 并满足:*

(P 1) *对每个 $\{S_i \to S\} \in R(S)$ 和每个态射 $T \to S$, 纤维积 $S_i \times_S T$ 均存在, 且 $\{S_i \times_S T \to T\} \in R(T)$.*

(P 2) *若 $\{S_i \to S\} \in R(S)$, 且对每个 i, $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$, 则复合族 $\{T_{ij} \to S\}$ 属于 $R(S)$.*

(P 3) *每个仅含一个同构的族都是覆盖族.*

命题 4.2.6. *对每个 S, 以 $J(S)$ 表示 S 的下述筛所成的集合: 它们是预拓扑 R 所生成的拓扑的覆盖筛. 以 $J_R(S)$ 表示 $J(S)$ 中由 $R(S)$ 中的族定义的筛所成的子集. 则 $J_R(S)$ 在 $J(S)$ 中共尾: S 的每个加细都包含一个由 $R(S)$ 中的某个族定义的筛.*

对每个 S, 以 $J'(S)$ 表示 S 的包含 $J_R(S)$ 中某个筛的筛所成的集合. 显然 $J'(S) \subset J(S)$. 要证明 $J(S) = J'(S)$, 只须证明这些 $J'(S)$ 定义一个拓扑, 即满足 (T 1)–(T 4). 公理 (T 1), (T 3) 和 (T 4) 是直接的; 只须验证 (T 2). [23]

设 $U \in J'(S)$, C 是 S 的一个筛, 并假设对每个 $T \to U$, 有 $C \times_S T \in J'(T)$. 须证明 $C \in J'(S)$. 根据定义, U 包含一个由族 $\{S_i \to S\} \in R(S)$ 定义的加细 U'. 由于已经验证了 (T 3), 只须证明 $U' \cap C \in J'(S)$; 因而可假设 $U = U'$. 由假设, 对每个 i, 有 $C \times_S S_i \in J'(S_i)$. 因此, 对每个 i, 都有覆盖族 $\{T_{ij} \to S_i\} \in R(S_i)$, 使 $T_{ij} \to S_i$ 经由 $C \times_S S_i \to S_i$ 分解. 所

[22]编者注: 这一定义在原文中位于 4.2.5 之后, 现将它移到这里, 因为 6.2.1 将在比 4.2.5 略为一般的情形中使用它.

[23]编者注: 以下修正了原文中的排印错误.

以 $T_{ij} \to S$ 经由 $C \to S$ 分解. 于是 C 包含由复合族 $\{T_{ij} \to S\}$ 定义的筛, 由 (P 2) 即完成证明.

公理 (P 1)–(P 3) 就是 [MA] 中的公理. 由于预拓扑在实际应用中很有用, 我们将通过定义所讨论拓扑的一个预拓扑, 来解释每个重要结果.

注 4.2.7. 可以引入一个略为一般的概念: 对每个 S, 指定覆盖族的一个集合, 使其满足 (P 1), (P 3) 以及命题 4.2.6 的结论. 特别地, 当所给族满足 (P 1), (P 3) 和 (C 5) 时就是如此. 见 [D].

定义 4.2.8. *设 $\mathscr{C}$ 赋有一个拓扑, S 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象, 而 $P(S')$ 是关于变元 $S' \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}_{/S}$ 的一个条件. 假设 $\mathrm{Hom}(S'', S') \neq \varnothing$ 蕴含 $P(S') \Rightarrow P(S'')$. 若下列等价条件成立, 就称条件 P 对于所讨论的拓扑在 S 上局部成立:*

(i) *使 $P(S')$ 成立的 $S' \to S$ 所成的集合是 S 的一个加细.*

(ii) *存在 S 的一个加细, 使该加细中的每个 S' 都满足 $P(S')$.*

(iii) *若拓扑由一个预拓扑定义, 则存在此预拓扑的一个覆盖族, 使该族中的每个 S' 都满足 $P(S')$.*

例 4.2.9. *设 $f : X \to Y$ 是一个 S-态射. 若存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使对每个 i, $f \times_S S_i$ 都是同构, 就称 f 局部为同构. 等价地, 存在 S 的一个加细 R, 使对每个 $T \to R$, $X(T) \to Y(T)$ 都是同构.*

后文还会出现许多使用这种“局部”语言的例子.

4.3. 预层、层以及预层的伴随层

定义 4.3.1. *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴. $\mathscr{C}$ 上的一个集合预层, 是指从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴的反变函子. 范畴*

$$\widehat{\mathscr{C}} = \mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

称为 $\mathscr{C}$ 上的预层范畴. 若 $\mathscr{C}$ 赋有一个拓扑, 则一个预层 P 称为分离的 (分别地, 称为一个层), 如果对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 以及每个 $R \in J(S)$, 典范映射

$$P(S) = \mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \tag{+}$$

为单射 (分别地, 双射). $\widehat{\mathscr{C}}$ 中对象为层的全子范畴称为层范畴, 记作 $\widetilde{\mathscr{C}}$. [24]

命题 4.3.2. *设 P 是一个分离预层 (分别地, 层). 对每个 $H \in \mathrm{Ob}\,\widehat{\mathscr{C}}$ 和每个 $R \in J(H)$, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}(H, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \tag{+}$$

为单射 (分别地, 双射).


设 P 分离, H 是一个预层, $R \in J(H)$, 并设 $u, v : H \to P$ 满足 $uj = vj$. 对每个 $f : S \to H$, 其中 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 筛 $R \times_H S$ 是 S 的一个加细, 且 $uf j_S = v f j_S$. 这由下图表示:

$$\begin{array}{ccccc} R \times_H S & \xrightarrow{j_S} & S & & \\ {\scriptstyle f_R}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ R & \xrightarrow{j} & H & \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} & P. \end{array}$$

由于 P 分离, 可得 $uf = vf$. 这一点对每个可表的 S 都成立, 所以 $u = v$.

[24] 编者注: 若 Q 是一个分离预层 P 的子预层, 则 Q 是分离的. 事实上, 对 S 的每个筛 R, 复合 $Q(S) \hookrightarrow P(S) \hookrightarrow P(R)$ 是单射, 并且经由 $Q(S) \to Q(R)$ 分解.

现假设 P 是一个层. 设 $g : R \to P$; 我们证明它经由 H 分解. 对每个 $f : S \to H$, 其中 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 态射 $g \circ f_R : R \times_H S \to P$ 唯一地经由 S 分解, 从而定义一个态射 $h : S \to P$. 由唯一性, h 显然关于 f 具有函子性:



因此, 对每个 S, 我们都定义了一个关于 S 具函子性的映射 $H(S) \to P(S)$, 从而给出一个具有所需性质的态射 $H \to P$.

推论 4.3.2.1. [25] *设 R 和 F 是两个层. 若 R 是 F 的一个加细, 则 $R = F$.*

事实上, 假设 R 是 F 的一个加细, 并以 $j : R \hookrightarrow F$ 表示包含态射. 由 4.3.2, $\mathrm{Hom}(F, R) = \mathrm{End}(R)$; 因而存在 $\pi : F \to R$, 使 $\pi j = \mathrm{id}_R$. 同样, $\mathrm{End}(F) = \mathrm{Hom}(R, F)$, 且 $j\pi j = j$ 蕴含 $j\pi = \mathrm{id}_F$. 所以 j 是同构.

命题 4.3.3 ([AS], 1.3). *设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, P 是 $\mathscr{C}$ 上的一个预层. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 以 $J(S)$ 表示 S 的下述筛 R 所成的集合: 对每个 $T \to S$, 映射*

$$\mathrm{Hom}(T, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_S T, P) \qquad (+)$$

为单射（分别地, 双射）. 则这些 $J(S)$ 定义 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑; 也就是说, 它们满足 (T 1)–(T 4).

推论 4.3.4. *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 设 $K(S)$ 是一个满足 (T 1) 的筛族, 并设 P 是 $\mathscr{C}$ 上的一个预层. 则 P 对于这些 $K(S)$ 所生成的拓扑是分离的（分别地, 是层）, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 以及每个 $R \in K(S)$, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}(S, P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R, P) \qquad (+)$$

为单射（分别地, 双射）.

推论 4.3.5. *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 设 $R(S)$ 是 $\mathscr{C}$ 中以 S 为靶的态射族的一个集合, 满足 (P 1), 例如一个预拓扑. 设 P 是 $\mathscr{C}$ 上的一个预层. 则 P 对于 R 所生成的拓扑是分离的（分别地, 是层）, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 以及每个族 $\{S_i \to S\} \in R(S)$, 映射*

$$P(S) \longrightarrow \prod_i P(S_i)$$

为单射（分别地, 下图

$$P(S) \longrightarrow \prod_i P(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} P(S_i \times_S S_j)$$

正合）.

定义 4.3.6. *范畴 $\mathscr{C}$ 上的典范拓扑, 是指使每个可表函子均为层的最细拓扑.*

推论 4.3.7. *S 的一个筛 R 是典范拓扑的加细, 当且仅当对 $\mathscr{C}$ 中的每个态射 $T \to S$ 以及每个 $X \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(R \times_S T, X)$$

为双射.

[25] 编者注: 本推论为新增内容.

定义 4.3.8. *典范拓扑的覆盖筛称为普遍有效满态射筛.*

推论 4.3.9. *普遍有效满态射族定义一个普遍有效满态射筛. 反之, 每个定义了普遍有效满态射筛的可平方族都是普遍有效满态射族.*

现在回到赋有任意拓扑的范畴 $\mathscr{C}$, 讨论预层 P 的伴随层的构造. 设 S 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象. 若 $R \supset R'$ 是 S 的两个加细, 则有图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,P) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(R,P) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathrm{Hom}(R',P). \end{array}$$

如前所述, 有序集 $J(S)$ 是滤过的. 由于 $S \in J(S)$, 有一个显然的态射

$$\mathrm{Hom}(S,P) \longrightarrow \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P).$$

定义 4.3.10.0. [26] 置

$$\check{H}^0(S,P) = \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P).$$

可以验证, $\check{H}^0(S,P)$ 关于 S 具有函子性, 因而通过下式定义一个函子 LP:

$$\mathrm{Hom}(S,LP) = \check{H}^0(S,P) = \varinjlim_{R \in J(S)} \mathrm{Hom}(R,P). \tag{++}$$

根据构造, 有态射

$$\ell_P : P \longrightarrow LP, \qquad z_R : \mathrm{Hom}(R,P) \longrightarrow \mathrm{Hom}(S,LP).$$

引理 4.3.10.

(i) *对 S 的每个加细 R 以及每个 $u : R \to P$, 下图*

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_R(u)} \\ R & \xrightarrow{i_R} & S \end{array}$$

交换.

(ii) *对每个态射 $v : S \to LP$, 都存在 S 的一个加细 R 和一个态射 $u : R \to P$, 使得 $v = z_R(u)$.*

(iii) *设 Q 是一个函子, 且 $u, v : Q \to P$ 满足 $\ell_P u = \ell_P v$. 则二元组 (u,v) 的核是 Q 的一个加细.*

(iv) *设 $u : R \to P$ 和 $u' : R' \to P$. 等式 $z_R(u) = z_{R'}(u')$ 成立, 当且仅当存在 S 的一个加细 $R'' \subset R \cap R'$, 使 u 与 u' 在其上相同.*

[26] 编者注: 为便于后文引用, 增加了编号 4.3.10.0. 此外, 由定义可知, 若 $Q \to P$ 是单态射, 则 $LP \to LQ$ 也是单态射; 因此 L“保持单态射”(另见 4.3.16, 那里给出了 L“与有限逆极限可交换”这一更一般的陈述).

证明. 对于 (i), 须证明 $z_R(u)i_R = \ell_P u$. 只须将这两个态射与每个态射 $g : T \to R$ 复合后作比较, 其中 T 可表. 置 $f = i_R g$ 和 $R' = R \times_S T$. [27] 有图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ {\scriptstyle u}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle z_R(u)} \\ R & \xrightarrow{i_R} & S \\ {\scriptstyle p}\uparrow & \overset{g}{\nwarrow} & \uparrow{\scriptstyle f} \\ R' & \xrightarrow[\sim]{i_{R'}} & T. \end{array}$$

由 ℓ_P 的定义, $\ell_P u g = z_R(u) f$; 这是所述断言 在 i_R 为同构时的特例. 而 $z_R(u)f = z_R(u)i_R g$, 所以 (i) 得证.

断言 (ii) 和 (iv) 只是表达了 $\mathrm{Hom}(S, LP)$ 作为正向极限的 定义.

对于 (iii), 设 K 是 (u, v) 的核. 对每个态射 $f : S \to Q$, 其中 S 可表, $K \times_Q S$ 是 $uf, vf : S \to P$ 的核的一个子函子. 因此由 $T'0$, 只须在 $Q = S$ 可表时证明所述断言. 此时, 由 (ii) 和 (iv), K 包含 S 的一个加细, 因而它本身就是 S 的一个加细.

最后可验证, $P \mapsto LP$ 定义一个函子

$$L : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}},$$

且 $P \mapsto \ell_P$ 定义一个函子态射

$$\ell : \mathrm{Id}_{\widehat{\mathscr{C}}} \longrightarrow L.$$

现在陈述关键结果.

命题 4.3.11.

(i) *对每个预层 P, 预层 LP 是分离的, 且 $\ell_P : P \to LP$ 是覆盖态射（4.2.3）.*

(ii) *若 P 是一个层, 则 $P \to LP$ 是同构.*


(iii) *对每个预层 P 和每个分离预层（分别地, 层）F, 映射*

$$\mathrm{Hom}(\ell_P, F) : \mathrm{Hom}(LP, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, F)$$

为单射（分别地, 双射）.

(iv) *若 P 分离, 则 $\ell_P : P \to LP$ 是覆盖单态射（因而 P 是 LP 的一个加细）, 且 LP 是一个层.*

证明. (i) 首先, $P \to LP$ 是覆盖态射. 事实上, 对每个 $v : S \to LP$, 引理 4.3.10(i),(ii) 给出 S 的一个加细 R 和一个交换图（从 R 到纤维积的映射由 $v' : R \to P$ 与 $i_R : R \to S$ 诱导）



[27]编者注: 设 $p : R' \to R$ 是投影. 由于 i_R 是单态射, 有 $p = g i_{R'}$. 设 g' 是由 g 定义的 $i_{R'}$ 的截面. 则 $pg' = g$, 从而 $pg' i_{R'} = g i_{R'} = p$. 这蕴含 $g' i_{R'} = \mathrm{id}_{R'}$, 所以 $i_{R'} : R' \to T$ 是同构, 其逆为 g'.

所以 $P \times_{LP} S \to S$ 是覆盖态射. 由 (C 0), $P \to LP$ 是覆盖态射.

现假设两个态射 $v_1, v_2 : S \to LP$ 在 S 的某个加细 R 上诱导出同一态射. 存在加细 R_i, $i = 1, 2$, 以及态射 $u_i : R_i \to P$, 满足 $z_{R_i}(u_i) = v_i$. 将 R 换成更小的加细后, 可假设 $R_1 = R_2 = R$. 此时引理 4.3.10(i) 中的交换图给出 $\ell_P u_1 = \ell_P u_2$. 由 4.3.10(iii), u_1 与 u_2 在 R 的某个加细上相同, 因而在 S 的某个加细上相同; 由 4.3.10(iv), $z_R(u_1) = z_R(u_2)$. 所以 LP 分离.

(ii) 这是显然的: 若 P 是层, 则对 S 的每个加细 R, $\mathrm{Hom}(S, P) \to \mathrm{Hom}(R, P)$ 已经是同构.

(iii) 设 $u, v : LP \to F$ 满足 $u\ell_P = v\ell_P$. 要证明 $u = v$, 只须对每个 $f : S \to LP$, 其中 S 可表, 证明 $uf = vf$. 存在 S 的一个加细 R 和一个态射 $g : R \to P$, 使 $f = z_R(g)$. 态射 uf 与 vf 在 R 上相同, 两者在其上都等于 $u\ell_P g = v\ell_P g$. 若 F 分离, 则它们在 S 上相同, 这证明了单射性. 若 F 是层, 则交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ F & \xrightarrow{\sim} & LF \end{array}$$

表明 $\mathrm{Hom}(\ell_P, F)$ 也是满射.

(iv) 假设 P 分离. 要证明 $P \to LP$ 是单态射, 只须考虑 $u, v : S \to P$, 其中 S 可表, 且满足 $\ell_P u = \ell_P v$. 由 4.3.10(iii), u 与 v 在 S 的一个加细上相同, 因此由 P 的分离性, 它们相同. 所以 $P \to LP$ 是单态射; 又由 (i), 它是覆盖态射, 故 P 是 LP 的一个加细.

只须再证明 LP 是层. 由 (i), 已经知道它是分离的. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, R 是 S 的一个加细, $h : R \to LP$. 须求 $u : S \to LP$, 使 $ui_R = h$. 由于 P 是 LP 的一个加细, $R' = P \times_{LP} R$ 是 R 的一个加细, 从而也是 S 的一个加细. 置 $u = z_{R'}(h')$; 情形如下:

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow{\ell_P} & LP & & \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & & {\scriptstyle h}\uparrow & \nwarrow^{u} & \\ R' & \xrightarrow{j} & R & \xrightarrow{i_R} & S. \end{array}$$

这里斜箭头是 $u : S \to LP$. 有 $ui_{R'} = \ell_P h' = hj$, 从而 $ui_R j = hj$. 由于 R' 是 R 的一个加细, 且 LP 分离, 命题 4.3.2 给出 $ui_R = h$.

推论 4.3.12. [28] *设 F 是层, R 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中 F 的一个子对象. 则 R 是一个分离预层, $\ell_R : R \to LR$ 是覆盖单态射, 并且有交换图*

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{i} & F \\ & {\scriptstyle \ell_R}\searrow & {\scriptstyle j}\uparrow \\ & & LR. \end{array}$$

因此, R 是 F 的一个加细, 当且仅当 j 是同构.

我们已经指出, R 分离, 且 j 是单态射; 见编者注 (24) 和 (26). 由命题 4.3.11(iv), ℓ_R 是覆盖单态射. 所以, 若 j 是同构, 则 R 是 F 的一个加细. 反之, 若 i 是覆盖态射, 则 j 也是覆盖态射, 而命题 4.3.2.1 表明 j 是同构.

注 4.3.13. 若 $J'(S)$ 是 $J(S)$ 的一个共尾子集, 则

$$\mathrm{Hom}(S, LP) = \varinjlim_{R \in J'(S)} \mathrm{Hom}(R, P).$$

[28] 编者注: 本推论的陈述与证明作了展开.

特别地, 设 $S \mapsto R(S)$ 是生成给定拓扑的一个预拓扑. 函子 L 可用属于 $R(S)$ 的覆盖族描述. 将上述公式写开, 就得到 [MA] 中的构造.

设 $i : \widetilde{\mathscr{C}} \to \widehat{\mathscr{C}}$ 是包含函子. 命题 4.3.11 给出下述定理.

定理 4.3.14. *存在唯一的函子 $a : \widehat{\mathscr{C}} \to \widetilde{\mathscr{C}}$, 使下图*

$$\begin{array}{ccc} \widehat{\mathscr{C}} & \xrightarrow{L} & \widehat{\mathscr{C}} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L} \\ \widetilde{\mathscr{C}} & \xrightarrow{i} & \widehat{\mathscr{C}} \end{array}$$

交换; 也就是说, 对每个预层 P, $L(L(P))$ 都是层. 函子 i 与 a 互为伴随: 对每个预层 P 以及每个层 F, 存在一个关于 P 和 F 具函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(P, i(F)) \simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathscr{C}}}(a(P), F),$$

或简单地写为

$$\mathrm{Hom}(P, F) \simeq \mathrm{Hom}(a(P), F).$$

定义 4.3.15. *层 $a(P)$ 称为预层 P 的*伴随层.

注 4.3.16. 由于 L 通过逆极限与滤过正向极限构造而成, 它与有限逆极限可交换. [29]

此外, 在等同 $L(P \times P) = LP \times LP$ 下, 态射 $\ell_{P\times P}$ 与 $\ell_P \times \ell_P$ 等同. 因此, 例如当 P 是群预层时, LP 就典范地成为群预层, 且典范态射 $P \to LP$ 是群态射. 对函子 a, 也有同样结论. 所以, 若 P 是群预层, F 是群层, 就有同构

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(P, i(F)) \simeq \mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathscr{C}}\text{-gr.}}(a(P), F).$$

更多细节见 [D].

4.3.17. 设 $\mathscr{V}$ 是任意范畴. *一个取值于 $\mathscr{V}$ 的 $\mathscr{C}$ 上的预层*, 是指从 $\mathscr{C}$ 到 $\mathscr{V}$ 的反变函子. 在定义取值于 $\mathscr{V}$ 的层之前, 先回顾函子的逆极限的定义. 设 $\mathscr{R}$ 和 $\mathscr{V}$ 是范畴, 并设

$$F : \mathscr{R}^\circ \longrightarrow \mathscr{V}$$

是一个反变函子. 以 $\varprojlim F$ 表示 $\widehat{\mathscr{V}}$ 中由下式定义的对象:

$$\begin{aligned} (\varprojlim F)(X) &= \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{V}}}(X, \varprojlim F) \\ &= \varprojlim_{U \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{R}} \mathrm{Hom}_{\mathscr{V}}(F(U), X) \\ &= \mathrm{Hom}(c_X, F), \end{aligned}$$

其中 X 遍历 $\mathscr{V}$ 的对象, c_X 表示将每个对象映为 X、每个箭头映为 id_X 的从 $\mathscr{R}$ 到 $\mathscr{V}$ 的反变函子, 且最后一个 Hom 是在 $\mathrm{Hom}(\mathscr{R}^\circ, \mathscr{V})$ 中取的. 若 $\mathscr{R}$ 有终对象 $e_{\mathscr{R}}$, 则 $\varprojlim F = F(e_{\mathscr{R}})$. 若 $\mathscr{V} = \mathbf{Set}$, 函子 $\varprojlim$ 就与 Γ 等同.

设 S 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象, R 是 S 的一个筛. 以 $\overline{R}$ 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ 中对象集为 $E(R)$ 的全子范畴, 并设 $i_R : \overline{R} \to \mathscr{C}_{/S}$ 是典范函子. $\mathscr{C}$ 上取值于 $\mathscr{V}$ 的预层 P 限制为一个函子

$$P_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathscr{V}.$$

[29]编者注: 特别地, 若 K 是一对预层态射 $u, v : Q \rightrightarrows P$ 的核, 则 LK 是 $Lu, Lv : LQ \rightrightarrows LP$ 的核. 这一点将在 4.4.5 中用到.

函子 i_R 诱导 $\widehat{\mathscr{V}}$ 中的一个态射:

$$P(S) = P_S(S) = \varprojlim P_S \longrightarrow \varprojlim (P_S \circ i_R).$$

我们将 $\widehat{\mathscr{V}}$ 中后一个对象记为

$$\varprojlim_R P = \varprojlim (P_S \circ i_R)$$

. 由 4.1.6, 定义 4.3.1 推广如下.

定义 4.3.18. *$\mathscr{C}$ 上取值于 $\mathscr{V}$ 的预层 P 称为*分离的*（分别地, 称为一个层）, 如果对每个 $S \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ 以及每个 $R \in J(S)$, $\widehat{\mathscr{V}}$ 中的典范态射*

$$P(S) \longrightarrow \varprojlim_R P$$

是单态射（分别地, 同构）.

当 $\mathscr{V}$ 是群范畴 **Gr**（或其他任何由有限逆极限所定义的代数结构的集合所成的范畴）时, 下述概念等价（参见 [D]）: $\mathscr{C}$ 上取值于 **Gr** 且底集合预层为层的预层, 与集合层范畴中的群对象. 在作了这些等同之后, 对取值于具有由有限逆极限所定义的代数结构的集合所成范畴的层, 我们总将其视为在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中赋有相应代数结构的集合层.

4.4. 层范畴的正合性质

定理 4.4.1.

(i) *$\widetilde{\mathscr{C}}$ 中任意逆向极限均存在, 且"在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中计算"; 即包含函子*

$$i : \widetilde{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

与逆向极限可交换. 更明确地说, 若 (X_α) 是层的逆向系, 则预层

$$\varprojlim_\alpha i(X_\alpha) : S \longmapsto \varprojlim_\alpha X_\alpha(S)$$

是层, 且

$$i\left(\varprojlim_\alpha X_\alpha\right) = \varprojlim_\alpha i(X_\alpha).$$

(ii) *$\widetilde{\mathscr{C}}$ 中任意正向极限均存在. 若 (X_α) 是层的正向系, 则*

$$\varinjlim_\alpha X_\alpha = a\left(\varinjlim_\alpha i(X_\alpha)\right),$$

其中 $\varinjlim_\alpha i(X_\alpha)$ 是各 $i(X_\alpha)$ 的预层正向极限:

$$\varinjlim_\alpha i(X_\alpha) : S \longmapsto \varinjlim_\alpha X_\alpha(S).$$

(iii) *函子*

$$a : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widetilde{\mathscr{C}}$$

与任意正向极限及有限逆向极限可交换.

断言 (i) 和 (ii) 形式地由伴随公式 (4.3.14) 得到, 而[30] (iii) 的第一个断言由 (ii) 得到. (iii) 的第二个断言已在 4.3.16 中指出.

附论 4.4.2. *借助此定理, 可用下面的方法在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中证明同时涉及任意正向极限和有限逆向极限的陈述 (例如, "每个满态射都是普遍有效的"; 参见下文). 先在集合范畴中证明相应陈述, 再逐点推广到预层范畴. 然后利用前述定理, 从预层范畴过渡到层范畴. 下文会出现许多使用此方法的例子 (4.4.3, 4.4.6, 4.4.9 等).*

最后注意, 关于预层范畴的陈述, 形式上是相应的层范畴陈述的推论. 只需取最粗的 ("混沌") 拓扑, 即由

$$J(S) = \{S\} \qquad \text{对每个} S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C};$$

定义的拓扑; 对此拓扑, 每个函子都是层.

命题 4.4.3. *设 $\mathscr{F} = \{F_i \to F\}$ 是层的态射族. 下列条件等价:*

(i) *$\mathscr{F}$ 是满态射族;*

(ii) *$\mathscr{F}$ 是普遍有效满态射族 (1.13);*

(iii) *$\mathscr{F}$ 是覆盖族 (4.2.3);*

(iv) *$\mathscr{F}$ 的层像, 即 $\mathscr{F}$ 的预层像 (4.1.2) 的相伴层, 是 F.*

(iii) 与 (iv) 的等价性由 4.3.12 得到. 其余等价性将由下面几个引理得出.

引理 4.4.4. *设 $f : X \to Y$ 是层的单态射, 同时也是满态射. 则 f 是同构.*

在集合范畴中, 此引理首先是显然的. 接着在预层范畴中证明它. 考虑预层

$$V : S \longmapsto Y(S) \amalg_{X(S)} Y(S);$$

这是预层范畴中 Y 和 Y 沿 X 的融合和 (推出). [31] 设 $i_1, i_2 : Y \rightrightarrows V$ 是两个坐标态射. 若 $X \to Y$ 是预层范畴中的满态射, 则 $i_1 = i_2$. 此时对每个 S, 映射 $X(S) \to Y(S)$ 都是满射; 由于它也是单射, 故为双射, 因而 $X \to Y$ 是同构.

最后, 在层范畴 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中讨论. 由 4.4.1(ii), 层 Y 和 Y 沿 X 在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的融合和是预层 V 的相伴层 Z. 考虑图

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{i_2}{\overset{i_1}{\rightrightarrows}} V \xrightarrow{\tau} Z = a(V).$$

有 $i_1 f = i_2 f$, 因而 $\tau i_1 f = \tau i_2 f$, 所以 $\tau i_1 = \tau i_2$, 因为 f 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的满态射. 由下一个引理的 (iii) 项, 预层 V 分离, 因此 τ 是单态射 (4.3.11(iv)). 于是 $i_1 = i_2$, 而上面已见这蕴含 $f : X \to Y$ 是同构. 这就证明了引理 4.4.4, 只要再验证 V 分离即可.

用 $R_\varnothing$ 表示将每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 映到空集的预层; 它是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的始对象. [32]

引理 4.4.5.

(i) *假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 有 $R_\varnothing \notin J(S)$. 若 (X_i) 是一族分离预层, 则余积预层 $\coprod_i X_i$ 分离.* [33]

---

[30] 编者注: 这里修改了原文.

[31] 编者注: 证明的其余部分略有修改.

[32] 编者注: 引理 4.4.5 的 (i) 项已改正, 并详细给出了全部三项的证明.

[33] 编者注: 一般而言, 两个层 F, G 的余积不是层. 事实上, 设 $S_1, S_2 \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 假定余积 $S = S_1 \coprod S_2$ 在 $\mathscr{C}$ 中存在, 且纤维积 $S_1 \times_S S_2$ 是 $\mathscr{C}$ 的始对象 $\varnothing$ (参见 I, 1.8). 设 R 是 S 的以 $\{S_1, S_2\}$ 为基的筛. 则 $(F \coprod G)(R)$ 是 $F(S) \coprod G(S)$ 与各集合 $F(S_i) \times G(S_j)$ $(i \neq j)$ 的不交并; 因此 $F \coprod G$ 一般不是层. 另一方面, 设 $\mathscr{C}$ 是只有一个对象 S, 并且只有态射 id_S 的范畴, 赋予由 $J(S) = \{R_\varnothing, S\}$ 定义的拓扑. 则仅有的分离预层为 $R_\varnothing$ 和 $X = \mathbf{h}_S$ (后者是层), 而 $X \coprod X$ 不分离.

(ii) *考虑预层范畴中的一个等价关系*

$$X \overset{u}{\underset{v}{\rightrightarrows}} Y,$$

并设 $w : Y \to Z$ 是其商. 若 X 是层而 Y 分离, 则 Z 分离.

(iii) *考虑预层范畴中的一个融合和, 其中 u 和 u' 为单态射:*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & V. \end{array}$$

若 Y 和 Y' 分离, 而 X 是层, 则 V 分离.

证明. 对 (i), 置 $X = \coprod_i X_i$. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $\tau : R \hookrightarrow S$ 是 S 的加细, 且 $x_1, x_2 \in X(S)$ 满足 $x_1 \circ \tau = x_2 \circ \tau$. 有指标 i, j, 使得 $x_1 \in X_i(S)$ 和 $x_2 \in X_j(S)$. 由于 $R \neq R_\varnothing$, 存在态射 $\phi : T \to R$, 其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 则

$$x_1 \circ \tau \circ \phi = x_2 \circ \tau \circ \phi.$$

由于 $X(T)$ 是各 $X_k(T)$ 的不交并, 可知 $i = j$. 由于 X_i 分离且为 X 的子对象, 映射

$$X_i(S) \longrightarrow X_i(R) \longrightarrow X(R)$$

是单射. 所以 $x_1 = x_2$, 这就证明了 X 分离.

接着证明 (iii). 设 $i : Y \to V$ 和 $j : Y' \to V$ 为典范态射, 并设 K 是态射对

$$Y \times Y' \overset{p}{\underset{q}{\rightrightarrows}} V, \qquad p = i \circ \mathrm{pr}_1, \quad q = j \circ \mathrm{pr}_2\,.$$

的核. 对 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 利用单态射 u, u', 可将 $X(S)$ 与其在 $Y(S)$, 分别地, 在 $Y'(S)$ 中的像等同. 用 $Z(S)$, 分别地, $Z'(S)$ 表示补集. 则 $V(S)$ 与 $Z(S)$, $Z'(S)$ 和 $X(S)$ 的不交并等同. 立即可知

$$i(S) : Y(S) \longrightarrow V(S), \qquad j(S) : Y'(S) \longrightarrow V(S)$$

是单射, 且

$$(u \times u')(S) : X(S) \longrightarrow K(S)$$

是双射. 因此 i 和 j 是单态射, 而 $u \times u' : X \to K$ 是同构.

置 $U = Y \coprod Y'$. 对加细 $\tau : R \hookrightarrow S$, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} U(S) & \xrightarrow{U(\tau)} & U(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V(S) & \xrightarrow{V(\tau)} & V(R). \end{array}$$

设 $v_1, v_2 \in V(S)$ 在 $V(R)$ 中的像相同. 由 V 的定义, 它们可提升为元素 $y_1, y_2 \in U(S)$; 用 z_1, z_2 表示它们在 $U(R)$ 中的像. 则 z_1, z_2 在 $V(R)$ 中的像相同.

由于 $i : Y \to V$ 和 $j : Y' \to V$ 是单态射, 映射 $Y(R) \to V(R)$ 和 $Y'(R) \to V(R)$ 是单射. 于是, 由于 Y 和 Y' 分离, 若 y_1, y_2 都属于 $Y(S)$, 或都属于 $Y'(S)$, 则 $y_1 = y_2$. 否则可假设 $y_1 \in Y(S)$ 和 $y_2 \in Y'(S)$, 从而 $z_1 \in Y(R)$ 且 $z_2 \in Y'(R)$. 由于 $i \circ z_1 = j \circ z_2$, 态射

$$z_1 \boxtimes z_2 : R \longrightarrow Y \times Y'$$

经过 $K = X$ 分解. 此外, 由于 X 是层, 限制映射将 $X(S)$ 与 $X(R)$ 等同. 因此存在 $x \in X(S)$, 使得

$$u(x) \circ \tau = z_1 = y_1 \circ \tau, \qquad u'(x) \circ \tau = z_2 = y_2 \circ \tau.$$

由于 Y 和 Y' 分离, 有 $u(x)=y_1$ 和 $u'(x)=y_2$, 因而 $v_1=v_2$. 这就证明了 V 分离.

最后证明 (ii). 先注意, 预层态射

$$X \xrightarrow{u\boxtimes v} K,$$

是同构, 其中 K 是态射对

$$w\circ \mathrm{pr}_i : Y\times Y \rightrightarrows Z,$$

的核. 事实上, 对每个 $T\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $X(T)$ 是 $Y(T)$ 上的等价关系, 因而图

$$X(T) \xrightarrow{u\boxtimes v} Y(T)\times Y(T) \underset{w\circ \mathrm{pr}_2}{\overset{w\circ \mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} Z(T)$$

在集合范畴中正合.

现设 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, $g_1,g_2: S\to Z$ 是两个在加细 $\tau: R\hookrightarrow S$ 上相同的态射. 由 Z 的构造,

$$Z(S)=Y(S)/X(S),$$

故有态射 $f_1,f_2: S\to Y$, 使 $wf_i=g_i$. 有 $wf_1\tau=wf_2\tau$; 由前面的观察, 存在态射 $\phi: R\to X$, 使得

$$u\phi=f_1\tau, \qquad v\phi=f_2\tau.$$

由于 X 是层, 存在态射 $\psi: S\to X$, 使 $\phi=\psi\tau$. 因此在 $Y(R)$ 中,

$$u\psi\tau=f_1\tau, \qquad v\psi\tau=f_2\tau.$$

由于 Y 分离, $Y(S)\to Y(R)$ 是单射, 可知 $u\psi=f_1$ 且 $v\psi=f_2$, 从而 $g_1=g_2$. 因此 Z 分离.

引理 4.4.6. [34]

(i) *设 $\{F_i \xrightarrow{f_i} F\}$ 是预层的态射族, $G\subset F$ 是其预层像. 则 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的 下图正合:*

$$\left(\coprod_i F_i\right)\times_G \left(\coprod_j F_j\right) \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} \coprod_i F_i \longrightarrow G.$$

等价地, 对每个预层 H, 集合的 下图正合:

$$\mathrm{Hom}(G,H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i,H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i\times_G F_j, H). \tag{*}$$

(ii) *层的态射的每个覆盖族都是普遍有效满态射族.*

证明. 对 (i), 设 H 是预层. 映射

$$f^*: \mathrm{Hom}(G,H)\longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i,H), \qquad \phi\longmapsto (\phi\circ f_i)_i,$$

是单射. 事实上, 对每个 $S\in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 映射 $\phi(S)$ 由各映射 $(\phi\circ f_i)(S)$ 确定, 因为族

$$f_i(S): F_i(S)\longrightarrow G(S)$$

是满射族. 显然 f^* 的像包含在 $\ker(p,q)$ 中.

[34]编者注: 已详细给出此引理的陈述及其证明.

反过来, 设 $\phi_i : F_i \to H$ 是一个态射族, 使得对每个 i, j, 图

$$\begin{array}{ccc} F_i \times_G F_j & \longrightarrow & F_j \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_j} \\ F_i & \xrightarrow{\phi_i} & H \end{array}$$

交换. 则对每个 S, 映射

$$\coprod_i F_i(S) \longrightarrow H(S)$$

唯一地经过映射 $\phi(S) : G(S) \to H(S)$ 分解. 这些映射定义一个满足 $f^*(\phi) = (\phi_i)$ 的态射 $\phi : G \to H$. 这就证明了 $(*)$ 的正合性, 因而证明了 (i).

证明 (ii). 由于覆盖族在基变换下稳定, 只须证明每个覆盖族都是有效满态射族. 设 $\{F_i \to F\}$ 是层的态射的覆盖族, G 是其预层像. 由于此族是覆盖族, 单态射 $G \hookrightarrow F$ 也是覆盖态射; 因此由 4.3.12,

$$a(G) = F.$$

此外, 由于 $G \hookrightarrow F$ 是单态射, 纤维积 $F_i \times_G F_j$ 与 $F_i \times_F F_j$ 相同. 因此 (i) 项表明, 对每个预层 H, 图

$$\mathrm{Hom}(G, H) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}(F_i, H) \underset{q}{\overset{p}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} \mathrm{Hom}(F_i \times_F F_j, H) \qquad (**)$$

正合. 若再假设 H 是层, 则

$$\mathrm{Hom}(G, H) = \mathrm{Hom}(a(G), H) = \mathrm{Hom}(F, H).$$

于是 $(**)$ 表明 $\{F_i \to F\}$ 是层范畴 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的有效满态射族.

引理 4.4.7. *层的每个态射族 $\{F_i \to F\}$ 都分解为一个覆盖族 $\{F_i \to G\}$ 后接一个单态射 $G \to F$.*

事实上, 只须取 G 为所给族的层像.

命题 4.4.3 的证明. 已在 4.4.6 中看到, (iii) 蕴含 (ii), 而 (ii) 显然蕴含 (i). 最后, 设 $\{F_i \to F\}$ 是满态射族. 由引理 4.4.7, 它分解为一个覆盖族后接一个单态射. 后一个单态射被一个满态射族支配, [35] 因此它本身也是满态射; 因而由 4.4.4, 它是同构.

注 4.4.8. [36] 由于族 $\mathscr{F} = \{F_i \to F\}$ 的预层像分离, 由相伴层的构造可知, 命题 4.4.3 中的条件还与下列条件等价:

(v) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 每个 $f \in F(S)$ 局部地属于 $\mathscr{F}$ 的像; 即,

(vi) 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和每个 $f \in F(S)$, 使 f 在 $F(S')$ 中的像属于某个 $F_i(S')$ 的像的态射 $S' \to S$ 所成的集合, 是 S 的加细;

(vii) 若拓扑由一个预拓扑 $S \mapsto \mathscr{R}(S)$ 定义, 则对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 和每个 $f \in F(S)$, 存在族 $\{S_j \to S\} \in \mathscr{R}(S)$, 使得对每个 j, f 在 $F(S_j)$ 中的像 f_j 属于某个 $F_i(S_j)$ 的像.

注 4.4.8 bis. 若层 F 可表, 则前述条件还等价于:

(viii) 所有满足下述条件的态射 $T \to F$ (其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$) 所成的集合是 F 的加细: 存在一个 i 及一个交换图

$$\begin{array}{ccc} & & F_i \\ & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & F \end{array}$$

[35] 编者注: 回忆 (参见编者注 17), 若态射族 $F_i \to H$ 经过态射 $g : G \to H$ 分解, 则称 g *被此族支配*.

[36] 编者注: 原文有两段都编号为 4.4.7, 现已改正编号, 以与后文引用相符.

事实上, 若 (viii) 成立, 则各 F_i 的预层像被 F 的一个加细支配, [37] 这蕴含此族为覆盖族. 反过来, 对 $\mathrm{id}_F \in F(F)$ 应用 (vi) 即可.

形象地说, 此条件意味着: *在 F 上局部地, 存在一个 i, 使 $F_i \to F$ 有截面.* 特别地, 若态射

$$G \longrightarrow F,$$

中 G 是层, F 是可表层, 则此态射是覆盖态射, 当且仅当它在 F 上局部地有截面.

下面的引理将在 $\mathrm{VI_B}$, 8.1 和 8.2 中用到. [38]

引理 4.4.8.1. *设 $Q \subset P$ 是 $\mathscr{C}$ 上的群预层, 且 Q 在 P 中正规. 假设 P 分离而 Q 是层. 则群预层 P/Q 分离. 因此,*

$$a(P/Q) = L(P/Q) = \varinjlim_{R \in J(S)} (P/Q)(R).$$

只须证明第一个断言, 因为第二个断言由它及 4.3.11(iv) 和 (ii) 得到. 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, R 是 S 的筛, $y \in P(S)/Q(S)$ 在 $(P/Q)(R)$ 中的像为单位元. 须证 $y = 1$.

由假设, 态射 $P(S) \to P(R)$ 是单射, 而 $Q(S) \to Q(R)$ 是同构, 并且下列交换图的上行正合:

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & Q(S) & \longrightarrow & P(S) & \longrightarrow & P(S)/Q(S) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & Q(R) & \longrightarrow & P(R) & \longrightarrow & (P/Q)(R). & & \end{array}$$

若下行正合, 就得到所求结果. 设 $f : R \to P$ 在 $(P/Q)(R)$ 中的像为单位元, 并取 $\phi : T \to R$, 其中 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 则 $f \circ \phi$ 在

$$(P/Q)(T) = P(T)/Q(T),$$

中为单位元, 即 $f \circ \phi \in Q(T)$. 因此 $\phi \mapsto f \circ \phi$ 是函子性的映射 $R(T) \to Q(T)$, 从而定义了一个函子态射 $\pi : R \to Q$, 使 $\pi(\mathrm{id}_R) = f$. 于是 $f \in Q(R)$. 这证明了下行的正合性, 从而证明了此引理.

引理 4.4.8.2. *设 $H \subset G$ 是 $\mathscr{C}$ 上的群预层.*

(i) *若 H 在 G 中正规, 则 $L(H)$ 在 $L(G)$ 中正规.*

(ii) *若 H 位于 G 的中心, 则 $L(H)$ 位于 $L(G)$ 的中心.*

设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 须证 (参见 I 2.3.6) $L(H)(S)$ 在 $L(G)(S)$ 中正规, 分别地, 位于其中心. 取

$$h \in L(H)(S), \qquad g \in L(G)(S).$$

存在 S 的一个筛 R 及元素 $h' \in H(R)$, $g' \in G(R)$, 使得按 4.3.10 的记号有

$$h = z_R(h'), \qquad g = z_R(g')$$

由于 z_R 是群态射,

$$ghg^{-1}h^{-1} = z_R(g'h'g'^{-1}h'^{-1}).$$

在情形 (i) 中,

$$g'h'g'^{-1}h'^{-1} \in H(R),$$

因而 $ghg^{-1}h^{-1} \in L(H)(S)$. 在情形 (ii) 中, $g'h'g'^{-1}h'^{-1} = 1$, 从而 $ghg^{-1}h^{-1} = 1$.

[37] 编者注: "包含" 已改为 "被支配"; 参见编者注 17.

[38] 编者注: 引理 4.4.8.1 和 4.4.8.2 是新增的.

命题 4.4.9. *$\widetilde{\mathscr{C}}$ 中每个等价关系都是普遍有效的 (3.3.3). 更确切地说, 设 R 是层 X 上的一个 $\widetilde{\mathscr{C}}$-等价关系. 则分离预层*

$$i(X)/i(R) : S \longmapsto X(S)/R(S)$$

的相伴层是 X 关于 R 的普遍有效商.

用 X/R 表示 X 关于 R 的层商, 由 4.4.1(ii), 它存在:

$$X/R = a(i(X)/i(R)).$$

须证 $X \to X/R$ 是普遍有效满态射, 且态射

$$f : R \longrightarrow X \times_{X/R} X$$

是同构. 第一个断言已在 4.4.3 中证明. 至于 f, 它由对态射

$$i(R) \longrightarrow i(X) \times_{i(X/R)} i(X),$$

施以函子 a 得到; 或者, 由于由 4.4.5(ii) 可知 $i(X)/i(R)$ 分离, 从而

$$i(X)/i(R) \longrightarrow i(X/R)$$

是单态射, 它由对典范态射

$$i(R) \longrightarrow i(X) \times_{i(X)/i(R)} i(X).$$

施以该函子得到. 因此归结为在预层范畴中证明同一陈述. 而 $i(X)/i(R)$ 是预层

$$S \longmapsto X(S)/R(S),$$

故此断言归结为其集合论的对应陈述, 后者是直接的.

命题 4.4.10. *在 4.4.9 的假设下, 设 Y 是 X 的子层, 用 R_Y 表示 R 在 Y 上诱导的等价关系. 则典范态射 (3.1.6)*

$$Y/R_Y \longrightarrow X/R$$

是单态射. 它将 Y/R_Y 与 X/R 的一个子层等同, 即复合

$$Y \longrightarrow X \longrightarrow X/R.$$

的层像.

预层态射

$$i(Y)/i(R_Y) = i(Y)/i(R)_{i(Y)} \longrightarrow i(X)/i(R)$$

是单态射. 由于函子 a 左正合 (4.3.16), 它将单态射映成单态射; 因而

$$Y/R_Y \longrightarrow X/R$$

是单态射. 最后一个断言由交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y/R_Y & \longrightarrow & X/R \end{array}$$

及 $Y \to Y/R_Y$ 是覆盖态射这一事实得到.

鉴于此命题, 今后总将 Y/R_Y 与 X/R 的一个子层等同.

命题 4.4.11. *设 R 是层 X 上的一个 $\widetilde{\mathscr{C}}$-等价关系. 对 X 的每个在 R 下稳定的子层 Y, 令 $Y' = Y/R_Y$, 并将它看成 $X' = X/R$ 的子层. 则*

$$Y = Y' \times_{X'} X,$$

且映射

$$Y \longmapsto Y/R_Y, \qquad Y' \longmapsto Y' \times_{X'} X$$

定义了 X 的在 R 下稳定的子层 Y 与 X' 的子层 Y' 之间的一一对应.

若 Y' 是 X' 的子层, 则 $Y' \times_{X'} X$ 是 X 的在 R 下稳定的子层. [39] 若 Y' 是由 X 的某个子层 Y 取商得到的, 则 Y 是 $Y' \times_{X'} X$ 的子对象. 因此只须证明: 若 Y 和 Y_1 是 X 的两个在 R 下稳定的子层, Y_1 包含 Y, 且它们的商 Y/R_Y 与 Y_1/R_{Y_1} 相同, 则 $Y = Y_1$.

显然可归结为 $Y_1 = X$ 的情形. 用

$$P = i(X)/i(R), \qquad Q = i(Y)/i(R_Y)$$

表示相应预层. 图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & P \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & Q \end{array}$$

是笛卡尔图. 另一方面, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} Q & \longrightarrow & a(Q) \\ \downarrow & & \downarrow\sim \\ P & \longrightarrow & a(P). \end{array}$$

由于由 4.3.11 可知 $Q \hookrightarrow a(Q)$ 是覆盖态射, 单态射 $Q \hookrightarrow P$ 也是覆盖态射, 故 Q 是 P 的加细. 作基变换后, Y 是 X 的加细. 由于 X 和 Y 都是层, 4.3.12 于是给出 $Y = X$.

4.4.12. 特别地, 若 Y 是 X 的子层, 且 $Y' = Y/R_Y$, 则前述对应定义了 X 的一个子层 $\overline{Y}$, 它在 R 下稳定, 包含 Y, 并且在具有这些性质的子层中最小. 称它为 Y 关于等价关系 R 的*饱和化 (saturation).*

4.5. 比典范拓扑更粗的拓扑的情形

由 4.3.6 和 4.3.8, 关于 $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑 $\mathcal{T}$ 的以下条件等价:

(i) $\mathcal{T}$ 比 $\mathscr{C}$ 的典范拓扑更粗;

(ii) 每个可表预层都是关于 $\mathcal{T}$ 的层;

(iii) 每个关于 $\mathcal{T}$ 的覆盖筛都具有普遍有效满态射性.

若 $\mathcal{T}$ 由一个预拓扑 $S \mapsto \mathscr{R}(S)$ 定义, 则这些条件还等价于:

(iv) 属于 $\mathscr{R}(S)$ 的每个族都是普遍有效满态射族.

当这些条件成立时, 典范函子 $\mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$ 通过一个函子

$$j_{\mathscr{C}} = j : \mathscr{C} \longrightarrow \widetilde{\mathscr{C}};$$

分解; 也记 $j(S) = \widetilde{S}$.[40]

[39] 编者注: 此外, $(Y' \times_{X'} X)/R = Y'$.

[40] 编者注: 还将记 $\mathbf{h}_S = \widehat{S}$; 参见 4.5.4 中的第一个交换图.

命题 4.5.1. *函子 $j : \mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ 是全忠实的, 且与任意逆极限可交换. 特别地, 它左正合, 因而保持由有限逆极限定义的代数结构.*

这立即由交换的分解图

$$\begin{array}{ccc} & \mathscr{C} & \\ {\scriptstyle j}\swarrow & & \searrow \\ \widetilde{\mathscr{C}} & \xrightarrow{\ i\ } & \hat{\mathscr{C}} \end{array}$$

及 4.4.1(i) 得到.

在给出 j 的更多性质之前, 必须先定义范畴 $\mathscr{C}/S$ 上的诱导拓扑. 此处不再假设给定的拓扑必定比典范拓扑更粗. $\mathscr{C}$ 中对象 T 的一个筛, 连同一个态射 $T \to S$, 自然地定义了 $\mathscr{C}/S$ 中 T 的一个筛, 因为 T 的筛的定义 只依赖于范畴

$$\mathscr{C}/T = (\mathscr{C}/S)/T.$$

例如, 若这个筛由一个族 $\{T_i \to T\}$ 定义, 则它在 $\mathscr{C}/S$ 中的像由同一个族定义, 只是现在将此族视为 $\mathscr{C}/S$ 中的态射族.

规定覆盖筛的这些像为覆盖筛, 便在 $\mathscr{C}/S$ 上定义了一个拓扑, 称为给定拓扑的*诱导拓扑 (induced topology)*. 用 [AS], 2.3 的术语来说, 这是 $\mathscr{C}/S$ 上使典范函子

$$i_S : \mathscr{C}/S \longrightarrow \mathscr{C}$$

成为余态射的最粗拓扑.[41] 按定义, 等同

$$(\mathscr{C}/S)/T = \mathscr{C}/T$$

保持这些拓扑.

命题 4.5.2. *设 S 是 $\mathscr{C}$ 上的一个可表层, $F \to S$ 是 $\hat{\mathscr{C}}$ 中的态射. $\mathscr{C}/S$ 上的预层*

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_S(S', F)$$

是分离的 (分别地, 是层), 当且仅当 F 是 $\mathscr{C}$ 上的分离预层 (分别地, 层).

对每个函子 P, 有 (I, 1.4.1)

$$\mathrm{Hom}(P, F) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(P,S)} \mathrm{Hom}_f(P, F).$$

[42] 设 $S' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\eta : C' \to S'$ 是一个覆盖筛. 由于 S 是层, 映射 $f \mapsto f \circ \eta$ 是双射

$$\mathrm{Hom}(S', S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(C', S).$$

所以映射

$$\mathrm{Hom}_{\hat{\mathscr{C}}}(S', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\hat{\mathscr{C}}}(C', F)$$

分解为映射

$$\mathrm{Hom}_f(S', F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{f\circ\eta}(C', F).$$

的 "不交并". 由此即得此命题.

推论 4.5.3. *若 $\mathscr{C}$ 上的拓扑比典范拓扑更粗, 则它在 $\mathscr{C}/S$ 上诱导的拓扑, 比 $\mathscr{C}/S$ 的典范拓扑更粗.*

---

[41] 编者注: 即对 $\mathscr{C}/S$ 的每个对象 $T \to S$, $i_S(T \to S) = T$ 的每个覆盖筛 R', 视为对象 $(T \to S) \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}/S)$ 的筛时仍为覆盖筛.

[42] 编者注: 下文扩充了原文中隐含的论证.

推论 4.5.4. *假设 $\mathscr{C}$ 上给定的拓扑比典范拓扑更粗. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 都有范畴等价*

$$\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathscr{C}/S}.$$

下列各图在同构意义下交换; 图中每个未标记的箭头都是等价:

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathscr{C}_{/S} & \xrightarrow{(j_{\mathscr{C}})_{/S}} & \widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} & \xrightarrow{(i_{\mathscr{C}})_{/\widetilde{S}}} & \widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{(a_{\mathscr{C}})_{/\widehat{S}}} & \widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \\
\| & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\
\mathscr{C}_{/S} & \xrightarrow{j_{\mathscr{C}/S}} & \widetilde{\mathscr{C}/S} & \xrightarrow{i_{\mathscr{C}/S}} & \widehat{\mathscr{C}/S} & \xrightarrow{a_{\mathscr{C}/S}} & \widetilde{\mathscr{C}/S}.
\end{array}$$

若 $T \to S$ 是 $\mathscr{C}/S$ 的一个对象, 则还有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
(\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}})_{/\widetilde{T}} & \longrightarrow & (\widetilde{\mathscr{C}/S})_{/\widetilde{T}} & & \\
\downarrow\wr & & & \searrow & (\widetilde{\mathscr{C}/S})_{/T}. \\
\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{T}} & \longrightarrow & \widetilde{\mathscr{C}/T} & \overset{\sim}{\nearrow} &
\end{array}$$

前两个方块的交换性, 由等价 $\widetilde{\mathscr{C}}_{/\widetilde{S}} \to \widetilde{\mathscr{C}/S}$ 的定义得到. 要证明最后一个方块的交换性, 只需注意下列方块交换:

$$\begin{array}{ccc}
\widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} & \xrightarrow{L'} & \widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\widehat{\mathscr{C}/S} & \xrightarrow{L''} & \widehat{\mathscr{C}/S}.
\end{array}$$

这里, L' 是函子 $L_{\mathscr{C}}$ 在 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\widehat{S}}$ 上的限制, 而 L'' 是函子 $L_{\mathscr{C}/S}$. 回到 4.3.9 之后给出的函子 L 的定义, 立即可以看出这一点. 第二个图只是预层范畴的相应交换图 (第 I 篇, 第 1 号) 在层范畴上的限制.

附论 4.5.5. 以上断言表明, 当给定的拓扑比典范拓扑更粗时, 可以将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 的一个全子范畴, 后者本身又是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个全子范畴. 在这些等同下, 可以对 $\mathscr{C} \to \widehat{\mathscr{C}}$ 作通常的语言滥用, 以上交换图保证了这些用法的合理性. 特别地, 4.5.4 的第一个图表明, 使用函子 a 时无需特别留意.

下一小节将说明, 将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 的全子范畴与某些正向极限的构造可交换, 这有别于将其等同于 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的全子范畴的情形; 随后将说明如何运用这一事实.

从现在起, 除非明确另作声明, 都假设给定的拓扑比典范拓扑更粗, 并系统地作上述等同.

命题 4.5.6. *设 F 和 G 是 S 上的两个层, $f : F \to G$ 是一个 S-态射. 关于 f 的以下条件等价:*

(i) *f 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构);*

(ii) *f 是 $\widetilde{\mathscr{C}}_{/S} = \widetilde{\mathscr{C}/S}$ 中的单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构).*

对单态射与同构, 这是直接的, 因为所讨论的是关于预层的问题. 对满态射, 结论由将满态射描述为覆盖态射的结果 (4.4.3) 得到, 因为按诱导拓扑的定义, 覆盖态射在 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中与在 $\widetilde{\mathscr{C}/S}$ 中是相同的.

命题 4.5.7. *设 $f : F \to G$ 是一个层态射. 以下条件等价:*

(i) *f 是单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构);*

(ii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 态射 $f_S : F_S \to G_S$ 局部为单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构), 即:*

(iii) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 使 $F_T \to G_T$ 为单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构) 的那些态射 $T \to S$ 所成的集合, 是 S 的一个加细.*

若给定的拓扑由预拓扑 $\mathscr{R}$ 定义, 则这些条件还等价于:

(iv) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\} \in \mathscr{R}(S)$, 使得对每个 i, $F_{S_i} \to G_{S_i}$ 都是单态射 (分别地, 满态射; 分别地, 同构).*

若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则在条件 (ii), (iii) 和 (iv) 中只需取 $S = e$.

显然, (ii), (iii) 和 (iv) 等价. 要证明 (i) 与 (ii) 等价, 以及关于终对象的断言, 只需证明 (ii) 蕴含 (i), 且所讨论的性质在基变换下稳定. 先证明后一事实. 对单态射与同构, 这是直接的, 因为所讨论的是关于预层的问题. 对满态射, 则由每个层满态射都是普遍的这一事实得到 (4.4.3).

还需证明 (ii) 蕴含 (i). 先假设 $f_S : F_S \to G_S$ 局部为单态射 (分别地, 同构). 此时存在 S 的一个覆盖筛 C, 使得对属于 C 的每个 $T \to S$, f_T 都是单态射 (分别地, 同构). 由于单态射 (分别地, 同构) 的逆极限仍是单态射 (分别地, 同构), $\mathrm{Hom}(C, f)$ 是单态射 (分别地, 同构); 见 4.1.4. 所以交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(C,F) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}(C,f)} & \mathrm{Hom}(C,G) \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ F(S) & \xrightarrow{f(S)} & G(S) \end{array}$$

表明 $f(S)$ 是单射 (分别地, 双射).

最后, 假设 $f : F \to G$ 局部为满态射, 设 $H \subset G$ 是它的像. 对每个 $S \to G$, 层 $H \times_G S$ 是

$$f \times_G S : F \times_G S \longrightarrow S.$$

的像. 要证明 f 是满态射, 只需证明 H 是 G 的一个加细, 或等价地, 对每个 S, $H \times_G S$ 是 S 的一个加细. 但由于 $f \times_G S$ 局部为覆盖态射, 这一点在沿属于 S 的一个加细的每个 $T \to S$ 作基变换后成立. 所以, 由公理 (T 2), $H \times_G S$ 本身就是 S 的一个加细.

推论 4.5.8. *设 F 与 G 是 S 上的两个层, $f : F \to G$ 是一个 S-态射. 则 f 是单态射, 分别地, 满态射, 分别地, 同构, 当且仅当它在 S 上局部具有相应性质.*

注 4.5.9. 此命题 的证明表明, 其关于单态射 (分别地, 同构) 的断言, 即使只假设 F 是一个分离预层 (分别地, 层), 而 G 是任意预层 (分别地, 分离预层), 也仍成立.

暂时回到任意拓扑的情形, 并作如下定义.

定义 4.5.10. *设 $G \to F$ 是 $\hat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射. 若对每个 F-函子 H 及 H 的每个加细 R, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}_F(H, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_F(R, G) \qquad (+)$$

是双射, 则称 G 是 F 上的相对层 (relative sheaf).

命题 4.5.2 立即给出以下推广.

命题 4.5.11. *若 F 是层, 则 G 是 F 上的相对层, 当且仅当 G 是层.*

引理 4.5.12. *在一个序列*

$$X \longrightarrow T \longrightarrow S,$$

中, X, T, S 是 $\hat{\mathscr{C}}$ 的三个对象. 假设 X 是 T 上的相对层. 则

$$U = \prod_{T/S} X$$

是 S 上的相对层.

事实上, 对每个 S-函子 Y, 有

$$\mathrm{Hom}_S(Y,U) = \mathrm{Hom}_T(T\times_S Y, X).$$

若 C 是 Y 的一个筛, 则 $T\times_S C$ 是 $T\times_S Y$ 的一个筛, 立即得到结论.

推论 4.5.13. *只要出现在其中的所有变元都是层, 预层* $\mathrm{Hom}_{T/S}(X,Y)$, $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ *及类似的预层就都是层.*

事实上, 所有这些预层都是用纤维积及预层 $\prod_{T/S}X$ 构造的 (I, 1.7 和 II, 1). 所以只需对预层 $\prod_{T/S}X$ 验证此断言; 在此情形中, 它由 4.5.11 和 4.5.12 得到.

4.6. 层关于等价关系的商的描述

回顾假设, 给定的拓扑 $\mathcal{T}$ 比典范拓扑更粗.

命题 4.6.1. *设* $R \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} X$ *是层* X *中的一个* $\widetilde{\mathscr{C}}$*-等价关系. 如下定义* $F\in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$*: 对每个* $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,[43]

$$F(S) = \left\{ \begin{array}{l} S\text{-层 } Z\text{, 为 } X_S \text{ 的子层且在 } R\times S \text{ 下稳定,} \\ \text{其关于 } R_Z \text{ 的商为 } S\text{, 即 } R_Z \rightrightarrows Z \to S \text{ 正合} \end{array} \right\}.$$

对每个层 Y, $\mathrm{Hom}(Y,F)$ *自然地等同于集合*

$$\left\{ \begin{array}{l} Y\text{-层, 为 } X\times Y \text{ 的子层且在 } R\times Y \text{ 下稳定,} \\ \text{且其商为 } Y \end{array} \right\}.$$

特别地, 子层 $R\subset X\times X$ *对应于一个元素* $p\in\mathrm{Hom}(X,F)$*, 且正合图*

$$R \overset{p_1}{\underset{p_2}{\rightrightarrows}} X \overset{p}{\to} F$$

将 F *等同于层商* X/R.

事实上, 置 $Q = X/R$. 对每个层 Y 及每个态射 $f\in\mathrm{Hom}(Y,Q)$, 它对应于一个截面 $s: Y\hookrightarrow Q\times Y$, 考虑图

$$\begin{array}{ccccc} R\times Y & \rightrightarrows & X\times Y & \longrightarrow & Q\times Y \\ & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ & & Z & \longrightarrow & Y, \end{array} \qquad (*)$$

其中右方块是笛卡尔方块. 由 4.4.11, 立即可见 Z 是 $X\times Y$ 的一个子 Y-层, 在 $R\times Y$ 下稳定, 且商为 Y. 反之, 每个这样的 Z 都来自 $Q\times Y$ 在 Y 上的唯一截面. 先取 Y 为可表层, 得到同构 $Q\simeq F$; 再取任意 Y, 便得到所断言的 $\mathrm{Hom}(Y,F)$ 的描述. 最后, 典范态射 $X\to Q$ 对应于子 X-层 $R\subset X\times X$, 证明完成.

推论 4.6.2. *设* G *是* F *的任意子函子, 使得* $\mathrm{Hom}(X,G)\subset\mathrm{Hom}(X,F)$ *包含* R*. 则典范态射* $p: X\to F$ *通过* G *分解.*

由于 p 是覆盖态射 (4.4.9 和 4.4.3), G 是 F 的一个加细. 特别地, F 的每个满足上述条件 的子层 G 都等于 F (4.3.12).

4.6.3. 现在考虑 X 与 R 可表的情形. 先引入一些术语. 除 3.4.1 中引入的条件 (a)–(d) 外, 还将使用关于 $\mathscr{C}$ 的态射族 (M) 的下列条件; 为完整起见, 重述条件 (a)–(c):

[43]编者注: $R\times S$ 表示 $X\times S$ 中由 $R\times S_{\mathrm{diag}}\subset X\times X\times S\times S$ 定义的等价关系, 而 R_Z 表示它在 Z 上诱导的等价关系 (参见 3.1.6).

(a) (M) 在基变换下稳定.

(b) (M) 的两个元素的复合属于 (M).

(c) 每个同构都属于 (M).

$(d_{\mathcal{T}})$ (M) 的每个元素都是覆盖态射. [44]

$(e_{\mathcal{T}})$ 设 $f : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}$ 的一个态射. 若存在 Y 的一个加细 R, 使得对每个 $Y' \to R$, 态射 $X \times_Y Y' \to Y'$ 都属于 (M), 则 f 属于 (M).

条件 (a) 和 (b) 蕴含

(a') (M) 的两个元素的纤维积属于 (M).

另一方面, 由 4.3.9, 条件 (a) 和 $(d_{\mathcal{T}})$ 蕴含

(d') (M) 的每个元素都是普遍有效满态射.

4.6.4. 当 $\mathscr{C}$ 有纤维积时, 记作 $(M_{\mathcal{T}})$ 的覆盖态射族满足上述条件. 事实上 (参见 4.2.3), (a) 由 (C 1) 得到, (b) 由 (C 2) 得到, (c) 由 (C 4) 得到, $(d_{\mathcal{T}})$ 由 定义 得到, 而 $(e_{\mathcal{T}})$ 由 (C 5) 得到. 所以, 下文对满足这些条件的族所建立的结果, 特别适用于 $(M_{\mathcal{T}})$. 特别地, 可以取 $\mathcal{T}$ 为典范拓扑, 取 (M) 为普遍有效满态射族.

引理 4.6.5. *设 (M) 是满足上述条件 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$ 的一个态射族. 设 R 是 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 中一个 (M) 型的 $\mathscr{C}$-等价关系. 以 $\widetilde{X}$ 表示 X 定义的层, 以 $\widetilde{R}$ 表示 R 定义的 $\widetilde{X}$ 中的 $\widetilde{\mathscr{C}}$-等价关系, 并以 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 表示层商. 则 R 是 (M)-有效的, 当且仅当 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 可表. 这些条件成立时, $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 由商 X/R 表出.*

先假设 R 是 (M)-有效的, 并置 $Y = X/R$. 典范态射 $p : X \to Y$ 属于 (M), 所以由 $(d_{\mathcal{T}})$, 它是覆盖态射. 因此相应的态射

$$\widetilde{p} : \widetilde{X} \longrightarrow \widetilde{X}/\widetilde{R}$$

是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的普遍有效满态射 (4.4.3). 所以它将 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 等同于 $\widetilde{X}$ 关于 $\widetilde{p}$ 定义的等价关系 R' 的商. 由于典范函子 $\mathscr{C} \to \widetilde{\mathscr{C}}$ 与纤维积可交换, 且 R 是 p 定义的等价关系, R' 恰好就是 $\widetilde{R}$.

反之, 假设 $\widetilde{X}/\widetilde{R}$ 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象 Y 表出. 设 $p : X \to Y$ 是由典范态射 $\widetilde{X} \to \widetilde{X}/\widetilde{R}$ 得到的态射; 由 4.4.3, 它是覆盖态射. 如前, R 显然是 p 定义的等价关系. 只需再证明 $p \in (M)$. 笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\sim} & X \times_Y X & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle p_2}\searrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ & & X & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

表明, 在沿覆盖态射 p 作基变换后, 态射 p 变为属于 (M) 的 p_2. 由 $(e_{\mathcal{T}})$ 即得此断言.

推论 4.6.5.1. [45] *设 (M) 满足上述条件 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$, $f : G \to G'$ 是一个满足 $f \in (M)$ 的 $\mathscr{C}$-群态射. 假设 $\mathrm{Ker}(f)$ 可表 (当 $\mathscr{C}$ 有终对象 e 时即为如此). 则由 $H = \mathrm{Ker}(f)$ 定义的 G 中的等价关系是 (M)-有效的, 且 G' 表出关于拓扑 $\mathcal{T}$ 的层商 $\widetilde{G}/\widetilde{H}$.*

这由 4.6.5 和 3.4.7.1 得到.

现在可以陈述本小节的主要结果.

定理 4.6.6. *设 (M) 是满足 4.6.3 中公理 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$ 的一个态射族. 设 R 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象 X 中的 (M) 型 $\mathscr{C}$-等价关系 (参见 3.4.3). 考虑由下式定义的函子 $F \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$:*

$$F(S) = \left\{ \begin{array}{l} S\text{-层 } Z, \text{为 } X_S \text{ 的子层且在 } R \times S \text{ 下稳定,} \\ \text{其关于 } R_Z \text{ 的商为 } S \end{array} \right\}.$$

[44]编者注: $\mathcal{T}$ 表示 $\mathscr{C}$ 上给定的拓扑, 它比典范拓扑更粗.

[45]编者注: 本推论 为新增内容.

设 F_0 是如下定义的 F 的子函子: $F_0(S)$ 由可表的 $Z \in F(S)$ 组成, 即

$$F_0(S) = \left\{ \begin{array}{l} \mathscr{C}/S\text{-对象 } Z\text{, 为 } X_S \text{ 的子对象且在 } R \times S \text{ 下稳定, 并满足} \\ R_Z \text{ 是 } (M)\text{-有效的且商为 } S\text{, 即满足} \\ Z \to S \text{ 属于 } (M)\text{, 且 } R_Z \simeq Z \times_S Z \end{array} \right\}.$$

则:

(i) *由子对象 $R \subset X \times X$ 定义的态射 $p \in \mathrm{Hom}(X, F) = F(X)$, 将 F 等同于 X 关于 R 的层商.*

(ii) *以下条件等价:*

  (a) *F 可表;*

  (b) *F_0 可表;*

  (c) *R 是 (M)-有效的.*

  在这些条件下, $F = F_0 = X/R$.

(iii) *设 (N) 是一个在基变换下稳定的态射族, 使得对每个覆盖族 $\{S_i \to S\}$ 及每个属于 (N) 的态射族 $\{T_i \to S_i\}$, T_i 上关于 $\{S_i \to S\}$ 的每个下降数据都有效. 假设 X 可平方 (参见 1.6.0), 且 $R \to X \times X$ 属于 (N). 则 $F_0 = F$.*

证明. 断言 (i) 已在 4.6.1 中证明.

对于 (ii), 已经证明 (a) 与 (c) 等价, 以及等式 $F = X/R$. 还需证明, (b) 或 (c) 都蕴含 $F_0 = F$. 首先注意, 如定理 中所述, F_0 确实是 F 的一个子函子: 若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 且 $Z \in F_0(S)$, 则 $Z \to S$ 可平方, 所以对每个 $S' \to S$, 有 $Z \times_S S' \in F_0(S')$. 由于 $R \in F(X)$ 属于 $F_0(X)$, 由推论 4.6.2 可知, (b) 蕴含 $F_0 = F$.

现在假设 (c) 成立, 设 Q 是 $\mathscr{C}$ 中表出 X/R 的一个对象. 则 $X \to Q$ 属于 (M). 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及每个 $Z \in F(S)$, 4.6.1 中的图 $(*)$ 给出

$$Z = S \times_{Q \times S} (X \times S).$$

所以 Z 可表, 且 $Z \to S$ 属于 (M), 因而 $Z \in F_0(S)$.

对于 (iii), 设 $f \in \mathrm{Hom}(S, F)$ 对应于 $Z \in F(S)$. 必须证明 f 通过 F_0 分解, 或等价地, Z 可表. 当 f 通过 X 分解时, 这立即由下列引理 得到.

引理 4.6.7. *设 $x_0 \in X(S)$. x_0 在 $F(S)$ 中的像, 对应于由以下两个笛卡尔方块定义的子层 $Z \subset X_S$:*

$$\begin{array}{ccccc} X_S & \xrightarrow{\mathrm{id}_{X_S} \times x_0} & X_S \times_S X_S & \longrightarrow & X \times X \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Z & \longrightarrow & R_S & \longrightarrow & R. \end{array}$$

这立即由态射 $X \to F$ 的描述得到.

回到定理 的证明, 先假设 f 通过 X 分解. 则 Z 可表; 此外, 由于 $R \to X \times X$ 属于 (N), $Z \to X_S$ 也属于该族.

一般情形中, f 未必通过 X 分解. 然而, 由于 $X \to F$ 是覆盖态射 (4.4.3), 由 4.4.8(vii), 存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 以及对每个 i, 一个使下图交换的态射 $S_i \to X$:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & F \\ \uparrow & & \uparrow f \\ S_i & \longrightarrow & S \end{array}$$

根据以上论证, 此图 定义的态射 $f_i : S_i \to F$ 属于 $\mathrm{Hom}(S_i, F_0)$, 并对应于子层 $Z \times_S S_i \subset X_{S_i}$. 态射 $Z \times_S S_i \to X_{S_i}$ 属于 (N), 且族 $\{X_{S_i} \to X_S\}$ 是覆盖族. 所以只需再证明下列命题.

命题 4.6.8. *设 $\{S_i \to S\}$ 是一个覆盖族, Z 是 S 上的一个层. 假设对每个 i, S_i-函子 $Z \times_S S_i$ 由一个对象 T_i 表出. 则族 (T_i) 带有关于 $\{S_i \to S\}$ 的一个典范下降数据. 层 Z 可表当且仅当此数据有效; 此时, 下降所得的对象表出 Z.*

首先注意, 由 4.4.3, $\{S_i \to S\}$ 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的一个普遍有效满态射族, 从而是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的一个下降族 (2.3). 若 Z 由一个对象 T 表出, 则 $T \times_S S_i$ 视为层时同构于 $Z \times_S S_i$. 因此, T_i 上的下降数据有效, 其唯一确定的下降对象同构于 T, 因而表出 Z.

反之, 假设 T_i 上的典范下降数据有效, 设 T 是下降所得的对象. 由于 $\{S_i \to S\}$ 是 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的下降族, 存在一个 S-态射 $T \to Z$, 其到每个 S_i 的基变换是典范态射 $T_i \to Z \times_S S_i$. 此态射局部为同构; 由于 T 与 Z 都是层, 由 4.5.8 可知它是同构.

推论 4.6.9. *设 R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系. 对每个层 F, 映射*

$$\mathrm{Hom}(X/R, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, F)$$

将第一个集合等同于第二个集合中与 R 相容的态射所成的子集.

推论 4.6.10. *设 $\mathcal{T}'$ 是一个比 $\mathcal{T}$ 更粗的拓扑, 且 (M) 中的态射关于此拓扑都是覆盖态射. 在 4.6.6(iii) 的假设下, 对介于 $\mathcal{T}'$ 和典范拓扑之间的每个拓扑, X/R 也都是 X 关于 R 的层商.*

注 4.6.11. 若在 4.6.6(iii) 的陈述中, 再假设每当该处的假设满足时, 下降所得的态射 $T \to S$ 都属于 (N), 则包含态射 $Z \hookrightarrow X_S$ 也属于 (N). 这立即由 Z 的下降构造得到.

注 4.6.12. 蕴含关系

$$\text{(c)} \Longrightarrow \text{(b)} \Longrightarrow \text{(a)} \qquad \text{及} \qquad \text{(c)} \Longrightarrow [F_0 = F = X/R]$$

的证明没有使用引理 4.6.5 的充分性方向, 而条件 $(e_{\mathcal{T}})$ 只在此方向中用到. 所以, 当 (M) 仅满足条件 (a)–$(d_{\mathcal{T}})$ 时, 这些蕴含仍成立. 可平方的覆盖态射族就是这样的族 (M) 的一个例子 (比较 4.6.4). 对典范拓扑, 这些态射恰好就是普遍有效满态射. 所以:

推论 4.6.13. *设 R 是 X 中的一个普遍有效等价关系. 则 $\mathscr{C}$ 的对象 X/R 是关于典范拓扑的 X 关于 R 的层商. 它表出下列函子: $(X/R)(S)$ 是 X_S 的那些在 $R \times S$ 下稳定的子 $\mathscr{C}/S$-对象 Z 的集合, 其中诱导的等价关系普遍有效, 且商为 S.*

类似地, 对任意拓扑:

推论 4.6.14. *设 (M) 是可平方的覆盖态射族. 若 R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系, 则 $\mathscr{C}$ 的对象 X/R 是 X 关于 R 的层商, 且表出 4.6.6 中的函子 F_0.*

附论 4.6.15. 现在可以对 4.5.5 作如下说明. 在仅涉及逆极限的问题中, 如纤维积、代数结构等, 第 I 篇的结果及 4.5.5 允许我们不加区别地将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 或 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个全子范畴. 对同时涉及逆极限和正向极限的问题, 则不能如此处理.

当逆极限和正向极限同时出现时, 特别是在取商时 (例如, 在一个群模其正规子群的商上赋予群结构时), 都将给定范畴视为嵌入层范畴中. 因此, 若 R 是 $\mathscr{C}$ 的一个对象 X 中的 $\mathscr{C}$-等价关系, 则记号 X/R 表示 X 关于 R 的层商, 此前记作 $j(X)/j(R)$; 而当此层可表时, 也表示表出它的对象. 以上结果表明, 在最重要的情形中, $\mathscr{C}$ 中的商也是层范畴中的商. 无论如何, 若 $\mathscr{C}$ 中的一个商与 $\widetilde{\mathscr{C}}$ 中的商不一致, 例如不是普遍的商, 则不对它使用记号 X/R. 这修改了第 3 号 中的定义.

所以, 研究这类问题时, 先在层范畴中进行, 其中通常的结果都成立 (参见第 4.4 号); 随后利用本小节的结果, 以及在可用时利用下降有效性的判别法, 将所得陈述具体化到原来的范畴中. 以下小节将给出运用此方法的例子.

4.7. 有效性判别法的应用: 同构定理

本小节给出一个有效性判别法的应用实例. 初始数据为: $\mathscr{C}$ 上的一个拓扑 $\mathcal{T}$, 仍假设它比典范拓扑更粗; $\mathscr{C}$ 的一个态射族 (M), 满足 4.6.3 的公理 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$; 以及 $\mathscr{C}$ 的一个态射族 (N), 它可以满足以下公理:

(a) (N) 在基变换下稳定;

$(f_{\mathcal{T}})$ (N) 中的态射关于给定拓扑可以下降. 更确切地说, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 每个覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 以及每个属于 (N) 的态射族 $\{T_i \to S_i\}$, T_i 上关于 $\{S_i \to S\}$ 的每个下降数据都有效; 若 T 表示下降所得的对象, 则 $T \to S$ 属于 (N).

由于 (M) 的每个元素都是覆盖态射 (条件 4.6.3 $(d_{\mathcal{T}})$), 公理 $(f_{\mathcal{T}})$ 蕴含以下公理: [46]

(f_M) 若 $Y \to X$ 属于 (N), 且 $X \to X_1$ 属于 (M), 则 Y 上关于 $X \to X_1$ 的每个下降数据都有效; 若 Y_1 表示下降所得的对象, 则 $Y_1 \to X_1$ 属于 (N).

以下是一个将在后文处理的例子: $\mathscr{C}$ 是概形范畴, $\mathcal{T}$ 是忠实平坦拟紧拓扑, (M) 是忠实平坦拟紧态射族, 而 (N) 是闭浸入族, 或拟紧浸入族. [47]

结合 4.6.11, 可将 4.6.6 的主要结果重述如下.

命题 4.7.1. *设 X 是 $\mathscr{C}$ 的一个可平方对象, R 是 X 中一个 (M) 型的等价关系. 假设 $R \to X \times X$ 属于 (N), 其中 (N) 满足 (a) 和 $(f_{\mathcal{T}})$. 则层商 X/R 由下式给出:*

$$\begin{aligned}(X/R)(S) = \{Z \subseteq X_S \mid\ & Z \text{ 是一个} S\text{-子对象, 且在} R \times S \text{ 下稳定},\\ & Z \to X_S \text{ 属于}(N), \quad Z \to S \text{ 是覆盖态射或属于}(M),\\ & R_Z \simeq Z \times_S Z\,\}.\end{aligned}$$

还有以下结果.

命题 4.7.2. *设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系, (N) 是一个满足 (a) 和 (f_M) 的态射族. 对 X 的每个在 R 下稳定且使得 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y, R 在 Y 中诱导的等价关系 R_Y 是 (M)-有效的. 此外, 商*

$$Y/R_Y = Y'$$

是 $X' = X/R$ 的一个子对象, 且 $Y' \to X'$ 属于 (N).

映射 $Y \mapsto Y'$ 是一个双射, 其定义域为 X 的那些在 R 下稳定且使 $Y \to X$ 属于 (N) 的子对象 Y 所成的集合, 值域为 X' 的那些使 $Y' \to X'$ 属于 (N) 的子对象 Y' 所成的集合. 其逆映射为

$$Y' \longmapsto Y' \times_{X'} X.$$

事实上, 由于 R 是 (M)-有效的, 态射 $X \to X'$ 属于 (M). 设 Y' 是 X' 的一个子对象, 使得典范态射 $Y' \to X'$ 属于 (N). 则 $Y = Y' \times_{X'} X$ 是 X 的一个在 R 下稳定的子对象, 且态射 $Y \to X$ 和 $Y \to Y'$ 分别属于 (N) 和 (M), 因为这两个族在基变换下都稳定. 以 R_Y 表示 R 在 Y 中诱导的等价关系. 由 4.4.11, 层商 Y/R_Y 由 Y' 表出; 因此 4.6.5 表明 R_Y 是 (M)-有效的.

反之, 设 Y 是 X 的一个在 R 下稳定的子对象, 并且 $Y \to X$ 属于 (N). 由于 Y 在 R 下稳定, 它在

$$R = X \times_{X'} X$$

中的两个逆像相同, 从而 Y 配备了关于 $X \to X'$ 的一个下降数据. 由族 (N) 的公理 (f_M) 即得所需结论.

[46] 编者注: 公理 (f_M) 原置于命题 4.7.2 之前, 现移至此处.
[47] 编者注: 参见 §6.4; 另见 VI_A, 5.3.1.

推论 4.7.3. *设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, R 是 X 中的一个 (M)-有效等价关系. 再假设 $R \to X \times X$ 属于 (N), 其中 (N) 满足 (a) 和 $(f_{\mathcal{T}})$. 则对 4.7.2 中的每个 Y, $R_Y \to Y \times Y$ 也属于 (N), 因而由 4.7.1 得到*

$$\begin{aligned}(Y/R_Y)(S) = \{Z \subseteq Y_S \mid\ & Z \text{ 是一个} S\text{-子对象, 且在} R_Y \times S \text{ 下稳定,} \\ & Z \to Y_S \text{ 属于} (N) \text{ (所以} Z \to X_S \text{ 也属于该族),} \\ & Z \to S \text{ 是覆盖态射,} \quad R_Z \simeq Z \times_S Z\,\}.\end{aligned}$$

5. 取商与代数结构

5.1. 主齐性丛

定义 5.1.0.[48] 回顾 (III 0.1), 带有 H 的右作用的对象 X 称为 H 下的*形式主齐性对象 (formally principal homogeneous)*[49] 若如下典范函子态射

$$X \times H \longrightarrow X \times X, \qquad (x, h) \longmapsto (x, xh),$$

为同构. 等价地 (参见*同上*), 对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 集合 $X(S)$ 在 $H(S)$ 下形式主齐性: 它或为空集, 或为 $H(S)$ 下的主齐性集. 特别地, 当 H 通过右平移作用于自身时, 它在自身作用下形式主齐性.

定义 5.1.1. 带有 H 作用的对象 X 称为*平凡的 (trivial)*, 若它作为 H-对象同构于带有平移作用的 H.

命题 5.1.2. *若 X 在 H 下形式主齐性, 则存在 $\Gamma(H)$ 下的主齐性集之间的同构*

$$\Gamma(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{H\text{-obj.}}(H, X)$$

对 X 的截面 x, 关联由集合上的映射 $h \mapsto xh$ 定义的态射 $H \to X$. 归结为集合论情形, 立即得到此断言.

推论 5.1.3. *存在 H-对象的同构*

$$X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_{H\text{-obj.}}(H, X).$$

推论 5.1.4. *带有群作用的对象平凡, 当且仅当它形式主齐性且有截面.*

定义 5.1.5. 设 $\mathscr{C}$ 为配备拓扑的范畴. 带有 S-群 H 作用的 S-对象 X 称为 H *下的主齐性丛*, 若它局部平凡, 即满足下述等价条件:[50]

(i) 所有使函子 $X \times_S T$ 在 $H \times_S T$ 下平凡的态射 $T \to S$ 所组成的族, 是 S 的一个加细;

(ii) 对于定义所给拓扑的一个预拓扑, 存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使得对每个 i, S_i-函子 $X \times_S S_i$ 在 S_i-群函子 $H \times_S S_i$ 下平凡, 等价地, 它在 S_i 上有截面.

命题 5.1.6. *设 $\mathscr{C}$ 为配备拓扑 $\mathcal{T}$ 的范畴, (M) 为满足4.6.3 的公理 (a)–$(e_{\mathcal{T}})$ 的 $\mathscr{C}$ 中的一族态射. 设 H 为结构态射 $H \to S$ 属于 (M) 的 S-群, P 为带有 H 作用的 S-对象. 下列条件等价:*

(i) *P 为 H 下的主齐性丛 (定义5.1.5);*

---

[48]编者注: 引入编号5.1.0, 以便后文引用.

[49]编者注: 也称为 "伪挠子 (pseudo-torsor)"; 参见 EGA IV_4, 16.5.15. 更一般的形式齐性对象 (未必主齐性) 的概念, 定义于本篇末尾的补遗 6.7.1.

[50]编者注: 此时也称 X 为 H-挠子 (torsor).

(ii) *P 在 H 下形式主齐性, 且其结构态射 $P \to S$ 属于 (M);*

(iii) *存在属于 (M) 的态射 $S' \to S$, 使得从 S 到 S' 基变换后, P 成为平凡对象; 即 $P \times_S S'$ 在 $H \times_S S'$ 下平凡;*

(iv) *H 自由且 (M)-有效地作用于 P, 且商 P/H 同构于 S.*

首先, (ii) 与(iv) 等价. 两种情形下 $P \to S$ 都属于 (M), 从而可平方, 这保证纤维积 $H \times_S P$ 和 $P \times_S P$ 可表. 条件(ii) 显然蕴涵(iii): 可取 $S' = P$, 因为形式主齐性与5.1.4 表明, $P \times_S P$ 在 $H \times_S P$ 下平凡, 其对角截面给出所需截面. 条件(iii) 显然蕴涵(i), 因为由公理$(d_{\mathcal{T}})$, $\{S' \to S\}$ 是覆盖族.

只需证明(i)⇒(ii). 层态射

$$P \times_S H \longrightarrow P \times_S P$$

局部为同构, 从而是同构 (4.5.8); 故 P 形式主齐性. 结构态射 $P \to S$ 局部同构于属于 (M) 的结构态射 $H \to S$, 因而由公理 $(e_{\mathcal{T}})$, 它也属于 (M).

(i) 与(iv) 的等价性有如下推广.

命题 5.1.7. *对 $\mathscr{C}$ 和 (M) 作相同假设, 设 H 为 S-群, X 为带有 H 的右作用的 S-对象. 假设 $H \to S$ 属于 (M). 下列条件等价:*

(i) *H 自由且 (M)-有效地作用于 X;*

(ii) *存在与 H 的作用在 X 上定义的等价关系相容的 S-态射 $p : X \to Y$, 使得 $H \times_S Y$ 在 X 上诱导的 Y 上的作用, 将 X 赋成 Y 上的 H_Y 下的主齐性丛.*

在这些条件下, p 将 Y 与商 X/H 等同.

若 $p : X \to Y$ 与 H 的作用相容, 则由同构

$$H_Y \times_Y X \xrightarrow{\sim} H \times_S X.$$

可知, $H \times_S Y$ 在 X 上诱导的 Y 上的作用, 与 H 的原作用在 X 上定义同一个等价关系. 由此观察及前述等价性(iv)⇔(i), 即得此命题.

推论 5.1.7.1.[51] *设 $\mathscr{C}$ 为具有终对象和纤维积的范畴, 配备比典范拓扑更粗的拓扑 $\mathcal{T}$. 设 $f : G \to H$ 为 $\mathscr{C}$-群的态射, 令 $K = \mathrm{Ker}(f)$, 并假设 f 是 $\mathcal{T}$ 的覆盖态射. 则 H 表出层商 G/K, 且 f 是 K_H-挠子. 等价地, 可以说 G 是 H 上的 K-挠子.*

事实上, 由于 f 是覆盖态射, 它是普遍有效满态射 (4.4.3). 故由3.3.3.1, H 是 G 对等价关系

$$\mathscr{R}(f) = G \times_H G.$$

的商. 此外, 态射

$$G \times K \longrightarrow G \times_H G, \qquad (g, k) \longmapsto (g, gk),$$

是 $K_G = G \times_H K_H$-对象的同构; 其逆为 $(g, g') \mapsto (g, g^{-1}g')$. 因此 $\mathscr{R}(f)$ 是 K 定义的等价关系. 由于 $f : G \to H$ 是覆盖态射, 由5.1.6(ii), 或直接由定义5.1.5(ii), 它是 K_H-挠子.

现在可以对群作用取商的情形加强定理4.6.6.

命题 5.1.8. *在5.1.7 的假设下, 用 F_0 表示如下定义的 S 上的函子: 对每个 $S' \to S$, $F_0(S')$ 是 $X \times_S S'$ 的那些可表 S'-子函子 Z 组成的集合, 这些子函子在 $H \times_S S'$ 下稳定, 且对诱导的作用, 是此 S'-群下的主齐性丛 (3.2.2).*

(i) *下列条件等价:*

(a) *H 在 X 上的作用是 (M)-有效且自由的;*[52]

[51]编者注: 此特殊情形作为推论加入, 将在后续各篇中多次使用.

[52]编者注: 增加了 "且自由" 一语.

(b) F_0 *可表.*

在这些条件下, $F_0 = X/H$.

(ii) *设* (N) *为对基变换稳定的态射族, 使得对每个覆盖族* $\{S'_i \to S'\}$ *和* (N) *中的每个态射族* $\{T_i \to S'_i\}$, T_i *上关于* $\{S'_i \to S'\}$ *的每个下降资料都是有效的. 假设* $X \times_S H \to X \times_S X$ *属于* (N), *且* X *可平方. 则与* $X \times_S X$ *的子对象* $X \times_S H$ *对应的元素* $p \in \mathrm{Hom}(X, F_0)$, *将* F_0 *与层商* X/H *等同.*

5.2. 群结构与取商

本小节考察群对其子群的商 (G/H) 上可赋予的代数结构. 先在 $\mathscr{C}$ 上关于任意拓扑的层范畴中讨论. 再取典范拓扑并使用4.5.12, 即可得到 $\mathscr{C}$ 中普遍有效取商的结果.

命题 5.2.1. *设* $u : H \to G$ *为群层的单态射. 商层* G/H *上存在唯一的* G*-对象结构, 使得典范态射*

$$p : G \longrightarrow G/H$$

为 G*-对象的态射. 此结构关于对* (G, H) *具有函子性: 给定交换图*

$$\begin{array}{ccc} H & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow f \\ H' & \longrightarrow & G', \end{array}$$

3.2.3 的态射 $f : G/H \to G'/H'$ *与作用群之间的态射* f *相容.*

事实上, G/H 是下列预层的伴随层:

$$i(G)/i(H) : S \longmapsto G(S)/H(S).$$

由于函子 a 左正合, 它将带有群作用的对象映到带有群作用的对象. 预层 $i(G)/i(H)$ 是 $i(G)$-对象, 因此

$$G/H = a\big(i(G)/i(H)\big)$$

是 $a(i(G)) = G$-对象. 此构造显然具有所述的全部性质.

推论 5.2.2. *设* $u : H \to G$ *为* $\mathscr{C}$*-群的单态射, 并假设* H *在* G *上的作用普遍有效. 商对象* $G/H \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ *上存在唯一的* G*-对象结构, 使得* $p : G \to G/H$ *为带有作用的对象的态射. 在前一命题的意义下, 此结构关于满足* H *普遍有效地作用于* G *的对* (H, G) *具有函子性.*

命题 5.2.3. *设* $u : H \to G$ *为群层的单态射, 将* H *与* G *的一个正规子群层等同. 商层* G/H *上存在唯一的群层结构, 使典范态射* $p : G \to G/H$ *为群态射. 此结构关于满足* H *正规的对* (H, G) *具有函子性.*

证明与5.2.1 的证明类似.

推论 5.2.4. *设* $u : H \to G$ *为* $\mathscr{C}$*-群的单态射, 将* H *与* G *的一个正规子群等同. 假设* H *在* G *上的作用普遍有效. 商对象* $G/H \in \mathrm{Ob}\mathscr{C}$ *上存在唯一的群结构, 使典范态射* $G \to G/H$ *为群态射. 此结构关于满足* H *正规且普遍有效地作用的对* (H, G) *具有函子性.*

可以更明确地刻画 G/H 的群结构.

命题 5.2.5. *在5.2.4 的假设下, 设* K *为* $\mathscr{C}$*-群,* $f : G \to K$ *为态射. 下列条件等价:*

(i) f *是与* H *定义的等价关系相容的群态射;*

(ii) f *是群态射, 且其限制* $H \to K$ *为平凡态射;*

(iii) f *经由群态射* $G/H \to K$ *分解.*

特别地, 存在关于群 K 具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}\text{-gr.}}(G/H,K)\xrightarrow{\sim}\{f\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}\text{-gr.}}(G,K)\mid f\circ u=e\}.$$

(i) 与(ii) 的等价性可在集合论层面证明, 而(iii)⇒(ii) 显然成立. (iii) 与(ii) 的等价性由公式

$$\mathrm{Hom}(G/H,K)\simeq\mathrm{Hom}\big(i(G)/i(H),K\big)$$

及 G/H 上群结构的定义得到.

注 5.2.6. 在上述情形中, 若 f 的核恰好为 H, 则 f 经由其分解的态射 $G/H\to K$ 是单态射. 这由3.3.4 立即得到.

对于群层, 可如下加强4.4.11.

命题 5.2.7. *设 G 为群层, H 为其正规子群层. 对 G 的每个包含 H 的子群层 K, 令 $K'=K/H$, 将其视为 $G'=G/H$ 的子群. 则*

$$K=K'\times_{G'}G,$$

且映射

$$K\longmapsto K/H,\qquad K'\longmapsto K'\times_{G'}G$$

给出 G 的包含 H 的子群层与 G' 的子群层之间的双射. 在此对应下, G 与 G' 的正规子群层相互对应.

第一个断言容易由4.4.11 和3.2.4 得到. 只需证明 K 在 G 中正规当且仅当 K' 在 G' 中正规. 若 K 在 G 中正规, 则预层 $i(K)/i(H)$ 在 $i(G)/i(H)$ 中正规; 由通常的论证, 对伴随层也有同样结论. 反之, 若 K' 在 G' 中正规, 则纤维积 $K'\times_{G'}G$ 在 G 中正规, 这显然成立.

现在设 L 为 G 的任意子群层. 用 $\overline{L}$ 表示 L 对 H 定义的等价关系的饱和, 也记为 $\overline{L}=L\cdot H$.

命题 5.2.8. *在上述假设下, $L\cdot H$ 是 G 的包含 H 的子群层, 且 L 在 G/H 中的像可等同于*

$$(L\cdot H)/H\simeq L/(H\cap L).$$

事实上, 用 L' 表示 L 在 G/H 中的像层. 在前一命题的对应下, 它是 G/H 中对应于 $L\cdot H$ 的子群层. 由于 $L\to L'$ 是覆盖态射, 从而是层的普遍有效满态射, 由4.4.9 可知, L' 可等同于 L 对 $L\to L'$ 的核的商, 而此核显然为 $H\cap L$.

最后, 考虑群层 G, 其子群层 K, 以及 K 的正规子群层 H. 首先在 G/H 上定义群层 $H\backslash K$ $(=K/H)$ 的右作用. 群 K 通过右平移作用于 G. 由于 H 在 K 中正规, 此作用与 H 的作用所定义的等价关系相容, 从而诱导 K 在 G/H 上的作用, 即从 K 的反群出发的态射

$$K^\circ\longrightarrow\mathrm{Aut}(G/H)$$

由于目标是层 (4.5.13), 且此态射在 H 上平凡, 它经由 K/H 分解, 定义了所需作用. G 在自身上的左、右作用可交换; 故 G 和 K/H 在 G/H 上的作用可交换.

命题 5.2.9. *在上述假设下, K/H 自由地右作用于 G/H, 且存在 G-对象的典范同构*

$$(G/H)/(K/H)\simeq G/K.$$

若 K 在 G 中正规, 则由5.2.7, K/H 在 G/H 中正规; 此时该同构保持两边的群结构.

有预层的同构

$$\big(i(G)/i(H)\big)/\big(i(K)/i(H)\big)\xleftarrow{\sim}i(G)/i(K),$$

它保持 $i(G)$-对象结构. 对此关系应用函子 a, 即得所述结果.

推论 5.2.10. *设 G 为 $\mathscr{C}$-群, K 为 G 的 $\mathscr{C}$-子群, H 为 K 的正规 $\mathscr{C}$-子群. 设 (M) 为满足公理 (a)–(e_T) 的 $\mathscr{C}$ 中的一族态射. 假设 H 在 G (相应地, K) 上的右作用是 (M)-有效的. 则 K/H 自然且自由地右作用于 G/H, 且此作用与 G 的作用可交换. 下列条件等价:*

(i) K 在 G 上的作用是 (M)-有效的;

(ii) K/H 在 G/H 上的作用是 (M)-有效的.

在这些条件下, 存在带有 G 作用的对象的同构[53]

$$(G/H)/(K/H) \simeq G/K.$$

5.3. 有效性判据的应用: Noether 定理

[54] 设 $\mathscr{C}$, $\mathcal{T}$ 和 (M) 如常. 设 (N) 为满足4.7 的公理 (a) 和(f_M) 的态射族. 结合5.2.7 与4.7.2, 得到下述结果.

命题 5.3.1. *设 G 为 $\mathscr{C}$-群, H 为 G 的正规 $\mathscr{C}$-子群, (M)-有效地作用于 G. 对 G 的每个包含 H 且满足 $K \to G$ 属于 (N) 的 $\mathscr{C}$-子群 K, H 在 K 上的作用是 (M)-有效的, 且商 $K/H = K'$ 是 $G/H = G'$ 的 $\mathscr{C}$-子群, 满足 $K' \to G'$ 属于 (N). 映射 $K \mapsto K'$ 是下列两个集合之间的双射: G 的包含 H 且使 $K \to G$ 属于 (N) 的 $\mathscr{C}$-子群 K 所组成的集合, 以及 G' 的使 $K' \to G'$ 属于 (N) 的 $\mathscr{C}$-子群 K' 所组成的集合. 其逆为*

$$K' \longmapsto K \times_{G'} G.$$

在此对应下, G 与 G' 的正规子群相互对应.

推论 5.3.2. *若 $H \to G$ 属于 (N), 则 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 且单位截面 $e \to G/H$ 属于 (N).*[55]

6. 概形范畴中的拓扑

6.1. Zariski 拓扑

这是由如下预拓扑生成的拓扑: 态射族 $\{S_i \to S\}$ 是覆盖族, 若每个态射都是开浸入, 且各 S_i 的像之并为整个 S. 这一拓扑记为 (Zar).

定义 6.1.1. *Zariski 拓扑下的层也称为*局部性函子 (functor of local nature)*: 它是从 **Sch** 到 **Set** 的反变函子, 使得对每个概形 S 及 S 的每个由开子概形 S_i 组成的覆盖, 图*

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \cap S_j)$$

都是正合的.

特别地, 局部性函子将直和变为积. 由于每个可表函子都是层, Zariski 拓扑比典范拓扑粗.

在术语方面, 凡是不加其他限定地使用“局部”或“局部地”, 都是指 Zariski 拓扑, 因而就是这些词的通常含义.

6.2. 一种构造拓扑的方法

命题 6.2.1. *设 $\mathscr{C}$ 是范畴, $\mathscr{C}'$ 是其满子范畴, P 是 $\mathscr{C}$ 中具有共同终点的态射族所成的一个集合, 它对基变换和复合稳定 (即满足 4.2.5 的公理 (P 1) 与 (P 2)). 设 P' 是 $\mathscr{C}'$ 中态射族所成的一个集合, 它包含每个由恒等同构组成的单元素族. 在 $\mathscr{C}$ 上配备由 P 与 P' 生成的拓扑 (参见 4.2.5.0), 并假设满足以下三个条件:*

[53] 编者注: $\mathscr{C}$ 的对象.

[54] 编者注: 事实上, 5.2.8–5.2.10 中建立的同构才称得上 “Noether 同构定理”.”

[55] 编者注: 这由对 $K = H$ 应用此命题得到.

(a) *若 $\{S_i \to S\} \in P'$, 因而 $S_i, S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, 且 $T \to S$ 是 $\mathscr{C}'$ 中的态射, 则在 $\mathscr{C}$ 中构成的纤维积 $S_i \times_S T$ 存在, 且族 $\{S_i \times_S T \to T\}$ 属于 P'; 特别地, $S_i \times_S T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$.*

这一条件蕴含 P' 对 $\mathscr{C}'$ 中的基变换稳定, 但与这一断言并不等价: 它还要求包含函子 $\mathscr{C}' \hookrightarrow \mathscr{C}$ 与某些纤维积可交换.

(b) *对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 存在族 $\{S_i \to S\} \in P$, 使得每个 i 都有 $S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$.*

(c) *在下述情形中*

$$\begin{array}{ccc} & & S_{ijk} \\ & & {\scriptstyle (P')}\downarrow \\ S_i & \xleftarrow{(P)} & S_{ij} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \\ S & & \end{array} \tag{6.2.1.c}$$

其中 S, S_i, S_{ij}, S_{ijk} 是 $\mathscr{C}'$ 的对象, $\{S_i \to S\} \in P'$, 对每个 i 有 $\{S_{ij} \to S_i\} \in P$, 对每对 ij 有 $\{S_{ijk} \to S_{ij}\} \in P'$, 则存在族 $\{T_n \to S\} \in P'$, 且对每个 n 存在一个多重指标 (ijk), 使得有交换图

$$\begin{array}{ccc} S_{ijk} & \longleftarrow & T_n \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S. \end{array} \tag{6.2.1.d}$$

在这些假设下, 对象 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 的筛 R 是覆盖筛, 当且仅当存在复合族

$$\begin{array}{ccc} R & \dashleftarrow & S_{ij} \\ \downarrow & & {\scriptstyle (P')}\downarrow \\ S & \xleftarrow{(P)} & S_i \end{array} \tag{6.2.1.e}$$

其中 $S_i, S_{ij} \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, $\{S_i \to S\} \in P$, 对每个 i 有 $\{S_{ij} \to S_i\} \in P'$, 使得所得的态射 $S_{ij} \to S$ 都经过 R 分解. 等价地, 此复合族生成的筛包含于 R.

证明. 属于 P 和 P' 的族都是覆盖族, 因而由 (C 2), 这些族的复合仍是覆盖族. 所示形式的筛包含一个覆盖筛, 因而也是覆盖筛.

反过来, 只需证明这种形式的筛构成一个拓扑, 也就是验证 4.2.1 的公理 (T 1)–(T 4).

公理 (T 4). 设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$. 由 (b), 存在族 $\{S_i \to S\} \in P$, 使得 $S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$. 由假设, 单元素族 $\{S_i \xrightarrow{\mathrm{id}_{S_i}} S_i\}$ 属于 P'. 因而 S 的极大筛 S 具有所要求的形式:

$$\begin{array}{ccc} S_i & \longrightarrow & S \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_S} \\ S_i & \xrightarrow{(P)} & S. \end{array} \tag{6.2.1.T4}$$

公理 (T 3). 这是显然的.

公理 (T 2). 设 R 是 S 的一个具有所要求形式的筛, 并设 C 是 S 的筛[56], 使得对每个 $T \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$ 及每个经过 R 分解的态射 $T \to S$, T 的筛 $C \times_S T$ 都具有所要求的形式. 由于 $S_{ij} \to S$ 经过 R 分解, S_{ij} 的筛

$$C_{ij} = C \times_S S_{ij}$$

[56]编者注: 此处已更正原文.

具有所要求的形式; 它可示意为

$$\begin{array}{ccccc} & & S_{ij} & \longleftarrow & C_{ij} \\ & \swarrow & {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \\ & & S_i & & \downarrow \\ & & {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ R & \longrightarrow & S & \longleftarrow & C. \end{array} \tag{6.2.1.T2a}$$

因此, 对每对 ij, 存在形如下述的图

$$\begin{array}{ccc} S_{ijkl} & & \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & \searrow & \\ S_{ijk} & & \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & & \\ S_{ij} & \longleftarrow & C_{ij}. \end{array} \tag{6.2.1.T2b}$$

于是得到一个复合族

$$S_{ijkl} \xrightarrow{(P')} S_{ijk} \xrightarrow{(P)} S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S \tag{6.2.1.T2c}$$

它属于 $P \circ P' \circ P \circ P'$, 经过 C 分解, 且除 S 之外的所有对象都在 $\mathscr{C}'$ 中.

对每个族 $\{S_{ijkl} \to S_i\}$ 应用条件 (c). 对每个 i 得到族 $\{T_{in} \to S_i\} \in P'$, 使得 $T_{in} \to S$ 经过某个 S_{ijkl} 分解, 从而经过 C 分解:

$$\begin{array}{ccc} T_{in} & \longrightarrow & S_{ijkl} \\ {\scriptstyle (P')}\downarrow & & \downarrow \\ S_i & & C \\ {\scriptstyle (P)}\downarrow & \swarrow & \\ S & & \end{array} \tag{6.2.1.T2d}$$

因此 S 的筛 C 具有所要求的形式, 这就完成了对 (T 2) 的验证.

公理 (T 1). 设 R 是 S 的一个具有所述形式的筛, $T \to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射. 我们来证明 T 的筛 $R \times_S T$ 仍具有所述形式. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & S_{ij} & \longleftarrow\!\!\!

表明态射 $U_{ikj} \to T$ 经过 T 的筛 $T \times_S R$ 分解. 因此这个筛具有所要求的形式, 证明完毕.

推论 6.2.2. *设 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, R 是 S 的一个筛. 则 R 是覆盖筛, 当且仅当存在族 $\{T_i \to S\} \in P'$ 经过 R 分解.*

这样的筛显然是覆盖筛. 反过来, 取族 $\{S_i \to S\}$ 为仅由 S 的恒等同构组成的族, 应用条件 (c); 则上述命题表明每个覆盖筛都具有所述形式.

推论 6.2.3. *$\mathscr{C}$ 上的预层 F 是分离的 (相应地, 是层), 当且仅当在下述两种情形中, 映射*

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i)$$

均为单射 (相应地, 图

$$F(S) \longrightarrow \prod_i F(S_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(S_i \times_S S_j)$$

均为正合图):

(i) $\{S_i \to S\} \in P$;

(ii) $S, S_i \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}'$, 且 $\{S_i \to S\} \in P'$.

由于所讨论的族都是覆盖族, 这些条件是必要的. 设 C 是 S 的筛, 它是复合族

$$\{S_{ij} \xrightarrow{(P')} S_i \xrightarrow{(P)} S\}.$$

的像. 简单的图追踪表明, 本推论的条件蕴含

$$\mathrm{Hom}(S, F) \xrightarrow{g} \mathrm{Hom}(C, F)$$

为单射, 相应地为双射. S 的每个覆盖筛 R 都包含一个这种形式的筛 C, 且有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(S,F) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Hom}(R,F) \\ & \searrow_{g} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & \mathrm{Hom}(C,F). \end{array} \tag{6.2.3.1}$$

由于 g 为单射, f 也为单射, 从而 F 分离. 此外, R 加细 C, 所以 h 也为单射. 若 g 为双射, 则 f 也为双射, 从而 F 为层.

注 6.2.4. *前一推论不能由 4.3.5 推出, 因为 P' 对基扩张并不稳定.*

注 6.2.5. *特别地, 当下述条件成立时, 条件 (c) 成立:*

(i) *P' 对复合稳定;*

(ii) *每当 $\{S_j \to S\}$ 是 $\mathscr{C}'$ 中属于 P 的态射族时, 它都包含一个属于 P' 的子族.*

6.3. 在概形范畴中的应用

取 $\mathscr{C}$ 为概形范畴, $\mathscr{C}'$ 为仿射概形构成的满子范畴, P 为由开浸入的满射族组成的集合. 我们将考虑下列集合 P'_i:

P'_1 : 平坦态射的有限满射族;
P'_2 : 平坦、有限呈示、拟有限态射的有限满射族;
P'_3 : 平展态射的有限满射族;
P'_4 : 有限平展态射的有限满射族.

关于 P_2' 的描述, 附有如下说明. [57]

除 P_4' 外, 每个 P_i' 都满足命题 6.2.1 的条件. 条件 (c) 由 6.2.5 得到: 由于仿射概形拟紧, $\mathscr{C}'$ 中每个属于 P 的态射族都包含一个仍属于 P 的有限子族, 因而当 $i = 1, 2, 3$ 时, 该有限子族属于 P_i'. 由 P 和 P_i' 生成的拓扑 T_i 采用如下记号及名称: [57]

$$\begin{array}{ll} T_1 & = (\text{fpqc}) \quad \text{忠实平坦拟紧拓扑,} \\ T_2 & = (\text{fppf}) \quad \text{忠实平坦拓扑 (局部有限呈示),} \\ T_3 & = (\text{ét}) \quad \text{平展拓扑,} \\ T_4 & = (\text{étf}) \quad \text{有限平展拓扑.} \end{array}$$

由于 $P_1' \supset P_2' \supset P_3' \supset P_4'$, 有

$$(\text{fpqc}) \geq (\text{fppf}) \geq (\text{ét}) \geq (\text{étf}) \geq (\text{Zar}).$$

命题 6.3.1.

(i) *S 的筛 R 对 T_i, $1 \leq i \leq 3$, 是覆盖筛, 当且仅当存在 S 的一个由仿射开子概形组成的覆盖 (S_p), 且对每个 p, 存在族 $\{S_{pq} \to S_p\} \in P_i'$, 其中各 S_{pq} 均仿射, 使得每个态射 $S_{pq} \to S$ 都经过 R 分解.* [58]

(ii) **Sch** *上的预层 F 是* (fpqc) *(相应地,* (fppf), (ét), *或* (étf)*) 拓扑下的层, 当且仅当:*

(a) *F 是* (Zar) *拓扑下的层, 即局部性函子;*

(b) *对每个忠实平坦 (相应地, 忠实平坦、有限呈示且拟有限; 满射平展; 或满射有限平展) 态射 $T \to S$, 其中 T 和 S 均仿射, 图*

$$F(S) \longrightarrow F(T) \rightrightarrows F(T \times_S T)$$

均正合.

(iii) *对于 $i = 1, 2, 3, 4$, 拓扑 T_i 均比典范拓扑粗.*

(iv) *平坦开态射 (相应地, 平坦且局部有限呈示态射; 平展态射; 或有限平展态射) 的每个满射族, 对于* (fpqc) *(相应地,* (fppf), (ét), *或* (étf)*) 都是覆盖族.*

(v) *平坦拟紧态射的每个有限满射族都是* (fpqc) *覆盖族. 特别地, 每个忠实平坦拟紧态射都是* (fpqc) *覆盖态射.*

证明. 由 6.2.1 得到 (i); 由 6.2.3, 并注意到 Zariski 拓扑下的层将直和变为积, 得到 (ii). 每个可表函子都是 (Zar) 拓扑下的层, 且由 SGA 1, VIII, 5.3, 满足条件 (ii)(b). 因此 T_1 比典范拓扑粗, 这就证明了 (iii).

来证明 (iv). 设 $\{S_i \to S\}$ 是陈述中的态射族. 用仿射开子概形覆盖 S, 立即化归到 S 仿射的情形. [59]

先设态射 $S_i \to S$ 平坦且为开态射 (相应地, 平展). 用仿射开子概形 S_{ij} 覆盖每个 S_i. 由于这些态射是开态射, 各 S_{ij} 的像 T_{ij} 构成 S 的开覆盖. 仿射概形 S 拟紧, 所以存在有限个 T_{ij} 覆盖它, 以有限集 E 为指标集. 于是

$$S' = \coprod_{(i,j) \in E} S_{ij}$$

[57]编者注: 设 P_2'' 是 $\mathscr{C}'$ 中平坦且有限呈示的态射的有限满射族所成的集合. 由下面的命题 6.3.1, 由 P 和 P_2' 生成的拓扑 T_2, 与由 P 和 P_2'' 生成的拓扑相同. 这由 EGA IV_4, §17.16 关于拟截面的结果得到; 见 6.3.1 的证明. 回顾 EGA IV_4, 17.16.2 的如下特殊情形. 设 S 仿射, $f : X \to S$ 是满射的、平坦且局部有限呈示的态射. 则存在一个忠实平坦、有限呈示且拟有限的态射 $S' \to S$, 其中 S' 仿射, 并存在一个 S-态射 $S' \to X$.

[58]编者注: 每个族 $\{S_{pq} \to S_p\} \in P_i'$ 均为有限族. 因此 $S_p' = \coprod_q S_{pq}$ 仿射, 可以将这个族替换为态射 $S_p' \to S_p$, 它仍属于 P_i'.

[59]编者注: 利用现在已假设 S 仿射这一点, 简化了下面的论证.

仿射, 且 $S' \to S$ 属于 P'_1, 相应地属于 P'_3, 因而是覆盖态射. 由于它经过给定的族分解, 该族也是覆盖族.

在 (étf) 情形中, 每个 S_i 都在 S 上有限, 因而仿射. 在前面的论证中, 可以取 S_i 的单元素覆盖 $\{S_i\}$, 这给出 $S' \to S \in P'_4$.

现设态射 $f_i : S_i \to S$ 平坦且局部有限呈示. 对每个 $s \in S$, EGA IV_4, 17.16.2 的证明给出某个 S_i 的一个仿射子概形 $X(s)$, 满足 $s \in f_i(X(s))$, 使得限制态射

$$g_i : X(s) \longrightarrow S$$

平坦、有限呈示且拟有限. 由 EGA IV_2, 2.4.6, 它的像 $g_i(X(s))$ 是 s 的一个开邻域 $U(s)$. 由于 S 仿射, 存在有限个这样的开集 $U(s_j)$, $j = 1, \ldots, n$, 覆盖 S. 因此,

$$X' = \coprod_{j=1}^{n} X(s_j)$$

仿射, 且 $X' \to S$ 满射、平坦、有限呈示且拟有限, 所以它属于 P'_2. [60] 这就完成了 (iv) 的证明.

来证明 (v). 设 $\{S_i \to S\}$ 是平坦拟紧态射的有限满射族, 用仿射开子概形 T_j 覆盖 S. 概形

$$S_{ij} = T_j \times_S S_i$$

拟紧, 因而具有有限的仿射开覆盖 T_{ijk}. 每个 $T_{ijk} \to T_j$ 都平坦, 且族 $\{T_{ijk} \to T_j\}$ 有限且满射, 因而是 T_1 的覆盖族. 由复合性, $\{T_{ijk} \to S\}$ 也是覆盖族. 它经过给定的族分解, 因而给定的族也是覆盖族:

$$\begin{array}{ccccc} S_i & \longleftarrow & S_{ij} & \longleftarrow & T_{ijk} \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ S & \longleftarrow & T_j & & \end{array} \tag{6.3.1.v}$$

推论 6.3.2. *设 (M_i) 为下列态射类:*

(M_1): 忠实平坦拟紧态射;
(M_2): 忠实平坦且局部有限呈示的态射;
(M_3): 满射平展态射;
(M_4): 满射有限平展态射.

态射类 (M_i) 满足 4.6.3 的公理 (a), (b), (c), (d_{T_i}) 和 (e_{T_i}). [61]

条件 (a), (b) 与 (c) 是经典结果 (见 EGA 和 SGA 1 的有关各处). [62] 由 6.3.1(iv),(v), (M_i) 满足 (d_{T_i}). 还需验证 (e_{T_i}). 只需验证 (e_{T_1}), 它蕴含其他所有条件; 这由 SGA 1, VIII, §§4–5 得到.

推论 6.3.3. *设 X 是概形, R 是 X 中的一个 (M_i) 型等价关系. 则 R 是 (M_i)-有效的, 当且仅当 X 对 R 的 T_i 拓扑下的商层可表; 在这种情形中, 它由商 X/R 代表.*

这就是 4.6.5.

---

[60] 编者注: 这表明, 若 P''_2 表示 $\mathscr{C}'$ 中平坦、有限呈示态射的有限满射族所成的集合, 则由 P 和 P''_2 生成的拓扑等于 T_2. 此外, 沿用 (iv) 证明开头的记号, 若每个 S_i 均由在 S 上有限呈示的仿射开集覆盖, 则所得态射 $S' \to S$ 属于 P''_2.

[61] 编者注: 为更正原文, 对 (M_3) 和 (M_4) 增添了满射性要求; 另外两种情形自动满足满射性.

[62] 编者注: 关于“拟紧”, 见 EGA I, 6.6.4; 关于“有限”, 见 EGA II, 6.1.5; 关于“局部有限呈示”, 见 EGA IV_1, 1.6.2; 关于“忠实平坦”, 见 EGA IV_2, 2.2.13; 关于“平展”, 见 EGA IV_4, 17.3.3.

6.4. 有效性条件

现在寻找满足 4.7 的公理 (f_T) 的态射类 (N). 先注意到 (f_{T_1}) 蕴含 (f_{T_i}), 所以只需考虑 (fpqc) 拓扑.

引理 6.4.1. *下列态射类满足 4.7 的公理 (f_{T_1}), 即它们“可作* (fpqc) *下降”:*

$$\begin{aligned}(N):&\ \text{开浸入};\\ (N'):&\ \text{闭浸入};\\ (N''):&\ \text{拟紧浸入}.\end{aligned}$$

由 6.3.1(ii), 只需验证这些态射类可对 Zariski 拓扑以及沿忠实平坦拟紧态射下降. 第一个断言显然成立. 对 (N), 第二个断言就是 SGA 1, VIII, 4.4; 对 (N'), 就是该处的 1.9; 对 (N''), 利用前两个结果, 按照该处 5.5 的方法论证.

推论 6.4.2. *同一结果也适用于拟紧开浸入.*

这些结果使 4.7.1, 4.7.2, 5.1.8, 5.3.1 等一般结果适用于当前情形. 我们以其中第一个结果为例, 将其陈述如下.

推论 6.4.3. $(= 4.7.1 + 4.6.10)$. *设 X 是概形, R 是 X 中的等价关系. 假设 $R \to X$ 忠实平坦且拟紧, $R \to X \times X$ 是闭浸入 (相应地, 开浸入、拟紧浸入或拟紧开浸入). 则* (fpqc) *拓扑与典范拓扑下的商层 X/R 相同. 对每个概形 S,*

$$(X/R)(S) = \left\{ \begin{array}{l} X_S \text{ 的闭 (相应地, 开、内拟紧或开且内拟紧)} \\ \text{子概形 } Z, \text{ 它对 } R \times S \text{ 稳定, 且满足:} \\ Z \to S \text{ 忠实平坦且拟紧, 并且} \\ R_Z \rightrightarrows Z \to S \text{ 正合} \end{array} \right\}. \tag{6.4.3.1}$$

63

6.5. 主齐性丛

这里只记录术语:

拓扑	主齐性丛
(fpqc)	主齐性丛 (不加限定词)
(ét)	拟等平凡主齐性丛
(étf)	局部等平凡主齐性丛
(Zar)	局部平凡主齐性丛.


(6.5.1)

6.6. 其他拓扑

概形范畴上的其他拓扑有时也很有用. 其中一种是*全局有限平展拓扑* (étfg), 它由如下预拓扑生成: 覆盖族是有限平展态射的满射族. 它并不比 Zariski 拓扑细. 相应的主齐性丛称为等*平凡的 (isotrivial)*.

[63]编者注: 回顾, 概形 T 的子概形 Z 称为*内拟紧的 (retrocompact)*, 若浸入 $Z \hookrightarrow T$ 拟紧; 见 EGA 0_{III}, 9.1.1.

这一拓扑以及混沌拓扑在拓扑格中的位置如下:



(6.6.1)

64

6.7. 齐性空间

设[65] G 是 S-群概形, X 是带有 G 左作用的 S-概形, 并设

$$\Phi : G \times_S X \longrightarrow X \times_S X$$

为在点上由

$$(g, x) \longmapsto (gx, x).$$

定义的 S-概形态射. 回顾 (参见 5.1.0 与 III.0.1), 若下述等价条件成立, 则称 X 是 G 下的一个*形式主齐性空间*:

(i) 对每个 $T \to S$, 集合 $X(T)$ 或者为空, 或者是 $G(T)$ 下的主齐性空间;

(ii) Φ 是 S-函子同构;

(iii) Φ 是 S-概形同构.

等价关系 (i)$\Longleftrightarrow$(ii) 是显然的; 而 (ii)$\Longleftrightarrow$(iii) 成立, 是因为 $\mathscr{C} = (\mathbf{Sch}/S)$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的满子范畴.

不一定为主齐性的*形式齐性空间*的概念, 则要求 Φ 在适当拓扑 $\mathcal{T}$ 下的层范畴中为满态射. 事实上, 要求 Φ 为 S-函子的满态射, 等价于要求对每个 $T \to S$, 集合 $X(T)$ 或者为空, 或者在 $G(T)$ 下齐性 (不一定为主齐性). 这要求过于苛刻, 下面这个简单例子就说明了这一点.

设

$$S = \operatorname{Spec} R, \qquad G = \mathbf{G}_{m,R}, \qquad X = \mathbf{G}_{m,R},$$

并让 G 通过 $t \cdot x = t^2 x$ 作用于 X. 则 Φ 满射、有限且平展, 因而是 (étf) 拓扑下的层范畴中的满态射 (*从而当然也是* S-概形的满态射). 另一方面, $X(R)$ 的点 1 和 -1 不能由 $G(R)$ 的任何元素共轭. 因此

$$G(R) \times X(R) \longrightarrow X(R) \times X(R)$$

[64]编者注: 回顾 (参见 4.4.2), 混沌拓扑是最粗的拓扑, 其定义为对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{C}$, 都有 $J(S) = \{S\}$.
[65]编者注: 下文的编号为增补内容.

并非满射.[66] 因此引出下述定义.

定义 6.7.1. *设 G 是 S-群, X 是带有 G 作用的 S-概形, $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 上的一个比典范拓扑粗的拓扑. 若下述等价条件成立, 则称概形 X 为相对于 $\mathcal{T}$ 的 G 下的形式齐性空间:*

(i) *态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 在 $\mathcal{T}$ 的层范畴中为满态射;*

(ii) *对每个 $T \to S$ 及每个 $x, y \in X(T)$, 存在 $\mathcal{T}$-覆盖态射 $T' \to T$ 和一个元素 $g \in G(T')$, 使得 $y_{T'} = g \cdot x_{T'}$.*

注 6.7.2. *特别地, 由 4.4.3, 条件 (i) 蕴含 Φ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 中的普遍有效满态射. 容易看出, 这又蕴含 Φ 为满射; 参见 1.3, 编者注 (3).*

命题与定义 6.7.3. [67] *设 G 是 S-群, X 是带有 G 作用的 S-概形, $\mathcal{T}$ 是 $(\mathbf{Sch}/S)$ 上的一个比典范拓扑粗的拓扑. 下述条件等价:*

(i) *X 同时满足以下两个条件:*

  (1) *态射 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 是覆盖态射, 即 X 是形式齐性 G-空间;*

  (2) *结构态射 $X \to S$ 也是覆盖态射, 即它关于 $\mathcal{T}$ 局部地具有截面 (参见 4.4.8 bis, (b)).*

(ii) *对于拓扑 $\mathcal{T}$, 在 S 上局部地, 带有 G 作用的概形 X 同构于 G 对某个子群概形 H 的 $\mathcal{T}$ 商层. 换言之, 存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使得每个 $X \times_S S_i$ 都代表 $G \times_S S_i$ 对某个子群概形 H_i 的商层.*

在这些条件下, 称 X 是相对于 $\mathcal{T}$ 的G-齐性空间.

证明. 假设 (ii) 成立. 置

$$G_i = G \times_S S_i, \qquad X_i = X \times_S S_i.$$

概形 X_i 在 S_i 上具有截面, 即单位截面 $\varepsilon_i : S_i \to G_i$ 与投影 $\pi_i : G_i \to X_i = G_i/H_i$ 的复合. 因此 $X \to S$ 是覆盖态射.

此外, π_i 是覆盖态射, 因而由 4.2.3 (C 1),(C 2), $\pi_i \times \pi_i$ 也是覆盖态射. 有交换图[68]

$$\begin{array}{ccc} G_i \times_{S_i} X_i & \xrightarrow{\Phi_i} & X_i \times_{S_i} X_i \\ {\scriptstyle \mathrm{id} \times \pi_i}\uparrow & & {\scriptstyle \pi_i \times \pi_i}\uparrow \\ G_i \times_{S_i} G_i & \xrightarrow[\sim]{\Psi_i} & G_i \times_{S_i} G_i, \end{array} \tag{6.7.3.1}$$

其中 Φ_i 由 Φ 经基变换 $S_i \to S$ 得到, Ψ_i 是在点上由

$$(g, g') \longmapsto (gg', g).$$

定义的同构. 复合态射 $(\pi_i \times \pi_i) \circ \Psi_i$ 是覆盖态射; 因而由 4.2.3 (C 3), Φ_i 也是覆盖态射. 所以 Φ 局部地是覆盖态射, 因而由 4.2.3 (C 5), 它就是覆盖态射. 这就证明了 (ii)$\Longrightarrow$(i).

---

[66]编者注: 这一困难显然来自如下事实. 设 $\mathscr{C}'$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个包含 $\mathscr{C}$ 的满子范畴, 例如对于一个比典范拓扑粗的拓扑 $\mathcal{T}$, 取 $\mathscr{C}$ 上的层所成的范畴 $\widetilde{\mathscr{C}_{\mathcal{T}}}$. 若 $f : X \to Y$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射, 则蕴含关系

$$f \text{ 在 } \widehat{\mathscr{C}} \text{ 中为满态射} \Longrightarrow f \text{ 在 } \mathscr{C}' \text{ 中为满态射} \Longrightarrow f \text{ 在 } \mathscr{C} \text{ 中为满态射}$$

一般都是严格的.

[67]编者注: 参见 [Ray70], 定义 VI.1.1.

[68]编者注: Polo–Gille 重版本右上角印为 $G_i \times_{S_i} X_i$. 这里写成 $X_i \times_{S_i} X_i$, 因为作为 $\Phi : G \times_S X \to X \times_S X$ 的基变换的 Φ_i, 以及 $\pi_i \times \pi_i$, 均以它为终点.

反过来, 假设 (i) 成立, 并且先额外假设结构态射 $X \to S$ 具有截面 σ. 由 EGA I, 5.3.13, σ 是浸入. 以下述两个方块均为笛卡尔方块的图 定义 $H = G \times_X S$:

$$\begin{array}{ccccc} H & \longrightarrow & G & \xrightarrow{\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma} & G \times_S X \\ \downarrow & & {\scriptstyle\pi}\downarrow & & {\scriptstyle\Phi}\downarrow \\ S & \xrightarrow{\sigma} & X & \xrightarrow{\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma} & X \times_S X. \end{array} \tag{6.7.3.2}$$

这里, π, $\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma$ 和 $\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma$ 是在点上对 $T \to S$, $g \in G(T)$ 及 $x \in X(T)$ 由下式定义的态射:

$$\pi(g) = g \cdot \sigma_T, \qquad (\mathrm{id}_G \boxtimes \sigma)(g) = (g, \sigma_T), \qquad (\mathrm{id}_X \boxtimes \sigma)(x) = (x, \sigma_T).$$

此时 π 是覆盖态射, H 是 G 的子群概形, 它代表 σ 的稳定子 $\mathrm{Stab}_G(\sigma)$ (参见 I, 2.3.3). 因此, 对每个 $T \to S$,

$$H(T) = \{g \in G(T) \mid g \cdot \sigma_T = \sigma_T\}.$$

以 G/H 表示预层

$$T \longmapsto G(T)/H(T),$$

并设 $a(G/H)$ 为它关于 $\mathcal{T}$ 的伴随层. 前面的构造给出带有 G 作用的预层的交换图:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\pi} & X \\ \downarrow & \nearrow_{\bar\pi} & \\ G/H & & \end{array} \tag{6.7.3.3}$$

其中 $\bar\pi$ 为单态射. 由于 π 是覆盖态射, $\bar\pi$ 也是覆盖态射. 因此由 4.3.12, $\bar\pi$ 诱导同构

$$a(G/H) \xrightarrow{\sim} X.$$

我们已经证明: 若 X 是一个 G-齐性空间, 且 $X \to S$ 具有截面 σ, 则 X 代表商层 G/H, 其中 $H = G \times_X S$ 是 σ 的稳定子.

一般情形下, 由假设存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 使得每个态射

$$X_i = X \times_S S_i \longrightarrow S_i$$

都具有截面 σ_i. 置 $G_i = G \times_S S_i$. 由 Φ 经基变换 $S_i \to S$ 得到的态射

$$\Phi_i : G_i \times_{S_i} X_i \longrightarrow X_i \times_{S_i} X_i$$

仍是覆盖态射.

前面的论证给出

$$X_i \simeq G_i/H_i,$$

其中 H_i 是 σ_i 在 G_i 中的稳定子. 这就完成了 (i)$\Longrightarrow$(ii) 的证明.

参考文献

[**AS**] J. Giraud, *Analysis Situs*, Séminaire Bourbaki, 第 256 篇, 1963 年 5 月.

[**D**] J. Giraud, *Méthode de la descente*, Mémoires de la Société Mathématique de France, 第 2 卷 (1964), 第 iii–viii 页及第 1–150 页.

[**MA**] M. Artin, *Grothendieck Topologies*, 油印讲义, Harvard, 1962.

[**SGA 1**] *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1960–61: Revêtements étales et groupe fondamental*, Lecture Notes in Mathematics 224 (1971); 重排注释版, Documents Mathématiques 3, Société Mathématique de France, 2003.

[**SGA 4**] *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964: Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, 第 I–III 卷, Lecture Notes in Mathematics 269, 270 (1972) 及 305 (1973).

[**TDTE I**] A. Grothendieck, *Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, 第 190 篇, 1959 年 12 月.

[**Ray70**] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Lecture Notes in Mathematics 119, Springer-Verlag, 1970.[69]

[69]编者注: 此条参考文献为增补内容.