# 天体物理与宇宙学

**从恒星结构到宇宙热史**

MIT OpenCourseWare 8.901、8.902 与 8.286 中文主题重编

2026 年 10 月 12 日

读者应已学过大学基础力学、电磁学、热学和量子力学, 能使用多元微积分与常微分方程. 曲率、张量和爱因斯坦方程承接本仓库广义相对论卷; 此处只调用均匀宇宙的 Friedmann 方程, 不重写该卷的几何体系. 本卷先建立光与物质之间的联系, 再研究自引力系统, 最后把同一套能量、输运和统计思想用于膨胀宇宙.

正文为中文主题重编, 并非原文件逐页翻译. 原题题面翻译与解答分开, 原编号由题前定位保留. 8.901 和 8.902 的答案由 AI 独立推导; 8.286 六道测验题核对官方解答后重新展开, 两道官方仅回指作业的题为独立补解. 数值计算随源码附上, 数值检查不代替一般推导.

- 8.901 Astrophysics I, Spring 2006, Deepto Chakrabarty. 官方课程有 26 次课历与十份作业, 没有公开整套讲义. 本卷只从公开课程范围和入选自足作业组织恒星基础, 不宣称全部课堂内容已译出.
- 8.902 Astrophysics II, Fall 2023, Mark Vogelsberger. 讲义署名 Mark Vogelsberger、Stephanie O'Neil、David DePalma. 官方提供 122 页合订本与 21 份分讲文件, 两种形式有重复, 不叠加为独立课程覆盖. 六组作业、期中题组和数值项目实际可取得; 作业答案与正式期末卷未公开. 期中题组按作业计分, 不是 2023 年闭卷期中考试.
- 8.286 The Early Universe, Fall 2013, Alan Guth. 官方列 23 次课历、22 份幻灯文件、十份作业和三次测验及解答. 本卷以均匀膨胀、宇宙热史和暴胀为主, 选八道测验题完整译解, 不把复习题库或每段视频都计为已全译.

基于 MIT OCW 的改编及本项目增补采用 CC BY-NC-SA 4.0: 保留署名, 非商业使用, 相同方式共享. 翻译、重排、补充推导及自绘图不代表 MIT 或原作者认可. 第三方照片、SDSS 图像、受限教材题面及未经确认可复用的数据不收录; 原件只列来源链接和哈希. 逐件清单与未选范围见源码包中的 `sources/` 与 `coverage.md`.

各题所用历史参数沿用题面, 例如 $H_0 = 71\,\mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$, 不将其作为当前观测最佳值. $\rho$ 表示质量密度, $u = \rho c^2$ 表示能量密度; 同一公式中不可混用二者.

# 目录


**1 辐射、测光与物质状态** **1**

1.1 强度与可观测量 . . . 1

1.2 黑体与输运方程 . . . 1

1.3 电离平衡 . . . 1

1.4 电离关系的统计推导 . . . 2

**2 恒星结构、燃烧与演化** **2**

2.1 静水平衡与能量预算 . . . 2

2.2 辐射扩散与对流 . . . 3

2.3 核反应与演化尺度 . . . 3

2.4 平衡尺度与稳定性的区别 . . . 3

**3 简并星、吸积与恒星形成** **4**

3.1 电子简并与多方球 . . . 4

3.2 吸积盘 . . . 4

3.3 云的引力不稳定 . . . 4

3.4 Lane–Emden 方程的检验例 . . . 5

**4 星系的引力势与轨道** **5**

4.1 质量模型 . . . 5

4.2 有效势与本轮运动 . . . 5

4.3 维里定理与弛豫 . . . 6

**5 分布函数、稳定性与星系演化** **6**

5.1 从轨道到统计描述 . . . 6

5.2 盘的局部稳定性 . . . 6

5.3 恒星族与化学演化 . . . 7

5.4 局部盘色散关系的来源 . . . 7

**6 均匀膨胀宇宙** **7**

6.1 尺度因子与红移 . . . 7

6.2 Friedmann 动力学 . . . 8

6.3 宇宙时间与视界 . . . 8

**7 距离、吸收与观测推断** **8**

7.1 三种距离 . . . 8

7.2 超新星与参数退化 . . . 9

7.3 吸收统计与 Lyman–alpha 森林 . . . 9

**8 宇宙热史与轻元素** **9**

8.1 相对论粒子与熵 . . . 9

8.2 反应率与冻结 . . . 10

8.3 核合成与复合 . . . 10

**9 扰动增长与结构形成** **10**

9.1 线性扰动 . . . 10

9.2 统计描述 . . . 11

9.3 球对称坍缩 . . . 11

9.4 质量函数与冷却 . . . 11

9.5 坍缩阈值的早期展开 . . . 11

**10 微波背景与暴胀** **12**

10.1 声学振荡与角谱 . . . 12

10.2 视界问题与加速膨胀 . . . 12

10.3 平直性与量子涨落的边界 . . . 12

10.4 声速和宇宙方差的推导 . . . 13

**11 恒星与气体习题** **13**

**12 星系动力学与宇宙结构习题** **16**

**13 早期宇宙测验习题** **21**

**14 课程来源与使用范围** **24**

**参考文献** **24**

# 1　辐射、测光与物质状态

## 1.1　强度与可观测量

天体通常不能送入实验室. 光的能量、频谱和方向分布便是推断温度、运动与组成的入口. 比强度 $I_\nu$ 定义为沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的射线在时间 $\mathrm{d}t$ 内, 穿过垂直射线的面积 $\mathrm{d}A_\perp$, 在立体角 $\mathrm{d}\Omega$ 和频段 $\mathrm{d}\nu$ 中携带的能量除以这四个增量. 若使用固定面元 $\mathrm{d}A$, 则 $\mathrm{d}A_\perp = \cos\theta\,\mathrm{d}A$. 因而通量为 $F_\nu = \int I_\nu \cos\theta\,\mathrm{d}\Omega$. 各向同性强度在整球上的净通量为零, 在向外半球上的通量为 $\pi I_\nu$. 强度与通量的区别在恒星表面与观测者处尤其重要.

半径为 $R$ 的球对称光源具有光度 $L$, 真空中能量守恒给出 $F = L/(4\pi d^2)$. 没有吸收时同一条射线的 $I_\nu$ 不随距离改变: 物体所占立体角与接收到的通量都按 $d^{-2}$ 缩小. 宇宙膨胀另使 $I_\nu/\nu^3$ 沿自由传播保持不变, 积分后的面亮度按 $(1+z)^{-4}$ 衰减. 后一结论有两个来自光子能量和到达率的因子, 再有两个来自角距离和光度距离之比.

星等是对数亮度: $m_1 - m_2 = -2.5\log_{10}(F_1/F_2)$. 绝对星等 $M$ 定义在 $10\,\mathrm{pc}$, 故无消光且低红移时 $m - M = 5\log_{10}(d/10\,\mathrm{pc})$. 波段星等不能直接等同于总光度; 用不同温度的恒星比较时须保留波段响应和总光度校正. 消光 $A_\lambda$ 使 $m_\lambda$ 增加, 色余 $E(B-V) = A_B - A_V$ 则刻画相对变红.

## 1.2　黑体与输运方程

频率为 $\nu$ 的光子振子平均能量为 $h\nu/(\mathrm{e}^{h\nu/k_\mathrm{B}T}-1)$. 每单位体积、频率有 $8\pi\nu^2/c^3$ 个含两偏振的模, 故

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{\mathrm{e}^{h\nu/k_\mathrm{B}T}-1}, \qquad u_\nu = \frac{4\pi}{c}B_\nu. \tag{1.1}$$

这个分布需要热平衡和光子数可改变, 于是光子化学势为零. $h\nu \ll k_\mathrm{B}T$ 时得到 Rayleigh–Jeans 极限 $B_\nu \simeq 2\nu^2 k_\mathrm{B}T/c^2$; 高频端由指数抑制控制. 由 $B_\lambda\,\mathrm{d}\lambda = -B_\nu\,\mathrm{d}\nu$ 可知两个峰值并不以 $\lambda\nu = c$ 对应, 因为谱密度的横轴不同.

沿射线路径 $s$ 的发射系数 $j_\nu$ 和吸收系数 $\alpha_\nu$ 给出 $\mathrm{d}I_\nu/\,\mathrm{d}s = -\alpha_\nu I_\nu + j_\nu$. 定义 $\mathrm{d}\tau_\nu = \alpha_\nu\,\mathrm{d}s$、源函数 $S_\nu = j_\nu/\alpha_\nu$, 解一阶线性方程得

$$I_\nu(\tau) = I_\nu(0)\mathrm{e}^{-\tau} + \int_0^\tau S_\nu(t)\mathrm{e}^{-(\tau-t)}\,\mathrm{d}t. \tag{1.2}$$

局域热平衡且真吸收主导时 $S_\nu = B_\nu$. 常源函数解为 $I_\nu = I_\nu(0)\mathrm{e}^{-\tau} + B_\nu(1-\mathrm{e}^{-\tau})$. 光学厚介质抹掉背景, 光学薄介质保留背景并加上线积分发射. 散射主导时源函数含辐射场自身, 不能直接以黑体代替.

## 1.3　电离平衡

在稀薄、非简并、局域热平衡气体中, 中性原子、电离离子和电子的化学势满足 $\mu_0 = \mu_1 + \mu_e$. 非相对论粒子的配分因子含热德布罗意体积 $\lambda_T^3 = (2\pi\hbar^2/mk_\mathrm{B}T)^{3/2}$. 对重原子与离子近似等质量, 消去化学势可得

$$\frac{n_e n_1}{n_0} = \frac{2U_1}{U_0}\left(\frac{2\pi m_e k_\mathrm{B}T}{h^2}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\chi/k_\mathrm{B}T}. \tag{1.3}$$

$U_i$ 是不含自由电子自旋的内部配分函数, $\chi$ 为电离能, 前面的 2 是电子自旋简并. 高温不是唯一的电离条件; 低密度也提高电离比例, 因为电离增加粒子可用的平动状态. 公式不能用于强辐照且碰撞不足的光电离气体, 这种情形须比

较实际电离与复合速率.

## 1.4 电离关系的统计推导

为了把 Saha 式与可测密度联系起来, 需说明能量零点. 对非简并粒子 $i$, 单粒子能量写为 $E_i = E_{i0} + p^2/(2m_i)$, Maxwell–Boltzmann 数密度为 $n_i = U_i \lambda_i^{-3} \exp[(\mu_i - E_{i0})/k_{\mathrm{B}}T]$. 反应 $H \leftrightarrow p + e$ 的化学势守恒并不等于三个 $E_{i0}$ 之和为零. 采用中性基态零点, 电离产物的最低总能比它高 $\chi$, 因而消去化学势后有 $\exp(-\chi/k_{\mathrm{B}}T)$. 重离子与原子的热波长比近 1, 留下电子平动因子及电子自旋权重, 得式(1.3).

这一步也说明为什么没有把原子质量放到最终的巨大 $T^{3/2}$ 因子中. 电离额外创造一个可以在空间独立平动的轻电子, 可用状态数正是由它的热波长控制. 在给定密度下半电离路径不是 $k_{\mathrm{B}}T = \chi$, 而是指数与电子平动状态数共同竞争. 对高密度气体, 电荷屏蔽、能级截断与简并会使这里的理想配分函数失效.

辐射扩散同样可以从频率输运明确构造平均值. 局域黑体且光学厚时 $F_\nu = -(4\pi/3\kappa_\nu\rho)(\partial B_\nu/\partial T)\nabla T$. 对频率积分后定义

$$\frac{1}{\kappa_R} = \frac{\int_0^\infty \kappa_\nu^{-1}(\partial B_\nu/\partial T)\,\mathrm{d}\nu}{\int_0^\infty (\partial B_\nu/\partial T)\,\mathrm{d}\nu}.$$

低不透明度频段更容易运走能量, 因而是调和权重. 分母由 $\int B_\nu\,\mathrm{d}\nu = \sigma T^4/\pi$ 求导, 恢复正文的扩散式. 频率平均不是单纯的数学便利, 它对应实际的能量输运方向.

# 2 恒星结构、燃烧与演化

## 2.1 静水平衡与能量预算

恒星长期发光却没有立即坍缩, 说明压力梯度平衡重力, 同时有能量来源补充辐射损失. 球对称、慢于动力学时间变化的恒星以 $r$ 为半径, $m_r$ 为内部质量, $L_r$ 为穿过球面的光度. 质量守恒、力平衡及能量守恒分别为

$$\frac{\mathrm{d}m_r}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2 \rho, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r} = -\frac{G m_r \rho}{r^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}L_r}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2 \rho \epsilon. \tag{2.1}$$

$\epsilon$ 是单位质量净产热率, 演化模型中还须计中微子损失与热储能变化. 这三式尚不封闭: 需要状态方程、能量输运规律以及不透明度和核反应率. 中心条件为 $m_r, L_r \to 0$, 表面则与大气边界匹配; 不能把给定总质量与任意中心温度当作互相独立的自由参数.

粗略地 $P_c \sim GM^2/R^4$、$\rho \sim M/R^3$. 理想气体 $P \sim \rho k_{\mathrm{B}}T/(\mu m_p)$ 于是给 $T_c \sim GM\mu m_p/(k_{\mathrm{B}}R)$. 这解释引力收缩为什么提高温度. 引力能 $W \sim -GM^2/R$, 热平衡下维里关系 $2K + W = 0$ 使总能 $E = W/2 < 0$. 星体丢失能量后 $E$ 更负, $K$ 反而增大; 自引力系统具有这种负热容行为. 仅靠收缩供能的时间 $t_{\mathrm{KH}} \sim GM^2/(RL)$ 远短于太阳的核燃烧寿命.

## 2.2 辐射扩散与对流

当平均自由程 $\ell = (\kappa_R \rho)^{-1}$ 远小于温度变化尺度, 各方向强度仅有小各向异性. 将 $B_\nu[T(s)]$ 按一个自由程展开并作角平均, $\int \cos^2\theta \, \mathrm{d}\Omega = 4\pi/3$, 得 $F = -c\nabla u/(3\kappa_R\rho)$. 使用 $u = a_R T^4$ 后,

$$F_r = -\frac{4 a_R c T^3}{3\kappa_R \rho}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}, \qquad \nabla_{\mathrm{rad}} \equiv \frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}\ln P} = \frac{3\kappa_R L_r P}{16\pi a_R c G m_r T^4}. \tag{2.2}$$

Rosseland 平均是按输运权重定义的不透明度调和平均, 不是任意频率不透明度的算术平均. 若气团上移时热交换慢, 它按绝热梯度 $\nabla_{\mathrm{ad}}$ 冷却. 环境在同一压强下温度下降更快, 即 $\nabla_{\mathrm{rad}} > \nabla_{\mathrm{ad}}$, 则气团较热、密度较低并继续上升. 这就是均匀组成下的 Schwarzschild 对流判据; 有平均分子量梯度时需加入组成稳定项.

## 2.3 核反应与演化尺度

质子间库仑势垒使低能粒子难以接近, 量子隧穿使反应仍可发生. 非共振带电粒子截面可写为

$$\sigma(E) = \frac{S(E)}{E}\exp\left[-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right].$$

Maxwell 分布的 $\exp(-E/k_{\mathrm{B}}T)$ 与隧穿因子竞争, 共同指数 $f(E) = E/k_{\mathrm{B}}T + \sqrt{E_G/E}$ 在 $E_0 = [E_G (k_{\mathrm{B}}T)^2/4]^{1/3}$ 处最小. 对 $f$ 的二阶展开给出反应率主要来自 $E_0$ 附近的有限能段, 即 Gamow 窗口. 这里不将未知的 $S(E)$ 当作已推导常数, 详细核反应网络和实测截面不在本卷范围.

氢转为氦约释放反应质量的 $0.007c^2$. 若可燃质量占总质量的 $f$、氢质量分数为 $X$, 主序寿命估计 $t_{\mathrm{nuc}} \sim 0.007 f X M c^2/L$. 全对流低质量恒星可把更多氢带到燃烧区; 大质量恒星光度增长比质量快, 因而寿命短. 主序离开后的壳层燃烧、核心收缩和外层膨胀可在 H–R 图上区分, 但轨道的精确数值依赖完整输运、质量损失及组成演化, 不能用这一时间估计替代恒星演化程序.

## 2.4 平衡尺度与稳定性的区别

估算恒星中心温度时, 必须区分维里总能与核燃料能. 对均匀球 $W = -3GM^2/(5R)$, 理想单原子气体总热动能 $K = 3Mk_{\mathrm{B}}\bar{T}/(2\mu m_p)$. 维里关系给 $\bar{T} = GM\mu m_p/(5k_{\mathrm{B}}R)$, 它是质量加权平均温度, 不等于中心温度. 中心温度通常更高, 要由具体密度与状态方程求出. 将此平均值的系数直接当作任意恒星中心公式会引入无依据的精度.

球的收缩和稳定也需要新的条件. 设均匀缩放时绝热 $P \propto \rho^\gamma$, 质量固定, 内能 $U \propto R^{-3(\gamma-1)}$, 引力能 $W \propto -R^{-1}$. 写 $E(R) = AR^{-q} - B/R$, $q = 3(\gamma-1)$、$A, B > 0$. 平衡 $E'(R) = 0$ 给 $B = qAR^{1-q}$, 再代二阶导数得 $E'' = q(q-1)AR^{-q-2}$. 因而这个同质缩放模型稳定要求 $\gamma > 4/3$, 临界 $\gamma = 4/3$ 对整体缩放边缘稳定. 这为相对论简并星质量极限提供物理解释, 但不是完整径向正常模分析, 对非均匀组成和强广义相对论星体须重新处理.

核燃烧还可给定温度反馈的直觉. 理想气体星体核心温度升高使反应率提高, 增加的热能推动膨胀, 密度与温度下降, 形成热调节. 简并核压力对温度不敏感, 热输入不能立即以相同方式膨胀调节, 可导致燃烧不稳定. 这解释氦闪的机制方向; 具体发生时刻和峰值必须使用相应反应率、热容和输运, 本卷没有编造未运行的氦闪曲线.

# 3 简并星、吸积与恒星形成

## 3.1 电子简并与多方球

白矮星不依靠高温维持压力. Pauli 原理使电子必须占据不同动量态. 零温时填满 $p \le p_F$, 两自旋态给 $n_e = p_F^3/(3\pi^2\hbar^3)$. 各向同性动量流的压强为

$$P = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3}\int_0^{p_F} p^3 v(p)\,\mathrm{d}p. \tag{3.1}$$

非相对论时 $v = p/m_e$, 因而 $P = K_{\mathrm{NR}}\rho^{5/3}$; 极相对论时 $v = c$, 因而 $P = K_{\mathrm{R}}\rho^{4/3}$. 其中 $\rho = \mu_e m_p n_e$, $\mu_e$ 为每电子对应的质子质量倍数, 并非恒星气体平均分子量 $\mu$.

令 $P = K\rho^{1+1/n}$、$\rho = \rho_c\theta^n$, 取 $r = \alpha\xi$、$\alpha^2 = (n+1)K\rho_c^{1/n-1}/(4\pi G)$. 把静水平衡式乘 $r^2/\rho$ 再求导, 使用质量守恒消去 $m_r$, 得

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}\left(\xi^2\theta'\right) = -\theta^n, \qquad \theta(0) = 1, \quad \theta'(0) = 0. \tag{3.2}$$

中心看似奇异, 正则展开却给 $\theta = 1 - \xi^2/6 + O(\xi^4)$, 可由小正 $\xi$ 启动数值积分. 第一零点 $\xi_1$ 定义表面, $R = \alpha\xi_1$、$M = 4\pi\alpha^3\rho_c[-\xi_1^2\theta'(\xi_1)]$. $n = 3/2$ 时 $R \propto M^{-1/3}$; $n = 3$ 时质量与 $\rho_c$ 无关, 给出 Chandrasekhar 质量尺度. 真实白矮星还受有限温度、库仑修正和逆 $\beta$ 过程影响.

## 3.2 吸积盘

对质量 $M$ 的中心天体, 半径 $r$ 的 Kepler 速度为 $v_K = (GM/r)^{1/2}$. 圆轨道单位质量总能为 $-GM/(2r)$, 进入更小半径必须失去能量和角动量. 因此吸积不仅是物质向内掉落, 还需要应力把角动量向外输运. 薄盘中垂直重力近似 $-\Omega_K^2 z$, 静水平衡给尺度高 $H \sim c_s/\Omega_K$; $H/r \ll 1$ 要求 $c_s \ll v_K$.

对稳态、Kepler 薄盘, 以 $\dot{M} > 0$ 为向内质量流率, 角动量守恒使应力矩满足 $\mathcal{G} = \dot{M}(\sqrt{GMr} - \sqrt{GMr_{\mathrm{in}}})$, 此处使用内缘零应力条件. 每环机械功率来自相邻环的相对角速度, 两面各自辐射通量为

$$F(r) = \frac{3GM\dot{M}}{8\pi r^3}\left(1 - \sqrt{\frac{r_{\mathrm{in}}}{r}}\right). \tag{3.3}$$

积分两面得到 $L = GM\dot{M}/(2r_{\mathrm{in}})$. 这个结果不适用于厚盘、强风、内缘有应力或强相对论区域. 辐射作用于自由电子, 通过电荷耦合带动离子; 比较 $\sigma_T L/(4\pi r^2 c)$ 与质子引力 $GMm_p/r^2$ 得 $L_{\mathrm{Edd}} = 4\pi GMm_p c/\sigma_T$. 这是球对称散射模型的力平衡尺度, 不表示所有盘必须严格低于它.

## 3.3 云的引力不稳定

均匀气体中取小扰动 $\delta\rho, \boldsymbol{v}, \delta\Phi \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}$. 连续方程给 $-\omega\delta\rho + \rho_0\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v} = 0$, Euler 方程给 $\omega\boldsymbol{v} = \boldsymbol{k}(c_s^2\delta\rho/\rho_0 + \delta\Phi)$, Poisson 方程给 $-k^2\delta\Phi = 4\pi G\delta\rho$. 消去两未知量得 $\omega^2 = c_s^2k^2 - 4\pi G\rho_0$. 当 $k < k_J = \sqrt{4\pi G\rho_0}/c_s$ 时扰动增长. 本卷定义 $\lambda_J = 2\pi/k_J$, Jeans 半径为 $R_J = \lambda_J/2$, 故 $M_J = \pi^{5/2}c_s^3/(6G^{3/2}\rho_0^{1/2})$. 不同文献的 Jeans 质量常数可能不同, 必须先声明约定.

这项无限均匀介质线性化以减去背景引力为理想化, 不是有限球的精确边界值解. 坍缩后若近似等温, $P$ 项相对

于重力会越来越弱; 角动量和磁场却可阻止简单球对称坍缩, 所以形成盘、碎裂和角动量输运是恒星形成不可忽略的后续步骤.

### 3.4 Lane–Emden 方程的检验例

从静水平衡可写 $\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{r^2}{\rho}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}\right)=-4\pi G\rho$. 代 $P=K\rho_c^{1+1/n}\theta^{n+1}$、$\rho=\rho_c\theta^n$, 内部导数的 $\theta^n$ 与 $\rho$ 消去, 尺度 $\alpha$ 则消去剩余常数, 得式(3.2). 此推导要求 $n>0$ 与正密度; $n=0$ 的不可压均匀密度球应直接取相应极限方程.

对 $n=0$, 直接积分 $\xi^2\theta'=-\xi^3/3$, 得 $\theta=1-\xi^2/6$, 第一零点 $\sqrt{6}$. 对 $n=1$, 令 $u=\xi\theta$, 方程化为 $u''+u=0$, 正则初值 $u(0)=0, u'(0)=1$, 故 $\theta=\sin\xi/\xi$, 第一零点 $\pi$, 质量参数 $-\pi^2\theta'(\pi)=\pi$. 两个解析例能检验中心处理与数值程序的归一化, 不能因它们可积就假定 $n=3/2,3$ 也有相同闭式.

无量纲曲线的作用是把中心密度与结构形状分开. 对固定 $n,K$, 改变 $\rho_c$ 只重缩放 $\alpha$ 和总质量, 无量纲 $\xi_1, w_n$ 不变. 因此质量半径尺度律是整族模型的结论, 不是某一次中心密度计算的巧合. 接近相对论简并极限时仍要注意, 真正的状态方程从 5/3 连续过渡到 4/3, 并不是突然切换一个全星固定多方指数.

## 4 星系的引力势与轨道

### 4.1 质量模型

星系中恒星分布可用面亮度 $I(R)$ 描述, 转为质量密度需要质量光度比和投影模型. 指数盘 $I\propto \mathrm{e}^{-R/R_s}$ 的面积积分给总光度 $2\pi I_0 R_s^2$. 椭球星系常用 Sérsic 曲线 $I(R)=I_e\exp\{-b_n[(R/R_e)^{1/n}-1]\}$, $b_n$ 由 $R_e$ 包含半光度确定. 一个拟合曲线不能独自区分年龄、金属丰度、尘埃与恒星初始质量函数, 动力学测量能提供额外质量约束.

球对称势满足 $\Phi'(r)=GM(<r)/r^2$, 因而圆速度 $v_c^2=r\Phi'=GM(<r)/r$. 若 $v_c$ 长距离近似常数, 则 $M(<r)\propto r$, 密度近似 $r^{-2}$; 光度已经趋于有限时, 这种质量行为提示暗物质或引力模型需要解释. 不能仅由一条投影旋转曲线无条件唯一恢复三维密度.

常用势密度对包括 Plummer 模型 $\Phi=-GM/\sqrt{r^2+b^2}$、$\rho=3Mb^2/[4\pi(r^2+b^2)^{5/2}]$, 以及 NFW 密度 $\rho=\rho_s/[x(1+x)^2]$, $x=r/r_s$. 对 NFW 积分得 $M=4\pi\rho_s r_s^3[\ln(1+x)-x/(1+x)]$. 未截断的质量对数发散, 因而实际使用必须指定晕边界, 如平均密度达到背景或临界密度某倍数处.

### 4.2 有效势与本轮运动

中心势中轨道平面固定, 单位质量角动量 $\ell=r^2\dot\phi$ 守恒. 径向运动满足 $\dot r^2/2+\Phi_{\mathrm{eff}}=E$, $\Phi_{\mathrm{eff}}=\Phi+\ell^2/(2r^2)$. 转向点是 $E=\Phi_{\mathrm{eff}}$, 圆轨道是有效势驻点. 对轴对称势, 以圆轨道半径 $R_0$ 为中心展开, 保持角动量而不是角速度固定, 得

$$\kappa^2=\Phi''(R_0)+3\frac{\Phi'(R_0)}{R_0}=R\frac{\mathrm{d}\Omega^2}{\mathrm{d}R}+4\Omega^2,\qquad \Omega=\frac{v_c}{R}. \tag{4.1}$$

$\kappa^2>0$ 时小径向扰动为谐振; $\kappa^2<0$ 时圆轨道不稳定. Kepler 势给 $\kappa=\Omega$, 平坦旋转曲线给 $\kappa=\sqrt{2}\Omega$, 后者的轨道一般不是闭合椭圆.

在太阳邻域把差分旋转一阶展开, Oort 常数为 $A=(v_c/R-v_c')/2$、$B=-(v_c/R+v_c')/2$, 因而 $\Omega=A-B$、$v_c'=-(A+B)$、$\kappa^2=-4B(A-B)$. 这些关系使用附近恒星、薄盘和近圆轨道假设, 远处的非圆运动不能都归入同一个局部线性场.

### 4.3 维里定理与弛豫

令 $I=\sum m_i r_i^2$. 两次微分并代入 Newton 方程得 $\ddot I/2=2K+\sum \boldsymbol r_i\cdot\boldsymbol F_i$. 成对 $1/r$ 引力使后一项等于势能 $W$. 长期束缚稳态的时间平均 $\langle\ddot I\rangle=0$, 因而 $2\langle K\rangle+\langle W\rangle=0$. 非孤立系统需保留外场、表面压力等项, 突然坍缩过程中不能直接强加稳态等式.

速度为 $v$ 的粒子以冲量近似经过质量 $m$ 的散射体, 冲量 $\Delta v_\perp\simeq 2Gm/(bv)$. 每时间的遭遇数是 $2\pi b n v\,\mathrm d b$. 积分速度扩散率得 $\mathrm d\langle(\Delta v)^2\rangle/\mathrm dt\simeq 8\pi G^2m^2n\ln\Lambda/v$, $\ln\Lambda=\ln(b_{\max}/b_{\min})$. 定义 $t_{\rm rel}$ 为累计扰动达到 $v^2$ 的时间, 有 $t_{\rm rel}\sim v^3/(8\pi G^2 m\rho\ln\Lambda)$. 星系的巨大 $N$ 通常使二体弛豫慢于年龄; 快速势变化引起的暴烈弛豫则不依靠逐次二体碰撞.

## 5 分布函数、稳定性与星系演化

### 5.1 从轨道到统计描述

令 $f(\boldsymbol x,\boldsymbol v,t)\,\mathrm d^3x\,\mathrm d^3v$ 为相空间体元中的质量. Hamilton 流保持相空间体积, 没有碰撞时沿轨道 $\mathrm df/\mathrm dt=0$, 即

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol v\cdot\nabla_x f-\nabla\Phi\cdot\nabla_v f=0,\qquad \nabla^2\Phi=4\pi G\int f\,\mathrm d^3v. \tag{5.1}$$

势与分布必须自洽, 不能给任意 $f$ 再无条件套用另一个势. 对速度积分时要求 $f$ 在大速度处衰减, 边界项消失. 零阶矩给连续方程; 乘 $v_i$ 再积分得

$$\partial_t(\rho\bar v_i)+\partial_j(\rho\overline{v_iv_j})=-\rho\partial_i\Phi. \tag{5.2}$$

这是 Jeans 方程, 不是一个独立封闭状态方程. 稳态、球对称、无整体径向流时, $\mathrm d(\rho\sigma_r^2)/\mathrm dr+2\beta\rho\sigma_r^2/r=-\rho GM(<r)/r^2$, $\beta=1-(\sigma_\theta^2+\sigma_\phi^2)/(2\sigma_r^2)$. 不同 $\beta$ 可产生相近投影视向速度弥散, 形成质量与各向异性的退化.

### 5.2 盘的局部稳定性

对薄气体盘取轴对称、波长远小于盘尺度的扰动, 局部径向惯性项给 $\kappa^2$, 压强给 $c_s^2k^2$. 薄片的扰动势满足 $\delta\Phi=-2\pi G\delta\Sigma/|k|$, 因而

$$\omega^2=\kappa^2+c_s^2k^2-2\pi G\Sigma|k|. \tag{5.3}$$

对于 $k>0$, 二次式在 $k=\pi G\Sigma/c_s^2$ 最小. 所有局部轴对称模式稳定需 $Q_g=\kappa c_s/(\pi G\Sigma)\ge 1$. 恒星盘的无碰撞响应不同, 不能把恒星速度弥散直接代入气体系数并声称同一个精确判据. 这也说明自引力、速度支持和旋转共同决定稳定性, 单凭盘半径无法在未指定模型时判断全局扰动.

### 5.3 恒星族与化学演化

恒星族综合把初始质量函数 $\xi(m)$ 与单星年龄、组成依赖的光谱 $l_\nu(m,t,Z)$ 卷积, 再对过去的恒星形成率积分. 最亮星未必贡献多数质量, 尘埃还能改变光谱; 因而以光谱恢复历史是有退化的逆问题.

封闭箱模型假设没有流入流出、瞬时回收和充分混合. 令总质量 $M_T$ 固定, 气体质量 $M_g$, 锁入长寿命恒星的增量 $\mathrm{d}M_s=-\mathrm{d}M_g$. 金属气体质量的变化为 $\mathrm{d}(ZM_g)=(y-Z)\,\mathrm{d}M_s$, 其中 $y$ 是每锁入单位质量的新生成金属产额. 展开左侧并消去 $\mathrm{d}M_g$ 得 $M_g\,\mathrm{d}Z=y\,\mathrm{d}M_s$, 初始 $Z=0$ 时积分为 $Z=-y\ln\mu$, $\mu=M_g/M_T$. 这条对数关系是模型推导, 不是任意星系的经验定律. G 型矮星问题、吸积和流出提示它的局限.

活动星系核的能量由黑洞吸积提供, 大致 $L=\eta\dot{M}c^2$. 尘埃环的方向选择可使同一中心发动机在光谱上表现不同, 但所有 AGN 差异并不都由方向解释. 喷流需要磁场、角动量和相对论流动, 本卷使用能量与 Eddington 尺度, 不声称完成磁流体喷流理论.

### 5.4 局部盘色散关系的来源

在半径 $R_0$ 的小区域, 取扰动径向波数 $k$ 与频率 $\omega$, 背景面密度近似常数. 线性连续式是 $-\mathrm{i}\omega\delta\Sigma+\mathrm{i}k\Sigma u_R=0$. 径向与切向 Euler 式为 $-\mathrm{i}\omega u_R-2\Omega u_\phi=-\mathrm{i}k(c_s^2\delta\Sigma/\Sigma+\delta\Phi)$, $-\mathrm{i}\omega u_\phi+\kappa^2u_R/(2\Omega)=0$. 第二式所含的 $\kappa$ 来自差分旋转, 不是任意添上的振荡频率.

无限薄片的扰动 Poisson 方程为 $(\partial_z^2-k^2)\delta\Phi=4\pi G\delta\Sigma\delta(z)$. 两侧衰减解 $\delta\Phi=C\mathrm{e}^{-|k||z|}$ 的导数跨片跳变 $-2|k|C$, 故 $C=-2\pi G\delta\Sigma/|k|$. 再由连续式消去 $\delta\Sigma$、切向式消去 $u_\phi$, 得正文色散关系. 若盘有限厚度, 引力响应因垂直分布被减弱; 若扰动非轴对称或波长接近盘尺度, 这个局部推导不能判断所有全局棒模或旋臂模.

Jeans 方程也可在一个自足模型中检验. 球对称、各向同性系统 $\rho=C/r^2$, 外部势给恒定圆速 $v_c$, 取常数 $\sigma_r^2$. Jeans 方程左侧为 $-2C\sigma_r^2/r^3$, 右侧为 $-Cv_c^2/r^3$, 因而 $\sigma_r^2=v_c^2/2$. 这是等温球尺度关系; 截断、各向异性或可见恒星作为示踪体时, 同一个比例不必保留. 通过检验例能看清密度梯度如何进入动力学质量估计.

## 6 均匀膨胀宇宙

### 6.1 尺度因子与红移

在足够大的尺度上采用均匀、各向同性的近似. 共动坐标把随 Hubble 流运动的星系位置固定, 其实际距离随尺度因子 $a(t)$ 改变. 取今日 $a_0=1$, 则 $H=\dot{a}/a$. $v=HD$ 是同一宇宙时刻相邻共动观察者的距离变化, 大距离的退行率可以超过 $c$, 它不等于局部狭义相对论中的相对速度.

沿平直 FLRW 径向光线有 $\mathrm{d}\chi=c\,\mathrm{d}t/a(t)$. 相邻两个波峰连接同一对共动观察者, 积分端点微小变化给 $\delta t_o/a_o=\delta t_e/a_e$, 所以 $1+z=\lambda_o/\lambda_e=a_o/a_e$. 红移由整个传播期间的几何变化给出, 不需要把遥远星系与地球的比较强行视为单次 Lorentz boost.

## 6.2 Friedmann 动力学

以下调用广义相对论卷已经建立的 FLRW 方程. $\rho$ 为包含全部组分的质量等效密度, $p$ 为压强:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2}, \tag{6.1}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right), \qquad \dot{\rho} + 3H\left(\rho + \frac{p}{c^2}\right) = 0. \tag{6.2}$$

曲率项不表示一种真实物质. 非相互作用组分分别守恒, 常数状态参数 $w = p/(\rho c^2)$ 给 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$. 物质 $w = 0$, 辐射 $w = 1/3$, 真空 $w = -1$. 后者虽然密度恒定, 共动体积内能量随体积增加, 由负压强做功关系补偿, 不应套用无压尘埃的能量直觉.

平直单组分宇宙若 $w > -1$, 由 $\dot{a} \propto a^{-(1+3w)/2}$ 积分得 $a \propto t^{2/[3(1+w)]}$. 物质期 $a \propto t^{2/3}$, 辐射期 $a \propto t^{1/2}$; 真空期须单独积分, 得 $a \propto \mathrm{e}^{Ht}$. 总密度临界值为 $\rho_c = 3H^2/(8\pi G)$, 定义 $\Omega_i = \rho_i/\rho_c$, 则 $\Omega_k = -kc^2/(a^2H^2)$ 且 $\sum \Omega_i + \Omega_k = 1$.

## 6.3 宇宙时间与视界

多组分模型写作

$$E(z)^2 \equiv \frac{H(z)^2}{H_0^2} = \Omega_{r0}(1+z)^4 + \Omega_{m0}(1+z)^3 + \Omega_{k0}(1+z)^2 + \Omega_{\Lambda 0}. \tag{6.3}$$

回望时间 $t_0 - t(z) = H_0^{-1}\int_0^z \mathrm{d}z'/[(1+z')E(z')]$. 年龄是上限改为无穷的积分, 须给出早期组分以保证模型在积分全域有效. 平直物质与真空模型有 $t_0 = 2\,\mathrm{arsinh}\,\sqrt{\Omega_\Lambda/\Omega_m}/(3H_0\sqrt{\Omega_\Lambda})$.

粒子视界 $D_p = a(t)\int_{t_{\mathrm{start}}}^{t} c\,\mathrm{d}t'/a(t')$ 描述到今天能收到的最远因果传播; 事件视界 $D_e = a(t)\int_t^{\infty} c\,\mathrm{d}t'/a(t')$ 描述现在发出的信号能到达的共动范围. 后者仅在积分收敛且模型持续有效时存在. Hubble 半径 $c/H$ 是局部膨胀尺度, 通常不等于前两者. 例如 $a \propto t^p$、$0 < p < 1$ 给 $D_p = ct/(1-p)$, 而持续指数膨胀给 $D_e = c/H$.

# 7 距离、吸收与观测推断

## 7.1 三种距离

由径向光线得共动径向距离 $\chi(z) = cH_0^{-1}\int_0^z \mathrm{d}z'/E(z')$. 曲空间横向距离为 $D_M = a_0 S_k(\chi)$, 其中 $S_k$ 分别为球面、平直或双曲几何的正弦、恒等、双曲正弦形式, 并保留相应曲率半径. 以下数值题的默认平直情形有 $D_M = \chi$.

发射时大小为 $l$ 的物体张角 $\theta = l/D_A$, $D_A = D_M/(1+z)$. 每个光子能量下降 $1+z$, 到达间隔再增加 $1+z$, 所以 $F = L/[4\pi D_M^2(1+z)^2]$. 定义 $D_L$ 使 $F = L/(4\pi D_L^2)$, 得

$$D_L = (1+z)D_M = (1+z)^2 D_A. \tag{7.1}$$

此关系需要光子数守恒和正常的度规光传播; 吸收、透镜选择效应或仪器选择会影响实际测量. 高红移物体的角大小不能用今日实际距离直接除, 宇宙学距离也不能统一称为一个「距离」而省掉定义.

## 7.2 超新星与参数退化

Ia 型超新星通过光变宽度和颜色修正构造距离模数. 典型参数化为 $\mu_i = m_i^* - M + \alpha(s_i - 1) - \beta c_i$, 与 $\mu_{\rm th} = 5\log_{10}[D_L/(\mathrm{Mpc})] + 25$ 比较. $M$ 与 $H_0$ 存在归一化退化, 不能只凭超新星相对距离各自精确确定两者. 若 $\sigma_i^2$ 依赖 $\alpha,\beta$, 简单只最小化 $\sum(\mu_i-\mu_{\rm th})^2/\sigma_i^2$ 会偏向放大分母; 需要完整统计模型或题面指定的迭代权重策略.

低红移展开为 $D_L = (cz/H_0)[1 + (1-q_0)z/2 + O(z^2)]$, $q_0 = \Omega_{m0}/2 - \Omega_{\Lambda 0}$ 对尘埃与真空成立. 很低红移只确定第一项, 较高红移才能比较减速或加速历史. 星系间尘埃使超新星更暗, 可模拟更大距离; 颜色、红外、背景辐射和不同距离探针的比较为这种退化提供检验. 本卷不捏造没有输入数据的最佳拟合.

## 7.3 吸收统计与 Lyman–alpha 森林

沿实际路径 $\mathrm{d}l = c\,\mathrm{d}z/[(1+z)H(z)]$, 共动密度恒定 $n_c$ 的吸收体有实际密度 $n_c(1+z)^3$. 对固定实际截面 $\sigma$, 遭遇概率给

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}z} = n_c \sigma \frac{c(1+z)^2}{H(z)}. \tag{7.2}$$

若指定固定共动截面, 则实际截面还按 $(1+z)^{-2}$ 变, 红移趋势因此改变. 题面中的截面约定必须先确定.

氢的 Lyman–alpha 共振发生在约 1216 埃. 远处类星体光穿过多个中性氢区域, 不同位置的共振因红移落在不同观测波长, 形成森林. 在均匀 Hubble 流的窄线近似下, 由 $\tau_\nu = \int n_{\rm HI}\sigma_\nu\,\mathrm{d}l$ 与频率沿程扫描的速率可得 Gunn–Peterson 光学深度 $\tau_{\rm GP} = \pi e^2 f_\alpha \lambda_\alpha n_{\rm HI}/[m_e c H(z)]$, 此式使用高斯电磁单位. 即使中性分数很小也可能强烈吸收. 光电离平衡 $n_{\rm HI}\Gamma \simeq \alpha(T) n_e n_p$ 使森林同时依赖密度、温度和电离背景, 因而吸收不是单一的密度计; 速度与热展宽也改变谱线.

# 8 宇宙热史与轻元素

## 8.1 相对论粒子与熵

温度高于静止质量时, 粒子速度接近 $c$. 对自由玻色子与费米子, 占据数分别为 $(\mathrm{e}^{E/T}-1)^{-1}$ 和 $(\mathrm{e}^{E/T}+1)^{-1}$; 本节恢复 $k_{\rm B},\hbar,c$ 时写明单位. 动量积分给

$$u = \frac{\pi^2}{30} g_* \frac{(k_{\rm B}T)^4}{(\hbar c)^3}, \qquad s = \frac{2\pi^2}{45} g_{*s} k_{\rm B} \frac{(k_{\rm B}T)^3}{(\hbar c)^3}. \tag{8.1}$$

费米子每自由度对 $g_*$ 的权重为 $7/8$, 若不同粒子温度不同还乘 $(T_i/T)^4$; 熵权重则乘三次方. 辐射压强 $p = u/3$ 由各向同性动量流得到, $s = (u+p)/T$ 使用零化学势. 绝热膨胀时 $s a^3$ 守恒, 所以 $aT \propto g_{*s}^{-1/3}$. 粒子湮灭时 $g_{*s}$ 下降, 仍耦合的粒子升温得比简单 $a^{-1}$ 慢.

## 8.2 反应率与冻结

是否保持平衡取决于每粒子反应率 $\Gamma = n\langle\sigma v\rangle$ 和膨胀率 $H$, 而不只是温度高低. $\Gamma \gg H$ 时体系能跟随平衡分布; $\Gamma \lesssim H$ 时反应来不及调整. 弱相互作用中微子粗略 $\Gamma \sim G_F^2 T^5$, 辐射期 $H \sim T^2/M_{\rm Pl}$, 故宇宙冷却时前者下降更快, 在 MeV 尺度退耦. 此估计不包含精确输运和非瞬时退耦修正.

中微子先退耦后, 电子正电子湮灭只加热光子. 湮灭前与光子耦合的熵自由度为 $2+(7/8)4 = 11/2$, 后为 2, 因而 $T_\gamma/T_\nu = (11/4)^{1/3}$. 中微子温度继续按 $a^{-1}$ 下降. 暗物质若以热遗迹产生, 数密度满足 $\dot n + 3Hn = -\langle\sigma v\rangle(n^2 - n_{\rm eq}^2)$. 用 $Y = n/s$ 消去纯稀释后, 剩余丰度取决于冻结期间的反应积分, 不能只给 $n = n_{\rm eq}$ 并认为今天仍平衡.

## 8.3 核合成与复合

弱平衡阶段的中子质子比近似 $n_n/n_p \simeq \exp[-(m_n - m_p)c^2/k_{\rm B}T]$. 弱反应冻结后中子继续衰变, 直到氘能存活并迅速生成氦. 由于每重子有许多光子, 即使 $k_{\rm B}T$ 已低于氘结合能, 高频尾仍能毁氘, 形成氘瓶颈. 当核反应展开, 大部分存活中子进入 $^4$He, 故氦质量分数近似 $Y_p \simeq 2r/(1+r)$, $r$ 是该时刻中子质子比. 精确 D、He、Li 丰度需要反应网络和速率数据; 此处不把估计标成精密 BBN 计算.

氢复合也发生在远低于 13.6 eV 的温度, 原因同样与光子重子比有关. Saha 关系描述早期平衡, 但后期非平衡复合需要速率方程. 光子的 Thomson 散射率 $n_e\sigma_T c$ 随自由电子减少而下降. 定义向今日的光学深度 $\tau$, 最后散射概率密度与 $\mathrm{e}^{-\tau}|\dot\tau|$ 成正比. 复合、光子退耦与后来再电离是不同过程, 不能视为同一瞬间.

# 9 扰动增长与结构形成

## 9.1 线性扰动

写 $\rho = \bar\rho(1+\delta)$, 把物理速度分为 Hubble 流与特殊速度 $\boldsymbol{u}$. 在共动坐标中连续、Euler 与 Poisson 方程线性化为

$$\dot\delta + \frac{1}{a}\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0,$$
$$\dot{\boldsymbol{u}} + H\boldsymbol{u} = -\frac{1}{a}\nabla\phi - \frac{c_s^2}{a}\nabla\delta,$$
$$\nabla^2\phi = 4\pi G a^2\bar\rho\delta.$$

对第一式求导, 消去速度与势, Fourier 模满足

$$\ddot\delta_{\boldsymbol{k}} + 2H\dot\delta_{\boldsymbol{k}} + \left(\frac{c_s^2 k^2}{a^2} - 4\pi G\bar\rho\right)\delta_{\boldsymbol{k}} = 0. \tag{9.1}$$

此 Newton 近似用于远小于视界、非相对论组分的尺度, 超视界扰动需要相对论且必须指定规范. 在 Einstein–de Sitter 尘埃模型中 $H = 2/(3t)$、$4\pi G\bar\rho = 2/(3t^2)$, 代 $\delta \propto t^p$ 得 $p = 2/3, -1$, 生长模 $\delta \propto a$. 辐射主导时物质扰动的增长受背景抑制, 暗能量主导后也不再近似 $D = a$.

## 9.2 统计描述

取 $\delta(\boldsymbol{x})=\int \mathrm{d}^3k\,\delta(\boldsymbol{k})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}/(2\pi)^3$, 齐次场满足 $\langle\delta(\boldsymbol{k})\delta^*(\boldsymbol{k}')\rangle=(2\pi)^3\delta_D(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')P(k)$. 相关函数 $\xi(r)$ 是 $P$ 的 Fourier 变换; $\Delta^2(k)=k^3P(k)/(2\pi^2)$ 是每对数波数的方差贡献. 原初谱经转移函数与生长因子传播, $P(k,t)=D(t)^2T(k)^2P_{\mathrm{initial}}(k)$ 只在适用的线性范围成立.

给定平滑窗口 $W(kR)$, $\sigma^2(R)=\int\Delta^2(k)|W(kR)|^2\,\mathrm{d}\ln k$. 对实空间球顶帽 $W(x)=3(\sin x-x\cos x)/x^3$, 小 $x$ 极限为 1. 窗口及质量映射 $M=4\pi\bar\rho_0R^3/3$ 必须一起给出, 否则不同 $\sigma(M)$ 不能直接比较.

## 9.3 球对称坍缩

均匀球顶帽在无压尘埃、无壳交叉条件下, 每层满足 $\ddot r=-GM/r^2$. 负能解写成 $r=A(1-\cos\eta)$、$t=B(\eta-\sin\eta)$、$A^3=GMB^2$. 在 $\eta=\pi$ 达最大半径, 在 $2\pi$ 形式上坍为一点. EdS 背景密度为 $1/(6\pi Gt^2)$, 代入球平均密度得到转向密度比 $9\pi^2/16$. 早期展开给线性外推 $\delta_L=(3/5)[3(\eta-\sin\eta)/4]^{2/3}$, 在形式坍缩时为 $\delta_c\simeq1.686$.

若能量守恒且最终满足维里关系, $W=-3GM^2/(5R)$ 导致 $R_{\mathrm{vir}}=R_{\mathrm{ta}}/2$. 因背景密度在 $t_{\mathrm{coll}}=2t_{\mathrm{ta}}$ 时下降四倍, 晕密度因半径减半提高八倍, 最终密度比为 $18\pi^2$. 这些数值是 EdS 理想化, 不可无条件用于任意红移的 ΛCDM.

## 9.4 质量函数与冷却

Gaussian 平滑场超过阈值的体积分数是 $F(>M)=\frac12\,\mathrm{erfc}[\delta_c/(\sqrt2\sigma(M))]$. 在 $\sigma\to\infty$ 的小质量极限只到 $1/2$, 原始 Press–Schechter 计数漏掉嵌套区域. 锐波数滤波使 $\delta$ 随方差 $S$ 作 Markov 随机游走. 将阈值设为吸收壁, 镜像法从自由 Gaussian 核减去镜像核, 首次过壁分布为 $f(S)=\delta_c\exp[-\delta_c^2/(2S)]/(\sqrt{2\pi}S^{3/2})$, 积分为 1. 这解释因子 2, 但实空间顶帽游走并非 Markov, 椭球坍缩和数值晕质量函数还需更多修正.

气体能否形成恒星还取决于冷却. 光学薄气体损失率写作 $n_en_i\Lambda(T)$, 储能约为 $3nk_{\mathrm B}T/2$, 因而 $t_{\mathrm{cool}}=3nk_{\mathrm B}T/(2n_en_i\Lambda)$. 与 $t_{\mathrm{dyn}}\sim(G\rho)^{-1/2}$ 比较可估计哪些晕能快速形成冷气体. $\Lambda$ 的单位和电离、组成约定不能省略, 固定一常数冷却曲线只是数量级模型.

## 9.5 坍缩阈值的早期展开

球顶帽的密度比可以直接用参数解而不用背诵常数. $\rho_{\mathrm{halo}}=3M/[4\pi A^3(1-\cos\eta)^3]$, EdS 背景 $\bar\rho=1/(6\pi GB^2(\eta-\sin\eta)^2)$, 结合 $A^3=GMB^2$ 得

$$1+\delta=\frac{9}{2}\frac{(\eta-\sin\eta)^2}{(1-\cos\eta)^3}.$$

展开 $\eta-\sin\eta=\eta^3/6-\eta^5/120+\cdots$、$1-\cos\eta=\eta^2/2-\eta^4/24+\cdots$, 比值给 $\delta=3\eta^2/20+O(\eta^4)$. 同时 $t\simeq B\eta^3/6$, 线性增长 $t^{2/3}$ 因而唯一匹配为 $\delta_L=(3/20)[6(\eta-\sin\eta)]^{2/3}$, 与正文写法等价. 在 $\eta=2\pi$ 外推得 $\delta_c=(3/20)(12\pi)^{2/3}=1.68647$.

外推的 $\delta_L$ 不是坍缩时真实密度对比, 后者在理想无压模型发散. 两者用途不同: 前者把线性随机场与形成条件联系, 后者描述非线性形状. Press–Schechter 使用的是前者. 后续维里化并非由 $\eta=2\pi$ 的点状解自行产生, 而是额外加入能量守恒和稳态维里假设后用有限半径模型替换.

# 10　微波背景与暴胀

## 10.1　声学振荡与角谱

复合前光子与重子强耦合. 光子提供压强, 重子增加惯性. 若 $R_b = 3\rho_b/(4\rho_\gamma)$, 有效声速 $c_s = c/\sqrt{3(1+R_b)}$. 这是对混合物绝热扰动的 $\delta p/\delta\rho$ 计算, 不是重子的热声速. 引力势推动压缩, 压强推动回弹, 于是每个波数经历不同相位的声学振荡. 共动声视界 $r_s = \int_0^{t_*} c_s\,\mathrm{d}t/a$ 与横向共动距离给角尺度 $\theta_s = r_s/D_M(z_*)$.

天空温度写为 $T(\boldsymbol{n}) = \bar{T}[1+\Theta(\boldsymbol{n})]$, 展开 $\Theta = \sum a_{\ell m}Y_{\ell m}$. 统计各向同性使 $\langle a_{\ell m}a^*_{\ell' m'}\rangle = C_\ell\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}$. 单一天空的估计 $\widehat{C}_\ell = (2\ell+1)^{-1}\sum_m |a_{\ell m}|^2$ 对 Gaussian 场的相对标准差为 $\sqrt{2/(2\ell+1)}$, 即宇宙方差. 小 $\ell$ 可用模式少, 提高仪器精度也不能消除这一统计限制.

在物质主导、大尺度、绝热扰动和忽略势随时间变化的近似下, 引力红移与本征温度共同给 $\Theta \simeq \Phi/(3c^2)$, 即普通 Sachs–Wolfe 项. 随时间变化的势还给积分项, 速度给 Doppler 项, 小尺度有扩散阻尼. 本卷解释来源与尺度, 不把完整 Einstein–Boltzmann 辐射输运求解标作已实现.

## 10.2　视界问题与加速膨胀

在减速的辐射或物质期, 共动 Hubble 尺度 $(aH)^{-1}$ 增长. 今日遥远区域回溯到早期时, 可能没有足够时间通过信号交换达到相似温度. 暴胀的核心条件是 $\ddot{a} > 0$, 等价于 $\mathrm{d}(aH)^{-1}/\mathrm{d}t < 0$. 若一块原本有因果联系的区域在这一时期被拉伸, 以后可包含整个可观测宇宙. 这给视界问题一种机制, 并不自动证明某一个暴胀模型.

取 $c = \hbar = 1$, 最小耦合标量场的均匀能量与压强为 $u = \dot{\phi}^2/2 + V$、$p = \dot{\phi}^2/2 - V$. 场方程 $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V' = 0$ 与 $H^2 = u/(3\bar{M}_{\mathrm{Pl}}^2)$ 相容, $\bar{M}_{\mathrm{Pl}} = (8\pi G)^{-1/2}$. 势能占优时负压强使膨胀加速. 慢滚近似忽略 $\ddot{\phi}$ 与动能, 得 $3H\dot{\phi} \simeq -V'$、$3\bar{M}_{\mathrm{Pl}}^2H^2 \simeq V$. 其自洽条件为

$$\epsilon_V = \frac{\bar{M}_{\mathrm{Pl}}^2}{2}\left(\frac{V'}{V}\right)^2 \ll 1, \qquad |\eta_V| = \left|\bar{M}_{\mathrm{Pl}}^2\frac{V''}{V}\right| \ll 1. \tag{10.1}$$

扩张倍数的对数 $N = \int H\,\mathrm{d}t \simeq \bar{M}_{\mathrm{Pl}}^{-2}\int_{\phi_f}^{\phi_i} V\,\mathrm{d}\phi/V'$; 所需 $N$ 随能标与再加热历史改变, 不能把固定「60」作为对所有模型的严格常数.

## 10.3　平直性与量子涨落的边界

曲率偏离满足 $\Omega - 1 = kc^2/(a^2H^2)$. 减速期偏离放大, 加速期偏离缩小, 因而暴胀能把初始曲率压低. 暴胀结束后场能量必须转为粒子与辐射, 即再加热; 热大爆炸的初始条件并非与再加热无关.

自由轻标量在近 de Sitter 空间的量子涨落经拉伸可提供近尺度不变扰动. 在单场、规范真空、慢滚且扰动线性的假设下, 曲率扰动谱的领先阶结果为 $\mathcal{P}_{\mathcal{R}} = H^2/(8\pi^2\epsilon_H\bar{M}_{\mathrm{Pl}}^2)$, $\epsilon_H = -\dot{H}/H^2$. 这里将曲时空量子模的规范化作为高阶工具引用, 未完成规范不变量量子作用量、再加热微观过程、多场或永恒暴胀的完整论证. 这些边界不会影响前述背景动力学、热史和选定题解的自足推导.

### 10.4 声速和宇宙方差的推导

紧耦合、绝热混合物中 $\delta\rho_b/\rho_b = 3\delta\rho_\gamma/(4\rho_\gamma)$. 总压强扰动只有光子贡献 $\delta p = c^2\delta\rho_\gamma/3$, 总质量等效密度扰动 $\delta\rho = \delta\rho_\gamma[1 + 3\rho_b/(4\rho_\gamma)]$. 比值便是 $c_s^2 = c^2/[3(1 + R_b)]$. 若忽略宇宙膨胀和势缓慢变化, 对局部平面扰动的连续与 Euler 式求导消元得到 $\ddot{\delta}_\gamma + c_s^2 k^2 \delta_\gamma =$ 引力驱动项. 均匀解是余弦和正弦, 每个波数在最后散射时已有不同相位, 因而角谱有多峰而不是一条无结构温度曲线. 膨胀、重子加载及势变化会改变振幅和相位, 精密计算须恢复它们.

对于 Gaussian 各向同性天空, 在实球谐基中某个 $\ell$ 有 $2\ell+1$ 个独立实 Gaussian 模, 每个方差 $C_\ell$. 正规化的平方和为 $\chi^2_{2\ell+1}$, 其均值 $2\ell+1$、方差 $2(2\ell+1)$. 所以 $\mathrm{Var}(\widehat{C}_\ell) = 2C_\ell^2/(2\ell+1)$. 这里假设完整天空、无噪声、Gaussian, 部分天空和噪声会进一步增大估计不确定性. 以复球谐直接计数时 $a_{\ell,-m} = (-1)^m a^*_{\ell m}$, 不可把 $m$ 与 $-m$ 又当作独立复变量并错误多算一倍.

## 11 恒星与气体习题

本章均为 AI 独立推导. 题目采用原题参数; 未指定组成或燃料比例时, 解答列出所用假设. 原题的质量半径系数与物理常数近似另作说明.

**原题定位:** 8.901, Spring 2006, PS2.1, (a)–(d).

**习题 11.1** 给定 $B_\nu = 2h\nu^3/[c^2(\mathrm{e}^{h\nu/k_\mathrm{B}T} - 1)]$. (a) 从频率谱推导波长谱 $B_\lambda$. (b) 积分推导 $F = \sigma T^4$, 可用 $\int_0^\infty x^3/(\mathrm{e}^x - 1)\,\mathrm{d}x = \pi^4/15$, 核查 $\sigma = 5.67 \times 10^{-5}\,\mathrm{erg\,cm^{-2}s^{-1}K^{-4}}$. (c) 求 $B_\lambda$ 峰值的 Wien 位移规律, 数值求解 $5(1 - \mathrm{e}^{-x}) = x$. (d) 求 $B_\nu$ 峰值与温度的关系; 两种峰对应的光子能量应否相同?

**解答.** (a) 因 $\nu = c/\lambda$, 保留 Jacobian 得 $B_\lambda = B_\nu(c/\lambda)c/\lambda^2 = 2hc^2/[\lambda^5(\mathrm{e}^{hc/\lambda k_\mathrm{B}T} - 1)]$. (b) 半球角积分是 $\pi$, 换元 $x = h\nu/k_\mathrm{B}T$ 得 $F = 2\pi(k_\mathrm{B}T)^4 \int x^3/(\mathrm{e}^x - 1)\,\mathrm{d}x/(h^3c^2)$, 所以 $\sigma = 2\pi^5 k_\mathrm{B}^4/(15h^3c^2)$, 实算 $5.6703744 \times 10^{-5}$, 单位如题面. (c) 对 $\lambda^{-5}/(\mathrm{e}^{A/\lambda} - 1)$ 求对数导数, 驻点满足 $5(1 - \mathrm{e}^{-x}) = x$. 非零根 $x = 4.9651142$, 故 $T\lambda_\mathrm{max} = hc/(k_\mathrm{B}x) = 0.289777\,\mathrm{cm\,K}$. (d) 对频率谱同理得 $3(1 - \mathrm{e}^{-x}) = x$, 根 $x = 2.8214394$, $\nu_\mathrm{max}/T = 5.87893 \times 10^{10}\,\mathrm{Hz\,K^{-1}}$. 两峰对应不同光子能量; 它们最大化的是两个不同横轴的密度, Jacobian 不是常数. □

**原题定位:** 8.901 PS2.2, (a)–(c).


**习题 11.2** 纯氢气体密度和温度固定, 电离能 13.6 eV, 原子与离子均取基态. (a) 写出中性与电离氢的 Saha 方程并合理选配分函数. (b) 用电中性 $n_e = n_1$ 与总核数 $n = n_0 + n_1$ 消去密度, 以 $x = n_1/n$ 表示, 检查温度极限. (c) 取 $n = \rho N_A$, $N_A = 6.023 \times 10^{23}\,\mathrm{g^{-1}}$, 求 $x = 1/2$ 的密度温度路径并在 $10^{-10}$–$10^{-2}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ 作双对数图.

**解答.** 取氢基态电子简并 $U_0 = 2$, 裸质子内部权重 $U_1 = 1$, 核自旋共同因子约去, 定义

$$S(T) = \left(\frac{2\pi m_e k_\mathrm{B}T}{h^2}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-\chi/k_\mathrm{B}T}.$$

方程为 $n_e n_1/n_0 = S$. 代约束得 $x^2/(1 - x) = S/n$. 令 $q = S/n$, 正根可稳定写为 $x = 2q/[q + \sqrt{q^2 + 4q}]$. $T \to 0$ 时 $q \to 0$, $x \to 0$; 模型形式上的 $T \to \infty$ 给 $x \to 1$, 但极高温时非相对论假设需更新.

半电离时 $S=n/2$, 所以 $\rho=2S(T)/N_A$. 本图按题面 $N_A$ 作图; 数值脚本另使用 $n=\rho/m_p$ 的现代近似, 端点温度相差约千分之几, 不把两种常数定义混为同一次实算. 路径单调: 降低密度使电离所需温度降低.




□

**原题定位:** 8.901 PS5.1, (a)–(b).

**习题 11.3** 主序低端 $M=0.085M_\odot$, $\log_{10}T_e=3.438$, $\log_{10}(L/L_\odot)=-3.297$; 高端 $M=90M_\odot$, 对应为 $4.722, 6.045$. (a) 估计两者氢燃烧寿命. 低质量星完全对流, 可用全部氢; 高质量星只用内部约 10%. (b) 求两者半径.

**解答.** 题面未给氢丰度, 保留 $X$ 再以 $X=0.7$ 示例. 寿命 $0.007fXMc^2/L$ 在低端 $f=1$ 给 $1.22\times10^{13}\,\mathrm{yr}$, 高端 $f=0.1$ 给 $5.88\times10^{5}\,\mathrm{yr}$. 这些是把当前端点光度固定后的燃料估计, 不是完整演化年龄; 低端远大于宇宙年龄并不矛盾. 由 $L=4\pi R^2\sigma T_e^4$, $R/R_\odot=\sqrt{L/L_\odot}(5772\,\mathrm{K}/T_e)^2$, 依次为 0.0996 与 12.62. □

**原题定位:** 8.901 PS5.5, (a)–(c).

**习题 11.4** 多方星 $P=K\rho^{1+1/n}$ 满足 Lane–Emden 方程, $R=\alpha\xi_1$, $M=4\pi\alpha^3\rho_c[-\xi_1^2\theta'(\xi_1)]$, $\alpha^2=(n+1)K\rho_c^{(1-n)/n}/(4\pi G)$. (a) 消去 $\rho_c$ 推导质量半径关系. (b) 对非相对论白矮星 $n=3/2$, 核查原题系数 $R=1.122\times10^4\,\mathrm{km}(\rho_c/10^6\,\mathrm{g\,cm^{-3}})^{-1/6}(\mu_e/2)^{-5/6}$、$M=0.4964M_\odot(\rho_c/10^6)^{1/2}(\mu_e/2)^{-5/2}=0.7011M_\odot(R/10^4\,\mathrm{km})^{-3}(\mu_e/2)^{-5}$. (c) 对相对论白矮星 $n=3$, 核查 $R=3.347\times10^4\,\mathrm{km}(\rho_c/10^6)^{-1/3}(\mu_e/2)^{-2/3}$、$M=1.457M_\odot(\mu_e/2)^{-2}$. 原题取 $n_e=\rho/(\mu_e m_p)$、$\mu_e\simeq A/Z$.

**解答.** 令 $C=(n+1)K/(4\pi G)$、$w_n=-\xi_1^2\theta'(\xi_1)$. 当 $n\neq1$, 从 $R=\sqrt{C}\rho_c^{(1-n)/(2n)}\xi_1$ 解出 $\rho_c=(R/(\sqrt{C}\xi_1))^{2n/(1-n)}$. 代入质量得到

$$M=4\pi C^{n/(n-1)}R^{(3-n)/(1-n)}\xi_1^{(n-3)/(1-n)}w_n.$$

由动量积分得 $K_{\mathrm{NR}}=(3\pi^2)^{2/3}\hbar^2/[5m_e(\mu_e m_b)^{5/3}]$、$K_{\mathrm{R}}=(3\pi^2)^{1/3}\hbar c/[4(\mu_e m_b)^{4/3}]$. $m_b$ 是每核子质量近似. 数值积分给 $(\xi_1,w_n)=(3.653754,2.714055)$ 与 $(6.896849,2.018236)$. 于是分别有 $R\propto\rho_c^{-1/6}\mu_e^{-5/6}$、$M\propto\rho_c^{1/2}\mu_e^{-5/2}$, 和 $R\propto\rho_c^{-1/3}\mu_e^{-2/3}$、$M\propto\mu_e^{-2}$, 均符合题面尺度律.

原题印刷系数使用历史常数与每核子质量近似. 严格按现代 $m_b=m_p$ 实算, 非相对论组为 $11148\,\mathrm{km}$ 与 $0.4872M_\odot$, 相对论组为 $33297\,\mathrm{km}$ 与 $1.4353M_\odot$, 与原题差约百分之一至二. 若用 $m_b=m_u$ 并使 $\mu_e=A/Z$, 质量约

为 $0.4961M_\odot$、$1.4562M_\odot$, 更接近原题. 不能同时要求现代质子质量的精确代入与印刷近似系数逐位相等. $n=3$ 的极限质量表示相对论简并支撑的尺度, 不是完整稳定性分析. □

**原题定位:** 8.901 PS10.1, (a)–(c), 原作业不提交、不评分.

**习题 11.5** 质量 $M_1, M_2$ 的圆轨道双星在共转坐标中的 Roche 势为 $\Phi = -GM_1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1| - GM_2/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2| - |\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}|^2/2$. 星 2 经 $L_1=(x_L,0,0)$ 溢出. (a) 用 $\nabla\Phi(L_1)=0$ 证明横向势增量数量级为 $\Omega^2(\Delta y)^2$. (b) 用能量说明溢出斑块半径 $\Delta y \sim c_s/\Omega$. (c) 推导 $-\dot{M}_2 \sim \rho c_s^3 P_{\rm orb}^2/(4\pi)$, 并说明深入恒星内部时流率为何增加.

**解答.** 应估计势差, 势零点可任意选择. 一阶 Taylor 项为零, 二阶横向系数为 $GM_1/d_1^3 + GM_2/d_2^3 - \Omega^2$, 与轨道 $\Omega^2$ 同阶, 故 $\Phi(x_L,\Delta y,0)-\Phi(L_1)\sim\Omega^2(\Delta y)^2$. 热能每单位质量约 $c_s^2$, 能越过势垒的横向范围满足 $\Omega^2(\Delta y)^2 \lesssim c_s^2$. 穿流速度约 $c_s$, 面积约 $\pi(c_s/\Omega)^2$, 故 $-\dot{M}_2 \sim \pi\rho c_s^3/\Omega^2 = \rho c_s^3 P_{\rm orb}^2/(4\pi)$. 系数仅为数量级. 深处 $\rho, T$ 增加, $c_s\propto T^{1/2}$, 流率随 $\rho T^{3/2}$ 增加. □

**原题定位:** 8.901 PS10.2, (a)–(c).

**习题 11.6** 中心星质量 $M$, 薄吸积盘在 $z=0$ 平面, 半径 $r$ 处半厚度 $H \ll r$, 盘自引力忽略. (a) 写垂直静水平衡式. (b) 证明 $H \simeq (c_s/v_K)r$, $c_s \simeq \sqrt{P/\rho}$. (c) 解释薄盘条件与超声速轨道运动的等价性.

**解答.** 精确垂直重力为 $-GMz/(r^2+z^2)^{3/2}$, 在 $z \ll r$ 时 $\partial_z P = -\rho\Omega_K^2 z$. 若等温, $P=c_s^2\rho$, 积分得 $\rho(z)=\rho(0)\exp[-z^2/(2H^2)]$, $H=c_s/\Omega_K = c_s r/v_K$. 非等温盘中这是尺度估计. 所以 $H/r = c_s/v_K$, 薄盘要求轨道速度远大于声速. 原题 (b) 的大写 $R$ 按上下文指当地半径 $r$. □

**原题定位:** 8.901 PS10.3, (a)–(c).

**习题 11.7** 均匀分子云 $T=150\,\mathrm{K}$、粒子数密度 $10^8\,\mathrm{cm^{-3}}$, 边缘压强近零. 径向运动方程 $\rho\ddot{r} = -GM_r\rho/r^2 - \mathrm{d}P/\mathrm{d}r$. (a) 用理想气体估计起始 $|\mathrm{d}P/\mathrm{d}r| \sim P_c/R_J$, 取 Jeans 质量与半径. (b) 验证压强与引力在数量级上相当. (c) 说明等温收缩后压强相对重力变弱.

**解答.** 假设分子为纯 $\mathrm{H_2}$, $\mu=2$; 题面未指定组成, 其他选择改变系数. 依第3章的约定, $\rho=2m_p n$, $c_s^2 = k_{\rm B}T/(2m_p)$, 得 $R_J = 986\,\mathrm{AU}$、$M_J = 2.265M_\odot$. $P_c/R_J \simeq 1.40\times10^{-21}\,\mathrm{Pa\,m^{-1}}$, $GM_J\rho/R_J^2 \simeq 4.62\times10^{-21}\,\mathrm{N\,m^{-3}}$, 比值约 0.30, 在粗估精度内相当.

收缩后同一质量 $M$ 固定, $\rho\propto R^{-3}$. 等温时压强梯度 $P/R\propto R^{-4}$, 引力力密度 $GM\rho/R^2\propto R^{-5}$, 前者与后者比值正比于 $R$. 一旦引力胜过压力, 后续等温缩小不会单靠压力恢复平衡. □

**原题定位:** 8.901 PS10.4.

**习题 11.8** 对上一题的 Jeans 云估计引力势能每单位体积, 与 $B = 10\,\mu\mathrm{G}$ 的磁能密度比较, 判断磁场是否显著影响该模型的坍缩.

**解答.** 均匀球 $|W| = 3GM^2/(5R)$, 除体积得 $u_G = 4.09 \times 10^{-7}\,\mathrm{J\,m^{-3}}$. $10\,\mu\mathrm{G} = 10^{-9}\,\mathrm{T}$, SI 磁能密度 $u_B = B^2/(2\mu_0) = 3.98 \times 10^{-13}\,\mathrm{J\,m^{-3}}$, 比值约 $9.7 \times 10^{-7}$. 对所给弱场和致密均匀云, 初始磁能很小. 结论不包括磁通冻结后的场增长、磁支撑的方向性和其他云参数. □

**原题定位:** 8.901 PS10.5, (a)–(d).

**习题 11.9** (a) 写含固定轴旋转的云径向自由落体式. 初始径向速度零, $r_f \ll r_0$, 以角动量守恒证明停转向半径 $r_f \simeq \omega_0^2 r_0^4/(2GM_r)$. 原题允许全程刚体转动这一不准确假设. (b) $M = 1M_\odot, r_0 = 0.5\,\mathrm{pc}, r_f = 100\,\mathrm{AU}$, 求初始角速度与边缘线速度. (c) 初始均匀球、末态均匀盘, 以总角动量守恒求末态边缘旋转速度. (d) 求末态公转时间并与 Kepler 周期比较, 解释差异.

**解答.** 对无转矩质量元 $j = \omega_0 r_0^2$, $\ddot r = -GM_r/r^2 + j^2/r^3$. 乘 $\dot r$ 积分, 得 $\dot r^2/2 - GM_r/r + j^2/(2r^2) = -GM_r/r_0 + j^2/(2r_0^2)$. 若右侧相对转向点各项可忽略, 得 $r_f = j^2/(2GM_r)$. 这是偏心轨道的近日点估计, 不是圆化半径 $j^2/(GM_r)$.

代入给定量得 $\omega_0 = 2.6473 \times 10^{-16}\,\mathrm{s^{-1}}$, $v_0 = 408.4\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$. (c) 使用总惯量 $I_0 = 2Mr_0^2/5$、$I_f = Mr_f^2/2$, 因而 $\omega_f = (4/5)\omega_0(r_0/r_f)^2$, $v_f = 3.370\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. 周期为 884 yr, Kepler 周期约 1000 yr. 末速是 $(4/5)\sqrt{2}$ 倍 Kepler 速度. (a) 保持单元 $j$, (c) 改用全体惯量并改变形状, 两者不构成严格自洽的单一刚体流体解; 也没有耗散圆化过程, 因此两周期不应精确相同. 这一差异不能被误写成稳定盘可以任意超 Kepler 转动. □

# 12 星系动力学与宇宙结构习题

本章均为 AI 独立解答. 8.902 官方没有公开作业答案. 原题缺少唯一数值所需的参数时, 给出参数表达式, 再以明确假设算例; 算例不冒充源文件的数据测量.


**原题定位:** 8.902 Fall 2023, PS2.1, 三倍权重.


**习题 12.1** 球对称势 $\Phi = v_c^2 \ln(r/r_{\mathrm{ref}})$ 中一恒星在远心点速度为 $v_c/2$. 数值积分并画轨道平面位置, 取绘图间隔约为径向周期的 1/50, 展示 50–100 个轨道周期, 同时给连续曲线与反映停留概率的点图, 简述结果. 数值步长可比绘图间隔小; 给出方程与代码.

**解答.** 取远心距 $r_a$ 为长度单位、$r_a/v_c$ 为时间单位, 平面方程为 $\ddot{\boldsymbol r} = -\boldsymbol r/r^2$, 初值 $(x, y, \dot x, \dot y) = (1, 0, 0, 1/2)$. 能量 $E = 1/8$, 角动量 $\ell = 1/2$. 非平凡近日点满足 $\ln r + 1/(8r^2) = 1/8$, 得 $r_p = 0.310885$. 径向周期积分为

$$T_r = 2\int_{r_p}^{1} \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{2[1/8 - \ln r - 1/(8r^2)]}} = 2.984886.$$

代码使用 DOP853, 内步长最多 $T_r/150$, 相对容差 $10^{-11}$, 积分 75 个径向周期, 按 $T_r/50$ 采样 3750 点. 能量最大误差 $6.9\times10^{-13}$, 角动量误差 $4.9\times10^{-14}$; 已实际运行, 但有限误差检查不证明任意时间的数值稳定性.




轨道进动而形成玫瑰线; 等时间点在远心处较密, 因为径向和角运动都慢. 「75 周期」指径向周期, 不把不闭合轨道称为 75 个相同椭圆. 完整代码和采样点位于源码包 `scripts/` 和 `qa/`. □

**原题定位:** 8.902 PS2.2, (A)–(C).

**习题 12.2** Mestel 盘势 $\Phi = v_c^2[\ln(r/r_{\rm ref}) + \ln((1+|\cos\theta|)/2)]$. (A) 证明盘面旋转曲线平坦. (B) 证明质量密度在 $z\neq0$ 时为零, 盘面上呈无限薄集中. (C) 对 $z$ 积分证明有限面密度 $\Sigma(R) = v_c^2/(2\pi GR)$.

**解答.** 用柱半径 $R$, 球半径 $r=\sqrt{R^2+z^2}$, 势写成 $v_c^2\ln[(r+|z|)/(2r_{\rm ref})]$. 在 $z=0$ 有 $R\partial_R\Phi = v_c^2$, 故圆速恒定. 对 $z>0$, $\partial_z\Phi = v_c^2/r$, $\partial_R\Phi = v_c^2R/[r(r+z)]$, 代柱坐标 Laplacian 可验证 $\nabla^2\Phi=0$; 下半空间由对称性相同. 跨盘面 $\partial_z\Phi$ 从 $-v_c^2/R$ 跳至 $+v_c^2/R$, 所以分布意义下 $\partial_z^2\Phi$ 有 $2v_c^2\delta(z)/R$ 项. 由 Poisson 方程, $\rho=\Sigma(R)\delta(z)$, $\Sigma = v_c^2/(2\pi GR)$. 「无穷密度」应理解为 delta 分布, 不是一个可当普通函数代入的无穷数. 未截断模型总质量发散, 实际盘须有限范围. □

**原题定位:** 8.902 PS3.1, (A)–(E).

**习题 12.3** 无限薄差分旋转盘圆速 $v_c(R)$, 附近恒星与太阳距离 $d\ll R_0$, 银经 $l$. (A) 证明相对视向与横向速度 $v_r = Ad\sin2l$, $v_T = d(A\cos2l+B)$, $A=(v_c/R-v_c')/2$, $B=-(v_c/R+v_c')/2$. 取 $A=14.82\pm0.84$, $B=-12.37\pm0.64$ 单位 $\mathrm{km\,s^{-1}kpc^{-1}}$, $R_0=8.5\,\mathrm{kpc}$, 只用中心值: (B) 求圆速与太阳公转周期; (C) 求局部剪切 $v_c'$; (D) 求本轮频率; (E) 求每次公转中的本轮次数.

**解答.** 用精确的局部观测几何式 $v_r=[R_0\Omega(R)-v_0]\sin l$, $v_T = R_0[\Omega(R)-\Omega_0]\cos l - \Omega(R)d$. 由 $R-R_0 = -d\cos l + O(d^2/R_0)$ 及 $R_0\Omega_0' = v_c' - v_0/R_0 = -2A$, 一阶给 $v_r = 2Ad\cos l\sin l = Ad\sin2l$. 横向分量为 $2Ad\cos^2 l - \Omega_0 d = d[A\cos2l + (A-\Omega_0)]$. 使用 $A-\Omega_0=B$ 得题面式. 横向正向与银经增加方向一致; 改变正向会使整式变号.

$\Omega_0 = A-B = 27.19$, $v_0 = R_0(A-B) = 231.115\,\mathrm{km\,s^{-1}}$, $2\pi/\Omega_0 = 225.95\,\mathrm{Myr}$. 剪切 $v_c' = -(A+B) = -2.45\,\mathrm{km\,s^{-1}kpc^{-1}}$. 由式(4.1), $\kappa=\sqrt{-4B(A-B)} = 36.679\,\mathrm{km\,s^{-1}kpc^{-1}}$, 每个引导中心周期内 $\kappa/\Omega_0 = 1.349$ 次本轮振荡. □

**原题定位:** 8.902 PS4.1, (A)–(C).

**习题 12.4** 默认 $\Omega_m = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7, H_0 = 71\,\mathrm{km\,s^{-1}Mpc^{-1}}$. 两个 Hubble 流吸收星系的 $\mathrm{Si}^{++}$ 线静止波长 1206 埃, 观测波长 4711, 4836 埃. (A) 求两星系共动视向距离; (B) 较近星系在其吸收光时刻看较远星系的红移是多少? (C) 对小红移间隔, 用早期 $H(z)$ 建立 (A)、(B) 的近似关系并估计距离.

**解答.** $z_1 = 2.906302, z_2 = 3.009950$, 共动间距 $\Delta\chi = (c/H_0)\int_{z_1}^{z_2} \mathrm{d}z/E(z) = 99.621\,\mathrm{Mpc}$. 同一段光线在近星系时波长相对远处发射波长增加 $a_1/a_2$, 故 $1 + z_{21} = (1+z_2)/(1+z_1)$, $z_{21} = 0.026534$. 小间隔下 $\Delta\chi \simeq c\Delta z/H(z_1) = c(1+z_1)z_{21}/H(z_1)$, $H(z) = H_0\sqrt{0.3(1+z)^3+0.7}$, 给约 101.5 Mpc. 若用中点 $H$ 则更接近精确积分. 对应近星系吸收时的实际间距须再除 $1+z_1$. □

**原题定位:** 8.902 PS4.2, (A)–(B).

**习题 12.5** 吸收体随机分布, 共动数密度 $n$ 恒定、吸收截面 $\sigma$ 恒定. (A) 求平均视线每红移吸收体数, 判断随红移增减. (B) 在 $z \sim 1.5$–$2.5$, 观测 $\mathrm{d}N/\mathrm{d}z \sim 2$, 典型亮星系 $n \sim 0.001\,\mathrm{Mpc}^{-3}$, 求 $z \sim 2$ 所需截面.

**解答.** 将恒定截面理解为**实际**面积, 式(7.2)给 $\mathrm{d}N/\mathrm{d}z = nc\sigma(1+z)^2/H(z)$. 对题面的物质和真空模型, $\mathrm{d}\ln[(1+z)^2/H]/\mathrm{d}\ln(1+z) = 2 - 3\Omega_m(z)/2 > 0$, 故增加. $z = 2$ 给 $\sigma = 0.1561\,\mathrm{Mpc}^2$, 圆形吸收半径 $\sqrt{\sigma/\pi} = 0.223\,\mathrm{Mpc}$. 若截面指固定共动面积, 上式红移因子不同, 答案也改变; 本解没有把两种约定混用. □

**原题定位:** 8.902 PS4.3, (A)–(D).

**习题 12.6** (A) 求复合面上包含一个星系质量的球区域张角. (B) 求直径 200 共动 Mpc 区域在复合面的张角. (C) 求复合时粒子视界内总质量. (D) 求宇宙刚进入物质主导时视界内总质量. 视界是自宇宙起始至该时刻的实际光传播距离.

**解答.** 原题未指定星系质量、复合红移与辐射密度, 因而不能唯一给四个数值. 令 $M_g, z_*, \Omega_{r0}$ 为参数. 共动球半径 $R_c = (3M_g/(4\pi\rho_{m0}))^{1/3}$, (A) 的直径张角为 $2R_c/\chi(z_*)$, (B) 为 $200\,\mathrm{Mpc}/\chi(z_*)$. 粒子视界共动半径 $\chi_p(a) = cH_0^{-1}\int_0^a \mathrm{d}x/\sqrt{\Omega_{r0}+\Omega_{m0}x+\Omega_{\Lambda0}x^4}$, 实际半径为 $a\chi_p$. 物质质量是 $M_m = 4\pi\rho_{m0}\chi_p^3/3$; 若「总质量」含辐射能的等效质量, 应为 $M_{\mathrm{tot}} = M_m[1 + \Omega_{r0}/(\Omega_{m0}a) + \Omega_{\Lambda0}a^3/\Omega_{m0}]$. 真空项在本题早期极小.

示例明确取 $M_g = 10^{12}M_\odot, z_* = 1100, \Omega_{r0} = 8.5\times10^{-5}$. (A) 约 0.914 角分, (B) 约 0.8535°. (C) 物质质量 $3.565\times10^{18}M_\odot$, 含辐射的总等效质量约 $4.68\times10^{18}M_\odot$. (D) 等密度时 $a_{\mathrm{eq}} = \Omega_{r0}/\Omega_{m0}$, 物质质量 $2.184\times10^{17}M_\odot$, 总等效质量约 $4.368\times10^{17}M_\odot$. 仅含物质与真空且设 $\Omega_r = 0$ 的模型没有辐射到物质的转折, 不能用于 (D). □

**原题定位:** 8.902 PS5.1, (A)–(E).

**习题 12.7** 银河与 M31 当前间距 700 kpc, 相对径向速度 $-121\,\mathrm{km\,s^{-1}}$, 宇宙年龄取 $13.7\times10^9$ yr. 理想径向两体模型 $r=A(1-\cos\eta), t=B(\eta-\sin\eta)$. (A) 推导 $v=(r/t)\sin\eta(\eta-\sin\eta)/(1-\cos\eta)^2$. (B) 用 Newton 方程证明 $GM_T=A^3/B^2=r^3(\eta-\sin\eta)^2/[t^2(1-\cos\eta)^3]$. (C) 求当前 $\eta$; (D) 求总质量, 总光度 $3\times10^{10}L_\odot$ 时的质量光度比. (E) 若两星系等质量、银河圆速合理取值, 暗晕需延伸多远? 原题印有 $M(<R)=v_c^2R/(2G)$.

**解答.** 参数微分给 $v=(A/B)\sin\eta/(1-\cos\eta)$, 用 $A=r/(1-\cos\eta)$、$B=t/(\eta-\sin\eta)$ 得 (A). 再求加速度 $\ddot r=-A/[B^2(1-\cos\eta)^2]=-A^3/(B^2r^2)$, 与两体方程比较得 (B). 收缩支取 $\pi<\eta<2\pi$, 数值根 $\eta=4.297242$. 总质量 $3.994\times10^{12}M_\odot$, 质量光度比 $133.1\,M_\odot/L_\odot$.

球对称圆轨道力平衡应为 $M(<R)=v_c^2R/G$, 原题分母的 2 与圆速定义不相容, 此处明示修正. 取 $v_c=220\,\mathrm{km\,s^{-1}}$、银河为总质量的一半, $R=177.4\,\mathrm{kpc}$. 按印刷式会得 354.9 kpc, 但它不满足同一模型的力平衡. 此 timing 模型忽略横向速度、质量增长、潮汐与真空力, Birkhoff 定理也不能把任意有限星系对精确变成均匀闭宇宙; 因此质量为理想化估计. □

**原题定位:** 8.902 PS6.1, (A)–(D).

**习题 12.8** EdS 球顶帽在 $z=8$ 达到最大半径. (A) 求动力学自由落体时间, 可引用转向密度比. (B) 假设引力势能用于加热理想气体, 求维里化后温度随 $M$ 的关系, 按 $10^{12}M_\odot$ 归一化. (C) 重子质量占 5%, 无冷却以外的机制, $\Lambda(T)=10^{-23}\,\mathrm{erg\,cm^3 s^{-1}}$, 求冷却时间. (D) 比较冷却和动力学时间, 估计能形成星系的最大特征质量. 原题未指定气体平均粒子质量或精确能量分配.

**解答.** 以 $\Omega_{m0}=0.3, H_0=71$ 作为早期 EdS 背景归一化, $\rho_{\rm ta}=(9\pi^2/16)\rho_{m0}(1+8)^3$. 由均匀球从静止坍缩时间 $t_{\rm ff}=\sqrt{3\pi/(32G\rho_{\rm ta})}$ 得 621 Myr. 维里半径 $R_v=R_{\rm ta}/2$, 晕密度 $8\rho_{\rm ta}$, $M=10^{12}M_\odot$ 时 $R_v=56.0\,\mathrm{kpc}$.

先给能量守恒且满足维里关系的标准解释: 平均单位质量热能对应 $|W|/(2M)$, 理想气体得

$$T_v=\frac{\mu m_pGM}{5k_{\rm B}R_v}\propto M^{2/3}.$$

若按题面「全部引力势能」的字面取 $|W|/M$ 而不是维里热能, 系数应加倍, 且不能同时声称已满足同一个封闭体系的维里能量预算. 以下使用标准维里解释, $\mu=1$ 给 $T_v=1.861\times10^6(M/10^{12}M_\odot)^{2/3}\,\mathrm{K}$; 完全电离纯氢有 $\mu=1/2$, 温度减半.

取冷却曲线定义为 $\mathcal{L}=n_en_p\Lambda$, 纯氢 $n_p=0.05\rho_v/m_p$, 储热为 $3n_pk_{\rm B}T$ (含电子和质子), 得 $t_c=3k_{\rm B}T/(n_p\Lambda)$. 若用 $\mu=1$ 温度尺度作数量级归一化, $t_c=888\,\mathrm{Myr}(M/10^{12}M_\odot)^{2/3}$, 最大质量 $5.84\times10^{11}M_\odot$. 完全电离且 $\mu=1/2$ 的自洽选取给 $t_c=444\,\mathrm{Myr}$、$M_{\max}=1.65\times10^{12}M_\odot$. 两种系数约定及原题热能措辞说明本题只支持数量级 $10^{12}M_\odot$, 不能伪造唯一精确质量. 真实冷却曲线并非在整个质量范围恒定. □

**原题定位:** 8.902 PS6.2, (A)–(B).

**习题 12.9** (A) 积分 Press–Schechter 的原始体积分数, 证明只计入一半质量. (B) 说明 excursion-set / extended Press–Schechter 的基本思想, 它怎样消除因子 2 问题. 原题引用 Bond 等人 1991 年工作作为阅读方向, 不要求复录论文.

**解答.** 以零均值 Gaussian 密度对比、方差 $S$ 为起点, $F=\int_{\delta_c}^{\infty}\exp[-\delta^2/(2S)]\,\mathrm{d}\delta/\sqrt{2\pi S}=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}(\delta_c/\sqrt{2S})$. 从大质量 $S\to 0$ 至小质量 $S\to\infty$, 总分数只能增加到 $1/2$. 漏计来源是某尺度上的低密度点仍可能属于更大尺度已经坍缩的区域, 即 cloud-in-cloud 问题.


锐波数滤波在独立 Gaussian 模假设下使增量独立, 分布满足 $\partial_S P=\frac{1}{2}\partial_\delta^2 P$. 在 $\delta_c$ 设吸收壁, 镜像法给 $P=[\mathrm{e}^{-\delta^2/(2S)}-\mathrm{e}^{-(2\delta_c-\delta)^2/(2S)}]/\sqrt{2\pi S}$, $\delta<\delta_c$. 首过壁概率流为 $f(S)=\delta_c\mathrm{e}^{-\delta_c^2/(2S)}/(\sqrt{2\pi}S^{3/2})$. 换元 $u=\delta_c/\sqrt{S}$ 得 $\int_0^\infty f(S)\,\mathrm{d}S=1$. 通过「第一次过壁」给每个质量元指定最大归属尺度, 不再重复或漏掉嵌套区域. 对非 Markov 滤波或非 Gaussian 场, 这一简单镜像结果不普遍成立. □

**原题定位:** 8.902 期中题组 Q2, (A)–(B), 按作业计分.

**习题 12.10** 封闭箱化学模型 $Z=-y\ln\mu$, 产额 $y$ 恒定, 当前气体金属丰度 $Z_0$. (A) 推导归一化恒星累积分布 $M_s(<Z)=(1-\mathrm{e}^{-Z/y})/(1-\mathrm{e}^{-Z_0/y})$, 并用物理解释支持公式. (B) 求 $\mathrm{d}M_s/\mathrm{d}\log_{10}Z$, 作示意并求峰位置.

**解答.** 充分混合使在某时刻形成的恒星继承当时气体丰度. 随气体分数由 1 降至 $\mu$, 锁入恒星的质量为 $M_T(1-\mu)$, 而 $\mu=\mathrm{e}^{-Z/y}$. 以今天全部恒星质量 $M_T(1-\mathrm{e}^{-Z_0/y})$ 归一化即得 (A). 它适用 $0\le Z\le Z_0$, 超出上界累积为 1.

微分得 $\mathrm{d}M_s/\mathrm{d}\log_{10}Z=(\ln 10)Z\mathrm{e}^{-Z/y}/[y(1-\mathrm{e}^{-Z_0/y})]$. 无截断曲线在 $Z=y$ 达峰; 若 $Z_0<y$, 可观测区间峰在右端 $Z_0$. 图取示意 $Z_0=3y$, 横轴 $x=\log_{10}(Z/y)$:




□

**原题定位：** 8.902 期中题组 Q3.

**习题 12.11** 只考虑二体弛豫，总质量相同的星系若由各为 $10^6 M_\odot$ 的球状星团构成，比由单个恒星构成的星系弛豫更快还是更慢？给定量关系与直觉解释.

**解答.** 固定宏观密度与速度，$t_{\rm rel} \propto 1/(m \ln\Lambda)$. 若单星质量取 $1M_\odot$，则 $t_{\rm cluster}/t_{\rm star} \simeq 10^{-6} \ln\Lambda_{\rm star}/\ln\Lambda_{\rm cluster}$. $b_{\min}$ 和星团有限尺度会改变 Coulomb 对数，所以不应把比例精确写死为 $10^{-6}$. 较重散射体造成的单次冲量大，即使数目减少，$m^2 n = m\rho$ 仍增大，故弛豫较快. 这只用于星团可近似为离散散射中心的模型. □

**原题定位：** 8.902 期中题组 Q4.

**习题 12.12** 用维里定理推导银河中恒星的典型速度.

**解答.** 设势能为 $W = -CGM^2/R$，$K = M\langle v^2\rangle/2$，稳态维里关系给 $\sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{CGM/R}$. 题面未给 $M, R$ 与结构系数，只能先给此表达式. 取代表性内部质量 $M = 10^{11} M_\odot$，$R = 10\,\mathrm{kpc}$、$C \sim 1$，得 $v \sim 207\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. 若均匀球 $C = 3/5$ 则约 $161\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. 视向一维弥散在各向同性下再除 $\sqrt{3}$，不可将其与三维速度混称. □

**原题定位：** 8.902 期中题组 Short Answer, (A)–(D), 原每项 5 分.

**习题 12.13** (A) 什么是 NFW 密度曲线？(B) 什么是暴烈弛豫，怎样发生，为什么重要？(C) 写无碰撞 Boltzmann 方程并说明如何导出 Jeans 方程. (D) 银河中两恒星发生强遭遇的可能性如何？

**解答.** (A) $\rho = \rho_s/[x(1+x)^2]$，内部近 $r^{-1}$、外部近 $r^{-3}$，为暗晕模拟常用拟合，未截断质量对数发散. (B) 体系快速形成或并合时 $\Phi(\boldsymbol{x}, t)$ 改变，单星能量沿轨道满足 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t = \partial_t \Phi$，轨道因而交换能量并发生相混合. 它在动力学时间内改变粗粒化分布，不等于微观 $f$ 违反 Liouville 定理，也不保证达到唯一 Maxwell 分布. (C) 式(5.1)沿轨道守恒. 乘 $v_i$ 积分，用速度边界项消失和分部积分 $\int v_i \partial_{v_j} f \,\mathrm{d}^3 v = -\delta_{ij}\rho$，得 $\partial_t(\rho\bar{v}_i) + \partial_j(\rho\overline{v_i v_j}) = -\rho\partial_i\Phi$. 二阶矩未知，仍需闭合或分布模型. (D) 强偏转需要 $b \lesssim G(m_1+m_2)/v^2$. 取 $m_1 = m_2 = M_\odot, v = 200\,\mathrm{km\,s^{-1}}$，$b_{90} \sim 0.044\,\mathrm{AU}$. 本地星数密度 $0.1\,\mathrm{pc^{-3}}$ 的示例遭遇率 $n\pi b_{90}^2 v$ 约 $3\times10^{-18}\,\mathrm{yr^{-1}}$，极低. 此数密度是解答的示例假设；密集星团或银河中心须另估，物理碰撞截面也不同于强引力偏转截面. □

# 13 早期宇宙测验习题

以下题面来自 8.286 Fall 2013 的正式测验，不是复习题库. Quiz 1 第 3 题与 Quiz 3 第 2 题的官方答案仅回指作业答案，未在该解答文件展开；两题明确由 AI 独立补写. 其余六题依据官方解答核对并重新展开.

**原题定位:** 8.286 Quiz 1, 2013 年 10 月 3 日, Q2, (a)–(e), 原题 30 分; 官方解答标题误标 25 分.

**习题 13.1** 平直宇宙 $a(t)=a_0\mathrm{e}^{\chi t}$, 取 $\chi>0$. 两共动星系在 $t_1$ 的实际间距为 $\ell_p$, 一个在 $t_1$ 向另一个发光, 接收时刻 $t_2$. (a) 求红移; (b) 仅以 $c,a_0,\chi,\ell_p,t_1$ 求 $t_2$; (c) 什么间距使光永不收到? (d) 光在什么时候距两星系相等? (e) 发射脉冲时长 $\Delta t$ 很短, 求收到的脉冲时长.

**解答.** (a) $1+z=a(t_2)/a(t_1)=\mathrm{e}^{\chi(t_2-t_1)}$. (b) 共动间距 $\ell_c=\ell_p/a(t_1)$, 光传播给 $\ell_c=\int_{t_1}^{t_2}c\,\mathrm{d}t/a(t)$. 因而 $\ell_p=(c/\chi)[1-\mathrm{e}^{-\chi(t_2-t_1)}]$, 解得 $t_2=t_1-\chi^{-1}\ln(1-\chi\ell_p/c)$. (c) 当 $\ell_p\geq c/\chi$ 时没有有限 $t_2$, 等号情形仅在无穷未来逼近. (d) 同时的实际距离均含同一 $a(t)$, 中点因此也是共动中点. 积分路径改为 $\ell_c/2$, 得 $t_{\mathrm{eq}}=t_1-\chi^{-1}\ln[1-\chi\ell_p/(2c)]$. 中点能否到达的条件是 $\ell_p<2c/\chi$, 所以某些光永不到终点但可先过中点. (e) 固定共动路径对端点微分给 $c\Delta t/a(t_1)=c\Delta t_o/a(t_2)$, 故 $\Delta t_o=(1+z)\Delta t$. 时长变长不是本地仪器走慢, 而是两次信号连接的宇宙时刻变化. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 1 Q3, (a)–(e), 25 分; 独立补写.

**习题 13.2** 无限长均匀圆柱宇宙只沿 $x,y$ 膨胀, $z$ 方向静止. 初始密度 $\rho_i$, 初始速度 $\boldsymbol{v}_i=H_i\boldsymbol{r}$, 初始外半径有限. $\mu$ 为半径 $r$ 内每长度质量. (a) Gauss 引力定律给 $\boldsymbol{g}=-A\mu\hat{\boldsymbol{r}}/r$, 求 $A$. (b) 以初始半径 $r_i$ 写粒子 $\ddot{r}$. (c) 证明 $u=r/r_i$ 与 $r_i$ 无关, 定义 $a(t)=u$. (d) 求密度与尺度因子关系及 $\ddot{a}$. (e) 找守恒量 $\mathcal{E}=\dot{a}^2/2+V(a)$, 判断永远膨胀还是再坍缩.

**解答.** 对单位长圆柱, $g_r 2\pi r=-4\pi G\mu$, 故 $A=2G$. 未壳交叉时每层 $\mu=\pi\rho_i r_i^2$, $\ddot{r}=-2\pi G\rho_i r_i^2/r$. 代 $r=r_i u$ 得 $\ddot{u}=-2\pi G\rho_i/u$, 且对所有非中心层 $u(t_i)=1,\dot{u}(t_i)=H_i$. 正半轴的方程局部唯一, 相同初值因此给相同函数; 中心层由连续极限处理.

横截面积按 $a^2$ 变, $\rho=\rho_i/a^2$, 因而 $\ddot{a}=-2\pi G\rho a$. 乘 $\dot{a}$ 积分得 $V(a)=2\pi G\rho_i\ln a$、$\mathcal{E}=H_i^2/2$. 若初始膨胀, 转向点 $a_{\max}=\exp[H_i^2/(4\pi G\rho_i)]$ 有限; 对正密度和有限初始速度, 不存在一直向无穷半径逃逸的解. 对数势在大 $a$ 无界, 所以最终回缩; 这是无限长圆柱的性质, 不能套用到三维球宇宙. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 1 Q4, (a)–(b), 25 分.

**习题 13.3** 今日宇宙时刻为 $t_0$, 星系当前实际距离 $\ell_p=a(t_0)\ell_c$. 视它为球, 发光时半径 $R_1$, 今日半径 $R_0$, 红移已知为 $z$, $\theta\ll 1$. (a) 不预设 $a(t)$ 的具体形式, 求张角. (b) 发射总功率 $P$ 各向同性, 求今日地球收到的能量通量 $J$. 原题未写平直假设, 官方解答说明按当时课程的平直几何处理.

**解答.** 采用官方明确的平直假设. 星系发射时的共动半径是 $R_1/a_e$, 因此直径张角 $\theta=2R_1/(a_e\ell_c)=2R_1(1+z)/\ell_p$. 不应把 $R_0$ 代替 $R_1$, 引力束缚星系并不随 Hubble 流按统一比例膨胀.

今日波面面积 $4\pi\ell_p^2$, 每光子能量与到达率各降 $1+z$, 故 $J=P/[4\pi\ell_p^2(1+z)^2]$. 若空间弯曲, 应用横向距离 $D_M$ 替代简单 $\ell_p$, 题面原量不足以单独给此形式. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 2, 2013 年 11 月 7 日, Q2, (a)–(d), 20 分.

**习题 13.4** 平直宇宙由奇异物质主导, $\rho \propto a^{-5}$. (a) 求尺度因子随时间的关系; (b) 求 $H(t)$; (c) 求实际粒子视界; (d) 求 $\rho(t)$.

**解答.** 从大爆炸起点 $t=0$ 计时, $\dot{a}/a \propto a^{-5/2}$, 故 $\dot{a} \propto a^{-3/2}$. 积分给 $a = Ct^{2/5}$, $H = 2/(5t)$. 粒子视界 $D_p = a(t)c\int_0^t \mathrm{d}t'/a(t') = 5ct/3$. 由 Friedmann 式, $\rho = 3H^2/(8\pi G) = 3/(50\pi G t^2)$. 能量守恒所对应状态参数为 $w = 2/3$, 不等于通常辐射. 每项都适用此理想单组分模型, 不作为真实宇宙的历史. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 2 Q4, (a)–(c), 20 分.

**习题 13.5** 假想物质能量密度随活塞体积 $V$ 按 $V^{-3/2}$ 下降, 初始为 $u_0$. (a) 活塞拉大 $\Delta V$ 后, 求系统能量变化 $\Delta U$, 增加规定为正. (b) 压强为 $p$, 求拉活塞的外界对系统做功 $\Delta W$. (c) 用两者确定 $p$ 与 $u$ 的关系. 忽略二阶小量.

**解答.** 密度不是总能量. $U(V') = u_0(V/V')^{3/2}V'$, 在 $V' = V$ 求导给 $\Delta U = -(1/2)u_0\Delta V$. 外界对系统做功为 $\Delta W = -p\Delta V$. 没有额外热交换时两者相等, 故 $p = u/2$. 若把 $u \propto V^{-3/2}$ 直接当作 $U$ 的变化, 会错误得到 $3u/2$; 少掉的因子正是体积本身. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 3, 2013 年 12 月 5 日, Q2, (a)–(c), 25 分; 独立补写.

**习题 13.6** 缪子静止能 106 MeV, 电子 0.511 MeV, 两者均自旋 1/2, 缪子与反缪子电荷相反. 本题按理想阈值热辐射模型, 不考虑额外强子热贡献. (a) 缪子与反缪子对 $u = (\pi^2/30)g(k_{\mathrm{B}}T)^4/(\hbar c)^3$ 的 $g$ 贡献是多少? (b) 当 $k_{\mathrm{B}}T$ 刚高于 106 MeV 时还有哪些轻粒子, 各贡献多少? (c) 缪子消失时所有其他粒子仍保持共同热平衡, $aT$ 增加多少倍?

**解答.** 两电荷态各两自旋态, 费米权重 7/8, 所以 $g_\mu = 4(7/8) = 7/2$. 其余为光子两偏振 $g_\gamma = 2$, 电子正电子 $g_e = 7/2$, 三味中微子及反中微子共六个手征自由度 $g_\nu = 6(7/8) = 21/4$. 合计不含缪子 $g_{\mathrm{after}} = 43/4$, 含缪子 $g_{\mathrm{before}} = 57/4$. 在全部共同温度且熵绝热守恒的模型中, $[aT]_{\mathrm{after}}/[aT]_{\mathrm{before}} = (57/43)^{1/3} = 1.0985$. 实际 $k_{\mathrm{B}}T \sim 106\,\mathrm{MeV}$ 并非严格的阶跃阈值, 接近质量阈值的粒子贡献连续变化, QCD 热史也更复杂. 原题的无中间质量叙述支持这一课堂自由粒子近似, 不把结果宣称为精确现代热史. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 3 Q3, (a)–(c), 25 分.

**习题 13.7** 平直宇宙今日参数 $\Omega_{m0}, \Omega_{r0}, \Omega_{\Lambda 0}, H_0$, 三密度参数和为 1. 今日从原点发出球面光脉冲. (a) 已知 $a(t)$ 时写永远能逼近的最大共动半径 $r_{\max}$. (b) 换积分变量, 仅以今日参数和 $a_0$ 写此积分, 不要求求值. (c) 对今天收到的光, 若源的共动位置恰在 $r_{\max}$, 写求源红移 $z_{\mathrm{eh}}$ 的显式积分方程.

**解答.** 零测地线给 $\dot{r} = c/a$. 最大半径为 $r_{\max} = c\int_{t_0}^{\infty} \mathrm{d}t/a(t)$; 此积分需由未来模型保证收敛. 令 $x = a/a_0$, $H = H_0\sqrt{\Omega_{r0}x^{-4} + \Omega_{m0}x^{-3} + \Omega_{\Lambda 0}}$, 则

$$r_{\max} = \frac{c}{a_0 H_0}\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\Omega_{r0} + \Omega_{m0}x + \Omega_{\Lambda 0}x^4}}.$$

今天收到的光的过去传播距离也必须是这个共动数, 所以

$$\int_0^{z_{\rm eh}} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{\Omega_{r0}(1+z)^4+\Omega_{m0}(1+z)^3+\Omega_{\Lambda 0}}} = \int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\Omega_{r0}+\Omega_{m0}x+\Omega_{\Lambda 0}x^4}}.$$

「该源今天的位置在事件视界」不表示它的早期光永远不可见. 示例忽略辐射、取 $0.3, 0.7, H_0 = 71$, 今日实际事件视界约 4816 Mpc, 对应今天收到的源红移约 1.805. 这只是给定未来真空不变模型的演示. □

**原题定位:** 8.286 Quiz 3 Q4, (a)–(b), 15 分.

**习题 13.8** (a) 从 $H^2 = 8\pi G\rho/3 - kc^2/a^2$ 推导 $(\Omega-1)/\Omega = AT^2/\rho$, 找常数 $A$. (b) 对近乎平直、$\rho \propto a^{-5}$ 的假想宇宙, 求该偏离量随时间的变化. 温度作为光子温度, 假设 $aT = C$ 固定.

**解答.** $\Omega = 8\pi G\rho/(3H^2)$, 所以 $(\Omega-1)/\Omega = 1 - 3H^2/(8\pi G\rho) = 3kc^2/(8\pi G\rho a^2)$. 用 $aT = C$ 得 $A = 3kc^2/(8\pi GC^2)$. 常数依尺度因子的规范与温度归一化而变, 整个偏离量不变. 近乎平直时上一章题解给 $a \propto t^{2/5}$, 所以 $T^2/\rho \propto a^3 \propto t^{6/5}$. 原式在粒子熵自由度改变时 $aT$ 不恒定, 不能继续把 $A$ 视作同一个常数. □

## 14 课程来源与使用范围

本卷十个理论章按主题重编, 原课程的单讲顺序不作为章节编号. 恒星与气体部分参照 8.901 的公开课历与入选题; 星系至 Lyman–alpha 主体参照 8.902 合订本各部分; 均匀膨胀、热史和暴胀参照 8.286 的公开幻灯及入选测验. 章节内完整推导是本卷重构, 未取得的教材题不由想象填入.

## 参考文献


[1] Deepto Chakrabarty. Astrophysics I, Spring 2006. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-901-astrophysics-i-spring-2006/.

[2] Mark Vogelsberger, Stephanie O'Neil, David DePalma. Astrophysics II, Fall 2023. 讲义、作业与课程资料. https://ocw.mit.edu/courses/8-902-astrophysics-ii-fall-2023/.

[3] 8.902 Fall 2023 讲义合订本, 122 PDF 页, 与分讲有重复. https://ocw.mit.edu/courses/8-902-astrophysics-ii-fall-2023/mit8_902_f23_lec_full.pdf.

[4] Alan Guth. The Early Universe, Fall 2013. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-286-the-early-universe-fall-2013/.

[5] MIT OpenCourseWare. 使用条款与逐件权利例外. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.