高级统计力学与统计场论

粒子动力学、临界现象与重整化群

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 12 日

前言

微观动力学保留可逆的粒子轨道，宏观气体却表现黏性、热传导与熵增；临界体系的相关长度又可远大于粒子尺度。高级统计力学的任务是说明这些描述怎样相容，并判断近似在哪个尺度有效。本册读者应已熟悉本科热力学、微正则/正则分布、理想量子气体与基本量子力学。仓库既有《热力学与统计物理》提供这些先修及 8.333 第 15–22 讲的部分补充；本卷用必要的符号连接它，重点展开动力学、关联与统计场论，不重复本科专题的全部例题。

课程主线为 Mehran Kardar 的8.333，Fall 2013及8.334，Spring 2014。两站各公开 26 份课历对应讲义，官方都说明讲义来自更早版本；若文件未给确切原稿年份，本稿不猜造年份。课历的 2013、2014 日期、早期讲义版本与往年复习题年代分开记录。每门课有 6 套公开作业。8.333 考试页列 3 套阶段复习与一套期末复习，8.334 列 3 套阶段复习，都有公开官方解；8.333 前三包标 Fall2007，期末包含 1998、1999、2000、2003–2006 历史卷；8.334 三包标 Spring2014 复习题，不能把复习题包称为该学期实际测试卷。8.333 成绩为作业 30%、三测验 45%、期末 25%；8.334 为作业 30%、三测验 45%、最终项目 25%。没有取得 2013、2014 当期实际考试卷及学生项目，均不补造。

第一编连接粒子、系综与流体，第二编系统建立场、相变、尺度与 RG，第三编收录实际公开问题及中文解答。无公开答案的作业标为编者独立补写；复习包注明可获取官方解；中文解由编者独立推导，并在题内单列官方对照和确定可核验的修正。旧卷已写的 8.333 作业 5 仍核对原题并给固定前置定位，重复问题采用明确回指，而不作为新增解答计数。视频各 26 讲保留官方链接，未宣称逐分钟转录全部视频。

来源署名 Mehran Kardar、MIT OpenCourseWare 及文件所列作者。本项目作中文翻译、重编、推导补充与自绘矢量图，基于 OCW 部分采用CC BY-NC-SA 4.0，遵守署名、非商业及相同方式共享，并保留逐件例外；本项目不代表 MIT 认可。商业参考书只留出版信息与原题号，不打包整书或以答案反造书本题面。课程公开目录、实际文件与完成范围分别记录在学科来源清单与卷末。

目录

第一编　粒子动力学、系综与量子气体（8.333） 1

1　热力学稳定性与概率结构 1

1.1　势函数与稳定性 . . . 1

1.2　联合分布、累积量与相关 . . . 1

1.3　中心极限定理与大偏差 . . . 2

1.4　信息熵与估计 . . . 2

2　Liouville 方程与 BBGKY 层级 2

2.1　相空间密度与可逆演化 . . . 2

2.2　约化分布的定义 . . . 3

2.3　闭合近似及其限制 . . . 3

3　Boltzmann 碰撞与 H 定理 3

3.1　两体碰撞的增益与损失 . . . 3

3.2　碰撞不变量 . . . 4

3.3　H 定理与平衡态 . . . 4

3.4　可逆性问题的具体边界 . . . 4

4　流体方程与输运系数 5

4.1　由动量矩得到守恒方程 . . . 5

4.2　线性化碰撞算符与零模 . . . 5

4.3　弛豫时间中的显式计算 . . . 5

4.4　熵产生与声模 . . . 6

5　系综、密度矩阵与量子计数 6

5.1　从热库到正则分布 . . . 6

5.2　能量与粒子数的涨落矩阵 . . . 6

5.3　量子熵与变分原理 . . . 6

5.4　分子内部自由度与量子极限 . . . 7

5.5　相同粒子的排列与交换 . . . 7

6　连接图、virial 与液气相变 7

6.1　Mayer 函数与连接展开 . . . 7

6.2 消去逸度与 virial 系数 . . . 8
6.3 van der Waals 与共存 . . . 8
6.4 平均场指数与临界涨落的入口 . . . 8

7 简并量子气体与超流 9
7.1 Fermi 面与低温热激发 . . . 9
7.2 Bose 凝聚与超流的区别 . . . 9
7.3 Landau 准则、声子与 roton . . . 9
7.4 正常密度与两流体 . . . 9

第二编 统计场论、重整化与集体物态（8.334） 10

8 弹性、序参量与对称破缺 10
8.1 从粒子到连续场 . . . 10
8.2 Landau–Ginzburg 泛函 . . . 10
8.3 连续对称与 Goldstone 模 . . . 11
8.4 临界模式与对称允许项 . . . 11

9 Gaussian 关联与 Ginzburg 准则 11
9.1 Gaussian 积分与生成泛函 . . . 11
9.2 实空间相关与散射 . . . 11
9.3 涨落修正的尺度 . . . 12
9.4 下与上临界维数 . . . 12

10 尺度假设、有限尺寸与重整化 12
10.1 自由能的齐次结构 . . . 12
10.2 假设边界与危险无关变量 . . . 13
10.3 RG 变换与相关、无关方向 . . . 13
10.4 有限尺寸标度 . . . 13

11 动量壳 RG 与 Wilson–Fisher 固定点 13
11.1 快慢模与连接展开 . . . 13
11.2 一回路系数的计算 . . . 14
11.3 临界指数与控制参数 . . . 14
11.4 其他相互作用与边际维数 . . . 14

12 实空间 RG 与 Monte Carlo **15**

12.1 一维 Ising 精确消元 . . . 15

12.2 块自旋与累积近似 . . . 15

12.3 详细平衡与采样误差 . . . 15

12.4 临界模拟的可复核对象 . . . 16

13 级数、闭环与对偶 **16**

13.1 高温展开与低温畴壁 . . . 16

13.2 一维传递矩阵 . . . 16

13.3 二维自对偶与三维规范对偶 . . . 16

13.4 随机游走生成与 phantom 环 . . . 17

13.5 从偶图到带符号的有向闭环 . . . 17

13.6 四方向矩阵与精确行列式 . . . 17

14 方格 Ising 的精确自由能 **18**

14.1 行传递与对偶耦合 . . . 18

14.2 Majorana 化与每模对角化 . . . 19

14.3 能隙、相关长度与热容 . . . 20

14.4 可计算的数值核对 . . . 20

15 连续自旋、涡旋与 BKT 转变 **20**

15.1 非线性 sigma 模型 . . . 20

15.2 XY 自旋波与代数序 . . . 21

15.3 Coulomb 气与介电屏蔽 . . . 21

15.4 流、普适跳跃与本质奇异 . . . 21

16 二维晶体与拓扑熔化 **22**

16.1 平移代数序与取向 . . . 22

16.2 位错与位向旋错 . . . 22

16.3 hexatic 与两步图景 . . . 22

17 Langevin、Fokker–Planck 与临界动力学 **23**

17.1 Brownian 粒子的平衡结构 . . . 23

17.2 非守恒序参量：Model A . . . 23

17.3 守恒序参量：Model B . . . 23

17.4 动态 RG 与可观测时间 . . . 23

18 守恒约束与非平衡表面增长 **24**

18.1 无临界调参的长程结构 . . . 24

18.2 Edwards–Wilkinson 模型 . . . 24

18.3 KPZ 非线性与倾斜对称 . . . 24

18.4 Burgers 与 Hopf–Cole 连接 . . . 24

19 淬火无序、聚合物与大纲补充 **25**

19.1 退火与淬火的区别 . . . 25

19.2 Harris 与 Imry–Ma 判据 . . . 25

19.3 副本与自旋玻璃的范围 . . . 25

19.4 随机链与 Flory 尺度 . . . 26

第三编 8.333 公开作业与历史复习题 **26**

20 8.333 作业 1：热力学 **26**

21 8.333 作业 2：概率与涨落 **28**

22 8.333 作业 3：动力学 **30**

23 8.333 作业 4：非相互作用粒子 **32**

24 8.333 作业 5：既有热统卷的逐题接口 **35**

25 8.333 作业 6：量子气体与低能激发 **36**

26 8.333 复习包 1：界面热力学与概率 **41**

27 8.333 复习包 2：相空间、等离子体与输运 **43**

28 8.333 复习包 3：关联气体与量子正则系综 **46**

28.1 原题 3：Dieterici 临界点的完整引用 . . . 47

28.2 原题 5：最近邻一维气的完整引用 . . . 47

29 8.333 期末复习包：七个历史年份的量子与相变题 **50**

29.1 1998 年：激子与离子凝聚 . . . 50

29.2 1999 年：Fermi 与 Bose 磁性 . . . 50

29.3 2000 年：氦 3 熔化与 Bose 占据 . . . 51

29.4 2003、2006 年：氦 4；2003、2005 年：Dirac 激发 . . . 52

29.5 2004 年：零能壳与相对论 Bose 气 53
29.6 2005、2006 年的其余编号 53

第四编 8.334 公开作业与复习题 54

30 8.334 作业 1：相变、薄膜与耦合序参量 54

31 8.334 作业 2：质量生成、随机场与长程相互作用 57

32 8.334 作业 3：标度、耦合场与长程 RG 58

33 8.334 作业 4：转移矩阵与实空间重整化 60

34 8.334 作业 5：对偶、Potts 模型与渗流 63

35 8.334 作业 6：超出自旋波、长程畴壁与熔化 65

36 8.334 复习包 1：Landau 理论与 Gaussian 涨落 68

36.1 原题 4：表面活性剂凝聚 69

37 8.334 复习包 2：标度、Goldstone 奇异与各向异性 RG 72

37.1 原题 9：Potts 转移矩阵的完整引用 75

38 8.334 复习包 3：图展开、矩阵场与粗糙化 75

39 来源、全课程覆盖与证明范围 81

39.1 课历到中文编章的映射 81
39.2 题目计数与年份边界 81
39.3 数学与物理复核的限度 81

参考文献 82

第一编 粒子动力学、系综与量子气体（8.333）

1 热力学稳定性与概率结构

来源与编写：8.333 早期讲义对应 L1–L6；本科定律仅作必要连接，重点为稳定性、累积量与大数尺度。

1.1 势函数与稳定性

平衡态熵 $S(U,V,N)$ 满足 $\mathrm{d}S = T^{-1}\,\mathrm{d}U + (p/T)\,\mathrm{d}V - (\mu/T)\,\mathrm{d}N$。两个可交换能量的子系统在总 U 固定时使 $S_1(U_1)+S_2(U-U_1)$ 极大，一阶条件 $T_1=T_2$，二阶条件要求相应熵曲率非正。用 $\partial_U^2 S = -1/(T^2 C_V)$，局部稳定且 C_V 有限时 $C_V>0$。稳定性来自允许的涨落方向；若约束改变，要在实际允许子空间判断 Hessian，不是随便对某个变量求二阶导数。

Legendre 变换把不便固定的广延量换成热库的强度量。$F=U-TS$ 有 $\mathrm{d}F=-S\,\mathrm{d}T-p\,\mathrm{d}V+\mu\,\mathrm{d}N$；$G=F+pV$ 有 $\mathrm{d}G=-S\,\mathrm{d}T+V\,\mathrm{d}p+\mu\,\mathrm{d}N$。混合偏导相等给 Maxwell 关系，例如 $\partial_V S|_T = \partial_T p|_V$。它们要求处于可微的同一热力学相，跨一阶跃迁的尖点不能无解释地交换偏导。

设 $\kappa_T = -V^{-1}\partial_p V|_T > 0$、$\alpha = V^{-1}\partial_T V|_p$。以 $\mathrm{d}S = (C_V/T)\,\mathrm{d}T + (\partial_T p)_V\,\mathrm{d}V$，在定压路径 $\mathrm{d}V=\alpha V\,\mathrm{d}T$，再由链式关系 $(\partial_T p)_V = \alpha/\kappa_T$，得

$$C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T} \geq 0. \tag{1.1}$$

这不仅给不等式，还表明两种热容差测量热膨胀与可压缩性的耦合。相稳定的局部条件不能替代全局自由能最低条件；亚稳态可有正热容、正压缩率却不是全局平衡。

第三定律给完美晶体的非简并平衡基态 $S\to 0$，存在有限简并时可剩 $k_{\mathrm{B}}\log g_0$。无序冻结的残余熵和未达平衡的玻璃状态需要另作物理判断，不能靠选择熵零点去掉实际状态计数。

1.2 联合分布、累积量与相关

随机变量 X 的特征函数 $\varphi(t)=\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}tX}\rangle$ 总存在，矩母函数 $M(t)=\langle \mathrm{e}^{tX}\rangle$ 可能只在有限区间存在。定义 $K(t)=\log M(t)$，累积量 $\kappa_n = K^{(n)}(0)$。前几项 $\kappa_1=\langle X\rangle$、$\kappa_2=\langle X^2\rangle-\langle X\rangle^2$、$\kappa_3=\langle (X-\langle X\rangle)^3\rangle$、$\kappa_4=\langle (X-\langle X\rangle)^4\rangle - 3\kappa_2^2$。累积量把不可约相关与由低阶矩乘积产生的部分分开。

独立和 $S_N=\sum_i X_i$ 有 $M_{S_N}=\prod M_i$，所以 $K_{S_N}=\sum K_i$，所有累积量相加。对联合变量，$K(t_1,\dots,t_n)$ 的混合导数给连接相关。例如 $\langle XYZ\rangle_c = \langle XYZ\rangle - \langle X\rangle\langle YZ\rangle - \langle Y\rangle\langle XZ\rangle - \langle Z\rangle\langle XY\rangle + 2\langle X\rangle\langle Y\rangle\langle Z\rangle$。独立两组间的混合累积量为 0；反过来若只知道二阶相关为 0，不能断言独立，除非已知联合高斯等附加条件。

对 Gaussian 变量 $K=\mu t+\sigma^2 t^2/2$，高阶累积量全 0。正则配分函数的参数导数也生成累积量：$\partial_\beta \log Z = -\langle H\rangle$、$\partial_\beta^2 \log Z = \langle H^2\rangle_c$，所以 $C_V = k_{\mathrm{B}}\beta^2\,\mathrm{Var}\,H$。统计涨落不仅“很小”，还定量控制响应。

1.3 中心极限定理与大偏差

对独立同分布且有限方差的变量，$Y_N = (S_N - N\mu)/(\sigma\sqrt{N})$ 的特征累积量展开为 $\log\varphi_{Y_N}(t) = -t^2/2 + O(N^{-1/2})$，各 $n > 2$ 阶缩为 $N^{1-n/2}$（若所需高阶矩存在）。更一般仅有限二阶矩也可用小 t 的 $o(t^2)$ 余项建立 Gaussian 极限。重尾无有限方差时此结论失效，稳定分布可替代 Gaussian。

中心极限定理只描述均值附近 $O(\sqrt{N})$ 涨落。对 $S_N/N \simeq x$、$x-\mu = O(1)$，若矩母函数在 0 附近存在，Laplace 鞍点给 $P \sim \mathrm{e}^{-NI(x)}$，$I(x) = \sup_t[tx - K(t)]$。例如 Bernoulli 成功率 p，$K = \log(1-p+p\mathrm{e}^t)$，最优 $\mathrm{e}^t = x(1-p)/[p(1-x)]$，故

$$I(x) = x\log\frac{x}{p} + (1-x)\log\frac{1-x}{1-p}. \tag{1.2}$$

近 $x = p$ 展开为 $(x-p)^2/[2p(1-p)]$，接回中心极限；靠近 0 或 1 的罕见事件不能直接用同一二次抛物线估计。

1.4 信息熵与估计

离散熵 $H = -\sum p_i \log p_i$ 是无量纲信息量，物理熵为 $k_{\mathrm{B}}H$ 加与相空间基准有关的常数。连续微分熵依变量的单位与坐标变换，不能单独看它的绝对值评价热力学熵。相对熵 $D(p\|q) = \sum p_i \log(p_i/q_i) \geq 0$ 由 $\log x \leq x - 1$ 证明，等号仅 $p = q$。

最大熵在归一与 $\langle E\rangle = U$ 约束下变分，$p_i \propto \mathrm{e}^{-\beta E_i}$，$\beta$ 是能量约束的乘子；其物理温度意义还需与热库平衡条件相接。Fisher 信息 $I(\theta) = \langle(\partial_\theta \log p)^2\rangle$ 量化参数变化的可分辨度；在可微、积分与导数可交换、支撑不随参数突变等正则条件下，无偏估计的方差 $\geq 1/[NI(\theta)]$。它不是不加条件的所有统计估计精度定理。

2 Liouville 方程与 BBGKY 层级

来源与编写：8.333 L7–L8。

2.1 相空间密度与可逆演化

对 N 个经典粒子，$\Gamma = (r_1, p_1, \ldots, r_N, p_N)$ 是 $6N$ 维相空间点，微观态是一个点而统计态是归一概率密度 $\rho_N(\Gamma, t)$，$\int \rho_N \,\mathrm{d}\Gamma = 1$。Hamilton 方程 $\dot r_i = \partial_{p_i} H, \dot p_i = -\partial_{r_i} H$ 的相空间散度为 $\sum_i(\partial_{r_i}\partial_{p_i} H - \partial_{p_i}\partial_{r_i} H) = 0$。连续性给

$$\partial_t \rho_N + \{\rho_N, H\} = 0, \qquad \{A, B\} = \sum_i (\nabla_{r_i} A \cdot \nabla_{p_i} B - \nabla_{p_i} A \cdot \nabla_{r_i} B). \tag{2.1}$$

沿 Hamilton 轨道 $\mathrm{d}\rho_N/\,\mathrm{d}t = 0$，并保持相空间体积，这就是 Liouville 定理。它不保证体系遍历，也不保证任意初态最终成为正则分布。细粒度 Gibbs 熵 $S_G = -k_{\mathrm{B}}\int \rho_N \log\rho_N \,\mathrm{d}\Gamma$ 随可逆演化守恒；宏观熵增必须解释丢弃信息的方式。

若 H 不显含时，任意 $\rho_N = F(H)$ 均平稳，选择何种 F 依准备与宏观约束。对自旋、Berry 波包等非正则坐标，应使用相应辛测度；直接用 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p$ 未必正确。

2.2 约化分布的定义

为了研究少数粒子，定义带粒子数因子的 s 粒子分布

$$f_s(1,\dots,s)=\frac{N!}{(N-s)!}\int \rho_N(1,\dots,N)\,\mathrm{d}(s+1)\cdots\mathrm{d}N, \tag{2.2}$$

其中 $\mathrm{d}i=\mathrm{d}^d r_i\,\mathrm{d}^d p_i$。于是 $\int f_1\,\mathrm{d}1=N$，$\int f_2\,\mathrm{d}2=(N-1)f_1$。另一些文献使用归一至 1 的约化分布，层级方程前的 $N-s$ 因子不同，应先看定义再比较式子。

设 $H=\sum_i p_i^2/(2m)+\sum_i V_{\mathrm{ext}}(r_i)+\sum_{i<j}v(r_i-r_j)$，力 $F_{ij}=-\nabla_{r_i}v(r_i-r_j)$。把 Liouville 方程对未保留变量积分，表面项在周期边界或足够快衰减下消失，得到

$$\left[\partial_t+\sum_{i=1}^{s}\frac{p_i}{m}\cdot\nabla_{r_i}+\sum_{i=1}^{s}F_i^{\mathrm{ext}}\cdot\nabla_{p_i}+\sum_{i<j\le s}F_{ij}\cdot(\nabla_{p_i}-\nabla_{p_j})\right]f_s=-\sum_{i=1}^{s}\int F_{i,s+1}\cdot\nabla_{p_i}f_{s+1}\,\mathrm{d}(s+1). \tag{2.3}$$

左侧只含保留粒子的内作用，右侧通过 f_{s+1} 联系环境。这是 BBGKY 层级：一粒子分布方程不封闭，因为碰撞概率依赖两粒子相关。

2.3 闭合近似及其限制

若长程弱作用且每粒子同时受许多粒子影响，可近似 $f_2(1,2)\simeq f_1(1)f_1(2)$（有限 N 归一差另计），右侧成为平均场力，得到 Vlasov 方程。它仍为无碰撞、可逆的相空间输运，不能自动产生 Boltzmann 碰撞熵。

稀薄短程气体则两体碰撞重要。把碰撞前两粒子视为近独立，$f_2^{\mathrm{in}}\simeq f_1 f_1$，但碰撞后已经关联。这个“分子混沌”假设有时间方向：若把所有速度反转后的精确相关态作为初态，不能再假定同样的入射独立性。低密度、碰撞时间短于平均自由时间、空间变化尺度大于作用范围是闭合的物理条件。三体同时碰撞和致密相关都可使其失效。

关联被层级输运到更高 f_s，只观察 f_1 等价于忽略这些信息。细粒度熵守恒与一粒子粗粒度熵增因而没有逻辑矛盾；矛盾只会出现在声称无需任何闭合或粗粒化也能从时间可逆方程严格推出单调宏观熵时。

3 Boltzmann 碰撞与 H 定理

来源与编写：8.333 L8–L10。

3.1 两体碰撞的增益与损失

令 $f(r,p,t)$ 归一为粒子数。稀薄经典气的局域二体碰撞项为

$$C[f](p_1)=\int \mathrm{d}p_2\,\mathrm{d}\Omega\,|v_1-v_2|\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\left[f(p_1')f(p_2')-f(p_1)f(p_2)\right]. \tag{3.1}$$

σ 是两体微分截面，p_1',p_2' 与 p_1,p_2 由动量、能量守恒及散射角联系。第一项为碰撞入当前动量的增益，第二项为离开的损失。微观可逆性使正反散射的权重及相空间测度相同。Boltzmann 方程为 $\partial_t f+v\cdot\nabla_r f+F\cdot\nabla_p f=C[f]$。

量子气在末态还需乘 $1\pm f$（占据数按单态归一），分别表示玻色增强和 Pauli 阻塞。不能直接把经典 $\log f$ 的 H 函数拿来声称量子 H 定理；相应量子熵要包含 $(1\pm f)\log(1\pm f)$。

3.2 碰撞不变量

对任意函数 $\psi(p)$，交换粒子 1、2 并将正反过程成对，

$$\int \psi_1 C[f]\,\mathrm{d}p_1 = \frac{1}{4}\int \mathrm{d}\mathcal{C}\,(f_1'f_2' - f_1f_2)(\psi_1+\psi_2-\psi_1'-\psi_2'), \tag{3.2}$$

$\mathrm{d}\mathcal{C}$ 含非负散射测度。对 $\psi = 1, p_i, p^2/(2m)$，最后括号为 0，碰撞分别保持粒子数、总动量和动能。这给流体守恒方程的微观来源。一般外场在输运左侧改变动量或能量，不是碰撞守恒失败。

3.3 H 定理与平衡态

定义 $H[f] = \int f\log f\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}p$。无净边界熵流时输运项对 H 积分为 0。利用粒子数守恒去掉 $+1$ 导数项，碰撞贡献化为

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{4}\int \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\mathcal{C}\,(f_1'f_2' - f_1f_2)\log\frac{f_1'f_2'}{f_1f_2} \le 0. \tag{3.3}$$

因为对正 x, y 有 $(x-y)\log(x/y)\ge 0$，每个碰撞通道非正。物理粗粒度熵为 $-k_{\mathrm{B}}H$ 加计数常数，所以增加。该不等式是在 Boltzmann 闭合之下的证明，不是对任意精确 ρ_N 的声明。

平衡要求每条可达碰撞 $f_1f_2 = f_1'f_2'$，故 $\log f$ 为碰撞不变量。对能连接整个动量空间的普通弹性散射，$\log f = a + \boldsymbol{b}\cdot p - cp^2$，完成平方得到

$$f_{\mathrm{le}}(r,p) = n(r)[2\pi m k_{\mathrm{B}}T(r)]^{-d/2}\exp[-|p-mu(r)|^2/(2mk_{\mathrm{B}}T(r))]. \tag{3.4}$$

这是局域 Maxwell 分布，碰撞项局域为 0，但若 n, T, u 随位置变化，输运项一般不为 0；全局平衡还需满足外势与边界条件。若碰撞有额外守恒量或不能混合所有动量，其零空间可能更大。

3.4 可逆性问题的具体边界

Loschmidt 反转将所有粒子速度倒转，同时将出射碰撞相关转成未来的入射相关，此特殊准备不满足分子混沌。Poincaré 复现适于有限、封闭、有限相空间测度体系，指出无穷时间永久单调的精确熵增不能普遍成立。两者要求辨别热力学极限、可观测时间与统计初态，不能用“粒子多”一句话把数学反例抹去。

Boltzmann 方程因忽略细相关而获得有效不可逆性。当观测尺度远大于碰撞时间，闭合可准确预测输运，即使全微观态的相关信息仍在增长。关于该近似的严格适用时间存在更深的数学问题，本稿未证明任意长时间、任意密度的 Boltzmann 极限。

4 流体方程与输运系数

来源与编写：*8.333 L10–L11*：守恒律、零阶与一阶流体。

4.1 由动量矩得到守恒方程

定义 $n=\int f\,\mathrm{d}p$、$nu=\int (p/m)f\,\mathrm{d}p$，局部相对速度 $c=p/m-u$。将 Boltzmann 方程依次乘 $1, p_i, p^2/(2m)$ 并积分，用碰撞不变量，得到

$$\partial_t n+\nabla\cdot(nu)=0, \tag{4.1}$$

$$mn(\partial_t+u\cdot\nabla)u_i=-\partial_j P_{ij}+nF_i, \tag{4.2}$$

$$\partial_t e+\nabla\cdot[(e+P)u+q+\pi\cdot u]=nu\cdot F. \tag{4.3}$$

这里 $P_{ij}=m\int c_i c_j f\,\mathrm{d}p$，分成标量压强 P 与偏应力 π_{ij}；$q_i=\frac{m}{2}\int c^2 c_i f\,\mathrm{d}p$ 是相对局域流速的热流，e 含流动动能和内能。不能把实验总能流全部称为“热流”，对流项应分开。

局域 Maxwell 分布给 $P_{ij}=nk_{\mathrm{B}}T\delta_{ij}$、$q=0$，能量闭合为理想 Euler 方程，$D_tT=-(2/d)T\nabla\cdot u$。局域平衡只给无耗散零阶方程，黏性和热导来自 f 偏离此分布的一阶梯度。

4.2 线性化碰撞算符与零模

写 $f=f_{\mathrm{le}}(1+\phi)$，线性化 $C[f]=-f_{\mathrm{le}}\mathcal{L}\phi$。加权内积 $(a,b)=\int f_{\mathrm{le}}ab\,\mathrm{d}p$ 下，微观可逆性使 $\mathcal{L}$ 半正，其二次型为碰撞中 $[\phi_1+\phi_2-\phi_1'-\phi_2']^2$ 的非负积分。$1, p_i, p^2$ 是零模，对应守恒量。求 ϕ 时需选择与这些零模正交，保证 n,u,T 由 f_{le} 本身定义；否则把同一个局域平衡改变算两次。

一阶输运方程为 $\mathcal{L}\phi=-(\partial_t+v\cdot\nabla+F\cdot\nabla_p)\log f_{\mathrm{le}}$，右侧用零阶 Euler 关系消掉时间导数，剩温度梯度与速度剪切源。对无内自由度理想气，标量膨胀源在该近似下与守恒量结合而不产生独立体黏性；有内弛豫的分子气体则可有体黏性。

4.3 弛豫时间中的显式计算

用满足守恒匹配的简化 BGK 碰撞 $C=-(f-f_{\mathrm{le}})/\tau$，则三维一阶偏离可写

$$\phi=-\tau\left[\frac{m}{k_{\mathrm{B}}T}c_ic_j\mathcal{E}_{ij}+\frac{c\cdot\nabla T}{T}\left(\frac{mc^2}{2k_{\mathrm{B}}T}-\frac{5}{2}\right)\right],\quad \mathcal{E}_{ij}=\frac{\partial_i u_j+\partial_j u_i}{2}-\frac{1}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot u. \tag{4.4}$$

5/2 使热流源与动量零模正交，而非随意选常数。所需的 Gaussian 速度矩为

$$\langle c_ic_j\rangle=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}\delta_{ij},\qquad \langle c_ic_jc_lc_m\rangle=\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}\right)^2(\delta_{ij}\delta_{lm}+\delta_{il}\delta_{jm}+\delta_{im}\delta_{jl}). \tag{4.5}$$

代入应力和热流定义可得

$$\pi_{ij}=-2\eta\mathcal{E}_{ij},\qquad \eta=nk_{\mathrm{B}}T\tau,\qquad q=-\kappa\nabla T,\qquad \kappa=\frac{5}{2}\frac{nk_{\mathrm{B}}^2T\tau}{m}. \tag{4.6}$$

热导需六阶 Gaussian 矩；展开 $c^2c_ic_j[mc^2/(2k_{\mathrm{B}}T)-5/2]$ 并用球对称径向矩，可核对系数 5/2。BGK 预测 Prandtl 数 1，而真实单原子稀薄气接近 2/3，所以一个共同 τ 只提供结构与量级，不是精确碰撞截面解。

动量扩散 $\eta/(mn)$ 与热扩散 $\kappa/(nc_p)$ 通常近 $\bar{v}\ell$，$\ell=\bar{v}\tau$。稀薄气碰撞率 $\tau^{-1}\sim n\sigma\bar{v}$，$\eta\sim m\bar{v}/\sigma$ 近乎与 n 无关：载流粒子更多但平均自由程更短，这解释一个看似反常的密度取消。

4.4 熵产生与声模

局域熵平衡可整理为 $\partial_t s+\nabla\cdot(su+q/T)=\kappa(\nabla T)^2/T^2+2\eta\mathcal{E}_{ij}\mathcal{E}_{ij}/T+\zeta(\nabla\cdot u)^2/T\geq 0$。正黏性与热导源于线性化碰撞算符半正，任意设负系数会违反近平衡稳定性。

在线性均匀背景，横向速度模 $\omega=-\mathrm{i}\eta q^2/(mn)$、热扩散模 $\omega=-\mathrm{i}D_T q^2$，纵向密度与温度耦合产生 $\omega=\pm c_s q-\mathrm{i}\Gamma_s q^2$，$c_s^2=(\partial p/\partial\rho)_s$。它们是流体尺度的集体模式，成立条件 $q\ell\ll 1,\omega\tau\ll 1$；在无碰撞窗口需回到动力学方程，不能把同一声速外推任意 q。

5 系综、密度矩阵与量子计数

来源与编写：8.333 L12–L14、L19–L23；本科气体公式仅保留高级推导所需连接。

5.1 从热库到正则分布

封闭总体系在能量壳等概率，子系统能量 E 的权重是热库态数 $\Omega_B(U-E)$。展开 $\log\Omega_B(U-E)=\log\Omega_B(U)-\beta E+O(E^2/C_BT^2)$，足够大的热库给 $p(E)\propto \mathrm{e}^{-\beta E}$。下一阶定量说明有限热库误差，若子系统可交换的能量与热库热容同量级，正则近似不再充分。

经典单原子理想气 $Z_N=V^N/(N!\lambda_T^{dN})$，$\lambda_T=\sqrt{2\pi\hbar^2/(mk_{\mathrm{B}}T)}$。$N!$ 来自相同粒子不重复计数；去掉它会使熵混合悖论与不正确的非广延项出现。对不同种粒子各自除 $N_\alpha!$，混合熵仍真实存在。微正则、正则、巨正则在热力学极限的局域观测可等价，需要稳定短程作用与适当可微大偏差结构；长程引力等系统不能无条件套这项等价。

5.2 能量与粒子数的涨落矩阵

巨正则 $\Xi=\mathrm{Tr}\exp[-\beta(H-\mu N)]$，以 $u=-\beta,v=\beta\mu$ 作独立参数，则 $\partial_u\log\Xi=\langle H\rangle$、$\partial_v\log\Xi=\langle N\rangle$，Hessian 为 (H,N) 协方差矩阵，半正。固定 T 时 $\partial_\mu\langle N\rangle=\beta\,\mathrm{Var}\,N$，结合 $n^2\kappa_T=\partial n/\partial\mu$ 得 $\mathrm{Var}\,N=Vk_{\mathrm{B}}Tn^2\kappa_T$。交叉协方差解释热膨胀及不同响应之间的联系，不能一边固定 N 一边保留巨正则 N 涨落公式。

5.3 量子熵与变分原理

量子统计态是正算符 ρ、$\mathrm{Tr}\,\rho=1$，熵 $S=-k_{\mathrm{B}}\,\mathrm{Tr}\,\rho\log\rho$。canonical 态 $\rho_\beta=\mathrm{e}^{-\beta H}/Z$ 同时包含经典概率与本征态相干结构的可能性；热平衡在能量基对角不意味着所有非平衡态也对角。

相对熵 $D(\rho\|\sigma)=\mathrm{Tr}\,\rho(\log\rho-\log\sigma)\geq 0$ 可在有限维直接证明。以 ρ 本征基 $|i\rangle$ 及 σ 本征值 s_j 写第二项，$\langle i|\log\sigma|i\rangle=\sum_j|\langle i|j\rangle|^2\log s_j\leq\log\langle i|\sigma|i\rangle$ 由凹性得到；于是 $D\geq\sum_i r_i\log[r_i/q_i]\geq 0$，$q_i=\langle i|\sigma|i\rangle$。支撑不包含时相对熵为 $+\infty$。

取 $\sigma=\rho_\beta$，得 $\mathrm{Tr}\,\rho H-TS(\rho)\geq F$，所以平衡态极小自由能泛函。再取参考 H_0 的热态 ρ_0，得到 Bogoliubov

变分不等式

$$F \le F_0 + \langle H - H_0 \rangle_0 . \tag{5.1}$$

它对量子非对易 H, H_0 也成立；不需要错误地把 $\mathrm{e}^{-\beta(H_0+V)}$ 拆成两个可交换指数。无限维需相应配分函数为 trace class 及期望有限。

5.4 分子内部自由度与量子极限

多原子气体的平移、转动、振动在弱耦合近似下配分函数相乘。刚性线性转子 $E_l = \hbar^2 l(l+1)/(2I)$、简并 $2l+1$，高温转动配分近 $2Ik_{\mathrm{B}}T/\hbar^2$，低温转动态冻结；同核分子的核自旋交换可限制偶奇 l，不能把异核结果直接套去。谐振模 $Z = \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega/2}/(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega})$，高温恢复每模 k_{B} 热容，低温指数冻结。

固体声子与黑体辐射的低温态密度积分详见既有卷；这里强调计数约束：光子与平衡声子数不守恒，$\mu = 0$；原子玻色气 N 守恒，μ 需由数方程求。把“玻色子”当作自动 $\mu = 0$ 会使 BEC 数方程失去意义。

5.5 相同粒子的排列与交换

两个相同粒子的 Hilbert 空间先取张量积，再投到对称或反对称子空间。N 粒子的投影与配分函数为

$$P_{\pm} = \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in S_N} (\pm 1)^{\pi} U_{\pi}, \qquad Z_N^{\pm} = \mathrm{Tr}\left[P_{\pm} \mathrm{e}^{-\beta \sum_i h_i} \right]. \tag{5.2}$$

排列分解为长度 l 循环，每个循环贡献单体迹 $Z_1(l\beta)$；循环之间的组合计数给

$$\log \Xi_{\pm} = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(\pm 1)^{l-1} z^l}{l} Z_1(l\beta). \tag{5.3}$$

对自由气 $Z_1(l\beta) = V/(\lambda_T^d l^{d/2})$，交换的量子 virial 修正由 $l=2$ 开始。这里不需诉诸额外相互作用就得到玻色趋向聚集、费米趋向排斥的有效第二 virial 符号。高温 $z \ll 1$ 或 $n\lambda_T^d \ll 1$ 只保留 $l=1$，恢复经典不可分辨计数。

6 连接图、virial 与液气相变

来源与编写：8.333 L15–L18 及 L19 的课历回顾；旧卷相关公式在此用于连接图与临界问题。

6.1 Mayer 函数与连接展开

两体势 v_{ij} 使 $\mathrm{e}^{-\beta\sum v_{ij}} = \prod_{i<j}(1+f_{ij})$，$f_{ij} = \mathrm{e}^{-\beta v_{ij}} - 1$。每项可画为粒子顶点与所选 f 边的图。构型积分中不相连的图分解成乘积，而 $\log \Xi$ 只保留连接图，这是累积量与连接相关的同一组合结构。

写 $\beta p = \sum_{l \ge 1} b_l z^l$、$n = \sum l b_l z^l$，$z$ 无量纲。平移不变、短程势下

$$b_1 = \lambda_T^{-d}, \quad b_2 = \frac{1}{2\lambda_T^{2d}} \int f(r)\, \mathrm{d}^d r, \tag{6.1}$$

$$b_3 = \frac{1}{6\lambda_T^{3d}} \iint \left[f_{12}f_{13} + f_{12}f_{23} + f_{13}f_{23} + f_{12}f_{13}f_{23} \right] \mathrm{d}^d r_2\, \mathrm{d}^d r_3, \tag{6.2}$$

固定 $r_1 = 0$ 后总体积已除去。三个树图与一个三角图皆为连接，不能只留三角便称为 b_3。



连接树　　另一树（标签不同）　不可约三角

图中的第二树仅示形状；实际标签置换在代数中给三份，不能把形状数当带标签图数。

6.2 消去逸度与 virial 系数

由数密度级数反解 $z = n/b_1 - 2b_2 n^2/b_1^3 + [8b_2^2/b_1^5 - 3b_3/b_1^4]n^3 + \cdots$，回代压力得到

$$\beta p = n + B_2 n^2 + B_3 n^3 + \cdots, \quad B_2 = -\frac{b_2}{b_1^2}, \quad B_3 = \frac{4b_2^2}{b_1^4} - \frac{2b_3}{b_1^3}. \tag{6.3}$$

因此 $B_2 = -\frac{1}{2}\int f$，$B_3 = -\frac{1}{3}\iint f_{12} f_{23} f_{31}$，树图在由逸度换成密度时取消。这个取消解释为何 virial 展开只含相应二连接图，而不是随意删掉的经验规则。

三维硬球直径 σ 有 $f = -1$ 于 $r < \sigma$、其余 0，$B_2 = 2\pi\sigma^3/3$，$B_3 = 5\pi^2\sigma^6/18$。后者为三个两两距离小于 σ 的几何体积，需做重叠球积分；可取 $r_{12} = r$，两个半径 σ 球交体积 $\pi(4\sigma + r)(2\sigma - r)^2/12$，再 $\int_0^\sigma 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ 并除 3，得到所给值。这样保留第三 virial 的可复算主计算。

6.3 van der Waals 与共存

排斥硬芯给 $b = 2\pi\sigma^3/3$，弱吸引外尾把 $f \simeq -\beta v$，$B_2 = b - a/(k_{\mathrm{B}}T)$，$a = -2\pi\int_\sigma^\infty r^2 v(r)\,\mathrm{d}r > 0$。把排斥近似为有效自由体积、吸引近似为平均密度作用，得到 $p = nk_{\mathrm{B}}T/(1 - bn) - an^2$。这个重组比仅截断 B_2 更能表现密度非线性，却不是精确簇展开到所有阶。

临界点满足 $\partial_n p = \partial_n^2 p = 0$，求得 $n_c = 1/(3b)$、$k_{\mathrm{B}}T_c = 8a/(27b)$、$p_c = a/(27b^2)$。低于 T_c 曲线有 $\partial_n p < 0$ 的不稳定区。平衡是自由能的凸包，两相须同 T, p, μ；对摩尔体积作 Maxwell 等面积构造正是相同化学势条件的积分表达，而非把负压缩率支保留下来。

6.4 平均场指数与临界涨落的入口

临界附近取密度差 $\phi = n - n_c$，消去平移后自由能近 $F/V = f_0 + r\phi^2/2 + u\phi^4/4 - h\phi$，$u > 0$。极小条件 $r\phi + u\phi^3 = h$ 给 $\phi \propto (-r)^{1/2}$、$\chi \propto r^{-1}$、临界 $\phi \propto h^{1/3}$，即 $\beta = 1/2, \gamma = 1, \delta = 3$，热容有有限跳跃 $\alpha = 0$。这些指数忽略空间涨落；第二编将通过 Gaussian 关联、Ginzburg 准则与 RG 说明何时可用、何时需要新的固定点。一般临界行为不能仅由局部势能的一阶极小化决定。

7 简并量子气体与超流

来源与编写：*8.333 L23–L26*；理想气体先修见既有卷，重点为低能激发与响应。

7.1 Fermi 面与低温热激发

单态占据 $\bar{n}_k=[\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_k-\mu)}+1]^{-1}$ 由 $\Xi_k=1+z\mathrm{e}^{-\beta\epsilon_k}$ 直接得。零温费米面是占据突变的动量边界。低温只有其附近宽 T 的能量窗口可热激发，固定粒子数的 Sommerfeld 展开给 $C/V=\pi^2 D(E_F)k_{\mathrm{B}}^2T/3$。一般晶格或各向异性色散，应以实际费米面 $\int \mathrm{d}S/[(2\pi)^d|\nabla\epsilon|]$ 计算态密度，不把自由气的球面公式当通用式。

相互作用 Fermi 液体的准粒子寿命率近 E^2+T^2，其速度与热态密度可重整化；磁化率、压缩率还含 Landau 参数，详细构造见新凝聚态卷。统计力学中的“低温像自由准粒子”不意味着原相互作用消失，也不意味着所有观测都只需把 m 换成 m^*。

7.2 Bose 凝聚与超流的区别

玻色占据 $\bar{n}_k=[\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_k-\mu)}-1]^{-1}$ 要求 $\mu\le\epsilon_{\min}$。在三维抛物线气体，激发态能容纳的密度上限 $n_{\mathrm{ex}}=\zeta(3/2)/\lambda_T^3$，超出的粒子进入最低态。均匀 $d\le 2$ 理想气有限温的低能积分发散，因此没有同样的有限温凝聚。有限势阱、相互作用与二维 BKT 需分别讨论。

凝聚是单体密度矩阵的一个本征值 $O(N)$，超流是对相位扭曲、旋转或流动的刚度和耗散性质。理想 Bose 气可凝聚，却在 $\epsilon(p)=p^2/2m$ 下 $\min\epsilon/p=0$，无正 Landau 临界速度。弱排斥作用使 Bogoliubov 谱 $E_p=\sqrt{(p^2/2m)(p^2/2m+2gn)}$ 低能线性，才给非零声速尺度。

7.3 Landau 准则、声子与 roton

在速度 u 的流体中，创建一激发同时减少流体动量 p。Galilean 能量变化为 $\Delta E=\epsilon(p)-u\cdot p$，若所有激发皆正则弱扰动不能自发激发它们，所以 $u_c=\min_p\epsilon(p)/|p|$。^{4}He 的声子线性段给 c，roton 谷 $\epsilon(p)\simeq\Delta_r+(p-p_0)^2/(2m_r)$ 可给更小约 Δ_r/p_0。涡旋成核、边界与非线性过程可使实际临界速度更小，Landau 准则不是任意实验的充分无耗散保证。

用密度激发试态 $|q\rangle=\rho_q|0\rangle$，归一为 $NS(q)$，双对易和规则给激发变分能

$$E_F(q)=\frac{\hbar^2q^2}{2mS(q)}. \tag{7.1}$$

它是 Feynman 密度试态的能量上界而非所有激发的精确色散。静态结构因子峰表示密度排列的强相关，对应上界变低，解释 roton 与液体短程结构的联系。

7.4 正常密度与两流体

激发在小相对速度 w 下分布 $n_B(\epsilon_p-p\cdot w)$，其动量密度线性为 $\rho_n w$，所以

$$\rho_n=\frac{1}{d}\int\frac{\mathrm{d}^dp}{(2\pi\hbar)^d}p^2[-\partial_{\epsilon_p}n_B]. \tag{7.2}$$

三维声子 $\epsilon = cp$ 给 $\rho_n = 2\pi^2(k_{\mathrm{B}}T)^4/(45\hbar^3c^5)$，积分中 $\int x^4\mathrm{e}^x/(\mathrm{e}^x-1)^2 = 4\pi^4/15$。roton 附近按 Gaussian 径向能量积分贡献 $\propto T^{-1/2}\mathrm{e}^{-\Delta_r/k_{\mathrm{B}}T}$，数值前因子含 p_0, m_r。超流密度 $\rho_s = \rho - \rho_n$。

两流体总质量流 $\rho_s u_s + \rho_n u_n$，熵主要由正常部分携带。线性化密度与熵守恒可有第一声（主要密度波）与第二声（主要熵温度波），低热膨胀近似 $u_2^2 = (\rho_s/\rho_n)Ts^2/c_p$，此处 s, c_p 按单位质量。式中若改成每体积熵须同步换单位，否则量纲会错。两流体是低能局域平衡描述，不从“有 BEC”一词自动推出。

第二编　统计场论、重整化与集体物态（8.334）

8　弹性、序参量与对称破缺

来源与编写：8.334 早期讲义对应 L1–L3；符号与量纲在此统一。

8.1　从粒子到连续场

晶体平衡位置 R_i 附近的位移 u_i 在长波可插值为 $u(x)$。均匀平移 $u \to u + a$ 不应改变能量，因此最低项含梯度。刚体转动也不产生弹性能，真正的应变为 $u_{ij} = (\partial_i u_j + \partial_j u_i)/2$ 而不是所有位移梯度。各向同性小应变自由能

$$F_{\mathrm{el}} = \int \mathrm{d}^d x\, [\lambda(\nabla\cdot u)^2/2 + \mu u_{ij}u_{ij}], \tag{8.1}$$

$\mu > 0$ 且体积模量满足正条件才稳定。Fourier 分解成纵横投影 $P_L = \hat{q}\hat{q}^T, P_T = I - P_L$，静态关联为 $\langle u_i(q)u_j(-q)\rangle = k_{\mathrm{B}}T[P_L/(\lambda+2\mu) + P_T/\mu]_{ij}/q^2$。零波矢整体平移须固定或单独积分，否则 Gaussian 配分出现零模无限体积。

关联 $\int \mathrm{d}^d q/q^2$ 在 $d \le 2$ 红外发散，长波位移可使二维晶体的通常平移长程序变为代数序，但局部应变含额外 q 因子，仍可有限。这说明破缺哪种对称与观察哪个场同等重要，不能把大位移涨落一概称晶体马上熔化。

8.2　Landau–Ginzburg 泛函

序参量 $\phi(x)$ 代表局域平均密度差、磁化或其他慢变量。短程相互作用、缓慢空间变化、相关对称约束允许

$$\mathcal{H}[\phi] \equiv \frac{F}{k_{\mathrm{B}}T} = \int \mathrm{d}^d x \left[\frac{K}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{r}{2}\phi^2 + \frac{u}{4}\phi^4 - h\phi\right]. \tag{8.2}$$

这里 $\mathcal{H}$ 无量纲，K, r, u, h 已吸收温度与场的单位。场积分必须有微观截止 a，不是未定义的无穷多个独立点积分。对 Ising$\phi \to -\phi$，$h = 0$ 禁奇项；对无这种对称的液气临界点可移场并调参，使最低临界形状同标量模型。$u > 0$ 稳定四阶截断；若 $u < 0$ 需六阶正项，可能一阶转变或三临界。

均匀鞍点 $r\phi + u\phi^3 = h$ 给平均场指数。空间 Euler 方程 $-K\nabla^2\phi + r\phi + u\phi^3 = h$ 也给非均匀构造。例如 $r < 0, h = 0$ 的平面畴壁 $\phi(x) = \phi_0 \tanh[x/(\sqrt{2}\xi)]$，$\phi_0 = \sqrt{-r/u}, \xi = \sqrt{K/|r|}$，代回可核对二阶导与局域势平衡。界面张力 $\sigma = k_{\mathrm{B}}T\int K(\partial_x\phi)^2\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{2}k_{\mathrm{B}}T\sqrt{K}|r|^{3/2}/(3u)$，不是单纯两极小值的自由能差。

8.3 连续对称与 Goldstone 模

n 分量 $O(n)$ 模型将 ϕ^2 换成 $\boldsymbol{\phi}^2$。$r<0$ 的均匀极小在半径 ϕ_0 球面上，选 n 方向后写纵 σ 与 $n-1$ 横 π。二次能量为 $\frac{1}{2}K(\nabla\sigma)^2+|r|\sigma^2+\frac{1}{2}K(\nabla\pi)^2$。纵模有质量平方 $2|r|/K$，横模没有局域恢复项，因为均匀转向不改能量。这是 Goldstone 模的具体来源。

热横涨落 $\langle\pi^2\rangle\propto(n-1)T\int \mathrm{d}^dq/(Kq^2)$，$d\le 2$ 会在无限尺度增长。对有限温、短程、连续内部对称的低维体系，这提示通常长程序被破坏；严谨 Mermin–Wagner 定理还要求其标准相互作用与对称假设。离散 Ising 无连续转向 Goldstone 模，二维可以有有限温序。外场、各向异性和长程力可给质量或改变红外幂，不能套同一禁止结论。

8.4 临界模式与对称允许项

平移、旋转、内部对称以及守恒量决定允许的低能项；忽略一个对称允许且相关的项会得到错误普适类。例如有各向异性 $\sum_i\phi_i^4$ 时并非严格 $O(n)$，而有长程势 $|q|^\sigma$ 时梯度核不再 q^2。Landau 泛函的作用是把微观细节组织为耦合常数，下一步 RG 才决定哪些细节在长距离留下。仅写出四次多项式并不证明它是某材料的完整有效理论。

9 Gaussian 关联与 Ginzburg 准则

来源与编写：8.334 L4–L5 及 L8 的 Gaussian 直接解。

9.1 Gaussian 积分与生成泛函

有限维正定矩阵 A 有 $Z[J]=\int \mathrm{d}^nx\exp[-x^TAx/2+J^Tx]=(2\pi)^{n/2}(\det A)^{-1/2}\exp[J^TA^{-1}J/2]$。证明是完成平方 $x\to x-A^{-1}J$ 再以正交矩阵对角化；若有零本征值或负本征值，积分并不存在为同一有限数。连续场在截断动量或有限晶格上使用同一公式，最后再取受控极限。

对 $\mathcal{H}_0=\frac{1}{2}\int[K(\nabla\phi)^2+r\phi^2]$，$G(q)=\langle\phi_q\phi_{-q}\rangle=1/(Kq^2+r)$、$\xi=\sqrt{K/r}$。配分自由能密度的 Gaussian 涨落项 $\frac{1}{2}\int\log(Kq^2+r)\,\mathrm{d}^dq/(2\pi)^d$ 包含截止依赖的常数和解析背景，物理临界奇异部分需与之区分。

Wick 定理由 $Z[J]$ 的指数二次形式直接生成：奇数零均值矩为 0，偶数矩为所有配对的 G 乘积。四点 $\langle1234\rangle=G_{12}G_{34}+G_{13}G_{24}+G_{14}G_{23}$；连通四点在纯 Gaussian 模型为 0，加入相互作用后才出现。

9.2 实空间相关与散射

三维 Fourier 反演 $G(r)=\mathrm{e}^{-r/\xi}/(4\pi Kr)$，可通过 $(-K\nabla^2+r)G=\delta$ 的径向 Green 方程得到。临界 $r\to0$，一般 $d>2$ 的长距离 $G(x)\propto1/|x|^{d-2}$。因此 Gaussian 指数 $\eta=0,\nu=1/2$，静态磁化率 $\chi=G(q=0)=1/r$。这里 r 同时表示质量参数和有时实空间距离容易混淆，正文距离用 $|x|$ 或明确下标。

实验小角散射测结构因子 $S(q)$ 近 $1/(q^2+\xi^{-2})$ 的 Lorentz 峰，临界相关长度增长使峰变窄。真实临界 $S(q)\sim q^{-2+\eta}$，非零 η 表示长距离场尺度已被相互作用修正。有限分辨率、样品尺寸与非临界背景须先校正，再把峰宽解释为 ξ^{-1}。

9.3 涨落修正的尺度

有序相鞍点 $\phi_0^2=|r|/u$。一个相关体积内粗粒化的涨落方差主要来自 $q\lesssim\xi^{-1}$，$\langle(\delta\phi)^2\rangle_\xi\sim\int_0^{1/\xi}\mathrm{d}^dq/[Kq^2+O(|r|)]\sim K^{-d/2}|r|^{(d-2)/2}$。将它与 ϕ_0^2 比较，

$$\frac{\langle(\delta\phi)^2\rangle_\xi}{\phi_0^2}\sim uK^{-d/2}|r|^{(d-4)/2}\ll 1 \tag{9.1}$$

是平均场自洽条件。$d>4$ 临界附近比值下降，$d<4$ 增长，$d=4$ 出现边际对数。这给上临界维数 4。它不是简单比较某点的全紫外方差；后者通常含大的非临界截止项。

一回路 *tadpole* 修正 $\delta r\propto u\int\mathrm{d}^dq/(Kq^2+r)$ 可移临界温度，导数 $\partial_r\delta r\propto -u\int\mathrm{d}^dq/(Kq^2+r)^2$ 在 $d\le 4$ 有红外奇异。这与 Ginzburg 比较是同一失控尺度的两种表现。质量偏移依微观截止，普适临界指数由后续尺度流的线性化得到。

9.4 下与上临界维数

下临界维数问涨落或缺陷是否连有序相都破坏，上临界维数问临界指数何时由 Gaussian/平均场决定。连续 $O(n>1)$ 的热自旋波下临界 2，标量 Ising 下临界 1，普通短程 ϕ^4 上临界 4。二维 XY 在边界维数仍可有代数序与 BKT，不能把“无通常长程序”解释成所有相关都短程；二维 Ising 则在其下临界之上、上临界之下，有非 Gaussian 有限温临界点。

10 尺度假设、有限尺寸与重整化

来源与编写：8.334 L6–L8。

10.1 自由能的齐次结构

以 $t=(T-T_c)/T_c$ 为温度尺度场、h 为外场，假设奇异自由能在稳定临界固定点附近满足 $f_s(t,h)=b^{-d}f_s(tb^{y_t},hb^{y_h})$。这个齐次形式来自粗粒化后每个相关块贡献有限自由能及尺度场的线性流，是需要临界尺度区的假设，不是任意函数恒等式。

选 $b=|t|^{-1/y_t}$，得 $f_s=|t|^{d/y_t}\Phi_\pm(h/|t|^{y_h/y_t})$。定义 $\xi\sim|t|^{-\nu}$、$M\sim(-t)^\beta$、$\chi\sim|t|^{-\gamma}$、$C_s\sim|t|^{-\alpha}$、临界 $M\sim h^{1/\delta}$，对该自由能求导得到

$$\nu=\frac{1}{y_t},\quad \alpha=2-d\nu,\quad \beta=\nu(d-y_h),\quad \gamma=\nu(2y_h-d),\quad \delta=\frac{y_h}{d-y_h}. \tag{10.1}$$

临界关联 $G(x)\sim|x|^{-(d-2+\eta)}$ 给场尺度 $x_\phi=(d-2+\eta)/2$，源项 $\int h\phi$ 无量纲要求 $y_h=d-x_\phi$，从而 $\gamma=\nu(2-\eta)$。这些推导解释指数关系为何不是独立猜测。

10.2 假设边界与危险无关变量

$\alpha = 2 - d\nu$ 称超尺度关系，要求只有 ξ 控制奇异自由能体积尺度。在 $d > 4$ 的 ϕ^4，u 在 RG 中流向 0，却有序相 $\phi_0 \sim \sqrt{|r|/u}$，不能在求振幅前置 $u = 0$。这种危险无关变量使通常超尺度失效，平均场 $\nu = 1/2, \alpha = 0$ 不会在任意 d 满足 $2 - d\nu$。边际维数还可有对数；BKT 的 ξ 为本质奇异，也不能硬套普通温度幂指数。

10.3 RG 变换与相关、无关方向

先积分掉尺度 a 到 ba 之间的短波，再把坐标缩回原截止，最后重标场。所有对称允许的耦合组成向量 g，变换 $g' = R_b(g)$。固定点 $R_b(g_*) = g_*$，在其附近 $\delta g_i' = \sum_j M_{ij}\delta g_j$，对角尺度方向的本征值 b^{y_i}。$y_i > 0$ 相关、< 0 无关、$= 0$ 边际，边际需看非线性项。对相关方向的名字应与所选基相关，原始温度可混入其他参数。

多个微观模型流到同一固定点，就有相同长距离指数与经尺度单位归一的普适函数；“所有材料都一样” 并非普适性的含义。对称、维数、相互作用范围、守恒与拓扑等改变可使流到不同固定点。

Gaussian 模型在 $x = bx'$、$\phi(x) = b^{-(d-2)/2}\phi'(x')$ 下保持梯度项，质量 $r' = b^2 r$，四次耦合 $u' = b^{4-d}u$。这直接给 $y_r = 2, y_u = 4 - d$ 与上临界维数。后续相互作用 RG 将这些工程维数修正。

10.4 有限尺寸标度

当样品边长 L 限制相关长度，临界量依赖 $tL^{1/\nu}$。例如 $M = L^{-\beta/\nu}\mathcal{M}(tL^{1/\nu}, hL^{y_h})$、$\chi = L^{\gamma/\nu}\mathcal{X}(tL^{1/\nu})$。Binder 比 $U_L = 1 - \langle M^4\rangle/[3\langle M^2\rangle^2]$ 无量纲，在相同几何边界下临界曲线近交于普适值。有限尺寸修正 $L^{-\omega}$、外形及边界都会移动交点，不能用两条小样品曲线交点声称精确 T_c。

有限尺寸谱或模拟数据做塌缩时，应先固定可检验的指数、误差与修正方案，再检查不同尺寸是否一致。任意调横纵坐标直到看起来重合不构成独立指数验证。

11 动量壳 RG 与 Wilson–Fisher 固定点

来源与编写：8.334 L9–L12；采用 $u/4!$ 规范统一图的组合系数。

11.1 快慢模与连接展开

设 $\mathcal{H} = \int[\frac{1}{2}(\nabla\boldsymbol{\phi})^2 + \frac{r}{2}\boldsymbol{\phi}^2 + \frac{u}{4!}(\boldsymbol{\phi}^2)^2]$，$n$ 分量，截止 Λ。分 $\phi = \phi_< + \phi_>$，慢模 $|q| < \Lambda e^{-\,dl}$，快模在薄壳。有效作用量 $\mathcal{H}_{\text{eff}}[\phi_<] = -\log\langle e^{-\mathcal{H}_{\text{int}}}\rangle_>$ 加慢 Gaussian 项，展开为 $\langle\mathcal{H}_{\text{int}}\rangle_> - \frac{1}{2}\langle\mathcal{H}_{\text{int}}^2\rangle_{>,c} + \cdots$。负二阶号来自对数，不能把各阶相同符号堆上去。

Gaussian 快模收缩 $\langle\phi_{>,a}(q)\phi_{>,b}(-q)\rangle = \delta_{ab}/(q^2 + r)$。一次四腿顶角中收缩两快腿给质量 tadpole；两个顶角各留两慢腿并两条快传播子相连给四次顶角修正。只保留连接图避免重复计入真空归一。

11.2 一回路系数的计算

薄壳积分 $I_1 = K_d\Lambda^{d-2}\,\mathrm{d}l/(1+\widetilde{r})$、$I_2 = K_d\Lambda^{d-4}\,\mathrm{d}l/(1+\widetilde{r})^2$，$K_d = S_{d-1}/(2\pi)^d$、$\widetilde{r} = r/\Lambda^2$。为算出 n 的组合系数，写 $\phi = \varphi + \chi$（慢、快），四次顶角中恰有两条快腿的部分为

$$V_2 = \frac{u}{24}\int [2\varphi^2\chi^2 + 4(\varphi\cdot\chi)^2] = \int \chi_a B_{ab}(\varphi)\chi_b, \qquad B_{ab} = \frac{u}{12}(\varphi^2\delta_{ab} + 2\varphi_a\varphi_b). \tag{11.1}$$

快场同点收缩 $\langle\chi_a\chi_b\rangle = \delta_{ab}I_1$，所以 $\langle V_2\rangle = (n+2)uI_1\int\varphi^2/12$；与 $r\varphi^2/2$ 比较即 $\delta r = (n+2)uI_1/6$。二阶连接收缩 $\langle\chi_a(x)\chi_b(x)\chi_c(y)\chi_d(y)\rangle_c = G_>(x-y)^2(\delta_{ac}\delta_{bd}+\delta_{ad}\delta_{bc})$。两条快线积分给 I_2，而

$$\operatorname{tr} B^2 = \frac{u^2}{144}(n+8)(\varphi^2)^2, qquad -\frac{1}{2}\langle V_2^2\rangle_c = -I_2\int \operatorname{tr} B^2. \tag{11.2}$$

与 $u(\varphi^2)^2/24$ 比较，$\delta u = -(n+8)u^2I_2/6$。这里的 n 是闭合指标环，额外的 2 和 8 来自纵向投影与两种跨顶角 Wick 配对；例如 $n=1$ 得 $\delta r = uI_1/2$、$\delta u = -3u^2I_2/2$。零外动量的局部顶角近似要求外部慢波矢远小于薄壳动量。

缩回截止后，以 $g = K_d u\Lambda^{d-4}$，$\epsilon = 4-d$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\widetilde{r}}{\mathrm{d}l} = 2\widetilde{r} + \frac{n+2}{6}\frac{g}{1+\widetilde{r}} + O(g^2), \tag{11.3}$$

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}l} = \epsilon g - \frac{n+8}{6}\frac{g^2}{(1+\widetilde{r})^2} + O(g^3). \tag{11.4}$$

非普适临界质量被 tadpole 移为负，不能直接把 $r=0$ 当相互作用模型的精确临界温度。固定点 $g_* = 6\epsilon/(n+8) + O(\epsilon^2)$，$\widetilde{r}_* = -(n+2)\epsilon/[2(n+8)] + O(\epsilon^2)$。

11.3 临界指数与控制参数

在临界面附近，温度方向本征值 $y_t = 2 - (n+2)\epsilon/(n+8) + O(\epsilon^2)$，所以 $\nu = 1/2 + (n+2)\epsilon/[4(n+8)] + O(\epsilon^2)$。一回路 tadpole 与外动量无关，故这一阶 $\eta = 0$。由前章指数关系，

$$\gamma = 1 + \frac{n+2}{2(n+8)}\epsilon + O(\epsilon^2), \qquad \beta = \frac{1}{2} - \frac{3}{2(n+8)}\epsilon + O(\epsilon^2), \qquad \delta = 3 + \epsilon + O(\epsilon^2). \tag{11.5}$$

这是一种在 $\epsilon \ll 1$ 且固定点 $g_* = O(\epsilon)$ 下可控的非 Gaussian 展开。将 $\epsilon = 1$ 代入可估三维，却有未计高阶误差；不应把一回路三维数当精确值。$n=1$ 给 $\nu \simeq 7/12$，与精确二维 $\nu = 1$ 的远维数结果更不能仅以一阶硬外推。

两回路首次产生外动量依赖的 sunset 自能。课程给出的标准 $O(n)$ 结果 $\eta = (n+2)\epsilon^2/[2(n+8)^2] + O(\epsilon^3)$ 需同阶波函数与耦合重整化。此处引用其结果定位两回路的作用，主稿完整算到一回路，未把一回路图称作该二阶系数的证明；相应作业中若要求具体二阶壳图，按其模型另算。

11.4 其他相互作用与边际维数

算符 ϕ^{2p} 的 Gaussian 耦合尺度 $y_{2p} = d - p(d-2)$，在 $d=4$、$p>2$ 为负；额外梯度也降低工程相关性。因此近四维的普通四次固定点只需有限个相关调参，而不是每个微观项都同等控制临界。但当四次项也被调到 0，六次项可变为三临界主项，上临界维数改为 3，不能仍删它。

$d=4$ 时 $g' = -(n+8)g^2/6$，$g(l) = g_0/[1+(n+8)g_0 l/6]$ 缓慢趋 0。把这个 $1/\log$ 流放入质量与场响应会产生平均场幂乘对数修正，这正是边际项需要非线性流的具体例子。

12 实空间 RG 与 Monte Carlo

来源与编写：*8.334 L13–L14* 与课程大纲中的格点模拟。

12.1 一维 Ising 精确消元

一维零场 $\mathcal{H}=-K\sum_i s_i s_{i+1}$，$s_i=\pm1$。积分每个偶站使 $\sum_{s_2}\mathrm{e}^{K(s_1s_2+s_2s_3)}=2\cosh[K(s_1+s_3)]=A\mathrm{e}^{K's_1s_3}$。比较 $s_1=s_3$ 与 $s_1=-s_3$，得 $K'=\frac{1}{2}\log\cosh 2K$、$A=2\sqrt{\cosh 2K}$。有限 $K>0$ 有 $K'<K$，流向高温无序点；$K=\infty$ 为零温临界端点。

精确相关 $\langle s_0 s_r\rangle=(\tanh K)^r$ 给 $\xi^{-1}=-\log\tanh K$。低温定义热缺陷逸度 $t=\mathrm{e}^{-2K}$，$\xi\simeq 1/(2t)$，消元 $t'\simeq 2t$ 给 $y_t=1$。此 t 不是线性 $T-T_c$，所以不能写一维 $\xi\propto T^{-1}$；它随 $\mathrm{e}^{2J/k_{\mathrm{B}}T}$ 增长。

12.2 块自旋与累积近似

高维选择块变量 S_B 并保持原自旋与块变量的条件权重，$\mathrm{e}^{-\mathcal{H}'[S]}=\sum_s P(S|s)\mathrm{e}^{-\mathcal{H}[s]}$。精确变换会产生更多邻距、多体和场耦合，一般不是只剩一个 K'。

Niemeijer–van Leeuwen 做法将块内 H_0 精确处理、块间 V 按连接累积展开：$\mathcal{H}'=-\log Z_0+\langle V\rangle_0-\langle V^2\rangle_{0,c}/2+\cdots$。块内条件分布由所选块自旋定义决定，$\langle s\rangle_i$ 与 $\langle s_i s_j\rangle_c$ 构成重整化系数。截断阶数与舍弃生成耦合必须明示，它不是高维 Ising 的精确消元。

Migdal–Kadanoff 近似用移键与消元改变连通结构。先串联消元再并联的一种 b 倍次序给

$$K'=b^{d-1}\,\mathrm{atanh}[(\tanh K)^b]. \tag{12.1}$$

$d=1$ 时是精确串联，$d>1$ 改变图的连通结构。$d=2,b=2$ 有 $K'=\log\cosh 2K$，临界不动点约 0.609，而方格精确值为 0.4407。线性化 $\nu=\log b/\log R'(K_c)$ 可检查估计精度。本卷官方复习题采用另一种先移键后消元次序，数值另列；两种都属近似，不能混用。近似仍保留两个流域与临界相关方向，物理结构可比数值更可靠。

12.3 详细平衡与采样误差

对构型 s 取目标 $\pi(s)=\mathrm{e}^{-\mathcal{H}(s)}/Z$。对称提议翻一自旋，接受 $P_{\mathrm{acc}}=\min(1,\mathrm{e}^{-\Delta\mathcal{H}})$。两态概率比恰为 $\mathrm{e}^{-\Delta\mathcal{H}}$，故详细平衡 $\pi(s)P(s\to s')=\pi(s')P(s'\to s)$。加可达性与非周期性保证有限状态 Markov 链趋目标分布；详细平衡本身不保证混合快。

能量或磁化的连续采样相关。定义积分自相关时间

$$\tau_{\mathrm{int}}=\frac{1}{2}+\sum_{t>0}\frac{C(t)}{C(0)},\qquad \mathrm{Var}(\overline{A})\simeq\frac{2\tau_{\mathrm{int}}}{N_{\mathrm{samples}}}\,\mathrm{Var}(A). \tag{12.2}$$

热化前样本应舍去；跨临界慢化时必须用更长轨迹、块平均或簇算法，不能把每一步当独立样本制造过小误差。

12.4 临界模拟的可复核对象

周期 $L\times L$ 方格的能量 $E=-J\sum_{\langle ij\rangle}s_is_j$，翻自旋的 $\Delta E=2Js_i\sum_{j\sim i}s_j$。测 $C=\beta^2(\langle E^2\rangle-\langle E\rangle^2)/L^2$、$\chi=\beta L^2(\langle m^2\rangle-\langle m\rangle^2)$ 和 Binder 比，用多个 L 检查标度。有限零场系统对称性常使 $\langle m\rangle=0$，报告 $|m|$ 作为序参量时磁化率定义仍要小心，不能未经说明把 $\langle m\rangle^2-\langle|m|\rangle^2$ 当严格线性响应。

本卷数值附档以固定种子执行短规模模拟并对照一维精确结果、Gaussian 积分与 RG 固定点。它验证程序与计算步骤，不以少量样品替代热力学极限证明。作业需要的具体图、误差与有限尺度范围另按题登记。

13 级数、闭环与对偶

来源与编写：8.334 L15–L18；L17 的无约束闭游走是近似，L18 的转角求和给二维精确计数。

13.1 高温展开与低温畴壁

Ising 键 $\mathrm{e}^{Ks_is_j}=\cosh K(1+s_is_j\tanh K)$，逐键相乘后对所有自旋求和，任何顶点若有奇数入边则该自旋求和为 0。故 $Z=2^N(\cosh K)^{N_b}\sum_{\text{even graphs}}(\tanh K)^{|G|}$，图在每顶点偶度，在二维可分成闭环但交叉与重叠的计数须保留。

低温从全同自旋出发，翻一个畴的能量只随边界长度：每条不满足键代价 $2J$。于是低温图权重 $\mathrm{e}^{-2K\ell}$，图画在对偶格。Peierls 估计在二维把穿过某邻域的长度 ℓ 闭环数上界为常数乘 3^ℓ，若 $3\mathrm{e}^{-2K}<1$，长畴壁总概率小，可证明足够低温有自发磁化。这个粗界证明存在有序区，不给精确 T_c。

13.2 一维传递矩阵

含场 h 时 $T_{ss'}=\exp[Kss'+h(s+s')/2]$，$Z=\operatorname{Tr}T^N$。本征值 $\lambda_\pm=\mathrm{e}^K\cosh h\pm\sqrt{\mathrm{e}^{2K}\sinh^2h+\mathrm{e}^{-2K}}$，无限链 $f=-k_{\mathrm{B}}T\log\lambda_+$。有限 K 最大根光滑且唯一，因此无有限温非解析相变。零场 $\lambda_-/\lambda_+=\tanh K$，再次得到相关长度。

高温闭环或低温缺陷在一维都可完整求和，适合核对展开系数和有限尺寸实现。把一维无相变推到二维的错误在于域壁熵随长度的增长和环结构已变化。

13.3 二维自对偶与三维规范对偶

方格的低温畴壁与对偶格高温偶图一一对应，令 $\mathrm{e}^{-2K^*}=\tanh K$。扣去显式 $2^N,\cosh K$ 等解析因子，$Z(K)$ 映到 $Z(K^*)$。自对偶条件 $\sinh 2K_c=1$ 给 $K_c=\frac12\log(1+\sqrt2)$，但只凭自对偶还须知道相变位置与唯一性；下章精确自由能核对此唯一临界奇异。

三维 Ising 低温图是闭合的二维畴壁面，而非二维闭线。$\mathbb{Z}_2$ 格点规范模型边变量 $u_l=\pm1$、作用 $-K_g\sum_p\prod_{l\in\partial p}u_l$ 的高温展开也给闭面，因为对每条边求和要求相邻选面数偶。因此 $\mathrm{e}^{-2K_{\mathrm{Ising}}}=\tanh K_g$ 联系三维 Ising 与对偶规范模型。不能把三维模型错误称为与同一三维 Ising 自对偶。

13.4 随机游走生成与 phantom 环

Gaussian 格点场的二次矩阵写 $A = I - w\mathsf{J}$, J 为邻接矩阵, 则 $\log Z = -\frac{1}{2}\log\det A + \text{const} = \frac{1}{2}\sum_{l\ge 1} w^l \operatorname{Tr}\mathsf{J}^l/l + \text{const}$。$\operatorname{Tr}\mathsf{J}^l$ 计起点相同的闭游走, $1/l$ 除去起点重复, $1/2$ 与无向或实场计数相联。这些游走可自交、重复走边, 故称 phantom 环。

具体把一次走步定义为邻接矩阵 $\mathsf{J}_{rr'} = 1$（最近邻）或 0, 长 ℓ 的游走矩阵便是 $W(\ell) = \mathsf{J}^\ell$。平移不变的 d 维超立方晶格上 $|q\rangle$ 为本征向量, $\lambda(q) = 2\sum_{\alpha=1}^{d}\cos q_\alpha$。同一 phantom 近似中, 两点相关由所有开放游走求和为

$$G_{\mathrm{ph}}(r) = \sum_{\ell\ge 0} t^\ell \langle r|\mathsf{J}^\ell|0\rangle = \int_{[-\pi,\pi]^d} \frac{\mathrm{d}^d q}{(2\pi)^d}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot r}}{1 - 2t\sum_\alpha \cos q_\alpha}. \tag{13.1}$$

当 $t < 1/(2d)$, 小 q 分母为 $1 - 2dt + tq^2 + O(q^4)$, 故 $\xi_{\mathrm{ph}}^2 = t/(1-2dt)$, 近伪临界 $t_c^{\mathrm{ph}} = 1/(2d)$ 时 $\xi \propto (t_c^{\mathrm{ph}} - t)^{-1/2}$。闭游走的迹和则给每站 $\log S'/N = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^d q/(2\pi)^d \log[1 - 2t\sum_\alpha \cos q_\alpha]$, 其奇异部分按 ξ^{-d} 缩放。由此直接得到 Gaussian $\nu = 1/2, \eta = 0$; 随机游走分形维数 2, 两条游走在 $d < 4$ 易相交, 说明四维以下忽略交叉并不自洽。这里的 G_{ph} 和 ξ_{ph} 是近似结果, 二维实际 Ising 临界 $t_c = \sqrt{2} - 1$, 不可把伪临界 $1/4$ 误作精确值。

它可总结高温图的 Gaussian 近似, 解释高维临界的均场结构, 但不是把每个 Ising 偶图精确计一次。二维精确求和需要如下局域转角相位, 而非让所有闭环带相同权。

13.5 从偶图到带符号的有向闭环

记 $t = \tanh K$。原 Ising 偶图在每条边上只取 0 或 1 次; Gaussian 的 exp(单环和) 却允许边重复。方格四度顶点有三种把四条边接成路径的方式: 两种不自交、一种自交。令自交方式带负号, 三种权重和为 $1 + 1 - 1 = 1$, 恰还原原偶图该顶点的单一权重。若一条边被两条路径占用, 可交换路径在这条边两侧的接法; 交换前后自交奇偶相反, 贡献相消。立刻沿原边折返的 U 形转弯不能如此配对, 故必须禁止反向一步。这两项是原讲义 L18 的消重规则, 不是 Gaussian 近似自动具有的性质。

对无立即折返的平面有向闭路径 γ, 令 $n_\times$ 为自交次数, $\Theta = \sum_j \theta_j$ 为切向量的总转角。平面 Whitney 奇偶关系给

$$(-1)^{n_\times} = -\exp(\mathrm{i}\Theta/2) = -\prod_j \exp(\mathrm{i}\theta_j/2). \tag{13.2}$$

简单方环转角 $\Theta = \pm 2\pi$, 权重为正; 一次自交把奇偶号翻转。右转、左转、直行的局域因子分别为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/4}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}, 1$, 反向因子为 0。全路径看似非局域的交叉号由此变成可逐步相乘的权。闭路径有两种取向, 指定起点的 ℓ 个选择还须除以 ℓ。

13.6 四方向矩阵与精确行列式

把出发方向按右、上、左、下排为 $\mu = 1, 2, 3, 4$。在 Fourier 空间, 无折返的有向一步矩阵写为 $T_*(q) = D(q)C$,

其中

$$D(q)=\operatorname{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_x},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q_y},\mathrm{e}^{\mathrm{i}q_x},\mathrm{e}^{\mathrm{i}q_y}),\qquad C=\begin{pmatrix}1 & z & 0 & z^{-1}\\ z^{-1} & 1 & z & 0\\ 0 & z^{-1} & 1 & z\\ z & 0 & z^{-1} & 1\end{pmatrix},\quad z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}. \tag{13.3}$$

例如第一行的 0 排除从左到达后立即向右折返；z 与 z^{-1} 记录左、右转。对单连通平面区域，先在 t 小的收敛域逐阶展开，交叉与重边相消后可解析延续：

$$S_{\mathrm{even}}=\exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{\ell\ge 1}\frac{t^{\ell}}{\ell}\operatorname{Tr}T_*^{\ell}\right]=\det(I-tT_*)^{1/2}. \tag{13.4}$$

负号来自 $(-1)^{n_\times}=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Theta/2}$；$1/2$ 除去闭路径的两个方向。最先的四步方环在 $\operatorname{Tr}T_*^4$ 中带负号，代入负半迹后给每个方格 $+t^4$，与原高温展开核对。有限环面有绕圈拓扑扇区，不能把上式的单个行列式当成全部有限尺寸配分函数；以下 Fourier 式取体自由能极限。

对上面的显式 4×4 矩阵直接展开行列式，得到

$$\det[I-tT_*(q)]=(1+t^2)^2-2t(1-t^2)(\cos q_x+\cos q_y). \tag{13.5}$$

因此方格体自由能满足

$$-\beta f=\log(2\cosh^2 K)+\frac{1}{2}\int_{[-\pi,\pi]^2}\frac{\mathrm{d}^2q}{(2\pi)^2}\log\bigl[(1+t^2)^2-2t(1-t^2)(\cos q_x+\cos q_y)\bigr]. \tag{13.6}$$

在 $q=0$ 行列式首次为 0 的条件是 $1-2t-t^2=0$，故 $t_c=\sqrt{2}-1$。原 L17 的无符号闭游走矩阵只给 $1-2t(\cos q_x+\cos q_y)$，其伪临界 $t=1/4$ 及奇异形式均不同。这里的转角相位和消重正是使结果精确的步骤；第14章给同一自由能的费米传递矩阵核对。

14　方格 Ising 的精确自由能

来源与编写：8.334 L18–L19 给 Kac–Ward 精确自由能并说明费米传递解释；以下 Jordan–Wigner 对角化为编者补足的等价计算链。

14.1　行传递与对偶耦合

考虑无限二维方格、零场、各向同性最近邻 $J>0$。一行 N 自旋间的垂直键矩阵每站为 $\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{K} & \mathrm{e}^{-K}\\ \mathrm{e}^{-K} & \mathrm{e}^{K}\end{pmatrix}=\sqrt{2\sinh 2K}\,\mathrm{e}^{K^*\sigma^x}$，$\tanh K^*=\mathrm{e}^{-2K}$。水平键对角，因此对称行传递矩阵可写

$$V=(2\sinh 2K)^{N/2}\mathrm{e}^{(K/2)\sum\sigma_j^z\sigma_{j+1}^z}\mathrm{e}^{K^*\sum\sigma_j^x}\mathrm{e}^{(K/2)\sum\sigma_j^z\sigma_{j+1}^z}. \tag{14.1}$$

每个因子由显式矩阵恒等式得到，$Z=\operatorname{Tr}V^{N_y}$，大 N_y 时最大本征值控制自由能。

14.2 Majorana 化与每模对角化

为了不把“化为自由费米子”当黑箱，取一行的串算符 $S_j=\prod_{\ell<j}\sigma^x_\ell$，定义两个 Hermitian Majorana 算符

$$a_j=S_j\sigma^z_j,\qquad b_j=S_j\sigma^y_j,\qquad \{a_j,a_k\}=\{b_j,b_k\}=2\delta_{jk},\quad \{a_j,b_k\}=0. \tag{14.2}$$

沿串移动一个站点会得到一次反对易；同站用 Pauli 乘法直接核对 $\sigma^x_j=\mathrm{i}a_jb_j$ 及 $\sigma^z_j\sigma^z_{j+1}=\mathrm{i}b_ja_{j+1}$。故上节 $V=PQP$ 的两种指数均为 Majorana 双线性，其中

$$P=\exp\!\left(\frac{\mathrm{i}K}{2}\sum_j b_ja_{j+1}\right),\qquad Q=\exp\!\left(\mathrm{i}K^*\sum_j a_jb_j\right). \tag{14.3}$$

周期自旋行的末键带总宇称 $\mathcal{P}=\prod_j\sigma^x_j$，在每个固定宇称扇区选对应的周期或反周期 Majorana 边界。以下 q 为该扇区允许的动量；两个动量网格相差半格，体极限相同。

取 $a_q=N^{-1/2}\sum_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qj}a_j$，$b_q$ 同。由 $[\mathrm{i}\gamma_1\gamma_2,\gamma_1]=-2\mathrm{i}\gamma_2$ 与另一条对易式，可逐项计算 P,Q 共轭作用于列向量 $(a_q,b_q)^{\mathsf T}$。记 $c=\cosh K, s=\sinh K$ 以及 $c_*=\cosh 2K^*, s_*=\sinh 2K^*$，两种作用矩阵分别为

$$H(q)=\begin{pmatrix} c & \mathrm{i}s\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q}\\ -\mathrm{i}s\mathrm{e}^{\mathrm{i}q} & c\end{pmatrix},\qquad Q_*(q)=\begin{pmatrix} c_* & -\mathrm{i}s_*\\ \mathrm{i}s_* & c_*\end{pmatrix}. \tag{14.4}$$

例如 $Pa_jP^{-1}=ca_j+\mathrm{i}sb_{j-1}$，$Pb_jP^{-1}=cb_j-\mathrm{i}sa_{j+1}$；Fourier 变换正给 $H(q)$ 中的两个相位。对称行传递的 2×2 块为 $M(q)=H(q)Q_*(q)H(q)$。两因子行列式均为 1，因此 $\det M=1$；利用迹的循环性，$\operatorname{tr}M=\operatorname{tr}[Q_*H^2]$，且 H^2 只需把 K 改成 $2K$。乘开两项对角元，得到

$$\frac12\operatorname{tr}M(q)=\cosh\gamma_q=\cosh 2K\cosh 2K^*-\sinh 2K\sinh 2K^*\cos q. \tag{14.5}$$

因 $\det M=1$，其本征值必为 $\mathrm{e}^{\pm\gamma_q}$；对偶关系 $\sinh 2K\sinh 2K^*=1$ 又把上式改写为 $\cosh\gamma_q=\cosh 2K\coth 2K-\cos q$。每个正能复费米模的两态传递本征值相差 e^{γ_q}，最大本征态在每模取 $+\gamma_q/2$，故

$$\log\lambda_{\max}=\frac{N}{2}\log(2\sinh 2K)+\frac12\sum_q\gamma_q. \tag{14.6}$$

有限行的宇称投影会调整允许动量和个别态，却不改上述每站体自由能；没有投影时不可把两个完整费米 Fock 空间重复计为原自旋空间。

因此每站精确自由能为

$$-\beta f=\frac12\log(2\sinh 2K)+\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\operatorname{arcosh}[\cosh 2K\coth 2K-\cos q]\,\mathrm{d}q. \tag{14.7}$$

高温 $K\to0$ 两个对数奇异相消，给 $\log 2$；低温给 $2K$，即每站两条满意键的基态能 $-2J$。两个边界极限是公式归一的直接检查。用 $t=\tanh K$ 将此一维 arcosh 积分还原为第13章的双动量行列式积分，两式必须给相同自由能；例如 $K=0.2,0.4,0.7$ 时两式数值差分别小于 3×10^{-15}。

14.3 能隙、相关长度与热容

$\gamma_0 = 2|K-K^*|$，只在 $K = K^*$ 闭合，故精确临界满足 $\sinh 2K_c = 1$。近临界，$\gamma_q \simeq \sqrt{m^2+q^2}$，$m = 2|K-K^*| \propto |T-T_c|$，因此 $\xi \sim m^{-1}$、$\nu = 1$。奇异自由能来自 $\int_0^\Lambda \sqrt{m^2+q^2}\,\mathrm{d}q$ 的 $-m^2\log|m|$ 项，二阶温度导数给对数热容，$\alpha = 0$ 带对数，而非有限平均场跳跃。

零场自发磁化的精确关联结果为 $m(T) = [1-\sinh^{-4}(2K)]^{1/8}$ 于 $K > K_c$，高温 0，故 $\beta = 1/8$。这一磁化公式需要非局域自旋相关的 Toeplitz/Pfaffian 分析；本章上述单粒子传递谱完整求出自由能，却没有把它冒称为磁化公式的全证明。课程 L19 引用该标准结果，本稿保留这个证明范围。

临界自旋相关 $G(r) \sim r^{-1/4}$ 给 $\eta = 1/4$，配尺度关系得 $\gamma = 7/4, \delta = 15$。这些不同于近四维一回路外推，说明二维强涨落固定点需要真正的非 Gaussian 结构。含外场、非最近邻或一般三维 Ising 没有此自由费米传递解，不能把零场精确公式用于任意 Ising 模型。

14.4 可计算的数值核对

随卷计算用稳定的 arcosh 与数值积分对照高低温展开，并以小周期方格枚举所有 2^{L^2} 构型核对有限尺寸配分与能量；无限体公式与小 L 有有限尺寸误差，不强求相等。积分在临界端点的导数奇异需单独处理，普通粗网格微分会低估对数峰。

15 连续自旋、涡旋与 BKT 转变

来源与编写：8.334 L20–L22。

15.1 非线性 sigma 模型

$O(n)$ 低温固定幅度场 $n(x)$ 满足 $n^2 = 1$，作用 $\mathcal{H} = (1/2g)\int(\nabla n)^2$，$g$ 与温度/刚度之比有关。参数化 $n = (\pi, \sqrt{1-\pi^2})$，展开得 $\mathcal{H} = (1/2g)\int[(\nabla\pi)^2 + (\pi\cdot\nabla\pi)^2 + \cdots]$，约束造成梯度相互作用，不能把 n 的 n 个分量都当独立 Gaussian。

在 $d = 2+\epsilon$，令 $K = 1/g$ 并分 $\pi = p + \chi$ 为慢快场。快场同点协方差 $\langle\chi_a\chi_b\rangle_> = \delta_{ab}I_d/K$，$I_d = \int_{\text{shell}} \mathrm{d}^d q/[(2\pi)^d q^2]$。四次梯度项 $K(\pi\cdot\nabla\pi)^2/2$ 中，$\langle(\chi\cdot\nabla p)^2\rangle_> = (I_d/K)(\nabla p)^2$，所以直接动能修正为 $+I_d(\nabla p)^2/2$。另一方面，约束给平均纵向分量 $\langle\sqrt{1-\chi^2}\rangle_> = \zeta = 1-(n-1)I_d/(2K)$；把慢自旋恢复为单位长度使动能再乘 ζ^2。两项合并是

$$K' = b^{d-2}(K+I_d)\zeta^2 = b^{d-2}[K-(n-2)I_d] + O(K^{-1}I_d^2). \tag{15.1}$$

其余快梯度项给局域约束/测度修正，不应再当独立的慢梯度计一次。二维 $I_2 = \mathrm{d}l/(2\pi)$，从 $g = 1/K$ 得 $\mathrm{d}g/\mathrm{d}l = -\epsilon g + (n-2)g^2/(2\pi) + \cdots$。$n > 2, d = 2$ 耦合随尺度增长，相关长约 $a\exp[2\pi/((n-2)g)]$，自旋波弱耦合最终失控。$n = 2$ 时直接修正的 1 与长度恢复的 $n-1 = 1$ 相消，与单角度 Gaussian 表述一致；涡旋仍是非微扰自由度。

15.2 XY 自旋波与代数序

$n=2$ 写 $n=(\cos\theta,\sin\theta)$，$\mathcal{H}=K\int(\nabla\theta)^2/2$，$K=\rho_s/(k_{\mathrm{B}}T)$。在二维高斯场 $\langle[\theta(r)-\theta(0)]^2\rangle=\log(r/a)/(\pi K)$，所以 $\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta(r)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta(0)}\rangle=(a/r)^{\eta}$，$\eta=1/(2\pi K)$。相位差的对数增长使通常磁化为 0，却有幂律关联，正是准长程序。

紧致角还允许 $\oint\nabla\theta\cdot\mathrm{d}l=2\pi m$ 涡旋。单涡 $\theta=m\arg(x+\mathrm{i}y)$，梯度 m/r，能量 $E_v=\pi\rho_s m^2\log(L/a)+E_c$。可放置位置的熵约 $2k_{\mathrm{B}}\log(L/a)$，对单位涡的简单能熵竞争给临界刚度量级 $\rho_s/(k_{\mathrm{B}}T)=2/\pi$。因其他涡与自旋波会重整刚度，应使用长距离的 K_R，不能把这个估计中的裸刚度直接叫精确转变温度。

15.3 Coulomb 气与介电屏蔽

多个涡的能量在中性条件 $\sum_i m_i=0$ 下为 $-2\pi\rho_s\sum_{i<j}m_im_j\log(r_{ij}/a)+E_c\sum_i m_i^2$。小涡反涡偶极子在大涡产生的场中极化，屏蔽对数作用、降低有效 K。赋予单位涡逸度 $y=\mathrm{e}^{-E_c/k_{\mathrm{B}}T}$，积分尺寸 a 到 $a\mathrm{e}^{\mathrm{d}l}$ 的偶极子并重标，标准归一给

$$\frac{\mathrm{d}K^{-1}}{\mathrm{d}l}=4\pi^3y^2+O(y^4),\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}l}=(2-\pi K)y+O(y^3). \tag{15.2}$$

为看清第一式的符号和系数，一对 $+1,-1$ 涡的尺寸 s 权重是 $y^2\,\mathrm{d}^2R\,\mathrm{d}^2s\,a^{-4}(a/s)^{2\pi K}$。对缓变的外测试场，把电荷作用差按 $s\cdot\nabla\Phi$ 展开到二阶；线性项角积分为 0，而 $\langle(s\cdot\nabla\Phi)^2\rangle_{\hat{s}}=s^2|\nabla\Phi|^2/2$。用涡的 2π 电荷及两种方向配对整理成反刚度增量，标准无量纲逸度约定给

$$\delta K^{-1}=2\pi^2y^2\int_{a<s<a\mathrm{e}^{\mathrm{d}l}}\frac{\mathrm{d}^2s}{a^4}s^2(a/s)^{2\pi K}=4\pi^3y^2\,\mathrm{d}l+O((\mathrm{d}l)^2). \tag{15.3}$$

第二式的 2 是涡位置积分维数，$-\pi K$ 是单涡自能的尺度代价；偶极可极化因而使 K^{-1} 增加。若将每对方向或核心面积吸收到 y，二阶系数相应重标，但正号与临界线不变。

15.4 流、普适跳跃与本质奇异

$y=0,K>2/\pi$ 是一条低温固定线，涡无关，相关幂随 K_R 连续变化；$K<2/\pi$ 时 y 增长，自由涡破坏代数序。分界流抵达 $K_R=2/\pi$，故 $\rho_s(T_c^-)=2k_{\mathrm{B}}T_c/\pi$，临界 $\eta=1/4$。

在端点 $K\simeq2/\pi$ 附近令 $x=2-\pi K$，$Y=4\pi y$，上式给 $\dot{x}=Y^2+O(xY^2)$，$\dot{Y}=xY+O(Y^3)$，从而 $C=x^2-Y^2$ 沿最低阶流不变。分界的高温侧 $C=-\kappa^2<0$ 且 $\kappa\propto\sqrt{\tau}$，其中 τ 是离分界的光滑温度距离。代入 $Y^2=x^2+\kappa^2$，临界区所用 RG 时间可实际积分：

$$l_*\simeq\int_{x_{\mathrm{in}}}^{x_{\mathrm{out}}}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+\kappa^2}=\frac{1}{\kappa}\left[\arctan\frac{x_{\mathrm{out}}}{\kappa}-\arctan\frac{x_{\mathrm{in}}}{\kappa}\right]\propto\tau^{-1/2}. \tag{15.4}$$

当 $Y(l_*)=O(1)$ 时涡浓度不再微扰，关联尺度 $\xi\sim a\mathrm{e}^{l_*}=a\exp(b/\sqrt{\tau})$。这是本质奇异，不能赋普通有限 ν；b 依微观逸度，刚度跳跃与临界指数由端点结构决定。

有限系统即使无穷体系无磁化也可有大 $\langle|M|\rangle$；应测关联与扭曲刚度随 L 的对数修正，再区分 BKT 与普通幂律临界。孤立单涡不能在严格周期环面中净存在，模拟要用中性涡对或相应拓扑扇区。

16 二维晶体与拓扑熔化

来源与编写：*8.334 L23*。

16.1 平移代数序与取向

取物理二维 Lamé 常数 λ,μ（尚未除以 $k_{\mathrm B}T$），弹性自由能 $F=\frac12\int \mathrm d^2x[2\mu u_{ij}u_{ij}+\lambda(u_{ii})^2]$。动量 q 处纵、横位移本征核分别为 $(\lambda+2\mu)q^2,\mu q^2$，所以

$$\langle u_i(q)u_j(-q)\rangle=\frac{k_{\mathrm B}T}{q^2}\left[\frac{P^T_{ij}(q)}{\mu}+\frac{P^L_{ij}(q)}{\lambda+2\mu}\right],\quad P^L_{ij}=q_iq_j/q^2,\ P^T=I-P^L. \tag{16.1}$$

晶体密度的倒格分量 $\rho_G(x)\propto \mathrm e^{\mathrm iG\cdot[x-u(x)]}$。Gaussian 特征函数把其关联写成 $\exp\{-\langle[G\cdot(u(r)-u(0))]^2\rangle/2\}$。长距对数系数可先对 q 角度取 $\langle(G\cdot\hat q)^2\rangle=G^2/2$；$\cos(q\cdot r)$ 的方向项只改有限常数或角向振幅，不改领先对数。由 $\int_{1/r}^{1/a}\mathrm d^2q/[(2\pi)^2q^2]=\log(r/a)/(2\pi)$ 得

$$\langle[G\cdot(u(r)-u(0))]^2\rangle=\frac{k_{\mathrm B}TG^2}{2\pi}\left(\frac{1}{\mu}+\frac{1}{\lambda+2\mu}\right)\log(r/a)+O(1),\qquad \eta_G=\frac{k_{\mathrm B}TG^2(\lambda+3\mu)}{4\pi\mu(\lambda+2\mu)}. \tag{16.2}$$

故 $\langle\rho_G(r)\rho_G(0)^*\rangle\propto r^{-\eta_G}$。每粒子归一的结构因子在倒格点附近是此幂律的二维 Fourier 变换，$S(G+k)\propto|k|^{\eta_G-2}$ $(0<\eta_G<2)$，有限边长 L 的峰高 $S(G)\propto L^{2-\eta_G}$。它是代数 Bragg 奇峰而非有限温下的严格 δ 峰；高 $|G|$ 的指数更大，峰渐弱。取向角近 $\omega=(\partial_xu_y-\partial_yu_x)/2$，多一个梯度，其无缺陷热长波方差红外有限。所以二维固体可有代数平移序而长期取向序，并不与位移红外发散矛盾。

16.2 位错与位向旋错

沿闭路位移增量 $\oint\partial_iu_j\,\mathrm dx_i=b_j$ 为 Burgers 向量，非零则存在位错；它不能由单值光滑位移场消掉。对六角晶格，键取向绕路改 $\pm\pi/3$ 为基本位向旋错。一个位错可视为相邻反号旋错偶极，两个缺陷层级的能量尺度不同，因而可能两步解束缚。

为得到能量的对数系数，把含位错的畸变 $\beta_{ij}=\partial_iu_j$ 分为满足 $\mathrm i\varepsilon_{li}q_l\beta_{ij}(q)=b_j$ 的奇异部分与单值的光滑部分。在上节二次弹性能中对光滑部分最小化，消去纵横位移后得到一个位错在红外的弹性能

$$E_d-E_c=\frac{Y}{2}\int_{1/L<|q|<1/a}\frac{\mathrm d^2q}{(2\pi)^2}\frac{|\boldsymbol b\times\boldsymbol q|^2}{q^4}=\frac{Yb^2}{8\pi}\log(L/a),\qquad Y=\frac{4\mu(\lambda+\mu)}{\lambda+2\mu}. \tag{16.3}$$

第二等号用角平均 $\langle\sin^2\theta\rangle=1/2$ 及 $\int\mathrm dq/q$；E_c 收集截止内的核心能。这也说明只把每个位移分量类比独立 XY 涡旋会漏掉平衡应变对系数的调整。位错可放在约 $(L/a)^2$ 个位置，故 $S_{\mathrm{pos}}=2k_{\mathrm B}\log(L/a)$。比较 E_d-TS_{pos} 给最短 $|b|=a$ 的长距离解束缚条件 $Ya^2/(k_{\mathrm B}T)=16\pi$；这里应取已屏蔽的重整模量，裸模量只给初步估计。

16.3 hexatic 与两步图景

位错解束缚破坏平移代数序，但仍可有六重键角序 $\psi_6=\mathrm e^{6\mathrm i\theta}$，称 hexatic 相。其长波角自由能 $F_\theta=K_A\int(\nabla\theta)^2/2$。旋错电荷 $1/6$，同一涡能熵分析给 $K_A/(k_{\mathrm B}T)=72/\pi$ 临界值，ψ_6 关联指数在临界为 $1/4$。再解束缚旋错后为各向同性液体。

KTHNY 图景要求缺陷核心代价使连续解束缚流可达相应固定点；某些材料或相互作用可能因核心能低而出现

一阶熔化、晶界机制或其他中间结构。因此“所有二维固体必经 hexatic”不是该理论的结论。解释实验应同时看平移和取向相关、弹性模量、缺陷密度与有限尺寸，不能仅凭一个结构因子峰宽标成 hexatic。

17 Langevin、Fokker–Planck 与临界动力学

来源与编写：8.334 L24–L25。

17.1 Brownian 粒子的平衡结构

过阻尼粒子满足 $\dot{x} = -\Gamma U'(x) + \eta(t)$，白噪声 $\langle \eta \rangle = 0$、$\langle \eta(t)\eta(t') \rangle = 2D\delta(t-t')$。短时间增量 $\Delta x = -\Gamma U' \Delta t + \sqrt{2D\Delta t}\,\zeta$，$\zeta$ 标准 Gaussian；对任意平滑测试函数 Taylor 展开至 $O(\Delta t)$，平均生成算符 $\mathcal{L}f = -\Gamma U' f' + D f''$。分部积分得到

$$\partial_t P = \partial_x [\Gamma U' P + D \partial_x P]. \tag{17.1}$$

概率流 $J = -\Gamma U' P - D\partial_x P$。要求无流的 $P_{\mathrm{eq}} \propto \mathrm{e}^{-\beta U}$，得到 Einstein 关系 $D = \Gamma k_{\mathrm{B}} T$。噪声与摩擦若不满足该关系，不能把稳态擅自称同温度的热平衡。

谐势 $U = kx^2/2$ 的 Ornstein–Uhlenbeck 过程有 $\langle x(t)x(0) \rangle = (k_{\mathrm{B}}T/k)\mathrm{e}^{-\Gamma k|t|}$，响应 $\chi(\omega) = \Gamma/(\Gamma k - \mathrm{i}\omega)$，噪声谱 $S_x = 2D/[(\Gamma k)^2 + \omega^2]$，直接满足经典涨落耗散 $S_x = 2k_{\mathrm{B}}T\chi''/\omega$。这提供从随机方程到可测谱的完整例子。

17.2 非守恒序参量：Model A

对场的物理自由能 $F[\phi]$，取 $\partial_t \phi = -\Gamma \delta F/\delta\phi + \zeta$，$\langle \zeta(x,t)\zeta(x',t') \rangle = 2\Gamma k_{\mathrm{B}} T \delta(x-x')\delta(t-t')$。泛函 Fokker–Planck 流同粒子情形，保证 $P[\phi] \propto \mathrm{e}^{-\beta F}$。若 Gaussian$F = \frac{1}{2}\int [r\phi^2 + K(\nabla\phi)^2]$，每 q 模衰减率 $\Gamma(r + Kq^2)$，$\tau \sim r^{-1} \sim \xi^2$，Gaussian 动态指数 $z = 2$。

响应 $R(q,\omega) = [-\mathrm{i}\omega + \Gamma(r + Kq^2)]^{-1}$，结构谱 $C(q,\omega) = 2\Gamma k_{\mathrm{B}} T |R|^2$。频率积分给静态 $\langle |\phi_q|^2 \rangle = k_{\mathrm{B}}T/(r + Kq^2)$，恢复前章 Gaussian 结果，这验证噪声归一及静动态一致性。

17.3 守恒序参量：Model B

若 $\int \phi$ 必须守恒，动力学应由电流 $J = -\Gamma \nabla(\delta F/\delta\phi) + \eta_J$ 形成，$\partial_t \phi = \Gamma \nabla^2 \delta F/\delta\phi - \nabla \cdot \eta_J$。噪声为电流噪声，谱额外 q^2，不能继续用空间独立非守恒白噪声。

Gaussian 衰减率 $\Gamma q^2(r + Kq^2)$，临界 $r = 0$ 为 q^4，$z = 4$。相互作用情况下在标准 Model B 且无额外耦合的条件下守恒与静态异常维数联系为 $z = 4 - \eta$；若序参量耦合动量、能量或其他慢量，可能属于其他动态普适类。相同静态 Ising 指数的两种模型可有不同弛豫时间。

17.4 动态 RG 与可观测时间

动态尺度形式 $C(q,\omega) = q^{-2+\eta-z}\mathcal{C}(\omega/q^z, q\xi)$，频率积分需给静态 $q^{-2+\eta}$。z 控制临界慢化，实验扫描速度若快于 $\tau(\xi)$，就可能看到非平衡滞后而非平衡指数。局域 Markov 随机方程已忽略热库记忆，若噪声有长时间相关或惯性重要，需要扩展而不能只改 Γ 数值。

响应场路径积分可把噪声 Gaussian 概率积分，得到包含 $\widetilde{\phi}(\partial_t\phi+\Gamma\delta F/\delta\phi)$ 与噪声二次项的动态作用量；其传播子是上述推迟响应，相关线为噪声乘两个响应。这个构造提供动态微扰图的起点，不能把静态传播子直接当频率依赖响应而忽略因果性。

18 守恒约束与非平衡表面增长

来源与编写：8.334 L26：平衡的一般尺度不变性与开放系统增长。

18.1 无临界调参的长程结构

临界长相关常需调温度到特殊点，但守恒、连续对称或约束也可使长波无质量。不可压缩流体 $\nabla\cdot u=0$ 的均衡动量能 $F=\rho\int u^2/2$，允许子空间为横向，故 $\langle u_i(q)u_j(-q)\rangle=(k_{\mathrm{B}}T/\rho)(\delta_{ij}-q_iq_j/q^2)$。尽管振幅无 q 发散，投影在 $q=0$ 方向非解析，实空间含非局域偶极型约束相关。不能仅以“谱有限”判断相关一定纯局域。

这些约束性尺度结构不同于标量液气临界的温度相关方向。开放系统的持续驱动、守恒噪声及模式耦合又可产生新的无临界调参标度，必须从其实际随机方程与对称判断，不能以平衡配分函数自动描述。

18.2 Edwards–Wilkinson 模型

表面高度 $h(x,t)$ 相对平均面写 $\partial_t h=\nu\nabla^2h+\eta$，$\langle\eta(x,t)\eta(x',t')\rangle=2D\delta^d(x-x')\delta(t-t')$。减掉 $q=0$ 平均高度增长后，每非零模为 OU 过程，稳态 $S_h(q)=D/(\nu q^2)$。

粗糙度 $W^2=L^{-d}\int\langle[h(x)-\bar h]^2\rangle\,\mathrm{d}x\sim\int_{1/L}^{1/a}\mathrm{d}^dq/q^2$。$d<2$ 给 $W\sim L^{\alpha}$、$\alpha=(2-d)/2$，$d=2$ 为 $W^2\sim\log L$，$d>2$ 红外有限。动态模时间 $\sim q^{-2}$，$z=2$；未饱和时 $W\sim t^{\beta}$，$\beta=\alpha/z=(2-d)/4$。这些指数从精确 Gaussian 过程来，适于检查模拟和噪声归一。

18.3 KPZ 非线性与倾斜对称

若沿表面法向沉积，转成垂直高度速度会出现 $(\nabla h)^2$ 项，KPZ 方程为 $\partial_t h=\nu\nabla^2h+\lambda(\nabla h)^2/2+\eta$。相对平面倾斜 $h\to h+v\cdot x$ 可由坐标漂移 $x\to x+\lambda vt$ 与常数速度补偿，给 Galilean 倾斜对称。若 RG 固定点保持该对称且 λ 有限，尺度要求 $\alpha+z=2$，不是独立地把两个指数都设成 Gaussian 值。

在一维周期边界，稳态梯度分布仍为 $P[h]\propto\exp[-\nu\int(\partial_xh)^2/(2D)]$。Fokker–Planck 中非线性流的额外贡献经泛函分部后正比 $\int(\partial_xh)^2\partial_x^2h\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int\partial_x[(\partial_xh)^3]\,\mathrm{d}x=0$。因此 $\alpha=1/2$；结合倾斜关系得 $z=3/2,\beta=1/3$，不同于 EW 的 $z=2$。这项一维稳态相消一般不在高维成立，也不证明所有噪声或边界下都同属 KPZ。

18.4 Burgers 与 Hopf–Cole 连接

令斜率 $u=\partial_xh$，得到随机 Burgers 方程 $\partial_tu=\nu\partial_x^2u+\lambda u\partial_xu+\partial_x\eta$，高度不守恒而斜率总积分在周期边界守恒。另一变换 $Z=\exp[\lambda h/(2\nu)]$ 把非线性梯度抵消，形式上 $\partial_tZ=\nu\nabla^2Z+\lambda\eta Z/(2\nu)$，是乘性随机热方程。白噪声下需固定 Itô/Stratonovich 与正规化常数，不能把光滑链式法则直接当作无紫外问题的精确随机恒等式。

随机热方程的路径积分可解释为随机环境中的有向聚合物配分，$h \propto \log Z$ 是其自由能。这连接非平衡增长与无序多路径问题；下一章讨论无序平均为何不能只把随机势换成均值。

19 淬火无序、聚合物与大纲补充

来源与编写：8.334 大纲列随机体系与聚合物；26 份公开讲义未为这些大纲项各给独立全讲，本章为编者补写的基础连接，不冒称遗漏的课堂原稿。

19.1 退火与淬火的区别

若杂质随系统充分运动，可与热变量一起求和，退火自由能 $F_a = -k_{\mathrm{B}}T \log \overline{Z}$；若杂质在观测时间内固定，每个样本先取热自由能，淬火 $F_q = -k_{\mathrm{B}}T\, \overline{\log Z}$。由 log 凹性 $\overline{\log Z} \le \log \overline{Z}$，故 $F_q \ge F_a$。平均哈密顿量、平均配分函数、平均自由能不是同一运算，不能互换。

例如独立随机能级 E 的单态 $Z = \mathrm{e}^{-\beta E}$，淬火 $F_q = \overline{E}$，退火 $F_a = \overline{E} - \beta \operatorname{Var} E/2$ 对 Gaussian 成立。退火结果被罕见低能样本偏重，差异不是仅一个数值误差。

19.2 Harris 与 Imry–Ma 判据

短程独立随机局域临界温度在相关体积 ξ^d 内的平均涨落 $\delta t_\xi \sim \xi^{-d/2}$。洁净体系距离临界 $t \sim \xi^{-1/\nu}$。若随机涨落比 t 更小，要求 $d\nu > 2$；反之 $d\nu < 2$ 无序相关。边际等号需更细 RG，不能据此判定必然相关或无关。若洁净超尺度成立，等价 $\alpha < 0$ 使弱随机质量无关。

随机场耦合 $-\int h(x)\phi(x)$ 则不同。Ising 翻一个尺度 L 畴的壁代价 $\sim \sigma L^{d-1}$，随机场能增益 $\sim hL^{d/2}$。$d < 2$ 时大畴增益压过壁，低维长程序被破坏；$d = 2$ 边际需更精细分析。连续自旋可通过缓慢转向降低代价为 L^{d-2}，比较给下临界尺度 4。随机键与随机场不能用同一个 Harris 不等式混称。

19.3 副本与自旋玻璃的范围

副本恒等式形式 $\overline{\log Z} = \lim_{n\to 0} (\overline{Z^n} - 1)/n$，对正整数 n 可先计算 n 份热变量共享同一无序。若随机场 Gaussian，平均 $\exp[\beta \int h \sum_a \phi_a]$ 生成 $\frac{1}{2}\beta^2 \Delta \int (\sum_a \phi_a)^2$，使不同副本耦合。随机质量则生成四次副本耦合。这解释副本作用量项的来源。

从整数 n 解析继续到 0 并非无需证明的普遍合法步骤；副本对称鞍点也可能失稳。自旋玻璃以无序冻结局域磁矩与大量亚稳态为特征，可用 Edwards–Anderson 量 $q_{EA} = \overline{\langle s_i \rangle^2}$ 区别均匀磁化为 0 的冻结态。完整有限维自旋玻璃与副本破缺的严谨解不属于这组公开讲义的可重建证明，本章给定义、平均结构与判据，不以一个 q 方程宣称完成所有模型。

19.4 随机链与 Flory 尺度

理想柔性链有 N 段、段长 a，独立方向使 $\langle R^2\rangle = Na^2$，Gaussian 端点分布 $P(R)\propto \exp[-dR^2/(2Na^2)]$。排斥体积 $v>0$ 可近似自由能 $F/k_{\mathrm B}T \sim R^2/(Na^2) + vN^2/R^d$，前项是伸展熵代价，后项为单体密度平方积分。极小 $R^{d+2}\sim va^2N^3$，Flory 指数 $\nu_F = 3/(d+2)$，三维为 $3/5$。

这是量级平衡而非精确指数；它忽略链段相关，二维虽恰得 $3/4$ 也不能据此称该方法严格。$d>4$ 排斥体积无关，应回理想 $\nu=1/2$，而不是无条件继续 $3/(d+2)$。$n\to 0$ 的 $O(n)$ 场论把两点高温图中一条开链保留、闭环因 n 权重消失，建立自避行走与 RG 的联系；近四维前章 $\nu = 1/2 + \epsilon/16 + O(\epsilon^2)$ 给可控修正。

吸引与排斥抵消的 θ 点涉及三体稳定项与三临界，上临界维数 3。更复杂网络需要按节点功能与连接拓扑另立熵计数，不能把所有网络都视为单条线性链。课程大纲的这些扩展保留实际覆盖与证明边界。

第三编　8.333 公开作业与历史复习题

20　8.333 作业 1：热力学

题源：Mehran Kardar，8.333 Fall 2013，PS1，截止 2013 年 9 月 18 日；与阶段复习 1 的同题另作对应。。以下解答为编者独立补写。

习题 20.1　弹性丝位移 x 所需张力 $J = ax - bT + cTx$，定 x 热容 $C_x = A(x)T$。(a) 由 Maxwell 关系求 $S_x|_T$。(b) 证明 A 不依 x。(c) 取 $S(0,0)=S_0$ 求熵。(d) 以 T, J 求定张力热容 C_J，注明稳定区。

解答.　$\mathrm dE = T\,\mathrm dS + J\,\mathrm dx$，$\mathrm dF = -S\,\mathrm dT + J\,\mathrm dx$，所以 $S_x = -J_T = b - cx$。而 $S_T = C_x/T = A(x)$，混合偏导要求 $A'(x) = \partial_T(b-cx) = 0$。积分 $S = S_0 + AT + bx - cx^2/2$。定 J 时 $x = (J+bT)/(a+cT)$，$\partial_T x|_J = (ab-cJ)/(a+cT)^2$，故

$$C_J = AT + \frac{T(ab-cJ)^2}{(a+cT)^3}. \tag{20.1}$$

局部机械稳定需 $\partial_x J = a + cT > 0$，通常热稳定还需 $A>0$。有限温经验方程不必适用于所有 T，$T=0$ 积分常数是题给的数学延拓条件。 □

习题 20.2　硬芯气满足 $p(V-Nb) = Nk_{\mathrm B}T$，固定 N、C_V 不随温度。(a) 求涉及 $S_V|_T$ 的 Maxwell 关系。(b) 求 $\mathrm dE$ 并证明 E 不依 V。(c) 证明 $\gamma = C_p/C_V = 1 + Nk_{\mathrm B}/C_V$。(d) 证明绝热 $p(V-Nb)^\gamma$ 恒定。

解答.　$S_V = p_T = Nk_{\mathrm B}/(V-Nb)$，$\mathrm dE = C_V\,\mathrm dT + [Tp_T - p]\,\mathrm dV = C_V\,\mathrm dT$，所以 $E = C_VT + E_0(N)$。定压膨胀 $V - Nb = Nk_{\mathrm B}T/p$，焓导数 $C_p = C_V + Nk_{\mathrm B}$。熵 $S = C_V\log T + Nk_{\mathrm B}\log(V-Nb) + S_0(N)$，绝热 $T(V-Nb)^{Nk_{\mathrm B}/C_V}$ 恒定，乘状态方程即所求。要求 $V>Nb, T>0$。 □

习题 20.3 零场超导与正常金属热容 $C_s = V\alpha T^3, C_n = V(\beta T^3 + \gamma T)$，体积变化忽略。(a) 第三定律求两熵。(b) 零场转变无潜热，求 T_c。(c)$E_n(0) = E_0, E_s(0) = E_0 - V\Delta$，求有限温能量。(d) 相平衡求 Δ。(e) 采用 Gaussian 磁功 $\mathrm{d}E = T\,\mathrm{d}S + B\,\mathrm{d}M + \mu\,\mathrm{d}N$，$M_s = -VB/(4\pi), M_n = 0$，求使超导失稳的 $B_c(T) = B_0[1 - T^2/T_c^2]$ 与 B_0。

解答. 熵 $S_s = V\alpha T^3/3, S_n = V(\beta T^3/3 + \gamma T)$，无潜热要求 $S_s(T_c) = S_n(T_c)$，得 $T_c^2 = 3\gamma/(\alpha - \beta)$，需 $\alpha > \beta, \gamma > 0$。能量 $E_s = E_0 - V\Delta + V\alpha T^4/4$、$E_n = E_0 + V\beta T^4/4 + V\gamma T^2/2$。自由能差

$$F_n - F_s = V[\Delta + (\alpha - \beta)T^4/12 - \gamma T^2/2]. \tag{20.2}$$

T_c 相等给 $\Delta = 3\gamma^2/[4(\alpha - \beta)] = \gamma T_c^2/4$，所以差 $V\Delta(1 - T^2/T_c^2)^2$。磁场自然势 $G = E - TS - BM$ 有 $G_B = -M$，超导额外 $VB^2/(8\pi)$、正常不变。平衡给 $B_c^2 = 8\pi\Delta(1 - T^2/T_c^2)^2$，故 $B_0 = \sqrt{8\pi\Delta}$，此形式只用于 $T \le T_c$ 与题示热容模型。 □

习题 20.4 用光子气的无穷小 Carnot 循环，从相邻温度 $T, T + \mathrm{d}T$、压强 $p, p + \mathrm{d}p$ 与体积区间 $V, V + \mathrm{d}V$ 推黑体能量。(a) 功 W。(b) 等温膨胀吸热 Q。(c) 用 Carnot 效率联系二者。(d) 已知 $p = AT^4, A = \pi^2 k_{\mathrm{B}}^4/[45(\hbar c)^3]$、$E(T, 0) = 0$ 求 E。(e) 求绝热线。

解答. 循环面积 $W = \mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$（取发动机方向），$Q = [(\partial_V E)_T + p]\,\mathrm{d}V$，效率 $\mathrm{d}T/T$ 给 $(\partial_V E)_T + p = T\,\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}T$。代 $p = AT^4$ 得 $E = 3AT^4V$。$S = (E + pV)/T = 4AT^3V$，绝热 VT^3 恒定，亦 $pV^{4/3}$ 恒定。原图的相邻曲线信息已由这些状态条件完整表述，不把示意图面积当有限循环精确公式。 □

习题 20.5 (a) 两个初温不同的物体只通过热交换趋向共同温度，利用热流方向证明总熵增加。(b) 可调体积气体置于恒 T, p 热库，热库熵变 $-(\Delta E + p\Delta V)/T$，证明平衡极小 $G = E + pV - TS$。

解答. 取 $\delta Q > 0$ 从较热物体 1 流到较冷 2，均匀体的熵变化 $\delta S = \delta Q(1/T_2 - 1/T_1) > 0$，积分给正总增量；若物体内部有不可逆温差还可增加更多熵。(b)$\Delta S_{\mathrm{tot}} = \Delta S_{\mathrm{gas}} - (\Delta E + p\Delta V)/T = -\Delta G/T \ge 0$，所以固定热库条件下自发过程 G 下降，稳定平衡取可达状态中最低 G。这是组合体系熵原理，并非开放气体自身熵必增。 □

习题 20.6 两物体热容常数 C_1, C_2、$T_1 > T_2 > 0$。(a) 直接接触且无外界交换，求最终温度与熵变。(b) 用可逆 Carnot 发动机在二者间传热，求最终温度与输出功。

解答. (a) 能量守恒给 $T_F = (C_1T_1 + C_2T_2)/(C_1 + C_2)$，$\Delta S = C_1 \log(T_F/T_1) + C_2 \log(T_F/T_2) \ge 0$，正号由加权对数凹性。(b) 总熵守恒给 $T_R = T_1^{C_1/(C_1+C_2)} T_2^{C_2/(C_1+C_2)}$，输出 $W = C_1T_1 + C_2T_2 - (C_1 + C_2)T_R$。$T_R \le T_F$ 来自算术–几何均值；更多初始内能可作为功输出。 □

习题 20.7 发动机与一组 $T_{max} = T_1 > \cdots > T_n = T_{min}$ 热源交换，吸入 $Q_\alpha^+ > 0$、放出 $Q_\beta^- > 0, W = Q^+ - Q^-$。证明效率不超过仅用最高最低温的 Carnot 效率，说明严格小于的条件。

解答. 周期热源熵要求 $\sum Q_\alpha^+/T_\alpha^+ \le \sum Q_\beta^-/T_\beta^-$。左侧 $\ge Q^+/T_{max}$，右侧 $\le Q^-/T_{min}$，所以 $\eta = 1 - Q^-/Q^+ \le 1 - T_{min}/T_{max}$。非零热量在中间温度吸入或释放、或循环不可逆时不等号严格；若只在两端交换且可逆，可等号。原题 “less” 应按实际多温流量理解，不能排除经典 Carnot 等号。 □

习题 20.8 近隔离稀薄气云经引力形成太阳和行星。(a) 轨道和结构更有序为何不违反第二定律? (b) 太阳核反应从质子形成较重元素是否因此降低总熵? (c) 地球生命与智能的组织增长如何与第二定律相容?

解答. (a) 可见空间结构并非总微观熵。引力收缩把势能释放为运动、热与辐射，粒子与辐射的状态数可增长；自引力系统的长程非加性还使普通气体直觉的均匀平衡不直接适用。(b) 核组成的某些自由度减少不决定总熵，必须把释能、光子及其他产物和传输一起计入，恒定粒子种类的简单混合熵不覆盖核反应。(c) 地球接受高温太阳光并向较冷空间辐射，吸能与排能的熵不同，开放子系统可形成局部组织同时向环境排更多熵。第二律约束包括热源与辐射环境的总熵，不以 “复杂程度” 替代 S。 □

21　8.333 作业 2：概率与涨落

题源：Mehran Kardar，8.333 Fall 2013，PS2。。以下解答为编者独立补写。

习题 21.1 独立各列沉积金原子，平均每秒 d 层。(a) 时间 t 后某位置有 m 原子的概率、未覆盖比例。(b) 厚度方差。

解答. 若各小时间段独立且单次到达率 d，Poisson 参数 $\lambda = dt$，$P(m) = \mathrm{e}^{-\lambda}\lambda^m/m!$，未覆盖比例 e^{-dt}，均值与方差皆 dt；原子层实际高度为 a 时厚度方差 $a^2 dt$。只给平均率却不假定独立 Poisson 到达不能唯一确定分布，题目的独立沉积模型在此明确采用。 □

习题 21.2 二维链 N 段 t_i、$|t_i| = a$，能 $H = -\kappa \sum t_i \cdot t_{i+1} = -\kappa a^2 \sum \cos\phi_i$，$R = \sum t_i$。(a) 求 $\langle t_m \cdot t_n\rangle$ 指数相关及持久长。(b)$N \gg 1$ 求 $\langle R^2\rangle$。(c) 求大 N 端点分布。(d) 拉力 F 使权重乘 $\mathrm{e}^{\beta F\cdot R}$，求 $\langle R\rangle = K^{-1}F + O(F^3)$ 与弹簧常数。

解答. 相邻转角独立且密度 $\propto \mathrm{e}^{u\cos\phi}$、$u = \beta\kappa a^2$。$c = \langle\cos\phi\rangle = I_1(u)/I_0(u)$，$\langle\sin\phi\rangle = 0$，迭代给 $\langle t_m\cdot t_n\rangle = a^2 c^{|m-n|}$，$\xi = -1/\log c, \ell_p = a\xi$（$\kappa > 0$；反向偏好需含振荡符号）。双和

$$\langle R^2\rangle = a^2\left[N + 2\sum_{s=1}^{N-1}(N-s)c^s\right] \simeq Na^2\frac{1+c}{1-c} \tag{21.1}$$

要求 $N \gg \xi$，不仅 $N \gg 1$。中央极限给 $P(R) \simeq [\pi\langle R^2\rangle]^{-1}\mathrm{e}^{-R^2/\langle R^2\rangle}$，两坐标方差各一半。对拉力展开配分，$\langle R_i\rangle = \beta\langle R_i R_j\rangle F_j = \beta\langle R^2\rangle F_i/2$，$K = 2k_\mathrm{B}T/\langle R^2\rangle$。大拉力伸展到 aN 附近 Gaussian 与线性 Hooke 律失效。 □

习题 21.3 二维随机觅食从巢原点扩散，系数 D。(a) 离巢 t 时距 r 分布。(b) 每段寻找时间独立指数平均 τ，返回与停留可忽略，长时间后的空间分布及大 r 鞍点渐近。

解答. 向量密度 $P(\boldsymbol{r},t)=(4\pi Dt)^{-1}\mathrm{e}^{-r^2/(4Dt)}$，径向密度 $p_r(r,t)=2\pi rP$，二者的单位不同。指数重置的平稳年龄密度 $\tau^{-1}\mathrm{e}^{-t/\tau}$，所以

$$P_\infty(r)=\frac{1}{4\pi D\tau}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t}\mathrm{e}^{-t/\tau-r^2/(4Dt)}=\frac{1}{2\pi D\tau}K_0(r/\sqrt{D\tau}). \tag{21.2}$$

指数的鞍点 $t_*=r\sqrt{\tau/(4D)}$，作用 $r/\sqrt{D\tau}$，Gaussian 宽度给 $K_0(z)\sim\sqrt{\pi/(2z)}\mathrm{e}^{-z}$。向量密度 $\propto r^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/\sqrt{D\tau}}$，径向密度 $\propto r^{1/2}\mathrm{e}^{-r/\sqrt{D\tau}}$。原点的对数峰可积，不是有限概率点质量，因为停巢时间被取零。 □

习题 21.4 (a) 由凸函数切线下界证明 Jensen 不等式。(b) 以它证明 $D(p\|q)=\int p\log(p/q)\,\mathrm{d}x\ge0$，说明零概率条件。

解答. 在 $y=\langle X\rangle$ 取 $f(x)\ge f(y)+f'(y)(x-y)$ 并平均，线性项 0，故 $\langle f(X)\rangle\ge f(\langle X\rangle)$；非可微凸函数用支撑线同理。取 $f=-\log$、随机量 q/p 且按 p 平均，$D\ge-\log\int_{p>0}q\ge0$。若 $p>0$ 而 $q=0$，相对熵 $+\infty$；若都是归一且支撑相同、函数严格凸，等号要求 q/p 恒定即 $p=q$。 □

习题 21.5 IID 序列 x_n，x_n 大于此前全部值时记录指标 $R_n=1$，$R_1=1$。(a) 求记录率与分布形式的关系。(b) 记录总数 S_N 期望及大 N，每年尝试数翻倍时增长。(c) 证明不同记录指标协方差 0。(d) 给所有矩与前三累积量，判断中心极限。(e) 已知第三记录 $n_3=9$，求第二记录 n_2 与第四 n_4 期望。采用连续分布或随机打破平局；有原子概率时原题的分布无关结论须修改。

解答. 无平局时前 n 个次序均等，每个位置成为最大概率 $1/n$，所以 $P(R_n=1)=1/n$。$\langle S\rangle_N=H_N\sim\log N+\gamma_E$，若 $N=N_02^t$，记录均数约 $t\log2+\log N_0+\gamma_E$。随机排列的“新元素在前 n 中排名”依次独立且均匀，故记录指标独立，特别 $\langle R_mR_n\rangle=1/(mn)$。

矩母函数 $M(t)=\prod_{n=1}^N[1+(\mathrm{e}^t-1)/n]=\Gamma(N+\mathrm{e}^t)/[\Gamma(\mathrm{e}^t)N!]$，所有 r 阶矩由 $M^{(r)}(0)$ 给出，也可写 $\langle S_N^r\rangle=\sum_k k^r c(N,k)/N!$，$c(N,k)$ 为第一类无符号 Stirling 数。前三累积量 $\kappa_1=H_N$、$\kappa_2=H_N-H_N^{(2)}$、$\kappa_3=H_N-3H_N^{(2)}+2H_N^{(3)}$。独立非同分布的有界指标满足 Lindeberg 条件，方差 $\sim\log N\to\infty$，故标准化后趋 Gaussian，不能说 IID 中心极限直接适用于原 R_n。

(e) 条件 $n_3=9$ 要求 2–8 只有一个记录，位置 r 相对权重 $[1/r]/[1-1/r]=1/(r-1)$，所以 $P(n_2=r|n_3=9)=1/[(r-1)H_7]$、$\langle n_2\rangle=1+7/H_7\simeq3.6997$。已出现 9 记录后，下一记录在 $m>9$ 的概率 $9/[m(m-1)]$，均值 $9\sum_{m>9}1/(m-1)=+\infty$。中位等待有限却均值发散，不能把 $\langle n_4\rangle$ 猜成 18。 □

习题 21.6 系统初始正则平衡，按协议做外功 W，Hamilton 微观态经一一且体积保持的演化到新 H'；正反协议初态各为对应平衡。(a) 证明 $P_f(W)/P_b(-W)=\mathrm{e}^{\beta(W-\Delta F)}$。(b) 推 Jarzynski$\langle\mathrm{e}^{-\beta W}\rangle=\mathrm{e}^{-\beta\Delta F}$。(c) 推 $\langle W\rangle\ge\Delta F$。(d) 循环若净抽出功 $\omega>0$，给违例概率上界。题页净功符号文字有歧义，此处规定 W 为输入系统的功。

解答. 对应路径的初态权重比 $[\mathrm{e}^{-\beta H}/Z]/[\mathrm{e}^{-\beta H'}/Z'] = \mathrm{e}^{\beta(W-\Delta F)}$。时间反演给反路径，Liouville 的单位 Jacobian 使按相同 W 积分后仍得 (a)；仅“确定性”不保证 Jacobian1，题中需 Hamilton 或等价微观可逆过程。

乘 $P_f \mathrm{e}^{-\beta W} = P_b(-W)\mathrm{e}^{-\beta\Delta F}$ 积分得 (b)。Jensen 给 $\mathrm{e}^{-\beta\langle W\rangle} \le \langle \mathrm{e}\rangle^{-\beta W}$，得 (c)。循环 $\Delta F = 0$，以非负变量 $Y = \mathrm{e}^{-\beta W}$、$\langle Y\rangle = 1$ 用 Markov 不等式，$P(W \le -\omega) = P(Y \ge \mathrm{e}^{\beta\omega}) \le \mathrm{e}^{-\beta\omega}$。稀有轨迹可抽功，平均仍服从第二律；用有限样本估计指数均值时罕见事件的重要性不可忽略。 □

习题 21.7 仅知骰子 6 面概率为 1 面的两倍。(a) 求除此约束外最大熵的“无偏”概率。(b) 这条信息相对公平骰子减少多少比特熵?

解答. 令约束 $p_6 - 2p_1 = 0$，最大 $-\sum p_i \log p_i$ 的乘子给 $p_1 = q2^{-2/3}, p_6 = q2^{1/3}, p_2 = \cdots = p_5 = q$，$q = [4 + 2^{-2/3} + 2^{1/3}]^{-1}$。若将“其他面与 1 相同”另作假设会得 $1/7$ 与 $2/7$，但那是新增约束，不是本题最大熵。记 $Z = 1/q$，约束使熵中乘子项相消，$H = \log_2 Z$，信息量 $I = \log_2 6 - H = \log_2(6/Z)$，约 0.0267 bit。 □

习题 21.8 平衡涨落变量 x_i，$C_{ij}(t) = \langle x_i(t)x_j(0)\rangle$。(a) 用时间平移与反演得互易关系。(b) 若分布 $P \propto \exp[-x^T Kx/2]$、$K$ 正定，求 $C(0)$。(c) 共轭力 $J = -\nabla \log P$ 证明 $\langle J_i x_j\rangle = \delta_{ij}$。(d) 平均松弛 $\dot{x} = -\mu Kx$，由 $\dot{C}(0)$ 推出 Onsagerμ 对称，说明变量的时间反演奇偶条件。

解答. 平稳是同时平移两时刻，$C_{ij}(t) = C_{ji}(-t)$；不是把时间差任意移仍相同。若 x_i 皆时间反演偶，反演又给 $C_{ji}(-t) = C_{ji}(t)$。Gaussian 完成平方得 $C(0) = K^{-1}$，$J_i = K_{ij}x_j$，所以 (c)$KC = I$。$\dot{C}(0^+) = -\mu KC(0) = -\mu$，互易 $C(t) = C(t)^T$ 令 $\mu = \mu^T$。奇变量时应为 Onsager–Casimir 带奇偶符号关系，不能强行对称。真正平稳随机松弛还需 FDT 噪声；所给确定性方程描述平均线性响应，噪声对这个右导数与过去初态无相关贡献。 □

22 8.333 作业 3：动力学

题源：*Mehran Kardar*，*8.333 Fall 2013*，*PS3*，截止 *2013* 年 *10* 月 *18* 日。。以下解答为编者独立补写。

习题 22.1 (a) 证明沿 Hamilton 轨道 $\dot{O} = \{O, H\}$。(b) 若任意可测光滑观测 O 的系综平均 $\langle\{O, H\}\rangle = 0$，证明 $\{H, \rho\} = 0$，注明边界条件。

解答. 链式法则与 Hamilton 方程给 (a)。对任意紧支撑 O 或有消失表面项的周期/衰减边界，分部积分 $\int \rho\{O, H\} = \int O\{H, \rho\}$。左侧全为 0，测试函数任意使 $\{H, \rho\} = 0$ 按分布意义；若 ρ 可微则逐点成立。只对一个 O 或有限几个矩为 0 不够推出全密度平稳。 □

习题 22.2 局域三维 Maxwell 分布 $f_1^0 = n(2\pi m k_{\mathrm{B}}T)^{-3/2}\exp[-(p - mu)^2/(2mk_{\mathrm{B}}T)]$。(a) 求压力张量 $P_{ij} = mn\langle c_i c_j\rangle$ 与热流 $h_i = nm\langle c_i c^2\rangle/2$，$c = p/m - u$。(b) 代入粒子、动量与能量守恒求 n, u, T 的零阶流体方程。(c) 证明 $D_t \log(nT^{-3/2}) = 0$。(d) 积分动量写 $H_0 = \int f_1^0 \log f_1^0$。(e) 求 $\dot{H}_0$。(f) 解释平衡趋近。

解答. Gaussian 二阶矩给 $P_{ij}=nk_{\mathrm B}T\delta_{ij}$，奇矩 $h_i=0$。故 $D_tn=-n\nabla\cdot u$、$mnD_tu=-\nabla(nk_{\mathrm B}T)$、$D_tT=-(2/3)T\nabla\cdot u$。前后两对数导数相消得 (c)。积分 $\langle mc^2/(2k_{\mathrm B}T)\rangle=3/2$，

$$H_0=\int \mathrm{d}^3r\,n\left[\log\frac{n}{(2\pi mk_{\mathrm B}T)^{3/2}}-\frac{3}{2}\right]. \tag{22.1}$$

常相空间单位仅加与 N 有关常数。由 (c) 方括号沿流线守恒，再以连续性求 $\partial_t(n\mathcal{A})+\nabla\cdot(nu\mathcal{A})=0$，无边界流时 $\dot H_0=0$。零阶 Euler 不产生耗散，局域 Maxwell 但非均匀态可持续运动；趋平衡需要梯度修正的黏性、热导或其他不可逆机制。 □

习题 22.3 两板距 w，下板静止、上板沿 x 速度 u。零阶分布为均匀 n,T、局域流速 $u_x=\alpha y$ 的 Maxwell，$\alpha=u/w$。(a) 用单碰撞时间 $\tau_\times$ 求一阶 $f_1=f_0-\tau_\times(v\cdot\nabla)f_0$。(b) 求穿过 y 面 x 动量流 Π_{xy}。(c) 求板受力与黏度。

解答. 令 $c_x=p_x/m-\alpha y, c_y=p_y/m$，$\partial_y f_0=(m\alpha c_x/k_{\mathrm B}T)f_0$，所以 $\delta f=-\tau_\times m\alpha c_xc_yf_0/(k_{\mathrm B}T)$。$\Pi_{xy}=\int mc_xc_y\delta f\,\mathrm{d}p=-nk_{\mathrm B}T\tau_\times\alpha$，因 $\langle c_x^2c_y^2\rangle=(k_{\mathrm B}T/m)^2$。下板所受沿流方向的力密度 $F_x=-\Pi_{xy}$，上板反向，$\eta=nk_{\mathrm B}T\tau_\times$，与 y 无关。要求 $|\alpha|\tau_\times\ll1$ 且板间有流体窗口 $w\gg\ell$。 □

习题 22.4 固定两态原子 a_0,a_1 相差 ε，与 $\omega=\varepsilon/\hbar$ 光子作用。自发 $a_1\to a_0+\gamma$ 率 σ_{sp}，吸收截面 σ_{ad}、受激发射 σ_{st} 均角无关。(a) 求 n_1/n_0。(b) 写光子密度 $f(r,p,t)$ 动力学。(c) 求 f_{eq}。(d) 用 $f_{eq}=h^{-3}/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)$ 求三截面关系。(e) 介质占 $x>0$，沿 $+x$ 入射光的非平衡通量如何衰减？求穿透长。

解答. (a) 等简并两态 $n_1/n_0=\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}$。选原题相空间密度归一，自发源每态为 $n_1\sigma_{sp}$，吸收与受激的速度/几何常数吸入其率系数，$\partial_tf+c\hat p\cdot\nabla f=n_1\sigma_{sp}+(n_1\sigma_{st}-n_0\sigma_{ad})f$。稳态 $f_{eq}=n_1\sigma_{sp}/(n_0\sigma_{ad}-n_1\sigma_{st})=\sigma_{sp}/[\mathrm{e}^{\beta\varepsilon}\sigma_{ad}-\sigma_{st}]$。

(d) 对所有温度匹配 Planck 式，需 $\sigma_{ad}=\sigma_{st}$ 且 $\sigma_{sp}=\sigma_{ad}/h^3$ 于上述密度归一；若截面用单位实际光通量，c 与态密度常数须恢复，两 Einstein B 系数相等的内容不变。(e) 沿入射方向 $c\partial_x(f-f_{eq})=-(n_0\sigma_{ad}-n_1\sigma_{st})(f-f_{eq})$，所以穿透长 $\ell_\gamma=c/(n_0\sigma_{ad}-n_1\sigma_{st})$，正温平衡 $n_0>n_1$ 使衰减。若 $n_1>n_0$ 人口反转，系数负，变增益而非正穿透长。 □

习题 22.5 外势 $U(q)$ 中经典气体。(a) 在归一与固定平均总能下极小一体 $H=N\int\rho_1\log\rho_1\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}q$，求平衡密度。(b) 两种质量 m_a,m_b 的气体共享固定总能，求两密度并说明每粒子平动能可定义共同温度。原题声称平稳解的必要性须检查其他守恒量。

解答. (a) 乘子变分 $\log\rho_1+1+\lambda+\beta[p^2/(2m)+U]=0$，得 $\rho_1=Z_1^{-1}\mathrm{e}^{-\beta[p^2/(2m)+U]}$。严格凸 $\rho\log\rho$ 使给定这些约束下极小唯一。(b) 各组归一乘子不同，能量乘子 β 相同，所以 $\rho_\alpha\propto\mathrm{e}^{-\beta[p^2/(2m_\alpha)+U_\alpha]}$，每粒子平动能 $3/(2\beta)=3k_{\mathrm B}T/2$ 相同。质量改变速度方差，不改共同能量温标。

H 定理的零碰撞态可含流速；在周期系统守恒总动量或有整体旋转等额外约束时，平稳态还可为广义 canonical 分布。题目所列零流唯一必要性只在无额外宏观守恒、固定静止边界或相应约束已排除时成立，不能将熵极小解当任意平稳解的无条件必要式。 □

习题 22.6 经典电子气被相对真空深度 φ 的势阱束缚。(a) 平坦表面逃逸电子内外速度关系。(b) 温度 T 的速度分布。(c) 密度 n 时热发射电流密度。

解答. 切向速度守恒。法向速度满足 $v_z'^2 = v_z^2 - 2\varphi/m$，因此仅 $v_z > \sqrt{2\varphi/m}$ 的电子向外逃逸。设 Maxwell 速度密度为

$$P(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T}\right)^{3/2} \mathrm{e}^{-mv^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}. \tag{22.2}$$

电流大小由通量积分求出：

$$j = en \int_{v_z > v_0} v_z P(v)\, \mathrm{d}^3 v = en\sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{2\pi m}}\mathrm{e}^{-\varphi/k_{\mathrm{B}}T}. \tag{22.3}$$

用入射到表面的速度做通量积分，不能用外部变小的速度却不换密度 Jacobian。题目是经典模型；真实简并金属 Richardson–Dushman 前因子需量子态填充。 □

23 8.333 作业 4：非相互作用粒子

题源：Mehran Kardar，8.333 Fall 2013，PS4，截止 2013 年 11 月 13 日。。以下解答为编者独立补写。

习题 23.1 N 个相同经典原子在球形谐陷阱 $H = \sum[p_i^2/(2m) + Kr_i^2/2]$。(a) 证明每粒子角动量守恒，说明加入旋转对称相互作用后只保证总角动量。(b) 广义分布原题取 $\exp[-\beta(H + \Omega L_z)]$，$|\Omega| < \sqrt{K/m}$，求 Z。(c) 求 $\langle L_z\rangle$。(d) 求位置密度与 $\langle x^2\rangle, \langle y^2\rangle, \langle z^2\rangle$。

解答. 中心力使 $\dot{L} = r \times (-Kr) = 0$。相互作用两体中心力的转矩对总量相消，却在粒子之间交换角动量。完成平方

$$H_1 + \Omega L_z = \frac{(p_x - m\Omega y)^2 + (p_y + m\Omega x)^2 + p_z^2}{2m} + \frac{K - m\Omega^2}{2}(x^2 + y^2) + \frac{K}{2}z^2. \tag{23.1}$$


令 $\omega_0 = \sqrt{K/m}$，$Z = Z_1^N/N!$，$Z_1 = (k_{\mathrm{B}}T/\hbar\omega_0)^3/[1 - \Omega^2/\omega_0^2]$。原题加号给 $\langle L_z\rangle = -\beta^{-1}\partial_\Omega \log Z = -2Nm\Omega k_{\mathrm{B}}T/(K - m\Omega^2)$；通常转动热库用 $H - \Omega L$ 时符号反转，不能暗改题。

位置 Gaussian 密度 $P(r) = [\beta/(2\pi)]^{3/2}(K - m\Omega^2)\sqrt{K}\exp\{-\beta[(K - m\Omega^2)(x^2 + y^2) + Kz^2]/2\}$，方差横向 $k_{\mathrm{B}}T/(K - m\Omega^2)$、纵向 $k_{\mathrm{B}}T/K$。$|\Omega| \to \omega_0$ 失去横向约束，配分函数发散，是稳定条件的真实边界。 □

习题 23.2 N 个双原子分子固定在方格金属表面，每个可沿 x, y 平躺（能 0）或沿 z 站立（能 $\varepsilon > 0$）。(a) 基态数与最高微观能。(b) 能量 E 的态数及熵。(c) 热容并画温度变化。(d) 特定分子站立概率。(e) 正温内能的最大值。

解答. (a) 基态数 2^N，最高 $N\varepsilon$ 的全部站立态只有 1 种。(b) $M = E/\varepsilon$ 须为 0 至 N 整数，$\Omega = \binom{N}{M}2^{N-M}$、$S = k_{\mathrm{B}}\log\Omega$；大 N 以 Stirling 给 $S/(Nk_{\mathrm{B}}) = -x\log x - (1-x)\log[(1-x)/2]$，$x = M/N$。

canonical 单站 $z = 2 + \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon}$，站立 $q = 1/(1 + 2\mathrm{e}^{\beta\varepsilon})$，$E = N\varepsilon q$，$C = Nk_{\mathrm{B}}(\beta\varepsilon)^2 q(1-q)$。两端 $T \to 0$ 指数小，$T \to \infty$ 按 T^{-2} 小，中间有 Schottky 峰。以下为 $C/(Nk_{\mathrm{B}})$ 按 k_BT/ε 的矢量曲线。



正温 $q < 1/3$，最大热能的上确界 $N\varepsilon/3$；高于此能的微正则宏观态可对应负温，不是“最高微观能”等于正温均能。 □

习题 23.3 N 个量子自旋 s，磁矩 $m_z = \mu m, m = -s, \dots, s$，外場 B。(a)Gibbs 配分。(b) 小 B 自由能至 B^2。(c)Curie 磁化率。(d) 小场证明 $C_B - C_M = cB^2/T^2$，$\chi = c/T$。

解答. $x = \beta\mu B, Z = [\sum_m e^{xm}]^N = [\sinh((2s+1)x/2)/\sinh(x/2)]^N, G = -Nk_BT\log z$。零場均匀 m 有 $\langle m^2\rangle = s(s+1)/3$，所以 $G(B) = G(0) - N\mu^2 s(s+1)B^2/(6k_BT) + O(B^4), \chi = N\mu^2 s(s+1)/(3k_BT) = c/T$。由 $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T - M\,\mathrm{d}B$ 的 Maxwell 关系，$C_B - C_M = T(\partial_T M|_B)^2/(\partial_B M|_T)$，代 $M = cB/T + O(B^3)$ 给 $cB^2/T^2 + O(B^4)$。题示式是 Curie 小场阶，并非整个 Brillouin 函数的有限场精确关系。 □

习题 23.4 理想气与有 N_s 个单占据吸附位置的催化表面接触，每吸附粒子能 $-\varepsilon$。(a) 求气体 $\mu(T,p)$。(b) 表面巨配分。(c) 占据率 $\theta = p/[p + p_0(T)]$ 及 p_0。(d) 粒子数特征函数与全部累积量相对巨势的导数。(e) 证明数涨落响应。(f) 求相对涨落。

解答. $\mu = k_BT\log[p\lambda_T^3/(k_BT)] = k_BT[\log(p/T^{5/2}) + A_0]$，后式的常数包含使对数无量纲的单位。表面 $\Xi_s = (1 + ze^{\beta\varepsilon})^{N_s}$，$\theta = ze^{\beta\varepsilon}/(1 + ze^{\beta\varepsilon})$，所以 $p_0 = (k_BT/\lambda_T^3)e^{-\beta\varepsilon}$。

$\langle e^{-ikN}\rangle = \Xi_s(\mu - ik_BTk)/\Xi_s(\mu)$，巨势 $\mathcal{G} = -k_BT\log\Xi_s$，$\kappa_m = -(k_BT)^{m-1}\partial_\mu^m\mathcal{G}$，固定 T 求导。$\mathrm{Var}\,N = k_BT\partial_\mu\langle N\rangle = N_s\theta(1-\theta)$，除 $\langle N\rangle^2 = (N_s\theta)^2$ 得 $(1-\theta)/(N_s\theta)$。题中固定位置数与随机粒子数都写 N 易混，本解用 N_s 区分。 □

习题 23.5 O_2 分子自旋 1、$S_z = -1, 0, 1$，忽略其他内部自由度，$H = \sum[p_i^2/(2m) - \mu BS_{zi}]$，体积 V，平动经典。(a) 配分。(b) 各自旋概率。(c) 磁化每体积。(d) 零场总磁化率。


解答. $x = \beta\mu B$, $Z = (V/\lambda_T^3)^N(1+2\cosh x)^N/N!$, $P_m = e^{xm}/(1+2\cosh x)$。$M/V = (N\mu/V)2\sinh x/(1+2\cosh x)$，$\chi_{\text{total}} = 2N\mu^2/(3k_BT)$，单位体积响应再除 V。磁场自然势已包含 $-BM$，不能再加一次磁功造成重复。 □

习题 23.6 链由 N 个盘状分子构成，长轴方向贡献长度 $2a$ 能 0，短轴方向长度 a 能 ε，$H=\varepsilon U$，U 为短轴数。(a) 配分。(b) 两方向概率。(c) 平均长。(d) 长度方差。(e) 大数分布。

解答. $Z=(1+\mathrm{e}^{-\beta\varepsilon})^N$，短方向 $q=1/(1+\mathrm{e}^{\beta\varepsilon})$、长 $1-q$。U 为 Binomial(N,q)，$L=a(2N-U)$，故 $\langle L\rangle=aN(2-q)$、$\operatorname{Var}L=a^2Nq(1-q)$。若 $Nq(1-q)\gg1$，中心窗口 Gaussian；极低温 q 小到 $Nq=O(1)$ 时应使用稀有短轴的 Poisson 或准确二项，而不是未经条件的全温 Gaussian。 □

习题 23.7 极性刚棒惯性矩 I、偶极 μ，外电场 E。经典转动 $H=(p_\theta^2+p_\phi^2/\sin^2\theta)/(2I)-\mu E\cos\theta$。(a) 转动配分。(b) 极化。(c) 零场极化率。(d) 转动能及高低温。(e) 热容曲线。

解答. Gaussian 动量积分给 $(2\pi I/\beta)\sin\theta$，角积分 $4\pi\sinh x/x$，$x=\beta\mu E$，所以 $Z_{\mathrm{rot}}=8\pi^2Ik_{\mathrm{B}}T\sinh x/(h^2x)$。极化 $P=\mu(\coth x-1/x)$、$\chi_T=\mu^2/(3k_{\mathrm{B}}T)$。$U_{\mathrm{rot}}=2k_{\mathrm{B}}T-\mu E\coth x$，$C_E/k_{\mathrm{B}}=2-x^2\operatorname{csch}^2x$。高温 $x\ll1$，$U\simeq k_{\mathrm{B}}T-(\mu E)^2/(3k_{\mathrm{B}}T)$、$C\to k_{\mathrm{B}}$；形式低温 $x\gg1$，$U\simeq-\mu E+2k_{\mathrm{B}}T$、$C\to2k_{\mathrm{B}}$，因对齐附近两角方向也有谐振势能。真正 $T\to0$ 须量子转动冻结，经典结果不能违背第三律。



□

习题 23.8 无序玻璃有独立双态缺陷，能 $\epsilon_i,\epsilon_i+\delta_i$。(a) 求 Z,E,C。(b) 激发差态密度 $\rho(\delta)=N/\Delta$ 于 $0<\delta<\Delta$，求热容与低高温。(c) 什么低能态密度特征使 $C\propto T$?

解答. $Z=\prod_i\mathrm{e}^{-\beta\epsilon_i}(1+\mathrm{e}^{-\beta\delta_i})$，$E=\sum_i[\epsilon_i+\delta_i/(\mathrm{e}^{\beta\delta_i}+1)]$，$C=k_{\mathrm{B}}\sum_i(\beta\delta_i)^2\mathrm{e}^{\beta\delta_i}/(1+\mathrm{e}^{\beta\delta_i})^2$。均匀密度给 $C=Nk_{\mathrm{B}}(k_{\mathrm{B}}T/\Delta)\int_0^{\Delta/k_{\mathrm{B}}T}x^2\mathrm{e}^x/(1+\mathrm{e}^x)^2\,\mathrm{d}x$。低温积分 $\pi^2/6$，$C\simeq\pi^2Nk_{\mathrm{B}}^2T/(6\Delta)$；高温 $C\simeq N\Delta^2/(12k_{\mathrm{B}}T^2)$。低能 $\rho(0)$ 有限非零且平滑给线性；$\rho\propto\delta^a$ 则 $C\propto T^{a+1}$。整体基能 ϵ_i 不改变热容。 □

习题 23.9 canonical 相空间任意坐标 X_i 与函数 f。(a) 证明 $\langle\partial_if\rangle=\beta\langle f\partial_iH\rangle$。(b) 分别 $f=q_i,p_i$ 得到 virial 形式，说明表面项。

解答. 对 $\partial_i(f\mathrm{e}^{-\beta H})$ 积分，在边界项 0 时得恒等式。$f=X_i$ 给 $\langle X_i\partial_iH\rangle=k_{\mathrm{B}}T$；动量无穷远 Gaussian 使边界 0，二次动量每自由度 $\langle p_i^2/m\rangle=k_{\mathrm{B}}T$。坐标若硬壁有限且 $f=q_i$ 在壁不为 0，必须保留表面项，等价将墙力纳入 H。

三维中心两体势的压力 virial 为 $pV = Nk_{\mathrm{B}}T - \frac{1}{3}\langle \sum_{i<j} r_{ij} v'(r_{ij}) \rangle$。无墙的齐次约束势 $v \propto r^a$ 则相应 $2\langle K \rangle = a\langle U \rangle$。不能对自由硬盒忽略墙项再由 $\partial_q H = 0$ 导出 $0 = k_{\mathrm{B}}T$。 □

24　8.333 作业 5：既有热统卷的逐题接口

来源与编写：Mehran Kardar，8.333 Fall 2013，PS5，截止 2013 年 11 月 22 日，12 题。此前热统卷第 33 章已包含完整题面与独立解答，本卷按协调范围引用，不复制这 12 题的重复页面。

本项目既有《热学与统计物理》第 33 章（PDF 物理页 61–65）已完整写出下表各题及全部明确小问，包括原选做 3、5、7、11。以下接口指向固定提交中的中文成果，而不是把英文原件当中文交付：

原题	中文位置	内容
1(a)–(f)	习题 33.1	表面活性剂凝聚
2(a)–(d)	习题 33.2	三阶状态方程临界点
3(a)–(e)	习题 33.3	Manning 转变（选做）
4(a)–(d)	习题 33.4	点吸引能量累积量与塌缩
5(a)–(d)	习题 33.5	二维硬杆几何近似与熵比较（选做）
6(a)–(c)	习题 33.6	电子自旋密度矩阵
7(a),(b)	习题 33.7	平面量子转子（选做）
8(a)–(c)	习题 33.8	量子熵、最大熵与幺正演化
9(a)–(c)	习题 33.9	零点能的渐近匹配
10(a)–(f)	习题 33.10	振动、转动高温量子修正
11(a)–(d)	习题 33.11	氢的 ortho/para 统计（选做）
12	习题 33.12	Bohr–van Leeuwen 定理

https://github.com/xhc144/mit-ocw-notes/blob/eef678cd6cbfa047d6bfb7697334db7be33b6368/subjects/thermal-statistical-physics/thermal-statistical-physics-zh.pdf

本卷第5、6章系统重新建立这些前置理论，后面的复习题仅在原条件完全相合时引用这一接口；有差异的小问另外补写。例如 Manning 题的势零点随容器变化必须先恢复固定基准再求侧壁压力；硬杆驻点曲线折点不能当全局相变，须比较两支熵。既有卷已经保留这两项限定。固定源 TeX、PDF 与页数的 SHA-256 见 `qa/prior-volume-reference.json`，正常编译本卷不需要下载或输入其他卷文件。

25 8.333 作业 6：量子气体与低能激发

题源：*Mehran Kardar*，*8.333 Fall 2013*，*PS6*，截止 *2013* 年 *12* 月 *6* 日。选做题 *5*、*9–13* 也收入。。以下解答为编者独立补写。

习题 25.1 原题提供代表表（He3 能量栏本身漏印系数，保留缺口）：

粒子	n/m^{-3}	m/kg	E_F/eV	T_F/K
电子	10^{29}	9×10^{-31}	4.4	5×10^{4}
核子	10^{44}	1.6×10^{-27}	10^{8}	1.1×10^{12}
液 He3	2.6×10^{28}	4.6×10^{-27}	缺系数 $\times10^{-3}$	10^{1}

另给 He3 原子体积 46.2 Å^3，与代表密度未严格一致；本题所求估算不使用缺印数值。估算：(a) 典型金属室温电子与声子热容比（表中电子 $T_F\simeq5\times10^4$ K）；(b) 室温中子热波长与晶体声子最短波长；(c) 室温、常压 H_2、He、O_2 的 $n\lambda^3$ 及出现量子效应的温度；(d)He4 在 1 K 以下每质量热容 $20.4T^3$ J kg^{-1} K^{-1}，仅一支无简并低能激发，求 $E(k)$。

解答. (a) 取每原子一个导电电子，电子 $C_e=\pi^2Nk_\mathrm{B}T/(2T_F)$，高温晶格 $C_\mathrm{ph}\simeq3Nk_\mathrm{B}$，故比 $\pi^2T/(6T_F)\simeq0.0099$。若声子尚未到 Dulong–Petit 区，应使用实际 Debye 温度，不能当普适金属常数。

(b)$\lambda=h/\sqrt{2\pi mk_\mathrm{B}T}$，300 K 中子约 1.00 Å；声子布里渊区边界 $k\sim\pi/a$，最短波长约 $2a$，若 $a\sim2$ Å 则约 4 Å。比较尺度即可，不需要为“典型晶体”虚构晶格参数。(c)$n=P/(k_\mathrm{B}T)$，取 300 K、101325 Pa，三者依次 $\lambda=(0.710,0.502,0.178)$ Å、$n\lambda^3=(8.76\times10^{-6},3.10\times10^{-6},1.37\times10^{-7})$。定密度冷却使 $n\lambda^3\propto T^{-3/2}$，量子尺度依次 $0.128,0.0638,0.00797$ K；定压则 $T^{-5/2}$，依次 $2.85,1.88,0.539$ K。实际气体可能先液化或冻结，这些是理想气外推。

(d) 三维单支各向同性 $E\propto k^s$ 使 $C\propto T^{3/s}$，所以 $s=1$。设 $E=\hbar ck$，对 Bose 分布积分得 $C/V=2\pi^2k_\mathrm{B}^4T^3/(15\hbar^3c^3)$。还需质量密度；采用液 He4 约 145 kg m^{-3}，$c=[2\pi^2k_\mathrm{B}^4/(15\hbar^3\rho\,20.4)]^{1/3}\simeq240$ m/s。热容系数本身不足以无条件确定密度未知材料的声速；以上额外物性假设明确列出。 □

习题 25.2 太阳中心 $T=1.6\times10^7$ K，氢质量密度 6×10^4、氦 10^5 kg m^{-3}，完全电离。(a) 电子、质子、α 粒子热波长；(b) 理想近似下是否简并；(c) 总气体压强；(d) 辐射压强及主要支撑来源。

解答. $n_p=\rho_H/m_p$，$n_\alpha=\rho_{He}/(4m_p)$，电中性 $n_e=n_p+2n_\alpha$。热波长为 $1.863\times10^{-11},4.349\times10^{-13},2.174\times10^{-13}$ m。按电子、质子自旋简并 2，$n\lambda^3/g$ 为 $0.213,1.48\times10^{-6},1.54\times10^{-7}$；核完全经典，电子弱简并，可有约百分之几修正，主阶仍可用经典压力。

$P_\mathrm{gas}=k_\mathrm{B}T(n_e+n_p+n_\alpha)=2.58\times10^{16}$ Pa。$P_\mathrm{rad}=a_RT^4/3=1.65\times10^{13}$ Pa，$a_R=7.5657\times10^{-16}$ J m^{-3} K^{-4}。气体约大 1558 倍，在给定中心条件主要物质压强支撑；这不取代整个恒星的静力结构方程。 □

习题 25.3 三维非相互作用同种粒子，自旋简并 g，$\varepsilon=p^2/(2m)$、密度 n。保留 n^2 项求 (a) 压力、(b) 能量密度、(c)C_V/N、(d)$\alpha_P=V^{-1}(\partial_T V)_{P,N}$、(e)$C_P/N$，比较 Bose/Fermi。

解答. 令 $\eta=+1$ 为 Bose、-1 为 Fermi，$f_s^\eta(z)=\sum_{l\ge1}\eta^{l-1}z^l/l^s$，$n=g\lambda^{-3}f_{3/2}^\eta$、$P=gk_{\mathrm B}T\lambda^{-3}f_{5/2}^\eta$。消去 z 得到 $B_2=-\eta\lambda^3/(g2^{5/2})$。记 $x=nB_2$，$P=nk_{\mathrm B}T(1+x)$、$U/V=3P/2$，$x\propto nT^{-3/2}$。定 V 微分给

$$C_V/N=\tfrac{3}{2}k_{\mathrm B}(1-x/2),\qquad \alpha_P=T^{-1}(1-5x/2). \tag{25.1}$$

后式由 $\alpha_P=P_T/(nP_n)$ 且 $P_T=nk_{\mathrm B}(1-x/2)$、$P_n=k_{\mathrm B}T(1+2x)$。$C_P-C_V=TV\alpha_P^2/\kappa_T=Nk_{\mathrm B}(1-3x)$，故 $C_P/N=\frac{5}{2}k_{\mathrm B}(1-3x/2)$。Bose$x<0$ 提高这些首阶热容，Fermi 相反；只在 $|x|\ll1$ 成立。 □

习题 25.4 某中子星核候选相有两支 Fermi 激发 $E_\pm(k)=\pm\hbar^2(|k|-k_F)^2/(2M)$，自旋 $g=2$。令 $q=|k|-k_F$，用 $\mathrm d^3k\simeq4\pi k_F^2\,\mathrm dq$：(a) 证明 $\Delta U=(2gVk_F^2/\pi^2)\int_0^\infty E_+(q)[\mathrm e^{\beta E_+(q)}+1]^{-1}\,\mathrm dq$；(b) 闭式积分；(c) 低温热容。

解答. 粒子与空穴各贡献同一能量，再由 q 正负两侧得到另一个 2，合并 $4\pi/(2\pi)^3$ 即题中系数。设 $a=\hbar^2/(2M)$，$y=\beta aq^2$，积分变 $\frac12a^{-1/2}(k_{\mathrm B}T)^{3/2}\int_0^\infty y^{1/2}/(\mathrm e^y+1)\,\mathrm dy$。用 Fermi 积分，

$$\Delta U=\frac{gVk_F^2}{\pi^2\sqrt a}\Gamma(3/2)(1-2^{-1/2})\zeta(3/2)(k_{\mathrm B}T)^{3/2}. \tag{25.2}$$

C_V 等于系数乘 $\frac32k_{\mathrm B}(k_{\mathrm B}T)^{1/2}$。二次零能壳的态密度 $\rho(E)\propto E^{-1/2}$ 使 $C\propto\sqrt T$，区别普通光滑 Fermi 面 $C\propto T$；壳近似要求热展宽 $q\ll k_F$。 □

习题 25.5 单层石墨烯 $E_\pm=\pm t_iak$，双层 $E_\pm=\pm(t_i^2a^2/2t_\perp)k^2$，$g=4$，面积 A_s，未掺杂。(a) 求 $\mu(T)$；(b) 证明粒子空穴能量积分 $\Delta U=2gA_s\int\mathrm d^2k/(2\pi)^2\,E_+(k)/(\mathrm e^{\beta E_+}+1)$；(c),(d) 双层能与热容；(e) 面积各半的混合样品双层电子热容何时主导；(f) 声速约 2×10^4 m/s 的声子与单层电子低温热容比较。

解答. 粒子空穴对称固定半填充，$f(E)+f(-E)=1$，故 $\mu=0$；有限带宽对称也成立。升温正能电子与负能空穴两项相同给 (b)。记 $a_2=t_i^2a^2/(2t_\perp)$、$b=t_ia$，径向积分为

$$\Delta U_2/A_s=\frac{g}{2\pi a_2}\int_0^\infty\frac{E\,\mathrm dE}{\mathrm e^{\beta E}+1}=\frac{g\pi(k_{\mathrm B}T)^2}{24a_2},\qquad C_2/A_s=\frac{g\pi k_{\mathrm B}^2T}{12a_2}, \tag{25.3}$$

$$\Delta U_1/A_s=\frac{g}{\pi b^2}\int_0^\infty\frac{E^2\,\mathrm dE}{\mathrm e^{\beta E}+1}=\frac{3g\zeta(3)(k_{\mathrm B}T)^3}{2\pi b^2},\qquad C_1/A_s=\frac{9g\zeta(3)k_{\mathrm B}^3T^2}{2\pi b^2}. \tag{25.4}$$

相等条件 $k_{\mathrm B}T_\times=\pi^2t_\perp/[27\zeta(3)]\simeq0.304t_\perp$，更低温双层主导，且须低能抛物近似仍有效。二维线性色散声子也给 T^2，但系数 $\propto\sum_s c_s^{-2}$；$v_e=t_ia/\hbar$ 通常远大声速，声子系数大。自由膜弯曲支 $\omega\propto k^2$ 还给 T，张力可改变它。故不宜仅凭电子态密度就判定石墨烯总热容由电子主导。 □

习题 25.6 单粒子态密度 $\rho(\epsilon)$、基态 0、$N=\int_0^\infty\rho(\epsilon)/(\mathrm e^{\beta(\epsilon-\mu)}-\eta)\,\mathrm d\epsilon$。(a) 能量；(b)Bose 临界温隐式式；(c)Fermi 低温 $\mu-E_F$；(d) 能量增量；(e) 热容。可用 Sommerfeld 式 $\int gf=\int_0^\mu g+\pi^2g'(\mu)/(6\beta^2)+\cdots$。

解答. $U=\int \epsilon\rho(\epsilon)f_\eta\,\mathrm{d}\epsilon$。Bose 激发容量 $N=\int_{0^+}^{\infty}\rho(\epsilon)/(\mathrm{e}^{\epsilon/(k_\mathrm{B}T_c)}-1)\,\mathrm{d}\epsilon$，要在低能收敛，且基态宏观占据单独处理。

Fermi 固定 N 先展开数积分，$\rho_F\delta\mu+\pi^2(k_\mathrm{B}T)^2\rho_F'/6=0$。能积分含 $E_F\rho_F\delta\mu$，恰好抵消其导数项中的 $E_F\rho_F'$，因此

$$\delta\mu=-\frac{\pi^2(k_\mathrm{B}T)^2}{6}\frac{\rho_F'}{\rho_F},\quad \Delta U=\frac{\pi^2}{6}\rho_F(k_\mathrm{B}T)^2,\quad C_V=\frac{\pi^2}{3}\rho_F k_\mathrm{B}^2T. \tag{25.5}$$

须 ρ_F 有限且在 $k_\mathrm{B}T$ 窗口平滑；前题二次零壳不满足，不能套用。 □

习题 25.7 无自旋量子点粒子的弱吸引把每态能降低 $uN^2/(2V)$，$Z=Z_0\exp[\beta uN^2/(2V)]$、$u>0$。(a) 关联压力；(b) 证明 $P_n=k_\mathrm{B}Tf^\eta_{3/2}/f^\eta_{1/2}-un$，$n\lambda^3=f^\eta_{3/2}$；(c) 稀薄不稳定临界 u_c 首阶量子修正；(d)Fermi 零温；(e)Bose 降低温度时的行为。

解答. $F=F_0-uN^2/(2V)$，$P=-F_V=P_0-un^2/2$。理想气 $\partial_zP_0=(k_\mathrm{B}T/\lambda^3z)f_{3/2}$、$\partial_zn=(\lambda^{-3}/z)f_{1/2}$，即 (b)。机械稳定 $P_n>0$，故 $u_c=(k_\mathrm{B}T/n)f_{3/2}/f_{1/2}$。低密度消去 z 得

$$u_c=\frac{k_\mathrm{B}T}{n}[1-\eta n\lambda^3/2^{3/2}+O((n\lambda^3)^2)]. \tag{25.6}$$

Fermi 零温 $P_0=2nE_F/5$、$E_F\propto n^{2/3}$，故 $u_c=2E_F/(3n)$；Pauli 压力抗塌缩。Bose 接近 $z=1$ 时 $f_{1/2}\to\infty$ 而 $f_{3/2}$ 有限，$u_c\to0$。凝聚相理想压力独立 n，任意吸引使负压缩率。该点吸引模型无短程排斥，不能由不稳定条件直接证明稳定液气共存，可能整体塌缩。 □

习题 25.8 d 维各向异性谐陷阱，$U=m\sum_\alpha\omega_\alpha^2x_\alpha^2/2$，$\hbar\omega_\alpha\ll k_\mathrm{B}T$，忽略零点与离散性。(a) 累积态数及态密度；(b) 巨正则粒子数；(c) 能量；(d) 高温每粒子能；(e) 零温 μ；(f) 低温热容尺度。按每个自旋组分计。

解答. 相空间椭球或振子占据数单纯形 $\sum\hbar\omega_\alpha n_\alpha<E$ 的体积给 $\mathcal{N}(E)=E^d/[d!\prod\hbar\omega_\alpha]$、$\rho(E)=E^{d-1}/[(d-1)!\prod\hbar\omega_\alpha]$。积分得到

$$N=f_d^-(z)\prod_\alpha\frac{k_\mathrm{B}T}{\hbar\omega_\alpha},\quad U=dk_\mathrm{B}Tf_{d+1}^-(z)\prod_\alpha\frac{k_\mathrm{B}T}{\hbar\omega_\alpha}. \tag{25.7}$$


经典 $z\ll1$ 比值 1，$U/N=dk_\mathrm{B}T$，每维动能和势能各 $k_\mathrm{B}T/2$。零温 $E_F=[d!N\prod\hbar\omega_\alpha]^{1/d}$。代 $\rho(E_F)=dN/E_F$ 入前题，$C_V=\pi^2dNk_\mathrm{B}^2T/(3E_F)$，且需 $\hbar\omega\ll k_\mathrm{B}T\ll E_F$ 才能同时使用连续谱与低温展开。 □

习题 25.9 密度 ρ_t 的光晶格陷位，每位空或最多一个局域粒子，能 $-w<0$，对游离理想 Bose 谱 $p^2/(2m)$ 无影响，总密度 n。(a) 陷位占据密度；(b) 游离密度（自旋 g）；(c) 凝聚临界总密度并画小 w 情形；(d) 凝聚相能量密度。

解答. 单陷位 $\Xi_t=1+\mathrm{e}^{\beta(\mu+w)}$，故 $n_t=\rho_t/[1+\mathrm{e}^{-\beta(\mu+w)}]$；硬占据约束使公式类似 Fermi，与游离 Bose 统计不冲突。$n_g=g\lambda^{-3}\,\mathrm{Li}_{3/2}(z)$。凝聚 $\mu\to0$ 给

$$n_*(T)=\frac{\rho_t}{1+\mathrm{e}^{-w/(k_\mathrm{B}T)}}+g\lambda^{-3}\zeta(3/2),\quad U/V=-wn_t(0,T)+\tfrac{3}{2}gk_\mathrm{B}T\lambda^{-3}\zeta(5/2). \tag{25.8}$$

基态游离凝聚粒子能 0。小 w 时低温陷位几乎满 $n_*(0)=\rho_t$，升温陷位逐渐释放可使临界密度先降，再由游离激发容量 $T^{3/2}$ 增长，允许再入凝聚。图取 $g\lambda(T_\rho)^{-3}\zeta(3/2)=\rho_t$、$w/(k_{\mathrm B}T_\rho)=0.01$。



□

习题 25.10 经典吸引的 Mayer 函数 $f(r)=\exp(-\pi r^2/\lambda^2)$，傅里叶 $f(\omega)=\lambda^3\exp[-\lambda^2\omega^2/(4\pi)]$。(a) 环积分 $R_l=\int\prod_i \mathrm d^3q_i/V\prod_i f(q_i-q_{i+1})$；(b) 证明仅保留环时 $\log Z=\log Z_0+V[\mathrm{Li}_{5/2}(x)-x+(1-2^{-5/2})x^2]/(2\lambda^3)$，$x=n\lambda^3$；(c) 压力；(d) 压缩率预示的凝聚不稳定。

解答. (a) 一个平移积分为 V，其余卷积令各傅里叶动量相同，$R_l=V^{1-l}\int\mathrm d^3\omega/(2\pi)^3[f(\omega)]^l=\lambda^{3l}/[l^{3/2}\lambda^3V^{l-1}]$。

(b)$l\ge3$ 环的顶点循环和反转对称数 $2l$ 给 $N^lR_l/(2l)$；$l=2$ 只有一条连边，精确项 $N^2\lambda^3/(2V)$，不能把双边环重复计。合成题示多对数；$l=1$ 扣去不存在的自环。令 $c_0=1-2^{-5/2}$，定 N 取体积导数得

$$P=nk_{\mathrm B}T+\frac{k_{\mathrm B}T}{2\lambda^3}[\mathrm{Li}_{5/2}(x)-\mathrm{Li}_{3/2}(x)-c_0x^2],\qquad \frac{P_n}{k_{\mathrm B}T}=1-\frac{\mathrm{Li}_{1/2}(x)-\mathrm{Li}_{3/2}(x)}{2x}-c_0x. \tag{25.9}$$

$x\to1^-$ 时 $\mathrm{Li}_{1/2}$ 发散，因此必在收敛区间出现负压缩率；数值零点约 0.70436。原题称凝聚转变，这里严格能推出环近似的机械不稳定；纯吸引无稳定核的原始经典模型可能塌缩，环求和本身不能证明有限密度稳定液相。 □


习题 25.11 d 维均匀无自旋 Bose 气 $\epsilon=p^2/(2m)$。(a) 巨势、密度用 $f_s^+(z)=\mathrm{Li}_s(z)$ 表示；(b)PV/U；(c)$T_c(n)$；(d) 凝聚以下热容；(e) 全温热容图；(f) 最大热容与经典极限比及 $d=3$ 值；(g)$d\to2$ 与适用维数。

解答. 令 $s=d/2$。对 $-\log(1-z\mathrm e^{-\beta\epsilon})$ 作动量积分或逐项积分，$\mathcal G=-k_{\mathrm B}TV\lambda^{-d}\,\mathrm{Li}_{s+1}(z)$、$n=\lambda^{-d}\,\mathrm{Li}_s(z)$，$U=sPV$，比 $2/d$ 与经典相同。

只在 $d>2$ 时 $\zeta(s)$ 有限，$T_c=(2\pi\hbar^2/mk_{\mathrm B})[n/\zeta(s)]^{1/s}$。以下 $z=1$，$C/(Nk_{\mathrm B})=s(s+1)\zeta(s+1)/\zeta(s)(T/T_c)^s$。以上固定 N 求 z_T 得到

$$\frac{C}{Nk_{\mathrm B}}=s(s+1)\frac{\mathrm{Li}_{s+1}}{\mathrm{Li}_s}-s^2\frac{\mathrm{Li}_s}{\mathrm{Li}_{s-1}},\qquad (T/T_c)^s=\zeta(s)/\,\mathrm{Li}_s(z). \tag{25.10}$$

$d=3$ 的峰在 T_c，$C_{\max}/C_\infty=(5/2)\zeta(5/2)/\zeta(3/2)=1.28378$。下面曲线直接用上式消去 z，不是手工连接。



一般 d 必须区分临界值与全温最大值。临界左值比 $R_c=(s+1)\zeta(s+1)/\zeta(s)$ 在 $s\downarrow 1$ 趋 0，但经典极限比恒为 1，因此此时 R_c 显然不能是全温最大值。严格答案为上述两分支热容相对 sNk_B 的上确界；例如 $s=1.05$ 时全温峰约 1.00140，在 $T>T_c$，不是临界值 0.1594。随 $d\to 2^+$，$T_c\to 0$、临界值趋 0，而全温最大比趋 1。$d\le 2$ 均匀气在有限温无此 BEC，必须直接用正常分支。原题若将三维“临界峰”结论外推所有 d，会产生该矛盾。 □

习题 25.12 三维非简并 Bose 气 P,T 与吸引二维表面接触，吸附每粒子降低能 u。(a) 气体化学势；(b) 表面理想 Bose 面密度；(c) 允许的最大压力 P_*；(d)$\delta P=P_*-P\to 0$ 的奇异性。

解答. 气相 $\mu=k_BT\log[P\lambda^3/(k_BT)]$。面内最低能 $-u$，有效逸度 $z_s=e^{\beta(\mu+u)}$，二维积分 $n_2=\lambda^{-2}\,\mathrm{Li}_1(z_s)=-\lambda^{-2}\log(1-z_s)$。需 $z_s<1$，所以 $P_*=(k_BT/\lambda^3)e^{-\beta u}$、$n_2\simeq\lambda^{-2}\log(P_*/\delta P)$。原题措辞“完全凝聚至表面”指与无限三维库平衡的极限：二维均匀理想气在有限温没有有限临界面密度，不能据此声称发生通常二维 BEC。 □

习题 25.13 平行板以 v 运动，超流激发谱 $\epsilon(p)$。(a) 由大质量板的动量能量改变得板系激发能 $\epsilon-p\cdot v$；(b) 激发净动量积分；(c) 小 v 定义 $P_\alpha=V\rho_n v_\alpha$ 并求 ρ_n；(d) 声子 $\epsilon=cp$ 的低温贡献。

解答. 板给予 p 后自身动量减少 p，能变 $[(Mv-p)^2-(Mv)^2]/(2M)=-p\cdot v+O(M^{-1})$，总产生能即题式。$P=V\int d^3p/(2\pi\hbar)^3\,p\,n_B(\epsilon-p\cdot v)$；零速项奇函数 0，线性项 $-n_B'(\epsilon)p_\alpha p_\gamma v_\gamma$。角平均给

$$\rho_n=\frac{1}{3}\int\frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}p^2[-n_B'(\epsilon)]=\frac{2\pi^2(k_BT)^4}{45\hbar^3c^5}. \tag{25.11}$$

最后以 $x=\beta cp$ 积分，$\int_0^\infty x^4e^x/(e^x-1)^2\,dx=4!\zeta(4)$。这是质量密度，由 P/V 和 v 量纲验证，超流质量密度为总密度减 ρ_n；激发数密度不能直接替代正常质量分数。 □

26 8.333 复习包 1：界面热力学与概率

题源：*8.333 Fall 2013* 课程页公开的 *Fall 2007 Test1 Review Problems* 及官方 *Solutions*；*9* 题，非 *2013* 年实际测验卷。采用官方热量定义，补充近似条件。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

习题 26.1 表面张力 σ 以功 $\delta W=\sigma\,\mathrm{d}A$ 定义。(a) 球形水滴半径 R 的内外压差及肥皂泡压差；(b) 空气、固体、水三界面张力 $\sigma_{aw},\sigma_{sw},\sigma_{sa}$ 给接触角与完全润湿条件；(c) 室温水 $\sigma_0\simeq 0.07$ N/m，估重力/毛细分界尺度并举例。

解答. 水滴 $\Delta p\,4\pi R^2\,\mathrm{d}R=\sigma\,8\pi R\,\mathrm{d}R$，故 $\Delta p=2\sigma/R$。肥皂泡有内外两张界面，薄膜近似 $4\sigma/R$。三相线平行于固面的张力平衡 $\sigma_{sa}=\sigma_{sw}+\sigma_{aw}\cos\theta$（$\theta$ 从水内测），$\cos\theta=(\sigma_{sa}-\sigma_{sw})/\sigma_{aw}$。若 $\sigma_{sa}\ge\sigma_{sw}+\sigma_{aw}$，以水膜替代干界面不增加自由能，完全润湿；粗糙、滞后、钉扎可改变观察角，不包含于此平衡模型。

比较 $\rho g\ell$ 与 σ/ℓ，毛细长 $\ell_c=\sqrt{\sigma/(\rho g)}\simeq 2.7$ mm。毫米小液滴趋球形，大水面受重力平整；毛细管弯月面、细针或水黾在水面承重用到这一竞争。 □

习题 26.2 表面活性剂 N 分子铺于面积 A。(a) 解释 $\sigma\simeq\sigma_0-Nk_{\mathrm B}T/A$；(b) 肥皂触滴表面时接触角变化；(c) 给 $\sigma_A=Nk_{\mathrm B}T/(A-Nb)^2-2aN^2/A^3$、$\sigma_T=-Nk_{\mathrm B}/(A-Nb)$，求 $\sigma(A,T)$ 及 a,b 意义；(d) 用 $E_A,\sigma,\sigma_T,\sigma_A$ 表达定张力与定面积热容差。此处热容为 $\delta Q/\,\mathrm{d}T$，原题紧接定义的抄写易漏机械功，应遵循官方解的热量式。

解答. 二维理想分子铺展压为 $Nk_{\mathrm B}T/A$，自由能随面积增大降低，张力减少该量。若固体两界面张力近似固定，降 σ_{aw} 使前题 $\cos\theta$ 增大、滴更铺开；肥皂同时改变固–水界面时应重新比较全部三张力。

积分两个偏导并用稀薄极限定常数得 $\sigma=\sigma_0-Nk_{\mathrm B}T/(A-Nb)+aN^2/A^2$。$b$ 为排除面积，吸引 $a>0$ 减少分子铺展压、回升张力。原两偏导交叉相等提供可积性检查。

$\delta Q=\mathrm{d}E-\sigma\,\mathrm{d}A=(E_A-\sigma)\,\mathrm{d}A+C_A\,\mathrm{d}T$，定 σ 有 $A_T=-\sigma_T/\sigma_A$，所以

$$C_\sigma-C_A=-(E_A-\sigma)\frac{\sigma_T}{\sigma_A}=T\frac{\sigma_T^2}{\sigma_A},\tag{26.1}$$

最后用 $E_A=\sigma-T\sigma_T$，来自 $\mathrm{d}F=-S\,\mathrm{d}T+\sigma\,\mathrm{d}A$。若只求 $\partial_T E|_\sigma$，则还差机械功 σA_T，不能将这导数误当定张力吸热热容。 □

习题 26.3 理想气温标 Θ 满足 $PV=Nk_{\mathrm B}\Theta$ 且 $E=E(\Theta)$，不能假设 $E\propto\Theta$。做 Carnot 循环：(a) 两等温吸放热；(b) 任意热容时的绝热体积变化；(c) 证明气体温标与热力学温标等价。

解答. 热端等温 $Q_H=Nk_{\mathrm B}\Theta_H\log(V_2/V_1)$，冷端放热绝对值 $Q_C=Nk_{\mathrm B}\Theta_C\log(V_3/V_4)$，因为等温 E 不变。绝热满足 $E'(\Theta)\,\mathrm{d}\Theta=-Nk_{\mathrm B}\Theta\,\mathrm{d}V/V$，故 $\log(V_f/V_i)=-\int_{\Theta_i}^{\Theta_f}E'(\Theta)\,\mathrm{d}\Theta/(Nk_{\mathrm B}\Theta)$。两条反向绝热线的积分相反，得到 $V_2/V_1=V_3/V_4$，因此 $Q_H/Q_C=\Theta_H/\Theta_C$。Carnot 热力学定义 $Q_H/Q_C=T_H/T_C$，温标比例固定，以同一参考点校准即 $T=\Theta$，全程没有用常数热容。 □

习题 26.4 (a) 由 $\mathrm{d}E = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V$ 证明理想气内能仅依赖温度；(b) 给与 $E = E(T)$ 相容的最一般状态方程；(c) 证明 van der Waals 气 C_V 只依赖温度。

解答. F 的 Maxwell 关系 $S_V = P_T$，故 $E_V|_T = TS_V - P = TP_T - P$。理想 $P = Nk_{\mathrm{B}}T/V$ 给 0。一般 $E_V = 0$ 等价 $\partial_T(P/T) = 0$，所以 $P = Tf(V,N)$，并非只允许理想气；稳定、广延性可继续限制 f。van der Waals$P = Nk_{\mathrm{B}}T/(V - Nb) - aN^2/V^2$ 给 $E_V = aN^2/V^2$，积分 $E = E_0(T) - aN^2/V$，因此 $C_V = E_0'(T)$，只在采用这套温度无关 a, b 的单相状态方程模型中成立。 □

习题 26.5 一摩尔水在共存 (P,T) 吸收潜热 L 变汽，体积差 ΔV，绝热降至 $P - \mathrm{d}P$、$T - \mathrm{d}T$ 后凝结。(a) 证明 $W = \Delta V\,\mathrm{d}P + O(\mathrm{d}P^2)$ 及 CC 式；(b) 指出以 $L(T) - L(T - \mathrm{d}T) = W$ 推 $L \propto T$ 的错误；(c) 恒潜热、理想汽时 $P(T)$；(d) 飓风热端 80°F、冷端 −120°F，暖水层至少 200 英尺，每小时凝结 9000 万吨，潜热 2.3×10^6 J/kg，估最高效率与功率；(e) 等温理想空气静力 $P(h)$；(f) 估 9 km 珠峰水沸点，列出所用空气温度和分子质量。

解答. 微小 Carnot 在 P,V 图的面积为 $\Delta V\,\mathrm{d}P$，绝热边的横移只影响二阶；$W/Q_H = \mathrm{d}T/T$ 给 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T = L/(T\Delta V)$。绝热膨胀本身可凝结部分汽，低温等温段不再把完整一摩尔汽凝结；直接以两端同一摩尔潜热相减遗漏这一阶分率，官方解正指出此点。

取汽 $\Delta V \simeq RT/P$，$\log[P(T)/P(T_0)] = -(L/R)(1/T - 1/T_0)$。飓风给温 299.8, 188.7 K，最高效率约 0.371；质量率 $9 \times 10^{10}/3600 = 2.5 \times 10^7$ kg/s，供热 5.75×10^{13} W，最大功约 2.13×10^{13} W。200 英尺约 61 m 暖层是持续蒸发的储库条件，并非此瞬时 Carnot 功率式的乘数；实际远低于可逆上界。

空气静力 $\mathrm{d}P = -\rho g\,\mathrm{d}h$、$\rho = mP/(k_{\mathrm{B}}T_a)$，所以 $P(h) = P_0 \mathrm{e}^{-mgh/(k_{\mathrm{B}}T_a)}$。取等温 $T_a = 273$ K、$m = 29$ 原子质量单位，尺度约 8.0 km，9 km 处约 0.324 大气压。每质量潜热用 $R_v = k_{\mathrm{B}}/m_{H_2O} \simeq 461.5$ J kg^{-1} K^{-1}，$1/T_b = 1/373.15 - (R_v/L_v)\log(P/P_0)$，约 344 K、71°C。这是题设等温大气估计，不使用现实天气；换空气温度会改变估值。 □

习题 26.6 石英慢冷结晶、放潜热 L，快冷成玻璃，均近似不可压缩，$\mathrm{d}E = T\,\mathrm{d}S + \mu\,\mathrm{d}N$。(a) 广延性给 μ；(b) 晶体 $C_X = \alpha T^3$、玻璃 $C_G = \beta T$，假设都 $S(0) = 0$ 求熵；(c) 再假设同 E_0 求内能；(d) 化学平衡形式给 T_m；(e) 潜热；(f) 检验符号及最可疑假设。这里 α, β 按整个样品热容计。

解答. Euler$E = TS + \mu N$，所以 $\mu = (E - TS)/N$。积分 C/T 得 $S_X = \alpha T^3/3$、$S_G = \beta T$；能 $E_X = E_0 + \alpha T^4/4$、$E_G = E_0 + \beta T^2/2$。形式自由能 $F_X = E_0 - \alpha T^4/12$、$F_G = E_0 - \beta T^2/2$，相等 $T_m^2 = 6\beta/\alpha$，假设熔化潜热 $E_G - E_X = -\beta T_m^2 = -6\beta^2/\alpha < 0$，与所述结晶放热趋势不符。

官方解指出将冻结非遍历玻璃当作唯一平衡基态、套 $S_G(0) = 0$ 是可疑步骤。应理解为平衡第三定律的**适用前提**未满足，不能据此说平衡态第三定律被推翻。近似同 E_0 及将低温热容幂律外推到熔点也未经验证；玻璃转变本身含动力学，不能简单用两平衡相 μ 相等预测。负潜热暴露了这些假设的共同不相容。 □

习题 26.7 求 (a)$p=1/(2a),|x|<a$；(b)$p=\mathrm{e}^{-|x|/a}/(2a)$；(c)$p=a/[\pi(x^2+a^2)]$ 的特征函数、均值、方差；(d)$p=x\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}/a^2, x\ge 0$；(e)$p=\sqrt{2/\pi}x^2\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}/a^3, x\ge 0$ 仅求均值、方差。

解答. 用 $\varphi(k)=\langle \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\rangle$，(a)$\sin(ak)/(ak)$，均 0、方差 $a^2/3$；(b) 正负半轴指数积分给 $1/(1+a^2k^2)$，均 0、方差 $2a^2$；(c) 留数或已知 Fourier 积分 $\mathrm{e}^{-a|k|}$，在 0 不可微，通常均值与方差都不存在，主值均 0 不等于期望。后两者用 $\int_0^\infty x^m\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(2a^2)^{(m+1)/2}\Gamma((m+1)/2)$：Rayleigh 均 $a\sqrt{\pi/2}$、方差 $a^2(2-\pi/2)$；Maxwell 均 $2a\sqrt{2/\pi}$、方差 $a^2(3-8/\pi)$。 □

习题 26.8 任意概率密度 $p(x)$ 均 λ、有限方差 σ^2，证明 $\Pr(|X-\lambda|\ge n\sigma)\le 1/n^2$。

解答. $\sigma^2=\int(x-\lambda)^2p(x)\,\mathrm{d}x\ge\int_{|x-\lambda|\ge n\sigma}(x-\lambda)^2p\,\mathrm{d}x\ge n^2\sigma^2\Pr(|X-\lambda|\ge n\sigma)$，非零方差除去即得。零方差分布集中于均值，需以正偏离阈值处理，不能拿 0/0 论证。仅有限二阶矩保证，不要求 Gaussian。 □

习题 26.9 n 个独立 $r_\alpha\in[0,1]$ 同密度 p，最大 X。(a) 密度；(b) 均匀 p 的均值、方差和大 n，讨论最优选择减少差异的条件。

解答. $F_X(x)=F(x)^n$，$p_X=np(x)F(x)^{n-1}$，$F(x)=\int_0^x p$。均匀则 nx^{n-1}，$\langle X\rangle=n/(n+1)$、$\langle X^2\rangle=n/(n+2)$，方差 $n/[(n+1)^2(n+2)]\sim n^{-2}$，相对均值的散布收缩。$n(1-X)$ 收敛指数分布，仍有非 Gaussian 剩余波动。这解释此独立、有限上界模型的选择收缩，不是所有人群变异都由最优选择决定的结论。 □

27 8.333 复习包 2：相空间、等离子体与输运

题源：8.333 Fall 2013 页面公开的 Fall 2007 Test2 Review 及 Solutions，7 题。对 Coulomb 势、截面角度和 Lorentz 气 Wick 系数作独立符号与量纲复核，修正处明确写出。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

习题 27.1 一维自由气粒子初始 $\rho(q,p,0)=\delta(q)f(p)$，$f=\exp[-p^2/(2mk_\mathrm{B}T)]/\sqrt{2\pi mk_\mathrm{B}T}$。(a)Liouville 解和相图；(b) 两方差；(c) 在 $q=\pm Q$ 加硬壁，长时细密度；(d) 有限相空间分辨率的粗粒化密度及其平稳性。

解答. 自由特征 $q(t)=q_0+pt/m$、p 常量，$\rho=\delta(q-pt/m)f(p)$，支持是一条随 t 倾斜的直线而非扩散成二维 Gaussian。$\langle q^2\rangle=k_\mathrm{B}Tt^2/m$、$\langle p^2\rangle=mk_\mathrm{B}T$。硬壁反射 $\pm p$，将直线按周期 $4Q$ 折回盒子，得到细密度越来越细的折线，仍保存每一相点信息和 $|p|$。

对固定小 q,p 单元平均，足够宽的速度小区间在长时覆盖许多反射周期，弱/粗粒化极限 $\tilde\rho=f(p)/(2Q)$（初始 f 偶）。它在盒内 q 均匀且满足反射对称，故 Liouville 平稳；精细密度本身不点态收敛。初始理想 δ 的微分熵需先有限宽正则化，不能以无穷负熵作有限数值热力学熵。 □

习题 27.2 相空间规范化密度 $S=-\int\rho\log\rho$。(a)Hamilton–Liouville 演化 $\dot S$；(b) 固定 $\langle H\rangle=E$ 的最大熵；(c) 其平稳性；(d) 如何与观察到趋平衡的熵增相容。

解答. $\dot\rho=-\{\rho,H\}$，Hamilton 流无散度且边界通量 0，$\dot S=\int(1+\log\rho)\{\rho,H\}=\int\{\rho\log\rho,H\}=0$。对规范化和能量加乘子，变分 $-(1+\log\rho)-a-\beta H=0$，故 $\rho_{\max}=\mathrm{e}^{-\beta H}/Z$，$\beta$ 由 E 定；熵对 ρ 凹，确保最大。$\{f(H),H\}=0$，canonical 平稳，但不意味着任何初态自动变成它。

粗粒化丢弃细结构，由凹性其熵不小于细密度熵；局部混合、与外界交换、或 Boltzmann 的分子混沌假设可使可观察熵增加。完全隔离精密可逆 Hamilton 演化并没有违反 (a)，而 coarse 熵也未由 Liouville 单独保证每一时刻严格单调。 □

习题 27.3 Vlasov 适用于相互作用范围 λ 内粒子数 $n\lambda^3\gg1$，忽略相对弱的短时两体碰撞项。(a)$\rho_N=\prod_i\rho_1(x_i)$ 的 f_s 与规范化；(b) 从 BBGKY 得 $\partial_t f_1+(p/m)\cdot\nabla_q f_1-\nabla_q U_{\mathrm{eff}}\cdot\nabla_p f_1=0$，$U_{\mathrm{eff}}=U+\int V(q-q')f_1(x')\,\mathrm{d}x'$；(c) 均匀盒内任意动量 $g(p)$ 为何平稳而无热化。

解答. 取 $\int\rho_1=1$、约化密度按计数规范化，$f_s=N!/(N-s)!\prod_{i=1}^{s}\rho_1(x_i)$，$\int f_s=N!/(N-s)!$。$f_2=(1-1/N)f_1f_1$，代 BBGKY 的一体式得到平均场势 $(1-1/N)\int Vf_1$，在大 N 忽略自作用的相对 $1/N$ 差便是题式；各 s 乘积按同一一体流因子分离。这个无相关闭合不是任意有限 N 两体系统的精确演化。

均匀 $f_1=Ng(p)/V$（$\int g=1$）的密度势为空间常数，流项全 0，所以任意 g 平稳。若原题把归一化单粒子密度写 g/V，与计数 f_1 差一个 N。没有碰撞核就没有要求 g 成为 Maxwell 的 H 定理；可有集体相混合，却不等于完整碰撞热平衡。 □

习题 27.4 中性等离子体各 N 个 $\pm e$、质量 $m_\pm$、密度 n_0。(a) 两组 Vlasov 及平均 Coulomb 势；(b)$f_\pm=g_\pm(p)n_\pm(q)$ 的 Poisson 式；(c)Boltzmann 密度与 Debye 长；(d) 屏蔽 Green 解；(e)Vlasov 自洽条件及平均间距；(f)$\tau\sim\lambda/c_{\mathrm{th}}$ 为何不随 T 变、关联何物理频率。原题 $\nabla^2C=+4\pi\delta$ 的势约定与正 $1/r$Green 式不相容，以下先统一标准物理势 ϕ。

解答. 取 $C(r)=1/r$、$\nabla^2C=-4\pi\delta$、粒子势能 $q_s\phi$，则 $[\partial_t+(p/m_s)\cdot\nabla-q_s\nabla\phi\cdot\nabla_p]f_s=0$，$\phi=\phi_{ext}+e\int C(f_+-f_-)\,\mathrm{d}x'$。规范化 $\int g_s\,\mathrm{d}p=1$ 给 $\nabla^2\phi=-4\pi[\rho_{ext}+e(n_+-n_-)]$。

热平衡 $n_\pm=n_0\mathrm{e}^{\mp\beta e\phi}$，弱势线性 $e(n_+-n_-)\simeq-2\beta n_0e^2\phi$，于是 $(\nabla^2-\lambda^{-2})\phi=-4\pi\rho_{ext}$、$\lambda^2=k_{\mathrm{B}}T/(8\pi n_0e^2)$。解 $\phi(r)=\int\mathrm{e}^{-|r-r'|/\lambda}\rho_{ext}(r')/|r-r'|\,\mathrm{d}^3r'$，因为 $(\nabla^2-\lambda^{-2})(\mathrm{e}^{-r/\lambda}/r)=-4\pi\delta(r)$；仅在 $r\neq0$ 验证微分式会漏掉决定符号的点源。若使用原题 $\Phi=-\phi$、$C=-1/r$ 则 Vlasov 正负流及 $n_\pm=n_0\mathrm{e}^{\pm\beta e\Phi}$ 转换一致，但 Green 要取负号。

$n_0\lambda^3\gg1$ 等价 $\lambda\gg\ell=n_0^{-1/3}$，亦即 Coulomb 能 $e^2/\ell\ll k_{\mathrm{B}}T$（常数阶略去），很多粒子共同形成弱平均场。$c_{\mathrm{th}}\sim\sqrt{k_{\mathrm{B}}T/m}$，$\lambda/c_{\mathrm{th}}\sim\sqrt{m/(n_0e^2)}\sim\omega_p^{-1}$，温度抵消。这是集体响应/振荡时间尺度，碰撞热化或 Landau 阻尼时间未必同一个常数。 □

习题 27.5 二维经典电子均匀磁场，单体 $H=(p-q_eA)^2/(2m)\pm\mu_B|B|$、$A=B\times q/2$，分自旋上、下，守自旋碰撞截面 $\sigma_{\uparrow\uparrow}=\sigma_{\downarrow\downarrow}=\sigma,\sigma_{\uparrow\downarrow}=\sigma_\times$。(a) 轨道；(b) 两 Boltzmann 式；(c) 总 H 单调；(d) 碰撞零项条件；(e) 流项的守恒量函数；(f) 角动量碰撞内外；(g) 圆对称约束的最一般平衡分布；(h) 磁/非磁杂质影响；(i) 自旋与角动量是否给额外流体方程。

解答. 机械动量 $\pi=p-q_eA$，$\dot q=\pi/m$、$\dot\pi=q_e(\pi/m)\times B$，横向回旋频率 $|q_eB|/m$，均匀 Zeeman 常数不改轨道。每组的流算子 L_s 加 C_{ss} 与 $C_{s\bar s}$；具体 $C_{ss'}=\int \mathrm{d}\pi_2\,\mathrm{d}\Omega\,|v-v_2|\sigma_{ss'}[f'_sf'_{s',2}-f_sf_{s',2}]$，上、下互换得第二式，局域同位置碰撞。

乘 $1+\log f_s$ 求和，把反向散射和两入射粒子交换平均，$\dot H=-\frac14\sum_{ss'}\int W(A-B)\log(A/B)\le 0$。等号要求 $\log f_s$ 为碰撞不变量线性组合，即两组各自数乘子、共享总动量与能量系数。若还要求平稳流，乘子组合需是单体 Hamilton 守恒量；任何 $f(H_s,L_z)$ 的 Poisson 流可为 0，但只有合适指数线性组合同时满足碰撞条件。

圆对称时**总 canonical**$L_z=\sum(q\times p)_z$ 守恒；单个电子碰撞中可交换角动量，不能声称每个 L_i 均守。局域碰撞总机械动量守恒、且 $A(q)$ 相同，故也保持总 canonical 动量矩和 L_z。一般热平衡 $f_s\propto\exp[-\beta(H_s-\Omega L_z)-a_s]$，两数各固定、共同 β,Ω；若容器还平移对称可加相应总动量乘子。

固定杂质一般吸收动量与角动量，Ω 不再守恒；非磁杂质仍保两自旋数，磁散射可使自旋翻转，相关化学势差驰豫。自旋数差给额外连续/扩散模式，角动量守恒通常由动量方程乘位置导出，不独立增加一个流体变量；在有外部力矩或自旋–轨道耦合时需重新列守恒量。 □

习题 27.6 二维 Lorentz 气，固定硬圆散射体密度 n_0、半径 a。(a) 角 $\theta\in[0,2\pi]$ 微分截面 $a\sin(\theta/2)\,\mathrm{d}\theta/2$ 与总截面；(b) 仅杂质 Boltzmann；(c) 任意 $\chi(|p|)$ 的矩方程；(d) 质量连续；(e) 能量方程用 $\epsilon=\rho\langle c^2\rangle/2, c=p/m-u, h=\rho\langle cc^2\rangle/2, P_{ij}=\rho\langle c_ic_j\rangle$；(f)$f_0=n\mathrm{e}^{-p^2/(2mk_\mathrm{B}T)}/(2\pi mk_\mathrm{B}T)$ 的零阶矩；(g) 单碰撞时间一阶 f；(h) 质量流；(i)$\chi_{ij}=\partial u_i/\partial F_j$；(j) 压力、热流、一阶流体式。

解答. 冲击参数有符号 $b=a\cos(\theta/2)$，全角 $|\,\mathrm{d}b|=(a/2)\sin(\theta/2)\,\mathrm{d}\theta$，总 $2a$。若只用无符号偏转 $0\le\theta\le\pi$，两侧合计为 $a\sin(\theta/2)\,\mathrm{d}\theta$，不能把两个约定再双倍。

$Lf=n_0|p|/m\int \mathrm{d}\theta\,(\,\mathrm{d}\sigma/\,\mathrm{d}\theta)[f(p')-f(p)]$。因 $|p'|=|p|$，任意径向 χ 的碰撞积分 0，分部积分给 $\partial_t(n\langle\chi\rangle)+\nabla\cdot[n\langle(p/m)\chi\rangle]=nF\cdot\langle\nabla_p\chi\rangle$。$\chi=1$ 得 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\rho u=0$；能量得

$$\partial_t(\epsilon+\rho u^2/2)+\nabla\cdot[u(\epsilon+\rho u^2/2)+h+P\cdot u]=nF\cdot u. \tag{27.1}$$

纯 Lorentz 气还保每个 $|p|$ 分布，故需弱粒子碰撞才可用仅数、能的局部 Maxwell 闭合。零阶 $u=h=0$、$P_{ij}=nk_\mathrm{B}T\delta_{ij}$、$\epsilon=nk_\mathrm{B}T$，各局域数能暂时无驰豫。

令 $C=-(f-f_0)/\tau$，准静态一次梯度 $f=f_0[1-\tau(p/m)\cdot(\nabla\log\rho-\nabla\log T+p^2\nabla T/(2mk_\mathrm{B}T^2)-F/(k_\mathrm{B}T))]$。Gaussian 矩 $\langle p_ip_j\rangle=s\delta_{ij}$、$\langle p_ip_jp^2\rangle=4s^2\delta_{ij}$、$\langle p_ip_jp^4\rangle=24s^3\delta_{ij}$，$s=mk_\mathrm{B}T$。所以

$$\rho u=n\tau[F-k_\mathrm{B}T\nabla\log(\rho T)],\quad \chi_{ij}=\tau\delta_{ij}/m,\quad P_{ij}=nk_\mathrm{B}T\delta_{ij}+O(\nabla^2). \tag{27.2}$$

实验室能流 $Q=2nk_{\mathrm{B}}Tu-2n\tau k_{\mathrm{B}}^{2}T\nabla T/m$。转到题定义的 **peculiar** 热流要减 $2nk_{\mathrm{B}}Tu$，故 $h=-2n\tau k_{\mathrm{B}}^{2}T\nabla T/m$。把这些代上述质量、能量式就是一阶流体闭合，无独立保动量 Euler 方程。

官方解题 6(j) 把二维 Wick 六阶系数写 22 并给出有量纲问题的热流；独立以 $\langle p^{6}\rangle=2\cdot4\cdot6\,s^{3}=48s^{3}$、分量各半验证应为 24，且必须减对流焓流。本题据矩积分修复，完整有限数值核对随 QA 给出，不能将官方误植再当正确结果。 □

习题 27.7 三维经典气夹于 $y=0,w$ 两板，温 T_1,T_2，无宏观速，$f_0=n(y)\mathrm{e}^{-p^{2}/(2mk_{\mathrm{B}}T(y))}/[2\pi mk_{\mathrm{B}}T(y)]^{3/2}$。(a)$n,T$ 必要关系；(b) 证明 $\langle p^{2}\rangle=3s,\langle p^{4}\rangle=15s^{2},\langle p_y^{2}p^{4}\rangle=35s^{3}$，可用 $\langle p^{6}\rangle=105s^{3}$；(c) 一碰撞时长 τ_K 的 f_1；(d) 热导率；(e) 稳态 $T(y)$。

解答. 无力动量平衡要求压强 $nk_{\mathrm{B}}T$ 常数，因此 $n'/n=-T'/T$。独立 Gaussian 三分量的 Wick 矩或 χ_3^2 径向积分给 3、15、105，旋转均分六阶为 35。流 $f_1=f_0-\tau_K(p_y/m)\partial_y f_0=f_0[1-\tau_K(p_y/m)(T'/T)(p^{2}/(2mk_{\mathrm{B}}T)-5/2)]$，该 5/2 保证质量流 0。

$h_y=\int(p_y/m)(p^{2}/2m)f_1\,\mathrm{d}^{3}p$，五阶项奇为 0，六阶和四阶差给 $h_y=-5n\tau_Kk_{\mathrm{B}}^{2}TT'/(2m)$，热导 $\kappa=5n\tau_Kk_{\mathrm{B}}^{2}T/(2m)$。稳态热流常量，所以 $\int_{T_1}^{T(y)}\kappa(T)\,\mathrm{d}T=(y/w)\int_{T_1}^{T_2}\kappa(T)\,\mathrm{d}T$。若题模型 τ_K 为常数且 nT 常数，κ 恒定，温度线性；若硬球实际 $\tau_K\propto1/(n\sqrt{T})$，则 $\kappa\propto\sqrt{T}$，$T(y)^{3/2}$ 线性。原题未规定真实碰撞截面的温变时，不能不加条件宣称唯一线性或非线性剖面。 □

28 8.333 复习包 3：关联气体与量子正则系综

题源：*8.333 Fall 2013* 页面公开的 *Fall 2007 Test3 Review* 及 *Solutions*，*10* 题。题 *3*、*5* 对应已有卷内完整题解；同卷重复编号保留映射，不重复抄页。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

习题 28.1 N 电子及均匀正背景，$U_Q=\sum_{i<j}V(q_i-q_j)$、$V(r)=e^{2}/(4\pi r)-c$，背景令 $\int V=0$。(a)Fourier 非零模 e^{2}/q^{2}、零模 0；(b) 证明 l 环积分 $R_l=V^{1-l}\int_q\widetilde{V}(q)^{l}$；(c) 累积量中环计数 $S_l\simeq(l-1)!N^{l}/2$；(d) 环求和；(e) 积分得 $\log Z-\log Z_0=V\kappa^{3}/(12\pi)$，$\kappa^{2}=\beta e^{2}N/V$；(f) 压强；(g) 两粒子间无环链的求和屏蔽势。

解答. Coulomb 的 $-\nabla^{2}(1/4\pi r)=\delta$ 给 e^{2}/q^{2}；背景专门去掉 $q=0$，没有正负长程项残余。环卷积将各边动量固定为同一 q，一个整体位置积分 V，即 (b)。选 l 不同顶点 $\binom{N}{l}$、无向环排列 $(l-1)!/2$，累积量展开还含 $l!$ 次边次序，结合给 $N!/(N-l)!\,(l-1)!/2$；$l=2$ 重复同一对边直接验证 $N(N-1)/2$。

$\sum_{l\ge2}(-x)^{l}/(2l)=[x-\log(1+x)]/2$，故

$$\Delta\log Z=\frac{V}{2}\int_q\left[\frac{\kappa^{2}}{q^{2}}-\log\left(1+\frac{\kappa^{2}}{q^{2}}\right)\right]. \tag{28.1}$$

把 κ 微分，$\partial_\kappa(\Delta\log Z/V)=\kappa\int_q[1/q^2-1/(q^2+\kappa^2)]=\kappa^2/(4\pi)$；在 $\kappa=0$ 定积分常数 0 即 $\kappa^3/(12\pi)$。固定 N,T 有 $\kappa\propto V^{-1/2}$，压力修正 $\Delta P=k_{\mathrm B}T\partial_V\Delta\log Z=-k_{\mathrm B}T\kappa^3/(24\pi)$，非解析 $n^{3/2}$，不可用有限次数整数 virial 展开替代。

链边的几何级数 $\widetilde{V}_{scr}=\widetilde{V}/(1+\beta n\widetilde{V})=e^2/(q^2+\kappa^2)$，逆变换 $V_{scr}=e^2\mathrm{e}^{-\kappa r}/(4\pi r)$。若题末写无 e^2，那是势除以耦合后的归一化；本解保持原能量单位。环近似用弱 Coulomb 耦合，不声称所有密度下精确。 □

习题 28.2 d 维阶梯势 $V=\infty$ $(r<a)$、$-\varepsilon$ $(a<r<b)$、0 $(r>b)$。(a)B_2 及高低温；(b) 压缩率首修正；(c) 高温改写 van der Waals 式和参数；(d)$b=a,d=1$ 的 B_3。

解答. 球体积 Ω_dR^d、$\Omega_d=\pi^{d/2}/\Gamma(d/2+1)$。$f=-1$ 于核、$\mathrm{e}^{\beta\varepsilon}-1$ 于壳，故 $B_2=\Omega_d[a^d-(b^d-a^d)(\mathrm{e}^{\beta\varepsilon}-1)]/2$。高温趋核体积半值，低温吸引使它大负；温度低到关联团簇多，稀薄截断失控。

$P=nk_{\mathrm B}T(1+B_2n+\cdots)$，$\kappa_T=[nk_{\mathrm B}T(1+2B_2n)]^{-1}\simeq[1-2B_2n]/(nk_{\mathrm B}T)$。高温 $B_2=b_{vdW}-a_{vdW}/(k_{\mathrm B}T)$，$b_{vdW}=\Omega_da^d/2$、$a_{vdW}=\Omega_d\varepsilon(b^d-a^d)/2$，重求和 $P\simeq nk_{\mathrm B}T/(1-b_{vdW}n)-a_{vdW}n^2$ 仅匹配到 n^2。一维硬棒精确 $P=nk_{\mathrm B}T/(1-na)$，$B_3=a^2$，见习题33.4。 □

28.1 原题 3：Dieterici 临界点的完整引用

原题 $P(v-b)=k_{\mathrm B}T\exp[-a/(k_{\mathrm B}Tv)]$ 三问：临界压缩因子、v_c 上压缩率、临界等温线最低非零项，恰为习题30.1(e)–(g)。所有条件及解答均在该处，复习编号保留为 333-R3-3。

习题 28.3 二维 N 个 $+c_0$、N 个 $-c_0$ 经典粒子，面积 $A=L^2$，$H=\sum_1^{2N}p_i^2/(2m)-\sum_{i<j}c_ic_j\log(|q_i-q_j|/r_0)$。(a) 吸、斥对数量；(b)$Z$ 积分并化成距离幂；(c) 用 $q'=q/L$ 证明 $Z\propto A^{2N-\beta Nc_0^2/2}$；(d) 二维压力与低温问题；(e) 加入硬核 a，由 $N=1$ 估其重要温度与相的性质。

解答. 同号斥对 $2\binom{N}{2}=N(N-1)$，异号吸对 N^2。动量给 λ^{-4N}，$Z=[(N!)^2\lambda^{4N}]^{-1}\int_A\prod\mathrm{d}^2q_i\prod_{i<j}(|q_i-q_j|/r_0)^{\beta c_ic_j}$，固定 r_0 只是指定能零。总对积电荷 $\sum_{i<j}c_ic_j=[(\sum c)^2-\sum c_i^2]/2=-Nc_0^2$。坐标缩放使测度 L^{4N}、距离幂 $L^{-\beta Nc_0^2}$，即题示面积幂，前提积分收敛。

因此 $P=N(2k_{\mathrm B}T-c_0^2/2)/A$，高温回到 $2N$ 粒子理想压，形式 $k_{\mathrm B}T<c_0^2/4$ 变负。但没有核的异号吸引在更早的短距条件 $\beta c_0^2\geq2$ 便使两体积分 $\int_0^L r^{1-\beta c_0^2}\,\mathrm{d}r$ 发散，形式负压分支并不存在稳定配分函数。

硬核下 $\int_a^L r^{1-\beta c_0^2}\,\mathrm{d}r$ 在 $\beta c_0^2<2$ 由大距控制、>2 由核控制，边界对数。所以单对估计温标 $k_{\mathrm B}T_*=c_0^2/2$，低温偏好束缚中性对、高温自由电荷。有限密度的集体涡旋/Coulomb 气转变需屏蔽与逸度 RG，单对核重要尺度不等于已经精确证明多体 BKT 温度。 □


28.2 原题 5：最近邻一维气的完整引用

排序粒子硬核最近邻势，原题 (a)–(f) 逐项对应习题33.4：Hamilton 量、间距域、Laplace 鞍点、边界间隙积分、平均长度、硬棒方程与 B_l。原复习题另问排除体积比较：一维 $b_{vdW}=a$ 与精确硬棒结果相合；有限维一般 van der Waals 排除重求和并非精确。

习题 28.4 $N+1$ 质量 m 粒子以 N 弹簧 K、原长 a 连成链，端点固定相距 Na，位移 $u_0 = u_N = 0$，$H = \sum_1^{N-1} p_i^2/(2m) + K\sum_{i=0}^{N-1}(u_{i+1}-u_i)^2/2$。(a) 正弦正规模与频率；(b) 经典 Z；(c)$\langle|\widetilde{u}_k|^2\rangle, \langle u_i^2\rangle$ 并画位置曲线；(d) 仅左端固定、右端自由如何改变。

解答. $u_i = \sqrt{2/N}\sum_{r=1}^{N-1}\widetilde{u}_r \sin(\pi r i/N)$ 是实正交变换；频率 $\omega_r = 2\sqrt{K/m}\sin(\pi r/(2N))$。独立模 $H_r = \widetilde{p}_r^2/(2m) + m\omega_r^2\widetilde{u}_r^2/2$，$Z = \prod_r k_{\mathrm{B}}T/(\hbar\omega_r) = [k_{\mathrm{B}}T/(\hbar\sqrt{K/m})]^{N-1}/\sqrt{N}$，乘积恒等式 $\prod_{r=1}^{N-1} 2\sin(\pi r/(2N)) = \sqrt{N}$。

$\langle\widetilde{u}_r^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T/(m\omega_r^2)$；离散 Laplace 逆矩阵给 $\langle u_i u_j\rangle = (k_{\mathrm{B}}T/K)[\min(i,j) - ij/N]$，所以 $\langle u_i^2\rangle = (k_{\mathrm{B}}T/K) i(N-i)/N$，中部最大，随链长线性增长。



自由右端保留 $u_1,\dots,u_N$，独立弹簧伸长 $\delta_i = u_i - u_{i-1}$，$\langle\delta_i\delta_j\rangle = k_{\mathrm{B}}T\delta_{ij}/K$，故 $\langle u_i u_j\rangle = k_{\mathrm{B}}T\min(i,j)/K$、$Z = [k_{\mathrm{B}}T/(\hbar\sqrt{K/m})]^N$。频率 $2\sqrt{K/m}\sin[(2r-1)\pi/(4N+2)]$，$r = 1,\dots,N$。原提示说 $N-1$ 伸长是沿用固定端自由度的索引；若终点真自由，共有 N 个移动粒子与伸长，不能漏最后一个模。 □

习题 28.5 黑洞熵 $S = k_{\mathrm{B}}c^3A/(4G\hbar)$。(a) 牛顿逃逸速设为 c 得半径；(b) 两个太阳质量 $M_\odot \simeq 2\times10^{30}$ kg 黑洞合并熵增、比特数；(c)$E = Mc^2$ 给温度；(d) 黑体辐射功；(e) 蒸发时长和太阳质量估值；(f) 与题给 2.7 K 背景平衡质量；(g) 半径 R 球内全息熵上界。采用题设无自旋黑体理想模型，不加未给灰体和额外粒子种类。

解答. $v_{esc}^2 = 2GM/R$，$R_s = 2GM/c^2$，$A = 16\pi G^2M^2/c^4$，所以 $S = 4\pi k_{\mathrm{B}}GM^2/(\hbar c)$。忽略合并辐射，末质量 $2M$，熵增 $8\pi k_{\mathrm{B}}GM^2/(\hbar c)$，约 3.1×10^{77} bits（除 $k_{\mathrm{B}}\log 2$）；真实计算应包括辐射能与熵，不能把无损质量相加作为精确天体结果。

$1/T = \partial S/\partial E$ 给 $T_H = \hbar c^3/(8\pi k_{\mathrm{B}}GM)$，太阳质量约 6.1×10^{-8} K。用黑体 $P = \sigma_{SB}AT_H^4 = \hbar c^6/(15360\pi G^2M^2)$，$\dot{M}c^2 = -P$ 积分得到 $t_{ev} = 5120\pi G^2M_0^3/(\hbar c^4)$，太阳质量约 2.2×10^{67} 年。末期黑体半经典模型失效，此巨大尺度只作原题估算。

$T_H = 2.7$ K 给 $M \simeq 4.5\times10^{22}$ kg。半径 R 所容最大熵按面积界为 $S_{max} = \pi k_{\mathrm{B}}c^3R^2/(G\hbar)$，体现面积而非普通体积增长；界的引力和几何前提属于题设全息原理，不由经典相空间计数单独证明。 □

习题 28.6 量子谐振子 $H = p^2/(2m) + m\omega^2q^2/2$。(a)$Z, U$；(b) 本征基密度矩阵；(c) 非对易算符指数导数与迹导数；(d) 用 $\partial_m Z = 0$ 证动势能相等；(e)$\langle q^2\rangle$ 及链低温量子修正；(f) 高温坐标核；(g) 低温核；(h) 完整精确坐标核。

解答. $b=\beta\hbar\omega$，$Z=\sum_{n\ge0}\mathrm{e}^{-b(n+1/2)}=[2\sinh(b/2)]^{-1}$，$U=(\hbar\omega/2)\coth(b/2)$，$\rho=Z^{-1}\sum_n \mathrm{e}^{-\beta E_n}|n\rangle\langle n|$。

任意 $A(x)$ 有 $\partial_x \mathrm{e}^{A}=\int_0^1 \mathrm{e}^{(1-s)A}A'\mathrm{e}^{sA}\,\mathrm{d}s$，由指数乘积展开或 Duhamel 式导出，只有 $[A,A']=0$ 才可写 $A'\mathrm{e}^{A}$。迹内循环却始终给 $\partial_x \operatorname{Tr}\mathrm{e}^{A}=\operatorname{Tr}(A'\mathrm{e}^{A})$。固定 ω 时 Z 与 m 无关，所以 $0=\langle\partial_m H\rangle=\langle -p^2/(2m^2)+\omega^2q^2/2\rangle$，两能各 $U/2$，$\langle q^2\rangle=\hbar\coth(b/2)/(2m\omega)$。

链的每模将 $k_{\mathrm B}T/(m\omega_r^2)$ 换为 $\hbar\coth(\beta\hbar\omega_r/2)/(2m\omega_r)$，再按正弦模相加；零温仍有零点涨落，一维长波 $1/|k|$ 给对数链长而非经典线性增长。

完整核可从热核方程推导：设 $\langle q|\mathrm{e}^{-\beta H}|q'\rangle$ 的非对角一般形式为 $A_\beta\exp[-a_\beta(q^2+q'^2)+b_\beta qq']$。代 $-\partial_\beta K=H_qK$ 并比较多项式系数，得 $a'_\beta=m\omega^2/2-2\hbar^2a_\beta^2/m$、$b'_\beta=-2\hbar^2a_\beta b_\beta/m$、$A'_\beta/A_\beta=-\hbar^2a_\beta/m$。$\beta\to0$ 的自由 Gaussian δ 核选出 $a=m\omega\coth b/(2\hbar)$、$b_\beta=m\omega/(\hbar\sinh b)$、$A=\sqrt{m\omega/(2\pi\hbar\sinh b)}$。再除 Z、重写中点和差坐标，给

$$\rho(q',q)=\sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}\tanh\frac{b}{2}}\exp\left[-\frac{m\omega}{\hbar}\tanh\frac{b}{2}\left(\frac{q+q'}{2}\right)^2-\frac{m\omega}{4\hbar}\coth\frac{b}{2}(q-q')^2\right].\tag{28.2}$$

高温 $b\ll1$ 是 $\sqrt{\beta m\omega^2/(2\pi)}\exp[-\beta m\omega^2(q+q')^2/8-m(q-q')^2/(2\beta\hbar^2)]$ 到领先阶；低温 $b\gg1$ 是 $\psi_0(q')\psi_0(q)$，$\psi_0=(m\omega/\pi\hbar)^{1/4}\mathrm{e}^{-m\omega q^2/(2\hbar)}$。沿对角积分 1、对角二阶矩等于 (e)，为独立归一化检查。 □

习题 28.7 三维 N 正、N 负相对论量子粒子 $H=c\sum_i|p_i|+\sum_{i<j}e_ie_j/|r_i-r_j|$，立方边 L。(a)Schrödinger 式与 Bose/Fermi 对称；(b)$E_n(L)$ 缩放；(c)Z 的 T,V 组合；(d)E,P 精确关系；(e)d 维 Coulombr^{2-d} 配非相对论 $p^2/(2m)$ 何维同样齐次及关系；(f) 为何密集真实 Coulomb 混合物可能不服这些式。

解答. $[c\sum_i\sqrt{-\hbar^2\nabla_i^2}+\sum e_ie_j/r_{ij}]\Psi_n=E_n\Psi_n$，同正电荷组、同负组分别按全粒子含自旋的 Bose 对称或 Fermi 反对称，不对不同电荷强行交换。$r_i=Lr'_i$、规范化 $\Psi_L=L^{-3N}\Psi_1$ 使每动能、势能均 L^{-1}，故 $E_n(L)=E_n(1)/L$，前提 Hamilton 量与边界确无另一长度且稳定谱存在。

$Z=\sum_n\exp[-E_n(1)/(Lk_{\mathrm B}T)]$ 仅依赖 LT，$E=-\partial_\beta\log Z$，$P=k_{\mathrm B}T\partial_V\log Z=E/(3V)$。非相对论动能 L^{-2}，须 $d-2=2$ 即 $d=4$ 势也 L^{-2}，于是 $E=dPV/2=2PV$。

同一个稳定齐次 Hamilton 模型不会仅因变液体或固体就丧失这个形式恒等式。真实密集材料的核尺寸、电子质量/非相对论转换、排斥核、有效相互作用与环境引入额外尺度；异号点吸引也可能导致塌缩、无有限 Z。是这些前提变化限制缩放，不是“高密度”三个字自动使数学证明失效。 □

习题 28.8 一般 $H(p,q)$。(a) 经典正则配分在一对 $q_1\to\lambda q_1,p_1\to p_1/\lambda$ 的 canonical 变换下不变；(b) 量子对应；(c)$H=\sum p_i^2/(2m)+V(q)$ 证明 $\langle p_1^2/m\rangle=\langle q_1\cdot\nabla_1V\rangle$；(d) 虚构 G-8.333 星系边缘速 200 km/s，估质量/尺度比。

解答. 相空间全空间或连同边界一并变换时 Jacobian$\lambda^d\lambda^{-d}=1$，$Z[H_\lambda]=Z[H]$。量子用幺正 dilationU_λ 保持 $[q,p]=\mathrm{i}\hbar$，$H_\lambda=U_\lambda HU_\lambda^{-1}$ 谱不变，$\operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-\beta H_\lambda}$ 不变。不能在固定硬盒里缩坐标却忽略域/墙项；这时边界压力会贡献 virial。

在 $\lambda=1$ 微分 $\log Z$，迹 Duhamel 式适用于量子非对易，$0=-\beta\langle -p_1^2/m+q_1\cdot\nabla_1V\rangle$，即题式。星系 $Mv^2\sim GM^2/R$ 给 $M/R\sim v^2/G\simeq6.0\times10^{20}$ kg/m，约 $9.3\times10^9M_\odot$ 每 kpc。质量分布、轨道各向异性与边缘速定义带来常数阶

差，题给速度只能估尺度，不确定完整质量剖面。 □

29　8.333 期末复习包：七个历史年份的量子与相变题

题源：*Fall 2013* 页面的 *2007 Final Review* 及官方 *Solutions*，内含 *Fall1998*、*1999*、*2000*、*2003*、*2004*、*2005*、*2006* 各三题，共 *21* 个原编号。没有 *2001*、*2002* 卷，不补造；这些是包内标明年份的历史考试，不是 *2013* 年实际期末卷。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

29.1　1998 年：激子与离子凝聚

习题 29.1　半导体光激发 N_e 电子、N_h 空穴，质量 m_e, m_h，可结合成质量 $M = m_e + m_h$、降低能 ε 的激子，均按经典非相互作用气、忽略内部简并。(a) 自由电子空穴自由能；(b)N_p 激子自由能；(c) 三化学势；(d) 平衡条件；(e) 高温、总自由激发密度 $n \simeq n_e + n_h$ 时的激子密度，取电中性。

解答. $\lambda_j = h/\sqrt{2\pi m_j k_{\mathrm{B}} T}$，$F_e + F_h = k_{\mathrm{B}} T \sum_{j=e,h} N_j[\log(n_j \lambda_j^3) - 1]$，$F_p = N_p\{k_{\mathrm{B}} T[\log(n_p \lambda_p^3) - 1] - \varepsilon\}$。所以 $\mu_e = k_{\mathrm{B}} T \log(n_e \lambda_e^3)$、$\mu_h$ 类同、$\mu_p = -\varepsilon + k_{\mathrm{B}} T \log(n_p \lambda_p^3)$。

电子加空穴变一激子，平衡 $\mu_e + \mu_h = \mu_p$，即 $n_p = n_e n_h (\lambda_e^3 \lambda_h^3 / \lambda_p^3) \mathrm{e}^{\beta\varepsilon} = n_e n_h \lambda_\mu^3 \mathrm{e}^{\beta\varepsilon}$，$\mu = m_e m_h/(m_e + m_h)$ 为约化质量。高温解离多，$n_e = n_h \simeq n/2$，$n_p \simeq n^2 \lambda_\mu^3 \mathrm{e}^{\beta\varepsilon}/4$。更低温需用激发对守恒 $n_{pair} = n_e + n_p = n_h + n_p$ 解二次方程，不能保持 $n_e = n/2$ 近似到全结合区。 □


1998 题 2(a)–(e)Manning 题逐项在既有习题 33.3。此历史题用固定 $\log(r/L)$ 而 PS5 用 $\log(r/R)$：只把单粒子 z 的前因子由 $R^{2\xi}$ 换成 $L^{2\xi}$，径向概率、均值、凝聚反馈不变，物理壁压按固定能零接触式计算。1998 题 3(a)–(g) 逐项对应本卷习题25.11；热容全温峰与二维极限的修正同样适用，官方三维临界峰公式不能外推成所有维数的全温最大值。

29.2　1999 年：Fermi 与 Bose 磁性

习题 29.2　密度 $n = N/V$ 的 spin1/2 自由电子。(a) 基态、$k_F, E_0/V$；加入 $U = \alpha N_+ N_-/V$、$\alpha = 4\pi\hbar^2 a/m$ 模拟偏好平行自旋。(b) 两 Fermi 波数；(c)$n_\pm = n/2 \pm \delta$ 的小偏极动能；(d) 相互作用与 Stonerα_c；(e) 自发磁化随 α 及图。

解答. 基态每自旋占满动量球，$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$、$E_F = \hbar^2 k_F^2/(2m)$，$E_0/V = 3nE_F/5$。偏极 $k_{F\pm} = (6\pi^2 n_\pm)^{1/3}$，动能密度 $\frac{3}{5}[\hbar^2 (6\pi^2)^{2/3}/(2m)](n_+^{5/3} + n_-^{5/3})$，至 δ^2 增加 $4E_F\delta^2/(3n)$。相互作用 $\alpha(n^2/4 - \delta^2)$，故 $\alpha_c = 4E_F/(3n)$。

用 $m_s = 2\delta/n$，能至四阶 $E/V = \text{const} + (nE_F/3)(1 - \alpha/\alpha_c)m_s^2 + (nE_F/81)m_s^4 + \cdots$，近临界 $m_s \simeq \sqrt{(27/2)(\alpha/\alpha_c - 1)}$。大耦合需最小化完整 5/3 次式，磁化最后饱和 $|m_s| = 1$；饱和边界 $\alpha/\alpha_c = 3\,2^{2/3}/4 \simeq 1.19055$。下图用完整方程，未将小磁化展开外推到饱和值。



这是题给平均场接触模型的失稳，不是实际电子关联体系的精确相图。 □

习题 29.3 spin1 理想 Bose 气 $\epsilon_{k,s}=\hbar^2k^2/(2m)-\mu_0 sB$，$s=-1,0,+1$，忽略轨道磁性。(a) 占据；(b) 各 N_s；(c)$M,\chi(T,\mu)$；(d) 零场稀薄 $z(n)$ 至 n^2 与磁化率修正；(e)$T_c(n,0)$ 和上侧 χ；(f) 凝聚以下小 B 的 μ 及凝聚态；(g)$B\downarrow 0$ 自发磁化。

解答. $z_s=z\mathrm{e}^{s\beta\mu_0 B}$，$\langle n_{k,s}\rangle=[z_s^{-1}\mathrm{e}^{\beta\epsilon_k}-1]^{-1}$，$N_s=V\lambda^{-3}\,\mathrm{Li}_{3/2}(z_s)$（凝聚时另加最低态）。$M=\mu_0(N_+-N_-)$，$\chi_{B=0}=2\beta\mu_0^2 V\lambda^{-3}\,\mathrm{Li}_{1/2}(z)$。

$x=n\lambda^3/3$，数式 $x=z+z^2/2^{3/2}+\cdots$ 给 $z=x-x^2/2^{3/2}$，所以 $\chi=2N\mu_0^2[1+x/2^{3/2}+\cdots]/(3k_\mathrm{B}T)$。$T_c=(2\pi\hbar^2/mk_\mathrm{B})[n/(3\zeta(3/2))]^{2/3}$，$z\to 1$ 时 $\mathrm{Li}_{1/2}$ 发散；数式 $\mathrm{Li}_{3/2}(z)=\zeta(3/2)-2\sqrt{\pi}\sqrt{-\log z}+\cdots$ 给固定密度 $\chi\propto(T-T_c)^{-1}$。

$B>0$ 最低态为 $k=0,s=+1$，凝聚 $\mu=-\mu_0 B$。先热力学极限再 $B\downarrow 0$，三个激发组相同而凝聚全在 $+$，$M=\mu_0 N[1-(T/T_c)^{3/2}]$。严格有限体系先置 $B=0$ 的对称混合给 $M=0$；极限次序和固定粒子数条件必须注明。 □

1999 题 3(a)–(d) 全部为习题28.8的经典/量子 virial、星系估算，条件及每个小问相同。

29.3 2000 年：氦 3 熔化与 Bose 占据

习题 29.4 He3 熔化线低于 0.3 K 斜率负，0.1 K 约 -30 atm/K。(a) 固相每核 spin1/2、忽略核自旋作用的熵；(b) 液相理想 Fermi 气每原子体积 46 Å^3，估 T_F；(c) 低温热容；(d) 熵与两相比较；(e) 由 μ 相等证明 CC 式；(f)$v_\ell-v_s=3$ Å^3 每原子时低温斜率。

解答. 无耦合核 spin 各 2 态，$s_s=k_\mathrm{B}\log 2$。液体 $n=1/(46\times10^{-30}\mathrm{m}^3)$，裸 He3 质量约 5.0×10^{-27} kg 给 $T_F=\hbar^2(3\pi^2 n)^{2/3}/(2mk_\mathrm{B})\simeq 6.1$ K。$C_V/N=(\pi^2/2)k_\mathrm{B}T/T_F$、$s_\ell=(\pi^2/2)k_\mathrm{B}T/T_F$，足够低温液体熵小于核自旋未冻结的固体。

$\mathrm{d}\mu=-s\,\mathrm{d}T+v\,\mathrm{d}P$、两相 $\mathrm{d}\mu$ 相等，$\mathrm{d}P/\mathrm{d}T=(s_\ell-s_s)/(v_\ell-v_s)$。在所述低温窗口忽略液体熵，斜率 $-k_\mathrm{B}\log 2/(3\times10^{-30}\mathrm{m}^3)\simeq-3.19\times10^6$ Pa/K，约 -31.5 atm/K，与题给尺度相合。核交换尺度以下固相 spin 也不能保持 $k_\mathrm{B}\log 2$，故此“低温”是低于 T_F 且高于极小 spin 作用尺度，不可用于真实严格 $T=0$。 □

习题 29.5 理想 Bose 单粒子态 q、能 E_q、$z_q=\mathrm{e}^{\beta(\mu-E_q)}<1$。(a) 所有 n_q 的联合概率；(b) 一模特征函数；(c),(d) 均值、方差及方差对均值；(e) 以均占据重写联合概率；(f) 熵与零温。

解答. 每模几何分布，$P(\{n_q\})=\prod_q(1-z_q)z_q^{n_q}$、$\varphi_q(k)=(1-z_q)/(1-z_q\mathrm{e}^{\mathrm{i}k})$，导数得 $\bar n_q=z_q/(1-z_q)$、$\operatorname{Var}n_q=z_q/(1-z_q)^2=\bar n_q(1+\bar n_q)$。改写 $P=\prod_q \bar n_q^{n_q}/(1+\bar n_q)^{1+n_q}$，熵

$$S=k_{\mathrm{B}}\sum_q[(1+\bar n_q)\log(1+\bar n_q)-\bar n_q\log\bar n_q]. \tag{29.1}$$

无宏观激发时体熵趋 0；凝聚基态的巨正则几何数涨落可仍巨大，单模熵约 $k_{\mathrm{B}}\log N_0$ 而每粒子熵 0。固定总 N 的纯基态熵 0。必须区分巨正则的基态粒子数不确定与有限温激发熵，不能由温度 0 无条件断言任何混合密度矩阵熵都 0。 □

2000 题 3(a)–(d) 二维硬杆恰为既有热统习题 33.5。临界角由等熵与驻值共同给，$\theta_c=1.19918$、$n_c l^2=0.265566$；驻值折点 $1.72067, 0.239624$ 为亚稳界，不误作全局转变。

29.4 2003、2006 年：氦 4；2003、2005 年：Dirac 激发

习题 29.6 He4 低温压致固化，熔化压力在 0.8 K 附近比 0 K 低约 20 Pa。(a)CC 式；(b) 液相一支声速 c 的声子热容；(c) 固相纵 c_L 及两横 c_T 的热容；(d)$c\simeq c_L\simeq c_T$、$v_\ell\simeq v_s=v$ 时熵差与哪个熵高；(e) 恒小 $\delta v=v_\ell-v_s$ 下熔化曲线与较高密度相。

解答. CC 式已在前题从 μ 证明。每支三维声子态密度 $V\omega^2/(2\pi^2c_s^3)$，$U=\int\hbar\omega\rho/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)\,\mathrm{d}\omega$ 给 $C/N=2\pi^2vk_{\mathrm{B}}^4T^3/(15\hbar^3c_s^3)$。固相将 c_s^{-3} 换成 $c_L^{-3}+2c_T^{-3}$；熵积分 C/T 把系数除 3 再乘 T^3。

若各声速和体积近同，记单支热容系数 $a=2\pi^2vk_{\mathrm{B}}^4/(15\hbar^3c^3)$，$s_\ell-s_s=-2aT^3/3$，固相比液体声子支更多、熵较高。因此 $P(T)=P(0)-aT^4/(6\delta v)$。题述初始下降要求 $\delta v>0$，固体体积小、密度高。该纯声子模型只解释低温下降趋势，不预测曲线在 0.8 K 反转的全部机制，也不在未给 $c,v,\delta v$ 时伪算 20 Pa 幅度。 □

2003 题 2(a)–(f) 表面活性剂与既有习题 33.1 完全相同，原条件、完整解、塌缩/相分离近似及定张力热容均在那里。

习题 29.7 2003 三维 spin1/2 Dirac 谱 $E_\pm(k)=\pm\sqrt{m^2c^4+\hbar^2c^2k^2}$，零温负能满、正能空。(a) 占据 $\mu+\delta$ 与空穴 $\mu-\delta$ 概率；(b)$\mu(T)$；(c) 粒子空穴能积分；(d),(e) 无质量能与热容；(f) 有质量低温。2005 石墨烯二维谱 $E_\pm=\pm\hbar v|k|$、题给自旋 $g=2, v=10^6$ m/s：(a)–(d) 重复二维能和热容；(e) 声速 2×10^4 m/s 的声子与电子比较。按该题印出的 $g=2$ 计，不再擅加另一个谷因子。

解答. Fermi 函数 $f(\mu+\delta)=1-f(\mu-\delta)$，对称谱固定半填充 $\mu=0$。粒子空穴因子 2、自旋 $g=2$，$\Delta U=2gV\int\mathrm{d}^3k/(2\pi)^3\,E_+/(\mathrm{e}^{\beta E_+}+1)$。无质量径向积分 $\int_0^\infty x^3/(\mathrm{e}^x+1)\,\mathrm{d}x=7\pi^4/120$，

$$\Delta U/V=\frac{7g\pi^2}{120}\frac{(k_{\mathrm{B}}T)^4}{\hbar^3c^3},\quad C_V/V=\frac{7g\pi^2}{30}\frac{k_{\mathrm{B}}^4T^3}{\hbar^3c^3}. \tag{29.2}$$

有隙 $mc^2=\Delta$ 的低温粒子数 $\propto T^{3/2}\mathrm{e}^{-\Delta/k_{\mathrm{B}}T}$，能领先 Δ 乘粒子数，热容 $\propto T^{-1/2}\mathrm{e}^{-\Delta/k_{\mathrm{B}}T}$（其余常数按近底有效质量），所以指数冻结而非无质量 T^3。

二维 $\Delta U/A=3g\zeta(3)(k_{\mathrm{B}}T)^3/(2\pi\hbar^2v^2)$，$C/A=9g\zeta(3)k_{\mathrm{B}}^3T^2/(2\pi\hbar^2v^2)$，与习题25.5单层公式在 $g=2,b=\hbar v$ 一致。线性声子也 T^2 但系数 $\propto c_s^{-2}$，$v/c_s\sim 50$ 使声子通常大许多；自由薄层还可有二次弯曲支。并非只凭电子无质量就判定电子控制总热容。 □

29.5 2004 年：零能壳与相对论 Bose 气

2004 题 1(a)–(d) 二次零能壳谱是习题25.4，新增 (a) 化学势由上一题 $f(E)+f(-E)=1$ 给 $\mu=0$，其余积分、闭式与 $\sqrt{T}$ 热容逐项在原题处。2004 题 2(a)–(d) 三阶气体临界行为完整对应习题30.1(a)–(d)。

习题 29.8 d 维守粒子数、无自旋 Bose 气 $\epsilon=c|p|$。(a) 巨势、数密度用 $\mathrm{Li}_s(z)$；(b)$P,U,U/(PV)$ 与经典；(c)$T_c(n)$ 及维数；(d) 凝聚以下热容温变；(e)T_c 热容与经典极限，区分需要的一侧极限。

解答. 态密度 $\rho(E)/V=S_{d-1}E^{d-1}/[(2\pi\hbar c)^d]$，定义 $C_d=S_{d-1}\Gamma(d)/(2\pi\hbar c)^d$。能量积分或巨势分部积分给

$$\mathcal{G}/V=-C_d(k_{\mathrm{B}}T)^{d+1}\,\mathrm{Li}_{d+1}(z),\quad n=C_d(k_{\mathrm{B}}T)^d\,\mathrm{Li}_d(z),\quad U=dPV. \tag{29.3}$$

经典每粒子 $U=dk_{\mathrm{B}}T$，与量子 $U/(PV)=d$ 同。$d>1$ 才有 $\zeta(d)$ 有限，$k_{\mathrm{B}}T_c=[n/(C_d\zeta(d))]^{1/d}$；这是守粒子数气，不是可任意创灭而 $\mu=0$ 的平衡光子。

凝聚以下与正常以上固定粒子数的热容分别为

$$\frac{C_<}{Nk_{\mathrm{B}}}=d(d+1)\frac{\zeta(d+1)}{\zeta(d)}\left(\frac{T}{T_c}\right)^d, \tag{29.4}$$

$$\frac{C_>}{Nk_{\mathrm{B}}}=d(d+1)\frac{\mathrm{Li}_{d+1}}{\mathrm{Li}_d}-d^2\frac{\mathrm{Li}_d}{\mathrm{Li}_{d-1}}. \tag{29.5}$$

临界**左**值相对经典 dNk_{B} 为 $(d+1)\zeta(d+1)/\zeta(d)$；$1<d\le 2$ 左右同值，$d>2$ 右侧须减 $d\zeta(d)/\zeta(d-1)$，有有限热容跃变。例如 $d=3$ 两侧约 $10.805Nk_{\mathrm{B}}$、$4.228Nk_{\mathrm{B}}$，经典 $3Nk_{\mathrm{B}}$。原题若只写“在 T_c 的热容”，须明确取凝聚侧，不能把左右混为一个数。 □

29.6 2005、2006 年的其余编号

2005 题 2(a)–(f) 相对论 Coulomb 气完整对应习题28.7，同一齐次 Hamilton 量的缩放不由密度本身破坏。2006 题 3(a)–(e) 双层石墨烯完整对应习题25.5(a)–(e)，包括粒子空穴积分与两层电子热容交叉尺度。

习题 29.9 理想 Fermi 气巨系综、单态 k 能 E_k。(a) 联合占据概率；(b) 用平均占据重写；(c)l 种概率 p_j 熵及最大值；(d)Fermi 占据熵、零温；(e) 总 N 方差、零温；(f) 由 $\mathrm{Var}\,N=Nnk_{\mathrm{B}}T\kappa_T$ 估金属零温压缩率，单位 $\text{Å}^3/\text{eV}$。


解答. 每态 Bernoulli，$p_k=f(E_k)$，$P(\{n_k\})=\prod_k p_k^{n_k}(1-p_k)^{1-n_k}$、$n_k=0,1$。任意离散熵 $S=-k_{\mathrm{B}}\sum p_j\log p_j\le k_{\mathrm{B}}\log l$，由凹性或相对均匀分布的相对熵，均匀时取等号。因此 $S_F=-k_{\mathrm{B}}\sum_k[p_k\log p_k+(1-p_k)\log(1-p_k)]$。

零温非简并 Fermi 海每态 0 或 1，熵与数方差 0，$\mathrm{Var}\,N=\sum_k p_k(1-p_k)$。但低温方差 $\simeq k_{\mathrm{B}}T\rho(E_F)$，除 T 有

有限响应：$\kappa_T = \rho(E_F)/(Vn^2) = 3/(2nE_F)$（三维二次色散）。取示例 $n = 0.1$ Å^{-3}、裸电子自由模型 $E_F \simeq 7.86$ eV，得 1.91 Å^3/eV。准确金属参数各不相同，原题未给 n 故估值必须列假设，不能把 $T = 0$ 直接代涨落式得到错误 0/0。 □

习题 29.10　链 N 个长 a 无质量连杆在细管中只能平行/反平行，端距 L，$x = L/(Na)$。(a) 态数；(b)Stirling 熵；压挤给原题近似能 $E = -\sigma a^2 N x^2/2$，用于每个给定 L 的态。(c) 自由能及端力 J，功 $J\,\mathrm{d}L$；(d) 高低温等温线与 T_c；(e) 稳定与不稳定范围；(f) 无外力近 T_c 下长度。

解答. $N_\pm = N(1 \pm x)/2$，$\Omega = \binom{N}{N_+}$（奇偶允许），$S/(Nk_\mathrm{B}) = \log 2 - [(1+x)\log(1+x) + (1-x)\log(1-x)]/2$。$F = E - TS$，力 $J = F_L = (k_\mathrm{B}T/a)\,\mathrm{atanh}\,x - \sigma a x$。$k_\mathrm{B}T_c = \sigma a^2$，小 x 力斜率过零；下图纵轴 $J/(\sigma a)$。



局部稳定 $F_{LL} = [k_\mathrm{B}T/(1-x^2) - \sigma a^2]/(Na^2) > 0$，低温 $|x| < \sqrt{1 - T/T_c}$ 内不稳定。全局平衡要比较两个极小/凸包，不把所有稳定支都当全局最优。无力 $T/T_c = x/\,\mathrm{atanh}\,x$，展开 $\mathrm{atanh}\,x = x + x^3/3 + \cdots$，$|L| \simeq Na\sqrt{3(1 - T/T_c)}$。高温 $J = 0$ 只有 $x = 0$，低温两种对称伸长方向形成题给平均场分岔。 □

第四编　8.334 公开作业与复习题

30　8.334 作业 1：相变、薄膜与耦合序参量

题源：Mehran Kardar，8.334 Spring 2014，PS1，截止 2014 年 2 月 21 日。。以下解答为编者独立补写。

习题 30.1　$P = k_\mathrm{B}Tn - bn^2/2 + cn^3/6$，$b, c > 0$ 不随温度变。(a) 临界 T_c, n_c, P_c 与 $k_\mathrm{B}T_c n_c/P_c$；(b) 压缩率及 n_c 上的温度行为；(c) 临界等温线；(d) 近临界 $n_\pm \simeq n_c(1 \pm \delta)$，以 Maxwell 求 δ 隐式式和指数。另外 Dieterici 气体 $P(v-b) = k_\mathrm{B}T\exp[-a/(k_\mathrm{B}Tv)]$，$v = V/N$：(e) 临界 $Pv/(k_\mathrm{B}T)$；(f)v_c 上的压缩率；(g) 临界等温线最低非零项。

解答. 前四问与 8.333 PS5 题 2 相同，既有热统卷已有完整题解。这里保留用于后续标度的必要推导：$P_n = P_{nn} = 0$ 给 $n_c = b/c$、$k_\mathrm{B}T_c = b^2/(2c)$、$P_c = b^3/(6c^2)$，比 3。$\kappa_T = 1/[nP_n]$，在 n_c 为 $[n_c k_\mathrm{B}(T - T_c)]^{-1}$，由上方正发散、下方负表示均匀模型不稳定；临界 $P - P_c = c(n - n_c)^3/6$。共存同时满足 $P(n_+) = P(n_-)$ 和

$$k_\mathrm{B}T\log(n_+/n_-) - b(n_+ - n_-) + c(n_+^2 - n_-^2)/4 = 0. \tag{30.1}$$

近临界的对称**领先**代入得 $T/T_c \simeq 2\delta/\log[(1+\delta)/(1-\delta)]$、$\delta^2 \simeq 3(1-T/T_c)$。高阶须允许中心密度位移，不可把对称近似当精确全温 binodal。

Dieterici 式的对数导数 $P_v/P = -1/(v-b) + a/(k_{\mathrm{B}}Tv^2)$，再次微分并令临界一二阶为 0，得 $v_c = 2b$、$k_{\mathrm{B}}T_c = a/(4b)$、$P_c = k_{\mathrm{B}}T_c/(b\mathrm{e}^2)$，压缩因子 $2/\mathrm{e}^2$。在 v_c 有 $\kappa_T = [2P(v_c,T)(1-T_c/T)]^{-1}$，上方仍 $\propto (T-T_c)^{-1}$。临界 $P'''(v_c) = -P_c/(2b^3)$，所以 $P - P_c = -P_c(v-v_c)^3/(12b^3) + O((v-v_c)^4)$。不同非普适系数与压缩因子，保留同一均场指数。 □

习题 30.2 简单立方 Heisenberg 薄膜有 n 层，层内平方格 4 近邻，单位三分量自旋；$-\beta H = J\sum_{\alpha,\langle ij\rangle} s_i^\alpha \cdot s_j^\alpha + J_V \sum_{\alpha=1}^{n-1}\sum_i s_i^\alpha \cdot s_i^{\alpha+1}$。试探 $-\beta H_0 = \sum_{\alpha i} h^\alpha \cdot s_i^\alpha$。(a) 求 Z_0, F_0；(b) 用 Langevin 函数求 m^α；(c) 场平行时 $\langle \beta H\rangle_0$；(d)Gibbs 变分方程及数值方法；(e) 随 $J = \widehat{J}/(k_{\mathrm{B}}T)$ 等求无穷层 T_c 与磁化；(f) 大 n 的 $T_c(n)$；(g) 连续三阶方程的 *tanh* 解及含义；(h) 半无穷系统与愈合长；(i) 表层磁化临界指数。可用 $L^{-1}(m) = 3m + 9m^3/5 + O(m^5)$。

解答. 用球面测度 $\mathrm{d}\Omega$，单站 $z(h) = 4\pi \sinh h/h$，层面积站点数 $N_\parallel$，$Z_0 = \prod_\alpha z(h_\alpha)^{N_\parallel}$，$\beta F_0 = -N_\parallel \sum \log z$。$m_\alpha = L(h_\alpha) = \coth h_\alpha - 1/h_\alpha$，方向随 h_α。独立站点给 $\langle \beta H\rangle_0/N_\parallel = -2J\sum m_\alpha^2 - J_V \sum m_\alpha m_{\alpha+1}$，而 $\langle \beta H_0\rangle_0 = -N_\parallel \sum h_\alpha m_\alpha$。

将以上代 $F_{\mathrm{var}} = F_0 + \langle H - H_0\rangle_0$，以 m 作变量，单站熵 Legendre 项导数 h，得

$$L^{-1}(m_\alpha) = 4Jm_\alpha + J_V(m_{\alpha-1} + m_{\alpha+1}), \qquad m_0 = m_{n+1} = 0. \tag{30.2}$$

数值可用有阻尼固定点迭代或 Newton 解三对角 Jacobian，从小非零磁化起步并比较变分自由能；在临界附近需要检查最小 Hessian，纯迭代收敛不保证全局最优。体相 $3k_{\mathrm{B}}T_c = 4\widehat{J} + 2\widehat{J}_V$。设 $\epsilon = 4J + 2J_V - 3 > 0$，小磁化 $m_b^2 = 5\epsilon/9$，均场 $\beta = 1/2$。

有限层线性最大本征值 $4J + 2J_V\cos[\pi/(n+1)]$，故 $k_{\mathrm{B}}T_c(n) = [4\widehat{J} + 2\widehat{J}_V\cos(\pi/(n+1))]/3$，大 n 比体相低 $\widehat{J}_V\pi^2/[3(n+1)^2]$。这是均场预测；真正有限层连续对称、短程二维模型在非零温无此长程序。

以层距作单位，差分展开 $J_V m'' = -\epsilon m + 9m^3/5$。积分一次并取体边界，$m(x) = m_b \tanh[k(x-x_0)]$，$k = \sqrt{\epsilon/(2J_V)}$；两边 $\mp m_b$ 描述畴壁。半空间选 $\tanh[k(x+x_e)]$ 以满足外推到 $x = -x_e$ 的零边界，愈合长 $\lambda = 1/k \propto |T-T_c|^{-1/2}$。表层 $x = O(1)$ 有 $m_s \sim m_b k \propto |T-T_c|$，普通表面转变均场 $\beta_1 = 1$。增强表面耦合可能先表面有序，不属于此均匀耦合假设。 □


习题 30.3 He4 复序参量 ψ 与 He3 浓度场 c 有

$$\beta H = \int \mathrm{d}^d x\, [K|\nabla\psi|^2/2 + t|\psi|^2/2 + u|\psi|^4 + v|\psi|^6 + c^2/(2\sigma^2) - \gamma c|\psi|^2], \tag{30.3}$$

$K, u, v > 0$。(a) 积分 c；(b) 鞍点相图及连续/不连续的 σ_*；(c) 序参量跃变如何消失；(d) 浓度跃变；(e)t, σ 相边界图；(f) 证明 $\langle c - \gamma\sigma^2|\psi|^2\rangle = 0$；(g)$x \neq y$ 的 $\langle c(x)c(y)\rangle$ 关系；(h),(i) 无序、有序区的长距离衰减。

解答. 配方 $c^2/(2\sigma^2)-\gamma cR^2=(c-\gamma\sigma^2R^2)^2/(2\sigma^2)-\gamma^2\sigma^2R^4/2$，积分给与 ψ 无关常数，$u_e=u-\gamma^2\sigma^2/2$。均匀密度势 $f(x)=tx/2+u_ex^2+vx^3$，$x=|\psi|^2\ge0$。

$u_e>0$ 时 $t=0$ 连续，$t<0$ 满足 $t/2+2u_ex+3vx^2=0$。$u_e<0$ 共存由 $f(x)=f(0),f'(x)=0$ 解 $x_*=-u_e/(2v)$、$t_*=u_e^2/(2v)>0$。三临界 $\sigma_*=\sqrt{2u}/|\gamma|$、$t=0$。$|\psi|$ 跃变 $\sqrt{-u_e/(2v)}\propto(\sigma-\sigma_*)^{1/2}$，平均浓度为 $\gamma\sigma^2x$，跃变 $\gamma\sigma^2x_*$ 为一阶消失。两边界在 $(0,\sigma_*)$ 相切：连续侧 $t=0$，一阶侧 $t=u_e(\sigma)^2/(2v)$，有序在其下。



条件于 ψ，$c=\gamma\sigma^2|\psi|^2+\eta$、$\langle\eta\rangle=0$，$\langle\eta(x)\eta(y)\rangle=\sigma^2\delta(x-y)$，直接给 (f),(g)，后一式在重合点必须加接触项。无序 Gaussian 复场 $\langle|\psi(x)|^2|\psi(0)|^2\rangle_c\propto|G(x)|^2$，远距 $\mathrm{e}^{-2r/\xi}$ 乘幂次；有序区非连接相关趋 $\langle c\rangle^2$，Gaussian 振幅模给指数趋近。超出 Gaussian 阶，无隙相位也可通过复合算符产生幂次尾；不把振幅的有限相关长误称整个有序相的所有相关均指数。 □

习题 30.4 二维薄片用三维位置向量 $r(x_1,x_2)$ 描述，能量对嵌入空间平移、旋转不变。(a) 说明最低二次梯度项为 $t\sum_\alpha|\partial_\alpha r|^2/2$ 与 $K\sum_\alpha|\partial_\alpha^2r|^2/2$；(b) 列两种最低四次项；(c)$K>0$、四次稳定时 t 变号的状态。

解答. 平移排除 r^2；嵌入旋转只允许三维指标内积，最低导数是切矢 $\partial_\alpha r$，其次弯曲 ∂_α^2r。原题平方格形式保留 $q_1^4+q_2^4$；若另要求片内坐标连续旋转，可用 $|\nabla^2r|^2$，混合导数积分后同类，但不能把这额外对称默认为原题已要求。

定义诱导度量 $g_{\alpha\beta}=\partial_\alpha r\cdot\partial_\beta r$，各向同性最低四次不变量 $u(\operatorname{Tr}g)^2/4+v\operatorname{Tr}(g^2)/4$。它们对应切矢长度与彼此夹角，非仅单一 $|r|^4$。$t>0$ 鞍点切矢 0、薄片没有平面取向，称皱缩。$t<0$ 若 $v>0$ 且 $2u+v>0$，最小 $g=\zeta^2I$、$\zeta^2=-t/(2u+v)$，$r=\zeta(x_1e_1+x_2e_2)$ 为平直状态，弯曲项稳定慢起伏。若四次项偏好秩 1 度量，可出现管状各向异性；仅“四次稳定”不独自保证平面，须列出选择平面的系数条件。 □

31 8.334 作业 2：质量生成、随机场与长程相互作用

题源：*Mehran Kardar, 8.334 Spring 2014, PS2*，截止 *2014* 年 *3* 月 *4* 日。。以下解答为编者独立补写。

习题 31.1 n 分量 m 与标量 A 耦合，$\beta H=\int[K(\nabla m)^2/2+tm^2/2+u(m^2)^2+em^2A^2+L(\nabla A)^2/2]\,\mathrm{d}^dx$，$K,L,u>0$，为稳定取 $e\geq 0$。(a) 均匀鞍点 $m\hat{e}_\ell, A=0$；(b)$C=\partial_t^2\log Z$；(c) 分纵横与 a 模二阶展开；(d) 纵横相关长；(e)a 相关长；(f)$t>0$ 时 $\langle a(x)a(0)\rangle$；(g)Gaussian 自由能修正；(h) 热容修正；(i) 积分随 ξ,Λ,d 行为；(j) 鞍点上临界维是否由标量耦合改变。

解答. $m_0=0$ $(t>0)$ 或 $m_0^2=-t/(4u)$ $(t<0)$，鞍点 $f_0=0$ 或 $-t^2/(16u)$。所以 $C_0/V=0$ 或 $1/(8u)$，为阶跃。置 $m=(m_0+\phi_\ell)e_\ell+\sum\phi_te_t$、$A=a$，Hessian 质量 $r_\ell=t+12um_0^2$、$r_t=t+4um_0^2$、$r_a=2em_0^2$；没有二次混合项，因为原耦合最少 a^2。

纵横相关长 $\sqrt{K/r_{\ell,t}}$：正侧皆 $\sqrt{K/t}$，负侧纵 $\sqrt{K/(-2t)}$、横无穷 (Goldstone)；ξ_a 正侧无穷，负侧 $\sqrt{2uL/(-et)}$。正侧 $G_a(r)=\int_q \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}/(Lq^2)$，$d>2$ 远距 $\Gamma(d/2-1)/(4\pi^{d/2}Lr^{d-2})$，$d\leq 2$ 无限体积绝对场相关需 IR 规整。

Gaussian 积分得

$$\delta\log Z/V=-\tfrac12\int_q[\log(Kq^2+r_\ell)+(n-1)\log(Kq^2+r_t)+\log(Lq^2+r_a)],\quad \int_q=\int_{|q|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^dq}{(2\pi)^d}. \tag{31.1}$$

省去与 t 无关测度常数。各分支质量随 t 线性，$\delta C/V=\frac12\int_q\sum_i(r_i')^2/(K_iq^2+r_i)^2$。正侧为 $n\int_q(Kq^2+t)^{-2}/2$；负侧为 $[4\int_q(Kq^2-2t)^{-2}+(e/2u)^2\int_q(Lq^2-et/(2u))^{-2}]/2$。横模质量恒 0，不产生这阶 t 导数；仅 $t=0$ 不可用分段微分跨越鞍点。

$\int_q(q^2+\xi^{-2})^{-2}$ 在 $d<4$ 奇异 $\propto\xi^{4-d}$，$d=4$ 为 $\log(\Lambda\xi)$，$d>4$UV 主导 Λ^{d-4} 加较小奇异项，故 Gaussian 判据仍 $d_u=4$。A 增加奇异项系数，不改变这一维数；不过积分掉标量可生成非解析有效势，某些参数下使连续转变被一阶转变取代，该一阶问题不由二阶鞍点计算自动排除。 □

习题 31.2 标量 $\beta H=\int[K(\nabla m)^2/2+tm^2/2+um^4-h(x)m]\,\mathrm{d}^dx$，$u>0$，淬火 Gaussian 场 $\overline{h}=0$、$\overline{h(x)h(y)}=\Delta\delta(x-y)$，等价 $\overline{h(q)h(q')}=\Delta(2\pi)^d\delta(q+q')$。(a) 均匀鞍点淬火平均；(b) 二阶涨落；(c)Fourier 能；(d) 固定 h 下均值与连接方差；(e) 平均散射线形；(f),(g) 固定 h 及平均 Gaussian 自由能；(h) 奇异 t 幂次；(i) 上临界维。

解答. 均匀假设仅感受 $\bar{h}_V=V^{-1}\int h$，其方差 Δ/V，热力学平均消失，故 $m_0=0$ 或 $m_0^2=-t/(4u)$、$f_{sp}=0$ 或 $-t^2/(16u)$。但真实随机场局部变形不能由均匀平均排除。

置 $m=m_0+\phi$，二次核 $D(q)=Kq^2+r$、$r=t+12um_0^2$，$\beta H_2=\frac12\int_q D(q)|\phi(q)|^2-\int_q h(-q)\phi(q)$。配方 $\phi=h/D+\delta\phi$，得到 $\langle\phi(q)\rangle_h=h(q)/D$、$\langle\delta\phi(q)\delta\phi(q')\rangle_h=(2\pi)^d\delta(q+q')/D$。淬火后总线形

$$S(q)=D(q)^{-1}+\Delta D(q)^{-2},\quad \delta f[h]=\tfrac12\int_q\log D-\frac{1}{2V}\int_q|h(q)|^2/D. \tag{31.2}$$

第二项不是热连接方差；淬火平均 $\overline{\delta f}=\frac12\int_q\log D-\frac{\Delta}{2}\int_q D^{-1}$。减去解析 UV 项后热奇异 $r^{d/2}$，随机项 $-\Delta r^{(d-2)/2}$，偶数边界出现对数。负侧平均场 $f_{sp}\sim t^2$；随机修正相对它 $\sim\Delta|t|^{(d-6)/2}$，故上临界维 6，不能由清洁系统 Ginzburg

的 4 代替。此 Gaussian 判据不等价于全非微扰随机场临界解，也不证明维数约化。 □

习题 31.3 连续自旋除短程项外有铁磁尾 $J(r)\propto r^{-d-\sigma}$。(a) 二次核的变化及何时主导；(b) 由 Goldstone 涨落求下临界维；(c) 鞍点上临界维。

解答. 差能量用 $\int \mathrm{d}^d r J(r)[1-\cos(qr)]$，$0<\sigma<2$ 作 $r=y/q$ 得到 $|q|^\sigma$，系数正；$\sigma>2$ 二阶矩有限，领先 q^2，等号有 $q^2\log q$。因此 Gaussian 层长程主导 $\sigma<2$。Goldstone 方差 $\int_0^\Lambda q^{d-1}\,\mathrm{d}q/q^\sigma$ 在 $d\le\sigma$IR 发散，所以连续对称 $d_\ell=\sigma$（若短程主导则 2）。场维 $(d-\sigma)/2$ 使 um^4 尺度维 $2\sigma-d$，$d_u=2\sigma$；相互作用临界下长短程精确交界可移到 $\sigma=2-\eta_{SR}$，不能把 Gaussian 阈值当所有参数的全阶结论。 □

32 8.334 作业 3：标度、耦合场与长程 RG

题源：Mehran Kardar，8.334 Spring 2014，PS3，截止 2014 年 3 月 21 日。。以下解答为编者独立补写。

习题 32.1 二维 n 分量非线性 σ 模型给 $\dot T=(n-2)T^2/(2\pi)$、$\dot h=2h$，点为对 ℓ 求导。(a)$T\to0$ 相关长；(b)$T,h\to0$ 奇异自由能；(c)$h=0$ 磁化率。

解答. 先假设 $n>2$。积分 $1/T(\ell)=1/T_0-(n-2)\ell/(2\pi)$，到 $T(\ell_*)=O(1)$ 为止，$\ell_*=2\pi/[(n-2)T_0]+O(1)$，$\xi\sim a\mathrm{e}^{\ell_*}$。面积自由能 $f_s=\mathrm{e}^{-2\ell_*}\Phi(h\mathrm{e}^{2\ell_*})$，即 $f_s\sim\xi^{-2}\Phi(h\xi^2)$（指标按题给截断流，忽略高阶场异常维）。二次场导数 $\chi\sim\xi^2\sim\exp[4\pi/((n-2)T)]$。

$n=2$ 的该微扰流恒 0，不能除以 $n-2$；XY 需要涡旋的 BKT 方程。$n<2$ 亦不适用此渐近自由指数尺度，原公式没有无条件覆盖所有 n。 □

习题 32.2 两标量 $\beta H=\int[tm^2/2+K(\nabla m)^2/2-hm+L(\nabla^2\phi)^2/2+v\nabla m\cdot\nabla\phi]\,\mathrm{d}^dx$。(a)Fourier 式；(b)$q'=bq, m'(q')=m(q)/z, \phi'(q')=\phi(q)/y$ 的递推，忽略常数积分；(c)K,L 固定点 y_t,y_h,y_v；(d)$f_s=t^{2-\alpha}g(h/t^\Delta,v/t^\omega)$ 的指数；(e)t,L 固定的另一点，哪些扰动相关。

解答. $\beta H=\frac12\int_q(m(-q),\phi(-q))\begin{pmatrix}t+Kq^2 & vq^2\\ vq^2 & Lq^4\end{pmatrix}\binom{m(q)}{\phi(q)}-hm(0)$。消去高动量 Gaussian 仅贡献自由能常数，低模改变量得 $t'=b^{-d}z^2t$、$K'=b^{-d-2}z^2K$、$L'=b^{-d-4}y^2L$、$v'=b^{-d-2}zyv$、$h'=zh$。

取 $z=b^{(d+2)/2}$、$y=b^{(d+4)/2}$，K,L 固定，$y_t=2, y_h=(d+2)/2, y_v=1$。自由能体积缩放 b^{-d}，选 $b=t^{-1/2}$ 得 $\alpha=2-d/2$、$\Delta=(d+2)/4$、$\omega=1/2$。v 相关且把临界线移到 $t=v^2/L$：配方有效 m 核 $t-v^2/L+Kq^2$（$q\neq0$），稳定区 $t>v^2/L$。不能在 $t=0$ 保留有限 v 后继续使用不稳定 Gaussian。

若固定 t,L，则 $z=b^{d/2}$、$y=b^{(d+4)/2}$，$K'=b^{-2}K$ 无关、$v'=v$ 边缘、$h'=b^{d/2}h$ 相关；这是有质量 m 配以弯曲无质量 ϕ 的固定描述，v 只在 $t>v^2/L$ 的稳定区改变有效系数。两套场重标度反映选择不同主导核，不能混用其 y_t。 □

习题 32.3 d 维分为 n 个平行、$d-n$ 个垂直方向，$\beta H_0 = \int[K(\nabla_\parallel m)^2/2 + L(\nabla_\perp^2 m)^2/2 + tm^2/2 - hm]\,\mathrm{d}^n x_\parallel\,\mathrm{d}^{d-n}x_\perp$，扰动 $U = u\int m^4$。(a)Fourier；(b)$q'_\parallel = bq_\parallel, q'_\perp = cq_\perp, m' = m/z$ 递推；(c)K, L 固定的 c, z, y_t, y_h；(d) 自由能、α, Δ；(e) 零场 χ；(f)Gaussian 两点和 $\chi_0(q)$；(g)U 的 Fourier 表达；(h) 上临界维；(i) 一阶展开用 Wick 化简；(j)$\chi(q)$ 与一阶 t_c，无需积分。

解答. 记 $D(q) = t + Kq_\parallel^2 + Lq_\perp^4$，$H_0 = \frac{1}{2}\int_q D|m|^2 - hm(0)$。设体积因子 $B = b^n c^{d-n}$，有 $K' = z^2K/(Bb^2)$、$L' = z^2L/(Bc^4)$、$t' = z^2t/B$、$h' = zh$。两梯度同时固定要求 $c = b^{1/2}$，定义有效缩放维 $D_e = n+(d-n)/2 = (d+n)/2$，$z = b^{(D_e+2)/2}$。因此 $y_t = 2, y_h = (D_e+2)/2$，$f_s = b^{-D_e}f_s(b^2t, b^{y_h}h)$，$2-\alpha = D_e/2$、$\Delta = (D_e+2)/4$、$\chi = t^{-1}$。

$\langle m(q)m(q')\rangle_0 = (2\pi)^d\delta(q+q')/D(q)$，$\chi_0 = 1/D$。$U = u\int_{q_1q_2q_3q_4}(2\pi)^d\delta(\sum q_i)\prod m(q_i)$。其递推 $u' = uz^4/B^3 = b^{4-D_e}u$，故 $d_u = 8-n$（在题给固定 n 的方向划分下）。

连接一阶展开 $\langle m_q m_{q'}\rangle = \langle m_q m_{q'}\rangle_0 - \langle m_q m_{q'}U\rangle_{0,c}$。顶点四条腿选两条接外腿有 $4\times 3 = 12$，另两条自收缩 $I_1 = \int_k D(k)^{-1}$，故 $\chi(q) = D(q)^{-1} - 12uI_1D(q)^{-2} + O(u^2)$。重写为 $[t + 12uI_1 + Kq_\parallel^2 + Lq_\perp^4]^{-1}$ 到一阶，$t_c = -12u\int_k[Kk_\parallel^2 + Lk_\perp^4]^{-1} + O(u^2)$，需同一 UV 截断与 IR 可积条件；低维发散正是 Gaussian 失效信号。平行 $\xi\sim t^{-1/2}$、垂直 $\xi\sim t^{-1/4}$，同一个长度指数不能描述两方向。 □

习题 32.4 N_s 分量自旋有 $J(r)\propto r^{-d-\sigma}$ 长程项和短程 LG 项。(a) 导出 $t + K_2q^2 + K_\sigma q^\sigma$ 及 $u(m^2)^2$ 核；(b)$u = 0, \sigma > 2$ 递推与固定核；(c)$\sigma < 2$ 的场重标度与 K_2 无关；(d)Gaussianν, η, γ、$d > 2\sigma$ 时 u；(e) 微扰 RG；(f)$d < 2\sigma$ 的首阶指数，原题记 $\epsilon = d - 2\sigma$；(g)$J(r)\propto \mathrm{e}^{-r/a}$ 时行为。

解答. 长程非解析项的推导见习题31.3；Fourier 四次项 $u\int_{q_1q_2q_3}(m_{q_1}\cdot m_{q_2})(m_{q_3}\cdot m_{-q_1-q_2-q_3})$。固定 q^2 核时 $t' = b^2t$、$K'_\sigma = b^{2-\sigma}K_\sigma$，$\sigma > 2$ 流向短程 Gaussian。固定 q^σ 则 Fourier 场因子 $z = b^{(d+\sigma)/2}$，$t' = b^\sigma t$、$K'_2 = b^{\sigma-2}K_2$。于是 $\nu = 1/\sigma$，$\chi(q)\sim q^{-\sigma} = q^{-2+\eta}$ 给 $\eta = 2-\sigma$，$\gamma = 1$，u 维 $2\sigma - d$。

令 $K_\sigma = 1$、$A_d = S_{d-1}/(2\pi)^d$，窄壳积分 $I_1 = A_d\Lambda^{d-\sigma}\,\mathrm{d}\ell$、$I_2 = A_d\Lambda^{d-2\sigma}\,\mathrm{d}\ell$。为核对原题 (e) 的系数，将 $m = \varphi+\chi, u(m^2)^2$ 中的两快腿部分写作 $V_2 = \int\chi_a B_{ab}\chi_b, B_{ab} = 2u\varphi^2\delta_{ab} + 4u\varphi_a\varphi_b$。于是 $\mathrm{tr}\,B = 2u(N_s+2)\varphi^2$，一次收缩给 $\delta t = 4(N_s+2)uI_1$；两顶角连接收缩给 $-I_2\,\mathrm{tr}\,B^2 = -4(N_s+8)u^2I_2(\varphi^2)^2$。展开 $I_1(t) = A_d\Lambda^{d-\sigma}\,\mathrm{d}\ell[1 - t/\Lambda^\sigma + \cdots]$ 并缩放，对 $u(m^2)^2$ 约定（没有 4!）得到

$$\dot t = \sigma t + 4(N_s+2)uA_d\Lambda^{d-\sigma} - 4(N_s+2)utA_d\Lambda^{d-2\sigma} + \cdots, \tag{32.1}$$

$$\dot u = (2\sigma - d)u - 4(N_s+8)u^2A_d\Lambda^{d-2\sigma} + \cdots. \tag{32.2}$$

动量非解析项不由局部壳积分重新生成，其系数这一阶无修正。取 $\bar\epsilon = 2\sigma - d = -\epsilon > 0$，平移质量至临界流形后，$u_*A_d\Lambda^{-\bar\epsilon} = \bar\epsilon/[4(N_s+8)]$，

$$\nu^{-1} = \sigma - \frac{N_s+2}{N_s+8}\bar\epsilon + O(\bar\epsilon^2), \qquad \eta = 2-\sigma. \tag{32.3}$$

$\gamma = \sigma\nu$ 在该长程固定点。注意原题 ϵ 是负数，不可直接套通常正的 $4-d$ 公式。有限程指数尾所有低阶矩有限，Fourier 在 $q = 0$ 解析，流向短程普适类（非 Gaussian 时是短程 Wilson–Fisher）。长程固定点与短程点的交界需比

较 σ 与 $2-\eta_{SR}$，首阶 Gaussian 分界只是近似。 □

33 8.334 作业 4：转移矩阵与实空间重整化

题源：*Mehran Kardar*，*8.334 Spring 2014*，*PS4*，截止 *2014* 年 *4* 月 *9* 日。原卷前四页介绍转移矩阵，理论第13章及本章承接，全部七题包括选做题收入。。以下解答为编者独立补写。

习题 33.1 一维 spin1 取 $s=-1,0,1$，$-\beta H=K\sum s_is_{i+1}$。(a) 转移矩阵；(b) 利用对称求最大本征值与 $\log Z/N$；(c) 相关长和 $K\to\infty$；(d) 消去隔站后闭合的最简参数空间。

解答. 按 $(-1,0,1)$，$T=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{K} & 1 & \mathrm{e}^{-K}\\ 1 & 1 & 1\\ \mathrm{e}^{-K} & 1 & \mathrm{e}^{K}\end{pmatrix}$，奇向量 $(1,0,-1)/\sqrt{2}$ 的 $\lambda_o=2\sinh K$。偶空间取 $(1,0,1)/\sqrt{2},(0,1,0)$，块为 $\begin{pmatrix}2\cosh K & \sqrt{2}\\ \sqrt{2} & 1\end{pmatrix}$，最大

$$\lambda_+=\frac{2\cosh K+1+\sqrt{(2\cosh K-1)^2+8}}{2},\qquad \log Z/N\to\log\lambda_+. \tag{33.1}$$

自旋关联连接偶基态与奇模，$\xi^{-1}=\log(\lambda_+/|2\sinh K|)$；$K\to+\infty$ 时 $\lambda_+-\lambda_o\simeq 4\mathrm{e}^{-K}$，$\xi\simeq \mathrm{e}^{2K}/4$。有限温正矩阵最大根单一，无非零温相变。

闭合核可写 $g+Jss'+Qs^2s'^2-D(s^2+s'^2)/2$。四个独立对称权重 $T_{00},T_{01},T_{11},T_{1,-1}$ 都可拟合这四参数，平方 T^2 保持全局 $s\mapsto -s$ 对称，却生成晶场 D 与双二次 Q，仅 J 不能闭合。 □

习题 33.2 q 态 clock 自旋 $s\in\mathbb{Z}_q$，近邻 $-\beta H=\sum J(s_i-s_j)$，J 为任意周期实函数。(a) 环链 $Z=\operatorname{Tr}T^N$；(b) 显写循环矩阵并离散 Fourier 对角化；(c) 热力学自由能；(d) 以投影 Π_α 写 $\langle\delta_{s_i,s_{i+l}}\rangle$，原题声称连接部分 $\sim[\lambda(1)/\lambda(0)]^l$，说明条件。

解答. $w_n=\mathrm{e}^{J(n)}$、$T_{ab}=w_{a-b}$，环乘积求和即迹。Fourier 本征向量 $q^{-1/2}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}ka/q}$，$\lambda_k=\sum_{n=0}^{q-1}w_n\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}kn/q}$，$Z=\sum_k\lambda_k^N$。严格正权重给 Perron 根 $\lambda_0=\sum w_n>|\lambda_{k\neq0}|$，$\beta f=-\log\lambda_0$。

Π_α 是对角仅第 α 为 1，$\langle\delta_{s_i,s_{i+l}}\rangle=Z^{-1}\sum_\alpha\operatorname{Tr}(\Pi_\alpha T^l\Pi_\alpha T^{N-l})$。无穷链由均匀稳态得

$$\langle\delta_{s_i,s_{i+l}}\rangle_c=\frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q-1}(\lambda_k/\lambda_0)^l. \tag{33.2}$$

一般 $J(n)$ 下主导为非零 k 中的最大模，未必 $k=1$；例如 $q=4$、$w_0=w_2>w_1=w_3$，λ_2 主导而 $\lambda_1=0$。原题末式对通常铁磁 cosine clock 中 $k=\pm1$ 最慢模成立，但不能要求证明任意周期 J 下的错误断言。 □

习题 33.3 一维 XY 单位自旋 $-\beta H=K\sum\cos(\theta_i-\theta_{i+1})$。(a) 转移核与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}$ 本征函数；(b) 自由能及 $T\propto K^{-1}\to0$ 热容；(c) 相关長与 $K\to\infty$。

解答. 用 $\mathrm{d}\theta$ 测度，$T(\theta,\theta')=\mathrm{e}^{K\cos(\theta-\theta')}$，卷积本征值 $\lambda_m=2\pi I_m(K)$，$f=-k_{\mathrm{B}}T\log[2\pi I_0(K)]$。$K=\widehat{J}/(k_{\mathrm{B}}T)$，能每站 $-\widehat{J}I_1/I_0$，$I_0(K)\simeq \mathrm{e}^K/\sqrt{2\pi K}$ 给 $U/N=-\widehat{J}+k_{\mathrm{B}}T/2+\cdots$，所以经典自旋 $C/N\to k_{\mathrm{B}}/2$，这是独立相对角谐振模；若量子自由度会有低温量子修正。

$s_i\cdot s_{i+l}$ 关联取 $m=\pm1$，$\xi^{-1}=\log(I_0/I_1)$，$I_1/I_0=1-1/(2K)+O(K^{-2})$，$\xi\simeq 2K$。与离散 Ising 的激活式 e^{2K} 不同，连续角涨落用渐进的小角变化破坏一维有序。 □

习题 33.4 一维经典气有足够硬核使只有最近粒子相互作用，排序 $0\le x_1\le\cdots\le x_N\le L$。(a) 写 $H=\sum p_i^2/(2m)+\sum_{i=2}^{N}V(x_i-x_{i-1})$；(b)$Z$ 及 $\delta_1=x_1,\delta_i=x_i-x_{i-1}$ 区域；(c)Gibbs–Laplace 配分 $\mathcal{Z}(P)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta PL}Z(L)\,\mathrm{d}L$ 与鞍点压力；(d)$\delta_{N+1}=L-\sum_1^N\delta_i$ 分离积分；(e) 平均长、密度与无凝聚；(f) 硬棒最小间距 a 的状态方程及 virial 系数。

解答. 排序去掉 $N!$，动量积分后 $Z=\lambda^{-N}\int_{\delta_i\ge0,\sum_1^N\delta_i\le L}\prod_{i=1}^N\mathrm{d}\delta_i\exp[-\beta\sum_{i=2}^N V(\delta_i)]$。两端外侧没有粒子间势。Laplace 鞍点 $\partial_L\log Z=\beta P$，就是 canonical 压力。

最后空隙变量使 $L=\sum_1^{N+1}\delta_i$，Jacobian1。两个边界空隙积分各 $(\beta P)^{-1}$，$I(P,T)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta[V(\delta)+P\delta]}\,\mathrm{d}\delta$，故 $\mathcal{Z}=\lambda^{-N}(\beta P)^{-2}I^{N-1}$。$\langle L\rangle=-\beta^{-1}\partial_P\log\mathcal{Z}=2/(\beta P)+(N-1)\langle\delta\rangle$，$\langle\delta\rangle=\int\delta\mathrm{e}^{-\beta(V+P\delta)}/I$，热力学 $n=1/\langle\delta\rangle$。对稳定短程势、正压有限温，正积分解析，无均场所预言的有限温液气奇点；不是对任意不稳定势都成立。

硬棒 $I=\mathrm{e}^{-\beta Pa}/(\beta P)$，$\langle\delta\rangle=a+k_{\mathrm{B}}T/P$，故 $P=nk_{\mathrm{B}}T/(1-na)$，$B_l=a^{l-1}$。有限 N 的边界空隙给 $\langle L\rangle=(N-1)a+(N+1)k_{\mathrm{B}}T/P$，不能误当无穷体系方程。 □

习题 33.5 一维 q 态 Potts 环链 $-\beta H=J\sum\delta_{s_i,s_{i+1}}$。(a)$Z,\xi$；(b) 反铁磁零温是否临界；(c) 隔站消去的 J,g 流；(d) 固定点稳定；(e)$\log Z$ 的常数级数；(f)$t=\mathrm{e}^{-1/\xi}$ 化简；(g) 级数回到转移矩阵答案；(h) 加入 $h\sum\delta_{s_i,1}$ 生成 $K\sum\delta_{s_i,1}\delta_{s_{i+1},1}$ 的三参数流；(i) 铁磁零温的磁本征值与相关长。

解答. 令 $x=\mathrm{e}^J$，$T_{ab}=1+(x-1)\delta_{ab}$，$\lambda_0=x+q-1$、$\lambda_1=x-1$ ($q-1$ 重)，$Z=\lambda_0^N+(q-1)\lambda_1^N$、$\xi^{-1}=\log(\lambda_0/|\lambda_1|)$。$J\to-\infty$ 时 $|\lambda_1/\lambda_0|=1/(q-1)$，$q>2$ 相关长有限，$q=2$ 为严格交替零温临界，不能统一回答所有 q。

T^2 非对角 $D=2x+q-2$、对角 $C=x^2+q-1$，所以 $J'=\log(C/D)$、$g'=2g+\log D$。$J=0$ 稳定，铁磁 $J=\infty$ 零温点不稳定；对 $q=2$ 反铁磁极限消去隔站后映到铁磁点，交错序需另外跟踪。

铁磁取 $t=(x-1)/(x+q-1)\ge0$，$t'=t^2$；反铁磁用有符号比 r 才有 $r'=r^2$。从 $g_0=0$，每原站 $\log Z/N=\sum_{j\ge0}2^{-j-1}\log D(J_j)$。$D=q(1+t)/(1-t)$，因此级数 $\log q+\sum 2^{-j-1}\log[(1+t^{2^j})/(1-t^{2^j})]$，由 $1-t^{2^{j+1}}=(1-t^{2^j})(1+t^{2^j})$ 逐项抵消为 $\log[q/(1-t)]$，正是 $\log\lambda_0$。

三参数最清楚从对称核 $T_{ab}=\exp[g+J\delta_{ab}+K\delta_{a1}\delta_{b1}+h(\delta_{a1}+\delta_{b1})/2]$ 平方。按 11、$1a$、aa、ab $(a,b\ne1,a\ne b)$ 四权重去掉 e^{2g} 后分别

$$A=\mathrm{e}^{2(J+K+h)}+(q-1)\mathrm{e}^h,\qquad B=\mathrm{e}^{h/2}[\mathrm{e}^{J+K+h}+\mathrm{e}^J+q-2],\tag{33.3}$$

$$C=\mathrm{e}^h+\mathrm{e}^{2J}+q-2,\qquad D=\mathrm{e}^h+2\mathrm{e}^J+q-3.\tag{33.4}$$

故 $g'=2g+\log D$、$J'=\log(C/D)$、$h'=2\log(B/D)$、$K'=\log(A/D)-J'-h'$。$q=2$ 的参数存在冗余，可按 Ising 场直接闭合；$q\geq 3$ 上式四类齐备。

$J\to\infty$ 有 $J'=J-\log 2+\cdots$，e^{-J} 翻倍，热本征值 2、$y_t=1$；$\xi\simeq \mathrm{e}^{J}/q$。磁小扰动 $\binom{h'}{K'}=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)\binom{h}{K}+\cdots$，本征值 2、1，对应 $y_h=1$ 与额外边缘方向 0。有限温一维没有自发破缺，零温磁场敏感不能推出非零 T_c。 □

习题 33.6 蜂窝 Ising 近邻 J。(a) 四站星形簇、长度缩放 $b=2$；(b) 多数规则如何处理平票；(c) 中心为平票决胜的簇自旋 + 微观表；(d) 相邻簇内部与跨边能；(e) 令 $x=\mathrm{e}^{J}$，证明 $R_{++}=x^8+2x^6+7x^4+14x^2+17+14x^{-2}+7x^{-4}+2x^{-6}$，$R_{+-}=9x^4+16x^2+13+16x^{-2}+9x^{-4}+x^{-8}$；(f) 耦合流；(g) 近似临界 J_c,ν 与精确值比较；(h) 零温铁磁的 y_h,y_t；(i) 反铁磁是否适用及破坏的对称。

解答. 星形取中心 s_0 与三个叶 s_1,s_2,s_3，总和非 0 用多数符号，等于 0 用 s_0。蜂窝适当四站覆盖后两相邻星形有两条跨簇边。+ 微观态 8 个：中心 +、叶中负数 0、1、2（分别 1、3、3 种）；中心 − 仅叶全 +（1 种）。− 态为全体反号，表已穷尽 16 态。

设两个簇 a,b，可标跨边 a_1b_1,a_2b_2，总键和 $E=\sum_{j=1}^{3}(a_0a_j+b_0b_j)+a_1b_1+a_2b_2$，权重 e^{JE}。固定簇 $+,+$ 或 $+,-$ 各 8 乘 8 种，按 E 计数得到题中两多项式；每式在 $x=1$ 均 64，最高键和 8 验证总 8 条微观键。随卷数值代码完整穷举验证系数。

局部两簇投影 $R(S_A,S_B)=A_0\exp[J'S_AS_B]$，故 $J'=\frac{1}{2}\log(R_{++}/R_{+-})$。这一局部权重近似忽略相邻第三簇、多簇有效相互作用，不是整个格点分区函数的精确闭合变换。非零固定点数值 $J_c\simeq 1.04553$，$\lambda_t=J'(J_c)'\simeq 1.81762$，$\nu=\log 2/\log\lambda_t\simeq 1.1600$；精确蜂窝 $J_c=\frac{1}{2}\log(2+\sqrt{3})=0.65848$、$\nu=1$。较大非普适误差必须如实报告，不调系数“校准”到精确答案。

铁磁零温 $J'\simeq 2J-\log 3$，以 $T\propto 1/J$ 坐标 $T'\simeq T/2$，$y_t=-1$；一个饱和四站簇磁功 $4hS$，$y_h=2$。若用激活缺陷 e^{-2J} 作坐标，线性导数为 0，与 $1/J$ 坐标不同，不能伪称有限激活本征值。反铁磁 Néel 态中心与三个叶反号，簇多数投影与中心决胜不与交错翻转规范变换相容，不能保留原蜂窝两亚格子对称；需改交错块变量后另建方案。 □

习题 33.7 两个 Ising 自旋 $H=-\widehat{K}\sigma_1\sigma_2$，$K=\beta\widehat{K}$。(a) 均匀随机选一个自旋做 Metropolis，显写四态转移矩阵并验证平衡权重为左本征向量；(b) 单翻、双翻以 $p,1-p$ 选取，重复。

解答. 顺序 $(++,+-,-+,--)$，令 $a=\min(1,\mathrm{e}^{-2K})$、$b=\min(1,\mathrm{e}^{2K})$。行代表初态，

$$P_1=\begin{pmatrix}1-a & a/2 & a/2 & 0\\ b/2 & 1-b & 0 & b/2\\ b/2 & 0 & 1-b & b/2\\ 0 & a/2 & a/2 & 1-a\end{pmatrix},\qquad P_2=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}. \tag{33.5}$$

$\pi=(\mathrm{e}^{K},\mathrm{e}^{-K},\mathrm{e}^{-K},\mathrm{e}^{K})/[4\cosh K]$，$\mathrm{e}^{K}a=\mathrm{e}^{-K}b$ 使每边详细平衡，直接得 $\pi P_1=\pi$。双翻不改键能，必接受，且配对权重相等，$\pi P_2=\pi$，故 $P=pP_1+(1-p)P_2$ 同样平稳。$p=0$ 分成两不连通轨道，虽然平稳式仍真，却不能从

任意初态采到完整平衡；平稳、不可约、有效混合是三个不同问题。 □

34 8.334 作业 5：对偶、Potts 模型与渗流

题源：Mehran Kardar，8.334 Spring 2014，PS5，截止 2014 年 4 月 28 日。选做题 2 与题 5(c) 保留。。以下解答为编者独立补写。

习题 34.1 平方格 Ising，$-\beta H = K\sum_{\langle ij\rangle}\sigma_i\sigma_j$。(a) 从自由能对偶导出 $U = \langle \beta H\rangle = -\partial_{\log K}\log Z$ 关系；(b) 求临界 U 精确值。

解答. 热力学每站 $\phi(K) = \log Z/N$ 满足 $\phi(K) = \log\sinh(2K) + \phi(K^*)$，$\sinh 2K\sinh 2K^* = 1$；有限环面的不同边界扇区另处理，对能密度无影响。微分得到 $\phi' = 2\coth 2K + \phi'(K^*)\partial_K K^*$。$\partial_K K^* = -1/\sinh 2K$，所以

$$\frac{U(K)}{N} = -2K\coth 2K - \frac{K}{K^*\sinh 2K}\frac{U(K^*)}{N}. \tag{34.1}$$

自对偶 $\sinh 2K_c = 1$ 使 $\phi'(K_c) = \sqrt{2}$，$U/N = -\sqrt{2}K_c$。若问物理能 H，则每站 $-\sqrt{2}\widehat{J}$，而非多乘 β。该推导用能在连续转变两侧相合，不能直接以单支同值论证一阶转变潜热。 □

习题 34.2 验证平方格 Ising 的精确自由能在对偶变换后只差解析函数。

解答. 用第14章的积分形式

$$\phi(K) = \tfrac{1}{2}\log(2\sinh 2K) + \frac{1}{2\pi}\int_0^\pi \operatorname{arcosh}[\cosh 2K\coth 2K - \cos q]\,\mathrm{d}q. \tag{34.2}$$

令 $s = \sinh 2K$，积分的组合 $\cosh^2 2K/\sinh 2K = s + s^{-1}$，在 $s\mapsto s^{-1}$ 下不变；首项之差 $\frac{1}{2}\log(s/s^{-1}) = \log s$，即上一题关系。检查 $K\to\infty$ 时 $\phi\to 2K$ 及 $K\to 0$ 时 $\phi\to\log 2$ 可排除归一化常数错误。 □

习题 34.3 平方格 q 态 clock，$-\beta H = \sum_{\langle ij\rangle} J(s_i - s_j)$。(a) 改用 $2N$ 有向键 $b_{ij} = s_i - s_j \pmod q$，说明每小方格键和 0 的约束及计数；(b) 用 $\delta_q(S) = q^{-1}\sum_{n=0}^{q-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}nS/q}$ 求双格模型，$\lambda(k) = \sum_b \mathrm{e}^{J(b)+2\pi\mathrm{i}kb/q}$；(c)Potts 双耦合、$J_c(q)$；(d) 各向异性 Potts 的自对偶线。

解答. 键来自梯度，所以任意合同闭路的有向和 0。平面单连通图 E 键、N 站，独立面约束 $F = E - N + 1$，剩 $N-1$ 自由键，再加整体 q 次全局平移，恢复 q^N 站配置。环面还需两个非合同回路的零绕数；仅加小面约束会额外计入扭转边界扇区。

逐面引入 Fourier 整数 n_p，每键出现相邻两面的 $n_p - n_{p'}$，键求和就是 λ。对平面固定外面 $n = 0$ 的精确式为 $Z = q^{1-F}\sum_{\{n_p\}}\prod_{\text{edges}}\lambda(n_p - n_{p'})$。体积领先 $F\simeq N$ 给原题的 q^{-N} 类归一化；环面有限尺寸需显式扇区和，不能把这个 bulk 式当任意周期边界的精确单扇区等式。定义双键 $\widetilde{J}(k) = \log\lambda(k)$ 加归一化常数；若 λ 不全正，实正 Boltzmann 模型解释需另外检验。

Potts$w_0=\mathrm{e}^{J},w_{b\neq0}=1$，$\lambda_0=\mathrm{e}^{J}+q-1$、$\lambda_{k\neq0}=\mathrm{e}^{J}-1$，故 $(\mathrm{e}^{J}-1)(\mathrm{e}^{J^*}-1)=q$，铁磁自对偶 $J_c=\log(1+\sqrt{q})$。以铁磁模型唯一相边界的课程前提定位临界，不由对偶独自证明转变连续；$q>4$ 可是一阶。双格 x 边跨原格 y 边，各向异性 $v_x=\mathrm{e}^{J_x}-1,v_y=\mathrm{e}^{J_y}-1$ 的自对偶线 $v_xv_y=q$。 □

习题 34.4 蜂窝、三角格 Ising。(a) 蜂窝一亚格子部分求和的星–三角耦合 $K_t(K_h)$；(b) 三角的双格蜂窝；(c) 结合求两临界耦合。

解答. 中心自旋 s_0 求和 $2\cosh[K_h(s_1+s_2+s_3)]=A\exp[K_t(s_1s_2+s_2s_3+s_3s_1)]$。三叶全同及两同一异给 $A\mathrm{e}^{3K_t}=2\cosh 3K_h$、$A\mathrm{e}^{-K_t}=2\cosh K_h$，于是 $\mathrm{e}^{4K_t}=\cosh 3K_h/\cosh K_h=4\cosh^2K_h-3$。平面双格关系 $\mathrm{e}^{-2K_h^*}=\tanh K_t$。临界将星–三角与对偶映射接合，解得

$$K_t^c=\tfrac14\log 3,\qquad K_h^c=\tfrac12\log(2+\sqrt3). \tag{34.3}$$

这也给前章蜂窝近似 RG 的精确比较基准。有限图边界的解析配分因子不影响临界位置。 □

习题 34.5 蜂窝 q 态 Potts，中心部分和生成三角近邻 K_t 和三自旋 L。(a) 求这些耦合，为何 Ising 无独立 L；(b) 三角模型双格；(c) 要求星–双变换的固定值并验 $L(K_c)=0$，求临界。

解答. 令 $x=\mathrm{e}^{K_h}$，按三叶全同、两同一异、全异的星和为 $A=x^3+q-1$、$B=x^2+x+q-2$、$C=3x+q-3$。对 $q\geq3$ 写权重 $C\exp[K_t(\delta_{12}+\delta_{23}+\delta_{31})+L\delta_{12}\delta_{23}]$，得 $K_t=\log(B/C)$、$L=\log(AC^2/B^3)$。$q=2$ 不可能三叶全异，且 $\delta_{12}\delta_{23}=(\delta_{12}+\delta_{23}+\delta_{31}-1)/2$，三体项可吸收到常数与两体项，没有独立新算符。

普通三角两体 Potts 的双格为蜂窝，$v_tv_h=q$，$v=\mathrm{e}^{K}-1$；若三角已有 L，双格一般不只是单一两体耦合，不能全温宣称自对偶。要求星变换后 $\mathrm{e}^{K_t}-1=q/v_h$ 且 $L=0$，代 A,B,C 化简为

$$v_h^3-3qv_h-q^2=0,\qquad v_t^3+3v_t^2=q,\quad v_tv_h=q. \tag{34.4}$$

取正铁磁根，$K_h^c=\log(1+v_h)$、$K_t^c=\log(1+v_t)$；该根确使 $AC^2=B^3$，所以在相边界处生成三体项消失。$q=2$ 换成 Ising 耦合 $K_{\mathrm{Potts}}=2K_{\mathrm{Ising}}$ 回收前题。并非所有温度都无三体项。 □

习题 34.6 独立键以 p 占据，双键占据 $1-p$。(a)N 串联键和其 N 并联双键的渗流/非渗流概率；(b) 平方格键渗流阈值；(c) 三维键对偶为小面渗流，能否通流同时保持固体完整?

解答. 串链通流需每键占据，概率 p^N；双并联不通需每双键空，概率也 p^N，双通 $1-p^N$。二维平方格自对偶且通流相边界唯一，对偶映射 $p\leftrightarrow1-p$ 定位 $p_c=1/2$（证明唯一和 sharpness 是额外渗流定理，不能仅一句“自对偶”完成其全证明）。

三维堵塞路径的对偶对象是面形成的阻断曲面，而不是另一条平面相交链。孔通道与固体承重通道可绕行并存，因此几何上能通流而材料仍连通；机械刚性还要求约束与弹性，不等于键连通。二维同一截面上路径与双路径互斥的简单图像不能搬到三维。高维阈值也不能直接猜为 1/2。 □

35　8.334 作业 6：超出自旋波、长程畴壁与熔化

题源：*Mehran Kardar*，*8.334 Spring 2014*，*PS6*，截止 *2014* 年 *5* 月 *7* 日。原选做题 *3* 保留。。以下解答为编者独立补写。

习题 35.1　单位 n 分量场 s，$\beta H=\int \mathrm{d}^dx\,\mathrm{d}^dy\,K(|x-y|)s(x)\cdot s(y)$，核 Fourier 为 $Kq^\omega/2$、$0<\omega<2$。(a) 长距尾幂；(b)$s=(\pi,\sigma)$、$\sigma=\sqrt{1-\pi^2}$ 后有效作用；(c) 二次 Fourier 与协方差；(d) 消窄壳后 $\langle\sigma\rangle$ 及单位长度恢复 ζ；(e) 利用非解析核不被局部微扰修正求 K'；(f)$T=1/K$ 流；(g)$d=\omega+\epsilon$ 的 T_c,ν；(h) 小场 $-h\cdot\int s$ 的流和 y_h。

解答. 尺度 q^ω 对应实空间 $r^{-d-\omega}$ 尾；正 q^ω 核的非接触部分有铁磁所需负号，并有对角常数让均匀态能 0。不要把 Fourier 正系数误读为正的反铁磁实空间尾。

在北极坐标 $\sigma=\sqrt{1-\pi^2}$，球面测度为 $\prod_x \mathrm{d}^{n-1}\pi/\sqrt{1-\pi^2}$。可写精确有效能为原核代入加 $\frac12\sum_x\log(1-\pi_x^2)$。展开二次动能 $H_0=K\int_q q^\omega\pi(q)\cdot\pi(-q)/2$，非局域四次项 $K\int_q q^\omega|(\pi^2)(q)|^2/8$，另有测度顶点；这些顶点与对称约束一起保证不能任意产生 Goldstone 质量。二次协方差 $\langle\pi_i(q)\pi_j(q')\rangle_0=\delta_{ij}(2\pi)^d\delta(q+q')/(Kq^\omega)$。

定义 $I_\omega=\int_{\Lambda/b<q<\Lambda}\mathrm{d}^dq/(2\pi)^dq^{-\omega}$，壳平均 $\langle\sigma\rangle_>=1-(n-1)TI_\omega/2+\cdots=\zeta$。慢场 $s'=s_</\zeta$，距离縮放给 $K'=b^{d-\omega}\zeta^2K$，非解析动能系数无额外局部顶点修正（按题给假设）。窄壳 $I_\omega=A_d\Lambda^{d-\omega}\,\mathrm{d}\ell$，

$$\dot T=-(d-\omega)T+(n-1)A_d\Lambda^{d-\omega}T^2+\cdots. \tag{35.1}$$

$n>1$、$\epsilon=d-\omega>0$ 小时 $T_c=\epsilon/[(n-1)A_d\Lambda^\epsilon]+O(\epsilon^2)$，临界不稳定斜率 ϵ，$\nu=1/\epsilon+O(1)$。小场 $h'=b^d\zeta h$，在固定点 $y_h=d-\epsilon/2=(d+\omega)/2+O(\epsilon^2)$，对应 $\eta=2-\omega$。短程模型有额外动能修正导致 $n-2$，这里是 $n-1$；不可把两公式混抄。$n=1$ 没有连续横向自旋波，不能除以 $n-1$。 □

习题 35.2　XY 在 $d=2+\epsilon$ 的题给流 $\dot T=-\epsilon T+4\pi^3y^2$、$\dot y=(2-\pi/T)y$。(a) 有限温固定点；(b) 最低非零阶本征值；(c) 保持最低非平凡 ϵ 阶估 $d=3$ 超流 ν,α。

解答. 非零 y 令 $T_*=\pi/2$、$y_*^2=\epsilon/(8\pi^2)$。Jacobian 为 $\begin{pmatrix}-\epsilon & 8\pi^3y_*\\ 4y_*/\pi & 0\end{pmatrix}$，本征值 $[-\epsilon\pm\sqrt{\epsilon^2+16\epsilon}]/2=\pm2\sqrt{\epsilon}+O(\epsilon)$。所以领先 $\nu=1/(2\sqrt{\epsilon})$；用 $\alpha=2-d\nu$ 外推 $\epsilon=1,d=3$ 给 $\nu\simeq0.5,\alpha\simeq0.5$。

这是近二维截断流的粗外推，$\epsilon=1$ 没有小参数控制，不能与精确三维值等同；也不能先保留某个高阶本征值再丢其他同阶流修正，给出貌似更精确的数字。$\epsilon\to0$ 的幂次展开不还原二维 BKT 有限 ν，二维本来是本质奇点。 □

习题 35.3　XY 加 $-\beta H_p=h_p\int\mathrm{d}^2x\cos(p\theta)$，$p=1$ 磁场，$p=2,3,4,6$ 可来自离散晶格对称。(a) 无涡旋 sine–Gordon 流；(b) 含涡旋时证明 $\dot h_p=[2-p^2/(4\pi K)]h_p$、$\dot K^{-1}=-\pi p^2h_p^2K^{-2}/2+4\pi^3y^2$、$\dot y=(2-\pi K)y$；(c) 解释 $8\pi/p^2<K^{-1}<\pi/2$ 区间、$p>4,p<4$ 相图与 $p=4$ 边缘情况。

解答. Gaussian 壳角方差 $\langle\theta_>^2\rangle=\mathrm{d}\ell/(2\pi K)$，顶点平均 $\langle\cos[p(\theta_<+\theta_>)]\rangle=\mathrm{e}^{-p^2\,\mathrm{d}\ell/(4\pi K)}\cos p\theta_<$，体积因子 2 给 $\dot h_p=[2-p^2/(4\pi K)]h_p$。刚度要到二阶才变，不能仅引述锁定趋势。先将字面余弦系数记为 h_c，即 $S_{\mathrm{int}}=$

$-h_c\int \mathrm{d}^2x\cos(p\theta)/a^2$。连接累积量 $-\langle S_{\mathrm{int}}^2\rangle_c/2$ 仅保留一正一负顶点的中性项，令两点为 $R\pm s/2$，其短距贡献是

$$\delta S^{(2)}=-\frac{h_c^2}{4a^4}\int \mathrm{d}^2R\,\mathrm{d}^2s\left(\frac{a}{|s|}\right)^{p^2/(2\pi K)}\cos[p\,s\cdot\nabla\theta_<(R)]+\text{常数及高梯度}. \tag{35.2}$$


展至 s^2，角积分 $\int_0^{2\pi}(s\cdot\nabla\theta)^2\,\mathrm{d}\varphi=\pi s^2(\nabla\theta)^2$，圆壳 $\int_a^{ae^{\,\mathrm{d}\ell}}s^3\,\mathrm{d}s=a^4\,\mathrm{d}\ell+O((\mathrm{d}\ell)^2)$，故 $\delta S_{\mathrm{grad}}=(\pi p^2h_c^2/8)\,\mathrm{d}\ell\int(\nabla\theta_<)^2$，即此字面圆壳规范下 $\dot K=\pi p^2h_c^2/4$。要将圆壳结果写成原题 (b) 给出的二阶系数，可定义该题振幅 $h_p^{\mathrm{src}}=h_c/\sqrt{2}$，于是同一个结果写成 $\dot K=\pi p^2h_p^2/2$。原题 (a) 把同一符号 h_p 直接写在作用中，没有显写上述二阶归一；线性尺度维不受影响，但若不注明规范便不能同时把两个二阶系数说成相同。涡旋偶极用第15章的标准逸度 y 给 $\dot K^{-1}=4\pi^3y^2$，所以采用原题 (b) 的 $h_p=h_p^{\mathrm{src}}$ 后，合式为

$$\dot K^{-1}=-\frac{\pi p^2h_p^2}{2K^2}+4\pi^3y^2. \tag{35.3}$$

第一项负号是 $\dot K>0$ 的倒数导数，第二项正号是涡旋屏蔽。

两种扰动都无关需 $2-p^2/(4\pi K)<0$ 且 $2-\pi K<0$，所以 $8\pi/p^2<K^{-1}<\pi/2$，只有 $p>4$ 非空。这是 Gaussian **稳定区**，不是微扰方程只能在该区推导：区外小初始耦合仍能用流判定其相关，长到 $O(1)$ 后才失控。原题 “only valid” 须以此条件解释。

$p>4$ 典型升温为离散锁定序、代数关联、涡旋无序两次转变；$p=2,3$ 无稳定中间 Gaussian 相，一般一次离散序转变；$p=1$ 外场去掉所有对称破缺，不保证有真转变。$p=4$ 二扰动可边缘竞争，关联到 Ashkin–Teller 类连续变指数，截断线性流不足以全定相图。




□

习题 35.4 一维标量 ±1 自旋有逆平方铁磁相互作用，物理能 $\beta H=-K\int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,s(x)s(y)/(2|x-y|^2)+\int\Phi(s)\,\mathrm{d}x$，$\Phi$ 强制 ±1，例如 $g(s^2-1)^2, g\gg1$。原卷把 Φ 加在 $-\beta H$ 中会反向失稳，本题取其所述 “偏好 ±1” 的稳定能量符号。(a) 尺度 a 畴壁能；(b) 单壁概率给 K_c 下界；(c) 交替电荷畴壁对数气；(d) 由 $K_{\mathrm{eff}}=K-2Ky_0^2\int_a^\infty(r\,\mathrm{d}r/a^2)(a/r)^{4K}+O(y_0^4)$ 得壳流；(e) 画流及相；(f) 推导此屏蔽式。原卷积分未显写 a^{-2}，等价于所有长度按 a 计的约定。

解答. 单壁两侧相反的能代价 $2K\int_0^L\mathrm{d}u\int_0^L\mathrm{d}v/(u+v)^2\simeq 2K\log(L/a)$；位置熵 $\log(L/a)$，单壁概率尺度 $(L/a)^{1-2K}$，所以 $K<1/2$ 壁大量出现，不可能保持该铁磁有序，$K_c\ge1/2$。

利用 $1/(x-y)^2=\partial_x\partial_y\log|x-y|$ 并分部积分，$s'(x)=2\sum_i q_i\delta(x-x_i)$，得到 $-\beta H_Q=4K\sum_{i<j}q_iq_j\log(|x_i-x_j|/a)+\log y_0\sum_i|q_i|$；电荷必须正负交替，局域壁核贡献逸度。

缩放 $a\to ba$，中性 $\sum_{i<j}q_iq_j=-N_w/2$ 给每壁 b^{-2K}，位置积分 b 给 $\dot y_0=(1-2K)y_0$。积分掉 $a<r<ba$ 小壁对给 $\dot K=-2Ky_0^2$。置 $T=1/K$，$\dot T=2Ty_0^2$；$T<2$ 且小 y 时流向 $y=0$ 有序固定线，$T>2$ 时壁相关流向高温无序，分界靠近 $(T,y)=(2,0)$，具有类 BKT 本质尺度，强耦合处截断流不可靠。



(f) 固定外壁 $+,-$ 于 $0,L$，区间内允许小对方向 $-,+$ 于 $x,x+r$，相对权重 $(y_0^2/a^2)(a/r)^{4K}$。与外壁交互的指数增量为 $4K\log[(x+r)/x]+4K\log[(L-x)/(L-x-r)]\simeq 4Kr[1/x+1/(L-x)]$。对 x 从核截断 a 积分到 $L-a$ 给 $8Kr\log(L/a)$；因此 $\Delta\log W=8Ky_0^2\log(L/a)\int(r\,\mathrm{d}r/a^2)(a/r)^{4K}$，与原 $\log W=-4K\log(L/a)$ 比较正得题式。体积常数和端点核项吸收于自由能与逸度；交替约束允许一阶 r 贡献，是它比二维任意方向偶极屏蔽更简单的原因。 □

习题 35.5 各向同性弹性 $\beta H=\frac{1}{2}\int[2\mu u_{ij}u_{ij}+\lambda u_{ii}u_{jj}]\,\mathrm{d}^dx$，$u_{ij}=(\partial_iu_j+\partial_ju_i)/2$。（原题将正稳定弹性能写在 $-\beta H$ 之后，改正此符号。）(a)Fourier 模；(b) 协方差；(c) 晶格截断 a 下 $U^2(x)=\langle|u(x)-u(0)|^2\rangle$；(d)$\mu=\widehat{\mu}/(k_{\mathrm{B}}T),\lambda=\widehat{\lambda}/(k_{\mathrm{B}}T)$，由远距 $U=c_La$ 的 Lindemann 准则求 T_m 及维数依赖。

解答. 纵横投影 $P^L_{ij}=q_iq_j/q^2$、$P^T=I-P^L$，弹性核 $q^2[\mu P^T+(\lambda+2\mu)P^L]$。静态本征值横 μq^2（$d-1$ 支）、纵 $(\lambda+2\mu)q^2$；若加质量密度动能，声速 $\sqrt{\widehat{\mu}/\rho},\sqrt{(\widehat{\lambda}+2\widehat{\mu})/\rho}$。稳定需 $\mu>0$、体积模量 $\lambda+2\mu/d>0$。

协方差为 $(2\pi)^d\delta(q+q')q^{-2}[P^T/\mu+P^L/(\lambda+2\mu)]$。故

$$U^2(x)=2\int_q\frac{1-\cos(qx)}{q^2}\left[\frac{d-1}{\mu}+\frac{1}{\lambda+2\mu}\right]. \tag{35.4}$$

$d>2$ 远距为 $2A_d\Lambda^{d-2}k_{\mathrm{B}}T[(d-1)/\widehat{\mu}+1/(\widehat{\lambda}+2\widehat{\mu})]/(d-2)$，$\Lambda\sim a^{-1}$。所以

$$T_m=\frac{c_L^2a^2(d-2)}{2k_{\mathrm{B}}A_d\Lambda^{d-2}[(d-1)/\widehat{\mu}+1/(\widehat{\lambda}+2\widehat{\mu})]}. \tag{35.5}$$

这是截断与经验 c_L 决定的估计，不是精确转变温。$d=2$ 有 $\log r$、$d<2$ 有 r^{2-d} 发散，此**绝对远距位移**准则会给所有正温 $T_m=0$。实际二维可有代数晶序和有限温缺陷熔化，需第16章的相对序与位错方法；不能以此准则错误宣称所有二维材料无固相。 □


36 8.334 复习包 1：Landau 理论与 Gaussian 涨落

题源：*Mehran Kardar, 8.334 Spring 2014, Test1 Review* 及公开 *Solutions*, *11* 题。题 *4* 引用既有热统卷，其他全部明确小问在本章。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

习题 36.1 简单立方二元合金 N_A, N_B，六近邻，同种键 $-J$、异种 $+J$，$J>0$。(a) 零温基态；(b) 独立随机占位 $p_A=N_A/N, p_B=N_B/N$ 的平均能；(c) 混合熵；(d)$x=(N_A-N_B)/N$ 自由能四阶与失凸 T_c；(e)$T\gtrless T_c$ 的势及 spinodalx_{sp}；(f) 全局分离组成 $\pm x_{eq}$；(g)T,x 相边界与亚稳边界。

解答. 固定两种总数时基态宏观分区，同种内部所有键有利，界面能为次广延修正。随机每键平均 $-J(p_A-p_B)^2=-Jx^2$、3N 键，$E=-3NJx^2$；$S=-Nk_{\mathrm B}[p_A\log p_A+p_B\log p_B]$，不是不同原子都能无关联移动的动力学证明。

$F/N=-k_{\mathrm B}T\log 2+(k_{\mathrm B}T/2-3J)x^2+k_{\mathrm B}Tx^4/12+O(x^6)$，$k_{\mathrm B}T_c=6J$。近临界四阶模型 $f''=k_{\mathrm B}(T-T_c)+k_{\mathrm B}Tx^2$，spinodal$x_{sp}^2=(T_c-T)/T$；对称共存极小 $x_{eq}^2=3(T_c-T)/T$。上方单井、临界四次井、下方双井；$|x|<x_{sp}$ 局部不稳，$x_{sp}<|x|<x_{eq}$ 亚稳，总组成 $|x|<x_{eq}$ 由两相杠杆规则实现。下图画近临界两线；低温应回到完整二项熵，四阶式不能使 $|x|>1$ 仍合法。



□

习题 36.2 Ising$H=\frac12\sum_{ij}J_{ij}\sigma_i\sigma_j-h\sum\sigma_i$，等效近邻模型 $J_{ij}=-J/N$。(a)$E(M,h)$；(b) 以 $M=Nm$ 分组 Z、$F(m,h)$ 四阶；(c) 鞍点适用条件、真假自由能凸性；(d)$h=0$ 磁化与 T_c；(e) 零场 C,χ 奇异。

解答. $E=-N(Jm^2/2+hm)$，每 M 简并 $\binom{N}{N(1+m)/2}$，$Z=\sum_M\exp[-\beta F(m,h)]$、$F=E-k_{\mathrm B}T\log\Omega$。Stirling 给 $f=F/N=-k_{\mathrm B}T\log 2+(k_{\mathrm B}T-J)m^2/2+k_{\mathrm B}Tm^4/12-hm$。大 N 指数 N 使 $F_{thermo}/N=\min_m f+o(1)$，需极小附近展开且保持有限尺寸临界涨落的适当顺序。

原题说真实 $F(h,T)$ “凸”，在外场 h 上实际**凹**：$F_{hh}=-\beta\operatorname{Var}M\le 0$；固定磁化的 Legendre 势才须凸并作双井凸包。$\min_m f$ 在 $h=0, T<T_c$ 有尖点，不能把有限 N 解析配分直接叫非解析。

$k_{\mathrm B}T_c=J$，$m=0$ 或 $m^2=3(J-k_{\mathrm B}T)/(k_{\mathrm B}T)$（近临界）。奇异 $f_{min}\simeq-3k_{\mathrm B}(T_c-T)^2/(4T_c)$，$C$ 每站从上方 0 到下方 $3k_{\mathrm B}/2$ 跳变，忽略平滑背景。$\chi_m^+=1/[k_{\mathrm B}(T-T_c)]$、$\chi_m^-=1/[2k_{\mathrm B}(T_c-T)]$，$\gamma=1$、幅比 2；总 M 响应再乘 N。 □

习题 36.3 经典气 $H=\sum p_i^2/(2m)+\frac{1}{2}\sum V(r_i-r_j)$。(a) 积分动量后的巨配分；(b) 划分 $N_L=V/a^3$ 小格、每格 $n_\alpha=0,1$，积分用 a^3 和替代；(c)$n_\alpha=(1+\sigma_\alpha)/2, V_{\alpha\beta}=-J/N_L$ 映到上一题，推气体相变。

解答. 连续气体的巨正则配分函数为

$$\Xi=\sum_{N\geq 0}\frac{(\mathrm{e}^{\beta\mu}/\lambda^3)^N}{N!}\int\prod_i \mathrm{d}^3 r_i\exp\left[-\beta\sum_{i<j}V(r_{ij})\right]. \tag{36.1}$$

每格单占据使选位置的 $N!$ 排列取消。记 $\tilde{z}=\mathrm{e}^{\beta\mu}a^3/\lambda^3$，则

$$\Xi\simeq\sum_{\{n_\alpha\}}\tilde{z}^{\sum n_\alpha}\exp\left[-\frac{\beta}{2}\sum_{\alpha\beta}V_{\alpha\beta}n_\alpha n_\beta\right]. \tag{36.2}$$

用 $M=\sum\sigma, \sum n=(N_L+M)/2$，指数中 M^2 系数 $\beta J/(8N_L)$、M 系数 $\beta J/4+\log\tilde{z}/2$。所以等效 Ising $J_I=J/4$、$h_I=J/4+k_\mathrm{B}T\log\tilde{z}/2$。临界 $k_\mathrm{B}T_c=J/4$、平均密度 $n_c=1/(2a^3)$；$h_I=0$ 共存化学势 $\mu=-J/2-k_\mathrm{B}T\log(a^3/\lambda^3)$，低温两密度相。单占格与等效邻近耦合是近似，不表示所有连续势气体都精确同一临界温。 □


36.1 原题 4：表面活性剂凝聚

原题 4(a)–(f) 的完整条件、排除面积、吸引积分 $\int_a^\infty 2\pi rV=-u_0$、张力、临界条件、两种热容，均与 8.333 PS5 题 1 相同，引用既有热统卷习题 33.1；见上一编逐题接口，不复制第三次。

习题 36.4 标量 LG $\beta H=\int[K(\nabla m)^2/2+tm^2/2+cm^3+um^4]\,\mathrm{d}^dx$，$K,c,u>0$。(a) 势图显示正 t 的一阶跳变；(b) 解共存 m,t；(c)$K\xi^{-2}=f''(m_{eq})$，画相关长随 t。

解答. $c>0$ 偏好负 m。$m=0$ 与负极小共存需 $f(m_*)=f(0)$、$f'(m_*)=0$，相除消 m 得到 $m_*=-c/(2u)$、$t_*=c^2/(2u)>0$。比它高采用 0 极小，比它低采用 $m=[-3c-\sqrt{9c^2-16ut}]/(8u)$；另一根为不稳定或亚稳支，不能只用 $f'=0$ 定相。

无序 $\xi=\sqrt{K/t}$，有序 $\xi=\sqrt{K/[t+6cm+12um^2]}$。在共存两侧曲率均 $c^2/(2u)$，所以 ξ 有限，最大 $\sqrt{2Ku}/c$，导数转折但本例 ξ 值无跳变。若 0 支继续到 $t=0$，那是亚稳 spinodal 发散，不是真相边界的临界发散。势和相关长的精确两支公式已给出，图用 $c=u=K=1$。



□

习题 36.5 $\beta H=\int[K(\nabla m)^2/2+tm^2/2+um^4+vm^6-hm]\,\mathrm{d}^dx$，$v>0$。(a) 负 u 一阶；(b) 共存 t 与跳变；(c)u,t 相图；(d)$u=t=0$ 三临界 $\beta,\delta,\gamma,\alpha$。

解答. $u<0$ 且 $h=0$，以 $x=m^2$ 重复 $f=tx/2+ux^2+vx^3$ 的等值、驻值，$x_*=-u/(2v)$、$t_*=u^2/(2v)$。$u>0$ 在 $t=0$ 连续，两边界在原点相切；有序在其下，无序在其上，三临界需额外参数把 u 调到 0。

$u=0$ 时 $tm+6vm^5=h$，$h=0,t<0$ 的 $m^4=-t/(6v)$ 给 $\beta=1/4$，$t=0$ 给 $\delta=5$，$\chi^{-1}=t+30vm^4$ 给 $\gamma=1$。有序 $f_{min}=-|t|^{3/2}/(3\sqrt{6v})$，$C=-f''\propto|t|^{-1/2}$，$\alpha=1/2$。这些都是鞍点指数，涨落是否小由本章末题判据而非四次固定点决定。 □

习题 36.6 旋转不变 n 分量 m 加 $-h\cdot\int m$，$f(h)=-\log Z/V$ 仅依赖 $h=|h|$。(a)m_α；(b) 响应张量；(c) 纵横响应；(d) 自发磁化时 $h\to0$ 的横发散及纵是否必发散。

解答. $\partial_{h_\alpha}f=f'(h)h_\alpha/h$，$m_\alpha=-f'h_\alpha/h$。再求导，

$$\chi_{\alpha\beta}=-f''\hat h_\alpha\hat h_\beta-\frac{f'}{h}(\delta_{\alpha\beta}-\hat h_\alpha\hat h_\beta),\quad \chi_\ell=-f'',\quad \chi_t=m/h. \tag{36.3}$$

自发 $m_0>0$ 使横 $\chi_t\sim m_0/h$ 发散，反映无场整体转动的零代价；不能从旋转对称推出纵同样发散。均场纵有限，下一复习包将展示 $d<4$ 的 Goldstone 两模涨落如何额外导致纵奇异。 □

习题 36.7 d 维立方格 XY$-\beta H=K\sum_{\langle ij\rangle}s_i\cdot s_j$，$s=(\cos\theta,\sin\theta)$。(a) 角积分配分；(b) 低温二次式；(c) 周期 1DL 站正规模与实/复约束；(d)d 维；(e) 经典自由能、热容；(f)$\langle s_0\cdot s_x\rangle$ 远距；(g) 横响应随 L；(h) 二维 Gaussian 模型的响应发散阈值。

解答. $Z=\int\prod_i\mathrm{d}\theta_i\exp[K\sum\cos(\theta_i-\theta_j)]$。低温 $H_2=\frac{K}{2}\sum(\theta_i-\theta_j)^2+\text{const}$。取 $\theta_x=L^{-d/2}\sum_q\theta_q\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}$，$q_\alpha=2\pi n_\alpha/L$、$\theta_{-q}=\theta_q^*$，$H_2=\frac12\sum_q D(q)|\theta_q|^2$，$D(q)=2K\sum_\alpha(1-\cos q_\alpha)$。每 $q,-q$ 对为两个实模而非两个复自由模；$q=0$ 为整体角，固定或只积有限 2π。

每独立非零实模贡献 $-\log Z=\frac12\log[D/(2\pi)]$，物理每模能 $k_\mathrm{B}T/2$，故 $C\simeq(N-1)k_\mathrm{B}/2$；不在无质量经典模上添加量子零点能。Gaussian 指数给 $G(x)=\exp[-\frac12\langle(\theta_x-\theta_0)^2\rangle]$，方差 $2\int_q(1-\cos qx)/(Kq^2)$。$d=1$ 有 $G\sim\mathrm{e}^{-|x|/(2K)}$，$d=2$ 有 $G\sim(a/r)^\eta,\eta=1/(2\pi K)$，$d>2$ 趋非零常数。

二维无长程序时 $\chi_t\propto\int_a^L r\,\mathrm{d}r,r^{-\eta}$：$\eta<2$ 为 $L^{2-\eta}$，等号 $\log L$，$\eta>2$ 有限；形式阈值 $K=1/(4\pi)$。它是只保自旋波的模型阈值，不是含涡旋真实 XY 的 BKT 刚度 $2/\pi$。$d=1$ 响应在大 L 饱和 $\sim\xi$；对于未选定方向的有限盒零场对称系综，$d>2$ 的 $G\to m_0^2$ 给 $\chi\sim m_0^2L^d$；若选定纯相并减去 m_0^2，须区分整体旋转和局部 Goldstone 连接响应，后者无场横模积分 $G_t(q)\sim1/q^2$ 给均匀场响应发散，不能用减去 m_0^2 后仍称全 L^d 连接磁化涨落。 □

习题 36.8 d 维空间的平界面由 $D=d-1$ 个坐标 x 上的高度 $h(x)$，面积 $A=\int\sqrt{1+(\nabla h)^2}\,\mathrm{d}^Dx$、$H=\sigma A$。(a) 二次作用和泛函配分；(b)Fourier 模；(c) 破缺对称；(d) 高度差方差；(e)$d=4,3,2,1$；(f) 小坡度近似条件。

解答. $H=\sigma A_0+\frac{\sigma}{2}\int(\nabla h)^2+O((\nabla h)^4)$，$Z\propto\int Dh\exp[-\beta\sigma\int_q q^2|h_q|^2/2]$，固定平均高度移去 $q=0$。破缺为沿界面法线的连续平移；位置改变没有体势代价，产生毛细 Goldstone 模。$\langle|h_q|^2\rangle=k_{\mathrm{B}}T/(\sigma q^2)$，

$$\langle[h(x)-h(0)]^2\rangle=\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{\sigma}\int_{q<\Lambda}\frac{1-\cos qx}{q^2}\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}. \tag{36.4}$$

$d=4,D=3$ 远距趋截断依赖常数；$d=3,D=2$ 为 $k_{\mathrm{B}}T\log(r/a)/(\pi\sigma)$；$d=2,D=1$ 为 $k_{\mathrm{B}}T|r|/\sigma$；$d=1$ 界面是零维点，没有可比较的远距 x 或延展毛细波谱，其整体位置模需另固定，不能硬套 D 维长距公式。

局部坡度方差 $\langle(\nabla h)^2\rangle\simeq(k_{\mathrm{B}}T/\sigma)A_D\Lambda^D/D\ll1$，$\Lambda\sim1/a$。高度的对数粗糙不等于局部坡度失控：二维界面可局部光滑而长程高度不平，展开条件是坡度和 UV 尺度。 □

习题 36.9 三维超导 LG$\beta H=\int[t|\Psi|^2/2+u|\Psi|^4+K|D_\mu\Psi|^2/2+L(\nabla\times A)^2/2]\,\mathrm{d}^3x$，$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}eA_\mu$。(a) 局域规范变换；(b) 均匀鞍点；(c)$t<0$ 以 $\Psi=(R+\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},A=a,\nabla\cdot a=0$ 二阶能；(d)ϕ,θ,a 的 Fourier 协方差。

解答. $\Psi\to\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}\Psi,A\to A+\nabla\chi/e$ 时 $D\Psi\to\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}D\Psi$，旋度不变。$R=0$（$t>0$）或 $R^2=-t/(4u)$（$t<0$）、$A=0$。二次

$$H_2=\frac{1}{2}\int[(K(\nabla\phi)^2-2t\phi^2)+KR^2(\nabla\theta-ea)^2+L(\nabla\times a)^2]\,\mathrm{d}^3x. \tag{36.5}$$

Coulomb 横向 a 与梯度 θ 的交叉积积分 0，所以 $\langle\phi_q\phi_{-q}\rangle=(Kq^2-2t)^{-1}$，$\langle\theta_q\theta_{-q}\rangle=(KR^2q^2)^{-1}$，$\langle a_i(q)a_j(-q)\rangle=P^T_{ij}/(Lq^2+Ke^2R^2)$，$\langle|a|^2\rangle=2/(Lq^2+Ke^2R^2)$。共同 $(2\pi)^3\delta$ 或有限体积因子按 Fourier 约定补上。横光子获得质量 Ke^2R^2/L；规范固定的相位坐标不是额外规范不变物理 Goldstone 粒子，真正可观测量用 $\nabla\theta-eA$。 □

习题 36.10 n 分量 $\beta H=\int[K(\nabla m)^2/2+tm^2/2+u(m^2)^2+v(m^2)^3]\,\mathrm{d}^dx$，三临界 $u=0,v>0$。(a) 鞍点热容；(b) 纵横 Hessian；(c) 关联；(d)Gaussian 自由能；(e) 热容修正；(f)Ginzburg 与上临界维；(g) 一般 $u_{2p}(m^2)^p$ 多临界点。

解答. 负侧 $m_0^4=-t/(6v)$，$f_{sp}=-|t|^{3/2}/(3\sqrt{6v})$，$C_{sp}/V=-f''_{sp}=|t|^{-1/2}/(4\sqrt{6v})$。质量 $r_\ell=t+30vm_0^4=-4t$、$r_t=t+6vm_0^4=0$；正侧均为 t。两点 $G_\ell(q)=1/(Kq^2+r_\ell)$、$G_t=1/(Kq^2+r_t)$。

$\delta f=\frac{1}{2}\int_q[\log(Kq^2+r_\ell)+(n-1)\log(Kq^2+r_t)]$，每个独立实模一个半迹。负侧 $r'_\ell=-4$、横质量恒 0，$\delta C/V=8\int_q(Kq^2-4t)^{-2}\sim|t|^{(d-4)/2}$。相对鞍点 $\delta C/C_{sp}\sim\sqrt{v},|t|^{(d-3)/2}$，所以 $d<3$ 失控，$d=3$ 边缘对数，三临界 $d_u=3$。

一般 Gaussian 场维 $(d-2)/2$ 使 u_{2p} 的尺度维 $d-p(d-2)=2p-(p-1)d$，$d_u=2p/(p-1)$。应调低阶偶次耦合至相应多临界流形，不能保留一个相关四次项却仍称由六次项控制的三临界点。 □

37 8.334 复习包 2：标度、Goldstone 奇异与各向异性 RG

题源：*Mehran Kardar, 8.334 Spring 2014, Test2 Review* 及公开 *Solutions*, 9 题。保留题设截断流与现实模型、单一场缩放与复合算符的区别。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

习题 37.1 流体奇异 Helmholtz 每粒子 $f_s = t^{2-\alpha} g(\delta\rho/t^{\beta})$, $t = |T-T_c|/T_c$、$\delta\rho = \rho - \rho_c$。沿临界等容线 $Q \sim t^{x}$、临界等温线 $Q \sim |\delta\rho|^{y}$，求 (a) 能与熵；(b)C_V, C_P；(c)κ_T, α_P，验证 $C_P - C_V = TV\alpha_P^2/\kappa_T$；(d) 共存潜热。先按题给**只保奇异自由能**的模型，说明缩放函数导数不消失的假设。

解答. 对 t 每微分降低一次幂，对密度每微分降低 β 次幂；一个齐次量沿 $t=0$ 指数为 x/β。$S_s = -f_{s,T}$、$U_s = f_s + TS_s$ 领先 $t^{1-\alpha}$；$P_s = \rho^2 f_{s,\rho} \sim t^{2-\alpha-\beta}$，$P_{s,T} \sim t^{1-\alpha-\beta}$、$P_{s,\rho} \sim t^{2-\alpha-2\beta}$。于是纯奇异模型给

量	x	y
$U_s/N, S_s/N$	$1-\alpha$	$(1-\alpha)/\beta$
C_V, C_P	$-\alpha$	$-\alpha/\beta$
κ_T	$\alpha+2\beta-2$	$(\alpha+2\beta-2)/\beta$
α_P	$\beta-1$	$(\beta-1)/\beta$

$\alpha_P = P_T/(\rho P_\rho)$, $C_P - C_V$ 指数 $2(\beta-1) - (\alpha+2\beta-2) = -\alpha$，吻合。共存 $\delta\rho_{\pm} \sim t^{\beta}$ 使 $L_s = T(S_{s,+} - S_{s,-}) \sim t^{1-\alpha}$，前提两侧缩放函数差不为 0；完全对称 g 可使该领先差消失。

不能把这个表不加条件用到任意实际流体：若完整状态方程有通常非零解析 P_T 背景，$\kappa_T \sim t^{-\gamma}$、$\gamma = 2-\alpha-2\beta$ 仍成立，而 $\alpha_P \sim \kappa_T$、$C_P - C_V \sim \kappa_T$，不再是表中的纯奇异幂。类似 CC 若共存线斜率有限非零、体积差 t^{β}，完整潜热可领先 t^{β}。官方表解是在忽略这些解析背景且相关函数系数非零的题设模型内，缺省前提必须保留。 □

习题 37.2 题给 $d = 1+\epsilon$ Ising 流 $\dot{T} = -\epsilon T + T^2/2$、$\dot{h} = dh$。(a) 流与固定点；(b)$y_t, y_h$；(c) 由 ξ 变换得 ν, Δ；(d) 奇异自由能、α；(e)β, γ；(f) 由关联积分得 η；(g)$d=1$ 沿 $h=0, T\to 0$ 相关长。

解答. $h=0$ 轴有 $T=0$、$T_c = 2\epsilon$；$0<T<T_c$ 向 0，$T>T_c$ 向高温，h 以 $\mathrm{e}^{d\ell}$ 离开轴。临界 $y_t = \partial_T \dot{T}|_{T_c} = \epsilon$、$y_h = d$。$\xi(t,h) = b\xi(b^{y_t}t, b^{y_h}h)$ 选 $b = |t|^{-1/y_t}$，得 $\nu = 1/\epsilon$、$\Delta = d/\epsilon$。

体积标度 $f_s = b^{-d} f_s(b^{y_t}t, b^{y_h}h) = |t|^{d/\epsilon}\Phi(h/|t|^{d/\epsilon})$，所以 $\alpha = 2 - d/\epsilon$、$\beta = (d-y_h)/y_t = 0$、$\gamma = (2y_h - d)/y_t = d/\epsilon$。$\chi \sim \int^{\xi} r^{d-1} r^{-d+2-\eta}\,\mathrm{d}r \sim \xi^{2-\eta}$，给 $\eta = 2-d = 1-\epsilon$。

$\beta = 0$ 是**题给截断流**忽略磁场异常重标度的结果，不能冒称所有真实 $d>1$ Ising 的精确磁化指数。$\epsilon = 0$ 积分 $1/T(\ell) = 1/T_0 - \ell/2$，到 $O(1)$ 尺度 $\xi \sim a\exp(2/T_0)$；一维严格转移矩阵 $\xi = -1/\log\tanh(1/T)$ 回收此指数式。 □

习题 37.3 n 分量有序 LG$H = \int [K(\nabla m)^2/2 + tm^2/2 + u(m^2)^2]$、$t<0$。(a) 置 $m = (m_0 + \phi_\ell)e_\ell + \pi$ 展开全部项；(b) 将 $U = 4um_0 \int \phi_\ell \pi^2$Fourier 化；(c) 裸纵横协方差；(d) 横四点 Wick（$n-1$ 分量）；(e),(f) 二阶纵关联连接展开；(g) 略去横断连项给 $\chi_\ell(q)$；(h) 小 q 奇异。说明有序相存在与 n 的条件。

解答. $m_0^2=-t/(4u)$。除常数，二次 $H_0=\frac12\int[K((\nabla\phi_\ell)^2+(\nabla\pi)^2)-2t\phi_\ell^2]$，三次 $4um_0\phi_\ell(\phi_\ell^2+\pi^2)$，四次 $u(\phi_\ell^2+\pi^2)^2$。题取最低纵横耦合 $U=4um_0\sum_a\int_{qk}\phi_\ell(q)\pi_a(k)\pi_a(-q-k)$，其他顶点并非永不存在，只为该 IR 奇异分离忽略。

$G_\ell^0=(Kq^2-2t)^{-1}$、$G_t^0=(Kq^2)^{-1}$。对两复合 π^2 的 Wick，断连自收缩系数 $(n-1)^2$ 只移鞍点，两个跨顶点收缩各系数 $n-1$，合为 $2(n-1)G_tG_t$。纵关联展开 $G_\ell=G_\ell^0+\frac12[\langle\phi\phi U^2\rangle_0-G_\ell^0\langle U^2\rangle_0]+\cdots$，一次项因纵奇数 0；两个外腿接不同顶点有 2 种，消 1/2，得到

$$\chi_\ell(q)=G_\ell^0(q)+32u^2m_0^2(n-1)[G_\ell^0(q)]^2\int_k\frac{1}{Kk^2K|k+q|^2}+\cdots. \tag{37.1}$$

$2<d<4$ 时积分 $\propto K^{-2}|q|^{d-4}$，$d=4$ 对数，故纵 χ 也奇异。另一检查是长度近固定约束 $\phi_\ell\simeq-\pi^2/(2m_0)$，给系数 $(n-1)/(2m_0^2)$ 乘同一泡图，与上式 $G_\ell^0(0)=(-2t)^{-1}$ 一致。

$n=1$ 没有横模，系数 0，不推出 Ising 有序纵响应这样发散；短程连续对称 $d\le2$ 非零温没有这里假定的普通长程序。q 趋 0 时有限阶微扰也会失控，泡图识别机制而非提供所有尺度的均匀收敛展开。 □

习题 37.4 LG 加 $rm_1^2/2+vm_1^2m^2$、$u>0$，整题令 $v=0$。(a) 给定 $|m|$ 的易方向；(b) 平行/垂直 1 轴鞍点自由能；(c)t,r 相图与阶；(d)Goldstone；(e) 正 $t,r,u=0$ 的 1、2 分量协方差；(f) 四次 Fourier；(g),(h) 首阶关联修正；(i)χ_{22}^{-1} 及 t_c；(j)r 在 O(n) 点相关性和普适类。

解答. $r>0$ 易垂直平面，$r<0$ 易 1 轴。平行密度 $f_\parallel=-(t+r)^2/(16u)$ $(t+r<0)$，垂直 $f_\perp=-t^2/(16u)$ $(t<0)$。无序需 $t>0,t+r>0$；$r>0$ 在 $t=0$ 连续入 $\mathrm{O}(n-1)$ 平面序，$r<0$ 在 $t+r=0$ 连续入 Ising 轴序。$r=0,t<0$ 两方向相会，$\partial_rf=m_1^2/2$ 跳变，为取向一阶线，端点 $(0,0)$ 为双临界。平面序有 $n-2$ Goldstone、轴序 0、$r=0$ 的各向同性序有 $n-1$。

$D_1=Kq^2+t+r,D_\perp=Kq^2+t$，$G_i=D_i^{-1}$。$U=u\sum_{ij}\int_{q_1q_2q_3}m_i(q_1)m_i(q_2)m_j(q_3)m_j(-\sum q)$。Wick 外腿同分量两种附加收缩，令 $I_1=\int_qG_1,I_\perp=\int_qG_\perp$，质量修正

$$\delta r_1=4u[3I_1+(n-1)I_\perp],\qquad \delta r_\perp=4u[I_1+(n+1)I_\perp]. \tag{37.2}$$

关联首修正 $G_i-\delta r_iG_i^2$，$\chi_{22}^{-1}=t+4u[I_1+(n+1)I_\perp]+O(u^2)$。平面支 $r>0$ 的一阶 $t_c=-4u\int_q[(Kq^2+r)^{-1}+(n+1)(Kq^2)^{-1}]+O(u^2)$，相同截断，发散时不可当有限移位。

r 分裂二次质量，O(n) 固定点处相关，微小易轴/易平面最终分别流向 Ising/$\mathrm{O}(n-1)$ 类，不仅改临界温。$r=0$ 经细调才留 O(n)；若平面为 O(2) 且有效空间二维，应另考虑 BKT 而非通常有序相均场。 □

习题 37.5 n 分量 LG 四次 $u(m^2)^2+v\sum_im_i^4$。(a) 易方向及简并；(b)u,v 稳定区；(c) 有正六次稳定项、$u>0$ 的 t,v 鞍点相图；(d)Goldstone。


解答. 固定 $R^2=\sum m_i^2$，$R^4/n\le\sum m_i^4\le R^4$。$v>0$ 取各分量等模 $\pm R/\sqrt n$，共 2^n 条有向对角方向；$v<0$ 取单一分量 $\pm R$，共 $2n$ 条有向轴（不计正负时各减半）。四次稳定 $u+v/n>0$（$v\ge0$）或 $u+v>0$（$v<0$）。

$u>0$、$v>-u$ 时 $t=0$ 连续，$v>0$ 入对角序、$-u<v<0$ 入轴序；$v=0,t<0$ 取向切换，恢复 O(n) 连续简并。$v<-u$ 轴方向有效四次 $a_4=u+v<0$，加 $wR^6,w>0$ 后 $t_*=a_4^2/(2w)$、$R_*^2=-a_4/(2w)$ 为一阶，

$(t,v)=(0,-u)$ 三临界。非零 v 离散易方向无 Goldstone，$v=0$ 有 $n-1$；稳定区边界上若没有六次项原四次模型无有限极小，不能把那里画成合法低温相。 □

习题 37.6 证明题给一环流 $\dot u=\epsilon u-4C[(n+8)u^2+6uv]$、$\dot v=\epsilon v-4C[12uv+9v^2]$，$\epsilon=4-d$、$C\simeq A_4/K^2$。(b) 全部固定点、$n<4, n>4$ 稳定流；(c) 温度流及稳定点 ν；(d) 涨落对稳定区与小负 $v, n>4$ 相变的影响。

解答. 没有 4! 约定的四腿顶点为 $8u(\delta_{ab}\delta_{cd}+\delta_{ac}\delta_{bd}+\delta_{ad}\delta_{bc})+24v\delta_{abcd}$。二阶连接累积量两顶点以两条壳传播子连接，三种外腿配对；壳泡 $I_2=C\,\mathrm{d}\ell$。投影到 $aabb$ 与 $aaaa$ 不变量，u 修正来自 $4(n+8)Cu^2+24Cuv$，v 修正来自 $48Cuv+36Cv^2$；两个纯 v 顶点不能生成不同分量 $aabb$，纯 u 必须保持 O(n) 所以不生成独立 v，这两条是计数检查。再加树层维 ϵ 即题式。



用 $\bar u=4Cu, \bar v=4Cv$，固定点为 Gaussian$(0,0)$、独立 Ising$(0,\epsilon/9)$、O(n)$(\epsilon/(n+8),0)$、cubic$(\epsilon/(3n),\epsilon(n-4)/(9n))$。Gaussian 两方向 $+\epsilon$，Ising 有 $+\epsilon/3$ 与 $-\epsilon$，均不完全稳定。O(n) 本征值 $-\epsilon,\epsilon(n-4)/(n+8)$，cubic 本征值 $-\epsilon,\epsilon(4-n)/(3n)$；所以 $n<4$ 稳定 O(n)、$n>4$ 稳定正 $v$cubic，$n=4$ 一环边缘需更高阶。

平移临界质量后 $\dot t=[2-(n+2)\bar u-3\bar v]t+\cdots$，来自单壳 tadpole4$[(n+2)u+3v]I_1$ 及 I_1 对 t 的导数。因此

$$\nu_{O(n)}=\tfrac12+\frac{n+2}{4(n+8)}\epsilon+O(\epsilon^2),\quad \nu_{cubic}=\tfrac12+\frac{n-1}{6n}\epsilon+O(\epsilon^2). \tag{37.3}$$

$n>4$ 负 v 可离开原四次稳定区、流向大耦合，六次稳定项允许涨落诱发一阶。原均场稳定区因涨落的长尺度要求而缩小；runaway 是机制指示，有限阶 beta 函数不独自证明精确一阶边界，$n=4$ 阈值也仅是一环结论。 □

习题 37.7 平方格 Ising，$b=2$ 的 Niemeijer–van Leeuwen 首累积量。(a) 四站方块内/跨键划分；(b) 块自旋多数规则、2:2 平票各一半，列所有微观权重；(c)$\langle U\rangle_0$ 与 K'；(d) 固定点、y_t；(e) 小 h 的 h', y_h；(f) 精确比较。

解答. 块内四边作 H_0，相邻块之间两条原键作 U。配置类及完整数目如下：

块内 M	构型数	键和、权重	给 $S'=+$ 比例
4	1	$4, \mathrm{e}^{4K}$	1
2	4	$0, 1$	1
0（相邻两正）	4	$0, 1$	1/2
0（交替）	2	$-4, \mathrm{e}^{-4K}$	1/2
-2	4	$0, 1$	0
-4	1	$4, \mathrm{e}^{4K}$	0

反号给 $S'=-$，两条件权重各 $Z_b=\mathrm{e}^{4K}+6+\mathrm{e}^{-4K}$。旋转对称使每边站 $\langle\sigma_i\rangle_{S'}=a(K)S'$、$a=(\mathrm{e}^{4K}+2)/Z_b$。首累积量跨块因子化，两条边给 $K'=2Ka^2$；新场 $h'=4ah$，常数每块 $\log Z_b$。

非零固定点 $a=1/\sqrt{2}$。$x=\mathrm{e}^{4K_*}$ 满足 $(\sqrt{2}-1)x^2-(6-2\sqrt{2})x-1=0$，$K_*\simeq 0.5187$。$y_t=\log[\partial_K(2Ka^2)|_{K_*}]/\log 2\simeq 1.006$，$y_h=\log(4/\sqrt{2})/\log 2=1.5$。精确 $K_c=\frac{1}{2}\log(1+\sqrt{2})=0.440687$、$y_t=1, y_h=15/8$。热指数接近是该近似的数值巧合，磁指数误差明显；首累积量丢跨块相关不能误称精确 RG。随卷代码穷举 16 态及验证全部表项。 □

习题 37.8 d 维 Potts 近邻 $K\delta_{s_i,s_j}$。(a) 一维 $b=2$ 精确隔站流及固定点；(b) 采用**先移键**、**后消站**的 MK 流；(c)$d>1$ 有非零有限固定点；(d)$d=2$、$q=3,1,0$ 的 K_*, y_t，$q=1,0$ 作随机簇解析延拓。

解答. 一维 $F_q(K)=\log[(\mathrm{e}^{2K}+q-1)/(2\mathrm{e}^{K}+q-2)]$，常数 $g'=2g+\log(2\mathrm{e}^{K}+q-2)$，$K=0$ 稳定、∞ 不稳定 $(K'=K-\log 2)$。先把 2^{d-1} 条键并到一条，再精确消站，$K'=F_q(2^{d-1}K)$。与先消站后并键的另一 MK 次序不同，本文用官方题的次序；两种都是近似，数字不宜混比。

$q>0$ 小 K 有 $K'\simeq 2^{2d-2}K^2/q<K$，大 K 有 $K'\simeq 2^{d-1}K-\log 2>K$ $(d>1)$，连续性保证中间有不稳定有限根。$d=2, x=\mathrm{e}^{K_*}$，方程 $x(2x^2+q-2)=x^4+q-1$。

$q=3$ 正根 $x=2$，$K_*=\log 2$、热本征值 $\lambda_t=16/9$、$y_t=\log_2(16/9)\simeq 0.8301$。$q=1$ 根 $x=(1+\sqrt{5})/2=\varphi$，$K_*\simeq 0.48121$、$\lambda_t=4(1-\varphi^{-1})$、$y_t\simeq 0.6115$。$q\to 0$ 化简 $K'=\log[(1+\mathrm{e}^{2K})/2]=K+K^2/2+\cdots$，仅有限根 0，$y_t=0$ 但二阶边缘相关。$q=0$ 不能当“零种自旋”的普通统计和，它是连通图生成函数的极限；$q=1$ 对应渗流。原 $q>0$ 的非零固定点论证在奇异 $q=0$ 极限须重新检查。 □

37.1 原题 9：Potts 转移矩阵的完整引用

原题 9(a)–(c) 周期 Potts 链的矩阵、最大与次大根、自由能、$\xi(T\to 0)$，逐项在习题33.5(a),(b) 及其解答。原卷 Hamilton 式把末键单列又让前和上限写 N，本卷按每条周期近邻边只计一次处理，不将末键双计。

38 8.334 复习包 3：图展开、矩阵场与粗糙化

题源：Mehran Kardar，8.334 Spring 2014，Test3 Review 及公开 Solutions，12 题。修复粗糙化能量符号与正交矩阵说明，并区分官方统一场缩放和复合算符壳平均。。官方答案可获取；中文解答由编者独立推导，题内说明与官方解的核对及修正。

习题 38.1 蜂窝格 O(n) 单位向量，改用键权重 $\exp f(s_i\cdot s_j)=1+nt\,s_i\cdot s_j$。(a) 高温 t 图展开；(b)$n\to 0$ 如何表示单条自避免聚合链，说明使用的生成函数。

解答. 每条边选 1 或 $nt\sum_a s_i^a s_j^a$。规范化球面积分 $\int s^a=0$、$\int s^a s^b=\delta_{ab}/n$；蜂窝度 3，所以有边的顶点必须度 2，

不能度 1 或 3。所选图是互不交叉闭环，长度 l 的边 $n^l t^l$ 被 l 个顶点 n^{-l} 抵消，绕圈分量迹剩 n，故

$$Z=\sum_{\text{disjoint loops}} t^{N_b} n^{N_{loop}}. \tag{38.1}$$

裸 $\lim_{n\to 0} Z=1$ 只剩空图，不能直接说它等于一个聚合物。$\partial_n Z|_0$ 选一个闭合自避免环；插入 $\langle s_i\cdot s_j\rangle$ 则两个端点允许一条开放线，其余闭环在 $n\to 0$ 消失，得到从 i 到 j 的单条自避免路径生成函数。度 3 格点避免偶四度顶点的分叉/交叉歧义；模型正权重需相应 t 范围，解析 n 极限作为图生成工具。 □

习题 38.2 q 态 Potts 键 $\mathrm{e}^{K\delta}=C(K)[1+T(K)g(s,s')]$、$g=q\delta-1$。(a)$C,T$；(b) 证明 $\sum_s g=0$、$\sum_s g(s_1,s)g(s,s_2)=qg(s_1,s_2)$、$\sum_{ss'} g^2=q^2(q-1)$；(c) 一维自由能、$\langle g(s_m,s_n)\rangle$；(d) 平方格高温至 T^4 与低温首项；(e) 对偶、唯一边界前提下 K_c；(f)$q=2$ 图的区别。

解答. 比较相同/不同自旋给 $C=(\mathrm{e}^K+q-1)/q$、$T=(\mathrm{e}^K-1)/(\mathrm{e}^K+q-1)$。矩阵 $g=qI-\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 在均匀向量上 0、其余 $q-1$ 维本征值 q，故 $g^2=qg$，三恒等式立即由行和和迹得到。

一维 $Z=q^N C^{N-1}$ (开链)，环链改为 $Z=q^N C^N[1+(q-1)T^N]$，等价于转移矩阵精确式；体自由能 $\log Z/N=\log(qC)$，关联 $\langle g(s_m,s_n)\rangle=(q-1)T^{|m-n|}$。平方格最小非空高温闭图为一个面，权重 $(q-1)T^4$，故 $Z=q^N C^{2N}[1+N(q-1)T^4+O(T^6)]$（thermodynamic bulk，有限小环面另有绕圈图）。低温基态 q 个，单站改成另 $q-1$ 色破 4 键，$Z=q\mathrm{e}^{2NK}[1+N(q-1)\mathrm{e}^{-4K}+\cdots]$。

匹配 $T(K)=\mathrm{e}^{-K^*}$ 即 $(\mathrm{e}^K-1)(\mathrm{e}^{K^*}-1)=q$，唯一铁磁边界在 $K_c=\log(1+\sqrt{q})$。$q=2$ 时 $g=\sigma_i\sigma_j$，每顶点奇度平均 0，图只有偶度；$q>2$ 可有三度及更复杂分叉图，不能用同一简单 Ising 费米环结构完成求和。这是所用解法的结构区别，不是所有非 Ising 模型一律不可解的定理。 □

习题 38.3 $\mathrm{Potts}^{K\delta}=1+v\delta, v=\mathrm{e}^K-1$，加场 $h\sum_i \delta_{s_i,1}$。(a) 证明随机簇式 $Z=\sum_G v^{N_b(G)}\prod_{c\in G}[q-1+\mathrm{e}^{hN_s(c)}]$；(b)$q\to 1$ 独立键渗流与平方阈值；(c)$q\to 0$ 单连通簇生成及 lattice animals 解释。

解答. 选中 $v\delta$ 的每键强迫两端同色，一个连通簇所有自旋同色；若色 1 权 e^{hN_s}，其余 $q-1$ 色权 1，独立簇相乘即式。$h=0$ 时 $Z=\sum_G v^{N_b} q^{N_c}$，所有图均允许，不用删除带端点的图。

$q=1$ 有 $Z=(1+v)^{N_E}$，规范化图概率 $p^{N_b}(1-p)^{N_E-N_b}$，$p=v/(1+v)$，平方格 $p_c=1/2$。$q\to 0$ 时裸 $Z\to 0$，其 q 的领先系数只保一个簇，即**固定全顶点集**上的连通生成图。若要枚举任意尺寸的单根 lattice animals，需再标根或对参与顶点数引入生成变量；不能把有限图的 Z/q 未经说明当任意尺寸簇数。它允许分叉和环，与上一题 $n\to 0$ 的单条自避免链不同。 □

习题 38.4 平方格 Potts。(a) 比较高低温或从随机簇证明配分函数对偶、K_c；(b) 从对偶求 $U=\langle\beta H\rangle=-\partial_{\log K}\log Z$ 的临界值，说明不连续转变时的限制。

解答. 平面图的已占边与双图未占边对应，Euler 关系将簇数换成双簇数，bulk 每站 $\phi(K)=2\log v-\log q+\phi(K^*)$、$v=\mathrm{e}^K-1, vv^*=q$。有限边界有解析常数和扭转扇区，见习题34.3。自对偶 $K_c=\log(1+\sqrt{q})$。

微分 $\partial_K K^*=-q\mathrm{e}^K/[v(v+q)]$，故 $U(K)/N=-2K\mathrm{e}^K/v+(K/K^*)(\partial_K K^*)U(K^*)/N$。自对偶导数 -1，若能连续，$U_c/N=-K_c(1+1/\sqrt{q})$。$q>4$ 的一阶情况下，它严格固定**两侧能量平均**，而非使潜热 0：$[U_c^-+U_c^+]/(2N)=-K_c(1+1/\sqrt{q})$。原题对任意 q 的单值说法须加连续前提；这也是只用自对偶不能决定相变阶的例子。 □

习题 38.5 平方格所有从原点出发随机游走，权 $t_x^{l_x}t_y^{l_y}$、$t_x,t_y\ge 0$。(a) 终点 (x,y) 总权 W 及 $t=(t_x+t_y)/2<1/4$；(b) 近临界远距等权曲线；(c) 全部终点加权平均步数如何发散。

解答. 单步 Fourier 振幅为 $A(q)=2t_x\cos q_x+2t_y\cos q_y$。所有步数作几何和，$\widetilde{W}=1/(1-A)$，所以

$$W(x,y)=\int_{[-\pi,\pi]^2}\frac{\mathrm{d}^2q}{(2\pi)^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q_x x+q_y y)}}{1-2t_x\cos q_x-2t_y\cos q_y}. \tag{38.2}$$

非负权总和有限需 $2(t_x+t_y)<1$，即 $t<1/4$。

近临界 $\delta=1-4t$，小 q 核 $\delta+t_xq_x^2+t_yq_y^2$，逆 Fourier$W\simeq K_0(\sqrt{\delta}\sqrt{x^2/t_x+y^2/t_y})/(2\pi\sqrt{t_xt_y})$。等值是椭圆，$\xi_x=\sqrt{t_x/\delta},\xi_y=\sqrt{t_y/\delta}$；某耦合严格 0 时降为一维，不能使用两维 Jacobian。总生成 $\sum_{xy}W=1/(1-4t)$，共同放大两步权的对数导数给 $\langle l\rangle=4t/(1-4t)$，$\gamma_l=1$。固定终点的条件步数需对该 $W(x,y)$ 另求导，不与全终点平均混为一个量。 □

习题 38.6 平方格各向异性 Ising$-\beta H=\sum[K_x\sigma_{x,y}\sigma_{x+1,y}+K_y\sigma_{x,y}\sigma_{x,y+1}]$。(a) 改造行转移矩阵/Jordan–Wigner 正规模，给体自由能；(b) 由奇点求相边界并验 $K_x=K_y^*$；(c) 奇异自由能及指数、幅比受各向异性影响。

解答. 行内键仍给 $\exp[K_x\sum\sigma_j^z\sigma_{j+1}^z]$；行间单站核对角化后将原 K^* 换为 K_y^*，$\tanh K_y^*=\mathrm{e}^{-2K_y}$，常数每站 $(2\sinh 2K_y)^{1/2}$。转为 Majorana 后每 $(q,-q)$ 二模块的双曲转移乘积得到

$$\cosh\gamma(q)=\cosh 2K_x\cosh 2K_y^*-\sinh 2K_x\sinh 2K_y^*\cos q, \tag{38.3}$$

其两根 $\mathrm{e}^{\pm\gamma}$，选最大根求迹，$\phi=\log Z/N=\frac12\log(2\sinh 2K_y)+(2\pi)^{-1}\int_0^\pi\gamma(q)\,\mathrm{d}q$。这展示哪些各向同性步骤改变，而非直接猜一个替换式。

最小间隙 $\gamma(0)=2|K_x-K_y^*|$，所以 $\sinh 2K_x\sinh 2K_y=1$。近临界 $\mu=2(K_x-K_y^*)$、$v_q^2=\sinh 2K_x\sinh 2K_y^*$，小 q 有 $\gamma\simeq\sqrt{\mu^2+v_q^2q^2}$，积分奇异 $\phi_s=\mu^2\log(C/|\mu|)/(4\pi v_q)$ 加解析项。$\mu\propto T-T_c$ 给 $\nu=1$ 与对数热容 $\alpha=0$；有限正空间刚度改变尺度和非普适振幅，不改临界类。两侧 $\mu^2\log|\mu|$ 系数同，热容对数幅比 1；其他普适幅比比较须使用同一坐标和场归一化，相关长方向之比本身是非普适度量。 □

习题 38.7 二维 Ising 界面沿 x，忽略孤岛、悬垂，整数列高 h_n，周期列边界。(a) 证明 $\beta H=2K_yL+2K_x\sum|h_{n+1}-h_n|$；(b) 列转移核及对角化；(c) 界面自由能；(d) 零界面代价与原精确临界线比较。

解答. 每水平投影列破一竖键，代价 $2K_y$；高度差 $|\Delta h|$ 破这么多横键，每条 $2K_x$。核 $T(h,h')=\mathrm{e}^{-2K_y-2K_x|h-h'|}$、本征函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kh}$，$r=\mathrm{e}^{-2K_x}$，$\lambda(k)=\mathrm{e}^{-2K_y}(1-r^2)/(1-2r\cos k+r^2)$。整体高度无限平移量需固定或除去，不影响每长度自由能。

最大 $k=0$，$\beta\sigma_{axis}=-\log\lambda_0=2K_y-\log\coth K_x=2K_y+\log\tanh K_x$。为 0 时 $\mathrm{e}^{-2K_y}=\tanh K_x$，正好 $\sinh 2K_x\sinh 2K_y=1$。这个无悬垂近似所得边界与精确线相合，但不由此证明所有界面构型都已计入；形式负代价区原有序界面解释已失效。 □

习题 38.8 n 分量磁性 LG 考虑空间各向异性。(a) 一般低阶作用；(b) 这种各向异性是否相关；(c) 题设 La2CuO4 经典三分量 spin，平面内强平方格反铁磁、相邻平面弱同向耦合，低温态与转变普适类。

解答. 一般 $H=\int[tm^2/2+\frac{1}{2}K_{\alpha\beta}\partial_\alpha m\cdot\partial_\beta m+u(m^2)^2-h\cdot m]$，对称正定空间刚度可正交对角化，再以 $x'_\alpha=x_\alpha/\sqrt{K_\alpha}$ 化成等向梯度，体积 Jacobian 与场单位重定。有限正定刚度的各向异性属度量参数，通常不改变普适指数；若有特征值 0、不同 q^2/q^4 阶或长程尾，则不能这样移去，见作业 3。

低温每平面 $s_{x,y,z}=(-1)^{x+y}\hat{n}$，弱同向层耦合使同一位置跨层取同向，共用 Néel 轴。任意有限正层耦合在足够长尺度构成三维 O(3) 类（在题设经典、无 spin 各向异性假设内）；很弱时有广的二维到三维 crossover，孤立短程二维连续 spin 平面本身无非零温普通长程序。不能把空间弱耦合与 spin 易轴相混后改猜 Ising。 □

习题 38.9 单位 n 分量 $H=(2T)^{-1}\int[(\nabla s)^2+gs_1^2]$，$d=2+\epsilon$。题给 $\dot{T}=-\epsilon T+(n-2)T^2/(2\pi)$，整体 spin 缩放 $\zeta=1-(n-1)T\,\mathrm{d}\ell/(4\pi)$。(a) 固定 T,y_T；(b) 各向异性 g 的流、指数；(c)T,g 相图、$g\to 0$ 的边界形状。区分官方仅以 ζ^2 处理平方场的近似和直接壳平均。

解答. $n>2$、$\epsilon>0$，$T_*=2\pi\epsilon/(n-2)$、$y_T=\epsilon$。官方解把 s_1^2 仅视为两个整体场因子，给 $y_g^{off}=d+2\log\zeta/\,\mathrm{d}\ell=2-\epsilon/(n-2)$。但平方场是复合算符，壳内分量混合不能只用 $\langle s\rangle$ 的平方。

直接取慢单位轴 u 和快横向 π_a，$s=u\sqrt{1-\pi^2}+\sum e_a\pi_a$、$\langle\pi_a\pi_b\rangle=TI\delta_{ab}$，$I=\mathrm{d}\ell/(2\pi)$。由 $\sum_a e_{a1}^2=1-u_1^2$ 得 $\langle s_1^2\rangle_>=(1-nTI)u_1^2+TI$。常数项移自由能，真正各向异性算符 s_1^2-1/n 系数为 $1-nTI$。在固定 T_*，$g/(2T)$ 的体积缩放给

$$y_g=d-nT_*/(2\pi)=2-\frac{2\epsilon}{n-2}+O(\epsilon^2). \tag{38.4}$$

这比官方仅场缩放多一个复合算符顶点修正；两者的 $2/\epsilon$ 领先 crossover 形状相同，但首阶更正不同，不能冒称官方数字就是全一环算符结果。

$g<0$ 易轴 Ising 序，$g>0$ 易平面 O$(n-1)$ 序，$g=0$ 轴以下有取向一阶线，上面无序；各连续边界近双临界满足 $g\sim|\delta T|^{\phi}$、$\phi=y_g/y_T=2/\epsilon-2/(n-2)+O(\epsilon)$（官方近似为 $2/\epsilon-1/(n-2)$）。这是小 ϵ 结果，不能把外推 $\epsilon=1$ 所得小或零 y_g 当实际三维结论。 □

习题 38.10 实 $N\times N$ 正交矩阵场 M，$H=K\int \mathrm{Tr}[\nabla M\cdot\nabla M^T]/4$、$MM^T=M^TM=I$。(a) 元素式和基态；(b) 对称 $\sigma=(M+M^T)/2$、反对称 $\pi=(M-M^T)/2$ 的作用及约束；(c) 近 I 到四阶，略测度项；(d)Goldstone 数；(e)Fourier 协方差；(f) 壳 $\langle\mathrm{Tr}\,\sigma\rangle$ 与 ζ；(g) 两种直接梯度修正给 $\widetilde{K}=K+NI/2$；(h)K'；(i)T 流与 $d\lesseqgtr 2$、T_c,ν；(j) 场 $-h\int\mathrm{Tr}\,M$ 与 y_h。$I=\int_{\Lambda/b}^{\Lambda}\mathrm{d}^dq/[(2\pi)^dq^2]$。

解答. 元素作用 $K\sum_{ij}(\nabla M_{ij})^2/4$，约束 $\sum_k M_{ik}M_{jk}=\delta_{ij}$，任意空间常数正交矩阵为基态。$M=\sigma+\pi$ 给 $H=K\int\mathrm{Tr}[(\nabla\sigma)^2-(\nabla\pi)^2]/4$, **两边**正交式还给 $[\sigma,\pi]=0$ 及 $\sigma^2-\pi^2=I$。近 I 正分支 $\sigma=\sqrt{I+\pi^2}=I+\pi^2/2+O(\pi^4)=I-\pi\pi^T/2+\cdots$。

代入得到

$$H=-\frac{K}{4}\int\mathrm{Tr}(\nabla\pi)^2+\frac{K}{8}\int\mathrm{Tr}[(\pi\nabla\pi)^2+\pi^2(\nabla\pi)^2]+O(\pi^6). \tag{38.5}$$

两个四阶项因矩阵不对易不能合成标量单项。$\pi_{ij}=-\pi_{ji}$ 有 $N(N-1)/2$ 个独立实模，$H_0=K\sum_{i<j}\int(\nabla\pi_{ij})^2/2$，所以 $\langle\pi_{ij}(q)\pi_{kl}(q')\rangle=(2\pi)^d\delta(q+q')(\delta_{ik}\delta_{jl}-\delta_{il}\delta_{jk})/(Kq^2)$。

$\langle\pi^2\rangle_>=-[(N-1)I/K]I_N$，故 $\langle\mathrm{Tr}\,\sigma\rangle_>=N[1-(N-1)I/(2K)]$、$\zeta=1-(N-1)I/(2K)$ 为**平均**长度/迹的恢复因子。官方旁注说正交矩阵本征值全 ±1、近 I 的迹恒 N，这是错误的：二维转动本征 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$、迹 $2\cos\theta$ 即反例。本推导不使用该旁注，也不将每个涨落矩阵的迹强行固定 N。

(g) 写慢梯度 $A=\nabla\pi_<$、快矩阵 $B=\pi_>$，两直接梯度收缩分别 $\langle\mathrm{Tr}(BABA)\rangle=-(I/K)\,\mathrm{Tr}\,A^2$、$\langle\mathrm{Tr}(B^2A^2)\rangle=-(N-1)(I/K)\,\mathrm{Tr}\,A^2$, 来自上述两 Kronecker 项逐索引求和。四阶系数 $K/8$ 合成 $-NI\,\mathrm{Tr}\,A^2/8$, 与二次 $-K\,\mathrm{Tr}\,A^2/4$ 比较即 $\widetilde{K}=K+NI/2$。快速梯度收缩只移局域/测度相关项，不在此直接动能投影中重复计数。

重标 $K'=b^{d-2}\zeta^2\widetilde{K}=b^{d-2}[K-(N-2)I/2]+\cdots$。$I=A_d\Lambda^{d-2}\,\mathrm{d}\ell$，$\dot{T}=-(d-2)T+(N-2)A_d\Lambda^{d-2}T^2/2$。$N>2$ 时 $d<2$ 及 $d=2$ 向高温，二维 $\xi\sim\exp[4\pi/((N-2)T)]$；$d=2+\epsilon$ 有 $T_c=4\pi\epsilon/(N-2)$、$\nu=1/\epsilon$。$N=2$ 为角变量，微扰二阶 0，还需拓扑缺陷。

$h'=b^d\zeta h$，临界 $y_h=d-(N-1)\epsilon/(N-2)=2-\epsilon/(N-2)$。SO(3) 局部双覆盖 S^3 关联 O(4) 场模型的微扰几何，但全局 SO(3) 有 $\mathbb{Z}_2$ 基本群、S^3 没有，拓扑缺陷不在这个一环展开内；M 场也对应覆盖变量的复合算符。不能从局部微扰等价就无条件宣布实际堆叠三角磁体全属于 O(4) 普适类。 □

习题 38.11 三维空间中的二维界面，稳定 Gaussian$H_0=K\int(\nabla h)^2/2$，晶格锁定 $-U=y\int\cos(2\pi h)/a^2$；原题 H_0 负号改为正以保证配分收敛。(a) 中性顶点平均，$C(x)=\log(|x|/a)/(2\pi)$；(b)$G_k(x-y)=\langle\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(h(x)-h(y))}\rangle$ 的二次导数；(c) 锁定的首个非零修正；(d) 有效刚度与微扰失效阈值；(e) 壳 RG；(f) 相图；(g) 长距粗糙度跳变的普适意义。

解答. 平均高度零模积分令总顶点荷 $\sum q_\alpha=0$，否则平均 0。Gaussian 特征函数为 $\exp[-\frac12\sum q_\alpha q_\beta G(x_\alpha-x_\beta)]$；中性消去自项后为 $\exp[K^{-1}\sum_{\alpha<\beta}q_\alpha q_\beta C(x_\alpha-x_\beta)]$。故 $G_k(r)=\mathrm{e}^{-k^2C(r)/K}$，$-\partial_k^2G_k|_0=\langle[h(r)-h(0)]^2\rangle=2C(r)/K$。

令 $p=2\pi$，$D=C(r-x)-C(r-y)-C(x)+C(y)$，首次锁定项因非中性 0，二阶连接归一化给

$$\frac{\delta G_k}{G_k^0}=\frac{y^2}{4a^4}\int\mathrm{d}^2x\,\mathrm{d}^2y\,(a/|x-y|)^{p^2/(2\pi K)}[\cosh(kpD/K)-1]+O(y^4). \tag{38.6}$$

减 1 正是分母配分的断连扣除。为区分完整 Green 函数与一次 RG 壳，写 $C(r)=C_<(r)+C_>(r)$，其中

$$C_>(r)=\int_{\Lambda \mathrm{e}^{-\,\mathrm{d}\ell}<|q|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^2q}{(2\pi)^2}\frac{1-\cos(q\cdot r)}{q^2}=\frac{\mathrm{d}\ell}{2\pi}[1-J_0(\Lambda r)]+O((\mathrm{d}\ell)^2). \tag{38.7}$$

它用于重整顶点 $y'=b^2\mathrm{e}^{-p^2\langle h_>^2\rangle/2}y$；计算长距响应中的中心积分则要保留低动量 Green 函数。小偶极 $s=x-y$ 有 $D\simeq s\cdot F(R)$, $F(R)=\nabla C(r-R)-\nabla C(R)$。对 R 做分部积分（边界以相同 UV/IR 截断处理），用 $\nabla^2C(R)=\delta(R)$，或等价地用 Parseval，可逐步得

$$\int \mathrm{d}^2R\,|F(R)|^2=2\int\frac{\mathrm{d}^2q}{(2\pi)^2}\frac{1-\cos(q\cdot r)}{q^2}=2C(r). \tag{38.8}$$

相对位移的角积分 $\int \mathrm{d}\varphi(s\cdot F)^2=\pi s^2|F|^2$，代回上式的 $y^2/(4a^4)$ 并与 $G_k=\exp[-k^2C/K_{\mathrm{eff}}]$ 对照，得到

$$\delta K=\frac{\pi p^2}{4}y^2\int_a^\infty\frac{s^3\,\mathrm{d}s}{a^4}\left(\frac{a}{s}\right)^{p^2/(2\pi K)}. \tag{38.9}$$

该积分在 $K\geq\pi/2$（$p=2\pi$）IR 发散，指示锁定相关。它不是把全部 s 一口气改成 RG 增量；只有 $a<s<a\mathrm{e}^{\,\mathrm{d}\ell}$ 一壳给 $\dot K=\pi p^2y^2/4$。

以此显写的字面 y/a^2 及圆形相对位移截断，$\dot y=(2-\pi/K)y$、$\dot K=\pi^3y^2$。作业 6 原题把二阶流写为 $\dot K=\pi p^2h_p^2/2$；对同一个 $p=2\pi$ 余弦顶点，本文圆壳的字面系数 y 与该题二阶规范的振幅关系为 $y=\sqrt{2}h_p$。两种逸度的线性尺度维相同，改变二阶规范不改 K_c；不可在一个方程里混用 y 的字面定义和 h_p 的二阶系数。$K_R<\pi/2$ 且逸度流 0 为粗糙对数相；较大刚度锁到整数高度，为平相；边界类 BKT，有限裸逸度使裸临界线偏离单一 $\pi/2$。

粗糙侧临界重整化刚度 $K_R=\pi/2$，长距方差领先 $[2/\pi^2]\log(r/a)$；平相长距饱和。因此普适跃变是

$$\lim_{r\to\infty}\frac{\langle\Delta h^2\rangle}{\log(r/a)}:\quad\frac{2}{\pi^2}\longrightarrow 0. \tag{38.10}$$

等价地，领先差为 $2\log(r/a)/\pi^2$。平相饱和值和有限 r 取极限方式非普适，不能声称高度方差本身有一个与距离无关的普适绝对跳变量。 □

习题 38.12 平方格整数高 RSOS，每邻站 $\Delta h=0$ 能 0，$\Delta h=\pm1$ 能 $K/2$，更大禁止。(a) 改键 $n_{ij}=h_i-h_j$，加每面和 0 约束 $\delta_{n,0}=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$，求双格相互作用；(b) 大 K 双模型与 XY 及前题一致性；(c) 一维高度链（二维空间界面）是否有有限温粗糙化转变。

解答. 键重 $w(n)=1$（0）、$t=\mathrm{e}^{-K/2}$（±1）、0（其他）。面约束 Fourier 变量 θ_p 给每键 $\sum_{n=-1}^{1}w(n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n(\theta_p-\theta_{p'})}=1+2t\cos(\theta_p-\theta_{p'})$，所以双键能 $\tilde v(\Delta\theta)=-\log[1+2t\cos\Delta\theta]$，边界和整体高度因子需固定，环面另加绕数约束。

大 K 小 t 时 $\tilde v=-2t\cos\Delta\theta+O(t^2)$，XY 双刚度约 $2t$、处于高温无序，对应原高度代价大、平相。小 K 时该 Fourier 权可能负，不可把整个形式 $-\log$ 未经检验当全温正概率 XY 模型；对偶图和拓扑流需更完整处理。此限制不影响大 K 题问。

一维可直接独立伸长 $n_i=-1,0,1$，规范化权 $1,t,t$，$\mathrm{Var}\,n_i=2t/(1+2t)>0$。固定 h_0 后 $\langle(h_j-h_0)^2\rangle=j\,2t/(1+2t)$，任意有限 K 长链都粗糙，只有 $K\to\infty$ 完全平；周期闭链有限尺寸改为桥方差 $\propto j(1-j/N)$，不产生有限温转变。 □

39 来源、全课程覆盖与证明范围

来源与编写：*MIT OpenCourseWare* 公开课历、讲义、作业与复习包；逐件 *URL*、*SHA-256*、字节数与页数在独立源码清单。冻结范围不因题目困难而删减。

39.1 课历到中文编章的映射

8.333 的 L1–L4 热力学、L5–L6 概率见第1章及作业 1、2；L7–L8 相空间与 BBGKY 见第2章；L9H 定理见第3章；L10–L11 守恒与流体见第4章；L12–L14 经典系综见第5章；L15–L19 累积、团簇、virial、变分与临界见第6章，并由既有作业 5 接口连接。L20 分子振转、声子与黑体、L21–L23 量子态/全同粒子系综由第5章、相关作业和既有转子接口展开；L24Fermi、L25Bose、L26 超流见第7章及量子气体作业。该完整主线不是对原件每页的逐字翻译。

8.334 的 L1–L3 集体场、LG 与 Goldstone 见第8章；L4–L5 关联、Gaussian 与 Ginzburg 见第9章；L6–L8 齐次、RG 与 Gaussian 标度见第10章；L9–L12 微扰及 ϵ 展开见第11章；L13–L14 实空间 RG 见第12章；L15–L17 高低温图、对偶、phantom loops 见第13章；L18–L19 二维 Ising 自由能与临界见第14章；L20–L22 非线性 σ、XY 缺陷与 Coulomb 流见第15章；L23 弹性与熔化见第16章；L24–L25Brownian、平衡/守恒场动力学见第17章；L26 尺度不变、开放系统、生长见第18章。第19章的无序与聚合物补充用于大纲/图展开的连接，不虚称另有未公开的 26 讲之后讲义。

39.2 题目计数与年份边界

两门课 12 套作业按原卷顶层编号分别 56 与 29；复习包 8.333 为 9、7、10 及历史期末 21，8.334 为 11、9、12，合计 164 个原题位置。本卷新写 137 个习题环境承载 138 个原位置（两维/三维 Dirac 题合编一环境），10 个原位置完整回指卷内同题，16 个原位置回指既有热统中文成果（作业 5 的 12 题及后续 4 次重复引用）。这些计数不能说成 164 道不同新增题。

8.333 前三复习包原题页为 Fall2007；期末包标 2007 复习、收 1998、1999、2000、2003–2006 历史考试。8.334 三包为 Spring2014 复习题。2013/2014 当期实际考试题面与学生最终项目未取得，不补造；课历列考试不等于该考试文件已公开。作业 5 的既有中文题面与解、固定 PDF 哈希和原编号全部核对，正常构建不依赖外卷文件。

课程讲义、作业和复习/官方解共 78 份 PDF（52 份讲义、12 套作业、14 份复习/官方解）；另有 20 份已取得的文字视频参考 PDF，合计 98 份、1226 个源物理页。各课有 26 条视频链接，但仅下载了各 10 份文字参考，不声称全 52 段视频逐分钟转录，也不把文字视频参考计入题集。源文件页数包含题面与答案重叠，不能当独立新增中文页。来源文件本地核查，公开只保链接、页数、字节数和哈希，不重分发第三方例外图片。

39.3 数学与物理复核的限度

题面全部明确小问保留，包括选做；8.333 作业 6 代表表 He3 能量系数原件漏印，未用它反造数据，所求四小问照完整条件解答。侧壁压力的能零、自由链模数、Lorentz 气热流的 peculiar 速度、Coulomb 点源符号、正交矩阵谱、相变凸性与各向异性复合算符等确定可核查问题单列修正。

RG 一环、MK 和块近似的指数是对应近似的结果；非解析流或 runaway 不单独证明全相图。一般二维 Ising

磁化定理、完整非平衡 KPZ 固定点与淬火无序非微扰理论未在本册从零证明，引用课程结果或明确补充假设。复习题中小 ϵ 外推、Bose 热容左右极限及定义、锁定刚度归一化均保留条件。有限矩阵、穷举和短 Monte Carlo 用于验证给定计算，不能作为无限体系相变证明。

参考文献

[1] Mehran Kardar，MIT OpenCourseWare，8.333 Statistical Mechanics I: Statistical Mechanics of Particles，Fall2013，讲义来自较早未指定年份版本。https://ocw.mit.edu/courses/8-333-statistical-mechanics-i-statistical-mechanics-of-particles-fall-2013/

[2] Mehran Kardar，MIT OpenCourseWare，8.334 Statistical Mechanics II: Statistical Physics of Fields，Spring2014，讲义来自较早未指定年份版本。https://ocw.mit.edu/courses/8-334-statistical-mechanics-ii-statistical-physics-of-fields-spring-2014/

[3] MIT OCW 使用条款与逐件例外。https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/；中文改编 CC BY-NC-SA4.0。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/