

度量空间与基础拓扑

MIT OCW 18.S190 IAP 2023 中文重编与学习补充

前言

本书面向已学过实数极限、连续函数与一元微积分, 并具备基本集合和线性代数知识的读者. 从距离的公理出发, 依次建立序列、开闭集、连续性、紧致性与完备性的理论, 再进入一般拓扑及函数空间中的应用. 第 1-6 章形成度量空间主线, 第 7 章将开集结构推广为一般拓扑, 第 8 章讨论分析中的拓展, 其中 Dirichlet 问题的最后一节另需基本多元微积分知识, 不影响前七章主线的学习.

主源为 Paige Bright 的 *18.S190 Introduction to Metric Spaces*, MIT OpenCourseWare, January IAP 2023. 六讲原件共 43 个 PDF 页, 其中 37 页为正文, 并附 6 份官方 TeX 与 3 份习题. 本册是简体中文重编, 按概念依赖重新编排, 不声称逐字全译. 原稿中的略证、留给读者的论证、若干笔误与缺少条件之处已补齐或修正; 球面距离、连续核积分算子、完备化唯一性等均采用核对后的陈述. 各章末题目为编者练习, 解答亦由编者撰写, 不冒称 OCW 官方答案. 原习题留在资料目录供对照, 本书不声称逐题译解了全部习题.

新领军考试的范围依据清华大学官方《2027 年丘成桐数学科学领军人才培养计划招生简章》, 其一试数学 1 明确包括“分析、代数、几何与拓扑”. 仓库既有考纲记录将开闭集、紧致性、连续性、完备性列为相关核心. 本次已核实官方考纲发布通知, 但未重新取得该通知所链详细考纲 PDF 的原文, 故不把既有摘要冒充本次逐页核验的官方细项. 本书优先充分讲解上述四项及其先修, 另补内部、闭包、边界、稠密性、连通性、基、同胚、有限积与商. Baire 定理、一致有界原理、函数族紧性和 Picard 应用属于明确标出的学习拓展, 不据此宣称全部拓展都是必考内容, 也不宣称本册覆盖整份新领军数学考纲.

章	内容	主源与补充角色
1	度量、范数与距离实例	18.S190 第 1 讲; 补齐例子验证
2	序列、开闭集与连续性	第 2 讲; 补闭包、内部、边界
3	欧氏空间的紧致性	第 3 讲; 补齐有限维论证
4	一般度量空间的紧致性	第 4 讲; 紧性等价的完整证明
5	完备空间与完备化	第 5 讲后半; 补构造与唯一性
6	一致连续与不动点应用	第 5 讲前半; 补局部 Picard 定理
7	拓扑空间与连通性	第 6 讲前半及第 2 讲; 基础拓扑补充
8	函数空间与分析拓展	第 6 讲后半; 18.102 及编者补充

来源与许可: MIT OCW 的对应内容按 CC BY-NC-SA 4.0 使用, 本册基于这些内容的中文译编、重排、勘误与增补采用相同许可. 原作者、课程、学期、官方链接和许可可见书末参考文献及源码中的 `sources/ATTRIBUTION.md`. MIT 及原作者不为本项目背书. 本项目不复制商业教材, 不把官方网页中的第三方“used with permission”材料当作默认开放授权. 固定排版来自用户提供的 `math-latex-typesetting v4.0.0` 模板; 字体不随源码分发.

目录

1 度量与典型空间	1
1.1 度量公理	1
1.2 范数与诱导度量	2
1.3 离散集合与有限空间	4
1.4 连续函数空间的度量	4
1.5 C^1 空间与微分算子	6
1.6 球面上的弦长与测地距离	7
1.7 练习与解答	8
2 序列, 开闭集与连续映射	9
2.1 收敛与 Cauchy 条件	10
2.2 开集, 闭集及其运算	11
2.3 相对开闭性	13
2.4 内部, 闭包与边界	13
2.5 用序列识别拓扑性质	15
2.6 连续性的等价表达	16
2.7 到集合的距离	18
2.8 度量可以不同而拓扑相同	19
2.9 练习与解答	20
3 欧氏空间的紧性	22
3.1 范数与线性结构	22
3.2 开覆盖与紧性	23
3.3 闭区间与闭方盒	25
3.4 有界点列与有限维范数等价	26
3.5 函数范数与紧支撑	28
3.6 编者练习与解答	30
4 一般度量空间的紧性	31
4.1 紧、序列紧与全有界	31
4.2 紧性等价定理的证明	33
4.3 有限交性质与嵌套紧集	35
4.4 连续像、最值与最小距离	37
4.5 编者练习与解答	39

5	完备空间与完备化	41
5.1	Cauchy 序列与完备性	41
5.2	子空间的完备性	42
5.3	上确界距离与函数空间的完备性	43
5.4	等距嵌入与完备化	45
5.5	完备化的唯一性	46
5.6	Cauchy 序列模型	46
5.7	练习与解答	48
6	一致连续与压缩映射	49
6.1	连续性与 Lipschitz 条件	49
6.2	紧空间上的一致连续性与参数积分	50
6.3	一致连续映射的延拓	51
6.4	Banach 不动点定理	52
6.5	积分方程的连续解	54
6.6	初值问题与 Picard 迭代	55
6.7	练习与解答	56
7	拓扑空间与连通性	58
7.1	拓扑公理与基	58
7.2	序列与连续映射	59
7.3	子空间、积空间与商空间	60
7.4	连通性与道路连通性	61
7.5	练习与解答	63
8	函数空间与分析中的拓扑	63
8.1	有界线性算子与对偶空间	63
8.2	Baire 定理与一致有界原理	65
8.3	连续函数族的紧性	66
8.4	流形与 Dirichlet 问题的动机	66
8.5	练习与解答	68
	参考文献	68

1 度量与典型空间

本章以 Paige Bright 的 MIT OCW 18.S190 IAP 2023 第 1 讲正文第 1–7 页为主要来源, 重新组织叙述并补充证明; 范数比较, 球面距离的严格解释及本章练习为编者补充.

在实数上, “两项越来越接近” 可以写成 $|x - y|$ 越来越小. 如果对象换成向量, 可以量线段的长度; 如果对象换成函数, 则需要先决定要比较图像的最大偏差, 还是整个区间上的累计偏差. 度量空间保留这些比较共同遵守的规则, 使收敛与连续的讨论不再依赖坐标或函数值的具体形式.

本章默认读者已经学过实数的完备性, 连续函数在闭区间上的有界性, 最大值定理与一致连续性, 以及 Riemann 积分的基本性质. 这些一元分析结论会在函数空间的例子中使用. 抽象度量空间的完备性则将在后文重新研究.

1.1 度量公理

定义 1.1 (度量空间) 设 X 是一个集合. 一个函数 $d: X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 称为 X 上的**度量**, 如果对任意 $x, y, z \in X$, 都有

$$d(x, y) = 0 \iff x = y, \quad d(x, y) = d(y, x), \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

最后一个条件称为**三角不等式**. 配备了度量的集合 (X, d) 称为**度量空间**.

距离取值有限且非负, 两个不同对象之间的距离严格为正. 三角不等式表达的是: 经过中间点走一段路, 不会比两端之间的直接距离更短. 它也提供了本书最常用的估计方法: 如果目标中的两个点不容易直接比较, 就插入一个已知接近两者的中间点.

集合 X 不必具有加法, 数乘或大小关系. 因而 $x + y$ 在一般度量空间中可能没有意义, 但 $d(x, y)$ 总有意义. 这一区别决定了哪些实分析论证能够原样推广, 哪些需要重新表达.

引理 1.2 (反三角不等式) 在任意度量空间中, 对 $x, y, z \in X$, 有

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

更一般地, 对 $x, x', y, y' \in X$, 有

$$|d(x, y) - d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y').$$

证明. 由 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ 可得 $d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$. 交换 x, y , 得到相反方向的差也不超过 $d(x, y)$, 合并即得第一式. 对第二式, 插入 x' 与 y' , 有

$$d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y') + d(y', y).$$

于是 $d(x, y) - d(x', y') \leq d(x, x') + d(y, y')$. 再交换带撇与不带撇的点即可. $\square$

第一式意味着, 当一个端点移动很少时, 它到固定点的距离也只会改变很少. 第二式允许两个端点同时移动. 下一章中距离与极限之间的相容性, 都将从这一估计直接得到.

定义 1.3 (球, 子空间与有界集) 设 (X, d) 是度量空间, $x \in X$ 且 $r > 0$. 定义**开球**与**闭球**

$$B_X(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad \overline{B}_X(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}.$$

不易混淆时省略下标 X . 如果 $A \subseteq X$, 将 d 限制在 $A \times A$ 上仍得到度量, 称为**子空间度量**. 若存在 $p \in X$ 与 $R \geq 0$, 使每个 $a \in A$ 都满足 $d(a, p) \leq R$, 则称 A **有界**. 空集约定为有界.

子空间度量满足公理, 因为对 A 中任意三个点, 原来的度量公理仍然成立. 子空间中的球由

$$B_A(x, r) = A \cap B_X(x, r) \quad (x \in A)$$

给出. “球”指距离小于指定半径的所有对象, 它不必长成欧氏几何中的圆或圆球. 此外, 闭球记号中的横线只是名称记号; 在一般度量空间中, 它不一定等于相应开球的闭包, 这一差异将在下一章出现.

有界性的中心可以更换. 如果 A 被中心 p , 半径 R 的闭球包含, 那么对另一点 $q \in X$, 三角不等式给出 $d(a, q) \leq R + d(p, q)$. 因而有界性不取决于最初选择哪个中心.

1.2 范数与诱导度量

向量空间中, “两个点相距多远”通常由它们的差向量有多长决定. 这使我们能把度量的构造转化为长度函数的构造.

定义 1.4 (范数) 设 V 是实向量空间. 函数 $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$ 称为**范数**, 如果对任意 $u, v \in V$ 与 $\lambda \in \mathbb{R}$, 满足

$$\|v\| = 0 \iff v = 0, \quad \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|, \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

配备了范数的向量空间称为**赋范空间**.

命题 1.5 若 $\|\cdot\|$ 是 V 上的范数, 则 $d(u, v) = \|u - v\|$ 是度量.

证明. 正定性由 $u - v = 0 \iff u = v$ 得到. 齐次性给出 $\|v - u\| = \|-(u - v)\| = \|u - v\|$, 所以距离对称. 最后,

$$\|u - w\| = \|(u - v) + (v - w)\| \leq \|u - v\| + \|v - w\|,$$

正是度量的三角不等式. □

在 $\mathbb{R}^n$ 上, 对 $v = (v_1, \dots, v_n)$, 最常用的三个范数是

$$\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|, \quad \|v\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)^{1/2}, \quad \|v\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|.$$

它们分别产生 d_1, d_2, d_∞ . 其中 d_2 是欧氏距离. 对 $v \neq 0$, 至少一个坐标不为零, 所以三个范数均严格为正. 齐次性也都直接来自绝对值的齐次性. 三角不等式值得分别核对, 因为它反映了这三种长度对各坐标的不同组合方式.

引理 1.6 (有限维 Cauchy–Schwarz 不等式) 对 $u, v \in \mathbb{R}^n$, 记 $u \cdot v = \sum_{i=1}^n u_i v_i$. 则

$$|u \cdot v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2.$$

证明. 如果 $v = 0$, 结论成立. 如果 $v \neq 0$, 则对任意 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$0 \leq \sum_{i=1}^n (u_i - tv_i)^2 = \|u\|_2^2 - 2t(u \cdot v) + t^2\|v\|_2^2.$$

取 $t = (u \cdot v)/\|v\|_2^2$, 得

$$0 \leq \|u\|_2^2 - \frac{(u \cdot v)^2}{\|v\|_2^2}.$$

移项并开平方即得所需不等式. 这里选择 t 是为了尽量消去 u 在 v 方向上的分量, 也就是让平方和最小. $\square$

命题 1.7 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的范数. 并且对每个 $v \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty, \quad \|v\|_1 \leq \sqrt{n}\|v\|_2.$$

证明. 1-范数的三角不等式来自对每个坐标使用 $|u_i + v_i| \leq |u_i| + |v_i|$, 然后求和. 对最大值范数, 每个坐标都满足

$$|u_i + v_i| \leq |u_i| + |v_i| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty.$$

对 i 取最大值即可. 欧氏范数则使用上一个引理:

$$\begin{aligned} \|u + v\|_2^2 &= \|u\|_2^2 + 2u \cdot v + \|v\|_2^2 \\ &\leq \|u\|_2^2 + 2\|u\|_2\|v\|_2 + \|v\|_2^2 = (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2. \end{aligned}$$

两边均非负, 开平方得到三角不等式.

对于比较不等式, 每一项 $|v_i|$ 都不超过 $\|v\|_2$, 从而 $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2$. 又因为

$$\sum_i |v_i|^2 \leq \left(\sum_i |v_i| \right)^2, \quad \sum_i |v_i| \leq n \max_i |v_i|,$$

得到中间两项. 最后一式对向量 $(|v_1|, \dots, |v_n|)$ 和 $(1, \dots, 1)$ 使用 Cauchy-Schwarz 不等式即可. $\square$

例题 1.1 在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $x = (1, -1)$ 与 $y = (4, 3)$. 求它们在 d_1, d_2, d_∞ 下的距离, 并描述三种度量下以原点为中心, 半径为 1 的开球.

解答. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 取 $x = (1, -1)$ 与 $y = (4, 3)$. 差向量为 $(3, 4)$, 故

$$d_1(x, y) = 7, \quad d_2(x, y) = 5, \quad d_\infty(x, y) = 4.$$

以原点为中心, 半径为 1 的开球, 在 d_2 下是 $x_1^2 + x_2^2 < 1$ 的圆盘, 在 d_1 下是 $|x_1| + |x_2| < 1$ 的菱形内部, 在 d_∞ 下是 $\max\{|x_1|, |x_2|\} < 1$ 的正方形内部. 距离数值和球形状都发生了变化, 但上述比较不等式表明: 任何一种距离足够小, 另外两种也会足够小. 下一章将把这一点精确表述为它们产生相同的开集. $\square$

注 原讲义还提及一般的 p -范数 $\|v\|_p = (\sum_i |v_i|^p)^{1/p}$, 其中 $1 \leq p < \infty$. 其三角不等式是 Minkowski 不等式, 不能从绝对值三角不等式直接推出. 本书这一阶段只使用已经完整证明的 $p = 1, 2, \infty$ 三个版本, 不把一般版本作为隐藏的先修知识.

1.3 离散集合与有限空间

例题 1.2 对任意集合 X , 定义

$$d_{\text{dis}}(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

证明这是度量, 求所有半径的开球, 并判断空间是否有界.

解答. 正定性和对称性由定义直接得到. 若 $x = z$, 三角不等式左边为零. 若 $x \neq z$, 则 y 不可能同时等于 x 和 z , 所以 $d_{\text{dis}}(x, y) + d_{\text{dis}}(y, z) \geq 1 = d_{\text{dis}}(x, z)$.

在这个度量下, 当 $0 < r \leq 1$ 时, $B(x, r) = \{x\}$; 当 $r > 1$ 时, $B(x, r) = X$. 即使 X 有无限多个点, 它仍然有界, 因为所有距离都不超过 1. 有界因而不等于点数有限. $\square$

命题 1.8 (有有限度量空间中的最小间隔) 设 (X, d) 是有限度量空间, 且 X 至少有两个点. 则

$$\eta = \min\{d(x, y) : x, y \in X, x \neq y\} > 0,$$

而且对每个 $x \in X$, 都有 $B(x, \eta) = \{x\}$. 若 X 只有一个点, 每个正半径球也都是这个单点集.

证明. 不同点对的距离组成一个非空有限集, 每个数都严格为正, 故其最小值存在且为正. 当 $y \neq x$ 时, $d(x, y) \geq \eta$, 所以 $y \notin B(x, \eta)$; 而 x 总在自己的正半径球中. $\square$

有限空间中不同点的距离未必全相等, 因而其度量未必是离散度量. 但是它总有一种共同性质: 每个点都可以用足够小的球单独分离出来. 这将使有限度量空间与离散空间在开集, 收敛等性质上相同.

1.4 连续函数空间的度量

设 $a < b$ 为实数, $C([a, b])$ 表示区间 $[a, b]$ 上的实值连续函数全体. 两个函数相等, 指它们在区间的每一点都相等. 函数空间中的“点”是一整个函数; 因而函数空间里的球包含的是许多函数, 并不是定义域上的一个小区间.

命题 1.9 (上确界范数) 对 $f \in C([a, b])$, 定义

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|.$$

这是一个范数, 从而

$$d_{\infty}(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|$$

是 $C([a, b])$ 上的度量.

证明. 连续函数 $|f|$ 在闭有界区间上有最大值, 所以上确界有限. 若范数为零, 则对所有 t , $0 \leq |f(t)| \leq \|f\|_{\infty} = 0$, 从而 f 是零函数. 反之零函数的范数为零. 齐次性来自 $|\lambda f(t)| = |\lambda| |f(t)|$. 最后, 对区间中的每个 t , 都有

$$|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty}.$$

对左边取上确界, 得到范数三角不等式. 再用命题1.5 即得度量结论. $\square$

证明三角不等式时不必先找最大值点. 只要右边是对每个 t 都成立的同一个上界, 它自然也是左边上确界的上界. 这种“先逐点估计, 再取上确界”的方法, 在后续一致收敛与算子连续性中十分常用.

例题 1.3 固定 $f \in C([a, b])$ 和 $r > 0$, 描述上确界度量下 $B(f, r)$ 中的函数. 再在 $[0, 1]$ 上取 $f(t) = t$, $g(t) = t^2$, 求 $d_\infty(f, g)$.

解答. 固定 $f \in C([a, b])$ 和 $r > 0$. 条件 $g \in B(f, r)$ 等价于

$$\sup_{t \in [a, b]} |g(t) - f(t)| < r.$$

由于 $|g - f|$ 在闭区间上取到最大值, 这又等价于每个 t 都满足 $f(t) - r < g(t) < f(t) + r$. 可以把它理解为 g 的整个图像落在 f 上下宽度为 r 的带内. 若定义域不是紧区间, 仅仅逐点严格小于 r 未必能保证上确界也严格小于 r .

例如在 $[0, 1]$ 上取 $f(t) = t$ 与 $g(t) = t^2$, 则

$$d_\infty(f, g) = \max_{0 \leq t \leq 1} (t - t^2) = \frac{1}{4},$$

因为 $t - t^2 = \frac{1}{4} - (t - \frac{1}{2})^2$. 所以 $g \in B(f, r)$ 当且仅当 $r > 1/4$. $\square$

最大偏差并不是唯一合理的函数距离. 如果希望比较整个区间上的累计偏差, 积分可以给出另一种度量.

命题 1.10 (积分距离) 在 $C([a, b])$ 上,

$$d_{L^1}(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$$

是度量. 此外,

$$d_{L^1}(f, g) \leq (b - a)d_\infty(f, g).$$

证明. 非负性, 对称性和距离有限都由连续函数积分的基本性质得到. 要证明正定性, 不能只说“积分为零则函数为零”, 因为这一断言对任意函数并不成立. 此处连续性是关键.

设 $f(t_0) \neq g(t_0)$, 并记 $c = |f(t_0) - g(t_0)| > 0$. 连续性给出 t_0 在 $[a, b]$ 中的一个相对邻域, 在其中 $|f(t) - g(t)| > c/2$. 即使 t_0 是端点, 该邻域也包含一个正长度区间 $J \subseteq [a, b]$. 因而

$$\int_a^b |f - g| dt \geq \int_J |f - g| dt \geq \frac{c}{2} |J| > 0.$$

所以积分距离为零时, $f = g$ 在每一点都成立. 反方向当然成立. 三角不等式由逐点的 $|f - h| \leq |f - g| + |g - h|$ 积分得到. 最后, 对所有 t 有 $|f(t) - g(t)| \leq d_\infty(f, g)$, 对这个常数上界积分即得比较式. $\square$

例题 1.4 在 $[0, 1]$ 上定义 $f_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}$. 求 $d_\infty(f_n, 0)$ 与 $d_{L^1}(f_n, 0)$, 并判断积分距离能否用一个固定常数反向控制上确界距离.

解答. 在 $[0, 1]$ 上定义 $f_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}$. 它是一条高度为 1, 底边长为 $1/n$ 的三角形尖峰. 于是

$$d_\infty(f_n, 0) = 1, \quad d_{L^1}(f_n, 0) = \int_0^{1/n} (1 - nt) dt = \frac{1}{2n}.$$

积分距离趋于零, 最大偏差却始终是 1. 因而上一个命题中的估计不能在全体连续函数上反向成立: 不存在与函数无关的常数 C , 使 $d_\infty(f, g) \leq C d_{L^1}(f, g)$ 总成立. 同一个集合上的不同度量, 确实可能表达不同的接近方式. $\square$

1.5 C^1 空间与微分算子

记 $C^1([a, b])$ 为连续可微实函数的空间, 其中区间内部有导数, 且导数连续延拓到端点; 端点处也可等价地采用相应的单侧导数. 如果只用上确界距离比较函数值, 便可能遗漏其变化速度.

命题 1.11 (C^1 范数与微分算子) 在 $C^1([a, b])$ 上定义

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty, \quad d_{C^1}(f, g) = \|f - g\|_{C^1}.$$

这是范数及其诱导度量. 微分算子

$$D : C^1([a, b]) \rightarrow C([a, b]), \quad Df = f'$$

满足

$$d_\infty(Df, Dg) \leq d_{C^1}(f, g).$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 若 $d_{C^1}(f, g) < \varepsilon$, 就有 $d_\infty(Df, Dg) < \varepsilon$; 特别地, 微分算子连续.

证明. 两个上确界均有限. 若 $\|f\|_{C^1} = 0$, 第一项已保证 $f = 0$. 齐次性由微分的线性和上确界范数的齐次性得到. 对三角不等式, 分别应用

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty, \quad \|f' + g'\|_\infty \leq \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty,$$

再相加即可. 算子估计则来自

$$d_\infty(Df, Dg) = \|f' - g'\|_\infty \leq \|f - g\|_\infty + \|f' - g'\|_\infty.$$

连续性的精确定义将在下一章给出; 此处估计已经给出了对任意精度都可使用的控制. $\square$

例题 1.5 在 $C^1([0, 1])$ 上只用 d_∞ 比较函数, 并在 $C([0, 1])$ 上同样使用 d_∞ . 判断微分算子 $D : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ 是否连续.

解答. 在 $C^1([0, 1])$ 上, 若只用 d_∞ 比较函数, 微分算子便不连续. 取

$$f_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n}.$$

则 $\|f_n\|_\infty \leq 1/n \rightarrow 0$, 但 $f'_n(t) = \cos(nt)$ 且 $\|f'_n\|_\infty = 1$, 因为 $t = 0$ 时导数等于 1. 这说明连续性需要同时说明定义域与值域各使用什么度量. C^1 范数中加入导数项, 正是为了排除“函数很小但振荡很快”的现象. $\square$

只比较导数的表达式 $\|f' - g'\|_\infty$ 也不是整个 $C^1([a, b])$ 上的度量. 不同的常数函数会使它等于零, 违反正定性. 若额外固定一个函数值, 例如限制在满足 $f(a) = 0$ 的子空间, 这一缺陷就消失了. 章末练习将核对这个区别.

1.6 球面上的弦长与测地距离

还有一种差异与函数空间无关: 我们可以用环境空间中的直线距离, 也可以用被限制在对象内部的路径长度. 必须先说清楚对象究竟是哪个集合.

命题 1.12 (单位球面上的两种距离) 设

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_2 = 1\}.$$

这是单位球面, 不包含球体内部. 欧氏距离限制在 S^2 上给出弦长距离 $d_{\text{ch}}(x, y) = \|x - y\|_2$. 另一种距离为

$$d_{\text{geo}}(x, y) = \arccos(x \cdot y) \in [0, \pi],$$

称为单位球面的测地距离. 它等于连接两点的较短大圆弧的长度; 对互为对跖点的两点, 任意相应半大圆的长度都为 π .

证明. 先证明角度公式确实满足度量公理. Cauchy-Schwarz 不等式保证 $x \cdot y \in [-1, 1]$, 所以公式有定义. 又由 $\|x - y\|_2^2 = 2 - 2x \cdot y$, 得到角度为零当且仅当 $x = y$. 对称性也直接成立.

对三角不等式, 记 $\alpha = d_{\text{geo}}(x, z)$, $\beta = d_{\text{geo}}(z, y)$. 若 $\alpha + \beta \geq \pi$, 则 $d_{\text{geo}}(x, y) \leq \pi \leq \alpha + \beta$. 若 $\alpha + \beta < \pi$, 将向量分解为沿 z 的分量和与 z 垂直的分量:

$$x = (\cos \alpha)z + u, \quad y = (\cos \beta)z + v,$$

其中 $u \cdot z = v \cdot z = 0$, $\|u\|_2 = \sin \alpha$, $\|v\|_2 = \sin \beta$. Cauchy-Schwarz 给出

$$x \cdot y = \cos \alpha \cos \beta + u \cdot v \geq \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha + \beta).$$

由于 $\arccos$ 在 $[-1, 1]$ 上递减, 有 $d_{\text{geo}}(x, y) \leq \alpha + \beta$.

为说明“最短路径”确有数学含义, 可把连续路径 $\gamma: [0, 1] \rightarrow S^2$ 的长度定义为各分割下弦长和的上确界:

$$L(\gamma) = \sup_{0=t_0 < \dots < t_m=1} \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\|_2.$$

对夹角 $\theta \in [0, \pi]$, 相应弦长 c 满足 $c = 2 \sin(\theta/2)$, 故当 $c \rightarrow 0$ 时 $\theta/c \rightarrow 1$. 给定 $\varepsilon > 0$, 充分短的弦满足 $\theta \leq (1 + \varepsilon)c$. 路径的三个坐标函数都在 $[0, 1]$ 上连续, 由本章声明的一元分析先修, 它们分别一致连续. 对给定弦长精度, 分别把三个坐标变化控制在该精度的 $1/\sqrt{3}$ 以下, 再取三个有效参数间隔的最小值, 就得到整条路径关于欧氏距离的一致连续性. 因而可以把参数区间分得足够细, 使每一小段两端的弦都满足这一估计. 用已经证明的角度三角不等式, 得

$$d_{\text{geo}}(\gamma(0), \gamma(1)) \leq \sum_j d_{\text{geo}}(\gamma(t_{j-1}), \gamma(t_j)) \leq (1 + \varepsilon)L(\gamma).$$

若路径长度有限, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得角度距离不超过路径长度; 长度无限时结论也成立. 较短大圆弧的长度恰为夹角: 分割弦长和不超过总圆弧长, 而等分后的弦长和 $2m \sin(\theta/(2m))$ 趋于 θ . 所以大圆弧达到上述下界, 测地距离确实是所有

球面内连续路径长度的最小值. $\square$

注 原讲义第 1 讲 Example 18 用了 “unit ball” 一词, 但随后描述的是球面上两点之间的球面路径. 本章明确改为 S^2 . 若对象是实心球 $\{x : \|x\|_2 \leq 1\}$, 两点间的直线段留在球内, 其内部最短路径长度就是欧氏距离, 不能与球面大圆弧混为一谈.

例如北极与赤道上的一点, 弦长为 $\sqrt{2}$, 测地距离为 $\pi/2$; 对跖点的弦长为 2, 测地距离为 π . 两种距离满足

$$d_{\text{ch}}(x, y) \leq d_{\text{geo}}(x, y) \leq \frac{\pi}{2} d_{\text{ch}}(x, y).$$

这里第一式来自 $\sin u \leq u$, 第二式来自 $\sin u \geq 2u/\pi$ 对 $0 \leq u \leq \pi/2$ 的成立; 后一不等式可由正弦函数在该区间的凹性与连接两端的弦线得到. 因而这两种距离虽有不同数值, 对 “趋于某一点” 给出的判断相同.

1.7 练习与解答

以下各题是围绕本章内容设计的编者练习, 不标作 MIT 原习题.

习题 1.1 设 d 是 X 上的度量. 证明 $\rho(x, y) = d(x, y)/(1 + d(x, y))$ 也是度量, 且其所有距离都小于 1. 对 $0 < r < 1$, 求 ρ -球与 d -球之间的关系.

解答. 令 $h(t) = t/(1 + t)$. 它在 $[0, \infty)$ 上严格递增, 且只在 $t = 0$ 取零. 所以正定性, 对称性成立. 对 $a, b \geq 0$, 有

$$h(a + b) = \frac{a}{1 + a + b} + \frac{b}{1 + a + b} \leq \frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b} = h(a) + h(b).$$

由三角不等式与 h 的单调性, $\rho(x, z) \leq h(d(x, y) + d(y, z)) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$. 另外 $h(t) < 1$. 最后,

$$\frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} < r \iff d(x, y) < \frac{r}{1 - r},$$

故 $B_\rho(x, r) = B_d(x, r/(1 - r))$. 若 $r \geq 1$, 则 $B_\rho(x, r) = X$. $\square$

习题 1.2 在 $V = \{f \in C^1([a, b]) : f(a) = 0\}$ 上, 证明 $\|f\|_D = \|f'\|_\infty$ 是范数, 并证明

$$\|f\|_D \leq \|f\|_{C^1} \leq (1 + b - a)\|f\|_D.$$

说明为何在整个 $C^1([a, b])$ 上第一项不是范数.

解答. 若 $\|f'\|_\infty = 0$, 则 $f' = 0$. 由微积分基本定理与 $f(a) = 0$, $f(t) = \int_a^t f'(s) ds = 0$. 因而在 V 上正定性成立. 齐次性与三角不等式由导数的线性及上确界范数的相应性质得到. 同一积分表达式给出

$$|f(t)| \leq \int_a^t |f'(s)| ds \leq (b - a)\|f'\|_\infty,$$

故 $\|f\|_\infty \leq (b - a)\|f\|_D$, 从而得到第二个估计. 第一个估计来自 C^1 范数包含导数项. 在整个空间中, 非零常数函数的导数为零, 所以正定性失败. $\square$

习题 1.3 对 $f \in C([a, b])$, 定义 $Tf(t) = \int_a^t f(s) ds$. 证明 $Tf \in C^1([a, b])$, 且

$$\|Tf - Tg\|_{C^1} \leq (1 + b - a)\|f - g\|_\infty.$$

解答. 微积分基本定理给出 $(Tf)' = f$, 而 f 连续, 所以 $Tf \in C^1([a, b])$. 对每个 t ,

$$|Tf(t) - Tg(t)| \leq \int_a^t |f(s) - g(s)| ds \leq (b - a)\|f - g\|_\infty.$$

取上确界, 再与 $\|(Tf - Tg)'\|_\infty = \|f - g\|_\infty$ 相加, 即得估计. 它说明积分算子不仅控制函数值, 也控制所得函数的一阶导数. $\square$

习题 1.4 判断 $\mathbb{R}$ 上的 $d(x, y) = |x - y|^2$ 是否为度量. 再证明对固定 $0 < \alpha \leq 1$, $d_\alpha(x, y) = |x - y|^\alpha$ 是度量.

解答. 平方距离不是度量. 取 $x = 0, y = 1, z = 2$, 有 $d(0, 2) = 4 > 1 + 1 = d(0, 1) + d(1, 2)$.

对于 $0 < \alpha \leq 1$, 先证 $(a + b)^\alpha \leq a^\alpha + b^\alpha$. 当 $a + b = 0$ 时成立; 否则令 $s = a/(a + b) \in [0, 1]$. 因 $s^\alpha \geq s$ 且 $(1 - s)^\alpha \geq 1 - s$, 两式相加并乘以 $(a + b)^\alpha$ 即得. 于是

$$|x - z|^\alpha \leq (|x - y| + |y - z|)^\alpha \leq |x - y|^\alpha + |y - z|^\alpha.$$

正定性与对称性由绝对值得到, 所以 d_α 是度量. 本题也说明: 把已有距离代入递增函数, 还必须核对该函数是否保留三角不等式. $\square$

习题 1.5 设 $X = \{a, b, c\}$, 指定 $d(a, b) = 2, d(b, c) = 3, d(a, c) = s$, 并用对称性及 $d(x, x) = 0$ 补齐距离. 求所有使 d 成为度量的 s , 并在 $s = 1$ 时写出 $B(a, 1), B(a, 2), B(a, 3)$.

解答. 不同点距离为正要求 $s > 0$. 三个可能有内容的三角不等式分别是 $s \leq 2 + 3, 2 \leq 3 + s, 3 \leq 2 + s$. 合并得 $1 \leq s \leq 5$, 而这一范围也保证全部公理. 当 $s = 1$ 时, 开球的严格不等号不能遗漏, 因而

$$B(a, 1) = \{a\}, \quad B(a, 2) = \{a, c\}, \quad B(a, 3) = X. \quad \square$$

2 序列, 开闭集与连续映射

本章以 Paige Bright 的 MIT OCW 18.S190 IAP 2023 第 2 讲正文第 1-7 页为主要来源, 并衔接第 1 讲第 3-4 页的定义; 子空间, 闭包与边界, 距离函数以及度量与拓扑的比较为编者补充.

有了距离, 就能把实数上的极限定义推广到函数, 向量或更一般的对象. 但度量不仅给出一个数值: 它还说明哪些集合可以作为某一点周围的活动范围. 本章先研究序列如何接近一点, 再把这种接近与开集联系起来, 最后得到连续性的三种等价表达. 这条联系也解释了为何基础拓扑能够从距离的具体公式中抽离出来.

2.1 收敛与 Cauchy 条件

定义 2.1 (序列收敛) 度量空间 (X, d) 中的**序列**是一个映射 $\mathbb{N} \rightarrow X$, 通常记为 $(x_n)_{n \geq 1}$. 对 $x \in X$, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \quad d(x_n, x) < \varepsilon,$$

则称 x_n **收敛于** x , 写作 $x_n \rightarrow x$; x 称为序列的**极限**.

这里 N 可以依赖于 ε , 但在 N 之后必须控制所有项. 极限还必须属于所讨论的空间 X . 比如序列 $1/(n+1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0, 但在子空间 $(0, 1)$ 中没有极限, 因为 0 不是该空间的点. 定义中使用严格不等号只是统一记号; 如果把它改成 $d(x_n, x) \leq \varepsilon$, 仍得到相同概念, 因为可以先对 $\varepsilon/2$ 应用该版本.

定理 2.2 (极限的基本性质) 在度量空间中, 一个收敛序列的极限唯一, 且该序列有界. 若 $x_n \rightarrow x$, 则任何子序列 x_{n_k} 都收敛于同一个 x . 若另有 $y_n \rightarrow y$, 则

$$d(x_n, y_n) \rightarrow d(x, y).$$

证明. 若 x_n 同时趋于 x 和 y , 给定 $\varepsilon > 0$, 可取足够大的 n , 使 $d(x, x_n) < \varepsilon/2$ 且 $d(x_n, y) < \varepsilon/2$. 三角不等式给出 $0 \leq d(x, y) < \varepsilon$. 由于这对每个正 ε 成立, 必有 $d(x, y) = 0$, 即 $x = y$.

为了证明有界, 先对 $\varepsilon = 1$ 取 N , 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < 1$. 余下只有有限多个项. 因而

$$R = \max(\{1\} \cup \{d(x_n, x) : 1 \leq n < N\})$$

是有限数, 且每一项都满足 $d(x_n, x) \leq R$. 使用集合中额外的 1 可以同时处理 $N = 1$, 没有前面例外项的情况.

子序列的下标 $n_1 < n_2 < \dots$ 严格递增, 所以 $n_k \geq k$. 对给定 ε , 原序列在下标 N 以后距 x 小于 ε . 当 $k \geq N$ 时也有 $n_k \geq N$, 故 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon$.

最后, 引理 1.2 给出

$$|d(x_n, y_n) - d(x, y)| \leq d(x_n, x) + d(y_n, y).$$

右边趋于零, 从而得到距离的极限公式. 固定 $y_n = y$ 时, 特别得到 $d(x_n, y) \rightarrow d(x, y)$. □

有界性只能保证各项留在一个大球中, 不能保证它们向同一点靠近. 在实数中, $(-1)^n$ 有界但不收敛. 更强的尾部控制是 Cauchy 条件: 它直接比较后面的项彼此之间的距离, 而无需预先知道极限应在哪里.

定义 2.3 (Cauchy 序列与完备性) 若序列 (x_n) 满足

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon,$$

则称其为 **Cauchy 序列**. 若 X 中每个 Cauchy 序列都收敛于 X 中某一点, 则称 (X, d) **完备**.

命题 2.4 (Cauchy 序列的基本性质) 每个收敛序列都是 Cauchy 序列. 每个 Cauchy 序列都有界. 若一个 Cauchy 序列有子序列收敛于 $x \in X$, 则原序列也收敛于 x .

证明. 若 $x_n \rightarrow x$, 对给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon/2$. 对 $m, n \geq N$, 有

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n) < \varepsilon.$$

若 (x_n) 是 Cauchy 序列, 对精度 1 取 N . 则对 $n \geq N$, 有 $d(x_n, x_N) < 1$. 将前 $N-1$ 项到 x_N 的距离与 1 一起取有限最大值, 就得到整个序列的统一界.

最后设 $x_{n_k} \rightarrow x$. 对精度 $\varepsilon/2$ 取 Cauchy 下标 N . 再取 k 足够大, 使 $n_k \geq N$ 且 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$. 对每个 $n \geq N$, 都有

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon.$$

这里固定一个足够靠后的子序列项作为中间点, 就把子序列的信息传给了整个尾部. $\square$

命题 2.5 (两个 Cauchy 序列之间的距离) 若 (x_n) 和 (y_n) 都是 (X, d) 中的 Cauchy 序列, 则实数序列 $(d(x_n, y_n))$ 收敛, 即使 X 本身不完备.

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取共同下标 N , 使 $m, n \geq N$ 时两序列各自项间距离均小于 $\varepsilon/2$. 由反三角不等式的双端点形式,

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m) < \varepsilon.$$

因此 $(d(x_n, y_n))$ 是实数中的 Cauchy 序列. 实数的完备性保证它收敛. 此处没有假设 x_n 或 y_n 在 X 中有极限, 也没有把不存在的极限代入距离. $\square$

例题 2.1 证明 $(0, 1)$ 的通常距离不完备, 并证明每个离散度量空间都完备.

解答. 在子空间 $(0, 1)$ 的通常距离下, 令 $x_n = 1/(n+1)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $1/(N+1) < \varepsilon/2$. 对 $m, n \geq N$, 有 $|x_m - x_n| \leq x_m + x_n < \varepsilon$, 所以它是 Cauchy 序列. 但它在 $\mathbb{R}$ 中的极限为 0, 而 $0 \notin (0, 1)$. 若它在 $(0, 1)$ 中还有极限, 由同一距离下的极限唯一性, 该极限也只能是 0, 矛盾. 因而 $(0, 1)$ 不完备.

在离散度量下, 对 $\varepsilon = 1/2$ 应用 Cauchy 条件, 得到尾部任意两项的距离小于 $1/2$. 由于离散距离只能是 0 或 1, 这些项必须全部相同. 因而离散度量空间中的 Cauchy 序列最终恒定, 所以每个离散度量空间都完备. $\square$

完备性讨论的是空间是否容纳全部 Cauchy 极限. 后面的完备性与完备化章节会系统发展这个主题. 当前先记住: “收敛 $\Rightarrow$ Cauchy $\Rightarrow$ 有界” 在任何度量空间中成立, 反向则需要额外条件.

2.2 开集, 闭集及其运算

定义 2.6 (开集与闭集) 设 $A \subseteq X$. 若对每个 $x \in A$, 都存在 $r > 0$, 使 $B_X(x, r) \subseteq A$, 则称 A 在 X 中开. 若 $X \setminus A$ 在 X 中开, 则称 A 在 X 中闭. 若 U 是包含 x 的开集, 则称 U 为 x 的开邻域.

本文用“开邻域”明确表示邻域本身开. 有些教材允许“邻域”是任何包含一个开邻域的集合; 两种约定对这里的收敛与连续性结论没有影响.

命题 2.7 (开球与闭球) 每个开球 $B(x, r)$ 都是开集, 每个闭球 $\overline{B}(x, r)$ 都是闭集. 每个单点集 $\{x\}$ 都是闭集.

证明. 若 $y \in B(x, r)$, 则 $s = r - d(x, y) > 0$. 对 $z \in B(y, s)$, 三角不等式给出

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + s = r.$$

所以 $B(y, s) \subseteq B(x, r)$, 证明了开球是开集. 这一论证对 $y = x$ 同样成立, 不必另设特殊情况.

若 $y \notin \overline{B}(x, r)$, 则 $s = d(x, y) - r > 0$. 对 $z \in B(y, s)$, 反三角不等式给出

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(y, z) > d(x, y) - s = r.$$

所以这个球留在闭球的补集中, 补集开, 闭球闭.

若 $y \neq x$, 则 $B(y, d(x, y))$ 不含 x . 因而单点集补集中每一点都有一个仍在补集内的球, 证明单点集闭. $\square$

定理 2.8 (开闭集的集合运算) 在度量空间 X 中, $\emptyset$ 和 X 都既开又闭. 任意族开集的并为开集, 有限多个开集的交为开集. 任意族闭集的交为闭集, 有限多个闭集的并为闭集.

证明. 空集开, 因为其中没有需要核对的小球条件的点. X 开, 因为任何球按定义都在 X 中. 二者互为补集, 所以也都闭.

设 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$, 且每个 U_i 开. 若 $x \in U$, 则 $x \in U_{i_0}$ 对某个下标 i_0 成立. 取 $r > 0$, 使 $B(x, r) \subseteq U_{i_0}$, 自然也有 $B(x, r) \subseteq U$. 所以任意并开.

设 $U_1, \dots, U_m$ 开且 x 属于它们的交. 分别取 $r_i > 0$, 使 $B(x, r_i) \subseteq U_i$. 因为只有有限多个正数, $r = \min_i r_i$ 仍然严格为正. 因而 $B(x, r) \subseteq \bigcap_i U_i$, 证明有限交开. 零个集合的交约定为 X , 也与结论一致.

闭集结论由补集与 De Morgan 律得到. 具体地, 如果每个 F_i 闭, 则

$$X \setminus \bigcap_{i \in I} F_i = \bigcup_{i \in I} (X \setminus F_i)$$

是开集, 所以交闭. 对有限并, 其补集是有限多个开集的交, 因而同样开, 证明并闭. De Morgan 律本身来自逐点判断: 一点不属于并集, 当且仅当它不属于任何一个集合; 一点不属于交集, 当且仅当它不属于其中至少一个集合. $\square$

“有限”这个条件不能删去. 在 $\mathbb{R}$ 中,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}$$

不是开集. 与之对应, $\bigcup_{n=1}^{\infty} [1/n, 1] = (0, 1]$ 不是闭集. 第一个例子中, 每个邻域半径都可以取正, 但无限多个半径的下确界可能为零.

有限集闭, 因为它是有限多个闭单点集的并. 开与闭也不是互相否定的两个形容词. 例如 $[0, 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中既不开也不闭: 点 0 的任何小球都会越过左端点, 而补集在点 1 的任何小球都会遇到 $[0, 1)$. 离散空间的任何子集则既开又闭, 因为每个点都可用单点球隔离. 开闭集合与空间能否被分成两个部分的关系, 将在连通性章节中专门讨论.

命题 2.9 (开集是球的并) $U \subseteq X$ 是开集当且仅当它可以写成 X 中某些开球的并.

证明. 若 U 开, 则对每个 $x \in U$, 取一个 $r_x > 0$ 使 $B(x, r_x) \subseteq U$. 每个 x 都在相应球中, 所以 $U = \bigcup_{x \in U} B(x, r_x)$. 若 $U = \emptyset$, 用空族的并即可. 反方向由每个球开及开集任意并仍开得到. $\square$

2.3 相对开闭性

“这个集合开不开”必须说明它被放在哪个空间中. 子空间中的球只搜索子空间里的点, 因此同一个集合在不同环境里可能有不同的开闭性质.

定理 2.10 (子空间中的开闭集) 设 $A \subseteq X$, 并在 A 上使用子空间度量. 对 $U \subseteq A$, U 在 A 中开当且仅当存在 X 中的开集 O , 使 $U = A \cap O$. 对 $F \subseteq A$, F 在 A 中闭当且仅当存在 X 中的闭集 C , 使 $F = A \cap C$.

证明. 若 $U = A \cap O$, 对每个 $x \in U$, 由 O 开可取 $r_x > 0$ 使 $B_X(x, r_x) \subseteq O$. 于是 $B_A(x, r_x) = A \cap B_X(x, r_x) \subseteq U$, 所以 U 在 A 中开.

反过来, 若 U 在 A 中开, 对每个 $x \in U$ 取 $r_x > 0$, 使 $A \cap B_X(x, r_x) \subseteq U$. 令 $O = \bigcup_{x \in U} B_X(x, r_x)$, 则 O 在 X 中开. 每个 $x \in U$ 都属于 $A \cap O$; 另一方面, $A \cap O$ 中每点落在某个 $A \cap B_X(x, r_x)$ 中, 因而属于 U . 所以 $A \cap O = U$.

闭集版本用 A 中的补集转化为开集版本. 若 $A \setminus F = A \cap O$, 则

$$F = A \setminus (A \cap O) = A \cap (X \setminus O).$$

右边是 A 与 X 中闭集的交. 相反方向使用同一补集关系即可. $\square$

例题 2.2 说明 $[0, 1/2)$ 在 $[0, 1]$ 中相对开, 在 $\mathbb{R}$ 中却不开, 以及 $(0, 1/2]$ 在 $(0, 1)$ 中相对闭, 在 $\mathbb{R}$ 中却不闭.

解答. 在 $X = \mathbb{R}$ 中取 $A = [0, 1]$. 集合 $U = [0, 1/2)$ 是 A 中的开集, 因为 $U = A \cap (-1, 1/2)$, 但它不是 $\mathbb{R}$ 中的开集. 在另一个子空间 $A = (0, 1)$ 中, $F = (0, 1/2]$ 是相对闭集, 因为 $F = A \cap (-\infty, 1/2]$, 但它不是 $\mathbb{R}$ 中的闭集.

任一子空间 A 在自身中总是既开又闭. 这并不表明 A 在环境空间中也开或闭. 例如 $(0, 1)$ 作为自己的全集是闭的, 但在 $\mathbb{R}$ 中不是闭的. $\square$

2.4 内部, 闭包与边界

开集描述一个集合中的点能否容许小幅移动而仍留在集合内. 闭包则描述一个点能否被集合中的点任意逼近. 这两种描述合起来, 能够分清集合内部, 外部及两者之间的边界.

定义 2.11 (内部, 闭包与边界) 对 $A \subseteq X$, 定义

$$A^\circ = \{x \in X : \exists r > 0, B(x, r) \subseteq A\},$$

$$\bar{A} = \{x \in X : \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset\},$$

$$\partial A = \{x \in X : \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset \text{ 且 } B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset\}.$$

它们分别称为 A 在 X 中的**内部**, **闭包**和**边界**. 闭包允许一个点用它自己被“逼近”, 所以 $A \subseteq \bar{A}$.

定理 2.12 (内部与闭包的基本性质) A° 是包含在 A 中的最大开集; $\bar{A}$ 是包含 A 的最小闭集. 因而

$$A \text{ 开} \iff A = A^\circ, \quad A \text{ 闭} \iff A = \bar{A}.$$

此外,

$$\bar{A} = X \setminus (X \setminus A)^\circ, \quad \partial A = \bar{A} \cap \overline{X \setminus A} = \bar{A} \setminus A^\circ.$$

特别地, 边界是闭集, 且 X 可分成三个互不相交的集合

$$X = A^\circ \cup \partial A \cup (X \setminus A)^\circ.$$

证明. 若 $x \in A^\circ$, 取 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq A$. 开球本身开, 且它的每个点都是 A 的内点, 故 $B(x, r) \subseteq A^\circ$. 所以 A° 开. 任意开集 $O \subseteq A$ 中的点都有一个留在 O , 从而留在 A 中的球, 所以 $O \subseteq A^\circ$. 这证明了最大性及开集判据.

按定义, $x \notin \bar{A}$ 当且仅当存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \cap A = \emptyset$, 即 $B(x, r) \subseteq X \setminus A$. 这又等价于 $x \in (X \setminus A)^\circ$. 得到第一条恒等式, 并由内部开得到 $\bar{A}$ 闭. 它包含 A , 因为每个以 $a \in A$ 为中心的球都包含 a .

若 C 闭且包含 A , 对 $x \notin C$, 开集 $X \setminus C$ 包含一个以 x 为中心的球; 该球不与 A 相交. 所以 $x \notin \bar{A}$, 即 $\bar{A} \subseteq C$. 这证明了最小性. 若 A 已闭, 最小性给出 $\bar{A} \subseteq A$, 结合反向包含即得闭集判据.

边界定义要求每个球同时与两边相交, 因而正是 $\bar{A} \cap \overline{X \setminus A}$. 对补集应用第一条恒等式, 得 $\overline{X \setminus A} = X \setminus A^\circ$, 所以边界也等于 $\bar{A} \setminus A^\circ$. 两个闭集的交闭. 最后, 一个点若不在边界, 则至少有某个球完全落在 A 或完全落在其补集中; 它相应属于其中一个内部. 两个内部不相交, 并且都不与边界相交, 得到所述分解. $\square$

例题 2.3 分别求 $\mathbb{R}$ 中 $[0, 1)$ 与 $\mathbb{Q}$ 的内部, 闭包和边界. 再在离散空间中求任意子集的内部, 闭包和边界, 并比较开球的闭包与同半径闭球.

解答. 在 $\mathbb{R}$ 中, 若 $A = [0, 1)$, 则 $A^\circ = (0, 1)$, $\bar{A} = [0, 1]$, $\partial A = \{0, 1\}$. 边界点可能属于 A , 也可能不属于 A .

有理数与无理数在 $\mathbb{R}$ 中都稠密, 因为每个非空实区间都包含两种数. 例如有理数的存在可从 Archimedes 性质先选足够大分母, 再选合适整数分子得到; 在更小区间内找到有理数后加上足够小的非零有理数倍 $\sqrt{2}$, 便得到区间内的无理数. 因而对 $A = \mathbb{Q}$,

$$A^\circ = \emptyset, \quad \bar{A} = \mathbb{R}, \quad \partial A = \mathbb{R}.$$

这提醒我们, 边界并不一定是一条线或少数端点, 它可以是整个空间.

在离散空间中, 每个集合都有单点球留在自己内部, 因而 $A^\circ = A = \bar{A}$, $\partial A = \emptyset$. 在具有至少两个点的离散空间里, $B(x, 1) = \{x\}$, 所以其闭包仍是 $\{x\}$; 但闭球 $\bar{B}(x, 1) = X$. 因此“闭球等于开球闭包”在一般度量空间中不成立. $\square$

定义 2.13 (稠密, 聚点与孤立点) 若 $\bar{A} = X$, 称 A 在 X 中**稠密**. 若 $x \in X$ 的每个球都与 $A \setminus \{x\}$ 相交, 称 x 为 A 的**聚点**. 若 $x \in A$ 且存在球 $B(x, r)$ 满足 $B(x, r) \cap A = \{x\}$, 称 x 为 A 的**孤立点**.

聚点的定义排除了只由点本身贡献的相交. 因此每个孤立点都属于闭包, 但不是聚点. 例如 $A = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset \mathbb{R}$ 中, 0 是聚点, 而每个 $1/n$ 都是孤立点. 对固定 n , 相邻数值与 $1/n$ 的距离严格为正, 取小于这些间隔的半径即可隔离它; $n = 1$ 时只需核对右侧空白与下一项的距离.

命题 2.14 (闭包的集合运算) 若 $A \subseteq B$, 则 $\bar{A} \subseteq \bar{B}$ 且 $A^\circ \subseteq B^\circ$. 对任意 $A, B \subseteq X$, 有

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \quad (A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ, \quad \overline{A \cap B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}.$$

证明. 包含关系的结论直接来自球的定义: 一个球与 A 相交就与 B 相交; 一个球包含在 A 中就包含在 B 中.

单调性给出 $\bar{A} \cup \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. 另一方面, $\bar{A} \cup \bar{B}$ 是包含 $A \cup B$ 的闭集, 由闭包最小性得到反向包含. 对内部, 若球包含在 $A \cap B$ 中, 它也分别包含在两者中. 反之, 若一点分别为两者的内点, 取两个有效半径的较小者, 得到留在交集内的球. 最后一式由 $A \cap B$ 分别包含在 A 与 B 中, 再用单调性得到. $\square$

最后一式可能严格. 取 $A = (0, 1)$, $B = (1, 2)$, 二者的交为空, 但闭包的交为 $\{1\}$. 任意无限并的闭包也未必等于各自闭包的并: 取单点集 $A_n = \{1/n\}$, 各自都闭, 但并集的闭包还包含 0.

2.5 用序列识别拓扑性质

度量空间的小球允许我们用半径 $1/n$ 构造一串逐渐精确的逼近点. 这一可数构造, 是序列能完整识别闭包和连续性的原因.

定理 2.15 (邻域中的最终包含) 对 (X, d) 中的序列 (x_n) 与点 x , 以下两条等价: $x_n \rightarrow x$; 对每个 x 的开邻域 U , 除有限多个下标外, 所有 x_n 都属于 U .

证明. 若 $x_n \rightarrow x$ 且 U 是 x 的开邻域, 取 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U$. 收敛定义保证某个 N 之后各项都在这个球内, 从而都在 U 中.

反过来, 对每个 $\varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon)$ 是 x 的开邻域. 只有有限多个下标的项不在这个球中, 所以取一个大于这些例外下标的 N , 就有 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$. 这正是收敛定义. $\square$

注 这里正确的结论是序列最终在每个邻域中. 原讲义第 2 讲 Theorem 27 的陈述多出否定词 “not”, 与前文实例例子及证明意图不一致. 本章已按收敛定义修正. “有限多个例外” 指下标个数有限, 而不只是例外值的种类有限.

定理 2.16 (闭包与闭集的序列判据) 对 $A \subseteq X$ 与 $x \in X$, 有 $x \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中的序列 (a_n) 使 $a_n \rightarrow x$. 因而 A 闭当且仅当: 每个在 X 中收敛, 且各项都在 A 中的序列, 其极限仍属于 A .

证明. 若 $x \in \bar{A}$, 对每个 $n \geq 1$, 球 $B(x, 1/n)$ 与 A 相交, 选 a_n 为交集中一点. 有 $d(a_n, x) < 1/n$, 因而 $a_n \rightarrow x$. 若 A 为空, 没有这样的 x , 两边同时不成立.

反过来, 若 $a_n \in A$ 且 $a_n \rightarrow x$, 则对任意 $r > 0$, 足够靠后的 a_n 落在 $B(x, r)$ 中, 所以该球与 A 相交, 即 $x \in \bar{A}$.

若 A 闭, 就有 $\bar{A} = A$, 因而上一结论表明所有这样的极限都在 A 中. 若所有这样的极限都在 A 中, 对任意 $x \in \bar{A}$, 用第一部分构造序列并应用假设, 得 $x \in A$. 所以 $\bar{A} \subseteq A$, 从而 A 闭. $\square$

注意判据所说的是“若序列在 X 中收敛”, 并不要求每个 A 中序列都收敛. 例如 $\mathbb{R}$ 是闭集, 其中序列 n 却不收敛.

命题 2.17 (聚点的序列判据) x 是 A 的聚点当且仅当存在由 $A \setminus \{x\}$ 中互不相同的点组成的序列, 收敛于 x .

证明. 若 x 是聚点, 先在 $B(x, 1) \cap (A \setminus \{x\})$ 中取 a_1 . 已取互不相同的 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 后, 取

$$r_n = \min \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{2}d(x, a_1), \dots, \frac{1}{2}d(x, a_{n-1}) \right\} > 0.$$

聚点条件允许在 $B(x, r_n) \cap (A \setminus \{x\})$ 中选 a_n . 此球排除了所有此前的 a_i , 且 $d(a_n, x) < 1/n$, 因而得到互不相同且趋于 x 的序列.

反过来, 若这些点趋于 x , 则每个以 x 为中心的球都包含一个序列项, 该项属于 $A \setminus \{x\}$, 所以 x 是聚点. 互不相同的条件还体现了聚点周围有无限多个不同的点; 仅有常值序列不能证明聚点性质. $\square$

2.6 连续性的等价表达

函数连续意味着输入的小变化只能引起输出的小变化. 为了准确表达, 必须同时指定输入与输出所用的距离, 并区分在一点连续与在整个空间连续.

定义 2.18 (连续与 Lipschitz 连续) 设 $(X, d_X), (Y, d_Y)$ 为度量空间, $f: X \rightarrow Y, c \in X$. 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X, \quad d_X(x, c) < \delta \implies d_Y(f(x), f(c)) < \varepsilon,$$

则称 f 在 c 连续. 若 f 在 X 中每一点连续, 称 f 连续. 如果存在一个与 x, x' 无关的常数 $L \geq 0$, 使

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq L d_X(x, x') \quad (x, x' \in X),$$

则称 f 为 Lipschitz 连续映射.

一般连续性的 δ 可以依赖于 c 与 ε . Lipschitz 估计则用一个常数控制整个空间. 若 $L > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/L$ 即得连续; 若 $L = 0$, f 是常值映射, 也连续. 第 1 章微分算子从 C^1 范数到上确界范数的估计, 就是 $L = 1$ 的例子. 若函数原本定义在 $A \subseteq X$ 上, 应把 A 当作定义域并使用子空间度量, 量词中的 x 只在 A 中变化.

定理 2.19 (点处连续的三个判据) 对 $f: X \rightarrow Y$ 和 $c \in X$, 下列条件等价:

1. f 在 c 满足 ε - δ 连续性定义;
2. 对 X 中每个满足 $x_n \rightarrow c$ 的序列, 都有 $f(x_n) \rightarrow f(c)$;
3. 对 $f(c)$ 的每个开邻域 $U \subseteq Y$, 逆像 $f^{-1}(U)$ 包含 c 的一个开邻域.

证明. 先由第一条推出第二条. 对给定 $\varepsilon > 0$, 连续性给出 $\delta > 0$. 因为 $x_n \rightarrow c$, 某个 N 之后都有 $d_X(x_n, c) < \delta$. 故相同尾部满足 $d_Y(f(x_n), f(c)) < \varepsilon$, 得到像序列收敛.

反过来, 假设 f 在 c 不连续. 否定定义中的量词, 得到一个固定的 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$, 都能找到 $x \in X$ 满足

$$d_X(x, c) < \delta, \quad d_Y(f(x), f(c)) \geq \varepsilon_0.$$

对 $\delta = 1/n$ 逐次选择 x_n . 这样 $x_n \rightarrow c$, 但所有像点到 $f(c)$ 的距离都至少为 ε_0 , 所以像序列不趋于 $f(c)$. 这与第二条矛盾. 反证中 ε_0 必须是固定的, 不能随 n 变化.

再证第一条推出第三条. 若 U 是 $f(c)$ 的开邻域, 取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_Y(f(c), \varepsilon) \subseteq U$. 连续性给出 $\delta > 0$, 从而

$$B_X(c, \delta) \subseteq f^{-1}(B_Y(f(c), \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(U).$$

左边是所需开邻域. 最后, 若第三条成立, 对 $U = B_Y(f(c), \varepsilon)$ 应用它. 所得到的 c 的开邻域包含某个球 $B_X(c, \delta)$, 故这个球的像落在 U 中, 正是第一条. $\square$

注意第三条只要求逆像在点 c 附近包含一个开邻域. 若 f 只在 c 连续, 整个逆像未必开. 当连续性在每一点成立时, 才能得到如下全局结论.

定理 2.20 (连续映射的逆像判据) 对度量空间间的映射 $f: X \rightarrow Y$, 下列条件等价: f 连续; Y 中每个开集的逆像在 X 中开; Y 中每个闭集的逆像在 X 中闭.

证明. 若 f 连续且 $U \subseteq Y$ 开, 对每个 $x \in f^{-1}(U)$, U 是 $f(x)$ 的开邻域. 上一定理给出包含在 $f^{-1}(U)$ 中的 x 的开邻域, 进而给出一个包含在逆像中的小球. 因而逆像开.

若每个开集的逆像开, 固定 $c \in X$ 与 $\varepsilon > 0$. 集合 $f^{-1}(B_Y(f(c), \varepsilon))$ 是包含 c 的开集, 所以包含某个 $B_X(c, \delta)$. 这证明 f 在 c 连续. 因为 c 任意, f 连续.

最后, 逆像与补集可交换:

$$f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A).$$

因此开集逆像开与闭集逆像闭互相等价. $\square$

例题 2.4 给出连续映射不保持开集的像为开集, 也不保持闭集的像为闭集的例子.

解答. 常值映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 0$, 是连续的, 但非空开区间的像为 $\{0\}$, 并非开集. 连续性因而保证的是开集的逆像开, 不是开集的像开.

同样, 闭集的像不一定闭. 连续函数 $f(x) = e^x$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0, \infty)$, 该集合在 $\mathbb{R}$ 中不闭. 后文将看到, 若定义域集合紧, 连续像具有更强的性质; 当前不能把这一额外结论提前套用到任意闭集. $\square$

命题 2.21 (复合与限制) 若 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 连续, 则 $g \circ f$ 连续. 若 $A \subseteq X$, 则 $f|_A: A \rightarrow Y$ 在子空间度量下连续.

证明. 对 Z 中任意开集 U , 有 $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$. 先由 g 连续知内部逆像在 Y 中开, 再由 f 连续知外部逆像在 X 中开. 应用逆像判据, 得到复合连续.

对限制映射, $(f|_A)^{-1}(U) = A \cap f^{-1}(U)$. 右边是 A 与 X 中开集的交, 根据子空间定理在 A 中开. 所以限制也连续. $\square$

2.7 到集合的距离

反三角不等式已经告诉我们, 到固定点的距离是连续函数. 现在将固定点换成一个非空集合, 就得到一个能够识别闭包的重要工具.

定义 2.22 (距离函数) 设 $A \subseteq X$ 非空. 对 $x \in X$, 定义

$$\text{dist}(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

它是 x 到 A 的**距离**. 因为集合非空, 所取下确界是一组有限非负数的下确界, 因而总是一个有限非负实数. 这里不要求存在某个 a 达到下确界.

定理 2.23 (距离函数的连续性与零点) 对非空 $A \subseteq X$, 有

$$|\text{dist}(x, A) - \text{dist}(y, A)| \leq d(x, y).$$

因此距离函数为 1-Lipschitz 连续函数. 此外,

$$\text{dist}(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}.$$

若 A 闭, 零点集恰好是 A .

证明. 对每个 $a \in A$, 有 $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$. 对 a 取下确界, 得

$$\text{dist}(x, A) \leq d(x, y) + \text{dist}(y, A).$$

交换 x, y , 就得到绝对值估计.

若下确界等于零, 对每个 $r > 0$ 都能找到 $a \in A$ 使 $d(x, a) < r$; 否则 r 会是一个正下界, 与下确界为零矛盾. 所以每个球都与 A 相交, 即 $x \in \overline{A}$. 反过来, 若 $x \in \overline{A}$, 每个球都与 A 相交, 则下确界不超过每个正 r , 只能为零. 闭集情形由 $\overline{A} = A$ 得到. $\square$

例题 2.5 举例说明到一个非空集合的距离可以为零却没有最近点, 以及两个非空, 不相交闭集之间的距离可以为零.

解答. 在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = (0, 1)$, 有 $\text{dist}(0, A) = 0$, 但 $0 \notin A$, 所以没有 $a \in A$ 能使 $|0 - a|$ 等于零. 即使 A 闭, 一般度量空间中也不能自动断言最近点存在. 例如取 $X = \{p\} \cup \{a_n : n \geq 1\}$, 对不同点指定

$$d(p, a_n) = 1 + \frac{1}{n}, \quad d(a_n, a_m) = 2 \quad (n \neq m),$$

并用对称性及对角线上取零补齐定义. 所有非零距离都在 $(1, 2]$ 中, 所以三个互不相同的点满足三角不等式: 左边不超过 2, 右边大于 2; 有点重复的情形也直接成立. 因而这是度量. 集合 $A = \{a_n : n \geq 1\}$ 闭, 因为它的补集 $\{p\} = B(p, 1)$ 是开集. 但是 $\text{dist}(p, A) = 1$, 而每个 $d(p, a_n) > 1$, 所以没有最近点. 最近点问题需要额外紧性或几何条件.

两个不相交闭集之间的距离也可能为零. 在 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏距离下, 取

$$F = \{(t, 0) : t \geq 1\}, \quad G = \{(t, 1/t) : t \geq 1\}.$$

它们不相交. F 显然闭; 若 G 中序列 $(t_n, 1/t_n)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中趋于 (t, s) , 则 $t_n \rightarrow t \geq 1$, 且 $1/t_n \rightarrow 1/t$, 所以 $s = 1/t$, 极限仍在 G 中, 由序列判据知 G 闭. 但两点 $(n, 0)$ 与 $(n, 1/n)$ 的距离为 $1/n$, 因而 $\inf\{d(u, v) : u \in F, v \in G\} = 0$. 对一个固定外点到闭集的距离严格为正, 与两个无限闭集之间缺少统一正间隔, 是不同的命题. $\square$

2.8 度量可以不同而拓扑相同

开集保留了每一点附近有哪些可用的活动范围, 但不保留距离的具体数值. 将一个度量所产生的全部开集记为 $\mathcal{T}_d$, 称为它诱导的**度量拓扑**. 定理 2.8 证明了它满足空集和全集属于其中, 任意并封闭及有限交封闭三个性质. 后文的基础拓扑将直接把这三条作为开集系统的公理.

定义 2.24 (同拓扑的度量与同胚) 同一集合 X 上的度量 d 与 ρ 若满足 $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_\rho$, 称为**产生相同拓扑的度量**. 若双射 $h : X \rightarrow Y$ 及其逆映射 h^{-1} 都连续, 称 h 为**同胚**. 同胚保留开集系统, 因而也保留由开集表述的性质.

命题 2.25 (比较小球) d 与 ρ 产生相同拓扑, 当且仅当对每个 $x \in X$ 与每个 $r > 0$, 都能找到 $s, t > 0$ 使

$$B_\rho(x, s) \subseteq B_d(x, r), \quad B_d(x, t) \subseteq B_\rho(x, r).$$

它们产生相同拓扑时, 有完全相同的收敛序列及极限, 并且用二者之一作为定义域或值域的度量, 不改变映射的连续性.

证明. 若拓扑相同, d -球是包含 x 的 ρ -开集, 因而包含某个 ρ -球. 交换角色得到另一包含关系.

反过来, 若小球互相包含的条件成立, 对 d -开集 U 中每一点 x , 先取留在 U 中的 d -球, 再在该球中取一个 ρ -球, 便证明 U 为 ρ -开集. 交换角色得到所有开集相同. 收敛序列相同由邻域判据得到, 连续性相同则由开集逆像判据得到. 此时恒等映射在两个度量空间之间是同胚. $\square$

例如 $\mathbb{R}^n$ 上的 d_1, d_2, d_∞ 产生相同拓扑, 因为第 1 章的范数比较给出了互相包含的小球. 球面弦长距离与测地距离也由同样的理由产生相同拓扑. 练习 1.1 中 $d/(1+d)$ 的球可明确换算, 所以它与 d 也产生相同拓扑.

命题 2.26 (双边常数估计的额外作用) 若存在 $c, C > 0$, 使 $cd(x, y) \leq \rho(x, y) \leq Cd(x, y)$ 对所有 $x, y \in X$ 成立, 则两种度量产生相同拓扑, 具有相同的 Cauchy 序列, 并且其中一个完备当且仅当另一个完备.

证明. 由 $\rho \leq Cd$ 得 $B_d(x, r/C) \subseteq B_\rho(x, r)$; 由 $cd \leq \rho$ 得 $B_\rho(x, cr) \subseteq B_d(x, r)$. 上一命题给出拓扑相同.

若序列为 d -Cauchy, 对精度 ε/C 应用它, 便得到 ρ -Cauchy 条件; 反方向使用精度 $c\varepsilon$. 因而 Cauchy 序列相同. 若 d 完备, 则任何 ρ -Cauchy 序列先是 d -Cauchy, 在 d 中收敛, 再由拓扑相同知也在 ρ 中收敛. 反方向相同. $\square$

这里只说这一较强的双边估计能够保留完备性. 单有拓扑相同, 结论并不成立.

例题 2.6 在 $\mathbb{R}$ 上考虑 $d(x, y) = |x - y|$ 和 $\rho(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$. 证明二者都是度量, 产生相同拓扑, 但一个完备, 另一个不完备. 同时比较二者的有界性.

解答. 在同一集合 $\mathbb{R}$ 上, 考虑

$$d(x, y) = |x - y|, \quad \rho(x, y) = |\arctan x - \arctan y|.$$

$\arctan$ 是单射, 因而 ρ 的正定性成立; 对称性与三角不等式来自实数绝对值, 所以 ρ 是度量.

它与通常距离产生相同拓扑. 一方面, 中值定理与 $0 < (\arctan)'(t) = 1/(1+t^2) \leq 1$ 给出 $\rho(x, y) \leq |x - y|$, 因此通常距离足够小便使 ρ 足够小. 另一方面, 固定 x , $\tan$ 在 $\arctan x$ 处连续, 所以对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$|\arctan y - \arctan x| < \delta \implies |y - x| < \varepsilon.$$

这就给出了反方向的小球包含.

通常实数空间完备, 但 $(\mathbb{R}, \rho)$ 不完备. 序列 $x_n = n$ 的反正切值趋于 $\pi/2$, 所以这些值构成实数 Cauchy 序列, 从而 (n) 为 ρ -Cauchy. 若它在 ρ 中趋于某个 $x \in \mathbb{R}$, 则 $|\arctan n - \arctan x| \rightarrow 0$, 因而 $\arctan x = \pi/2$, 不可能. 所以该序列没有 ρ -极限.

同一开集系统保留了收敛与连续性, 却没有保留 Cauchy 条件. 原因是 Cauchy 条件要求尾部任意两点在一个统一的距离尺度下接近, 而拓扑只指定每一点局部有哪些邻域. 本例也说明有界性不是拓扑不变量: $\mathbb{R}$ 在通常距离下无界, 但所有 ρ -距离都小于 π . $\square$

2.9 练习与解答

以下题目均为编者练习. 前几题训练量词与相对拓扑, 后几题说明常见结论的边界.

习题 2.1 设 (x_n) 是度量空间中的序列. 证明 $x_n \rightarrow x$ 当且仅当每个子序列都有一个进一步的子序列收敛于 x .

解答. 正方向由子序列保持同一极限得到, 每个子序列本身就已经趋于 x .

反方向用反证法. 若 x_n 不趋于 x , 则存在固定 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 N , 都存在 $n \geq N$ 满足 $d(x_n, x) \geq \varepsilon_0$. 递归选取严格递增的下标 n_k , 使这些项全部满足该不等式. 这个子序列的任何进一步子序列仍然距 x 至少为 ε_0 , 不可能趋于 x , 与题设矛盾. $\square$

习题 2.2 设 $A \subseteq X$, $E \subseteq A$. 证明 E 在子空间 A 中的闭包为 $A \cap \overline{E}^X$, 其中上标说明闭包在 X 中取. 再取 $X = \mathbb{R}$, $A = (0, 1]$, $E = (0, 1)$, 求 E 在 A 中的内部, 闭包与边界.

解答. 对 $x \in A$, 有

$$B_A(x, r) \cap E = (A \cap B_X(x, r)) \cap E = B_X(x, r) \cap E,$$

因为 $E \subseteq A$. 所以 x 的每个 A -球与 E 相交, 当且仅当每个 X -球与 E 相交. 将 x 限制在 A 中, 就得到闭包公式.

在具体例子中, $E = A \cap (-1, 1)$, 所以 E 在 A 中开, 内部为 $(0, 1)$. 它在 X 中的闭包是 $[0, 1]$, 与 A 相交得 $(0, 1]$. 因而相对边界为 $\{1\}$. 点 0 不在环境空间 A 中, 不能出现在相对边界里. $\square$

习题 2.3 设 F, G 是度量空间中两个非空, 不相交的闭集. 证明

$$u(x) = \frac{\text{dist}(x, F)}{\text{dist}(x, F) + \text{dist}(x, G)}$$

是连续函数, 满足 $u|_F = 0$ 与 $u|_G = 1$. 不要假定两个集合之间的距离有正下界.

解答. 两个距离函数连续且非负. 若某点分母为零, 则它到 F 与 G 的距离都为零. 由于两集合闭, 该点同时属于 F 与 G , 与不相交矛盾. 因而分母在每一点严格为正; 通过连续实函数的加法与除法, 得到 u 连续.

若 $x \in F$, 分子为零, 而 $x \notin G$ 保证到 G 的距离严格为正, 故 $u(x) = 0$. 若 $x \in G$, 则到 G 的距离为零, 到 F 的距离为正, 故 $u(x) = 1$. 证明只使用了每个固定点的分母为正, 并未要求所有点的分母具有统一正下界. $\square$

习题 2.4 设 $X = U \cup V$, 其中 U, V 是 X 中的开集. 若 $f: X \rightarrow Y$ 的限制 $f|_U$ 和 $f|_V$ 均连续, 证明 f 连续. 再证明将有限个开集换成任意族开集, 结论仍成立.

解答. 对 Y 中开集 O , 限制连续意味着 $f^{-1}(O) \cap U$ 在 U 中开. 因为 U 本身在 X 中开, 子空间中相对开集也是 X 中开集: 它可写成 $U \cap W$ 且 W 在 X 中开. V 同理. 因而

$$f^{-1}(O) = (f^{-1}(O) \cap U) \cup (f^{-1}(O) \cap V)$$

在 X 中开, 逆像判据给出连续. 对任意开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$, 使用 $f^{-1}(O) = \bigcup_i (f^{-1}(O) \cap U_i)$, 并应用任意开集并仍开即可. 这里不需要覆盖有限. $\square$

习题 2.5 在 $X \times Y$ 上使用度量 $D((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}$. 证明这个公式给出度量, 且连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 的图像 $\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ 是闭集. 说明反过来不一定成立.

解答. 正定性与对称性由各个分量得到. 每个分量距离都满足三角不等式, 因而两分量中的任一个都不超过相邻两段的 D 距离之和; 取最大值即得 D 的三角不等式. 此外, 在 D 中收敛等价于两个分量分别收敛.

设 Γ_f 中序列 $(x_n, f(x_n))$ 在积空间中趋于 (x, y) . 则 $x_n \rightarrow x$ 且 $f(x_n) \rightarrow y$. 连续性给出 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, 极限唯一性给出 $y = f(x)$. 所以极限仍在图像中, 由闭集序列判据知图像闭.

反例取 $X = Y = \mathbb{R}$, 并定义 $f(0) = 0$, $f(x) = 1/x$ 对 $x \neq 0$. 它在 0 不连续, 因为 $1/n \rightarrow 0$, 但 $f(1/n) = n$ 不趋于 0. 图像却闭. 若图像中序列 $(x_n, f(x_n))$ 趋于有限点 (x, y) , 当 $x \neq 0$ 时, 最终 $x_n \neq 0$, 且 $f(x_n) \rightarrow 1/x$, 故 $y = 1/x$. 当 $x = 0$ 时, 如果有无限多个 $x_n \neq 0$, 沿这些下标 $x_n \rightarrow 0$, 则 $|f(x_n)| = 1/|x_n| \rightarrow \infty$, 与像序列收敛从而有界矛盾. 因此最终 $x_n = 0$, 得 $y = 0$. 两种情形的极限都在图像中, 图像闭. $\square$

习题 2.6 对于练习 1.1 的 $\rho = d/(1+d)$, 证明 d 与 ρ 具有相同的 Cauchy 序列, 因而完备性相同. 解释这为何不与例 2.6 矛盾.

解答. 因 $\rho(x, y) \leq d(x, y)$, d -Cauchy 立即推出 ρ -Cauchy. 反方向, 给定 $\varepsilon > 0$, 令 $\eta = \varepsilon/(1+\varepsilon) \in (0, 1)$. 由于 $t/(1+t)$ 严格递增,

$$\rho(x_n, x_m) < \eta \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

对 ρ -Cauchy 条件使用精度 η , 就得到 d -Cauchy 条件. 两者已有相同拓扑, 所以收敛序列相同; Cauchy 序列也相同, 完备性因而相同.

例 2.6 只说明同拓扑未必足以保留完备性, 并没有说每一对同拓扑度量都改变完备性. 本题的换算对所有点对使用同一个精度 η , 而反正切例子中从 ρ 小推出 d 小, 只能在一个固定有限点附近使用依赖该点的局部控制. $\square$

3 欧氏空间的紧性

本章以 Paige Bright 的 MIT OCW 18.S190 IAP 2023 第 3 讲为主线重编, 讨论范数、开覆盖与欧氏空间的紧集. 为使证明可以独立追踪, 补写原讲义中的区间端点论证, 并补充嵌套方盒、有限维范数等价与紧支撑的反例. 这些补充是编者组织的学习内容, 不作为原课程的逐字翻译或试题题源. 来源定位: 第 3 讲正文第 1-3 页为范数与支撑, 第 4-7 页为紧性、Heine-Borel 与 Bolzano-Weierstrass. 页码采用原讲义印刷页码, 不含末尾 OCW 许可页.

3.1 范数与线性结构

度量比较两个点之间的距离. 向量空间还允许作差, 因而可以先衡量一个向量的长度, 再把两点之间的距离定义为它们之差的长度. 范数正是与加法和数乘相容的长度概念. 本节以实向量空间为例; 向量空间的代数公理与有限维线性代数作为先修知识.

定义 3.1 (范数) 设 V 是实向量空间. 函数 $\|\cdot\|: V \rightarrow [0, \infty)$ 称为范数, 如果对任意 $u, v \in V$ 与 $\lambda \in \mathbb{R}$ 都有

$$\|v\| = 0 \iff v = 0, \quad \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|, \quad \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

配备范数的向量空间称为赋范空间.

命题 3.2 (范数诱导的度量) 若 $\|\cdot\|$ 是 V 上的范数, 则 $d(u, v) = \|u - v\|$ 是度量. 此外,

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|.$$

证明. 范数的正定性给出 $d(u, v) \geq 0$ 及 $d(u, v) = 0$ 当且仅当 $u = v$. 由齐次性, $\|u - v\| = \|-(v - u)\| = \|v - u\|$, 所以 d 对称. 把 $u - w$ 写成 $(u - v) + (v - w)$, 再使用范数的三角不等式, 得到

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

最后, $\|u\| \leq \|u - v\| + \|v\|$ 给出 $\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$. 交换 u, v 后得到反方向的估计, 合在一起即为所求. $\square$

例题 3.1 对 $x = (x_1, \dots, x_n)$, 定义

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^n |x_j|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|.$$

证明这三个函数都是范数.

解答. 对 $\|\cdot\|_1$, 三角不等式由各坐标上的 $|x_j + y_j| \leq |x_j| + |y_j|$ 相加得到. 对 $\|\cdot\|_\infty$, 各坐标都有 $|x_j + y_j| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$, 取最大值得到三角不等式. 欧氏范数的三角不等式则由有限维 Cauchy-Schwarz 不等式给出:

$$\|x + y\|_2^2 = \|x\|_2^2 + 2 \sum_j x_j y_j + \|y\|_2^2 \leq (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.$$

其余两条范数公理均可直接由坐标定义核对. $\square$

三种长度的数值不相同, 但有不依赖于向量 x 的比较常数:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 \leq n \|x\|_\infty. \quad (3.1)$$

其中 $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$ 来自对 $(|x_j|)$ 与 (1) 使用 Cauchy-Schwarz; 其余估计来自最大项与求和的比较. 因此, 三种度量下的收敛完全相同: 一种长度趋于零, 另外两种也趋于零. 后面将证明这不是三个特殊公式之间的巧合, 而是所有有限维范数共有的性质. 为避免用尚未证明的紧性, 我们先建立欧氏空间的紧性理论, 再完成该结论.

3.2 开覆盖与紧性

有限集合有一个简单性质: 不论怎样给每个点安排一个包含它的开集, 总能从这批开集中挑出有限多个, 仍然覆盖全部点. 紧性把这个性质保留下来, 却不要求集合本身只有有限个点.

定义 3.3 (开覆盖与紧集) 设 $A \subseteq X$, 其中 (X, d) 是度量空间. 若每个 U_i 都在 X 中开, 且

$$A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i,$$

则称 $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 A 的开覆盖. 中选出的子族若仍覆盖 A , 称为子覆盖; 只有有限个成员的子覆盖称为有限子覆盖. 若 A 的每个开覆盖都有有限子覆盖, 就称 A 是紧集.

覆盖要求的是包含关系, 而不要求开集的并恰好等于 A . 例如一个包含 $[0, 1]$ 的开区间就构成 $[0, 1]$ 的开覆盖. 当我们把 A 本身作为度量空间时, 开集是相对于 A 开的. 这两个说法与紧性相容, 但需要说明理由.

命题 3.4 (紧性与子空间) 设 $A \subseteq Y \subseteq X$, 均使用从 X 限制而来的度量. 则 A 作为 X 的子集是紧集, 当且仅当 A 作为 Y 的子集是紧集, 也当且仅当度量空间 A 是紧的.

证明. 先比较 X 与 Y . 若 A 在 X 中紧, 而 $\{V_i\}$ 是由 Y 中开集组成的 A 的覆盖, 则存在 X 中的开集 U_i 使 $V_i = Y \cap U_i$. 因为 $A \subseteq Y$, $\{U_i\}$ 也覆盖 A . 取其中有限子覆盖后, 相应的 V_i 仍覆盖 A .

反过来, 若 A 在 Y 中紧, 对任意 X 中开集给出的覆盖 $\{U_i\}$, 子空间开集 $Y \cap U_i$ 覆盖 A . 取有限多个后, 原来的相应 U_i 也覆盖 A . 再取 $Y = A$, 就得到最后一个等价关系. $\square$

例题 3.2 证明度量空间中的任意有限子集与空集都是紧集.

解答. 对有限子集 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 的任意开覆盖, 对每个 a_j 从覆盖中选一个包含它的成员, 最多选出 m 个就足够. 空集也紧, 因为空子族已经覆盖空集. $\square$

以后关于取得最大值、选定一个点等陈述则要另外要求集合非空.

例题 3.3 证明 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1]$ 在通常实数度量下均不紧.

解答. $\mathbb{R}$ 上的开区间 $U_m = (-m, m)$, $m \geq 1$, 覆盖整个 $\mathbb{R}$. 有限多个的并只等于 $(-M, M)$, 其中 M 是所选指标的最大值, 因而不能覆盖 $\mathbb{R}$. 这说明 $\mathbb{R}$ 不紧.

集合 $(0, 1]$ 虽然有界, 却也不紧. 取 $U_m = (1/m, 2)$, $m \geq 1$. 对每个 $x \in (0, 1]$, 可取 $m > 1/x$ 使 $x \in U_m$, 所以这是一族开覆盖. 有限子族的并为 $(1/M, 2)$, 未覆盖点 $1/(2M)$. 前一个例子中的点可以向无穷远逃逸, 后一个例子中的点可以向缺失的端点 0 逃逸. 这正是接下来闭性与有界性分别要阻止的现象. $\square$

定理 3.5 (度量空间中的紧集闭且有界) 度量空间 X 的每个紧子集 K 都在 X 中闭且有界.

证明. 若 $K = \emptyset$, 两个结论均成立. 以下设 $K \neq \emptyset$, 并固定 $p \in K$. 正整数半径的球 $B_X(p, m)$ 覆盖 X , 当然也覆盖 K . 由紧性, 有有限多个球覆盖 K . 若所选半径的最大值为 M , 则 $K \subseteq B_X(p, M)$, 所以 K 有界.

为了证明闭性, 固定 $z \in X \setminus K$, 并对每个 $q \in K$ 令

$$r_q = \frac{d(z, q)}{3} > 0, \quad W_q = B_X(q, r_q).$$

这些 W_q 覆盖 K , 因而存在 $q_1, \dots, q_s$ 使 $K \subseteq \bigcup_{j=1}^s W_{q_j}$. 令 $r = \min_j r_{q_j} > 0$. 若 $x \in B_X(z, r) \cap K$, 则 x 落在某个 W_{q_j} 内, 于是

$$d(z, q_j) \leq d(z, x) + d(x, q_j) < r + r_{q_j} \leq 2r_{q_j} = \frac{2}{3}d(z, q_j),$$

矛盾. 因此 $B_X(z, r)$ 与 K 不相交. 每个 $z \notin K$ 都有这样的邻域, 所以 $X \setminus K$ 开, 即 K 在 X 中闭. $\square$

上述闭性是相对于指定的环境空间 X 而言的. 每个空间在自身中都是闭集, 却未必紧. 例如 $(0, 1]$ 作为自身的子空间是闭且有界的, 仍不紧. 因而不能把后面的欧氏空间定理误读为任意子空间中闭且有界都紧.

命题 3.6 (紧空间的闭子集) 若 K 是紧度量空间, 且 $F \subseteq K$ 在 K 中闭, 则 F 紧. 特别地, 若 $K \subseteq X$ 紧而 $F \subseteq K$ 在 X 中闭, 也有 F 紧.

证明. 设 $\{V_i\}_{i \in I}$ 是由 K 中开集组成的 F 的覆盖. 因为 F 在 K 中闭, $K \setminus F$ 在 K 中开, 且

$$K = (K \setminus F) \cup \bigcup_{i \in I} V_i.$$

由 K 的紧性选出有限子覆盖. 从这有限子族中去掉 $K \setminus F$ 后, 所剩的 V_i 仍覆盖 F , 因为 $K \setminus F$ 不含 F 的任何点. 因此 F 在 K 中紧, 再由命题 3.4 得到所需的子集紧性. 若 F 在 X 中闭, 它也在 K 中闭, 故属于前一种情形. $\square$

3.3 闭区间与闭方盒

要证明 $\mathbb{R}^n$ 中的闭有界集紧, 不能只重复紧集闭且有界的论证. 我们需要从实数的完备性出发, 真正构造有限子覆盖. 一维情况下, 上确界能描述已经用有限多个开集覆盖到的最远位置.

定理 3.7 (闭区间的紧性) 对实数 $a \leq b$, 闭区间 $[a, b]$ 在通常度量下紧.

证明. 若 $a = b$, 这是单点集, 已知紧. 以下设 $a < b$. 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 $[a, b]$ 的开覆盖, 并令

$$S = \{t \in [a, b] : [a, t] \text{ 可由这族覆盖的有限多个成员覆盖}\}.$$

$a \in S$, 因为某个 U_i 包含 a . 集合 S 非空且上界为 b , 故由实数的上确界性质存在 $c = \sup S \in [a, b]$.

取覆盖中包含 c 的成员 U_{i_0} . 由开放性, 存在 $\delta > 0$ 使 $(c - \delta, c + \delta) \subseteq U_{i_0}$. 上确界的性质保证可以取 $s \in S$ 且 $s > c - \delta/2$: 当 $c = a$ 时取 $s = a$, 当 $c > a$ 时用上确界的逼近性质. 已有有限多个成员覆盖 $[a, s]$, 再加入 U_{i_0} , 就覆盖 $[a, c]$. 因此 $c \in S$. 这一步说明上确界本身也能被有限覆盖, 不能只由 $c = \sup S$ 直接断言这一点.

若 $c < b$, 令 $t = \min\{b, c + \delta/2\}$, 则 $t > c$. 仍用覆盖 $[a, s]$ 的有限子族并加入 U_{i_0} , 就覆盖 $[a, t]$, 所以 $t \in S$, 与 c 是上界矛盾. 因而 $c = b$. 前一段已证明 $c \in S$, 故 $b \in S$, 即整个 $[a, b]$ 有有限子覆盖. $\square$

高维时, 不再有单一的最右端点可供推进. 但可以把方盒不断二分. 如果原覆盖没有有限子覆盖, 那么每一层总有一个小方盒也没有有限子覆盖. 小方盒不断缩小, 最后集中到一个点; 包含这个点的开集就会覆盖整个足够小的方盒, 产生矛盾. 为了让这个论证完整, 先证明其中的实数存在性.

引理 3.8 (嵌套方盒) 设

$$Q_k = \prod_{j=1}^n [a_{k,j}, b_{k,j}], \quad k \geq 1,$$

都是非空闭方盒, 且 $Q_{k+1} \subseteq Q_k$. 则 $\bigcap_{k \geq 1} Q_k \neq \emptyset$. 若还满足 $\max_j (b_{k,j} - a_{k,j}) \rightarrow 0$, 则这个交集恰好只有一个点.

证明. 对每个坐标 j , 嵌套关系给出 $a_{k,j}$ 单调不减、 $b_{k,j}$ 单调不增, 且 $a_{k,j} \leq b_{1,j}$. 定义 $x_j = \sup_{k \geq 1} a_{k,j}$. 对任意固定 k , 有 $a_{k,j} \leq x_j$. 又对所有 $\ell \geq k$ 都有 $a_{\ell,j} \leq b_{k,j}$; 对 $\ell < k$ 则有 $a_{\ell,j} \leq a_{k,j} \leq b_{k,j}$. 所以 $b_{k,j}$ 是所有 $a_{\ell,j}$ 的上界, 从而 $x_j \leq b_{k,j}$. 因此 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 属于每个 Q_k .

若 x, y 均属于交集, 对每个 k, j 都有 $|x_j - y_j| \leq b_{k,j} - a_{k,j}$. 当各边长趋于零时, 令 $k \rightarrow \infty$ 得到 $x_j = y_j$ 对所有 j 成立, 故 $x = y$. $\square$

定理 3.9 (闭方盒的紧性) 每个非空闭方盒 $Q = \prod_{j=1}^n [a_j, b_j]$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的欧氏度量下紧.

证明. 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 Q 的开覆盖, 却没有有限子覆盖. 把每个坐标区间从中点二分, 就把 Q 表为至多 2^n 个闭子方盒的并. 至少一个子方盒没有有限子覆盖; 否则把各子方盒的有限子覆盖合在一起, 就会得到 Q 的有限子覆盖. 选定这样的子方盒为 Q_1 , 再将 Q_1 二分并重复此过程. 因此得到

$$Q \supseteq Q_1 \supseteq Q_2 \supseteq \cdots,$$

其中每个 Q_k 都没有有限子覆盖, 第 j 个坐标的边长为 $(b_j - a_j)2^{-k}$. 允许原来某些边长为零, 这不影响二分和论证.

由嵌套方盒引理, 存在唯一的 $x \in \bigcap_{k \geq 1} Q_k$. 取覆盖中包含 x 的 U_{i_0} , 并取 $r > 0$ 使欧氏球 $B_2(x, r) \subseteq U_{i_0}$. 对每个 $y \in Q_k$, 因为 x 也在 Q_k 中,

$$\|y - x\|_2 \leq 2^{-k} \left(\sum_{j=1}^n (b_j - a_j)^2 \right)^{1/2}.$$

右端随 k 趋于零. 因而当 k 足够大时, 整个 Q_k 都包含在 $B_2(x, r) \subseteq U_{i_0}$ 中. 此时单个 U_{i_0} 就是 Q_k 的有限子覆盖, 矛盾. 所以原开覆盖必有有限子覆盖. $\square$

定理 3.10 (Heine–Borel 定理) 设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$, 其中使用通常欧氏度量. 则 K 紧当且仅当 K 在 $\mathbb{R}^n$ 中闭且有界.

证明. 紧性推出闭且有界已由定理 3.5 证明. 反过来, 空集紧. 对非空闭有界集 K , 可取 $R > 0$ 使 $K \subseteq [-R, R]^n$. 该方盒由定理 3.9 紧, 而 K 在方盒中闭. 命题 3.6 遂给出 K 紧. $\square$

例题 3.4 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 判断单位闭球、单位球面, 以及从单位闭球中删去原点后的集合是否紧.

解答. 闭球 $\{x : \|x\|_2 \leq 1\}$ 与单位球面 $\{x : \|x\|_2 = 1\}$ 都是闭有界集, 因而紧. 删去原点后的集合仍有界, 但不再闭: 点列 $(1/k, 0, \dots, 0)$ 在该集合中而趋于原点. 由紧集必闭, 删点后的集合不紧. 集合名字中的“闭球”指原来的球, 不能自动把后来删点得到的集合也视为闭集. $\square$

3.4 有界点列与有限维范数等价

开覆盖紧性处理的是任意多的开集, 而点列常常更容易直接构造. 二分方盒不仅能从开覆盖中导出有限子覆盖, 也能从有界点列中抽出收敛子列. 两个用途依赖相同的实数完备性, 不必让一个结论的证明预先假设另一个结论.

定理 3.11 (Bolzano–Weierstrass 定理) $\mathbb{R}^n$ 中的每个有界点列都有在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的子列.

证明. 设 $(x_m)_{m \geq 1}$ 有界, 选闭方盒 $Q_0 = [-R, R]^n$ 包含全部点列项. 二分 Q_0 后得到有限多个子方盒. 至少一个子方盒含有无穷多个点列项的指标, 否则有限个有限指标集合的并不可能包含全部正整数. 选这样的方盒为 Q_1 . 再二分 Q_1 , 并在仍有无穷多个指标的子方盒中选择 Q_2 . 递归得到嵌套方盒 Q_k , 其各边长为 $2R2^{-k}$, 而每个指标集合

$$I_k = \{m \geq 1 : x_m \in Q_k\}$$

都无限.

由嵌套方盒引理, 交集恰好为一个点 x . 先取 $m_1 \in I_1$, 再逐次取 $m_k \in I_k$ 且 $m_k > m_{k-1}$. 这是可行的, 因为无限的正整数集合不可能有上界. 严格递增保证所选的是原点列的子列. 因为 x_{m_k} 与 x 都在 Q_k 中,

$$\|x_{m_k} - x\|_2 \leq 2R\sqrt{n}2^{-k} \rightarrow 0.$$

所以 $x_{m_k} \rightarrow x$. □

定义 3.12 (序列紧) 度量空间的子集 A 称为序列紧, 如果每个点列 (x_m) , $x_m \in A$, 都有一个子列收敛到 A 中的某个点. 这里极限属于 A 是定义的一部分.

定理 3.13 (欧氏空间中的序列紧性) 对 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 以下三项等价: A 紧; A 在 $\mathbb{R}^n$ 中闭且有界; A 序列紧.

证明. 前两项由 Heine–Borel 定理等价. 若 A 闭且有界, 对 A 中的任意点列使用 Bolzano–Weierstrass, 得到在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛的子列. 闭性保证这个极限仍在 A 中, 所以 A 序列紧.

反过来, 设 A 序列紧. 若 $x \in \bar{A}$, 对每个 m 选 $a_m \in A \cap B_2(x, 1/m)$. 于是 $a_m \rightarrow x$. 序列紧性给出一个子列收敛到某个 $a \in A$. 这个子列也收敛到 x , 由度量空间中极限的唯一性得 $x = a \in A$. 因此 A 包含所有闭包点, 所以闭. 若 A 无界, 可以选 $a_m \in A$ 使 $\|a_m\|_2 > m$. 对任意严格递增的子列指标 m_k , 都有 $\|a_{m_k}\|_2 > m_k \rightarrow \infty$, 所以该子列不可能收敛: 收敛于 a 会使尾项的长度不超过 $\|a\|_2 + 1$. 这与序列紧性矛盾. 因而 A 也有界. □

本章的依赖关系至此已经清楚: 实数上确界性质给出嵌套方盒; 嵌套方盒分别给出闭方盒紧性与 Bolzano–Weierstrass; 前者结合闭子集命题给出 Heine–Borel, 后者结合闭性给出序列紧. 在一般度量空间中, “闭且有界”无法替代紧性, 但紧与序列紧仍等价. 下一章将另作证明, 而不把 Heine–Borel 当成一般空间的工具.

定义 3.14 (等价范数) 同一向量空间上的范数 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 称为等价, 如果存在与 v 无关的常数 $c, C > 0$, 使

$$c\|v\|_a \leq \|v\|_b \leq C\|v\|_a \quad (v \in V).$$

定理 3.15 (有限维范数等价) $\mathbb{R}^n$ 上的任意范数 $\|\cdot\|$ 都与欧氏范数等价. 因而同一有限维实向量空间上的任意两个范数等价.

证明. 设 $n \geq 1$, 并令 $e_1, \dots, e_n$ 是标准基. 对任意 $x = \sum_j x_j e_j$, 三角不等式、齐次性与 Cauchy–Schwarz 给出

$$\|x\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|e_j\| \leq C\|x\|_2, \quad C = \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{1/2} > 0.$$

因此

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C\|x - y\|_2,$$

即 $x \mapsto \|x\|$ 对欧氏度量连续. 上界容易取得, 困难在于不能让单位向量的范数任意接近零.

若没有正数 c 使所有欧氏单位向量 u 满足 $\|u\| \geq c$, 则对每个 m 可选 u_m 使 $\|u_m\|_2 = 1$ 而 $\|u_m\| < 1/m$. 单位球面是欧氏空间中的闭有界集, 由刚证明的序列紧性, 有子列 $u_{m_k} \rightarrow u$ 且 $\|u\|_2 = 1$. 上一段的连续性又给出 $\|u\| = \lim_k \|u_{m_k}\| = 0$, 与范数的正定性矛盾. 故这样的 $c > 0$ 必定存在.

对 $x \neq 0$, 向量 $u = x/\|x\|_2$ 在单位球面上. 齐次性给出 $\|x\| = \|x\|_2\|u\| \geq c\|x\|_2$; 对 $x = 0$ 也成立. 所以

$$c\|x\|_2 \leq \|x\| \leq C\|x\|_2.$$

若 V 为 n 维, 选定一组基把 V 与 $\mathbb{R}^n$ 线性对应. V 上的范数通过这一对应成为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数. 两个范数各自与欧氏范数比较, 再合并常数, 就得到它们互相等价. 若维数为零, $V = \{0\}$, 任取 $c = C = 1$ 即可. $\square$

推论 3.16 (有限维空间中的拓扑与紧性) 有限维向量空间上的等价范数诱导相同的开集、相同的收敛点列与 Cauchy 点列, 也给出相同的有界集与紧集. 对其中任一范数的度量, 闭有界集均紧.

证明. 若 $c\|v\|_a \leq \|v\|_b \leq C\|v\|_a$, 则对每个 x 与 $r > 0$,

$$B_a(x, r/C) \subseteq B_b(x, r) \subseteq B_a(x, r/c).$$

这些包含关系使任一量度的每个开邻域都包含另一度量的某个开球, 所以开集相同. 范数比较应用于 $x_m - x$ 、 $x_m - x_\ell$ 以及 $x - p$, 分别给出收敛、Cauchy 性与有界性的等价. 紧性只由开集和有限覆盖定义, 因而也相同. 最后选定基, 把闭有界集转为欧氏空间中的闭有界集, 再用 Heine–Borel 即得结论. $\square$

3.5 函数范数与紧支撑

范数不只衡量有限维向量. 连续函数也组成向量空间, 不同范数可以突出函数的不同特征. 这时首先要检查定义的数值是否有限, 而不能仅验证三角不等式.

例题 3.5 在 $C([0, 1])$ 上, 定义

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|, \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

证明两者都是范数. 本例假设读者掌握闭区间上连续函数的 Riemann 积分.

解答. 先说明数值有限. 连续函数 f 的集合 $U_m = \{x \in [0, 1] : |f(x)| < m\}$ 在 $[0, 1]$ 中开, 且随 $m \geq 1$ 覆盖整个区间. 闭区间紧, 所以有限多个 U_m 已覆盖它. 由于 U_m 随 m 增大, 其中指标最大的 U_M 就包含整个区间, 即 $|f(x)| < M$ 对所有 x 成立. 因此上确界范数有限. 连续函数 $|f|$ Riemann 可积, 且积分也有限.

对上确界范数, 正定性来自 $\sup |f| = 0$ 当且仅当各点上 $f = 0$. 齐次性由 $\sup |\lambda f| = |\lambda| \sup |f|$ 得到. 点态不等

式 $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ 在取上确界后给出

$$\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty.$$

对积分范数, 非负性、齐次性与三角不等式分别来自积分的非负性、常数因子法则与点态三角不等式. 唯一需要多解释的是正定性. 若 $f(x_0) \neq 0$, 由连续性, 在某个正长度的子区间 $J \subseteq [0, 1]$ 上有 $|f(x)| \geq |f(x_0)|/2$. 若 x_0 是端点, 就取朝区间内部的单侧子区间. 因而

$$\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{|f(x_0)|}{2} |J| > 0.$$

所以积分等于零只能发生在 f 恒为零时. □

在 $\mathbb{R}$ 上直接写 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ 或 $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx$, 不一定得到有限数. 例如 $f(x) = x$ 无界, 而常值函数 1 的绝对值积分发散. 选择合适的函数空间因此属于定义的一部分. 对连续实值函数, 紧支撑是保证这两个数值有限的一种充分条件.

定义 3.17 (支撑与紧支撑) 设 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 X 是度量空间. 它的支撑定义为

$$\text{supp } f = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}^X.$$

若 $\text{supp } f$ 紧, 则称 f 有紧支撑. 全体有紧支撑的实值连续函数记作 $C_c(X)$.

取闭包是必要的. 函数在某个点恰好为零, 该点仍可能被非零点逼近, 于是仍属于支撑. 对连续函数, 非零点集 $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ 是开集; 支撑则始终是闭集, 两者通常不同.

命题 3.18 (紧支撑的等价表述) 函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 有紧支撑, 当且仅当存在紧集 $K \subseteq X$ 使 f 在 $X \setminus K$ 上恒为零. 特别地, 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 这等价于存在 $R > 0$ 使 f 在 $[-R, R]^n$ 外恒为零.

证明. 若支撑紧, 就取 $K = \text{supp } f$. 不在支撑中的点当然不在非零点集中, 所以函数值为零. 反过来, 若非零点集包含在紧集 K 中, 由紧集闭, 它的闭包仍包含在 K 中. 支撑作为 K 的闭子集紧.

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 紧集有界, 因而包含在某个 $[-R, R]^n$ 中. 反过来, 若函数在此方盒外为零, 该方盒紧, 再用前一结论即可. □

例题 3.6 在 $\mathbb{R}$ 上定义 $f(x) = \max\{1 - |x|, 0\}$. 求它的支撑, 并判断它与零函数是否有紧支撑.

解答. f 的非零点集是 $(-1, 1)$, 支撑为 $[-1, 1]$, 所以它有紧支撑. 尽管 $f(-1) = f(1) = 0$, 这两个点仍在支撑中. 零函数的支撑是空集, 所以零函数也有紧支撑. □

例题 3.7 判断函数 $g(x) = e^{-|x|}$ 是否有紧支撑, 并计算其绝对值在 $\mathbb{R}$ 上的积分.

解答. g 在整个 $\mathbb{R}$ 上均非零, 因而支撑是 $\mathbb{R}$, 不紧. 但

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 2.$$

所以对连续实值函数, 紧支撑是绝对可积的充分条件, 不是必要条件. 对 $f \in C_c(\mathbb{R})$, 其支撑包含在某个闭区间中, 连续性保证区间上有界, 区间外又为零, 因而上确界与绝对值积分都有限. 任意函数的支撑仍可定义, 但若没有连续性或其他可积性条件, 单有紧支撑并不能保证函数有界或可积. $\square$

3.6 编者练习与解答

本节各题由编者为本章知识组织, 不声称来自 MIT 原习题或新领军真题. 做题时先确定环境空间, 再判断闭性、有界性与极限是否留在集合中.

习题 3.1 证明度量空间中有限多个紧集的并紧. 再说明无限多个紧集的并未必紧.

解答. 设 $K = K_1 \cup \cdots \cup K_m$, 各 K_j 紧. K 的任意开覆盖也是每个 K_j 的开覆盖, 所以对每个 j 可取有限子族覆盖 K_j . 把这 m 个有限子族合并, 仍只有有限多个成员, 并覆盖 K . 故 K 紧. 对无限并, $\mathbb{R} = \bigcup_{m \geq 1} [-m, m]$, 各闭区间紧, 但 $\mathbb{R}$ 不紧. $\square$

习题 3.2 判断下列集合在 $\mathbb{R}$ 中是否紧, 并说明理由:

$$A = \{1/m : m \geq 1\}, \quad B = A \cup \{0\}, \quad C = \mathbb{Q} \cap [0, 1].$$

解答. A 有界, 但点列 $1/m \rightarrow 0$ 且 $0 \notin A$, 所以 A 在 $\mathbb{R}$ 中不闭, 因而不紧. B 有界且闭. 为核对闭性, 若 $x \notin B$, 则 $x \neq 0$. 在不含 0 的一个小邻域中, 只有有限多个 $1/m$ 可能出现; 再缩小半径避开这有限个点, 就得到与 B 不相交的邻域. 故补集开, 从而 B 紧. C 有界但不闭, 因为可取有理数列趋于 $[0, 1]$ 内的无理数, 例如 $\sqrt{2}/2$. 极限不在 C 中, 所以 C 不紧. $\square$

习题 3.3 在 $C([0, 1])$ 上证明 $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$. 是否存在常数 $c > 0$ 使所有连续函数都满足 $c\|f\|_\infty \leq \|f\|_1$?

解答. 因为区间长度为 1, 积分估计给出 $\int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dx = \|f\|_\infty$. 对 $m \geq 1$, 令 $f_m(x) = \max\{1 - mx, 0\}$. 则 f_m 连续, $\|f_m\|_\infty = 1$, 而

$$\|f_m\|_1 = \int_0^{1/m} (1 - mx) dx = \frac{1}{2m}.$$

若存在这样的 c , 就有 $c \leq 1/(2m)$ 对所有 m 成立, 矛盾. 两个范数因此不等价. 有限维范数等价定理中的维数条件不能删去. $\square$

习题 3.4 在度量空间 $X = (0, 1)$ 中, 判断 $A = [1/3, 2/3]$ 与 $D = (0, 1/2]$ 是否紧. 说明“在 X 中闭且有界”为什么不能直接决定答案.

解答. A 在 $\mathbb{R}$ 中闭且有界, 因而紧; 子空间命题说明它作为 X 的子集仍紧. D 在 X 中闭, 因为 $X \setminus D = (1/2, 1)$ 在 X 中开; 它也有界. 但取 $x_m = 1/(m+2) \in D$, 任何子列在 $\mathbb{R}$ 中都趋于 0, 因而不可能在 X 中收敛. 或直接取 X 中开集 $V_m = X \cap (1/m, 1)$ 覆盖 D , 有限个的并漏掉充分小的正数. 所以 D 不紧. Heine–Borel 的闭性要求是在整个欧氏空间中闭, 不是仅在任意子空间中闭. $\square$

习题 3.5 设 $f, g \in C_c(X)$, 其中 X 是度量空间. 证明 $f+g$ 与 fg 均有紧支撑, 并给出它们的支撑与原支撑之间的包含关系.

解答. 若 $f(x) + g(x) \neq 0$, 则至少一个函数在 x 非零, 所以

$$\{f + g \neq 0\} \subseteq \operatorname{supp} f \cup \operatorname{supp} g.$$

右端是两个闭集的并, 因而闭. 取闭包后得 $\operatorname{supp}(f + g) \subseteq \operatorname{supp} f \cup \operatorname{supp} g$. 右端由有限并练习紧, 所以左端作为其闭子集紧. 同理, $fg \neq 0$ 要求 $f \neq 0$ 且 $g \neq 0$, 故

$$\operatorname{supp}(fg) \subseteq \operatorname{supp} f \cap \operatorname{supp} g.$$

右端为 $\operatorname{supp} f$ 的闭子集, 因而紧, 左端亦紧. 加法时可能有抵消, 所以第一条通常只能写包含关系, 不能写等号. $\square$

4 一般度量空间的紧性

本章以 Paige Bright 的 MIT OCW 18.S190 IAP 2023 第 4 讲为主线重编. 核心是把开覆盖、收敛子列和 Cauchy 点列三种语言联系起来, 并用紧性证明连续像、极值与非空交结论. 编者补写递归抽取的指标选择、空集约定及紧集间的距离, 修正原稿中同一半径球内两点的距离估计. 一致连续与完备化分别留待后续章节. 来源定位: 第 4 讲正文第 1–2 页为 Lebesgue 数、全有界与紧性的等价, 第 3–4 页为连续像、极值、有限交性质及完备性; 本章补充一般度量空间版本与完整证明. 页码采用原讲义印刷页码.

4.1 紧、序列紧与全有界

上一章中, 闭性使有界点列的极限留在集合中, 而有界性配合有限维坐标保证能抽出收敛子列. 在一般度量空间中, 坐标方盒未必存在, 有界性也可能太弱. 我们需要一种更细的控制: 不仅把全部点装进一个大球, 而且能在每一个指定尺度上, 用有限多个小球覆盖全部点.

本章把 X 本身作为度量空间讨论. 对子集 $K \subseteq X$, 所有结论都可应用于限制度量后的空间 K ; 其中的球就是 $B_K(x, r) = K \cap B_X(x, r)$.

定义 4.1 (序列紧、全有界与完备) 度量空间 (X, d) 称为序列紧, 如果其中的每个点列都有收敛到 X 中某点的子列. 称 X 全有界, 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限多个点 $p_1, \dots, p_m \in X$, 使

$$X = \bigcup_{j=1}^m B_X(p_j, \varepsilon).$$

这样的有限点集称为一个有限 ε -网, 这里使用严格小于 ε 的开球约定.

点列 (x_n) 称为 Cauchy 点列, 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$. 若 X 中每个 Cauchy 点列都收敛到 X 内的点, 则称 X 完备.

空空间按定义紧、序列紧、全有界且完备. 全有界性在空空间中用空的有限网即可. 下面在需要选取点时可直接排除这一平凡情况.

例题 4.1 在无限集合 X 上定义离散度量

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

判断 X 是否有界、全有界、完备以及紧.

解答. 所有距离都不超过 1, 所以 X 有界. 但当 $0 < \varepsilon < 1$ 时, 每个 ε -球都只是一个单点, 有限多个球不能覆盖无限集合. 因而 X 不全有界, 也不紧: 全部单点组成开覆盖, 却没有有限子覆盖. 此空间完备, 因为 Cauchy 点列取 $\varepsilon = 1/2$ 后必须最终恒定. 所以完备与有界合起来仍不足以得到紧性. $\square$

命题 4.2 (全有界的基本性质) 全有界空间必有界, 它的任意子空间也全有界. 有限维欧氏空间中的每个有界子集全有界.

证明. 若 X 非空且全有界, 取有限 1-网 $p_1, \dots, p_m$. 对任意 $x \in X$, 选 j 使 $d(x, p_j) < 1$. 则

$$d(x, p_1) < 1 + \max_{1 \leq j \leq m} d(p_j, p_1),$$

所以 X 包含在某个以 p_1 为中心的有限半径球中.

设 $A \subseteq X$, 要在 A 中选有限 ε -网. 先取 X 的有限 $\varepsilon/2$ -网. 对每个与 A 相交的球 $B_X(p_j, \varepsilon/2)$, 从交集选 $a_j \in A$. 若 $a \in A$ 落在这个球中, 则 $d(a, a_j) \leq d(a, p_j) + d(p_j, a_j) < \varepsilon$. 因此有限多个 $B_A(a_j, \varepsilon)$ 覆盖 A . 这一步需要移动球心, 因为原来网的球心未必属于 A .

最后, 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界, 把它装进某个方盒. 对给定 $\varepsilon > 0$, 把方盒分成有限个边长小于 $\varepsilon/\sqrt{n}$ 的小方盒. 从每个与 A 相交的小方盒中选一个 A 中的点. 同一小方盒内任意两点的欧氏距离小于 ε , 所选点便构成有限 ε -网. 空集的情形均用空网处理. $\square$

引理 4.3 (Cauchy 点列中的收敛子列) 收敛点列是 Cauchy 点列. 若一个 Cauchy 点列 (x_n) 有子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$, 则整个点列都收敛到 x .

证明. 若 $x_n \rightarrow x$, 对给定 $\varepsilon > 0$, 当 m, n 足够大时 $d(x_m, x) < \varepsilon/2$ 且 $d(x_n, x) < \varepsilon/2$, 从而 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

再设 (x_n) 为 Cauchy 点列且 $x_{n_k} \rightarrow x$. 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$. 选一个固定的子列项 x_{n_k} , 使

$n_k \geq N$ 且 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$. 对每个 $n \geq N$, 都有

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon.$$

这对所有尾项成立, 因而 $x_n \rightarrow x$. 仅估计某一个 x_N 到 x 的距离不能代替这一步. $\square$

4.2 紧性等价定理的证明

我们将先证明开覆盖紧性推出序列紧, 再证明序列紧推出全有界与完备. 反向的抽取依靠全有界, 让子列先成为 Cauchy 点列, 再由完备性得到极限. 最后使用 Lebesgue 数, 把序列紧重新转回有限子覆盖. 这样每一步只使用已经证明的结果.

定理 4.4 (紧性推出序列紧) 每个紧度量空间都序列紧.

证明. 设 X 紧, 假设存在点列 (x_n) 没有任何在 X 中收敛的子列. 对每个 $x \in X$, 必存在 $r_x > 0$, 使 $B_X(x, r_x)$ 只包含有限多个点列项的指标. 否则, 对每个 k 球 $B_X(x, 1/k)$ 都包含无穷多个指标, 我们便可逐次选取

$$n_1 < n_2 < \cdots, \quad x_{n_k} \in B_X(x, 1/k),$$

于是 $x_{n_k} \rightarrow x$, 与假设矛盾.

全部 $B_X(x, r_x)$ 构成 X 的开覆盖. 由紧性, 有有限多个这样的球覆盖 X . 每个所选球只包含有限多个点列项的指标, 所以它们的有限并只包含有限多个指标. 但它们覆盖 X , 就必须包含每个 x_n , 即必须包含全部正整数指标, 矛盾. 因而每个点列必有收敛子列. $\square$

这里数的是指标, 不是不同点的个数. 如果某个点在点列中反复出现无穷次, 本来就有恒定的收敛子列. 上述证明统一处理了重复出现与各项不同两种情形, 不需要预先把点列改成两两不同.

命题 4.5 (序列紧性推出全有界与完备) 每个序列紧的度量空间都全有界且完备.

证明. 先证全有界. 若不全有界, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使任何有限多个半径为 ε_0 的球都不能覆盖 X . 任选 $x_1 \in X$, 再递归选择

$$x_{n+1} \in X \setminus \bigcup_{j=1}^n B_X(x_j, \varepsilon_0).$$

每一步的补集非空, 所以选择可行. 于是当 $i \neq j$ 时 $d(x_i, x_j) \geq \varepsilon_0$. 这个点列的任何子列都不是 Cauchy 点列, 因为不同两项之间的距离始终至少为 ε_0 . 由引理 4.3, 它也没有收敛子列, 与序列紧性矛盾.

再证完备. 任取 X 中的 Cauchy 点列, 序列紧性保证它有收敛于 X 中某点的子列. 同一引理说明原点列收敛到这个点. 因此每个 Cauchy 点列都在 X 中收敛, 即 X 完备. $\square$

引理 4.6 (全有界空间中的子列抽取) 全有界度量空间中的每个点列都有 Cauchy 子列.

证明. 设 (x_n) 是 X 中的点列. 对每个整数 $k \geq 1$, 取一个有限的半径 $1/k$ 的球覆盖. 第一层覆盖中, 至少有一个球 $B_X(p_1, 1)$ 含有无穷多个点列项的指标. 记这些指标组成的集合为 I_1 .

已构造无限指标集合 I_{k-1} 后, 用第 k 层的有限球覆盖这些指标对应的点. 至少一个球 $B_X(p_k, 1/k)$ 含有无穷多个来自 I_{k-1} 的指标. 令

$$I_k = \{n \in I_{k-1} : x_n \in B_X(p_k, 1/k)\}.$$

因此 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$, 且每个 I_k 都无限. 这里 p_k 是第 k 层有限覆盖中选出的球心, 不要求各层球彼此包含.

从 I_k 中依次选取 $n_k > n_{k-1}$, 得到真正的子列 (x_{n_k}) . 对任意固定的 N , 若 $k, \ell \geq N$, 则 $n_k \in I_k \subseteq I_N$ 且 $n_\ell \in I_\ell \subseteq I_N$, 所以两点都在 $B_X(p_N, 1/N)$ 内. 故

$$d(x_{n_k}, x_{n_\ell}) \leq d(x_{n_k}, p_N) + d(p_N, x_{n_\ell}) < \frac{2}{N}. \quad (4.1)$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $2/N < \varepsilon$, 就证明该子列为 Cauchy 点列. 无穷多个指标保证每次能选比前一次更大的指标; 单纯在各个球中随便取点, 不足以得到原点列的子列. $\square$

推论 4.7 (完备且全有界推出序列紧) 若 X 完备且全有界, 则 X 序列紧.

证明. 任取点列. 由上一引理, 它有 Cauchy 子列; 由完备性, 这个子列收敛到 X 中的某点. 这正是序列紧的定义. $\square$

剩下的问题是怎样从收敛子列推出有限覆盖. 全有界性会给出有限个同半径的球, 但原来的覆盖成员可能大小不一. 我们需要证明: 对每个固定的开覆盖, 总能找到一个统一的正半径, 使以任意点为中心的这个半径的球都落进某个覆盖成员中. 统一的是半径, 而允许使用的覆盖成员随中心改变.

引理 4.8 (Lebesgue 数引理) 设 X 是序列紧度量空间, $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 是 X 的开覆盖. 则存在 $r > 0$, 使对每个 $x \in X$, 都有某个 $i \in I$ 满足

$$B_X(x, r) \subseteq U_i.$$

这样的 r 称为这个覆盖的一个 Lebesgue 数, 这里采用球包含版本的定义.

证明. 空空间中取任意 $r > 0$ 即可. 设 $X \neq \emptyset$. 若结论不成立, 则对每个 $r > 0$, 都能找到一个中心 $x \in X$, 使这个半径的球不包含于任何 U_i . 对 $r = 1/n$, 选取这样的 x_n , 即

$$B_X(x_n, 1/n) \not\subseteq U_i \quad \text{对每个 } i \in I.$$

由序列紧性, 有子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$. 取 i_0 使 $x \in U_{i_0}$; 由开放性, 存在 $\rho > 0$ 使 $B_X(x, \rho) \subseteq U_{i_0}$. 当 k 足够大时, 同时有

$$d(x_{n_k}, x) < \rho/2, \quad 1/n_k < \rho/2.$$

若 $y \in B_X(x_{n_k}, 1/n_k)$, 则

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < 1/n_k + \rho/2 < \rho.$$

因此 $B_X(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B_X(x, \rho) \subseteq U_{i_0}$, 矛盾. 故所需的 r 存在. $\square$

注 有的书把 Lebesgue 数定义为正数 λ , 使每个直径小于 λ 的非空子集都包含在某个覆盖成员中. 球包含版本给出这个版本: 若 $\text{diam } A < r$ 且 $a \in A$, 则 $A \subseteq B_X(a, r)$. 反过来, 若使用直径版本的 λ , 则 $B_X(x, \lambda/3)$ 的直径至多 $2\lambda/3 < \lambda$, 从而得到球包含版本. 两种版本表达相同的统一尺度思想, 使用时要注意半径与直径的因子.

定理 4.9 (序列紧性推出紧性) 每个序列紧度量空间都紧.

证明. 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 X 的任意开覆盖. 由 Lebesgue 数引理取 $r > 0$. 序列紧性已经推出全有界, 因而可取有限 r -网 $p_1, \dots, p_m$. 对每个球 $B_X(p_j, r)$, 由 Lebesgue 数性质选 i_j 使该球包含在 U_{i_j} 中. 所以

$$X = \bigcup_{j=1}^m B_X(p_j, r) \subseteq \bigcup_{j=1}^m U_{i_j}.$$

这就是原覆盖的有限子覆盖. 空空间直接用空子覆盖. $\square$

定理 4.10 (度量紧性的三个等价条件) 对任意度量空间 X , 下列条件等价:

1. X 紧, 即每个开覆盖都有有限子覆盖.
2. X 序列紧, 即每个点列都有在 X 中收敛的子列.
3. X 完备且全有界.

证明. 定理 4.4 给出第一项推出第二项. 命题 4.5 给出第二项推出第三项. 推论 4.7 给出第三项推出第二项. 定理 4.9 给出第二项推出第一项. 因此三者等价, 且这些方向的证明没有使用一般空间中不成立的 Heine-Borel 性质. $\square$

例题 4.2 比较区间 $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ 的全有界性、完备性和紧性.

解答. 区间 $(0, 1)$ 全有界, 因为它是有界的欧氏子集, 但不完备: Cauchy 点列 $1/(n+1)$ 的唯一实数极限为 0, 不属于此空间. 它因而不紧. $\mathbb{R}$ 完备, 但不全有界: 有限多个半径为 1 的球的并仍有界, 不能覆盖 $\mathbb{R}$. 前面的无限离散空间则表明, 把全有界放宽成有界, 即使保留完备也不能得到紧性. $\square$

4.3 有限交性质与嵌套紧集

开覆盖使用并集来表达“所有点都被照顾到”. 取补集后, 同一个事实可以改写成闭集交为空. 因而有限子覆盖与有限交之间有一个对偶关系: 在紧空间中, 若每次有限地施加闭条件都还有解, 就不能在施加全部条件时突然失去所有解.

定义 4.11 (有限交性质) 空间 X 的子集族 $\{F_i\}_{i \in I}$ 称为具有有限交性质, 如果对每个有限指标集 $J \subseteq I$, 都有

$$\bigcap_{j \in J} F_j \neq \emptyset.$$

约定没有任何集合参与时的交集为 X , 即 $\bigcap_{j \in \emptyset} F_j = X$. 因此这个定义也包含空的有限子族; 在非空空间中, 它不额外增加条件.

定理 4.12 (紧性的有限交刻画) 度量空间 X 紧, 当且仅当每一族具有有限交性质的、在 X 中闭的子集 $\{F_i\}_{i \in I}$ 都满足

$$\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset.$$

证明. 先设 X 紧. 如果闭集族的总交为空, 则其开补集 $U_i = X \setminus F_i$ 覆盖 X . 紧性给出有限子覆盖 $U_{i_1}, \dots, U_{i_m}$, 从而

$$\bigcap_{j=1}^m F_{i_j} = X \setminus \bigcup_{j=1}^m U_{i_j} = \emptyset,$$

与有限交性质矛盾.

反过来, 假设每个这样的闭集族均有非空总交. 若有开覆盖 $\{U_i\}$ 没有有限子覆盖, 则对每个有限 $J \subseteq I$,

$$\bigcap_{j \in J} (X \setminus U_j) = X \setminus \bigcup_{j \in J} U_j \neq \emptyset.$$

所以闭集族 $F_i = X \setminus U_i$ 具有有限交性质, 按假设其总交非空. 但 $\{U_i\}$ 覆盖 X 意味着这个总交为空, 矛盾. 故每个开覆盖都有有限子覆盖, 即 X 紧.

若 $X = \emptyset$, 它紧, 且没有任何子集族满足本定义的有限交性质, 因为空的有限子族的交已经是空集. 所以右侧的全称条件也成立. 上述约定保证空空间不会成为例外. $\square$

有限交刻画与定理 4.10 的三项一起, 就得到原课程中紧性的四种等价描述. 有限交性质必须配合闭性. 例如在紧空间 $[0, 1]$ 中, 集合 $F_n = (0, 1/n)$ 具有有限交性质, 却有空的总交; 它们都不在 $[0, 1]$ 中闭.

定理 4.13 (嵌套非空紧集之交) 设 X 是度量空间, 且

$$K_1 \supseteq K_2 \supseteq K_3 \supseteq \dots$$

是一列非空紧子集, 则 $\bigcap_{n \geq 1} K_n \neq \emptyset$.

证明. 每个 K_n 都在 X 中闭, 因而也在 K_1 中闭. 任意有限个 K_n 的交就是其中指标最大的那个集合, 所以非空. 把它们看成紧空间 K_1 的闭子集族, 应用有限交刻画, 就得到总交非空.

也可以直接用序列紧性理解这个结论. 对每个 n 取 $a_n \in K_n$. 因为 $a_n \in K_1$ 且 K_1 紧, 存在同一个收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow a \in K_1$. 对任意固定的 m , 当 k 足够大时 $n_k \geq m$, 故 $a_{n_k} \in K_{n_k} \subseteq K_m$. K_m 闭, 所以 $a \in K_m$. 这对每个 m 都成立, 于是 a 属于全部 K_m . 不需要为不同的 m 另选不同的收敛子列, 也不能仅由另一个子列存在就断言它有同一个极限. $\square$

注 此定理不要求 $\text{diam } K_n \rightarrow 0$. 若另有这个条件, 交集至多含一个点, 因为交集中的任意 x, y 都满足 $d(x, y) \leq \text{diam } K_n$ 对所有 n 成立. 结合非空性, 此时交集恰好是单点. 后面的完备性章节会讨论另一种 Cantor 交集定理: 用完备空间、非空闭集和直径趋于零来替代这里各集合的紧性.

例题 4.3 在 $\mathbb{R}$ 中取 $K_n = [n, \infty)$ 与 $H_n = (0, 1/n)$, $n \geq 1$. 分别求它们的总交, 并说明为什么不违背嵌套紧集的交定理.

解答. K_n 非空、闭且嵌套, 但不紧. 任意实数 x 都不属于某个 $n > x$ 对应的 K_n , 所以总交为空. H_n 非空、有界且嵌套, 直径甚至趋于零, 但不闭. 若 x 在全部 H_n 中, 则 $0 < x < 1/n$ 对所有 n 成立, 不可能. 所以总交也为空. 两者都没有满足紧性假设, 这两个例子分别说明不能任意删去控制逃逸或保留极限的条件. $\square$

4.4 连续像、最值与最小距离

连续性用开集的逆像来描述, 因而特别适合与开覆盖定义相接. 若目标空间中的开集覆盖了函数像, 把它们拉回原空间就会覆盖定义域. 定义域紧时, 选出的有限子覆盖又可以送回目标空间.

定理 4.14 (紧集的连续像) 设 K 是紧度量空间, Y 是度量空间, $f: K \rightarrow Y$ 连续. 则 $f(K)$ 是 Y 的紧子集. 特别地, 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续而 $K \subseteq X$ 紧, 则 $f(K)$ 紧.

证明. 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 是 $f(K)$ 的开覆盖, 各 U_i 在 Y 中开. 连续性保证 $V_i = f^{-1}(U_i)$ 在 K 中开. 因为每个 $x \in K$ 的像落在某个 U_i 中, 所以 $\{V_i\}$ 覆盖 K . 由紧性, 可选 $V_{i_1}, \dots, V_{i_m}$ 覆盖 K .

任取 $y \in f(K)$, 写为 $y = f(x)$, $x \in K$. 某个 V_{i_j} 包含 x , 即 $f(x) \in U_{i_j}$. 因而 $U_{i_1}, \dots, U_{i_m}$ 覆盖 $f(K)$, 得到有限子覆盖. 注意证明只使用 $f(V_i) \subseteq U_i$, 并不需要、也一般没有 $f(V_i) = U_i$. 最后一项应用于限制映射 $f|_K$ 即可. $\square$

定理 4.15 (紧集上的极值定理) 设 K 是非空紧度量空间, $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 则 f 有界, 且存在 $x_{\min}, x_{\max} \in K$ 使

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad (x \in K).$$

证明. 连续像定理说明 $C = f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的非空紧集, 因而闭且有界. 设 $M = \sup C$ 与 $m = \inf C$, 它们都是有限实数. 对每个正整数 n , 由上确界定义选 $c_n \in C$ 使 $M - 1/n < c_n \leq M$. 所以 $c_n \rightarrow M$, 由 C 的闭性得 $M \in C$. 同理, 可选 $b_n \in C$ 使 $m \leq b_n < m + 1/n$, 得 $m \in C$. 由像集的定义, 有 $x_{\max}, x_{\min} \in K$ 分别满足 $f(x_{\max}) = M$, $f(x_{\min}) = m$. 这就证明最值被实际取得, 而不仅是上确界与下确界存在. $\square$

例题 4.4 在 $(0, 1)$ 上取连续函数 $f(x) = x$ 与 $g(x) = 1/x$. 判断它们是否有界以及是否取得最值.

解答. f 有界, 上确界为 1, 下确界为 0, 但两个端点值都不在函数像中, 所以最大值与最小值均不存在. g 无界, 因为 $g(1/n) = n$ 对 $n \geq 2$ 成立. 它的下确界为 1, 不取得, 也没有最大值. 非紧并不表示每个连续函数都会失败: 常值函数仍有最大值与最小值. 极值定理给出的是非空紧定义域上所有连续实值函数均可取得最值的保证. $\square$

定义 4.16 (点到集合、集合到集合的距离) 对非空子集 $A \subseteq X$, 定义

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

若 A, B 均非空, 定义

$$d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

两者都是有限的非负实数. 这里不把空集的距离纳入定义, 以免在讨论最小值时混入扩展实数 $+\infty$.

引理 4.17 (距离函数的连续性) 对非空 $A \subseteq X$, 有

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y) \quad (x, y \in X).$$

因此 $x \mapsto d(x, A)$ 连续. 此外, $d(x, A) = 0$ 当且仅当 $x \in \overline{A}$.

证明. 对任意 $a \in A$, 三角不等式给出 $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$. 对 a 取下确界, 得 $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$. 交换 x, y , 得到绝对值估计. 若 $d(x, A) = 0$, 则对每个 $r > 0$, 下确界定义保证某个 $a \in A$ 满足 $d(x, a) < r$, 所以每个球 $B_X(x, r)$ 都与 A 相交, 即 $x \in \overline{A}$. 反过来, 若 $x \in \overline{A}$, 每个半径 r 的球都包含 A 中某点, 从而 $0 \leq d(x, A) < r$ 对所有 $r > 0$ 成立, 故距离为零. $\square$

定理 4.18 (紧集与闭集的正距离) 设 $A, B \subseteq X$ 非空且不相交. 若 A 紧而 B 在 X 中闭, 则 $d(A, B) > 0$. 特别地, 两个非空不相交紧集之间的距离为正. 若 A, B 均紧, 还存在 $a_0 \in A, b_0 \in B$ 使

$$d(A, B) = d(a_0, b_0) > 0.$$

证明. 因为 B 闭且 $A \cap B = \emptyset$, 对每个 $a \in A$ 都有 $a \notin \overline{B}$, 所以上一引理给出 $d(a, B) > 0$. 连续函数 $a \mapsto d(a, B)$ 在非空紧集 A 上取得最小值, 设取得点为 a_0 . 因为函数在每个点都严格为正, 特别是在最小值取得点严格为正, 故

$$d(A, B) = \inf_{a \in A} d(a, B) = d(a_0, B) > 0.$$

第一处等号来自对全部配对 (a, b) 取下确界与逐次取下确界的等价. 具体地, 任意全体配对距离的下界也是每个 $d(a, B)$ 的下界; 反过来, 任意全部 $d(a, B)$ 的下界又是每个配对距离 $d(a, b)$ 的下界. 因而两边有相同的下界集合, 下确界相同.

若 B 也紧, 连续函数 $b \mapsto d(a_0, b)$ 在 B 上取得最小值, 设取得点为 b_0 . 则 $d(a_0, b_0) = d(a_0, B) = d(A, B)$, 从而同时证明距离被一对点取得. $\square$

这个证明揭示两个不同作用: B 的闭性使每个固定点 $a \notin B$ 与 B 有正距离; A 的紧性把这些各自可能很小的正数变成一个统一的正下界. 若两者都只闭, 点对可以一起向无穷远移动, 让距离趋于零.

例题 4.5 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$A = \{(x, 0) : x \geq 1\}, \quad B = \{(x, 1/x) : x \geq 1\}.$$

证明 A, B 均闭且不相交, 但 $d(A, B) = 0$. 再比较 $\mathbb{R}$ 中的 $\{0\}$ 与 $(0, 1)$.

解答. 两者不相交. A 闭; B 也闭, 因为若 $(x_n, 1/x_n) \rightarrow (x, y)$, 则 $x_n \geq 1$ 给出 $x \geq 1$, 连续性给出 $y = 1/x$, 所以极限仍在 B . 但

$$d((n, 0), (n, 1/n)) = 1/n \rightarrow 0,$$

所以 $d(A, B) = 0$. 两集合均不有界, 因而均不紧. 另一个反例是 $A = \{0\}$ 与 $B = (0, 1)$: A 紧, 但 B 不闭, 仍有 $d(A, B) = 0$. 因而在正距离定理中, 不能只保留“不相交”而删去相应的紧性或闭性条件. $\square$

4.5 编者练习与解答

以下练习由编者组织, 不标作 MIT 原习题或新领军真题. 它们分别训练有限网的运用、子列抽取、有限交与最值条件, 每题均附完整解答.

习题 4.1 称空间 X 可分, 如果存在至多可数的子集 $D \subseteq X$ 使 $\overline{D} = X$. 证明每个全有界度量空间可分, 从而每个紧度量空间可分. 可分是否推出全有界?

解答. 对每个 $n \geq 1$, 取一个有限 $1/n$ -网 D_n , 并令 $D = \bigcup_{n \geq 1} D_n$. 可数多个有限集合的并至多可数. 对任意 $x \in X$ 与 $r > 0$, 取 n 使 $1/n < r$. 有 $p \in D_n$ 满足 $d(x, p) < 1/n < r$, 所以 $B_X(x, r)$ 与 D 相交. 因而每个 x 都在 $\overline{D}$ 中, 即 D 稠密. 空空间取 $D = \emptyset$. 紧空间全有界, 所以也可分. 反方向不成立: $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的可数稠密子集, 所以 $\mathbb{R}$ 可分, 但 $\mathbb{R}$ 不全有界. $\square$

习题 4.2 设 A 是度量空间 X 的全有界子集. 证明其在 X 中的闭包 $\overline{A}$ 也全有界. 若 X 完备, 证明 $\overline{A}$ 紧.

解答. 若 $A = \emptyset$, 闭包为空, 结论成立. 否则对给定 $\varepsilon > 0$, 取 A 中的有限 $\varepsilon/3$ -网 $p_1, \dots, p_m$. 对任意 $x \in \overline{A}$, 可选 $a \in A$ 使 $d(x, a) < \varepsilon/3$, 再选 j 使 $d(a, p_j) < \varepsilon/3$. 则 $d(x, p_j) < 2\varepsilon/3 < \varepsilon$. 球心 p_j 均属于 $\overline{A}$, 所以它们构成闭包的有限 ε -网.

若 X 完备, 则 $\overline{A}$ 也完备: 其中任意 Cauchy 点列在 X 中收敛, 而闭性使其极限留在 $\overline{A}$. 闭包因此完备且全有界, 由紧性的等价条件得它紧. 这也说明在完备度量空间中, 全有界性恰好保证闭包紧; 单纯有界性没有这样的保证. $\square$

习题 4.3 设 (X, d_X) 与 (Y, d_Y) 是紧度量空间. 在 $X \times Y$ 上定义

$$d((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}.$$

证明这是度量, 且 $X \times Y$ 紧. 说明证明中为什么要再次抽取子列.

解答. 非负性、对称性与正定性来自两个坐标的度量. 对三个点 u, v, w , 每个坐标距离都满足三角不等式, 且分别不超过 $d(u, v) + d(v, w)$, 所以取最大值后有 $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$. 因而 d 是度量. 若某个因子为空, 积也为空, 已知紧.

对非空情形, 取任意点列 $((x_n, y_n))$. X 紧, 所以有子列指标 n_k 使 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$. 再对 Y 中的点列 (y_{n_k}) 使用

序列紧性, 得到严格递增的 k_ℓ 使 $y_{n_{k_\ell}} \rightarrow y \in Y$. 因为收敛点列的子列仍收敛到同一极限, 仍有 $x_{n_{k_\ell}} \rightarrow x$. 因此

$$d((x_{n_{k_\ell}}, y_{n_{k_\ell}}), (x, y)) = \max\{d_X(x_{n_{k_\ell}}, x), d_Y(y_{n_{k_\ell}}, y)\} \rightarrow 0.$$

所以积空间序列紧, 从而紧. 第二次抽取是在第一次子列内部进行的, 才能同时保留两个坐标的收敛性. 分别独立选两个子列, 未必得到共同的指标. 同一方法可逐次用于任意有限多个因子. $\square$

习题 4.4 设 K 为非空紧度量空间, $\{f_i\}_{i \in I}$ 是一族连续实值函数. 假设对每个有限指标集 $J \subseteq I$, 都存在 $x_J \in K$ 使 $f_j(x_J) \geq 0$ 对所有 $j \in J$ 成立. 证明存在同一个 $x \in K$ 使 $f_i(x) \geq 0$ 对所有 $i \in I$ 成立.

解答. 令 $F_i = f_i^{-1}([0, \infty))$. 连续函数对闭集的逆像闭, 所以每个 F_i 都在 K 中闭. 题设恰好说明每个有限交 $\bigcap_{j \in J} F_j$ 非空. 因而这族闭集具有有限交性质. 由 K 的紧性及有限交刻画, 总交非空. 取 $x \in \bigcap_{i \in I} F_i$, 就有所有 $f_i(x) \geq 0$. 当 I 为空时, 总交按约定为非空的 K , 结论也成立. 这里有限问题的解 x_J 可以依赖 J , 而紧性保证最后能找到适合全部条件的同一个点. $\square$

习题 4.5 构造度量空间中的一个非空紧集 A 和一个非空闭集 B , 使 $A \cap B = \emptyset$, $d(A, B) > 0$, 但没有任何 $a \in A, b \in B$ 满足 $d(a, b) = d(A, B)$.

解答. 取 $X = \{p\} \cup \{b_n : n \geq 1\}$, 这些点彼此不同. 令 $r_n = 1 + 1/n$, 定义

$$d(p, b_n) = d(b_n, p) = r_n, \quad d(b_n, b_m) = r_n + r_m \quad (n \neq m),$$

并令 $d(x, x) = 0$. 这是度量: 正定性和对称性直接成立. 对三个不同点, 若中间点是 p , 两个 b 点之间的三角不等式取等号; 若三个点均为 b 点, 右端比左端多出中间点的 $2r_j > 0$; 若一个端点是 p 而中间点是某个 b_j , 右端比左端多出 $2r_j$. 含重复点的三角不等式则直接成立.

令 $A = \{p\}$, $B = \{b_n : n \geq 1\}$. 单点集 A 紧. B 在 X 中闭, 因为它的补集 $\{p\} = B_X(p, 1)$ 开. 两者不相交, 且

$$d(A, B) = \inf_{n \geq 1} (1 + 1/n) = 1.$$

但每个 $d(p, b_n) > 1$, 所以下确界不被任何点对取得. 此例与正距离定理相容: B 只有闭性而无紧性. 若 B 也紧, 才能保证这个最后下确界也取得. $\square$

习题 4.6 设 K 是非空紧度量空间, $f, h : K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x) > 0$ 对每个 $x \in K$ 成立. 证明存在 $c > 0$ 使 $f(x) \geq c$ 对所有 x 成立, 并证明 h/f 有界. 若删去紧性, 第一结论是否仍成立?

解答. 极值定理保证 f 在某个 $x_0 \in K$ 取得最小值. 令 $c = f(x_0)$, 题设逐点严格为正, 所以这个已经取得的最小值满足 $c > 0$. 同时 h 有界, 可取 $M \geq 0$ 使 $|h(x)| \leq M$. 因而

$$\left| \frac{h(x)}{f(x)} \right| \leq \frac{M}{c} \quad (x \in K).$$

删去紧性后不成立: 在 $(0, 1)$ 上取 $f(x) = x$, 每个函数值严格为正, 但 $\inf f = 0$. 要把逐点的正性变成统一正下界, 需要保证下确界实际取得, 而不能仅写出“所有值都正”. $\square$

5 完备空间与完备化

来源: 本章重编自 *Paige Bright, MIT OCW 18.S190, IAP 2023, Lecture 5, pp. 5–6*, 并承接 *Lecture 1, pp. 4–7* 的函数空间例子. 原课留作练习的完备性证明在此补全; 嵌套闭集判据、Cauchy 序列构造及章末练习为编者补充. 来源和许可详见书末说明.

5.1 Cauchy 序列与完备性

上一章研究紧性时, 我们从任意序列中寻找收敛子列. 完备性回答另一个问题: 如果一个序列的后段已经彼此任意接近, 空间中是否有一个点承接这些越来越集中的项? 这里不要求从所有序列中找到好子列, 而只考察已经满足 Cauchy 条件的序列.

定义 5.1 度量空间 (X, d) 称为**完备空间**, 如果其中每个 Cauchy 序列都收敛于 X 中某点. 具体地, 对每个满足

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N, \quad d(x_m, x_n) < \varepsilon$$

的序列 (x_n) , 都存在 $x \in X$ 使 $d(x_n, x) \rightarrow 0$.

条件中的“收敛于 X 中某点”必不可少. 在更大的空间中找到极限, 不能直接证明原空间完备. 每个收敛序列都是 Cauchy 序列: 若 $x_n \rightarrow x$, 当 m, n 足够大时,

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x, x_n) < \varepsilon.$$

反向推理必须用到空间的完备性.

例题 5.1 已知 $\mathbb{R}$ 在通常距离下完备. 证明 $\mathbb{Q}$ 和 $(0, 1)$ 在通常距离下都不完备.

解答. 取有理数 q_n 使 $|q_n - \sqrt{2}| < 1/n$, 则 (q_n) 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 因而在 $\mathbb{Q}$ 的限制距离下是 Cauchy 序列. 若它在 $\mathbb{Q}$ 中收敛于 q , 就会在 $\mathbb{R}$ 中同时收敛于 q 和 $\sqrt{2}$. 极限唯一性给出 $q = \sqrt{2}$, 与 $q \in \mathbb{Q}$ 矛盾.

区间 $(0, 1)$ 也不完备, 因为 $x_n = 1/(n+1)$ 是其中的 Cauchy 序列, 在 $\mathbb{R}$ 中的唯一极限 0 却不属于该区间. 缺失的极限不一定是无理数; 一个被删去的端点也足以破坏完备性. $\square$

例题 5.2 证明离散度量下的任意集合都完备.

解答. 若集合为空, 没有需要检验的序列. 否则对 Cauchy 序列使用 $\varepsilon = 1/2$, 可知从某一项开始任意两项的距离都小于 $1/2$. 离散距离只有 0 和 1, 所以这些项必须相同, 序列最终为常值并收敛. $\square$

命题 5.2 若 Cauchy 序列 (x_n) 有一个收敛子列 $x_{n_j} \rightarrow x$, 则整个序列也收敛于 x .

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 由 Cauchy 条件取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$. 再选一个 j 使 $n_j \geq N$ 且 $d(x_{n_j}, x) < \varepsilon/2$. 于是对所有 $n \geq N$,

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_j}) + d(x_{n_j}, x) < \varepsilon.$$

这里用于比较的子列项只需选定一个; Cauchy 条件随后控制所有足够靠后的项. $\square$

因此紧度量空间是完备的: 先用紧性找到收敛子列, 再用上面的命题收回整个 Cauchy 序列. 完备性本身并不保证紧性, 例如 $\mathbb{R}$ 完备但不紧. 完备性约束 Cauchy 序列, 紧性则还要求空间不能无限分散.

5.2 子空间的完备性

定理 5.3 设 A 是完备度量空间 X 的子集, 并赋予限制距离. 则 A 完备当且仅当 A 在 X 中闭.

证明. 先设 A 闭. 若 (a_n) 是 A 中的 Cauchy 序列, 它也是 X 中的 Cauchy 序列. X 完备给出 $a_n \rightarrow x \in X$. 由于 A 闭, $x \in A$, 故序列在 A 中收敛.

反过来, 设 A 完备. 取 $x \in \bar{A}$. 每个球 $B(x, 1/n)$ 都与 A 相交, 所以可取 $a_n \in A$ 使 $d(a_n, x) < 1/n$. 序列 (a_n) 在 X 中收敛于 x , 因而是 Cauchy 序列. A 完备给出某个 $a \in A$ 使 $a_n \rightarrow a$. 同一个限制距离下的收敛也就是在 X 中的收敛, 极限唯一性给出 $x = a \in A$. 因此 $\bar{A} = A$, 即 A 闭. $\square$

这段证明还说明: 完备子空间在任意度量母空间中都闭, 反方向才需要母空间完备. 若母空间不完备, 闭子集也可能不完备, 因为母空间自身就是一个闭子集.

推论 5.4 若 A 是度量空间 X 的稠密完备子空间, 则 $A = X$.

证明. 由刚才证明的方向, A 在 X 中闭. 稠密性又给出 $\bar{A} = X$, 所以 $A = \bar{A} = X$. $\square$

注 稠密性不能保证完备性. $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 却不完备. 母空间也可能是完备空间的扩张而仍然不完备: $\{0\}$ 完备, 把它扩张成 $[0, 1)$ 后, 序列 $1 - 1/n$ 缺少极限. 这两种现象的区别在于, 完备性关乎限制距离下所有 Cauchy 序列的极限, 不是集合的大小或点的多少.

定理 5.5 (嵌套闭集判据) 非空度量空间 X 完备, 当且仅当下述性质成立: 对每个非空闭集序列

$$F_1 \supset F_2 \supset \cdots, \quad \text{diam } F_n \rightarrow 0,$$

交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 恰有一个点. 这里 $\text{diam } F = \sup\{d(x, y) : x, y \in F\}$, 允许前面有限项的直径为无穷大.

证明. 若 X 完备, 从每个 F_n 取 x_n . 对 $m, n \geq N$, 嵌套性保证 $x_m, x_n \in F_N$, 因而 $d(x_m, x_n) \leq \text{diam } F_N$. 直径趋于 0 表明 (x_n) 是 Cauchy 序列, 所以 $x_n \rightarrow x \in X$. 固定 N , 后段全部位于闭集 F_N , 故 $x \in F_N$. 这对每个 N 成立, 得到 $x \in \bigcap_N F_N$. 若 y 也在交集中, 则对每个 N 都有 $d(x, y) \leq \text{diam } F_N$, 令 $N \rightarrow \infty$ 得 $x = y$.

反过来, 假设嵌套闭集性质成立. 对任意 Cauchy 序列 (x_n) , 令

$$F_N = \overline{\{x_n : n \geq N\}}.$$

这些集非空、闭且嵌套. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$. 对任意 $u, v \in F_N$, 从序列后段分别取 $u_j \rightarrow u, v_j \rightarrow v$. 三角不等式给出距离函数的连续性, 所以 $d(u, v) = \lim_j d(u_j, v_j) \leq \varepsilon/2$. 因此 $\text{diam } F_N \leq \varepsilon/2$, 直径趋于 0. 假设给出 $x \in \bigcap_N F_N$. 当 $n \geq N$ 时 $x_n, x \in F_N$, 故 $d(x_n, x) \leq \text{diam } F_N \rightarrow 0$. 于是 (x_n) 在 X 中收敛. $\square$

直径趋于 0 不是可删去的附带条件. 在完备空间 $\mathbb{R}$ 中, 非空闭集 $F_n = [n, \infty)$ 嵌套, 交集却为空. 它们向无穷远移动, 并没有集中到一个点.

5.3 上确界距离与函数空间的完备性

在函数空间中, 一个点是一整个函数. 若要用极限寻找函数方程的解, 就必须先选定函数之间的距离. 本节的距离同时控制所有自变量, 因而能把函数列的收敛转化为一收敛.

定义 5.6 对非空度量空间 X , 定义

$$C_b(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ 连续且有界}\}, \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

函数 $f, g \in C_b(X)$ 的上确界距离为 $d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty$.

有界性保证上确界是有限实数. 这里不要求最大值在某点取得: 例如 $f(x) = x$ 在 $X = (0, 1)$ 上有上确界 1, 却没有最大值. 原课将 $C_b(X)$ 记为 $C_\infty(X)$; 本书用下标 b 强调有界, 避免与光滑函数空间 C^∞ 混淆.

先核对这是一个距离. 非负性和对称性来自绝对值. 若 $\|f - g\|_\infty = 0$, 则每个 x 上都有 $|f(x) - g(x)| = 0$, 所以 $f = g$. 对每个 x ,

$$|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq \|f - g\|_\infty + \|g - h\|_\infty.$$

对左端取上确界, 即得到三角不等式. 这个证明没有使用最大值点, 因而适用于非紧空间 X .

定义 5.7 函数列 (f_n) 一致收敛于函数 f , 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in X, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

相比点态收敛, 一致收敛要求同一个 N 对所有 x 有效.

在有界函数空间中, $d_\infty(f_n, f) \rightarrow 0$ 等价于一致收敛. 一个方向直接由 $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$ 得到; 另一个方向对一致收敛的不等式取上确界, 用 $\varepsilon/2$ 代替 ε 即可.

定理 5.8 对任意非空度量空间 X , $(C_b(X), d_\infty)$ 是完备空间.

证明. 设 (f_n) 是上确界距离下的 Cauchy 序列. 目标是构造一个仍然属于 $C_b(X)$ 的极限. 构造分为点态极限、一致控制、有界性和连续性四个相互衔接的步骤.

固定 $x \in X$. 由于

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty,$$

实数列 $(f_n(x))$ 是 Cauchy 序列. $\mathbb{R}$ 完备, 因而可定义 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. 这样在每一点定义出一个函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 但此刻尚未知道它连续或有界.

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$. 固定任意 $n \geq N$ 和任意 x , 在 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ 中令 $m \rightarrow \infty$, 得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2.$$

N 不依赖 x , 所以取上确界可得 $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. 这就是一致收敛. 注意极限可能把严格不等式变成非严格不等式, 提前使用 $\varepsilon/2$ 可保留最终所需的严格估计.

对上述估计取一次 $\varepsilon = 2$, 则某个 N 满足所有 x 上 $|f(x) - f_N(x)| \leq 1$. 于是

$$|f(x)| \leq |f_N(x)| + 1 \leq \|f_N\|_\infty + 1.$$

因此 f 有界. 无须假设所有 f_n 的界一开始就是同一个常数; 一个固定函数 f_N 和一致误差已经足够.

最后证明连续性. 固定 $x_0 \in X$ 和 $\varepsilon > 0$. 一致收敛允许先选一个 n 使 $\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon/3$. f_n 在 x_0 连续, 再选 $\delta > 0$ 使 $d(x, x_0) < \delta$ 时 $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$. 于是

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

故 f 连续. 至此 $f \in C_b(X)$, 且 $d_\infty(f_n, f) \rightarrow 0$, 完备性得证. $\square$

推论 5.9 设 $a < b$. 实连续函数空间 $C([a, b]) = C^0([a, b])$ 在上确界距离下完备.

证明. 连续函数在紧区间 $[a, b]$ 上有界, 所以 $C([a, b]) = C_b([a, b])$. 应用定理 5.8 即得. 具体证明仍是: 由一致 Cauchy 得每一点的实数极限, 由同一个尾部估计得一致收敛, 再以三段误差证明极限连续. $\square$

注 点态极限本身不能保留连续性. $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 点态极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

它在 1 不连续. 因此这些 f_n 不可能在上确界距离下形成 Cauchy 序列: 若是, 上面的完整性证明会迫使其点态极限连续. 这也解释了为什么函数方程中的距离必须认真选择.

5.4 等距嵌入与完备化

对不完备空间, 我们希望补上 Cauchy 序列缺少的极限, 又不改变原有点之间的距离. 仅说“把所有极限添进去”并不是构造, 因为在构造完成之前, 这些极限还没有一个共同的母空间. 原课提供了一个巧妙办法: 先把空间等距放入已经证明完备的函数空间, 再取闭包.

定义 5.10 度量空间 X 的一个**完备化**是一个完备度量空间 $\widehat{X}$, 连同等距嵌入 $i: X \rightarrow \widehat{X}$, 满足 $i(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密. 等距嵌入的意思是

$$\widehat{d}(i(x), i(y)) = d(x, y) \quad (x, y \in X).$$

等距性自动保证 i 单射. 我们常把 x 和 $i(x)$ 视为同一点, 但定义中保留嵌入能准确表达完备化的唯一性.

定理 5.11 每个度量空间都有完备化.

证明. 空空间已经完备, 取自身即可. 以下设 $X \neq \emptyset$, 并固定一个基点 $o \in X$. 对每个 $x \in X$ 定义

$$g_x(p) = d(p, x) - d(p, o) \quad (p \in X).$$

为什么减去第二项? 若空间无界, $p \mapsto d(p, x)$ 可能无界, 不能放进 $C_b(X)$. 两个距离的差却由反三角不等式满足

$$|g_x(p)| = |d(p, x) - d(p, o)| \leq d(x, o).$$

因此对固定 x , 函数 g_x 有界. 又由三角不等式,

$$\begin{aligned} |g_x(p) - g_x(q)| &\leq |d(p, x) - d(q, x)| + |d(p, o) - d(q, o)| \\ &\leq 2d(p, q), \end{aligned}$$

所以 g_x 连续. 于是 $g_x \in C_b(X)$.

定义 $i(x) = g_x$. 对任意 $x, y \in X$,

$$|g_x(p) - g_y(p)| = |d(p, x) - d(p, y)| \leq d(x, y),$$

取上确界得到 $\|g_x - g_y\|_\infty \leq d(x, y)$. 为了得到反向不等式, 只需找一个取等的测试点. 取 $p = x$, 就有

$$|g_x(x) - g_y(x)| = |d(x, x) - d(x, y)| = d(x, y).$$

故 $\|g_x - g_y\|_\infty = d(x, y)$, i 是等距嵌入. 这里映射只需是到它的像 $i(X)$ 的双射, 无须满射到整个 $C_b(X)$.

现在令 $\widehat{X} = \overline{i(X)}$, 闭包在 $C_b(X)$ 中取得, 并赋予上确界距离的限制. 定理 5.8 给出 $C_b(X)$ 完备, 定理 5.3 给出闭子空间 $\widehat{X}$ 完备. 由闭包的定义, $i(X)$ 在 $\widehat{X}$ 中稠密. 这正好满足完备化的全部要求. $\square$

这个构造的用途超出证明存在性: 原空间里的几何距离成为两个函数之间的上确界距离. 基点 o 只用于让函数有界, 不改变最后恢复出来的距离. 不同基点可能给出不同的函数模型, 下节说明这些模型仍表示同一个完备化.

5.5 完备化的唯一性

定理 5.12 若 $(\widehat{X}_1, i_1)$ 和 $(\widehat{X}_2, i_2)$ 都是 X 的完备化, 则存在唯一的满射等距映射 $U: \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}_2$, 满足 $U \circ i_1 = i_2$.

证明. 对 $z \in \widehat{X}_1$, 由 $i_1(X)$ 稠密, 选 $x_n \in X$ 使 $i_1(x_n) \rightarrow z$. 序列 $(i_1(x_n))$ 是 Cauchy 序列, 等距性给出

$$\widehat{d}_2(i_2(x_n), i_2(x_m)) = d(x_n, x_m) = \widehat{d}_1(i_1(x_n), i_1(x_m)).$$

所以 $(i_2(x_n))$ 也是 Cauchy 序列. 由 $\widehat{X}_2$ 完备, 可以定义 $U(z) = \lim_n i_2(x_n)$.

先核对定义与近似序列无关. 若 $i_1(y_n) \rightarrow z$, 则

$$d(x_n, y_n) \leq \widehat{d}_1(i_1(x_n), z) + \widehat{d}_1(z, i_1(y_n)) \rightarrow 0.$$

等距性让 $\widehat{d}_2(i_2(x_n), i_2(y_n)) \rightarrow 0$, 因而两个极限相同. 取常值近似序列可得 $U(i_1(x)) = i_2(x)$.

对 $z, w \in \widehat{X}_1$, 分别选近似序列 $i_1(x_n) \rightarrow z, i_1(y_n) \rightarrow w$. 距离对两个变量连续, 所以

$$\begin{aligned} \widehat{d}_2(U(z), U(w)) &= \lim_n \widehat{d}_2(i_2(x_n), i_2(y_n)) \\ &= \lim_n d(x_n, y_n) = \widehat{d}_1(z, w). \end{aligned}$$

因此 U 等距, 特别地单射.

为证明满射, 任取 $v \in \widehat{X}_2$, 选 $x_n \in X$ 使 $i_2(x_n) \rightarrow v$. 等距性表明 $(i_1(x_n))$ 是 Cauchy 序列. 由 $\widehat{X}_1$ 完备, 它收敛于某个 z , 而定义给出 $U(z) = v$.

最后, 若 V 是另一满足 $V \circ i_1 = i_2$ 的等距映射, 则它连续. 对任意 $i_1(x_n) \rightarrow z$,

$$V(z) = \lim_n V(i_1(x_n)) = \lim_n i_2(x_n) = U(z).$$

所以 $V = U$, 唯一性得证. □

注 “唯一”指的是固定原空间嵌入后, 延伸该嵌入的等距同构唯一. 它不表示两个构造所得的点集在字面上相等, 也不表示完备空间不能有其他等距对称. 例如 $\mathbb{R}$ 有等距映射 $x \mapsto -x$, 但它不在原嵌入的每一点上保持恒等.

5.6 Cauchy 序列模型

本节为编者补充, 将原课提出但未展开的 Cauchy 序列思路写成完整构造. 它与上一节的函数模型互补: 新点就是原空间中近似过程的等价类.

设 $\mathcal{C}(X)$ 是 X 中所有 Cauchy 序列组成的集合. 对 $u = (u_n)$ 和 $v = (v_n)$, 定义

$$u \sim v \iff d(u_n, v_n) \rightarrow 0.$$

自反性和对称性直接来自距离; 若 $u \sim v$ 且 $v \sim w$, 则 $d(u_n, w_n) \leq d(u_n, v_n) + d(v_n, w_n) \rightarrow 0$, 所以关系传递. 因此可以取商集 $\mathcal{C}(X)/\sim$.

命题 5.13 在等价类上定义

$$\rho([u], [v]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(u_n, v_n).$$

该极限存在, 与代表序列无关, 且 ρ 是商集上的距离.

证明. 由三角不等式,

$$|d(u_n, v_n) - d(u_m, v_m)| \leq d(u_n, u_m) + d(v_n, v_m).$$

右端由两个 Cauchy 条件趋于 0, 所以 $(d(u_n, v_n))$ 是实数 Cauchy 序列, 极限存在且有限. 若 $u \sim u', v \sim v'$, 同样的估计给出

$$|d(u_n, v_n) - d(u'_n, v'_n)| \leq d(u_n, u'_n) + d(v_n, v'_n) \rightarrow 0,$$

故极限与代表元无关.

非负性和对称性对每一项成立, 取极限后仍成立. $\rho([u], [v]) = 0$ 恰好等价于 $u \sim v$, 也就是 $[u] = [v]$. 最后从 $d(u_n, w_n) \leq d(u_n, v_n) + d(v_n, w_n)$ 取极限, 得到三角不等式. $\square$

把 $x \in X$ 对应到常值序列的类, 记为 $j(x) = [(x, x, \dots)]$. 则 $\rho(j(x), j(y)) = d(x, y)$, 所以 j 等距.

定理 5.14 赋予上述距离的 $\mathcal{C}(X)/\sim$, 连同嵌入 j , 是 X 的完备化.

证明. 先证明 $j(X)$ 稠密. 任取 $A = [(u_n)]$ 和 $\varepsilon > 0$, 由 (u_n) 的 Cauchy 性取 N , 使 $m, n \geq N$ 时 $d(u_n, u_m) < \varepsilon/2$. 当 $n \geq N$ 时,

$$\rho(j(u_n), A) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(u_n, u_m) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

因此 $j(u_n) \rightarrow A$.

再证明商空间完备. 设 (A_k) 是商空间中的 Cauchy 序列. 利用刚证明的稠密性, 对每个 $k \geq 1$ 选 $x_k \in X$ 使 $\rho(A_k, j(x_k)) < 2^{-k}$. 对 k, l ,

$$d(x_k, x_l) = \rho(j(x_k), j(x_l)) \leq 2^{-k} + \rho(A_k, A_l) + 2^{-l}.$$

当 k, l 足够大时右端任意小, 所以 (x_k) 是 X 中的 Cauchy 序列. 令 $A = [(x_k)]$. 第一段稠密性证明对这个序列给出 $j(x_k) \rightarrow A$. 因此

$$\rho(A_k, A) \leq \rho(A_k, j(x_k)) + \rho(j(x_k), A) \rightarrow 0.$$

于是每个 Cauchy 序列 (A_k) 都在商空间中收敛, 完备性得证. $\square$

两个构造之间的对应也可以直接写出: 把 $[(x_n)]$ 送到 $C_b(X)$ 中的一致极限 $\lim_n g_{x_n}$. 等距性保证 (g_{x_n}) 一致 Cauchy, 等价序列给出同一个极限. 唯一性定理说明这正是两个完备化之间延伸原嵌入的唯一等距同构. 对 $\mathbb{Q}$ 的通常距离而言, 这个构造恢复 $\mathbb{R}$; 换一个距离, 得到的完备化也可能改变.

5.7 练习与解答

以下题目均为编者练习, 用于检查完备性条件、函数空间距离与完备化构造, 不冒充 MIT 原题.

习题 5.1 在 $\mathbb{R}$ 上定义 $d_*(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$. 证明 d_* 是距离, 它与通常距离诱导同一拓扑, 但 $(\mathbb{R}, d_*)$ 不完备. 描述它的一个完备化.

解答. $\arctan$ 单射, 所以 $d_*(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$. 非负性、对称性和三角不等式由实数绝对值立即得到. 映射 $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ 在通常拓扑下连续, 逆映射 $\tan$ 也连续, 因而是同胚. d_* 又恰好是这个映射拉回的通常距离, 所以两种距离给出同一拓扑.

取 $x_n = n$. 则 $\arctan n \rightarrow \pi/2$, 所以 (n) 对 d_* 是 Cauchy 序列. 如果它对 d_* 收敛于 $x \in \mathbb{R}$, 就有 $\arctan n \rightarrow \arctan x$, 迫使 $\arctan x = \pi/2$, 不可能. 因此该度量不完备. 闭区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 连同嵌入 $i(x) = \arctan x$ 是其完备化: 区间完备, 映射等距, 像为稠密的开区间. 这个例子说明完备性属于距离结构, 同一拓扑不能单独决定它. $\square$

习题 5.2 在 $C^1([a, b])$ 上取距离

$$d_{C^1}(f, g) = \|f - g\|_\infty + \|f' - g'\|_\infty.$$

证明它是完备距离. 若只使用 $\|f - g\|_\infty$, $C^1([-1, 1])$ 是否完备?

解答. 距离公理由两项上确界估计得到; 第一项已保证正定性. 若 (f_n) 对 d_{C^1} 是 Cauchy 序列, 则 (f_n) 和 (f'_n) 分别在 $C([a, b])$ 的上确界距离下是 Cauchy 序列. 由推论 5.9, 存在连续函数 f, h 使 $f_n \rightarrow f$, $f'_n \rightarrow h$, 两者均为一致收敛.

对每个 $x \in [a, b]$, 微积分基本定理给出

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt.$$

而

$$\left| \int_a^x (f'_n(t) - h(t)) dt \right| \leq (b-a) \|f'_n - h\|_\infty \rightarrow 0.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f(x) = f(a) + \int_a^x h(t) dt$. 因 h 连续, 再用微积分基本定理得 $f \in C^1([a, b])$ 且 $f' = h$. 因而 $d_{C^1}(f_n, f) = \|f_n - f\|_\infty + \|f'_n - h\|_\infty \rightarrow 0$.

若只控制函数值, 取 $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$, 它们属于 $C^1([-1, 1])$, 且

$$0 \leq f_n(x) - |x| = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + 1/n} + |x|} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

故 f_n 一致收敛于 $|x|$, 从而是上确界 Cauchy 序列. $|x|$ 在 0 不可微, 不属于 $C^1([-1, 1])$. 任何可能的上确界极限必为它, 所以这一距离下不完备. $\square$

习题 5.3 在 $C([0, 1])$ 上取 $d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$. 证明这一空间不完备.

解答. 对 $n \geq 3$, 令 f_n 在 $[0, 1/2 - 1/n]$ 上为 0, 在 $[1/2 + 1/n, 1]$ 上为 1, 中间用直线连接. 设 $s(x) = 0$ 当 $x < 1/2$, $s(x) = 1$ 当 $x \geq 1/2$. 两者只在长度 $2/n$ 的区间上可能不同, 且差的绝对值不超过 1, 所以 $\int_0^1 |f_n - s| \leq 2/n$. 于是 $d_1(f_n, f_m) \leq 2/n + 2/m$, (f_n) 是 Cauchy 序列.

若它在该空间中收敛于连续函数 f , 则积分三角不等式给出

$$\int_0^1 |f - s| \leq d_1(f, f_n) + \int_0^1 |f_n - s| \rightarrow 0.$$

因此左端为 0. 在区间 $(0, 1/2)$ 上, 连续非负函数 $|f|$ 的积分为 0, 故每一点都为 0: 若某点为正, 连续性会使一段正长度区间上的值有正下界, 积分便为正. 同理在 $(1/2, 1)$ 上 $f = 1$. 这与 f 在 $1/2$ 连续矛盾. 因而不存在连续极限, 该距离下不完备. $\square$

习题 5.4 设 $(\hat{X}, i)$ 是 X 的完备化. 证明 $\hat{X}$ 中每个点都是 X 中某个 Cauchy 序列在嵌入后的极限. 若 X 已经完备, 证明 i 满射.

解答. 任取 $z \in \hat{X}$. 稠密性允许取 $x_n \in X$ 使 $\hat{d}(i(x_n), z) < 1/n$. 故 $i(x_n) \rightarrow z$, 从而是 Cauchy 序列. 等距性让 (x_n) 在 X 中也是 Cauchy 序列.

若 X 完备, 则 $x_n \rightarrow x \in X$. 等距性给出 $i(x_n) \rightarrow i(x)$, 极限唯一性迫使 $z = i(x)$. 每个 z 都在像中, 所以 i 满射. 已完备的空间没有需要补入的新极限. $\square$

6 一致连续与压缩映射

来源: 本章重编自 *Paige Bright, MIT OCW 18.S190, IAP 2023, Lecture 5, pp. 1-4*. 一致连续、参数积分、Banach 不动点定理和积分算子来自原课; 误差界、一致连续延拓、局部 Picard-Lindelöf 定理及章末练习为编者补充. 原课积分式的积分变量已订正, 仅连续核不保证可微性的限制在正文说明. 来源与许可详见书末说明.

6.1 连续性与 Lipschitz 条件

连续性说, 在固定点附近足够小的输入变化造成足够小的输出变化. 但“足够小”可以随点的位置改变. 在用一整个函数作为未知量时, 我们往往需要对所有点同时有效的控制, 这就引出一致连续性和 Lipschitz 条件.

定义 6.1 设 (X, d_X) 、 (Y, d_Y) 为度量空间. 函数 $f: X \rightarrow Y$ 称为**一致连续**, 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in X, \quad d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

同一个 δ 必须控制 X 中所有点对.

连续性的量词顺序是先固定 x , 再对给定 ε 选择 δ , 允许 δ 依赖 x . 一致连续性先选 δ , 再检查所有 x, y . 把一个点的连续性证明逐点做完, 并不自动给出一个可同时使用的 δ .

定义 6.2 若存在常数 $K \geq 0$, 使对所有 $x, y \in X$ 都有

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq K d_X(x, y),$$

则称 f 为 **Lipschitz 映射**, 或 K -Lipschitz 映射.

命题 6.3 Lipschitz 映射一致连续, 一致连续映射连续.

证明. 若 $K > 0$, 对给定的 $\varepsilon > 0$ 取 $\delta = \varepsilon/K$. 当 $d_X(x, y) < \delta$ 时,

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq K d_X(x, y) < K \delta = \varepsilon.$$

这个 δ 不依赖 x, y , 所以 f 一致连续. 若 $K = 0$, 则任意两点的像的距离都为 0, 函数为常值, 可取任何 $\delta > 0$. 最后, 一致连续的定义对每个固定 x 都有效, 因而给出该点的连续性. $\square$

例题 6.1 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续但不满足 Lipschitz 条件, 而 $x \mapsto 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续却不一致连续.

解答. 对 $x \geq y \geq 0$,

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \leq (\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = x - y.$$

所以 $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$, 取 $\delta = \varepsilon^2$ 就得到一致连续. 若存在 Lipschitz 常数 K , 令 $y = 0$ 将给出 $\sqrt{x} \leq Kx$, 即 $1/\sqrt{x} \leq K$ 对所有 $x > 0$ 成立, 不可能.

$f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上连续却不一致连续. 取 $x_n = 1/(n+1)$, $y_n = 1/(n+2)$. 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $|f(x_n) - f(y_n)| = 1$. 对 $\varepsilon = 1/2$, 无论给出多小的 δ , 最终这些点对都违反一致连续的要求. $\square$

这些例子区分了三个层次. Lipschitz 条件给出线性的全局估计; 一致连续允许非线性的变化尺度; 普通连续只给出每一点附近的局部控制.

6.2 紧空间上的一致连续性与参数积分

定理 6.4 若 X 是紧度量空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 f 一致连续.

证明. 给定 $\varepsilon > 0$. 对每个 $c \in X$, 连续性允许选 $r_c > 0$, 使

$$d_X(z, c) < r_c \implies d_Y(f(z), f(c)) < \varepsilon/2.$$

所有 $B(c, r_c)$ 构成 X 的开覆盖. 引理 4.8 给出 $\delta > 0$, 使每个球 $B(x, \delta)$ 都包含在该覆盖的某一个成员中. 若 $d_X(x, y) < \delta$, 就可取 c 使 $B(x, \delta) \subset B(c, r_c)$. x, y 都属于 $B(c, r_c)$, 所以

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq d_Y(f(x), f(c)) + d_Y(f(c), f(y)) < \varepsilon.$$

同一个 δ 对所有点对有效, 故为一致连续. $\square$

证明中的紧性将各点的局部控制汇合成一个全局尺度. 不要求值域 Y 紧, 也不要求 Y 完备; 这里用的是定义域的紧性和 f 的连续性.

命题 6.5 设 $a < b, c < d$, 且 $F : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 则

$$G(y) = \int_a^b F(x, y) dx$$

是 $[c, d]$ 上的连续函数.

证明. 赋予矩形上确界距离, 它是紧度量空间. 由定理 6.4, F 一致连续. 对给定的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使矩形中两点距离小于 δ 时, 函数值的差小于 $\varepsilon/(2(b-a))$. 若 $|y - y'| < \delta$, 则对所有 $x \in [a, b]$,

$$|F(x, y) - F(x, y')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

因此

$$\begin{aligned} |G(y) - G(y')| &\leq \int_a^b |F(x, y) - F(x, y')| dx \\ &\leq (b-a) \sup_{x \in [a, b]} |F(x, y) - F(x, y')| \\ &\leq \varepsilon/2 < \varepsilon. \end{aligned}$$

这个直接估计已证明一致连续, 因而也证明连续. 若 $a = b$, 积分恒为 0, 结论仍成立. $\square$

此处关键在于对所有积分变量 x 使用同一个控制. 单独知道每个 x 上 $F(x, y') \rightarrow F(x, y)$, 并不足以直接交换积分和极限; 上式展示了本例交换的实际依据.

6.3 一致连续映射的延拓

本节为编者补充, 说明上一章的完备化如何与一致连续性配合.

引理 6.6 一致连续映射把 Cauchy 序列送到 Cauchy 序列.

证明. 设 $f : X \rightarrow Y$ 一致连续, (x_n) 是 X 中的 Cauchy 序列. 给定 $\varepsilon > 0$, 先取一致连续性中的 $\delta > 0$, 再取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d_X(x_m, x_n) < \delta$. 于是 $d_Y(f(x_m), f(x_n)) < \varepsilon$. 这就是像序列的 Cauchy 条件. $\square$

定理 6.7 设 A 在度量空间 X 中稠密, Y 完备. 每个一致连续映射 $f : A \rightarrow Y$ 都有唯一的一致连续延拓 $\tilde{f} : X \rightarrow Y$. 若 f 是 K -Lipschitz, 延拓也可取同一个 Lipschitz 常数 K .

证明. 对 $x \in X$, 稠密性允许选择 $a_n \in A$ 使 $a_n \rightarrow x$. 它是 Cauchy 序列, 由引理 6.6, $(f(a_n))$ 也是 Cauchy 序列. Y 完备保证极限存在, 定义 $\tilde{f}(x) = \lim_n f(a_n)$.

若另有 $b_n \in A$ 趋于 x , 则 $d_X(a_n, b_n) \leq d_X(a_n, x) + d_X(x, b_n) \rightarrow 0$. 一致连续性给出 $d_Y(f(a_n), f(b_n)) \rightarrow 0$, 所以两个极限相同. 定义不依赖所选序列. 对 $x \in A$ 取常值序列即可得到 $\tilde{f}(x) = f(x)$.

证明延拓的一致连续性时, 需要照顾取极限后的非严格不等式. 给定 $\varepsilon > 0$, 对原映射用 $\varepsilon/2$ 选择 $\eta > 0$: 当 $a, b \in A$ 且 $d_X(a, b) < \eta$ 时, $d_Y(f(a), f(b)) < \varepsilon/2$. 取 $\delta = \eta/3$. 对 $d_X(x, y) < \delta$ 的任意 $x, y \in X$, 选 $a_n \rightarrow x, b_n \rightarrow y$. 对足够大的 n ,

$$d_X(a_n, b_n) \leq d_X(a_n, x) + d_X(x, y) + d_X(y, b_n) < \eta.$$

故令 $n \rightarrow \infty$ 得 $d_Y(\tilde{f}(x), \tilde{f}(y)) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. δ 不依赖 x, y , 延拓一致连续.

若 $H: X \rightarrow Y$ 是另一连续延拓, 对 $a_n \rightarrow x$ 有 $H(x) = \lim_n H(a_n) = \lim_n f(a_n) = \tilde{f}(x)$, 所以延拓唯一. 最后, 若原映射满足 Lipschitz 估计, 则

$$d_Y(\tilde{f}(x), \tilde{f}(y)) = \lim_n d_Y(f(a_n), f(b_n)) \leq K \lim_n d_X(a_n, b_n) = K d_X(x, y).$$

因此常数 K 被保留. □

连续性本身不能代替一致连续性. 例如 $1/x$ 在稠密子空间 $(0, 1)$ 上连续, 却不能连续延拓到 $[0, 1]$. 延拓构造需要把趋于边界的 Cauchy 序列送到仍有极限的序列.

6.4 Banach 不动点定理

现在把 Lipschitz 常数降到 1 以下. 每次应用映射后, 两个输入的距离都会按固定比例缩小. 若反复应用映射, 相邻迭代之间的距离形成几何级数, 完备性便能承接这个过程的极限.

定义 6.8 度量空间 X 上的自映射 $T: X \rightarrow X$ 称为**压缩映射**, 如果存在 $q \in [0, 1)$ 使

$$d(Tx, Ty) \leq qd(x, y) \quad (x, y \in X).$$

满足 $Tx_* = x_*$ 的点 x_* 称为 T 的**不动点**.

定理 6.9 (Banach 不动点定理) 设 X 是非空完备度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是压缩映射, 压缩常数为 $q < 1$. 则 T 恰有一个不动点 x_* . 对任意 $x_0 \in X$, 递归定义 $x_{n+1} = Tx_n$, 都有 $x_n \rightarrow x_*$.

证明. 先设 $0 < q < 1$. 由压缩条件逐次得到

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq qd(x_n, x_{n-1}) \leq \cdots \leq q^n d(x_1, x_0).$$

仅仅证明相邻距离趋于 0 不够, 因为小步长仍可能累积出无穷路程. 这里几何级数的可求和性给出所有后段项之间的估计. 当 $m > n$ 时,

$$\begin{aligned} d(x_m, x_n) &\leq \sum_{j=n}^{m-1} d(x_{j+1}, x_j) \\ &\leq d(x_1, x_0) \sum_{j=n}^{m-1} q^j \leq \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

右端与 m 无关并趋于 0, 因而 (x_n) 是 Cauchy 序列. 完备性保证存在 $x_* \in X$ 使 $x_n \rightarrow x_*$. 压缩映射是 Lipschitz 映

射, 因而连续. 所以

$$Tx_* = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x_*.$$

这证明存在性. 若 y_* 也为不动点, 则

$$d(x_*, y_*) = d(Tx_*, Ty_*) \leq qd(x_*, y_*).$$

因 $1 - q > 0$, 得 $d(x_*, y_*) = 0$, 即 $x_* = y_*$.

若 $q = 0$, 则 T 的所有像相同, 记为 $c \in X$. 因 $Tc = c$, 它是唯一不动点, 任意迭代从第一项起就恒为 c . 这一情况无需几何级数估计. $\square$

证明同时给出了寻找解的算法. 完备性用于获得极限, 自映射条件用于保证每一步和极限都仍在空间内, $q < 1$ 同时用于几何级数求和与唯一性. 在应用之前, 这三个条件都必须分别核对.

命题 6.10 (迭代误差界) 在定理 6.9 的条件下, 当 $0 < q < 1$ 时, 对 $n \geq 0$ 有先验误差界

$$d(x_n, x_*) \leq \frac{q^n}{1 - q} d(x_1, x_0).$$

对 $n \geq 1$ 有后验误差界

$$d(x_n, x_*) \leq \frac{q}{1 - q} d(x_n, x_{n-1}).$$

此外任意 $x \in X$ 都满足残差估计

$$d(x, x_*) \leq \frac{d(x, Tx)}{1 - q}.$$

证明. 在上一定理的 $d(x_m, x_n)$ 估计中令 $m \rightarrow \infty$, 得到先验界. 对后验界, 以当前一步距离为起点, 压缩条件给出

$$d(x_{n+j+1}, x_{n+j}) \leq q^{j+1} d(x_n, x_{n-1}) \quad (j \geq 0).$$

把这些距离相加再令后端趋于极限, 得

$$d(x_n, x_*) \leq \sum_{j=0}^{\infty} q^{j+1} d(x_n, x_{n-1}) = \frac{q}{1 - q} d(x_n, x_{n-1}).$$

最后, 对任意 x 使用三角不等式和压缩条件,

$$d(x, x_*) \leq d(x, Tx) + d(Tx, Tx_*) \leq d(x, Tx) + qd(x, x_*),$$

移项即得残差估计. 当 $q = 0$ 时, 残差界仍成立, 且 $x_n = x_*$ 对 $n \geq 1$ 成立. $\square$

先验界只用初始一步和迭代次数, 能在计算前估计需要多少步. 后验界用已经算出的相邻两项, 能在计算中决定何时停止. 残差界则可以检验任何候选点, 无须它一定来自同一条迭代.

6.5 积分方程的连续解

定理 6.11 设 $a < b$, $g \in C([a, b])$, $k \in C([a, b] \times [a, b])$, $\lambda \in \mathbb{R}$. 令

$$M = \max_{(x,y) \in [a,b]^2} |k(x,y)|.$$

若 $q = |\lambda|M(b-a) < 1$, 则积分方程

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_a^b k(x,y)f(y) dy$$

在 $C([a, b])$ 中恰有一个解. 从任意 $f_0 \in C([a, b])$ 出发的迭代

$$f_{n+1}(x) = g(x) + \lambda \int_a^b k(x,y)f_n(y) dy$$

一致收敛于该解, 并满足命题 6.10 的上确界误差估计.

证明. 在 $C([a, b])$ 上定义

$$(Tf)(x) = g(x) + \lambda \int_a^b k(x,y)f(y) dy.$$

先核对自映射条件. 对固定的连续 f , 二元函数 $k(x,y)f(y)$ 连续; 命题 6.5 在交换两个坐标的角色后表明其关于 y 的积分是 x 的连续函数. 加上连续的 g , 得 $Tf \in C([a, b])$.

再核对压缩性. 对 $f, h \in C([a, b])$, 每个 x 都满足

$$\begin{aligned} |(Tf)(x) - (Th)(x)| &\leq |\lambda| \int_a^b |k(x,y)| |f(y) - h(y)| dy \\ &\leq |\lambda|M(b-a) \|f - h\|_\infty. \end{aligned}$$

取上确界得 $\|Tf - Th\|_\infty \leq q \|f - h\|_\infty$, 且 $q < 1$. 最后, 推论 5.9 表明该函数空间完备, 并且零函数保证它非空. Banach 不动点定理给出唯一的不动点, 正是积分方程的唯一连续解; 同时给出迭代收敛及误差估计. $\square$

注 条件 $|\lambda|M(b-a) < 1$ 是本次上确界估计得到的充分条件, 不是所有积分方程有解的必要条件. 有些核可以得到更小的算子估计, 有些方程即使不满足这个条件也有唯一解; 那些结论需要另行证明.

仅连续的核不能保证解属于 C^1 . 例如在 $[-1, 1]$ 上取 $g = 0$, $k(x,y) = |x|$, $\lambda = 1$. 连续函数 $f(x) = |x|$ 满足 $f(x) = \int_{-1}^1 |x|f(y) dy$, 却在 0 不可微. 即使在压缩范围内也不能加强为 C^1 : 取 $g(x) = 1$, $k(x,y) = |x|$, $\lambda = 1/4$, 则压缩常数为 $1/2$, 唯一解为 $f(x) = 1 + (2/3)|x|$, 仍不可微. 确实, 若 $I = \int_{-1}^1 f(y) dy$, 方程给出 $f(x) = 1 + (I/4)|x|$, 从而 $I = 2 + I/4$, 即 $I = 8/3$.

这一限制并不削弱不动点结论, 而是区分了两种不同的推理: 完备性和压缩性给出连续函数空间中的解, 可微性必须来自积分式的额外结构. 下一节的变上限积分恰好提供这种结构.

6.6 初值问题与 Picard 迭代

考虑初值问题

$$y'(t) = F(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

如果 y 是 C^1 解, 微积分基本定理给出

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, y(s)) \, ds.$$

反过来, 若一个连续函数满足这个积分式, 且 F 在函数图像上连续, 那么被积函数连续, 微积分基本定理使 y 可微, 导数正是 $F(t, y(t))$. 因此我们可以先在连续函数空间中寻找积分算子的不动点, 再恢复微分方程.

定理 6.12 (局部 Picard–Lindelöf 定理) 设 $\alpha, \beta > 0$, 函数 F 在闭矩形

$$R = [t_0 - \alpha, t_0 + \alpha] \times [y_0 - \beta, y_0 + \beta]$$

上连续, 并存在 $L \geq 0$ 使同一 t 下的所有 $u, v \in [y_0 - \beta, y_0 + \beta]$ 都满足

$$|F(t, u) - F(t, v)| \leq L|u - v|.$$

令 $M = \max_R |F|$. 选 $h > 0$ 满足

$$h \leq \alpha, \quad hM \leq \beta, \quad hL < 1.$$

则在 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上, 初值问题有唯一一个图像位于 R 的 C^1 解. 若另一解只在 t_0 的某个邻域定义, 并具有相同初值, 则它在某个更小的共同邻域上与这个解相同.

证明. 所需的 h 总能取到: M, L 是有限非负数, α, β 为正, 所以取充分小的正数即可. 若 $M = 0$ 或 $L = 0$, 对应条件不施加额外限制.

在完备空间 $C(I)$ 中考虑闭球

$$\mathcal{B} = \{u \in C(I) : \|u - y_0\|_\infty \leq \beta\}.$$

它非空, 因为含常值函数 y_0 . 它是闭集: 若 $u_n \rightarrow u$ 一致且 $\|u_n - y_0\|_\infty \leq \beta$, 则逐点取极限得 $|u(t) - y_0| \leq \beta$ 对每个 t 成立. 因而由定理 5.3, $\mathcal{B}$ 完备.

定义 Picard 算子

$$(Tu)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t F(s, u(s)) \, ds.$$

若 $u \in \mathcal{B}$, 则 $(s, u(s)) \in R$ 对所有 $s \in I$ 成立, 所以积分有定义, 被积函数连续, Tu 也连续. 对 $t < t_0$ 将积分方向反转再估计, 对 $t \geq t_0$ 直接估计; 两种情形统一为

$$|(Tu)(t) - y_0| \leq |t - t_0|M \leq hM \leq \beta.$$

因此 T 确实把 $\mathcal{B}$ 映入自身. 这一步解释了保球条件 $hM \leq \beta$ 的用途; 仅有压缩估计不足以保证不动点定理可用.

对 $u, v \in \mathcal{B}$, Lipschitz 条件给出

$$\begin{aligned} |(Tu)(t) - (Tv)(t)| &\leq \left| \int_{t_0}^t |F(s, u(s)) - F(s, v(s))| \, ds \right| \\ &\leq |t - t_0| L \|u - v\|_\infty \leq hL \|u - v\|_\infty. \end{aligned}$$

第一行右端表示在两个端点之间对非负函数积分的绝对值, 因而同时适用于正反两个方向. 取上确界后得到压缩常数 $q = hL < 1$. Banach 不动点定理给出唯一 $y \in \mathcal{B}$ 满足 $Ty = y$. 它连续, 而 $F(t, y(t))$ 连续, 所以积分式给出 $y'(t) = F(t, y(t))$ 和 $y(t_0) = y_0$. 端点的导数按单侧导数理解; 在 I 的内部这是通常的 C^1 解.

若 z 是另一个在 I 上、图像位于 R 的 C^1 解, 将其微分方程积分便得 $Tz = z$, 且 $z \in \mathcal{B}$, 不动点唯一性给出 $z = y$.

最后设 z 只在包含 t_0 的开区间上定义, 具有相同初值, 并解同一方程. 由 $z(t_0) = y_0$ 和连续性, 可取 $0 < \eta \leq h$, 使 $J = [t_0 - \eta, t_0 + \eta]$ 包含在它的定义区间中, 且 $|z(t) - y_0| \leq \beta$ 对所有 $t \in J$ 成立. $y|_J$ 和 $z|_J$ 都属于 $C(J)$ 中同一半径为 β 的闭球. 限制后的 Picard 算子仍是自映射, 压缩常数为 $\eta L \leq hL < 1$. 两者都为其不动点, 因而在 J 上相同. 这正是所陈述的局部唯一性. $\square$

定理没有宣称解能在任意长的时间区间上存在. 矩形限定了可用的 F 与 Lipschitz 条件, 保球估计限定了函数值的范围, 压缩估计限定了本次直接证明的时间长度. 若要继续延拓解, 必须在新的邻域重新核对条件.

例题 6.2 用 Picard 迭代求初值问题 $y' = y$, $y(0) = 1$ 的局部解, 并核对迭代可用的区间.

解答. 取 $R = [-1, 1] \times [0, 2]$. 此时 $M = 2$, $L = 1$. 选 $h = 1/2$, 则 $hM = 1 \leq \beta = 1$, $hL = 1/2 < 1$. 在 $[-1/2, 1/2]$ 上, 从 $y^{(0)}(t) = 1$ 开始迭代,

$$y^{(n+1)}(t) = 1 + \int_0^t y^{(n)}(s) \, ds.$$

前几项为 $1 + t$, $1 + t + t^2/2$, $1 + t + t^2/2 + t^3/6$. 归纳可得 $y^{(n)}(t) = \sum_{j=0}^n t^j/j!$. 不动点定理证明这些多项式在上述区间上一致收敛于唯一解; 已知指数函数满足同一方程和初值, 所以极限为 e^t . 本次论证给出的是一个受控局部区间, 而不是从形式级数直接假定解存在. $\square$

6.7 练习与解答

以下均为编者练习. 题目分别检查一致控制、压缩定理的假设、积分方程的求解与初值问题的唯一性.

习题 6.1 证明 $x \mapsto x^2$ 在每个有界闭区间上 Lipschitz, 但在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续.

解答. 若 $x, y \in [-A, A]$, 则 $|x^2 - y^2| = |x - y||x + y| \leq 2A|x - y|$, 所以常数 $2A$ 有效; 任意有界闭区间都包含在这样的区间中. 在整个 $\mathbb{R}$ 上, 取 $x_n = n$, $y_n = n + 1/n$. 输入距离为 $1/n \rightarrow 0$, 输出距离为

$$y_n^2 - x_n^2 = 2 + 1/n^2 \geq 2.$$

对 $\varepsilon = 1$ 不存在统一的 δ , 故不一致连续. $\square$

习题 6.2 分别给出例子, 说明 Banach 不动点定理中“完备”、“自映射”和“ $q < 1$ ”三个条件在当前表述中不能直接删除.

解答. 在不完备空间 $X = (0, 1)$ 上取 $T(x) = x/2$. 它是常数 $q = 1/2$ 的压缩自映射, 却无不动点, 因为唯一可能的解 $x = 0$ 不在 X 中.

在完备空间 $X = [0, 1]$ 上取 $T: X \rightarrow \mathbb{R}, T(x) = 2 + x/2$. 它满足同样的压缩距离估计, 但像不在 X 中, 而不动点方程的解 $x = 4$ 也不在 X . 因此只有距离估计、没有自映射条件并不够.

在完备空间 $\mathbb{R}$ 上取 $T(x) = x+1$. 它是 1-Lipschitz 自映射, 却无不动点. 同一空间上的恒等映射也是 1-Lipschitz, 却有无穷多个不动点. 因而将 $q < 1$ 放宽为 $q \leq 1$ 后, 存在性和唯一性都不能保证. $\square$

习题 6.3 在 $\mathbb{R}$ 上解 $x = \cos x$. 证明恰有一个解, 并给出从 $x_0 = 0$ 开始迭代时保证误差小于 ε 的先验条件.

解答. 任意解必在 $[-1, 1]$ 中. $T(x) = \cos x$ 把闭区间 $[-1, 1]$ 映入自身. 对 $x, y \in [-1, 1]$, 中值定理给出

$$|\cos x - \cos y| \leq \sin(1)|x - y|,$$

因为 $|\sin t| \leq \sin(1) < 1$ 对 $|t| \leq 1$ 成立. 区间完备, 所以 Banach 定理给出唯一不动点 x_* . 区间之外不可能有解, 因此这也是 $\mathbb{R}$ 中的唯一解.

令 $q = \sin(1)$, $x_0 = 0$, 则 $x_1 = 1$, 先验误差界为 $|x_n - x_*| \leq q^n/(1 - q)$. 取足够大的整数 n 使 $q^n < \varepsilon(1 - q)$, 即保证误差小于 ε . 无须预先知道 x_* 的数值. $\square$

习题 6.4 设 $g \in C([0, 1])$, $|\lambda| < 1$. 求积分方程

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_0^1 f(y) dy$$

的唯一连续解. 当 $\lambda = 1$ 时, 完整讨论是否有解及是否唯一.

解答. 记 $A = \int_0^1 f(y) dy$, $G = \int_0^1 g(y) dy$. 对方程两侧积分, 得 $A = G + \lambda A$. 当 $\lambda \neq 1$ 时, $A = G/(1 - \lambda)$, 从而

$$f(x) = g(x) + \frac{\lambda G}{1 - \lambda}.$$

直接代回可验证这是解, 推导也证明它唯一. 在 $|\lambda| < 1$ 的范围, 这一结论与压缩定理一致; 公式还说明压缩条件不是必要条件.

若 $\lambda = 1$, 关系 $A = G + A$ 要求 $G = 0$. 若 $G \neq 0$, 无解. 若 $G = 0$, 对任意常数 $A \in \mathbb{R}$, 函数 $f = g + A$ 都满足积分为 A , 因而都是解. 所有解也必须是这种形式, 所以有无穷多个解. $\square$

习题 6.5 考察初值问题 $y' = \sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$. 证明它有不只一个局部 C^1 解, 并指出为何不与局部 Picard-Lindelöf 定理矛盾.

解答. 零函数是一个解. 对任意 $c \geq 0$, 定义

$$y_c(t) = \begin{cases} 0, & t \leq c, \\ (t-c)^2/4, & t > c. \end{cases}$$

函数在连接点两侧的导数都趋于 0, 所以是 C^1 函数. 当 $t \leq c$ 时两侧都为 0; 当 $t > c$ 时, $y'_c(t) = (t-c)/2 = \sqrt{|y_c(t)|}$. 因 $c \geq 0$, 还满足 $y_c(0) = 0$. 特别地 y_0 与零函数在 0 的任何邻域都不同, 因而局部唯一性失败.

$F(t, y) = \sqrt{|y|}$ 连续, 但在 $y = 0$ 的任何邻域都不能对 y 满足统一 Lipschitz 条件. 对 $u > 0, v = 0$, 其差商为

$$\frac{|F(t, u) - F(t, 0)|}{|u - 0|} = \frac{1}{\sqrt{u}} \rightarrow \infty.$$

定理要求的 Lipschitz 假设不成立, 所以没有矛盾. □

7 拓扑空间与连通性

本章以 18.S190 第 6 讲第 1-2 页的拓扑空间定义和第 2 讲第 4 页的连通性定义为起点. 基、分离性、积与商、连通性的完整论证为编者补充.

7.1 拓扑公理与基

度量同时规定距离的数值和开集的结构. 连续函数的逆像判据只涉及开集, 因而可以将开集本身作为基本对象. 这样做保留了连续性、紧致性和连通性, 但不再自动保留柯西序列、距离误差或收缩系数. 后面每次从度量空间推广到拓扑空间时, 都要检查证明是否曾使用半径或距离.

定义 7.1 设 X 是集合. 一个子集族 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为 X 上的拓扑, 如果 $\emptyset, X \in \mathcal{T}$, 任意多个 $\mathcal{T}$ 中集合的并仍属 $\mathcal{T}$, 有限多个的交仍属 $\mathcal{T}$. $(X, \mathcal{T})$ 称为拓扑空间. $\mathcal{T}$ 中的集合称为开集, 补集为开集的集合称为闭集. 点 x 的邻域指包含一个含 x 的开集的集合; 开邻域则还要求自身开.

闭包 $\bar{A}$ 仍定义为所有包含 A 的闭集的交. 等价地, $x \in \bar{A}$ 当且仅当 x 的每个开邻域与 A 相交: 若有不交的开邻域 U , 闭集 $X \setminus U$ 包含 A 却不包含 x ; 若 x 不在某个闭超集 F 内, 开邻域 $X \setminus F$ 就与 A 不交. 内部是所有包含于 A 的开集的并, 边界仍是 $\bar{A} \setminus A^\circ$. 这些定义只使用开闭结构, 因而适用于一般拓扑.

这里允许空并和空交, 分别是 $\emptyset$ 和 X . “任意并”与“有限交”不能交换: 在通常实数拓扑中, $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ 不是开集.

例题 7.1 $\mathcal{P}(X)$ 是离散拓扑, $\{\emptyset, X\}$ 是平凡拓扑. 验证它们确为拓扑, 并说明度量空间的开集形成拓扑, 而至少含两点的平凡拓扑不能由度量产生.

解答. 离散拓扑包含所有子集, 而平凡拓扑只包含空集与全集, 两者均直接满足三个公理. 度量空间的开集形成拓扑 $\mathcal{T}_d$, 因为开集的任意并和有限交仍开. 若 X 至少有两点, 平凡拓扑不能由度量产生: 度量中的半径小于两点距离的球能够包含其中一点而排除另一点. □

定义 7.2 一个开集族 $\mathcal{B}$ 称为拓扑 $\mathcal{T}$ 的基, 如果每个开集都是某些 $\mathcal{B}$ 中集合的并. 等价地, 对每个 $x \in U \in \mathcal{T}$, 都存在 $B \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B \subseteq U$.

开球是度量拓扑的一组基. 基使检验连续性和写出开集更有效: 不必处理所有开集, 只须处理足够小的一批基本开集.

命题 7.3 子集族 $\mathcal{B}$ 能作为某个拓扑的基, 当且仅当它覆盖 X , 且若 $x \in B_1 \cap B_2$, 则有 $B_3 \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$. 此时由它生成的拓扑就是它的所有并组成的集合族.

证明. 若已有拓扑且 $\mathcal{B}$ 是基, 则把基的局部包含性质分别用于 X 和开集 $B_1 \cap B_2$, 即得两个条件. 反过来, 令 $\mathcal{T}$ 为基元素的所有并. 覆盖条件保证 $X \in \mathcal{T}$, 空并保证 $\emptyset \in \mathcal{T}$, 任意并的性质由并集结合律直接得到. 若 $U, V \in \mathcal{T}$ 且 $x \in U \cap V$, 可选 B_1, B_2 使 $x \in B_1 \subseteq U$ 和 $x \in B_2 \subseteq V$. 再选 B_3 使 $x \in B_3 \subseteq U \cap V$. 将对所有 x 选出的这些 B_3 取并就得到 $U \cap V$, 故其属于 $\mathcal{T}$. 两两交闭合加上 X 可推出所有有限交闭合. $\square$

实线上端点为有理数的开区间也是一组基. 给定 $x \in (a, b)$, 有理数的稠密性使我们可取 $a < q < x < r < b$. 因而 $x \in (q, r) \subseteq (a, b)$. 这说明一组基不必包含所有开球, 只须能够在每一点局部缩小.

定义 7.4 若对任意不同的点 $x, y \in X$, 都存在互不相交的开邻域 $U \ni x$ 和 $V \ni y$, 则称 X 为 Hausdorff 空间. 若对每个点 x 存在可数个开邻域 $U_1, U_2, \dots$, 使任意开邻域 $U \ni x$ 都包含某个 U_n , 则称 X 满足第一可数性.

度量空间是 Hausdorff 空间: 取半径 $d(x, y)/3$ 的两个球, 三角不等式使两球不相交. 它也满足第一可数性: $B(x, 1/n)$ 构成点 x 的可数邻域基.

7.2 序列与连续映射

在拓扑空间中定义 $x_n \rightarrow x$, 是指每个 x 的开邻域都包含序列的所有充分靠后的项. 度量空间中这与 ε 定义等价, 因为开球构成基. 在 Hausdorff 空间中极限唯一: 若序列同时收敛到不同的 x, y , 两个不相交的开邻域都应包含充分靠后的项, 产生矛盾. 一般拓扑空间中这个结论会失效; 平凡拓扑中每个序列收敛到每个点.

定义 7.5 拓扑空间间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为连续, 如果对每个 Y 的开集 V , $f^{-1}(V)$ 都是 X 的开集. 若 f 是双射, 且 f 与 f^{-1} 均连续, 则称 f 为同胚.

复合连续映射仍连续, 因为 $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$. 逆像保持任意并, 所以检查连续性时只需检查目标空间的基元素. 对闭集的逆像仍闭也是等价判据, 因为 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$.

命题 7.6 连续映射保持序列收敛. 若 X 满足第一可数性, 则反过来也成立: 若 $x_n \rightarrow x$ 总能推出 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, 则 f 连续. 同样, 在第一可数空间中, $x \in \overline{A}$ 当且仅当存在 A 中序列收敛到 x .

证明. 若 f 连续, 则 $f(x)$ 的每个开邻域 V 的逆像都是 x 的开邻域; $x_n \rightarrow x$ 保证 x_n 最终在这个逆像中. 反过来, 若 f 不连续, 存在 Y 中开集 V , 使 $f^{-1}(V)$ 非开. 取 $x \in f^{-1}(V)$ 且没有包含于此逆像的 x 的开邻域. 将 x 的可数邻域基换成 $W_n = U_1 \cap \dots \cap U_n$, 可使其递减. 按 x 的选法, 每个 x 的开邻域都有点的像落在 V 外. 从每个 W_n 选 x_n

满足 $f(x_n) \notin V$. 邻域基的性质保证 $x_n \rightarrow x$, 而像序列不收敛到 $f(x)$, 矛盾. 若 $x \in \bar{A}$, 每个 W_n 都与 A 相交, 选 $a_n \in A \cap W_n$ 即得 $a_n \rightarrow x$. 反向由收敛定义直接得到所有开邻域与 A 相交. $\square$

上述反向结论中, 第一可数性承担了从所有邻域中选出一条序列的作用. 不能把度量空间的序列判据不加条件地搬到一般拓扑空间.

例题 7.2 在不可数集合 X 上定义余可数拓扑: 非空开集是补集可数的集合. 验证这是拓扑, 并说明闭包和连续性的序列判据在这个空间中失效.

解答. 这是拓扑, 因为若一个并集非空, 可选其中一个非空成员 U , 并集的补集包含于可数集 $X \setminus U$; 空并或成员全为空的并仍为空集. 有限交只需在成员均非空时检查, 其补集是有限个可数集的并; 若有空成员则交为空. 在此拓扑中, 收敛序列必须最终恒等于极限. 若 $x_n \rightarrow x$ 但有无穷多项不同于 x , 令 $C = \{x_n : x_n \neq x\}$, 则 $X \setminus C$ 是 x 的开邻域, 这些无穷多项都不在其中, 矛盾. 然而任意不可数真子集 A 都满足 $\bar{A} = X$, 因为不可数的 A 不可能包含在可数的开集补集中. 因此 $x \notin A$ 属于 $\bar{A}$, 却没有 A 中序列收敛到它.

这也是一个非 Hausdorff 空间: 两个非空开集的交非空, 因为不可数集合删去两个可数集仍非空. 从该空间到同一集合的离散拓扑的恒等映射保持所有序列极限, 却不连续. 此例同时指出闭包序列判据和序列连续判据的适用边界. $\square$

7.3 子空间、积空间与商空间

定义 7.7 若 $A \subseteq X$, 则 $\mathcal{T}_A = \{A \cap U : U \in \mathcal{T}_X\}$ 称为子空间拓扑. 对拓扑空间 X, Y , 由所有矩形 $U \times V$ 生成的拓扑称为 $X \times Y$ 的积拓扑, 其中 U, V 分别开.

子空间的开集不必在原空间中开. 例如 $[0, 1]$ 中的 $[0, 1/2)$ 是相对开集, 因为它等于 $[0, 1] \cap (-1, 1/2)$. 相对开闭必须注明所处空间. 矩形基满足命题 7.3, 因为矩形交仍是矩形. 若 X, Y 是度量空间, 则

$$d((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}$$

是度量, 其半径 r 的球正是 $B_X(x, r) \times B_Y(y, r)$. 反过来, 任一点在开矩形中时, 可取两个分量允许半径的最小值, 找到其中的积度量球. 因而这个度量恰生成积拓扑. 有限多个空间同理. 这里不把有限积结论误当成任意无限积的度量公式.

命题 7.8 映射 $h: Z \rightarrow X \times Y$ 连续, 当且仅当两个坐标映射 $\pi_X \circ h$ 和 $\pi_Y \circ h$ 连续.

证明. 投影的开集逆像是开矩形 $U \times Y$ 或 $X \times V$, 故投影连续. 若 h 连续, 两个复合当然连续. 反过来, 开矩形的逆像等于两个坐标逆像的交, 因而开; 用矩形基检查连续性即可. $\square$

定义 7.9 设 $\sim$ 是 X 上的等价关系, $Q = X/\sim$ 是等价类集合, $q: X \rightarrow Q$ 是自然满射. 定义 $V \subseteq Q$ 开, 当且仅当 $q^{-1}(V)$ 在 X 中开. 这称为商拓扑. 更一般地, 满射 $q: X \rightarrow Q$ 若满足此开集等价判据, 则称为商映射.

这个定义确实给出拓扑, 因为逆像保持任意并、有限交以及全集和空集. “像的开集”与“逆像的开集”作用不同: 商映射本身连续, 但连续满射未必是商映射.

命题 7.10 若 $q: X \rightarrow Q$ 是商映射, $h: Q \rightarrow Y$ 是映射, 则 h 连续当且仅当 $h \circ q$ 连续. 因而一个在每个等价类上常值的连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 唯一诱导连续映射 $\tilde{f}: Q \rightarrow Y$.

证明. 正向用复合连续性. 反向取 Y 中开集 V , 由复合连续可知 $q^{-1}(h^{-1}(V))$ 开, 商拓扑定义给出 $h^{-1}(V)$ 开. 若 f 在等价类上常值, 定义 $\tilde{f}([x]) = f(x)$ 是良定义的, 并满足 $\tilde{f} \circ q = f$. 满射性使这一定义唯一. $\square$

引理 7.11 Hausdorff 空间的紧子集闭. 从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚.

证明. 设 K 紧, $y \notin K$. 对每个 $x \in K$, 取互不相交的开邻域 $U_x \ni x$ 和 $V_x \ni y$. 有限个 U_{x_i} 覆盖 K , 则 $\bigcap_i V_{x_i}$ 是 y 的开邻域且与 K 不交. 故 $X \setminus K$ 开. 空 K 的结论也成立. 对连续双射 $f: X \rightarrow Y$, X 的闭集 F 紧: 给定 F 的相对开覆盖, 先把各成员写成 $F \cap O_i$, 其中 O_i 在 X 中开. 集合族 $\{O_i\}$ 加上 $X \setminus F$ 是 X 的开覆盖, 从其有限子覆盖中即可得到 F 的有限子覆盖. 连续像 $f(F)$ 紧, 因而在 Y 中闭. 于是逆映射的闭集逆像都闭, 故逆映射连续. 紧性与连续像论证只使用开覆盖, 在一般拓扑空间中同样成立. $\square$

例题 7.3 将 $[0, 1]$ 的两个端点视为等价, 其余点仅与自身等价. 证明商空间同胚于单位圆 S^1 .

解答. 映射 $f(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ 连续, 并且其纤维正好是这些等价类, 故由命题 7.10 诱导连续双射 $\tilde{f}: [0, 1]/\sim \rightarrow S^1$. 商空间是紧区间的连续像, 因而紧; S^1 是欧氏空间子空间, 因而 Hausdorff. 引理 7.11 保证 $\tilde{f}$ 为同胚. 这说明粘合端点的几何直觉怎样变成可验证的拓扑论证. $\square$

7.4 连通性与道路连通性

定义 7.12 若空间 X 不能写成两个互不相交、非空开集的并, 则称 X 连通. 这样的表示称为一个分离. 子集的连通性总相对于子空间拓扑定义. 若任意 $x, y \in X$ 都可用连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 连接, 即 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$, 则称 X 道路连通.

连通不意味着只有一个点. 它意味着没有开闭的方式把空间整体分成两部分. 空空间也按定义连通, 但许多连通像和并集论证会另外要求有关集合非空.

命题 7.13 空间 X 连通当且仅当其同时开闭的子集只有 $\emptyset$ 和 X . 连通空间的连续像连通.

证明. 非空真子集 A 同时开闭时, A 和 $X \setminus A$ 给出分离. 反之, 分离的两部分互为补集, 所以都同时开闭. 若连续像 $f(X)$ 有分离 U, V , 它们在 X 中的逆像是互不相交的非空开集并覆盖 X , 与连通性矛盾. 这里用到 $f: X \rightarrow f(X)$ 的连续性, 它由子空间开集逆像判据保证. $\square$

定理 7.14 实数集 I 连通当且仅当它是区间, 即对 $a, b \in I$ 且 $a < t < b$, 必有 $t \in I$. 空集和单点集包括在此约定中.

证明. 若 $a < t < b$, $a, b \in I$ 而 $t \notin I$, 则 $I \cap (-\infty, t)$ 与 $I \cap (t, \infty)$ 给出分离, 因而连通集必须是区间. 反向设 I 是区间但有分离 U, V . 取 $a \in U, b \in V$, 必要时交换名称, 使 $a < b$. 令 $s = \sup(U \cap [a, b])$, 则 $s \in [a, b] \subseteq I$. 若 $s \in U$, 相对开放性给出 $\varepsilon > 0$ 使 $I \cap (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq U$. 又 $b \in V$, 故 $s < b$; 从 s 右侧取一个仍在 $[a, b]$ 中的点会违反上确界. 若 $s \in V$, 相对开放性给出 $\varepsilon > 0$ 使 $I \cap (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq V$. 由于 $a \in U$, 有 $s > a$; 上确界的定义保证这小段里又有 U 的点, 矛盾. 两种情形均不可能, 故区间连通. $\square$

若 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 其像是连通集, 因而是区间. 这立即给出介值定理, 并说明其背后的条件是定义域的连通性, 而不只是函数有局部极限.

命题 7.15 道路连通空间连通. 连通子集族若有公共点, 则其并连通.

证明. 若道路连通空间有分离, 取两个分量中的端点并用道路连接. 道路的像是连通区间的连续像, 不可能同时与分离的两部分相交, 矛盾. 若连通集合 A_i 有公共点 p 而并集有分离, 设 p 属于其中一部分. 每个 A_i 都因连通而必须完全在该部分, 另一部分因此空, 矛盾. $\square$

欧氏空间中凸集道路连通, 因为 $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ 处处留在凸集内. 更一般地, 星形集可先把 x 连接到星形中心, 再连接到 y .

例题 7.4 连通不必道路连通. 令

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}, \quad S = G \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

证明 S 连通而非道路连通.

解答. G 是区间 $(0, 1]$ 的连续像, 因而连通. 它在平面中的闭包正是 S : 对任意 $a \in [-1, 1]$, 选 θ 使 $\sin \theta = a$, 则充分大的 n 所对应的 $x_n = 1/(\theta + 2\pi n)$ 在 $(0, 1]$ 中且趋于 0, 点 $(x_n, \sin(1/x_n))$ 收敛到 $(0, a)$; 其他新极限点不存在, 因为 y 坐标总在该闭区间中, 而 $x > 0$ 时由连续性仍在图像上. 连通集的闭包连通: 若闭包有分离, 连通的原集只能在一部分, 另一非空相对开部分应与稠密原集相交, 矛盾.

但是 S 中不存在从竖直线段到 G 的道路. 假设有道路 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, 从 $x(0) = 0$ 到 $x(1) > 0$. 连续函数 $x(t)$ 的零点集合是非空闭集, 因为它包含 0, 且是紧区间的闭子集. 因此它有最大值 t_0 . 因为 $x(1) > 0$, 有 $t_0 < 1$; 按最大值定义和 S 中横坐标非负的条件, $x(t) > 0$ 对 $t \in (t_0, 1]$ 成立. 对任意小的 $\delta > 0$, 从 $x(t_0) = 0$ 到 $x(t_0 + \delta) > 0$ 的介值性保证该小时间段内 $x(t)$ 取得所有充分小的正值. 其中可选 $1/x = \pi/2 + 2k\pi$ 以及 $1/x = 3\pi/2 + 2k\pi$, 所以 $y(t)$ 在任意这样的时间段内分别取得 1 与 -1. 这与 y 在 t_0 连续矛盾. 因而 S 连通而非道路连通. $\square$

7.5 练习与解答

以下练习由编者编写, 不作为官方试题.

习题 7.1 证明有限积 $X \times Y$ 在 X, Y 连通时连通. 同时证明道路连通空间的有限积道路连通.

解答. 若某一因子为空, 积为空, 结论按定义成立. 否则固定 (x_0, y_0) . 对每个 $x \in X$, 子集 $\{x\} \times Y$ 同胚于 Y , 而 $X \times \{y_0\}$ 同胚于 X . 两者都连通且交于 (x, y_0) , 因而 $A_x = (\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y_0\})$ 连通. 所有 A_x 都含 (x_0, y_0) , 故其并即整个积空间连通. 若两因子道路连通, 分别选从 x_1 到 x_2 的道路 α 和从 y_1 到 y_2 的道路 β . 坐标连续性保证 $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ 为积空间的道路. $\square$

习题 7.2 设 X 是紧空间, Y 是 Hausdorff 空间, $f: X \rightarrow Y$ 是连续满射. 证明 f 是商映射. 为什么去掉紧性后, 连续双射不一定是同胚?

解答. 若 $f^{-1}(V)$ 开, 则 $F = X \setminus f^{-1}(V)$ 闭而紧. 由于 f 满射, $f(F) = Y \setminus V$; 它紧, 在 Y 中闭, 故 V 开. 反向由连续性保证, 所以 f 是商映射. 对反例, 取离散拓扑的 $\mathbb{R}$ 到通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 的恒等映射. 它连续且双射, 但逆映射不连续, 因为单点集在离散拓扑中开而在通常拓扑中不开. 离散的无限实数空间不是紧空间, 其单点开覆盖无有限子覆盖. $\square$

习题 7.3 设 X 是连通空间, $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ 连续, 目标赋予离散拓扑. 证明 f 是常值. 用这个判据证明任意至少有两点的离散空间不连通.

解答. 像是连通子集, 而离散二点空间唯一的非空连通子集是两个单点, 所以当 X 非空时 f 常值; 空定义域按通常约定也无非恒定映射. 若离散空间有不同点 a, b , 令 $f(a) = 0$, 其余点值为 1. 所有逆像均开, 所以 f 连续且非常值, 该空间不连通. $\square$

8 函数空间与分析中的拓扑

本章补齐 18.S190 第 6 讲第 3-5 页关于 Banach 空间、线性泛函与 Dirichlet 问题的导论. Baire 定理和一致有界原理参考 MIT OCW 18.102 Spring 2021 第 3 讲 PDF 第 3-4 页 (正文第 16-17 页); 函数族紧性与具体反例为编者补充, 不列为已核实的必考细项.

8.1 有界线性算子与对偶空间

范数空间既有度量又有线性运算. 距离 $d(u, v) = \|u - v\|$ 保证加法和数乘连续: 例如 $u_n \rightarrow u, v_n \rightarrow v$ 时, $\|(u_n + v_n) - (u + v)\| \leq \|u_n - u\| + \|v_n - v\| \rightarrow 0$. 若 $\lambda_n \rightarrow \lambda$ 且 $u_n \rightarrow u$, 序列 u_n 有界, 估计 $\|\lambda_n u_n - \lambda u\| \leq |\lambda_n - \lambda| \|u_n\| + |\lambda| \|u_n - u\|$ 给出数乘连续. 这些运算在纯度量空间中未必有定义.

定义 8.1 实或复范数空间 E, F 间的线性映射 $T: E \rightarrow F$ 称为有界线性算子, 如果存在 $C \geq 0$ 使 $\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E$ 对所有 $x \in E$ 成立. 算子范数定义为

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|_F.$$

所有有界线性算子构成空间 $\mathcal{L}(E, F)$. 当 F 是底域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时, 它们称为连续线性泛函, 其空间记为 E^* . “线性泛函”也常泛指任意线性标量映射, 故本书谈对偶范数时明确要求连续或有界.

若 $E \neq \{0\}$, 上确界也可在单位球面上取, 因为线性性允许缩放; 若 $E = \{0\}$, 用单位闭球的定义仍给出零范数, 避免空单位球面的约定问题. $\|T\|$ 是不等式中最小可用常数, 上确界无需取到.

命题 8.2 线性算子 $T: E \rightarrow F$ 有界, 当且仅当它在 0 连续, 也当且仅当它处处连续. 有界算子满足 $\|Tx - Ty\| \leq \|T\|\|x - y\|$.

证明. 有界性和线性性给出最后的不等式, 因而连续. 若在 0 连续, 可取 $\delta > 0$ 使 $\|z\| < \delta$ 时 $\|Tz\| < 1$. 对 $x \neq 0$, 令 $z = \delta x / (2\|x\|)$, 则 $\|Tx\| < 2\|x\|/\delta$. 对 $x = 0$ 不等式成立, 所以 T 有界. 处处连续当然包含在 0 连续. $\square$

例题 8.1 在非退化区间 $[a, b]$ 的连续函数空间中, 求点值泛函与积分泛函的范数, 并比较不同定义域范数下微分算子的连续性.

解答. 在 $C([a, b])$ 中, 点值泛函 $f \mapsto f(t_0)$ 的范数是 1, 因为 $|f(t_0)| \leq \|f\|_\infty$, 且常函数 1 取等. 当 $a < b$ 时, 积分泛函 $I(f) = \int_a^b f(t) dt$ 的范数是 $b - a$, 由积分估计及常函数取等得到. 导数算子 $D: C^1([a, b]) \rightarrow C([a, b])$ 若定义域使用 $\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ 则有界, 但若只使用 $\|f\|_\infty$ 就不有界. 例如 $f_n(t) = \sin(n(t-a))/n$ 在上确界范数下趋于 0, 而 $\|f'_n\|_\infty = 1$. 同一个代数算子的连续性取决于选用的范数. $\square$

定理 8.3 若 F 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{L}(E, F)$ 在算子范数下也是 Banach 空间. 特别地, 任意范数空间 E 的连续对偶 E^* 都是 Banach 空间, 即使 E 本身不完备.

证明. 算子范数的正定性、齐次性和三角不等式分别来自标量缩放及逐点估计, 所以它是范数. 设 (T_n) 是算子范数下的柯西序列. 对每个 $x \in E$, $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\|$, 因而 $(T_n x)$ 在 F 中有极限, 定义 $Tx = \lim_n T_n x$. 将极限通过有限线性组合, 得到 T 线性. 柯西序列 (T_n) 有统一范数上界 M , 于是 $\|Tx\| = \lim_n \|T_n x\| \leq M\|x\|$, 所以 T 有界. 给定 $\varepsilon > 0$, 当 $n, m \geq N$ 时 $\|T_n - T_m\| < \varepsilon/2$. 固定 $n \geq N$, 令 $m \rightarrow \infty$ 得 $\|(T_n - T)x\| \leq (\varepsilon/2)\|x\|$, 再对单位闭球取上确界, 得 $\|T_n - T\| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. 因此收敛在算子范数中成立. $\square$

这里两个层次都不可省: 先借助目标空间的完备性定义逐点极限, 再用对所有单位向量统一的柯西估计证明算子范数收敛. 仅有逐点收敛不足以给出算子范数收敛.

8.2 Baire 定理与一致有界原理

全有界性与完备性一起产生紧致性. 但无限维 Banach 空间的单位闭球通常不紧; 完备性单独还能控制什么? Baire 定理给出的控制是: 不能用可数多个处处稀疏的闭集覆盖一个非空完备空间.

定义 8.4 度量空间 X 中的子集 A 称为无处稠密, 如果 $\bar{A}$ 的内部为空. 可数个无处稠密的并称为第一纲集.

闭集无处稠密, 等价于不包含任何非空开球. 无处稠密集不必为空; 例如实数中的整数集闭且内部空. 第一纲集则仍可能稠密. 有理数是可数个单点的并, 因而在 $\mathbb{R}$ 中是第一纲集, 同时又稠密.

定理 8.5 (Baire 定理) 在完备度量空间 X 中, 可数个稠密开集 G_n 的交仍稠密. 特别地, 非空完备度量空间不能是可数个无处稠密的并; 若非空 $X = \bigcup_n F_n$ 且各 F_n 闭, 则至少一个 F_n 有非空内部.

证明. 若 X 为空, 稠密交的结论按定义成立. 否则要证明稠密, 只须在每个非空开集 U 中找到交集的点. 因 G_1 稠密且开, $U \cap G_1$ 非空开. 取中心 x_1 与 $0 < r_1 < 1/2$, 使闭球 $\bar{B}_d(x_1, r_1) = \{x : d(x, x_1) \leq r_1\}$ 包含在 $U \cap G_1$ 内. 这可做到: 从中心的一个已包含开球取更小半径. 这里闭球记号表示距离不大于半径的集合, 不假定它等于同半径开球的闭包.

归纳地, $B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}$ 非空开, 取 x_{n+1} 与 $0 < r_{n+1} < 2^{-n-1}$, 使

$$\bar{B}_d(x_{n+1}, r_{n+1}) \subseteq B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}.$$

这些非空闭球嵌套且直径趋于 0. 第 5 章的完备空间嵌套闭集定理给出唯一公共点 x . 若不调用该定理, 也可直接看出: 对 $m > n$, 有 $x_m \in \bar{B}_d(x_n, r_n)$, 故中心序列柯西; 由完备性有极限, 各闭球包含相应尾部所以也包含极限. 于是 $x \in U$ 且 $x \in G_n$ 对所有 n 成立, 证明稠密性.

若 A_n 无处稠密, 其闭包补集 $G_n = X \setminus \bar{A}_n$ 稠密且开. 非空 X 中稠密交非空, 其中的点不在任何 A_n 内, 故这些集合不能覆盖 X . 对闭集覆盖若每个 F_n 内部均空, 就得到这样的不可能覆盖. $\square$

反例的环境同样重要: $\mathbb{Q}$ 在通常度量下是可数个单点的并, 每个单点在 $\mathbb{Q}$ 内闭且内部空, 但 $\mathbb{Q}$ 不完备. 这不违反 Baire 定理.

定理 8.6 (一致有界原理) 设 E 是 Banach 空间, F 是范数空间, $T_n \in \mathcal{L}(E, F)$. 如果对每个 $x \in E$ 都有 $\sup_n \|T_n x\| < \infty$, 则 $\sup_n \|T_n\| < \infty$.

证明. 令 $A_k = \{x \in E : \|T_n x\| \leq k \text{ 对所有 } n\}$, $k \geq 1$. 每个 A_k 是闭集, 因为它是闭集 $T_n^{-1}(\bar{B}_F(0, k))$ 的交. 逐点有界保证 $E = \bigcup_k A_k$. 若 $E = \{0\}$, 所有算子范数为零; 否则 Baire 定理仍对整个非空完备空间 E 适用, 给出 $B(x_0, r) \subseteq A_k$, $r > 0$. 对 $\|h\| < r$, $x_0 + h$ 与 x_0 均属 A_k , 故 $\|T_n h\| \leq \|T_n(x_0 + h)\| + \|T_n x_0\| \leq 2k$. 取 $h = (r/2)x$ 且 $\|x\| \leq 1$, 得 $\|T_n x\| \leq 4k/r$. 这个界同时适用于所有 n, x , 因而 $\|T_n\| \leq 4k/r$. $\square$

本证明在整个 E 中使用 Baire 定理. 若只在单位闭球中得到相对开球, 不能直接假定它包含范数空间中的整球; 必须额外处理边界. 将闭集 A_k 定义在全空间中可以避开这个不必要的障碍.

8.3 连续函数族的紧性

函数序列逐点有界并不足以有一致收敛子列. 在 $[0, 1]$ 上, $f_n(x) = x^n$ 全部满足 $\|f_n\|_\infty = 1$, 但逐点极限在 1 不连续; 所以任何子列也不可能一致收敛到连续函数. 缺失的是所有函数共同的局部变化控制.

定义 8.7 设 K 为非空紧度量空间. 函数族 $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ 称为一致等度连续, 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使所有 $f \in \mathcal{F}$ 和所有 $x, y \in K$ 都满足 $d(x, y) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 称它一致有界, 若存在 M 使 $|f(x)| \leq M$ 对所有 f, x 成立.

紧空间上常用的逐点等度连续定义与本定义等价. 若每个 x 都有适用于全族的半径 r_x 使 $d(x, y) < r_x$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/2$, 则球 $B(x, r_x/2)$ 覆盖 K . 取有限子覆盖 $B(x_i, r_i/2)$, 并令 $\delta < \min_i r_i/2$. 若 y 在第 i 个小球内且 $d(y, z) < \delta$, 则 y, z 都在 $B(x_i, r_i)$ 内, 用三角不等式给出 $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$. 这样将逐点半径变为全域统一半径.

定理 8.8 (Arzelà–Ascoli 判据) 设 K 为非空紧度量空间. $\mathcal{F} \subseteq C(K, \mathbb{R})$ 的闭包在上确界范数下紧, 当且仅当 $\mathcal{F}$ 一致有界且一致等度连续.

证明. 若闭包 H 紧, 则它在范数度量下有界, 即有统一上确界. 给定 $\varepsilon > 0$, 用有限个半径 $\varepsilon/4$ 的范数球覆盖 H , 中心为 $g_1, \dots, g_m \in H$. 每个 g_i 在紧 K 上一致连续, 故存在统一的 $\delta > 0$ 使 $d(x, y) < \delta$ 时 $|g_i(x) - g_i(y)| < \varepsilon/2$ 对所有中心成立. 任意 $f \in H$ 选相距小于 $\varepsilon/4$ 的中心, 得 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/4 + \varepsilon/2 + \varepsilon/4 = \varepsilon$. 因而 $\mathcal{F}$ 一致等度连续.

反过来, 要利用第 4 章的“完备且全有界”等价判据. $C(K)$ 完备, 故 $\overline{\mathcal{F}}$ 完备. 只须证明 $\mathcal{F}$ 全有界, 因为全有界集的闭包仍全有界: 先用半径 $\eta/2$ 的有限球覆盖原集, 再用半径 η 的同心球覆盖闭包.

固定 $\varepsilon > 0$, 取等度连续半径 δ 使近点函数差小于 $\varepsilon/4$. 用有限个半径 δ 的球覆盖 K , 中心为 $x_1, \dots, x_N$. 在有界区间 $[-M, M]$ 中分出有限个长度小于 $\varepsilon/4$ 的小区间, 把每个 $f \in \mathcal{F}$ 按 N 个值 $f(x_i)$ 各属哪一个小区间分类; 端点可以用半开分割避免多重归属. 类别仅有限个. 对每个非空类别选一个代表 g . 若 f 与 g 同类, 则对任意 $x \in K$ 选 i 满足 $d(x, x_i) < \delta$, 有

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - g(x_i)| + |g(x_i) - g(x)| < 3\varepsilon/4.$$

所以这些有限代表的半径 ε 球覆盖 $\mathcal{F}$. 若函数族为空, 结论直接成立. 故闭包全有界且完备, 从而紧. $\square$

在 $[0, 1]$ 上, 族 $\{f : \|f\|_\infty \leq M, |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|\}$ 一致有界且等度连续. 两个不等式在一致极限下仍成立, 所以这个族还闭, 因而紧. 相比之下, $C([0, 1])$ 的整个单位闭球不紧. 这是有限维“闭且有界即紧”和无限维函数空间之间最常见的分界.

8.4 流形与 Dirichlet 问题的动机

18.S190 的终点还包括流形和偏微分方程的学习方向. 这里保留其与拓扑的关系, 不把导论提升为已证明的流形理论或椭圆方程存在性理论.

定义 8.9 一个 n 维拓扑流形通常定义为 Hausdorff、第二可数且局部同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的空间. 第二可数指存在可数的全局开集基. “局部同胚”指每点有开邻域 U , 以及从 U 到 $\mathbb{R}^n$ 某开子集的同胚. 光滑流形进一步要求所选坐标图之间的转移映射光滑.

本定义并不直接把流形定义为嵌在欧氏空间中的光滑曲面. 例如圆周在每点附近同胚于开区间, 但圆周整体不与开区间同胚, 因为前者紧而后者不紧. 开圆弧上可用角度作局部坐标. 度量不是这里写出的定义项; 在常用的 Hausdorff、第二可数约定下有可度量化定理, 该定理超出本书证明范围. 局部坐标、全局拓扑和所选度量是不同层次.

平面区域 Ω 上的经典 Dirichlet 问题要求寻找 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 使

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{在 } \Omega, \quad u|_{\partial\Omega} = f.$$

存在性还取决于区域边界和边界数据的条件, 不能只凭 f 连续就对任意区域宣布存在. 一个自然的研究方向是 Dirichlet 能量 $E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dA$. 在积分有意义、且允许光滑紧支撑变分的函数类中, 若光滑 u 满足 $E(u) < \infty$ 且已是能量极小元, 则对每个 $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$0 = \left. \frac{d}{dt} E(u + t\phi) \right|_{t=0} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \phi dA = - \int_{\Omega} (\Delta u) \phi dA.$$

最后一步用紧支撑消除边界项. 由于 Δu 连续, 若它在某点为正或负, 可选择支撑在 Δu 保持同号的小邻域内的非零非负测试函数, 使最后的积分非零. 因此 $\Delta u = 0$. 这个论证证明的是“光滑极小元存在时满足方程”, 并未证明极小元存在.

例题 8.2 构造零边界条件的光滑函数序列, 使其 Dirichlet 能量趋于零, 而一阶导数上确界范数趋于无穷.

解答. 小能量不能控制 C^1 范数, 所以不能直接用 C^1 紧性为上述极小元存在作保证. 取 $x_0 \in \Omega$ 及一个非恒定的光滑函数 ϕ , 其支撑紧含于单位圆盘内. 这样的函数可由 $\exp(-1/(1-|x|^2))$ 在 $|x| < 1$ 定义、在外部置零并适当缩放构造; 所有阶导数在边界趋零是由指数衰减快于任意幂得到的. 选 $r_n \downarrow 0$ 使 $B(x_0, r_n) \subseteq \Omega$, 并定义

$$u_n(x) = r_n^{1/2} \phi((x - x_0)/r_n).$$

它们在边界附近为零. 对这些有紧支撑的函数, 本例使用 $\|u\|_{C^1} = \|u\|_{\infty} + \|\nabla u\|_{\infty}$, 各项均有限. 变量代换给出

$$E(u_n) = \frac{r_n}{2} \int_{\mathbb{R}^2} |\nabla \phi(y)|^2 dy \longrightarrow 0, \quad \|\nabla u_n\|_{\infty} = r_n^{-1/2} \|\nabla \phi\|_{\infty} \longrightarrow \infty.$$

因此零边界问题的极小能量是 0, 这些 u_n 是趋近该能量的序列, 却没有 C^1 收敛子列. 能量趋近下确界与适当拓扑中的紧性是两件不同的事. 为解决一般存在性问题需要选择更合适的函数空间与收敛方式, 而不是把能量有界直接当成一致导数有界. $\square$

8.5 练习与解答

以下练习由编者编写, 不作为官方试题.

习题 8.1 在 $C([0, 1])$ 中, 令 $\mathcal{F} = \{f : f(0) = 0, |f(x) - f(y)| \leq |x - y|\}$. 证明 $\mathcal{F}$ 紧. 若去掉 Lipschitz 条件而只留下 $\|f\|_\infty \leq 1$ 与 $f(0) = 0$, 结论是否仍成立?

解答. 从 $f(0) = 0$ 得 $|f(x)| \leq x \leq 1$, 所以一致有界. Lipschitz 条件保证一致等度连续. 这些条件在一致极限下保持, 故族闭; Arzelà–Ascoli 判据给出紧性. 去掉 Lipschitz 条件后, $f_n(x) = x^n$ 都属于新族. 若有一致收敛子列, 其连续极限也应等于所有子列的逐点极限, 即在 $[0, 1)$ 为 0 而在 1 为 1, 不连续, 矛盾. 因而新族不紧. $\square$

习题 8.2 设 c_{00} 是只有有限个非零项的实数序列空间, 赋予上确界范数. 定义 $T_n(x) = nx_n$. 证明每个 T_n 是有界线性泛函, 对每个固定 x 有 $\sup_n |T_n x| < \infty$, 而 $\sup_n \|T_n\| = \infty$. 指出这为什么不反驳一致有界原理.

解答. $|T_n x| \leq n\|x\|_\infty$, 取第 n 项为 1 其余为零的序列即可取等, 所以 $\|T_n\| = n$. 对固定有限支撑序列, $T_n x$ 只有有限多个非零值, 故逐点有界. 但 c_{00} 不完备: 序列 $x^{(m)} = (1, 1/2, \dots, 1/m, 0, \dots)$ 是上确界范数下的柯西序列, 其任何可能极限的第 k 项必为 $1/k$, 这个无限支撑序列不在 c_{00} 中. 一致有界原理所需定义域完备性失效. $\square$

习题 8.3 证明一个非零且完备的实或复范数空间, 若作为向量空间有一组可数无限 Hamel 基 $e_1, e_2, \dots$, 将产生矛盾. 可调用第 3 章的有限维范数等价, 但不能把可数稠密集当成 Hamel 基.

解答. 令 $E_n = \text{span}(e_1, \dots, e_n)$. 有限维范数等价保证 E_n 完备, 因而在完备空间中闭. 它是一个真线性子空间, 所以内部空: 若包含某个球 $B(x, r)$, 则 $x \in E_n$, 减去 x 得到 $B(0, r) \subseteq E_n$; 再用缩放使任意向量落入该球, 可得 $E_n = E$, 矛盾. Hamel 基的定义要求每个向量是有限线性组合, 故 $E = \bigcup_n E_n$. 这与 Baire 定理矛盾. 可分空间可以有可数稠密集, 但稠密集允许取极限, 而 Hamel 基只允许有限线性组合, 二者不能混淆. $\square$

参考文献

[1] Paige Bright. *18.S190 Introduction to Metric Spaces*. MIT OpenCourseWare, January IAP 2023. 六讲 Lecture Notes 及官方 TeX, 另附三份 Problem Sets. 主讲义 PDF 物理页数依次为 8、8、8、6、7、6.

课程: <https://ocw.mit.edu/courses/18-s190-introduction-to-metric-spaces-january-iap-2023/>.

讲义: <https://ocw.mit.edu/courses/18-s190-introduction-to-metric-spaces-january-iap-2023/pa- ges/lecture-notes/>.

[2] Casey Rodriguez(授课), Andrew Lin(笔记). *18.102/18.1021 Introduction to Functional Analysis*, Lecture 3: Quotient Spaces, the Baire Category Theorem and the Uniform Boundedness Theorem. MIT OpenCourseWare, Spring 2021. PDF 第 3–4 页, 正文印刷第 16–17 页: Baire 定理及一致有界原理. 本册重新给出证明, 修正原证明

中相对开球与全空间开球的区分.

官方资源页: 18.102 第 3 讲.

- [3] James Munkres(授课). *18.901 Introduction to Topology*, Supplementary Notes D: Countability Axioms. MIT OpenCourseWare, Fall 2004, 3 页. 本册可数性讨论的选读参考; 不作为 18.901 整课或商业教材的全文翻译. Notes C 与 K 仅作为原件选读归档, 未将其高级结论纳入基础必备范围.
<https://ocw.mit.edu/courses/18-901-introduction-to-topology-fall-2004/pages/lecture-notes/>.
- [4] 清华大学本科招生网. 2027 年丘成桐数学科学领军人才培养计划招生简章. 2026 年 9 月 28 日. 第六条第 3 项: 一试数学 1 包括分析、代数、几何与拓扑.
<https://www.admissions.tsinghua.edu.cn/info/1033/2240.htm>.
- [5] 清华大学求真书院. 数学领军计划之数学与物理科目考纲发布! 官方通知, 2026 年 8 月 21 日. 本次核实其通知与详细考纲链接存在, 未获得所链原文; 具体考纲核实边界见前言和 [research/syllabus-verification.md](https://qzc.tsinghua.edu.cn/).
<https://qzc.tsinghua.edu.cn/>. 既有仓库记录的资料题名为领军考试大纲 (2).pdf, 文件内日期 2026 年 8 月 20 日, 共 6 页; 本次没有将该摘要提升为重新逐页核验的证据.
- [6] Creative Commons. *Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*.
许可: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.
MIT OCW 使用条款: <https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/>.