

凸分析与最优化

MIT 6.253 中文讲义与 15.053 课程习题

Dimitri P. Bertsekas 原课程讲义, Spring 2012

2026 年 10 月中文整理

前言

本书以 MIT OpenCourseWare 的 6.253 *Convex Analysis and Optimization* 2012 年春季课程完整讲义为主源, 按凸集与函数、最优解与分离、对偶、结构化模型和数值算法的依赖关系重新组织. 原资料是教学幻灯片; 本稿把其数学陈述转写为可连续阅读的简体中文正文, 补充定义之间的联系、证明中省略的论证及例题计算. 补充论证由整理者负责, 不能理解为原作者逐字表述.

预备知识是有限维线性代数、多元微积分及实分析中的序列、闭集与紧集. 所有向量默认是列向量, $x^T y$ 表示欧氏内积, $\|x\| = \sqrt{x^T x}$. 最优值允许为无穷; “最优解存在”与“最优值有限”分别讨论. 为避免遗漏条件, 后文使用闭、真、凸函数时均说明其含义.

原作者署名为 Dimitri P. Bertsekas, 课程提供者 of Massachusetts Institute of Technology / MIT OpenCourseWare. 原始公开课程材料的适用许可见 [MIT OCW 使用条款](#)及 [CC BY-NC-SA 4.0](#). 本稿为翻译、重排与补充证明的改编, 按同一非商业、署名、相同方式共享许可提供; MIT 与原作者未为本稿背书. 原 PDF 第 1 页说明图形由 Athena Scientific 授权使用. 本稿不复制这些图形, 不转载外部教材全文; 所绘示意图是按数学定义重新绘制. 外部书籍、论文及课程链接不因此自动取得 OCW 许可.

本次增补将原课大纲与独立课历置于正文前, 并将公开作业、期中卷和综合练习的中文题面与解答收入同册. 6.253 的 2010 年作业与 2010/2012 年考试分别标年; 15.053 按 2013 年资源页面保留版本, 不造合并课表. 官方解答重构、独立补解及原件错漏在题后区分.

各章首给出对应原讲次与原 PDF 页范围, 便于对照; 同一原讲的复习内容可在数章出现. 数学正文不沿用幻灯片式省略, 也不把算法列表当作收敛证明.

原课程资料与课历

6.253: Convex Analysis and Optimization, Spring 2012. MIT 电气工程与计算机科学系研究生课程, 教师 Dimitri P. Bertsekas. 每周两次讲课, 每次 1.5 小时. 官方网页没有逐讲公历日期或上课钟点, 因而下面保留讲次顺序, 不填推测日期. 先修为一门线性代数课 (最好包含抽象理论) 及一门实分析课, 例如 18.06、18.100. 课程强调严格证明、几何直觉及算法的适用条件. 成绩由作业 25%、期中考试 25%、学期论文 50% 组成. 主教材为 Bertsekas 的 *Convex Optimization Theory*, Athena Scientific, 2009. 课程大纲的阅读顺序为: 基本凸性 (1.1–1.4 节), 凸性与优化 (第 3 章), 超平面与共轭 (1.5–1.6 节), 多面体凸性 (第 2 章), 几何对偶 (第 4 章), Lagrange/Fenchel/锥对偶及鞍点 (5.1–5.3、5.5 节), 次梯度与最优性 (5.4 节), 凸优化算法 (第 6 章). 这里的教材章节号属于原教材, 与本册重构成章号不同.

讲次	原课主题	本册对应
1	凸性在优化中的作用; 对偶; 算法与对偶	第1、4章
2	凸集与函数; 上图; 闭凸函数; 凸性的判别	第1章
3	可微凸函数; 凸包与仿射包; Carathéodory 定理	第1章
4	相对内部与闭包; 二者的运算; 凸函数连续性与闭包	第2章
5	衰退锥与线性空间; 函数衰退方向; 局部/全局极小; 最优解存在	第2章
6	闭集交非空; 解的存在; 线性变换下闭性; 超平面	第3章
7	超平面分离; 非竖直超平面; 共轭函数; 共轭定理	第3章
8	共轭复习; 最小公共点/最大截距 (MC/MC); 弱对偶	第3、4章
9	极小极大与零和博弈; MC/MC 定理; 强对偶; 对偶解存在	第4章
10	MC/MC 定理 III; 非线性 Farkas 引理; 线性及凸规划对偶; 最优条件	第4章
11	凸规划对偶反例; Fenchel 对偶; 锥对偶	第4、6章
12	次梯度; Fenchel 不等式; 灵敏度; 次微分运算; 最优性	第5章
13	问题结构; 锥规划	第6章
14	锥与半正定规划; 精确罚函数; 下降与最速下降	第7章
15	次梯度计算、迭代与收敛	第7章
16	近似次梯度; 近似方法; 切平面	第7、8章
17	切平面; 单纯形分解; 二者的对偶关系	第8章
18	广义多面体近似; 结合切平面与单纯形分解	第8章
19	近端极小化及其扩展	第9章
20	近端切平面; 束方法; 增广 Lagrange; 对偶近端	第9章
21	广义近端; 内点与障碍法; 锥规划内点	第9–11章
22	大规模求和; 增量梯度/次梯度/近端; 循环与随机选择	第10章

讲次	原课主题	本册对应
23	梯度投影; 迭代复杂度; 外推; 最优一阶算法	第11章
24	梯度近端; 非二次近端; 熵、指数增广 Lagrange 与镜像下降	第11章
25	凸分析、对偶与算法复习	第13章

以上课历属于 2012 年讲义. 官方作业页明确说明五组作业来自 2010 年春季; 本册分别标为 2010 年作业、2010 年期中、2012 年期中. 原作业文件没有截止日期, 不将它们安插进 2012 年某一周. 课程大纲与 讲次索引是这份课历的来源.

15.053: Optimization Methods in Management Science, Spring 2013. MIT Sloan 管理学院本科课程, 教师 James Orlin 与 Ebrahim Nasrabadi. 每周两次讲课, 每次 1.5 小时; 每周一次习题课, 每次 1.5 小时. 官方无正式先修要求. 无必购教材, 原课使用 Excel Solver. 课程按线性规划、整数规划、网络流与启发式、决策树、行为经济学组织. 本册原第12章只取已选的线性规划讲次; 增补题目按原课程库存收入, 因而还包含后续整数规划、网络与决策树题, 不将这些题伪称全部属于线性规划.

考核为书面作业 10%、电子表格作业 10%、测验 2-5 合计 10%、测验 6-7 合计 10%、两次期中各 20%、团队项目 15%、课堂参与 5%. 测验 1 是练习, 原权重 0%, 在能提高测验平均分时可计入; 测验 2-5 去掉最低分后把其余总分折算为 10 分. 七次测验通常 20-30 分钟. 期中 1 考线性规划, 期中 2 考整数规划; 没有期末考试. 六组作业独立提交, 可讨论但不可抄袭; PS1、PS2 各分两组, 所以前两题合并、第 3 题两版均保留. 习题课自愿参加; 两次期中考前各有一次复习. 团队项目要求 4-6 页团队论文、1 页个人学习报告及展示. 这些是 2013 年原课规定, 不是本册给自学者新增的评分安排.

课次	原课主题	原课程节点
L1	课程介绍	
L2	线性与非线性规划建模	
R1	习题课 1	
L3	线性规划几何与图示	测验 1(建模); PS1 截止
L4	单纯形法 1	
R2	习题课 2	
L5	单纯形法 2	测验 2(建模与 LP 几何); PS2 截止
R3	习题课 3	
L6	灵敏度与影子价格	
L7	双人零和/常和博弈 1	测验 3(单纯形); PS3 截止
R4	习题课 4	
L8	博弈论 2	
L9	项目讨论; 松弛与人工变量	测验 4(灵敏度); PS4 截止
R5	习题课 5	
考试	期中考试 1	官方此页没有实际试卷
L10	整数规划介绍	项目成员名单提前一天截止
L11	整数规划建模	选题及简介两天后截止
R6	习题课 6	
L12	分支定界	
L13	割平面	测验 5(整数建模); PS5 与项目初步提案截止

课次	原课主题	原课程节点
R7	习题课 7	
L14	整数规划建模续	
L15	网络 1: 最短路	PS6 截止
R8	习题课 8	
考试	期中考试 2	项目最终提案截止; 提供综合练习
L16	网络 2: 网络流	
L17	网络 3: 旅行商问题	班级票选课堂项目展示
R9	习题课 9	
L18	决策树 1	测验 6(网络)
L19	决策树 2: 信息价值	
R10	习题课 10	
L20	行为经济学 1	测验 7(决策树); 团队论文及个人报告截止
L21	行为经济学 2	
L22	项目报告	
L23	项目报告	最终反馈

课历取自**2013 年大纲**. L 为讲课, R 为习题课. 大纲给课次及相对截止节点, 没有具体上课钟点或逐讲日期. 作业 PDF 另记 PS1 截止 2 月 12 日、PS2 截止 2 月 21 日、PS3 截止 2 月 28 日、PS4 截止 3 月 7 日、PS6 截止 4 月 11 日 (均 2013 年). PS5 标题原写 “Thursday April 2th, 2013”, 日期 4 月 2 日与星期四相矛盾, 无据决定哪个正确, 故保留矛盾而不猜测改成 4 月 4 日. PS1 组别文件名与页首 “Second Group” 亦有不一致, 按官方资源页 Group 1/2 及对应内容标版本. 这些日期不反推为另一个课程的日历. 习题课 1-9 原由 Ebrahim Nasrabadi、Giacomo Nannicini 为 2012 年课程编制, 经 Nannicini 许可收入 2013 年页面, 其年份出处在题章保留.

公开考试资料的边界. 6.253 公开两份期中卷及解答. 15.053 公开期中 2 综合练习及解答, 没有两份实际期中试卷或七份测验试卷. 不能用复习指南反造缺失试卷. 测验 2 指南列九类任务: 二维可行域与冗余约束, 凸形与顶点, 指定最优点的目标构造, 松弛/剩余变量, 标准单纯形表判别, 基与基本可行解, 进入变量及最优性, 沿边移动与无界判断, 主元更新. 测验 3 指南列七类: 进入变量, 比值与离基/无界, 退化, 替代最优解, 唯一点/最优边/最优射线, Bland 规则, Phase I. 测验 6 指南覆盖网络术语与 Dijkstra, 最小费用流、整数性、运输与指派, 独立 1 与覆盖线的对偶, TSP 及设施选址的构造和改进启发式. 指南 3 说明测验 25 分钟; 指南 6 正文的 “3D-minute” 是原件字符错误, 不能据此捏造一项精确时长.

目录

原课程资料与课历	ii
1 凸集与凸函数	1
1.1 优化问题与凸性	1
1.2 保持凸性的运算	1
1.3 上图、闭性与扩展实值	2
1.4 可微凸函数与最优性	3
1.5 投影与有限表示	4
2 相对内部与无穷远方向	6
2.1 相对内部与线段原理	6
2.2 相对内部的运算	7
2.3 凸函数的连续性与闭包	8
2.4 衰退锥与线性空间	9
2.5 衰退函数与最优解存在性	9
3 闭性、分离与共轭	10
3.1 嵌套闭集与回缩性	11
3.2 线性像与部分极小化	12
3.3 分离超平面	13
3.4 多面体分离的加强	13
3.5 仿射下界与共轭函数	14
3.6 支撑函数、极锥与 Farkas 引理	15
4 扰动、对偶与最优性	16
4.1 最小共点与最大截距	16
4.2 拉格朗日对偶	17
4.3 线性与二次规划对偶	19
4.4 Fenchel 对偶及反例	19
4.5 极小极大与零和博弈	20
5 次梯度与灵敏度	20
5.1 定义、存在性与共轭等号	20
5.2 法锥与支撑函数	21
5.3 链式法则与和法则	22

5.4	乘子的灵敏度意义	23
6	锥规划与问题结构	23
6.1	锥约束与对偶锥	23
6.2	二阶锥与半正定锥	24
6.3	可分离结构与离散下界	25
6.4	大规模和与多约束	25
6.5	由紧性保证强对偶	26
7	锥模型、惩罚与次梯度迭代	26
7.1	二阶锥与半正定模型	26
7.2	精确惩罚与乘子的阈值	28
7.3	方向导数与最陡下降	29
7.4	一个次梯度的计算	30
7.5	投影次梯度法的距离估计	30
7.6	步长、目标值估计与误差次梯度	31
8	多面体近似与内外线性化	32
8.1	切平面与上下界	32
8.2	单纯形分解	33
8.3	函数的内线性化及共轭关系	34
8.4	广义单纯形分解与对偶切平面	35
8.5	广义单调规划的对称对偶	35
8.6	混合多面体近似算法	36
9	近端稳定化与增广拉格朗日	37
9.1	近端子问题的存在与基本恒等式	37
9.2	收敛、增长阶与有限终止	38
9.3	共轭实现与 Moreau 包络	39
9.4	近端切平面与 bundle 方法	40
9.5	增广拉格朗日作为对偶近端法	41
9.6	广义正则化与上界最小化	42
10	内点障碍与增量方法	43
10.1	障碍法及其极限	43
10.2	锥的对数障碍	44

10.3 大规模分量和与极限环	44
10.4 循环次序的整轮估计	45
10.5 独立随机次序与概率保证	46
10.6 增量近端与次梯度的组合	46
11 一阶复杂度、复合近端与镜像下降	47
11.1 从渐近收敛到迭代次数	47
11.2 光滑性、投影与二次模型	48
11.3 复合目标的梯度近端法	48
11.4 梯度法上界的量级与动量	49
11.5 递增外推与加速势函数	49
11.6 Bregman 正则化与三点恒等式	51
11.7 熵近端及指数增广拉格朗日	51
11.8 镜像下降与单纯形上的乘法更新	52
12 线性规划建模与单纯形法	53
12.1 变量、参数与线性模型	53
12.2 排班与辅助变量	55
12.3 线性变换与标准形	56
12.4 基本可行解与顶点	56
12.5 换基、检验数与终止证书	57
12.6 Phase I 与人工变量	58
12.7 退化、循环与 Bland 规则	58
12.8 基不变范围与影子价格	59
13 分析与计算的联系	60
13.1 从模型到证书	60
13.2 算法利用的结构	61
13.3 一个复合模型	61
14 6.253 作业题与解答	62
14.1 作业 1: 凸集与凸函数	62
14.2 作业 2: 相对内部与最优解稳定性	63
14.3 作业 3: 回缩、分离与部分极小化	65
14.4 作业 4: 共轭、支持函数与鞍点	67

14.5 作业 5: 乘子、扰动与整数规划	68
15 6.253 期中考试题与解答	70
15.1 2010 年春季期中考试	70
15.2 2012 年春季期中考试	72
16 15.053 作业题与解答	74
16.1 作业 1: 变量、变换与产品组合	75
16.2 作业 2: 图解、单纯形与重新定价	78
16.3 作业 3: 两阶段法、退化与参数表	81
16.4 作业 4: 灵敏度报告与零和博弈	83
16.5 作业 5: 整数建模与逻辑约束	85
16.6 作业 6: 分支定界、覆盖割与 Gomory 割	88
17 15.053 习题课题目与解答	91
17.1 Recitation 1: 建模与凸性	91
17.2 Recitation 2: 几何与单纯形	93
17.3 Recitation 3: 多最优解、退化与 Phase I	96
17.4 Recitation 4: 灵敏度与活动定价	98
17.5 Recitation 5: Phase I 与零和博弈	100
17.6 Recitation 6: 整数模型与分段线性函数	102
17.7 Recitation 7: 分支定界	104
17.8 Recitation 8: 整数凸包与割平面	105
17.9 Recitation 9: 最短路与网络流	107
17.10 Recitation 10: 决策树与信息价值	109
18 15.053 期中 2 综合练习	111
19 题目来源与版本索引	115
19.1 计数与原件对应	115
19.2 缺漏、版权例外与解答标记	116
19.3 逐题内链索引	116
参考文献	117

1 凸集与凸函数

本章对应原讲义第 1 讲的优化概念及第 2-3 讲, 原 PDF 第 2-38 页. 先理解凸性提供了什么, 再把这一几何性质转写为分析和计算工具.

1.1 优化问题与凸性

最优化问题的基本形式是求 $\inf_{x \in C} f(x)$. 集合 C 是可行集, f 是目标函数. 记最优值为 f^* ; 若某个 $x^* \in C$ 满足 $f(x^*) = f^*$, 则称其为最优解. 写 $\inf$ 而非 $\min$ 是为了不预设最优解存在. 例如 $f(x) = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上的下确界为 0, 却没有取到 0 的点.

定义 1.1 集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集, 若任意 $x, y \in C$ 及 $t \in [0, 1]$ 都满足 $(1-t)x + ty \in C$. 在凸集 C 上, 函数 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸函数, 若

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

若对 $x \neq y$ 及 $0 < t < 1$ 不等号严格, 则称 f 严格凸. 凸规划指 C 与 f 都凸的最优化问题.

凸集要求连接两个可行点的整条线段仍然可行; 凸函数要求线段上的函数图像不高于两端图像的弦. 这不是“图像看起来像碗”的模糊描述, 因为可行集可以位于低维平面上, 目标也可以不可微.

命题 1.2 凸函数在凸集上的每个局部极小点都是全局极小点. 最优解集合是凸集; 严格凸函数至多有一个最优解.

证明. 设 x^* 是局部极小点, 若存在 $y \in C$ 使 $f(y) < f(x^*)$, 则对任意 $0 < t < 1$, $f((1-t)x^* + ty) \leq (1-t)f(x^*) + tf(y) < f(x^*)$. 取足够小的 t 就与局部极小性矛盾. 若 x, y 都最优, 凸性给出线段上函数值不大于 f^* , 而最优值的定义给出反向不等式. 若严格凸且 $x \neq y$, 线段内部的值严格小于 f^* , 产生矛盾. $\square$

上述结论不保证最优解存在, 也不保证任何数值算法都能快速找到它. 原课程强调对偶的另一作用: 即使原问题含有整数限制或其他非凸结构, 由拉格朗日乘子得到的对偶目标仍是凹函数, 因而对偶最大化具有凸优化结构. 我们将在对偶章节证明这一点及其下界意义.

例题 1.1 比较 $f(x) = x^2$ 在 $C_1 = \mathbb{R}$ 与 $C_2 = \{-2, 1\}$ 上的局部、全局最优点.

解答. 在 C_1 上, f 严格凸, 唯一最优点为 0. 在离散可行集 C_2 中, 两个点都在相对拓扑意义下局部最优, 因为可取一个小邻域不包含另一个可行点. 但 $f(-2) = 4 > 1 = f(1)$, 所以 -2 不是全局最优. 关键障碍在于两点间线段不在 C_2 中, 命题 1.2 的证明无法使用. $\square$

1.2 保持凸性的运算

半空间 $\{x: a^\top x \leq b\}$ 和超平面 $\{x: a^\top x = b\}$ 都是凸集. 有限个半空间的交称为多面体, 它闭且凸, 但不一定有界. 锥是对正数乘法封闭的集合; 锥本身不一定凸或闭. 本书涉及生成锥时将明确包括原点.

命题 1.3 任意族凸集的交为凸集. 凸集的线性像、仿射像、逆像、数乘、向量和、闭包与内部均为凸集.

证明. 交集的两点属于每一个原集合, 因而线段逐一属于它们. 对线性映射 A , 有 $A((1-t)x+ty) = (1-t)Ax + tAy$; 这一恒等式同时证明线性像与逆像的结论, 平移不改变线段结构. 若 $x_i \in C_i$, 则 $(1-t)(x_1+x_2) + t(y_1+y_2)$ 是两个可行线段点之和. 闭包的结论通过用 C 中序列逼近端点, 然后取极限得到. 若端点属于内部, 它们各有一小球包含于 C ; 对 $0 < t < 1$, 将一端小球与另一端固定点作凸组合, 得到以相应线段点为中心的小球. 端点本身已经是内点. $\square$

内部可以为空, 例如 $\mathbb{R}^2$ 中的一条直线; 后面用相对内部处理这一情形. 线性像保持凸性却未必保持闭性, 两种性质不能混为一谈.

命题 1.4 设各 $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 为凸函数. 下列运算保持凸性: 正系数有限和 $\sum_i \alpha_i f_i$; 仿射复合 $f(Ax+b)$; 逐点上确界 $\sup_i f_i(x)$. 若参与运算的函数都闭, 上述得到的函数也闭.

证明. 凸性不等式可以乘以正数后相加, 也可以在仿射映射下代入. 对上确界, 每个 i 都有 $f_i((1-t)x+ty) \leq (1-t)\sup_j f_j(x) + t\sup_j f_j(y)$, 再对 i 取上确界. 闭性将由下一节的下半连续性等价刻画得到. 仿射映射连续, 因而保持下半连续性; 上确界的上图是各上图的交. 对有限和, 在任一极限点附近, 每个下半连续函数都具有一个有限下界, 所以可以对下极限使用有限和不等式, 不会出现 $+\infty - \infty$. $\square$

常用的凸函数包括仿射函数、范数及半正定二次型. 范数的凸性由三角不等式与齐次性给出. 二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx + b^T x + c$ 的凸性取决于对称矩阵 Q 是否半正定; 若原矩阵不对称, 先以 $(Q + Q^T)/2$ 代替它, 因为反对称部分对二次型没有贡献.

例题 1.2 证明 $f(x) = \max\{a_1^T x + b_1, \dots, a_m^T x + b_m\}$ 凸, 并说明为何凸函数的逐点最小值未必凸.


解答. 每个仿射函数凸, 所以命题 1.4 适用. 反例为 $g(x) = \min\{x, -x\} = -|x|$. 取 $x = -1, y = 1, t = 1/2$, 有 $g(0) = 0 > -1 = (g(-1) + g(1))/2$. 上确界与下确界在凸性运算中并不对称. $\square$

1.3 上图、闭性与扩展实值

约束可以放入目标函数中. 对集合 C , 定义指示函数 $\delta_C(x) = 0$ 当 $x \in C$, 在其他点取 $+\infty$. 则在 C 上最小化 f 等价于在全空间最小化 $f + \delta_C$. 这里的 $+\infty$ 是禁止不可行点的记号, 不参与普通实数算术.

定义 1.5 对于扩展实值函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, +\infty]$, 定义有效域 $\text{dom } f = \{x: f(x) < +\infty\}$ 及上图 $\text{epi } f = \{(x, w) \in \mathbb{R}^{n+1}: f(x) \leq w\}$. 若上图凸, 称 f 凸; 若上图闭, 称 f 闭. 若 $\text{dom } f \neq \emptyset$ 且 f 从不取 $-\infty$, 称 f 为真函数. 对序列 $x_k \rightarrow x$, 若总有 $f(x) \leq \liminf_k f(x_k)$, 则称 f 在 x 下半连续.

对有限值函数, 上图凸性与此前的函数凸性定义等价. 一方面, 取上图上两点并使用函数凸性; 另一方面, 对图像上两点 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 使用上图凸性. 有效域也因此凸. 函数的下水平集 $\{x: f(x) \leq \gamma\}$ 和严格下水平集 $\{x: f(x) < \gamma\}$ 都凸, 但反过来, 仅有水平集凸只说明拟凸, 不足以说明函数凸.



图中虚线为两端图像点之间的线段, 凸性要求它处在上图中. 图只辅助定义, 不代替其量词条件.

定理 1.6 对定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的扩展实值函数, 下列三条等价: 每个实数 γ 的下水平集都闭; 函数处处下半连续; 上图闭.

证明. 若函数下半连续, 取 $(x_k, w_k) \in \text{epi } f$ 且 $(x_k, w_k) \rightarrow (x, w)$, 则 $f(x) \leq \liminf f(x_k) \leq w$, 所以上图闭. 若上图闭, 由 x_k 属于 γ 水平集可知 $(x_k, \gamma) \in \text{epi } f$, 极限 (x, γ) 仍在上图, 因而水平集闭.

最后假设所有水平集闭. 若在某个 x 有 $f(x) > \liminf_k f(x_k)$, 可在二者之间取实数 γ . 存在子序列满足 $f(x_{k_j}) \leq \gamma$, 又有 $x_{k_j} \rightarrow x$. 水平集闭便给出 $f(x) \leq \gamma$, 矛盾. 这也适用于无穷值, 因为两者严格不等时仍能选取有限的中间实数. $\square$

“定义在整个空间”不能省略. 在 $(0, 1)$ 上恒为 0 的函数在其定义域内下半连续, 但上图 $(0, 1) \times [0, \infty)$ 并不闭. 若把端点函数值定义为 $+\infty$, 上图不变, 而端点处的下半连续性失败. 因此约束进入目标后, 应在全空间上检查闭性.

例题 1.3 给出一个闭真凸函数, 其有效域不是闭集.

解答. 取 $f(x) = 1/x$ 当 $x > 0$, 在 $x \leq 0$ 取 $+\infty$. 在正半轴上 $f''(x) = 2/x^3 > 0$, 上图凸. 对有限 $\gamma > 0$, 下水平集为 $[1/\gamma, \infty)$; 对 $\gamma \leq 0$ 为空集. 它们都闭, 所以函数闭, 但 $\text{dom } f = (0, \infty)$ 不闭. 此例说明闭性由上图决定, 不能简单替换为有效域闭. $\square$

若有效域闭且函数在有效域内下半连续, 则把域外取 $+\infty$ 后的函数确实闭. 证明时, 上图中的收敛序列的横坐标极限仍在有效域, 然后使用相对下半连续性即可.

原讲义也提到非真闭凸函数的特殊性. 若它不恒为 $+\infty$ 而在某点取 $-\infty$, 则它在每一个有效域点都取 $-\infty$. 设 $f(x_0) = -\infty$, $y \in \text{dom } f$. 凸性使 $(1-t)y + tx_0$ 在任意 $t > 0$ 时都具有任意低的上图高度; 令 $t \downarrow 0$, 上图闭性使 (y, r) 对任意实数 r 都属于上图, 所以 $f(y) = -\infty$. 因而后续优化理论主要使用真函数, 避免这类退化情形.

1.4 可微凸函数与最优性

定理 1.7 设 C 凸, f 在包含 C 的开集上可微. 函数 f 在 C 上凸, 当且仅当对任意 $x, z \in C$,

$$f(z) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(z - x). \quad (1.1)$$

若对不同的 x, z 不等号总严格, 则 f 严格凸.

证明. 设 f 凸. 对 $0 < t \leq 1$, 凸性给出 $[f(x + t(z - x)) - f(x)]/t \leq f(z) - f(x)$. 令 $t \downarrow 0$, 左侧趋于 $\nabla f(x)^\top(z - x)$, 得到(1.1).

反过来, 设(1.1)成立. 对 $w = (1 - t)x + tz$, 分别在基点 w 使用它, 得 $f(x) \geq f(w) + \nabla f(w)^\top(x - w)$ 与 $f(z) \geq f(w) + \nabla f(w)^\top(z - w)$. 乘以 $1 - t$ 与 t 后相加, 梯度项抵消, 得到凸性. 当 $0 < t < 1$ 且 $x \neq z$ 时, x, w, z 两两不同; 严格版本给出严格凸性. $\square$

(1.1)把局部一阶信息变成了全局下界. 这就是凸优化中驻点容易判定的原因. 但有约束时, 梯度不必为零: 在边界处, 所有可行移动方向都可能让目标增加.

定理 1.8 在定理1.7的条件下再设 f 凸. 点 $x^* \in C$ 最优, 当且仅当

$$\nabla f(x^*)^\top(x - x^*) \geq 0 \quad (x \in C).$$

证明. 充分性由切平面下界直接得到. 对必要性, 固定 $x \in C$, 线段 $x^* + t(x - x^*)$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 时可行. 最优性使差商 $[f(x^* + t(x - x^*)) - f(x^*)]/t \geq 0$. 令 $t \downarrow 0$ 即得结论. $\square$

无约束 $C = \mathbb{R}^n$ 时, 可以取梯度方向与反方向, 条件等价于 $\nabla f(x^*) = 0$. 若 C 是线性等式约束, 条件表示梯度垂直于所有可行方向. 一般凸集的情况将在法锥与次梯度章节统一处理.

定理 1.9 设 f 二阶连续可微. 若在凸集 C 上 $\nabla^2 f(x) \succeq 0$, 则 f 在 C 上凸; 若处处正定, 则严格凸. 若 C 还是开集, 则凸性反过来蕴含 Hessian 半正定.

证明. 对 $x, z \in C$ 令 $h(t) = f(x + t(z - x))$. 它满足 $h''(t) = (z - x)^\top \nabla^2 f(x + t(z - x))(z - x) \geq 0$. 因而 h' 单调, 积分得 $h(1) \geq h(0) + h'(0)$; 由定理1.7即得凸性. 当 $x \neq z$ 且 Hessian 正定时, $h'' > 0$, 积分不等式严格.

反向结论在内点 x 处对任意方向 d 考察 $f(x + td) + f(x - td) - 2f(x) \geq 0$. 除以 t^2 并令 $t \rightarrow 0$, 得 $d^\top \nabla^2 f(x) d \geq 0$. 开集条件保证足够小的正负方向都可行. $\square$

正定是严格凸的充分条件, 不是必要条件. 例如 x^4 严格凸, 但在 0 处二阶导数为 0. 低维可行集上的凸性也不要求在所有环境方向上 Hessian 半正定.

1.5 投影与有限表示

定理 1.10 (投影定理) 非空闭凸集 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 上, 每个 $z \in \mathbb{R}^n$ 都有唯一最近点 $P_C(z)$. 点 $p \in C$ 等于 $P_C(z)$ 当且仅当

$$(z - p)^\top(x - p) \leq 0 \quad (x \in C). \quad (1.2)$$

证明. 固定 $x_0 \in C$. 只须在 $C \cap \{x : \|x - z\| \leq \|x_0 - z\|\}$ 上寻找最小值; 此集非空、闭且有界, 所以紧, 连续目标取到最小值. 函数 $\|x - z\|^2$ 严格凸, 因而最小点唯一. 最优性条件1.8与梯度 $2(p - z)$ 给出(1.2). $\square$

推论 1.11 投影非扩张: $\|P_C(u) - P_C(v)\| \leq \|u - v\|$. 若 $x \in C$, 则 $\|P_C(z) - x\| \leq \|z - x\|$.

证明. 记 $p = P_C(u), q = P_C(v)$. 在两次投影条件中分别取 $x = q, p$, 相加得到 $\|p - q\|^2 \leq (p - q)^\top(u - v) \leq \|p - q\|\|u - v\|$. 对第二条, 展开 $\|z - x\|^2 = \|z - p\|^2 + \|p - x\|^2 + 2(z - p)^\top(p - x)$, 最后一项非负. $\square$

例题 1.4 求 z 在半空间 $C = \{x : a^\top x \leq b\}$ 上的投影, 其中 $a \neq 0$.

解答. 若 $a^\top z \leq b$, 投影就是 z . 否则令 $p = z - [(a^\top z - b)/\|a\|^2]a$. 有 $a^\top p = b$, 且 $z - p$ 是 a 的正倍数. 因而对任意 $x \in C$, $(z - p)^\top(x - p) \leq 0$, 投影定理给出答案. 这也是投影梯度算法的一种可直接计算的约束步骤. $\square$

对任意集合 X , 其凸包 $\text{conv } X$ 是包含它的最小凸集, 等于全部有限凸组合 $\sum_i \alpha_i x_i$, 其中 $\alpha_i \geq 0, \sum_i \alpha_i = 1$. 仿射包 $\text{aff } X$ 允许系数为任意实数但仍要求和为 1. 生成锥 $\text{cone } X$ 允许非负系数而不要求和为 1. 凸组合集合本身凸且包含 X , 又必须包含于每个包含 X 的凸集, 这证明了两种凸包定义一致.

定理 1.12 (Carathéodory 定理) 若 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空, 则 $\text{cone } X$ 中每个非零向量都能写成至多 n 个来自 X 的线性无关向量的正组合. 每个 $x \in \text{conv } X$ 都能写成至多 $n + 1$ 个来自 X 的向量的凸组合.

证明. 选择一个项数最少的正组合 $x = \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i$. 若 x_i 线性相关, 有非零系数 β_i 使 $\sum_i \beta_i x_i = 0$. 必要时整体换号, 使某个 $\beta_i > 0$. 取 $t = \min_{\beta_i > 0} \alpha_i / \beta_i > 0$. 新系数 $\alpha_i - t\beta_i$ 全部非负且至少一个为 0, 但仍表示 x , 与最少项数矛盾. 因而 $m \leq n$.

对凸组合, 提升到 $\mathbb{R}^{n+1}$: $(x, 1) = \sum_i \alpha_i (x_i, 1)$. 由锥版本可用至多 $n + 1$ 个提升向量正组合表示. 最后一个坐标强制系数和为 1, 所以降回原空间得到凸组合. $\square$

推论 1.13 紧集的凸包紧. 有限集合生成的锥闭.

证明. 若 X 紧, 每个凸包点可表示为 $n + 1$ 项凸组合, 不足的项补零. 因而 $\text{conv } X$ 是紧集 $\Delta_{n+1} \times X^{n+1}$ 在连续映射 $(\alpha, x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto \sum_i \alpha_i x_i$ 下的像, 其中 Δ_{n+1} 是系数单纯形, 所以紧.

设 X 有限, $y_k \in \text{cone } X$ 收敛. 锥版本使每个 y_k 由 X 的一个线性无关子集正组合表示. 可能的子集有限, 可取子序列让它固定为 $x_1, \dots, x_m$. 线性无关保证从 y_k 恢复系数的线性逆映射连续, 所以系数收敛到非负值, 极限仍在生成锥中. 对零向量也有结论, 因为原点属于生成锥. $\square$

闭集的凸包却不一定闭. 例如 $X = \{(t, 1/t) : t > 0\} \cup \{(t, -1/t) : t > 0\}$ 闭; 任意趋向 $t = 0$ 的点都向无穷逃逸, 不产生有限漏点. 凸包包含 $(t, 0)$ 对所有 $t > 0$, 因而原点在其闭包中. 但每个有限凸组合的第一坐标都正, 所以原点不在凸包中. 后面讨论对偶闭性时, 这种“极限存在而表示参数逃向无穷”的现象会再次出现.

2 相对内部与无穷远方向

本章对应原第 4–5 讲, 第 39–63 页. 凸性不仅控制两点之间, 还控制边界与无穷远处的行为. 相对内部处理低维可行集, 衰退方向则把不有界性变成可计算的代数条件.

2.1 相对内部与线段原理

定义 2.1 设 C 非空, $L = \text{aff } C - x_0$ 为其仿射包的方向子空间. 点 $x \in C$ 属于相对内部 $\text{ri } C$, 若某个 $r > 0$ 满足 $x + \{u \in L : \|u\| < r\} \subseteq C$.

例如线段的相对内部是去掉两个端点后的开线段, 单点集的相对内部就是它自己. 相对内部总在自身的仿射包中计算, 不能把它当成环境空间内部.

定理 2.2 (线段原理) 若 C 凸, $x \in \text{ri } C$, $y \in \text{cl } C$, 则 $(1-t)x + ty \in \text{ri } C$ 对所有 $0 \leq t < 1$ 成立.

证明. 取定义中的相对球半径 r . 当 $t = 0$ 结论已知. 固定 $0 < t < 1$, 取 $y_k \in C$ 趋于 y , 并令 $z = (1-t)x + ty$. 对任意 $u \in L$ 满足 $\|u\| < (1-t)r/2$, 选足够大的 k 使 $t\|y - y_k\|/(1-t) < r/2$. 则

$$z + u = (1-t) \left(x + \frac{t(y - y_k) + u}{1-t} \right) + ty_k \in C.$$

括号内点位于以 x 为中心半径 r 的相对球内. 因而 z 也具有包含于 C 的相对球. □

定理 2.3 非空凸集的相对内部非空、凸且具有相同的仿射包. 点 $x \in C$ 属于 $\text{ri } C$, 当且仅当每条从 $y \in C$ 到 x 的线段都能越过 x 延长而仍留在 C 中.

证明. 设仿射维数为 m . 取 $m+1$ 个仿射无关的点 $z_0, \dots, z_m \in C$. 它们的单纯形包含于 C , 且重心附近有一个相对于 $\text{aff } C$ 的小球, 所以相对内部非空. 该小球也说明相对内部的仿射包等于 $\text{aff } C$. 两个相对内点之间的线段用各自小球作凸组合即可证明仍是相对内点.

相对内点允许沿任何方向小幅移动, 因而线段可以延长. 反过来, 取 $z \in \text{ri } C$. 若 $x = z$, 已得结论; 否则假设的延长性给出 $w = x + \varepsilon(x - z) \in C$. 点 x 是 z, w 间的真内分点, 由线段原理属于 $\text{ri } C$. □

命题 2.4 非空凸集满足 $\text{cl}(\text{ri } C) = \text{cl } C$ 及 $\text{ri}(\text{cl } C) = \text{ri } C$. 两个非空凸集有相同闭包当且仅当有相同相对内部. 若 $\text{ri } C \subseteq D \subseteq \text{cl } C$ 且 D 凸, 则 D 也有相同闭包和相对内部.

证明. 固定 $z \in \text{ri } C$. 对 $y \in \text{cl } C$, 线段原理给出 $(1-t)z + ty \in \text{ri } C$ 对 $t < 1$ 成立, 令 $t \uparrow 1$ 得到闭包等式. 若 $x \in \text{ri}(\text{cl } C)$, 则从 z 到 x 的线段可以在 $\text{cl } C$ 内延长到 y , 因而 x 是 z, y 的真内分点, 再由线段原理得 $x \in \text{ri } C$. 其余结论由这两个等式及集合夹逼立即得到. □

命题 2.5 若凹函数在非空凸集 C 的相对内点 x^* 取到最小值, 则它在 C 上恒定.

证明. 若某个 $y \in C$ 满足 $f(y) > f(x^*)$, 延长线段至 $w \in C$ 使 $x^* = (1-t)y + tw$, $0 < t < 1$. 由最小性 $f(w) \geq f(x^*)$, 而凹性给出 $f(x^*) \geq (1-t)f(y) + tf(w) > f(x^*)$, 矛盾. $\square$

因此在可行集上非恒定的线性目标不可能在相对内部取到最小值. 注意说的是“在可行集上非恒定”, 否则环境空间的非零线性函数可能恰好在一个低维可行集上恒定.

2.2 相对内部的运算

定理 2.6 对非空凸集 C 与线性映射 A , 有 $A(\text{ri } C) = \text{ri}(AC)$. 同时 $A(\text{cl } C) \subseteq \text{cl}(AC)$; 若 C 有界, 则后者等号成立.

证明. 线性映射从方向空间 L 到 AL 是满射. 在有限维中可取一个连续线性右逆, 所以相对球的像包含 AL 中的某个相对球. 这证明 $A(\text{ri } C) \subseteq \text{ri}(AC)$.

取 $z \in \text{ri } C$ 及 $y \in \text{ri}(AC)$. 若 $y = Az$, 无须进一步处理. 否则在 AC 中把 Az 到 y 的线段越过 y 延长到 $v = Aw$, 其中 $w \in C$. 于是 $y = (1-t)Az + tAw$, $t < 1$, 并且 $(1-t)z + tw \in \text{ri } C$, 给出反向包含.

闭包的正向包含由连续性得到. 若 C 有界, 对 $y_k = Ax_k \rightarrow y$, 可选 x_k 的收敛子序列, 极限 $x \in \text{cl } C$ 满足 $Ax = y$, 得反向包含. $\square$

定理 2.7 若 C_1, C_2 非空凸, 则相对内部与笛卡尔积、向量和可交换:

$$\text{ri}(C_1 \times C_2) = \text{ri } C_1 \times \text{ri } C_2, \quad \text{ri}(C_1 + C_2) = \text{ri } C_1 + \text{ri } C_2.$$

若 $\text{ri } C_1 \cap \text{ri } C_2 \neq \emptyset$, 则

$$\text{ri}(C_1 \cap C_2) = \text{ri } C_1 \cap \text{ri } C_2, \quad \text{cl}(C_1 \cap C_2) = \text{cl } C_1 \cap \text{cl } C_2.$$

证明. 积的结论由相对球定义得到; 和是积在线性映射 $(x_1, x_2) \mapsto x_1 + x_2$ 下的像, 所以使用定理 2.6. 对交, 固定共同相对内点 z . 两个相对球在共同仿射方向空间的交仍含一个球, 故 $z \in \text{ri}(C_1 \cap C_2)$. 更一般地, $\text{ri } C_1 \cap \text{ri } C_2$ 中任一点也如此.

反向取 $x \in \text{ri}(C_1 \cap C_2)$. 延长 z 到 x 的线段到共同可行点 w , 于是 x 是 z, w 的真内分点, 在每个 C_i 中都属相对内部. 对闭包, 取 $y \in \text{cl } C_1 \cap \text{cl } C_2$, 用 z 与 y 的线段内分点同时逼近, 即得到 $y \in \text{cl}(C_1 \cap C_2)$. $\square$

在没有资格条件时, 通常只能得到 $\text{ri } C_1 \cap \text{ri } C_2 \subseteq \text{ri}(C_1 \cap C_2)$ 与 $\text{cl}(C_1 \cap C_2) \subseteq \text{cl } C_1 \cap \text{cl } C_2$. 取实轴上的 $C_1 = (-\infty, 0]$, $C_2 = [0, \infty)$, 交集的相对内部为 $\{0\}$, 而相对内部的交为空. 若改成两个开半轴, 它们交为空, 闭包的交却仍是 $\{0\}$.

闭包对向量和只有 $\text{cl } C_1 + \text{cl } C_2 \subseteq \text{cl}(C_1 + C_2)$. 若一集有界, 可对该集的表示序列取收敛子序列, 另一表示序列随之收敛, 因而等号成立. 对线性逆像, 若 $A^{-1}(\text{ri } C) \neq \emptyset$, 把逆像看成集合 $\{(x, y) : y = Ax\}$ 与 $\mathbb{R}^n \times C$ 的交, 可得 $\text{ri}(A^{-1}C) = A^{-1}(\text{ri } C)$ 及 $\text{cl}(A^{-1}C) = A^{-1}(\text{cl } C)$. 这两个公式需要上述非空资格条件; 不可把原讲义的运算摘要读成无条件规则.

命题 2.8 (纤维公式) 设 $C \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ 凸, $C_x = \{y : (x, y) \in C\}$, $D = \{x : C_x \neq \emptyset\}$. 则 $\text{ri } C = \{(x, y) : x \in \text{ri } D, y \in \text{ri } C_x\}$.

证明. 投影定理 2.6 说明 $x \in \text{ri } D$ 时存在 y_0 使 $(x, y_0) \in \text{ri } C$. 纤维仿射平面 $M_x = \{x\} \times \mathbb{R}^m$ 因而与 $\text{ri } C$ 相交. 用交集公式得 $\text{ri}(M_x \cap C) = M_x \cap \text{ri } C$, 而左边正是 $\{x\} \times \text{ri } C_x$. 结合投影的反向包含即得结论. $\square$

2.3 凸函数的连续性与闭包

定理 2.9 真凸函数在 $\text{ri}(\text{dom } f)$ 上相对连续. 特别地, 有限值凸函数在整个 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

证明. 将坐标平移并限制到有效域的仿射包, 只须在内点 0 证明. 取一个小立方体包含于有效域, 其所有顶点函数值有限; 由凸性, 立方体内函数值不超过这些顶点值的最大值 M . 对趋于 0 的非零点 x , 选固定半径 r 使正反两个径向点 $y = rx/\|x\|$ 与 $z = -rx/\|x\|$ 都在立方体中. 记 $s = \|x\|/r$. 凸性给出

$$f(x) \leq (1-s)f(0) + sM, \quad f(0) \leq \frac{s}{1+s}M + \frac{1}{1+s}f(x).$$

后式等价于 $f(x) \geq (1+s)f(0) - sM$. 令 $x \rightarrow 0$ 即得连续性. $\square$

在边界可能不连续或取无穷. 闭包恰好修补从内部逼近边界时漏掉的上图极限. 对真凸函数定义 $\text{cl } f$ 使 $\text{epi}(\text{cl } f) = \text{cl}(\text{epi } f)$. 它和被 f 逐点控制的最大闭凸函数. 对一般函数, 先将上图取凸包再闭包得到闭凸包函数; 它和被原函数控制的最大闭凸函数, 但可能不真.

命题 2.10 真凸函数的闭包仍为真凸函数, 在 $\text{ri}(\text{dom } f)$ 上与原函数相同. 若 x 属于该相对内部, $y \in \text{dom}(\text{cl } f)$, 则

$$(\text{cl } f)(y) = \lim_{t \downarrow 0} f(y + t(x - y)).$$

函数、其闭包与其闭凸包有相同下确界; 原函数取到下确界的点, 在这些包函数下仍为最优点.

证明. 连续性已说明内部上图不产生新的有限高度. 在内部取一小球, 凸性与局部有界性给出有限的仿射下界; 因而上图闭包不可能包含任何整条竖直线, 所以闭包真. 这一仿射下界也可以由下一章的上图分离构造, 不依赖边界连续性.

令 $g = \text{cl } f$. 线段原理与内部相等性说明 $f(y + t(x - y)) = g(y + t(x - y))$. 凸性给出该值不超过 $(1-t)g(y) + tg(x)$, 下半连续性给出极限下界不小于 $g(y)$, 所以极限恰为 $g(y)$.

若 $m = \inf f$ 有限, 整个原上图都位于闭半空间 $w \geq m$ 中, 其凸包与闭包也如此, 所以包函数下确界不小于 m ; 又因包函数不大于原函数, 有反向不等式. 当 $m = -\infty$ 或 $+\infty$ 时由同一序关系直接得到. 原最优点的函数值被这两个界夹住. $\square$

这里仿射下界的存在将在分离章节给出完整独立证明; 读者可暂把这一句话作为明确的前向引用, 不能用它替代后面的证明.

2.4 衰退锥与线性空间

定义 2.11 非空凸集 C 的衰退锥为 $\text{rec } C = \{d : x + td \in C \text{ 对一切 } x \in C, t \geq 0\}$. 其线性空间为 $L_C = \text{rec } C \cap (-\text{rec } C)$.

L_C 中的方向允许正反两向无限移动. 因而它是子空间, 且 $C = L_C + (C \cap L_C^\perp)$. 确实, 将 $x \in C$ 正交分解为 $x = l + z$, 沿 $-l \in L_C$ 移动得到 $z \in C \cap L_C^\perp$; 反向包含由衰退方向定义得到. 任何 $S \subseteq L_C$ 的子空间也可替代 L_C 作同样分解.

定理 2.12 对非空闭凸集 C , 衰退锥闭且凸. 一个方向属于衰退锥, 当且仅当从某个点出发的整条对应射线包含于 C . 集合 C 无界当且仅当衰退锥含非零方向. 对非空交集, $\text{rec}(\bigcap_i C_i) = \bigcap_i \text{rec } C_i$. 还满足 $\text{rec}(\text{ri } C) = \text{rec } C$.

证明. 对每个固定的 x, t , 条件 $x + td \in C$ 对 d 定义闭凸集, 取交即得第一条. 若 $x_0 + sd \in C$ 对 $s \geq 0$ 成立, 则对任意 $x \in C, t \geq 0$ 及 $s > t$, $(1 - t/s)x + (t/s)(x_0 + sd) \in C$. 令 $s \rightarrow \infty$ 得 $x + td \in C$, 用到了闭性.

无界时固定 $x_0 \in C$, 取 $x_k \in C$ 满足 $r_k = \|x_k - x_0\| \rightarrow \infty$. 单位方向的子序列趋于某个单位向量 d . 对固定 $t \geq 0$, $x_0 + (t/r_k)(x_k - x_0) \in C$ 最终成立, 极限为 $x_0 + td$, 从而 $d \in \text{rec } C$. 反向显然, 因为一条非零射线无界. 对交, 若一个方向给交集集中的某点提供整条射线, 则分别用射线判据得到它属于每个衰退锥.

若 $d \in \text{rec } C$ 且 $x \in \text{ri } C$, 将 x 附近相对球沿 td 平移, 仍在 C , 所以 $x + td \in \text{ri } C$. 反向若 $d \in \text{rec}(\text{ri } C)$, 同一射线位于 C , 用闭集射线判据即可. $\square$

闭性条件重要. 非闭凸集可以无界而没有非零衰退方向, 所以不能对任意凸集套用无界性判据.

2.5 衰退函数与最优解存在性

闭真凸函数的衰退函数 f^∞ 定义为上图衰退锥的边界函数, 即 $\text{epi}(f^\infty) = \text{rec}(\text{epi } f)$. 对任意 $x \in \text{dom } f$,

$$f^\infty(d) = \sup_{t>0} \frac{f(x + td) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(x + td) - f(x)}{t}. \quad (2.1)$$

差商随 t 单调不减, 因为一维凸性使短弦斜率不大于长弦斜率. 若其上确界为 a , 就有 $f(x + td) \leq f(x) + ta$ 对所有 $t \geq 0$ 成立, 等价于 (d, a) 从上图某点出发给出射线. 由闭凸射线判据, 该方向对整个上图有效, 所以上确界与基点无关, 并给出公式. 有限差商的极限不可能为 $-\infty$.

若 f 在全空间可微, 则还可写 $f^\infty(d) = \lim_{t \rightarrow \infty} \nabla f(x + td)^\top d$. 设 $h(t) = f(x + td)$, 凸性使 $h'(t)$ 单调; 由 $[h(t) - h(0)]/t = t^{-1} \int_0^t h'(s) ds$, 其平均值趋于同一有限或无穷极限, 即得公式.

定义函数的衰退方向为 $R_f = \{d : f^\infty(d) \leq 0\}$, 线性空间为 $L_f = R_f \cap (-R_f)$. 前者使函数沿射线不增加, 后者使函数沿整条直线恒定. 原资料第 55 页的英文摘要出现 “nondecreasing”; 由上图的水平衰退方向定义及第 57 页示意可知应为 “不增加”, 本稿依数学定义表述.

命题 2.13 闭真凸函数的所有非空下水平集具有相同衰退锥 R_f . 若某个非空下水平集有界, 则所有下水平集紧.

证明. 若 $d \in R_f$, 函数沿射线不增加, 所以它保持每个水平集. 反过来, 若某个水平集从 x 沿 d 包含整条射线, 则函数值在这条射线上有一个有限上界. 将该上界减去 $f(x)$ 再除以 t , 令 $t \rightarrow \infty$, 得 $f^\infty(d) \leq 0$. 因而衰退锥相同. 下水平集闭凸, 有界当且仅当衰退锥没有非零方向, 故一集有界推出全部有界, 闭有界则紧. $\square$

例题 2.1 计算半正定二次函数 $f(x) = x^T Q x + a^T x + b$ 的衰退方向与恒定方向, 其中 Q 对称半正定.

解答. 差商为 $2x^T Q d + t d^T Q d + a^T d$. 若 $Qd \neq 0$, 半正定性给出 $d^T Q d > 0$, 极限为 $+\infty$. 若 $Qd = 0$, 衰退函数为 $a^T d$. 因而 $R_f = \{d : Qd = 0, a^T d \leq 0\}$, $L_f = \{d : Qd = 0, a^T d = 0\}$. 特别地, 正定二次函数在所有非零方向上衰退函数为 $+\infty$. $\square$

若多个闭真凸函数在某点同时有限, 则有限和的衰退函数等于其衰退函数之和; 有限最大值则对应衰退函数的最大值. 证明在共同有限的基点使用(2.1); 有限个单调差商的极限可交换有限和或最大值. 对任意上确界族, 还需上确界函数为真并在基点有限, 此时 $\text{rec}(\text{epi} \sup_i f_i) = \bigcap_i \text{rec}(\text{epi} f_i)$ 给出 $(\sup_i f_i)^\infty = \sup_i f_i^\infty$. 不能忽略真性而进行无穷算术.

定理 2.14 (最优解存在性) 设 X 闭非空, f 下半连续且不取 $-\infty$, $X \cap \text{dom } f \neq \emptyset$. 若某个非空可行下水平集有界, 则最优解集合非空且紧. 这包括 X 有界, 或 f 在 X 上强制, 即 $\|x_k\| \rightarrow \infty$ 时 $f(x_k) \rightarrow +\infty$.

证明. 选该紧水平集中的点 x_0 . 所有比 $f(x_0)$ 更好的候选点都在同一个紧集内. 下半连续函数在紧集上取到下确界: 取极小化序列并选收敛子序列, 下半连续性保证极限值不大于下确界, 因而等于它. 这也说明下确界有限, 否则会使极限点取 $-\infty$. 最优解集是闭水平集且包含于原紧集, 所以紧. $\square$

定理 2.15 若再设 X 闭凸且 f 闭真凸, 则最优解集合非空且紧, 当且仅当 $\text{rec } X \cap R_f = \{0\}$.

证明. 任一非空可行水平集 $X \cap \{f \leq \gamma\}$ 的衰退锥等于 $\text{rec } X \cap R_f$. 若其为 $\{0\}$, 水平集有界, 上一定理适用. 反过来, 若最优解集非空紧, 它的衰退锥为 $\{0\}$. 将它写成可行集与最优值水平集之交, 同一公式给出必要性. $\square$

因此若 $f = \sum_i f_i$ 为真, 而其中某一项在每个非零方向上的衰退函数都为 $+\infty$, 总目标具有紧非空最优解集. 若该项是正定二次函数, 总目标还严格凸, 所以最优解唯一. 同样的存在性论证适用于有限最大值, 但最大值未必严格凸, 不可自动添加唯一性结论.

3 闭性、分离与共轭

本章对应原第 6–8 讲的闭集交、分离与共轭部分, 第 64–103 页. 三个看似不同的问题, 即最优解是否存在、线性像是否闭、消去变量后的值函数是否闭, 都可转化为嵌套闭集的交是否非空.

3.1 嵌套闭集与回缩性

若 $C_{k+1} \subseteq C_k$ 都非空闭, 且某个 C_k 紧, 则交集非空: 在每个后续集合选点, 紧性给收敛子序列, 嵌套性使极限属于每个固定集合. 不紧时这一结论失败, 如 $C_k = [k, \infty)$.

定义 3.1 对嵌套非空闭凸集 C_k , 若 $x_k \in C_k$, $\|x_k\| \rightarrow \infty$ 且 $x_k/\|x_k\| \rightarrow d/\|d\|$, $d \neq 0$, 称其为渐近序列. 若最终 $x_k - d \in C_k$, 称这一渐近序列可回缩. 若每个渐近序列都可回缩, 称集合序列可回缩. 单个闭凸集的可回缩性由常值集合序列定义.

任何无界的选择序列都存在渐近子序列. 其方向属于每个 $\text{rec } C_j$: 固定 j , 后续点都在 C_j , 对规范化线段取极限即可使用衰退锥的证明. 回缩性进一步要求在已很远的可行点上向反方向移动固定距离仍可行, 它比“正方向可以无限移动”更强.

引理 3.2 闭半空间、多面体是可回缩集. 有限个可回缩集合序列的逐项交及笛卡尔积仍可回缩. 凸紧集与可回缩凸集的向量和可回缩.

证明. 半空间记为 $a^\top x \leq b$. 对渐近方向 d , 必有 $a^\top d \leq 0$. 若等于 0, 平移 $-d$ 不改变不等式; 若小于 0, 则 $a^\top x_k \rightarrow -\infty$, 最终也允许平移. 多面体只有有限个条件, 逐一应用即可. 交集的渐近序列是每个组成序列的渐近序列, 故可以同时回缩.

对积, 各分量中方向非零的项按相应增长比例作渐近序列, 使用该分量的回缩性; 方向为零的项无须移动. 对和, 写 $x_k = u_k + v_k$, 紧集分量 u_k 有界. 则 v_k 具有与 x_k 相同的渐近方向, 最终 $v_k - d$ 可行, 所以 $x_k - d = u_k + (v_k - d)$ 可行. $\square$

定理 3.3 可回缩的嵌套非空闭凸集合序列具有非空交集. 更一般地, 设 X 为可回缩闭凸集, 每个 $X \cap C_k$ 非空, 并令 $R = \bigcap_k \text{rec } C_k$, $L = \bigcap_k L_{C_k}$. 若 $\text{rec } X \cap R \subseteq L$, 则 $\bigcap_k (X \cap C_k)$ 非空.

证明. 在每个 C_k 中取离原点最近的点 p_k . 若此序列有界, 收敛子序列的极限属于交集. 若无界, 取渐近子序列, 方向为 d . 回缩性给出最终 $p_k - d \in C_k$, 但 $\|p_k - d\|^2 = \|p_k\|^2 - 2p_k^\top d + \|d\|^2 < \|p_k\|^2$, 因为 $p_k^\top d \rightarrow +\infty$. 这与最近点定义矛盾.

对一般情况, 渐近方向 d 属于 $\text{rec } X \cap R$, 因而属于每个 L_{C_k} . 所以 $x_k - d \in C_k$ 始终成立; 而 X 的回缩性保证它最终属于 X . 于是 $X \cap C_k$ 序列可回缩, 用第一部分得结论. $\square$

X 的回缩性不能删掉. 取闭凸集 $X = \{(x, y) : x > 0, y \geq 1/x\}$ 与 $C_k = \{(x, y) : y \leq 1/k\}$, 各个交非空, 全部交却为空. $\text{rec } X \cap \bigcap_k \text{rec } C_k$ 是非负水平射线, 包含于每个 C_k 的线性空间, 但 X 不可回缩: 点 $(k, 1/k)$ 向左平移 1 后不再属于 X .

推论 3.4 在非空多面体上, 半正定二次函数只要下确界有限, 就取到最小值. 线性规划是其特例.

证明. 写 $f(x) = x^T Qx + c^T x$, $Q \succeq 0$, 取 $\gamma_k \downarrow f^*$, $\gamma_k > f^*$. 下水平集的共同衰退锥为 $R = \{d : Qd = 0, c^T d \leq 0\}$, 共同线性空间为 $L = \{d : Qd = 0, c^T d = 0\}$. 若 $d \in \text{rec } X \cap R$ 且 $c^T d < 0$, 任一可行点沿 d 使目标趋于 $-\infty$, 与有限下确界矛盾. 因而 $\text{rec } X \cap R \subseteq L$. 多面体可回缩, 上一定理使嵌套可行水平集之交非空, 交中点恰为最优点. $\square$

3.2 线性像与部分极小化

定理 3.5 设 C 非空闭凸, A 线性. 若 $\text{rec } C \cap \ker A \subseteq L_C$, 则 AC 闭. 若 X 是可回缩闭凸集, 则条件 $\text{rec } X \cap \text{rec } C \cap \ker A \subseteq L_C$ 保证 $A(X \cap C)$ 闭. 特别地, 多面体的线性像闭.

证明. 取 $y_k = Ax_k \rightarrow y$. 令 $\varepsilon_k \downarrow 0$ 且选择子序列使 $\|y_k - y\| \leq \varepsilon_k$, 再令 $D_k = \{x \in C : \|Ax - y\| \leq \varepsilon_k\}$. 各 D_k 非空闭凸, 共同衰退锥为 $\text{rec } C \cap \ker A$, 线性空间包含 $L_C \cap \ker A$. 条件及定理 3.3, 取 $X = \mathbb{R}^n$, 保证交非空; 交中点满足 $Ax = y$.

第二种情况在同一 D_k 外再交 X , 并用一般回缩交定理. 多面体的线性像可令 $C = \mathbb{R}^n$, 此时 $L_C = \mathbb{R}^n$, 条件自动成立. $\square$

原第 1 讲第 13 页的例子也可精确写出: $C_1 = \{(u, v) : u > 0, v > 0, uv \geq 1\}$ 与 $C_2 = \{(0, v) : v \in \mathbb{R}\}$ 都闭凸, 但 $C_1 + C_2 = \{(u, v) : u > 0, v \in \mathbb{R}\}$ 不闭. 前者闭是因为趋于 $u = 0$ 时 v 必趋无穷, 不产生有限漏点; 与竖直线相加后这个阻止有限极限的条件消失. 同样, 将 C_1 投影到第一坐标只得到开半轴.

最简单的充分条件是 $\text{rec } C \cap \ker A = \{0\}$, 这时预像截集本身紧. 向量和是积在线性求和映射下的像; 因而若 $d_i \in \text{rec } C_i$ 且 $\sum_i d_i = 0$ 只能在各 $d_i = 0$ 时成立, 则 $\sum_i C_i$ 闭. 特别地, 一个闭凸集与一个凸紧集的和闭, 以及 $\text{rec } C_1 \cap \text{rec } C_2 = \{0\}$ 时 $C_1 - C_2$ 闭.

定理 3.6 设 $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 闭真凸, $p(x) = \inf_z F(x, z)$. 则 p 凸. 若某个纤维水平集 $\{z : F(x_0, z) \leq \gamma\}$ 非空紧, 则 p 闭且真, 且对每个 $x \in \text{dom } p$, 纤维极小值都取到, 极小点集合非空紧.

证明. 对两个近似极小点作凸组合, 目标误差可任意小, 得 p 凸. 记 $P(x, z, w) = (x, w)$. 总有 $P(\text{epi } F) \subseteq \text{epi } p \subseteq \text{cl}(P(\text{epi } F))$: 第二个包含由在固定 x 处取任意接近下确界的 z 得到.

某个纤维水平集紧, 说明上图没有非零水平纤维衰退方向 $(0, d, 0)$. 否则该方向会使这一个紧集包含非零射线. 因而 $\text{rec}(\text{epi } F) \cap \ker P = \{0\}$, 线性像定理使 $P(\text{epi } F)$ 闭, 两个包含变为等号. 对任一非空纤维函数 $F(x, \cdot)$, 它的所有非空水平集衰退锥也都为零; 存在性定理使其最优值有限并取到, 极小点集合紧. 因而 p 不取 $-\infty$, 又在 x_0 有限, 所以真, 上图闭则说明它闭. $\square$

例题 3.1 原第 69 页反例取 $F(x, z) = e^{-\sqrt{xz}}$ 当 $x, z \geq 0$, 其余处取 $+\infty$. 求 $p(x) = \inf_z F(x, z)$ 并解释其闭性.

解答. 几何平均 $\sqrt{xz}$ 在非负象限上凹, 所以 $-\sqrt{xz}$ 凸; 指数函数凸且单调递增, 复合仍凸. 非负象限闭, 函数在其中连续, 扩展后闭. 当 $x > 0$, 令 $z \rightarrow \infty$ 得下确界 0 但不取到; 当 $x = 0$, 值恒为 1; 当 $x < 0$, 无可行 z . 因而 $p(x) = 0$

对 $x > 0$, $p(0) = 1$, $p(x) = +\infty$ 对 $x < 0$. 正数列趋于 0 使下半连续性失败. 此处每个非空纤维水平集都缺少定理要求的紧性. $\square$

3.3 分离超平面

定义 3.7 超平面 $H = \{x : a^\top x = b\}$ 要求 $a \neq 0$. 若 $a^\top x_1 \leq b \leq a^\top x_2$ 对所有 $x_i \in C_i$ 成立, 称 H 分离两集. 若两边都为严格不等式, 称严格分离. 若分离且两集不全包含在 H 中, 称适当分离. 若 $x \in \text{cl } C$ 且经过 x 的超平面把 C 放在一侧, 称其在 x 支持 C .

定理 3.8 非空凸集 C 的非内点 x 可与 C 由经过 x 的超平面分离. 两个不交非空凸集可分离. 若其中一个闭而另一个紧, 则可严格分离. 两个非空凸集可适当分离, 当且仅当它们的相对内部不交.

证明. 先对闭凸集及外点 x 使用投影 $p = P_C(x)$. 向量 $a = p - x \neq 0$ 满足 $a^\top(y - p) \geq 0$ 对 $y \in C$, 并且 $a^\top p > a^\top x$, 所以给出严格分离. 对边界点, 取外点 $x_k \rightarrow x$, 将各分离法向量规范化为单位向量并取收敛子序列, 极限仍为非零单位向量, 使 $a^\top(y - x) \geq 0$. 非闭集以闭包代替. 若仿射包是低维, 可取垂直于仿射包的法向量; 若 x 不在闭包, 使用严格分离后把平面移至 x 即可.

对不交集合, 在凸差集 $C_2 - C_1$ 与原点间用第一条, 得 $a^\top(x_2 - x_1) \geq 0$. 因而存在有限 b 夹在 $\sup_{C_1} a^\top x$ 与 $\inf_{C_2} a^\top x$ 之间. 闭集与紧集的差闭且不含 0; 投影原点到差集, 得到严格正的间隔, 可将平面放在间隔中点.

若相对内部不交, 则 $0 \notin \text{ri}(C_2 - C_1)$, 因为相对内部与和交换. 在差集的仿射包内应用支持构造, 或当原点不在该仿射包时严格分离, 可选一个不在整个差集上恒为 0 的分离泛函, 因而适当分离成立. 反向若两集有共同相对内点 z , 任何分离泛函在该点取得两侧等号. 因为它在每个集合中都在相对内部取线性极值, 必须在两集各自恒定, 所以只能把两集都包含于平面中, 无法适当分离. $\square$

适当分离在差集的仿射包内构造的细节如下. 若 0 位于相对边界, 外点可在仿射包内选择, 单位法向量也在其方向空间内; 极限法向量非零, 而整个差集仿射张成该空间, 所以它不能在差集上恒为 0. 这避免了只取环境空间中无信息的垂直法向量.

推论 3.9 $\text{cl}(\text{conv } C)$ 等于所有包含 C 的闭半空间的交.

证明. 每个包含 C 的闭半空间都包含其闭凸包. 若 x 在闭凸包外, 点与闭凸包的严格分离提供一个包含该包而排除 x 的闭半空间, 因而反向包含成立. $\square$

3.4 多面体分离的加强

后续线性约束的对偶性不要求所有约束严格可行, 其基础是多面体分离可以加强到“不把非多面体一侧整个放在平面上”. 为说明有限性在哪里起作用, 先建立多面体的有限生成表示.

引理 3.10 每个多面体锥都由有限个向量生成. 每个非空多面体都可写成有限点的凸包与有限向量生成锥之和.

证明. 全空间由 $\pm e_i$ 有限生成. 若 $K = \text{cone}\{v_i\}$, 则与半空间 $a^\top x \leq 0$ 相交后, 可用满足 $a^\top v_i \leq 0$ 的原生成向量及每一正负配对向量

$$(-a^\top v_j)v_i + (a^\top v_i)v_j \quad (a^\top v_i > 0, a^\top v_j < 0)$$

生成. 为验证, 将任意非负组合中正的 a 分量与负的 a 分量逐量配对抵消, 每次抵消正对应上述配对向量, 剩余只含非正分量. 有限次加入定义锥的半空间, 即得第一条; 等式用两个半空间表示.

对多面体 $P = \{x : Bx \leq b, Ex = e\}$, 提升为锥 $K = \{(x, t) : Bx \leq bt, Ex = et, t \geq 0\}$. 将有限生成向量中 $t > 0$ 的项按其最后坐标归一到 1, 其横坐标形成有限点集; $t = 0$ 的项形成有限方向集. 切取 $t = 1$ 时, 正高度项的系数和为 1, 零高度项仍为非负组合, 得所述表示. $\square$

定理 3.11 若 C 非空凸, P 非空多面体, 且 $\text{ri} C \cap P = \emptyset$, 则存在分离超平面, 并且 C 不全包含在该平面中.

证明. 先适当分离 C, P . 若平面不包含整个 C , 已得结论. 否则 C 在平面上, 而 P 在一侧且有点严格位于该侧. 将 P 限制到与平面的交, 这是 P 的真面, 维数下降; 若交为空, 多面体的有限生成点在该泛函上有统一正余量, 可将平面朝多面体方向小幅平移, 使它严格分离并不包含 C . 对剩余面与 C 再作适当分离, 必要时重复. 每次若仍包含整个 C , 就再取一个真面. 维数有限, 不可能无限下降, 因而最终得到一个不包含整个 C 的分离泛函.

还须把最后泛函扩展为对原 P 的分离. 在引理 3.10 的有限点与射线表示上, 前一个泛函对不属于所取面的生成点或方向有严格正余量; 对面的生成项, 新泛函已经非负. 因而把新泛函乘以足够小的正数再加入到前一个泛函上, 对全部有限生成项仍非负. 在 C 上前一个泛函恒定, 所以加入新泛函后保留其非恒定性. 逐级反向合并, 就得到对原 P 的分离且不包含整个 C 的平面. $\square$

有限生成项是此证明不可缺少的条件. 对非多面体, 无限生成方向的严格余量可能趋于 0, 无法选取统一的小系数.

3.5 仿射下界与共轭函数

引理 3.12 每个真凸函数都具有有限的仿射下界. 若 f 闭真凸且 $r < f(x)$, 则存在仿射函数 ℓ 满足 $\ell \leq f$ 且 $\ell(x) > r$.

证明. 对真凸函数, 取 $x_0 \in \text{ri dom } f$. 它在相对小球上有限连续. 在上图相对于 $\text{aff}(\text{dom } f) \times \mathbb{R}$ 的空间内, 分离上图和 $(x_0, f(x_0) - 1)$. 分离泛函写成 $a^\top x + \beta w \geq c$, 由于上图可向上无限移动, $\beta \geq 0$. 若 $\beta = 0$, 相对内点 x_0 处的严格分离不可能成立, 所以可取得 $\beta > 0$. 除以 β 得仿射下界, 并把横向泛函从仿射包延拓到全空间. 这也完成上一章闭包真性的前向引用.

对于闭真凸函数, 点 (x, r) 在闭上图外, 严格分离得到 (a, β) , $\beta \geq 0$. 若 $\beta > 0$ 直接得到所需仿射函数. 若 $\beta = 0$, 将该严格分离不等式加上已有仿射下界对应不等式的小正倍数. 严格间隔在小扰动下仍为正, 竖直系数变为正, 除以

它便得到 $\ell(x) > r$. □

定义 3.13 函数 f 的凸共轭为 $f^*(y) = \sup_x \{y^\top x - f(x)\}$. 它记录所有斜率为 y 的仿射下界中最大的截距: $y^\top x - f^*(y) \leq f(x)$. 二次共轭记为 f^{**} .

共轭是仿射函数族的上确界, 所以始终闭凸, 即使 f 本身不凸. 对真凸函数, 仿射下界说明其共轭至少在一个点有限, 因而共轭真; 又因原函数在某点有限, 共轭从不取 $-\infty$.

定理 3.14 (共轭定理) 总有 $f^{**} \leq f$. 若 f 闭真凸, 则 $f^{**} = f$. 更一般地, 若 f 的闭凸包函数真, 则 f^{**} 等于这一闭凸包函数.

证明. 由 $f^*(y) \geq y^\top x - f(x)$ 得 $y^\top x - f^*(y) \leq f(x)$, 对 y 取上确界得第一条. 若 f 闭真凸, 对任意实数 $r < f(x)$, 引理 3.12 给出 $a^\top z + b \leq f(z)$ 且 $a^\top x + b > r$. 由共轭定义, $f^*(a) \leq -b$, 所以 $f^{**}(x) \geq a^\top x - f^*(a) \geq a^\top x + b > r$. 对所有 $r < f(x)$ 成立, 包括 $f(x) = +\infty$ 的情形, 因而 $f^{**} \geq f$.

共轭的定义只取线性泛函在上图上的下界, 对上图取凸包或闭包不改变这些下界. 因而 f 与其闭凸包有相同共轭; 对真闭凸包使用已证明结论即可. □

非真性不能忽略. 令 $f(x) = -\infty$ 对 $x \leq 0$, $f(x) = +\infty$ 对 $x > 0$, 它闭凸, 但 $f^* \equiv +\infty$, $f^{**} \equiv -\infty$, 不等于 f .

例题 3.2 计算仿射函数、绝对值、幂函数及正定二次函数的共轭.

解答. 对 $f(x) = a^\top x - b$, 有 $f^*(y) = b$ 若 $y = a$, 否则 $+\infty$. 因为 $y \neq a$ 时沿 $y - a$ 方向的线性表达式无界. 对 $f(x) = |x|$, 当 $|y| \leq 1$ 时 $yx - |x| \leq 0$ 且 0 处取到; 当 $|y| > 1$ 时沿对应符号方向无界, 所以共轭是区间 $[-1, 1]$ 的指示函数.

取 $1 < p < \infty$, $q = p/(p-1)$. 对 $f(x) = \sum_i |x_i|^p/p$, 各坐标独立, 最大化条件为 $y_i = \text{sgn}(x_i)|x_i|^{p-1}$, 代回得到 $f^*(y) = \sum_i |y_i|^q/q$.

对 $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + a^\top x + b$, $Q \succ 0$, 最大化的一阶条件给出 $x = Q^{-1}(y - a)$, 完成平方得 $f^*(y) = \frac{1}{2}(y - a)^\top Q^{-1}(y - a) - b$. 一维 $f(x) = cx^2/2$ 的共轭因此为 $y^2/(2c)$. □

若 $f(x) = p(A(x-c)) + a^\top x + b$ 且 A 可逆, 变量代换 $z = A(x-c)$ 给出 $f^*(y) = p^*(A^{-\top}(y-a)) + c^\top(y-a) - b$. 可逆条件是这里直接代换公式的一部分, 不可用于一般降维映射.

3.6 支撑函数、极锥与 Farkas 引理

集合 X 的支撑函数为 $\sigma_X(y) = \sup_{x \in X} y^\top x$, 它是指示函数的共轭. $X, \text{cl } X, \text{conv } X, \text{cl conv } X$ 有相同支撑函数; 它的上图是闭凸锥. 支撑值是投影方向上的上确界, 可能为无穷或未取到, 因而不能总画成一个实际“最远点”.

本书使用极锥约定 $C^\circ = \{y : y^\top x \leq 0 \ \forall x \in C\}$. 在锥规划中将另用非负约定的对偶锥 $C^+ = -C^\circ$, 两者的符号不可混用. 若 C 是包含 0 的锥, 则 $\sigma_C = \delta_{C^\circ}$, 因为任何正内积都可按比例放大至无穷. 共轭定理给出双极公式 $(C^\circ)^\circ = \text{cl conv } C$.

定理 3.15 (Farkas 引理) 设 A 的列为 $a_1, \dots, a_m$. 方程 $A\lambda = b, \lambda \geq 0$ 可解, 当且仅当对每个 $y, A^\top y \leq 0$ 都蕴含 $b^\top y \leq 0$. 等价地, 下列两者恰有一个成立: b 是各列的非负组合; 存在 y 使 $A^\top y \leq 0$ 而 $b^\top y > 0$.

证明. 必要性由 $b^\top y = \lambda^\top A^\top y \leq 0$. 对充分性, 列向量生成的锥闭, 已在 Carathéodory 推论中证明. 若 b 不在该锥中, 对点与闭凸锥严格分离; 锥的齐次性强制分离泛函在整个锥上非正, 而在 b 上严格正, 正是第二种条件. 两种条件不可能同时成立. $\square$

这把“找一组非负系数”和“找一个证实不可能的线性泛函”连接起来. 在线性规划中, 前者给出对偶乘子, 后者给出降低目标的可行方向; 这一几何关系将在下一章展开.

4 扰动、对偶与最优性

本章对应原第 1 讲对偶导论以及第 8–11 讲的对偶理论, 原 PDF 第 6–16 页、第 104–157 页. 对偶的基本问题是: 能否用一个容易计算的下界逼近原最优值, 下界是否取到, 以及下界与原值相等时如何恢复解.

4.1 最小共点与最大截距

对非空 $M \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$, 把点记为 (u, w) . 定义最小共点值 $w^* = \inf\{w : (0, w) \in M\}$, 以及

$$q(\mu) = \inf_{(u, w) \in M} (w + \mu^\top u), \quad q^* = \sup_{\mu \in \mathbb{R}^r} q(\mu).$$

超平面 $w + \mu^\top u = \xi$ 将 M 放在上方的条件是 $\xi \leq q(\mu)$, 所以 q^* 是这类非竖直超平面在 w 轴上的最大截距. 原课程称为 min common / max crossing, 简称 MC/MC. 它不是额外的计算技巧, 而是统一各种对偶问题的几何形式.

命题 4.1 (弱对偶) q 凹且上半连续, 总有 $q(\mu) \leq w^*$ 及 $q^* \leq w^*$. 将 M 向上补齐、取凸包或闭包都不改变 q .

证明. q 是关于 μ 的仿射函数族的下确界, 所以凹且上半连续. 在下确界中只取 $u = 0$ 的点即得 $q(\mu) \leq w^*$. 线性泛函的下确界在凸包与闭包上不变; 向上增加 w 也不降低下确界. $\square$

若 $M = \text{epi } p$, 则 $w^* = p(0)$, $q(\mu) = -p^*(-\mu)$, $q^* = p^{**}(0)$. 对偶把扰动函数中原点处的高度替换为其闭凸包高度. 这直接说明闭性、凸性为何进入强对偶条件.

定理 4.2 (MC/MC 强对偶条件) 设 $w^* < +\infty$, 向上补齐集合 $M^+ = \{(u, v) : \exists (u, w) \in M, v \geq w\}$ 凸. 则 $q^* = w^*$ 当且仅当对每个 $(u_k, w_k) \in M, u_k \rightarrow 0$, 都有 $w^* \leq \liminf_k w_k$.

证明. 必要性由 $q(\mu) \leq w_k + \mu^\top u_k$ 取下极限, 再对 μ 取上确界得到. 若 $w^* = -\infty$, 弱对偶已经给强对偶, 因而只须考虑有限 w^* .

设序列条件成立. 对任意 $\varepsilon > 0$, 点 $(0, w^* - \varepsilon)$ 不在 $\text{cl } M^+$, 否则近似序列将违反条件. 闭凸集 $\text{cl } M^+$ 也不含竖直线: 一条这样的直线使向下方向成为其衰退方向, 而 $(0, w^*) \in \text{cl } M^+$, 从而使所有 $(0, w^* - \varepsilon)$ 都在闭包中. 不含竖直直线的凸集有一个非竖直半空间下界; 这是上一章仿射下界论证对一般集合的同一版本. 若严格分离当前外点

的平面恰为竖直, 加上该非竖直下界的小正倍数, 仍严格分离且竖直系数为正. 规范化为 1 得到 $w^* - \varepsilon < q(\mu) \leq w^*$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得结论. $\square$

补充上段使用的集合版本: 闭凸集是包含它的全部闭半空间之交. 若全部界定半空间都竖直, 该交必含每个已有上方与下方的整条竖直线. 因而至少一个界定半空间非竖直. 向上补齐使其竖直系数非负, 非零时即为正. 对非闭集, 其相对内部与闭包具有同一衰退锥, 所以闭包若含竖直线, 原集合的相对内部也含竖直线; 无竖直线性质因而保留.

定理 4.3 (乘子存在与紧性) 在上述凸性条件下设 w^* 有限, $D = \{u : \exists w, (u, w) \in M\}$. 若 $0 \in \text{ri } D$, 则强对偶成立且有对偶最优解. 对偶最优解集非空紧当且仅当 $0 \in \text{int } D$.

证明. $(0, w^*)$ 不在 $\text{ri } M^+$, 否则向下小幅移动仍可行. 适当分离给出 $\beta w^* \leq \mu^\top u + \beta w$ 对所有 $(u, w) \in M^+$, 且泛函不在整个集合上恒定. 向上封闭使 $\beta \geq 0$. 若 $\beta = 0$, 则 $\mu^\top u$ 在 D 的相对内点 0 取得最小值, 必在整个 D 恒为 0, 与适当性矛盾. 故 $\beta > 0$, 除以它得到 $q(\mu/\beta) \geq w^*$, 弱对偶使等号成立.

若 0 为内点, 选 $\pm re_i \in D$ 及相应有限高度 $w_i^\pm$. 对任意最优乘子, $w^* \leq w_i^\pm \pm r\mu_i$, 因而每个分量有上下界. 最优集由上半连续性闭, 所以紧. 反过来, 若有最优乘子而 0 不是内点, 支持 D 于 0 得到非零 a 使 $a^\top u \geq 0$ 对所有 $u \in D$. 则 $q(\mu + ta) \geq q(\mu) = w^*$ 对 $t \geq 0$, 弱对偶又强制等号, 最优集含非零射线, 不紧. $\square$

这里强对偶与乘子存在是不同结论. 扰动函数可能在原点闭却没有非竖直支持平面, 此时最优下界只能由乘子趋向无穷取到极限.

定理 4.4 (多面体加强) 设 $\widetilde{M}$ 凸, P 为非空多面体, $M = \widetilde{M} - (P \times \{0\})$, w^* 有限. 若 $\text{ri } \widetilde{D} \cap P \neq \emptyset$, 其中 $\widetilde{D}$ 是 $\widetilde{M}$ 的横坐标投影, 则强对偶成立且有最优乘子. 所有最优乘子满足 $\mu^\top d \leq 0$ 对 $d \in \text{rec } P$.

证明. 令 $C_1 = \{(u, v) : \exists (u, w) \in \widetilde{M}, v > w\}$, $C_2 = P \times \{w^*\}$. 两者不交, 否则 M 在竖轴上有低于 w^* 的点. 多面体加强分离使 C_2 位于下侧, 并且平面不包含整个 C_1 . 写分离不等式为 $\mu^\top z + \beta w^* \leq \mu^\top u + \beta v$. 有 $\beta \geq 0$. 若 $\beta = 0$, 在 $\text{ri } \widetilde{D} \cap P$ 的共同点, $\mu^\top u$ 在 $\widetilde{D}$ 上取得相对内部极小, 因而恒定, 违背分离加强性质. 故可规范化 $\beta = 1$.

对 $z \in P$ 与 $(u, v) \in C_1$ 取下确界, 得 $w^* \leq \inf(v + \mu^\top(u - z)) = q(\mu)$; 弱对偶给等号. 若某个 $d \in \text{rec } P$ 满足 $\mu^\top d > 0$, 令 z 沿 d 趋于无穷就使上述下确界为 $-\infty$, 不可能最优. $\square$

与相对内部版本相比, 这里把 $\text{ri } P$ 放宽为 P 本身. 线性不等式允许等号处可行而无需严格可行, 正是这一放宽的后果.

4.2 拉格朗日对偶

考虑 $\inf\{f(x) : x \in X, g(x) \leq 0\}$, 其中 $g = (g_1, \dots, g_r)$. 定义扰动函数 $p(u) = \inf\{f(x) : x \in X, g(x) \leq u\}$. 引入拉格朗日函数 $L(x, \mu) = f(x) + \mu^\top g(x)$. 对 $\mu \geq 0$,

$$q(\mu) = \inf_u (p(u) + \mu^\top u) = \inf_{x \in X} L(x, \mu).$$

若任一分量 $\mu_j < 0$, 可把相应 u_j 增大至无穷, 所以对偶值为 $-\infty$. 对偶问题因而在非负正交域上最大化 q . 原问题不必凸, 弱对偶及 q 的凹性仍成立; 凸性主要用于使下界达到原最优值.

定理 4.5 (非线性 Farkas 引理) 设 X 凸, f, g_j 在 X 上有限凸, 且 $g(x) \leq 0$ 时 $f(x) \geq 0$. 若存在 $\bar{x} \in X$ 使 $g(\bar{x}) < 0$, 则存在 $\mu \geq 0$ 使 $f(x) + \mu^\top g(x) \geq 0$ 对所有 $x \in X$ 成立. 此类乘子集合非空紧; 反过来, 其非空紧性蕴含严格可行点存在. 若全部 g_j 仿射, 则仅要求 $\text{ri } X$ 中有一个可行点就足以保证乘子存在.

证明. 取 $M = \{(u, w) : \exists x \in X, g(x) \leq u, f(x) \leq w\}$. 它凸, 严格可行点使 0 为其横向投影内点, 而 $w^* \geq 0$ 且有限. 定理 4.3 给出 $q(\mu) = w^* \geq 0$, 并强制 $\mu \geq 0$. 任一证书乘子满足 $0 \leq f(\bar{x}) + \mu^\top g(\bar{x})$, 因而 $\sum_j \mu_j \leq f(\bar{x}) / \min_j (-g_j(\bar{x}))$. 证书集合闭, 故紧.

若没有严格可行点, 凸上闭集合 $g(X) + \mathbb{R}_+^r$ 与严格负正交域不交. 分离两集给非零 $d \geq 0$ 使 $d^\top g(x) \geq 0$ 对所有 $x \in X$. 任一证书 μ 因而可加上 td , $t \geq 0$, 仍是证书, 所以非空证书集不紧. 仿射约束的版本把 M 写成仿射像上图加正交域, 用定理 4.4 及 $\text{ri } X$ 中可行点得到证书. $\square$

定理 4.6 (凸规划强对偶) 设 X, f, g_j 如上, 原最优值有限. 若存在严格可行点, 或全部 g_j 仿射且 $\text{ri } X$ 中有可行点, 则 $q^* = f^*$ 且有最优乘子. 在严格可行条件下最优乘子集还紧.

证明. 将上一引理用于 $f - f^*$. 得 $f^* \leq f(x) + \mu^{*\top} g(x)$ 对全部 $x \in X$. 取下确界得 $f^* \leq q(\mu^*)$, 弱对偶给反向不等式. 对最优乘子, 严格可行点同样给出 $\sum_j \mu_j \leq [f(\bar{x}) - f^*] / \min_j (-g_j(\bar{x}))$, 所以最优集紧. $\square$

这一结论保证对偶解, 并不单独保证原解存在; 原解的存在仍由上一章的闭性、紧性或多面体结构判断.

定理 4.7 (原始-对偶最优性) 可行点 x^* 与 $\mu^* \geq 0$ 同时最优且具有零对偶间隙, 当且仅当

$$x^* \in \operatorname{argmin}_{x \in X} L(x, \mu^*), \quad \mu_j^* g_j(x^*) = 0 \quad (j = 1, \dots, r).$$

证明. 若二者最优且零间隙, 有 $f^* = q(\mu^*) \leq L(x^*, \mu^*) = f(x^*) + \sum_j \mu_j^* g_j(x^*) \leq f(x^*) = f^*$. 全部等号迫使 x^* 达到拉格朗日下确界, 且每个非正项为 0. 反过来, 两条件使 $q(\mu^*) = f(x^*)$, 弱对偶夹逼给出二者最优及零间隙. $\square$

乘子为正的约束必须取等号; 有松弛的约束必须乘子为零. 反向均不必成立, 因为一个活跃约束也可能乘子为零.

等式约束 $Ax = b$ 的乘子 λ 无符号限制, 因为等式可写成两组反向不等式, 其非负乘子差可为任意实数. 拉格朗日函数为 $f(x) + \mu^\top g(x) + \lambda^\top (Ax - b)$. 纯等式的强对偶条件是有限原值与 $\text{ri } X$ 中有等式可行点. 混合约束可用以下条件: 在等式可行集中有严格不等式可行点, 且 $\text{ri } X$ 与等式平面相交. 取严格可行点与后一相对内点的合适凸组合, 可在 $\text{ri } X$ 内保留严格不等式并满足等式, 从而同时应用相对内部与严格可行论证. 最优性条件增加等式可行性, 但等式没有额外的互补松弛条件.

4.3 线性与二次规划对偶

定理 4.8 线性规划 $\inf\{c^\top x : Ax \geq b\}$ 的对偶为 $\sup\{b^\top \mu : A^\top \mu = c, \mu \geq 0\}$. 若任一最优值有限, 两问题都有最优解且最优值相同. 若原问题无界向下, 对偶不可行; 若对偶无界向上, 原问题不可行.

证明. 拉格朗日函数为 $(c - A^\top \mu)^\top x + b^\top \mu$. 对自由 x 取下确界, 当 $A^\top \mu = c$ 时为 $b^\top \mu$, 否则为 $-\infty$. 若原值有限, 多面体上的线性函数取到最小值, 记解为 x^* . 令 J 为活跃行集合. 可行方向锥为 $D = \{d : a_j^\top d \geq 0, j \in J\}$, 任一这样的方向都允许足够小的可行正步长. 最优性使 $c^\top d \geq 0$ 对 $d \in D$. Farkas 引理使 $c = \sum_{j \in J} \mu_j a_j$, $\mu_j \geq 0$. 非活跃项置零, 得对偶可行乘子且 $c^\top x^* = \sum_j \mu_j b_j = b^\top \mu$. 弱对偶使二者最优. 对偶值有限的情况可对对偶线性规划反向应用同一论证. 两个无界结论直接由弱对偶得到. $\square$

对线性问题, 原始、对偶可行性加互补松弛就是完整最优性证书. 两边都不可行也是可能的, 因而不能把无界与不可行一一对应而忽略此情形.

例题 4.1 求 $\frac{1}{2}x^\top Qx + c^\top x$ 在 $Ax \leq b$ 下的对偶, 其中 $Q \succ 0$.

解答. 对固定 $\mu \geq 0$, 无约束二次函数的极小点为 $x(\mu) = -Q^{-1}(c + A^\top \mu)$. 代回得

$$q(\mu) = -\frac{1}{2}\mu^\top A Q^{-1} A^\top \mu - \mu^\top (b + A Q^{-1} c) - \frac{1}{2}c^\top Q^{-1} c.$$

所以对偶等价于非负正交域上的半正定二次最小化. 若原问题可行, 正定二次项保证原解存在唯一, 仿射约束强对偶给最优乘子. 最优性证书是 $Ax^* \leq b$, $\mu^* \geq 0$, $x^* = -Q^{-1}(c + A^\top \mu^*)$ 及 $\mu_j^*((Ax^*)_j - b_j) = 0$. $\square$

4.4 Fenchel 对偶及反例

对闭真凸函数 f_1, f_2 , 原问题为 $\inf_x [f_1(x) + f_2(x)]$. 将同一个变量拆成 $x_1 = x_2$, 拉格朗日函数取 $f_1(x_1) + f_2(x_2) + y^\top (x_2 - x_1)$, 分别极小化得

$$q(y) = -f_1^*(y) - f_2^*(-y).$$

若原值有限且 $\text{ri dom } f_1 \cap \text{ri dom } f_2 \neq \emptyset$, 等式约束强对偶给出零间隙与对偶解. 原点 x^* 与乘子 y^* 的完整证书为 $x^* \in \arg\min_x [f_1(x) - y^{*\top} x]$ 及 $x^* \in \arg\min_x [f_2(x) + y^{*\top} x]$. 若两者可微且全空间有限, 这等价于 $y^* = \nabla f_1(x^*) = -\nabla f_2(x^*)$.

Fenchel 两侧结构对称. 对偶值有限且 $\text{ri dom } f_1^* \cap \text{ri}(-\text{dom } f_2^*) \neq \emptyset$ 时, 反向使用强对偶可保证原解. 这个结论与原侧资格条件所保证的“对偶解存在”要分开.

例题 4.2 说明强对偶、对偶解存在与原解存在不能互相替代.

解答. 第一例沿用部分极小化反例: 在非负象限最小化 $e^{-\sqrt{x_1 x_2}}$, 加等式 $x_1 = 0$. 原值为 1. 对偶 $q(\lambda) = \inf_{x \geq 0} [e^{-\sqrt{x_1 x_2}} + \lambda x_1]$ 在 $\lambda \geq 0$ 时为 0, 在 $\lambda < 0$ 时为 $-\infty$. 当 $\lambda \geq 0$, 选 $x_1 \downarrow 0$ 同时 $x_1 x_2 \rightarrow \infty$ 就逼近 0; 当 $\lambda < 0$, 固定 $x_2 = 0$ 令 $x_1 \rightarrow \infty$ 即无界. 因而间隙为 1. 非负象限的相对内部不满足 $x_1 = 0$, 资格条件失效.

第二例最小化 x 且 $x^2 \leq 0$. 唯一可行原解为 0, 原值 0. 对 $\mu > 0$, 完成平方给 $q(\mu) = -1/(4\mu)$; $\mu = 0$ 时为 $-\infty$. 对偶上确界 0 而无最优乘子. 扰动函数为 $p(u) = -\sqrt{u}$ 对 $u \geq 0$, 其余为 $+\infty$, 在 0 下半连续却没有有限斜率支持线.

最后, 无约束最小化 e^x 的原值 0 未取到. 把它写成 $f_1 = e^x, f_2 = 0$, Fenchel 对偶可在唯一可行共轭乘子 0 处取到 0. 因而即使强对偶与对偶解都有, 原解仍可不存在. $\square$

4.5 极小极大与零和博弈

对任意有限值 $\phi : X \times Z \rightarrow \mathbb{R}$, 总有 $\sup_z \inf_x \phi(x, z) \leq \inf_x \sup_z \phi(x, z)$. 因为固定 x, z 时, 左侧内层不超过 $\phi(x, z)$, 对另一变量依次取界即可. 鞍点 (x^*, z^*) 定义为 $\phi(x^*, z) \leq \phi(x^*, z^*) \leq \phi(x, z^*)$ 对全部 x, z 成立. 鞍点等价于极小极大等式成立且两侧最优值分别在 x^*, z^* 取到: 一方面由鞍点夹逼; 另一方面两侧共同最优值夹住 $\phi(x^*, z^*)$, 于是两条鞍点不等式成立.

约束优化是 $\inf_x \sup_{\mu \geq 0} L(x, \mu)$, 因为不可行点让内层为 $+\infty$, 可行点让它为 $f(x)$. 对偶是把两层交换. 因而拉格朗日鞍点就是零间隙且存在原始-对偶最优解的情况.

更一般地取 $p(u) = \inf_x \sup_z [\phi(x, z) - u^\top z]$. 对固定 x , 内层是 $-\phi(x, \cdot)$ 的共轭在负参数处的值. 对 u 再极小化并交换两个下确界, 得 $q(\mu) = \inf_x \hat{\phi}(x, \mu)$, 其中 $\hat{\phi}$ 是关于第二变量的闭凹包. 若每个第二变量函数已经闭凹, 对偶正是 $\sup_z \inf_x \phi(x, z)$. 当 p 真凸且在 0 闭, MC/MC 给极小极大等式. 原资料这一构造的作用是说明何种闭凹化进入对偶, 而不是在任意 X, Z 上无条件交换极值.

例题 4.3 有限零和矩阵博弈中, 玩家一以概率 $x \in \Delta_n$ 选行, 玩家二以概率 $z \in \Delta_m$ 选列, 第一人向第二人支付 $x^\top A z$. 证明双方最坏情形最优值相同.

解答. 对固定 x , 最大期望支付为 $\max_j (A^\top x)_j$. 玩家一问题因此是线性规划 $\min t, A^\top x \leq t \mathbf{1}, \mathbf{1}^\top x = 1, x \geq 0$. 其对偶可写成 $\max s, A z \geq s \mathbf{1}, \mathbf{1}^\top z = 1, z \geq 0$, 正是玩家二的 $\max_z \min_i (A z)_i$. 两个单纯形紧, 目标连续, 原值有限; 线性规划强对偶保证等式与双方策略存在. 例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 时, 双方各以 $(1/2, 1/2)$ 混合, 期望值恒为 0, 直接构成鞍点. $\square$

5 次梯度与灵敏度

本章对应原第 12 讲, 第 158–172 页. 可微凸函数由一个切平面提供下界; 不可微点可能允许多个支撑斜率. 次梯度将这种全局下界性质保留下来, 既提供最优性证书, 也为次梯度与切平面算法提供信息.

5.1 定义、存在性与共轭等号

定义 5.1 对真凸函数 f , 若 $x \in \text{dom } f$ 且 $g \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(z) \geq f(x) + g^\top(z - x)$ 对全部 $z \in \mathbb{R}^n$ 成立, 称 g 为 f 在 x 的次梯度. 全部次梯度组成次微分 $\partial f(x)$; 域外约定为空集.

次微分是闭凸集, 因为每个 z 对 g 规定一个闭半空间. 当 f 可微时, $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$: 切平面不等式给包含, 而任一次梯度对 $z = x + td$ 的不等式在 $t \downarrow 0$ 和 $t \uparrow 0$ 两向给出 $g^\top d = \nabla f(x)^\top d$.

例题 5.1 计算 $f(x) = |x|$ 及 $h(x) = \max\{0, (x^2 - 1)/2\}$ 的次微分.

解答. 绝对值在正负半轴的导数分别为 1 和 -1 , 在 0 处次梯度条件是 $|z| \geq gz$ 对全部 z , 等价于 $-1 \leq g \leq 1$. 对 h , 当 $|x| < 1$ 时局部恒为 0 且可微, 次微分为 $\{0\}$; 当 $|x| > 1$ 时为 $\{x\}$. 在 1 处, 支撑斜率可取 0 与 1 之间任意值, 由左、右差商也只能取这些值, 所以为 $[0, 1]$; 在 -1 处为 $[-1, 0]$. $\square$

定理 5.2 真凸函数在 $\text{ri dom } f$ 上次微分非空. 若 S 是有效域仿射包的方向空间, 则在这些点 $\partial f(x) = S^\perp + G$, 其中 $G \subseteq S$ 非空紧. 对任意域内点, 次微分非空紧当且仅当该点属于有效域的环境空间内部.

证明. 在仿射包内, 对平移函数 $p(u) = f(x+u) - f(x)$ 使用 MC/MC 的相对内部支持论证, 得到 $p(u) \geq g^\top u$ 的非竖直支持平面, 从而次梯度存在. 也可直接在闭上图的边界 $(x, f(x))$ 支持; 相对内部连续性保证这个边界高度未改变, 域内相对球强制竖直系数为正.

取相对球半径 r 并在略大球上用凸性给有限上界 M . 对 $g \in \partial f(x) \cap S$, 在 $z = x + rg/\|g\|$ 代入支撑不等式, 得 $r\|g\| \leq M - f(x)$, 所以这一集合有界, 又闭非空, 故紧. 沿 $S^\perp$ 加任何向量不改变域内支撑不等式, 给出分解. 若点是环境内点, $S = \mathbb{R}^n$, 所以次微分非空紧.

反过来, 若域内点不是环境内点, 分离有效域得到非零法向量 a , $a^\top(z - x) \leq 0$ 对全部域内 z . 任一次梯度 g 都可加上 ta , $t \geq 0$, 仍是次梯度, 因而若非空就无界. 这证明必要性, 包括低维域情形. $\square$

边界点可以有次梯度, 也可以没有. 指示函数在边界通常具有无界法锥; $-\sqrt{x}$ 在非负半轴边界 0 则没有有限次梯度. 后续算法在每一步调用次梯度时必须保证所选点确实有可用次梯度.

定理 5.3 (Fenchel 不等式与等号) 对真凸函数, $x^\top y \leq f(x) + f^*(y)$. 等号成立当且仅当 $y \in \partial f(x)$. 若 f 闭, 还等价于 $x \in \partial f^*(y)$.

证明. 不等式正是共轭定义. 等号使 x 达到 $\sup_z [y^\top z - f(z)]$, 即 $f(z) \geq f(x) + y^\top(z - x)$; 反向也由同式得到. 若 f 闭真凸, 双共轭等于 f , 对共轭函数反向使用相同等号条件即可. $\square$

推论 5.4 闭真凸函数的全空间极小点集等于 $\partial f^*(0)$. 若 $0 \in \text{ri dom } f^*$, 极小点存在; 极小点集非空紧当且仅当 $0 \in \text{int dom } f^*$.

证明. x 最优当且仅当 $0 \in \partial f(x)$, 用 Fenchel 等号等价于 $x \in \partial f^*(0)$. 其余结论由次梯度存在性与紧性定理得到. $\square$

5.2 法锥与支撑函数

集合 C 在 $x \in C$ 的法锥为 $N_C(x) = \{g : g^\top(z - x) \leq 0 \ \forall z \in C\}$. 由定义立即有 $\partial \delta_C(x) = N_C(x)$. 内点的法锥为 $\{0\}$; 边界法向量朝向所有可行方向的反侧.

命题 5.5 对多面体 $C = \{x : a_i^\top x \leq b_i\}$, 在可行点 x 有 $N_C(x) = \text{cone}\{a_i : a_i^\top x = b_i\}$.

证明. 活跃法向量的非负组合显然是法向量. 反向, 任一法向量 g 对局部可行方向 d 满足 $g^\top d \leq 0$. 这些方向由活跃不等式 $a_i^\top d \leq 0$ 刻画, 因为不活跃约束有严格余量, 对任何固定方向足够小的正步长仍满足它们. Farkas 引理使 g 是活跃法向量的非负组合. $\square$

命题 5.6 若 $K = \text{cl conv } X$ 非空, 则 $\partial\sigma_X(y) = \text{argmax}_{x \in K} y^\top x$. 对有限最大仿射函数 $f(x) = \max_i(a_i^\top x + b_i)$, 令 $I(x) = \{i : a_i^\top x + b_i = f(x)\}$, 则 $\partial f(x) = \text{conv}\{a_i : i \in I(x)\}$.

证明. $\sigma_X = \delta_K^*$, 且 δ_K 闭真凸, 所以 Fenchel 等号说明 $x \in \partial\sigma_X(y)$ 当且仅当 $x \in K$ 且 $y^\top x = \sigma_X(y)$. 最大值未取到时, 两边都是空集.

对最大仿射函数, 每个活跃斜率都是次梯度, 其凸组合也都是. 若 g 不在这些斜率凸包中, 严格分离给方向 d 使 $g^\top d > \max_{i \in I(x)} a_i^\top d$. 因为项数有限, 不活跃项的余量确保足够小的 $t > 0$ 时, $f(x + td) = f(x) + t \max_{i \in I(x)} a_i^\top d$. 这违反 g 的次梯度不等式, 所以没有更多次梯度. $\square$

5.3 链式法则与和法则

定理 5.7 令 $F(x) = f(Ax)$ 为真凸函数. 总有 $A^\top \partial f(Ax) \subseteq \partial F(x)$. 若 $\text{Range } A \cap \text{ri dom } f \neq \emptyset$, 或 f 为多面体凸函数, 则等号成立.

证明. 正向包含把 f 的支撑不等式代入 Az 即得. 反向设 $d \in \partial F(x)$, 则 $(y, z) = (Ax, x)$ 达到问题 $\min[f(y) - d^\top z]$, 约束 $Az = y, y \in \text{dom } f$ 的有限最小值. 相对内部资格条件使这个等式约束问题具有最优乘子 v . 若 f 多面体, 可以在其多面体上图上写成线性规划, 也有最优乘子. 拉格朗日函数为 $f(y) - d^\top z + v^\top (Az - y)$. 对自由 z 极小化要求 $A^\top v = d$, 而对 y 的最优性说明 $v \in \partial f(Ax)$. 因而 d 属于右侧所述像. $\square$

多面体函数指上图为多面体的真凸函数, 可写成多面体域上有限个仿射函数的最大值. 这类函数的资格条件可以比一般凸函数宽松, 因为其有限生成结构排除了参数向无穷逃逸而丢失边界的困难.

定理 5.8 设 f_i 真凸且 $F = \sum_i f_i$ 真. 若 $\bigcap_i \text{ri dom } f_i \neq \emptyset$, 则 $\partial F(x) = \sum_i \partial f_i(x)$. 若前 k 个函数多面体, 条件可放宽为

$$\left(\bigcap_{i \leq k} \text{dom } f_i \right) \cap \left(\bigcap_{i > k} \text{ri dom } f_i \right) \neq \emptyset.$$

证明. 令 $Ax = (x, \dots, x)$, $h(x_1, \dots, x_m) = \sum_i f_i(x_i)$. 对各独立变量, 次梯度不等式说明 $\partial h = \partial f_1 \times \dots \times \partial f_m$. 又 $F = h \circ A$, 用链式法则即得一般资格条件下的等式. 在含多面体项的情况下, 同一拆变量证明中的相等约束与多面体域可合并为一个多面体集合; 对其余项使用 MC/MC 多面体加强版本. 它只要求该多面体与剩余有效域相对内部相交, 正是所列放宽条件. 最优乘子的存在再给出各分量次梯度的分解. $\square$

没有资格条件时只能保证次微分和包含于总函数的次微分, 不能任意作反向分解. 例如 $f(x) = -\sqrt{x}$ 在非负半轴上, $C = \{0\}$, 总函数 $f + \delta_C$ 在 0 最小且有零次梯度, 但 $\partial f(0) = \emptyset$, 所以无法把零分成目标次梯度与法向量之和.

定理 5.9 (约束次梯度最优性) 若 f 与凸集 X 满足下列任一条件: 相对内部相交; f 多面体且 $\text{dom } f \cap \text{ri } X \neq \emptyset$; X 多面体且 $\text{ri dom } f \cap X \neq \emptyset$; 二者都多面体且有共同可行点, 则 x^* 最优当且仅当存在 $g \in \partial f(x^*)$ 使 $-g \in N_X(x^*)$, 即 $g^\top(x - x^*) \geq 0$ 对所有 $x \in X$.

证明. 在 X 上最小化等价于全空间最小化 $f + \delta_X$. 全空间最优性等价于 $0 \in \partial(f + \delta_X)(x^*)$. 上述条件分别允许使用和法则, 所以它等价于 $0 \in \partial f(x^*) + N_X(x^*)$, 即所述条件. $\square$

可微情况恢复第 1 章的变分不等式. 一般情况只须找到一个适当次梯度, 不要求整个次微分都朝向可行集外.

5.4 乘子的灵敏度意义

对约束扰动函数 $p(u)$, 若它真凸且强对偶成立, 则最优乘子集为 $-\partial p(0)$. 因为 $q(\mu) = -p^*(-\mu)$, 最优性正是 $p(0) + p^*(-\mu) = 0$, 由 Fenchel 等号即得. 因而每个最优乘子给出全局扰动下界

$$p(u) \geq p(0) - \mu^*{}^\top u.$$

放宽约束的分量 $u_j > 0$ 不会提高最优值, 非负乘子记录这一降低的局部边际幅度. 若 p 在 0 可微, 最优乘子唯一, 且 $\mu_j^* = -\partial p(0)/\partial u_j$. 若不可微, 可能有多个乘子, 每个都给一个合法的一阶下界, 不能假定某个乘子在大幅扰动下仍精确预测最优值.

例题 5.2 最小化 $x^2/2$ 且 $x \geq b$, 在 $b > 0$ 处求影子价格.

解答. 写约束 $b - x \leq u$. 对足够小的 u , 最优点为 $x = b - u$, 所以 $p(u) = (b - u)^2/2$. 有 $-p'(0) = b$. 拉格朗日函数 $x^2/2 + \mu(b - x)$ 在 $x = \mu$ 极小, 原最优点为 b , 因而最优乘子为 b , 与扰动导数一致. 当放宽量 $u \geq b$ 时, 最优点变为 0, 旧的一阶公式只能给下界, 不能继续当作等式. $\square$

6 锥规划与问题结构

本章承接原第 11 讲锥对偶及第 13 讲, 原 PDF 第 153–157 页、第 173–184 页. 后续算法的选择不仅取决于是否凸, 还取决于目标与约束如何分解、线性优化或投影是否容易计算, 以及约束锥的结构.

6.1 锥约束与对偶锥

闭凸锥 C 的非负对偶锥定义为 $C^+ = \{y : y^\top x \geq 0 \ \forall x \in C\}$. 它等于 $-C^\circ$, 且 $(C^+)^+ = C$. 最小化闭真凸 f 于 $x \in C$ 可写成 $\min(f + \delta_C)$, Fenchel 对偶为

$$\sup_{y \in C^+} \{-f^*(y)\}.$$

原讲义有时将它改写为 $\min_{y \in C^+} f^*(y)$, 此时是将对偶目标整体换号, 两个最小化问题的值不能直接写成相等.

定理 6.1 若原值有限且 $\text{ri dom } f \cap \text{ri } C \neq \emptyset$, 则上述锥对偶零间隙且有最优解. 若对偶值有限且 $\text{ri dom } f^* \cap \text{ri } C^+ \neq \emptyset$, 则反向保证零间隙及原解存在. 原始-对偶解对满足 $x \in C, y \in C^+, y \in \partial f(x)$ 与 $x^\top y = 0$.

证明. 前两条分别在 Fenchel 对偶的原侧与共轭侧使用资格条件. 最优解对的拉格朗日条件是 $y \in \partial f(x)$ 与 $-y \in \partial \delta_C(x) = N_C(x)$. 对锥, 后式等价于 $y \in C^+$ 与 $x^\top y = 0$: 在法锥定义中取 $z = 0, 2x$ 得内积为 0, 再对任意 $z \in C$ 得非负对偶条件. 反向把这些条件代回 Fenchel 等号, 得 $f(x) = -f^*(y)$, 弱对偶使二者最优. $\square$

命题 6.2 线性锥规划有如下两种常用对偶形式:

$$\begin{aligned} \inf_{Ax=b, x \in C} c^\top x &\longleftrightarrow \sup_{c-A^\top \lambda \in C^+} b^\top \lambda, \\ \inf_{Ax=b \in C} c^\top x &\longleftrightarrow \sup_{A^\top y=c, y \in C^+} b^\top y. \end{aligned}$$

证明. 第一式拉格朗日函数取 $c^\top x + \lambda^\top (b - Ax)$. 在锥上极小化 $(c - A^\top \lambda)^\top x$ 时, 系数属于 C^+ 则下确界为 0, 否则沿某个锥方向趋于 $-\infty$. 第二式先令 $z = Ax - b \in C$, 用乘子 y 对等式写 $c^\top x - y^\top (Ax - b - z)$; 对自由 x 极小化要求 $A^\top y = c$, 对锥变量 z 极小化要求 $y \in C^+$, 剩余为 $b^\top y$. $\square$

若用仿射集合 $b+S$ 而非矩阵等式描述, $f(x) = c^\top x + \delta_{b+S}(x)$ 的共轭为 $(y-c)^\top b$ 当 $y-c \in S^\perp$, 否则为 $+\infty$. 对偶最大值因此为 $\sup[b^\top c - b^\top y]$, 约束 $y-c \in S^\perp, y \in C^+$. 去掉常数并换号才得到原讲义的对偶最小化形式 $\min b^\top y$. 这一计算保留了常数, 有助于检查对偶最优值的符号.

6.2 二阶锥与半正定锥

命题 6.3 非负正交锥、二阶锥 $\mathcal{Q}_n = \{(u, t) : \|u\| \leq t\}$ 以及对称半正定矩阵锥 S_+^n 都自对偶, 即 $C^+ = C$. 矩阵空间的内积取 $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(XY)$.

证明. 非负正交域的结论逐坐标取单位向量即可. 若 $(u, t), (v, s) \in \mathcal{Q}_n$, 则 $u^\top v + ts \geq -\|u\|\|v\| + ts \geq 0$, 因而二阶锥包含于其对偶. 若 (v, s) 不在锥内, 当 $s < 0$ 取 $(0, 1)$ 给负内积; 否则 $\|v\| > s$, 取 $(-v/\|v\|, 1)$ 给负内积, 得反向包含.

若 $X, Y \succeq 0$, 对 X 作谱分解 $X = \sum_i \lambda_i v_i v_i^\top$, 则 $\text{tr}(XY) = \sum_i \lambda_i v_i^\top Y v_i \geq 0$. 若对称矩阵 Y 非半正定, 取 v 使 $v^\top Y v < 0$, 秩一半正定矩阵 $vv^\top$ 与它的内积为负, 所以不属于对偶. 对称矩阵空间实际维数为 $n(n+1)/2$, 不必把重复的对称分量当作独立坐标. $\square$

二阶锥规划的约束可写为 $A_i x - b_i \in \mathcal{Q}_{n_i}$, 目标线性. 把锥取笛卡尔积并用命题 6.2, 得对偶 $\max \sum_i b_i^\top y_i, \sum_i A_i^\top y_i = c, y_i \in \mathcal{Q}_{n_i}$. 若有严格锥可行点且原值有限, 则零间隙与对偶解存在. 这些资格条件并不比一般线性锥规划更强, 也不能因锥自对偶就删掉.

例题 6.1 把 $\|Bx - d\| \leq a^\top x + \beta$ 和 $\|x\|^2 \leq t$ 写成锥约束.

解答. 第一条就是 $(Bx - d, a^\top x + \beta) \in \mathcal{Q}$, 自动要求右侧非负. 第二条等价于 $(2x, t - 1, t + 1) \in \mathcal{Q}_{n+2}$, 因为 $(t + 1)^2 - [(t - 1)^2 + 4\|x\|^2] = 4(t - \|x\|^2)$, 且锥条件保证 $t + 1 \geq 0$. 反向原不等式使 $t \geq 0$, 故也满足锥约束. 不少凸二次模型可通过这种提升成为二阶锥规划. $\square$

半正定规划在 $\mathbb{S}^n$ 中最小化 $\langle C, X \rangle$, 约束 $\mathcal{A}(X) = b, X \succeq 0$. 其对偶为 $\max b^\top y, C - \mathcal{A}^*(y) \succeq 0$, 其中伴随算子由 $\langle \mathcal{A}^*y, X \rangle = y^\top \mathcal{A}(X)$ 定义. 互补性是 $\langle X, C - \mathcal{A}^*y \rangle = 0$. 若原始与对偶松弛矩阵都半正定, 该内积等于 0 还蕴含其矩阵乘积为零: 从 $\text{tr}(X^{1/2}SX^{1/2}) = 0$ 得半正定矩阵 $X^{1/2}SX^{1/2} = 0$, 继而 $S^{1/2}X^{1/2} = 0$, 因而 $SX = 0$. 后章会给最大特征值与离散二次规划的具体建模例子.

6.3 可分离结构与离散下界

设变量按块 $x_i \in X_i$, 目标为 $\sum_i f_i(x_i)$, 耦合约束为 $\sum_i g_{ji}(x_i) \leq 0$. 对固定 $\mu \geq 0$, 拉格朗日下确界可分解为

$$q(\mu) = \sum_i q_i(\mu), \quad q_i(\mu) = \inf_{x_i \in X_i} \left[f_i(x_i) + \sum_j \mu_j g_{ji}(x_i) \right].$$

每个块可独立计算; 原问题变量维数很大时, 耦合乘子维数可能较小. 若各块下确界取到, 令块解为 $x_i(\mu)$, 则向量 $s_j = \sum_i g_{ji}(x_i(\mu))$ 是凹函数 q 的超梯度, 即 $q(\nu) \leq q(\mu) + s^\top(\nu - \mu)$. 证明只须在 $q(\nu)$ 的极小化中代入旧块解, 无须对块解关于乘子求导. 等价地 $-s$ 是凸函数 $-q$ 的次梯度.

当 X_i 离散, 强对偶可能失败, 但 $q(\mu)$ 仍是原最优值的合法下界. 在分支定界中, 每个节点固定部分离散选择, 剩余子问题的对偶值给节点下界; 已找到的可行解给全局上界. 若节点下界不小于当前上界, 节点可剪枝. 对偶间隙影响下界紧度与搜索效率, 不影响下界的正确性. 本课程在这里介绍结构用途, 并未把离散问题变成无条件强对偶的凸问题.

6.4 大规模和与多约束

统计学习常出现 $f(x) = \sum_{i=1}^m f_i(x)$, 每一项对应一个样本损失. 最小二乘为 $\sum_i (a_i^\top x - b_i)^2$; 加 ℓ_1 正则得到 $\sum_i (a_i^\top x - b_i)^2 + \lambda \sum_j |x_j|$. 不可微项促使部分坐标精确为 0, 后面的近端软阈值公式会把这一性质计算出来. 离散概率空间上的期望 $\mathbb{E}F(x, \omega) = \sum_i p_i F(x, \omega_i)$ 也具有同一大和结构. 两阶段随机规划还可写为 $F_1(x) + \mathbb{E}_\omega[\inf_y F_2(x, y, \omega)]$, 其中内层值函数的凸性与闭性需要使用部分极小化条件, 不能因为写成期望就自动成立.

当约束数很大时, 一种方式是罚函数, 如 $\sum_j [(a_j^\top x - b_j)_+]^2$ 或 $\sum_j (a_j^\top x - b_j)_+$. 二次惩罚通常需要参数趋大才逼近精确可行; 非光滑线性惩罚在乘子有界条件下可以精确, 其阈值将在下降方法章节证明. 另一种方式是先保留少量约束, 求解后检测违反项并加回, 形成外逼近; 若维护一组确定可行的点或内模型, 则是内逼近. 它们分别提供不同方向的界, 后面的切平面与单纯形分解将说明如何形成最优性间隔.

原第 178 页给出实践中的粗略问题层级: 线性与凸二次、二阶锥、半正定、一般凸、非凸、离散. 这是一种课程组织视角, 并非对每个实例的严格复杂度排名. 网络结构、可分离性、投影和线性优化子问题的可解性, 都可能显著改变实际难度. 第 1 讲所强调的算法与对偶结合, 在这些结构化问题中最有作用.

6.5 由紧性保证强对偶

命题 6.4 设 X 闭凸, f, g_j 为闭凸函数, 原可行集 $C = \{x \in X : g(x) \leq 0\}$ 非空紧且存在有限目标值可行点, f 真. 则原解集非空紧, 拉格朗日对偶零间隙. 此条件本身不保证对偶解存在.

证明. 在紧可行集上用下半连续性得到原解存在, 且最优值有限. 令 $F(x, u) = f(x)$ 当 $x \in X, g(x) \leq u$, 其他点为 $+\infty$. 其上图由闭凸条件定义, 所以闭凸. 在 $u = 0$ 处的一个非空有限目标水平集包含于紧可行集, 因而紧. 部分极小化定理使 $p(u) = \inf_x F(x, u)$ 闭真凸. 于是 $p^{**}(0) = p(0)$, 即强对偶. 对偶解需要 p 在 0 有次梯度, 紧性只保证闭性而不保证这一点; 前章 $x^2 \leq 0$ 的例子正说明区别. $\square$

7 锥模型、惩罚与次梯度迭代

本章对应原第 14–16 讲, 原 PDF 第 185–213 页. 第 14 讲先承接锥对偶的建模应用, 随后转入非光滑算法. 本章补写的计算与收敛证明是对幻灯片省略步骤的教学重构.

7.1 二阶锥与半正定模型

线性锥问题的两种常用格式是

$$\inf\{c^T x : Ax = b, x \in C\}, \quad \inf\{c^T x : Ax - b \in C\}.$$

这里 C 是闭凸锥, 其对偶锥取 $C^* = \{y : y^T z \geq 0, z \in C\}$. 第一种格式的对偶是 $\sup\{b^T \lambda : c - A^T \lambda \in C^*\}$; 第二种格式的对偶是 $\sup\{b^T \lambda : A^T \lambda = c, \lambda \in C^*\}$. 例如对第二式取拉格朗日函数 $c^T x - \lambda^T (Ax - b)$, 对 x 取下确界, 即可看到等式 $A^T \lambda = c$ 的来源. 本节所说的对偶界总是弱对偶界; 把它升级为最优值相等还需前章的强对偶条件.

记 $\mathcal{Q}_d = \{(u, t) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} : \|u\| \leq t\}$ 为二阶锥. 因 $\mathcal{Q}_d^* = \mathcal{Q}_d$, 问题

$$\min c^T x \quad \text{满足} \quad A_i x - b_i \in \mathcal{Q}_{d_i}, \quad i = 1, \dots, m$$

的对偶是

$$\max \sum_{i=1}^m b_i^T \lambda_i \quad \text{满足} \quad \sum_{i=1}^m A_i^T \lambda_i = c, \quad \lambda_i \in \mathcal{Q}_{d_i}.$$

多个锥约束只是在乘积锥上写一个约束, 并不需要另造一套对偶理论.

例题 7.1 在鲁棒线性规划中, 第 j 条约束要求 $a^T x \leq b$ 对所有 $(a, b) \in T_j$ 成立. 设不确定集为椭圆

$$T_j = \{(\bar{a}_j + P_j u, \bar{b}_j + q_j^T u) : \|u\| \leq 1\}.$$

把这条无限多不等式写成一个二阶锥约束.

解答. 最坏约束违反量为

$$g_j(x) = \sup_{\|u\| \leq 1} [(\bar{a}_j + P_j u)^T x - \bar{b}_j - q_j^T u]$$

$$\begin{aligned}
&= \bar{a}_j^\top x - \bar{b}_j + \sup_{\|u\| \leq 1} (P_j^\top x - q_j)^\top u \\
&= \bar{a}_j^\top x - \bar{b}_j + \|P_j^\top x - q_j\|.
\end{aligned}$$

最后一步用柯西不等式; 向量非零时取同方向的单位向量达到上界. 因而 $g_j(x) \leq 0$ 恰好等价于 $(P_j^\top x - q_j, \bar{b}_j - \bar{a}_j^\top x) \in \mathcal{Q}_{d_j+1}$. 这说明椭球不确定性所引入的非线性仍可保留为标准锥模型. $\square$

对称矩阵空间的内积是 $\langle U, V \rangle = \text{tr}(UV)$. 半正定锥 $\mathbb{S}_+^n$ 在此内积下自对偶, 内部为正定矩阵. 于是半正定规划

$$\min \langle D, X \rangle \quad \text{满足} \quad \langle A_i, X \rangle = b_i \quad (i = 1, \dots, m), \quad X \succeq 0$$

的对偶是 $\max \{b^\top \lambda : D - \sum_i \lambda_i A_i \succeq 0\}$. 若原问题有正定可行矩阵, 且原最优值有限, 则强对偶成立且对偶最优解存在. 若对偶有严格可行点, 且对偶最优值有限, 则反向的结论成立. 有限性不可从严格可行性自动推出.

例题 7.2 给定仿射对称矩阵 $M(\lambda) = D + \sum_{i=1}^m \lambda_i M_i$, 最小化其最大特征值.

解答. 由谱定理, $\lambda_{\max}(M(\lambda)) \leq z$ 等价于 $zI - M(\lambda) \succeq 0$. 故问题可写为

$$\min_{z, \lambda} z \quad \text{满足} \quad zI - D - \sum_i \lambda_i M_i \succeq 0.$$

变量虽包含矩阵的特征值, 约束对 (z, λ) 却是仿射半正定约束. $\square$

例题 7.3 考虑非凸二次等式问题

$$\min_x x^\top Q_0 x + a_0^\top x + b_0 \quad \text{满足} \quad x^\top Q_i x + a_i^\top x + b_i = 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

其中 Q_i 对称. 推导一个半正定规划形式的拉格朗日下界.

解答. 令 $Q(\lambda) = Q_0 + \sum_i \lambda_i Q_i$, $a(\lambda) = a_0 + \sum_i \lambda_i a_i$, $b(\lambda) = b_0 + \sum_i \lambda_i b_i$. 对偶函数是

$$q(\lambda) = \inf_x \{x^\top Q(\lambda)x + a(\lambda)^\top x + b(\lambda)\}.$$

条件 $q(\lambda) \geq t$ 是一个对所有 x 成立的二次不等式. 它等价于

$$\begin{pmatrix} Q(\lambda) & a(\lambda)/2 \\ a(\lambda)^\top/2 & b(\lambda) - t \end{pmatrix} \succeq 0.$$

正定方向的等价性可由配方看出. 一般情形, 矩阵半正定显然推出二次不等式. 反向, 对 (v, s) 在 $s \neq 0$ 时把二次型写成 s^2 乘以 $x = v/s$ 的表达式; 在 $s = 0$ 时由连续性取极限. 因而对偶就是在上述矩阵约束下最大化 t . 它给原问题下界, 不保证非凸原问题的强对偶. 特别地, $x_i \in \{0, 1\}$ 可写成 $x_i^2 - x_i = 0$, 所以这种下界也适用于离散优化. $\square$

7.2 精确惩罚与乘子的阈值

考虑凸约束问题

$$f^* = \inf\{f(x) : x \in X, g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, r\},$$

其中 X 凸, f, g_j 为实值凸函数. 惩罚函数 $P: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ 在负正交锥上为零, 在出现正分量时为正; 为使 $P \circ g$ 仍凸, 本节还取 P 凸且逐坐标不减. 常用选择是 $P_c(u) = c \sum_j \max\{0, u_j\}$ 或 $\frac{c}{2} \sum_j \max\{0, u_j\}^2$.

用扰动值函数 $p(u) = \inf\{f(x) : x \in X, g(x) \leq u\}$, 有

$$\inf_{x \in X} \{f(x) + P(g(x))\} = \inf_u \{p(u) + P(u)\}. \quad (7.1)$$

一侧由取 $u = g(x)$ 得到; 另一侧由 $g(x) \leq u$ 与 P 单调性得到, 再分别逼近下确界. 设 p 真凸, 并满足 Fenchel 强对偶的相对内部条件, 则右侧等于

$$\sup_{\mu \geq 0} \{q(\mu) - P^*(\mu)\}, \quad q(\mu) = \inf_{x \in X} \{f(x) + \mu^\top g(x)\}.$$

P 在负正交锥上为零, 故其共轭在含负分量的 μ 处为 $+\infty$. 惩罚的作用是在原对偶目标 q 上再扣掉一个凸函数 P^* .

命题 7.1 若 $\mu^* \geq 0$ 为一个满足 $q(\mu^*) = f^* \in \mathbb{R}$ 的最优乘子, 且 $\mu^* \in \partial P(0)$, 则惩罚问题的最优值等于 f^* . 对 $P_c(u) = c \sum_j \max\{0, u_j\}$, 条件为 $0 \leq \mu_j^* \leq c$. 若 $c > \|\mu^*\|_\infty$, 则惩罚问题的每个最优解都可行, 因而也是原问题的最优解.

证明. 次梯度不等式给 $P(u) \geq \mu^{*\top} u$. 所以对每个 $x \in X$,

$$f(x) + P(g(x)) \geq f(x) + \mu^{*\top} g(x) \geq q(\mu^*) = f^*.$$

另一方面, 用原问题的可行点逼近 f^* , 惩罚项恒为零, 得到反向值界. 对分段线性惩罚, $\partial P_c(0) = [0, c]^r$. 若 x 有违反约束的分量, 则

$$c \sum_j (g_j(x))_+ - \mu^{*\top} g(x) \geq \sum_{g_j(x) > 0} (c - \mu_j^*) g_j(x) > 0.$$

此时惩罚目标严格大于 f^* , 不可能最优. 这里严格阈值用于排除不可行最优解; 仅用非严格阈值足以保证最优值相等. $\square$

一维共轭计算尤其直观. 对 $c > 0$,

$$(cu_+)^*(\mu) = \begin{cases} 0, & 0 \leq \mu \leq c, \\ +\infty, & \text{其他}, \end{cases} \quad \left(\frac{c}{2}(u_+)^2\right)^*(\mu) = \begin{cases} \mu^2/(2c), & \mu \geq 0, \\ +\infty, & \mu < 0. \end{cases}$$

第一式在一段乘子区间上完全平坦; 第二式只在零处取零. 原第 193 页还画了带线性项的二次惩罚. 为符合负半轴

上惩罚为零的定义, 应取 $P(u) = au_+ + (u_+)^2$, $a \geq 0$, 此时

$$P^*(\mu) = \begin{cases} +\infty, & \mu < 0, \\ 0, & 0 \leq \mu \leq a, \\ (\mu - a)^2/4, & \mu > a. \end{cases}$$

这是在 $u \geq 0$ 上最大化 $(\mu - a)u - u^2$ 所得. 原页印作 $\max\{0, au + u^2\}$, 若按全实轴解释会在 $u < -a$ 处产生正惩罚, 与该页图形和前页定义不相容; 这里明确采用与惩罚定义相容的分段形式. 更一般地, P^* 在 μ^* 取最小值等价于 $0 \in \partial P^*(\mu^*)$, 也等价于 $\mu^* \in \partial P(0)$. 若 P 在零处可微且负半轴上为零, 则 $\partial P(0) = \{0\}$, 无法容纳非零最优乘子. 这解释了精确惩罚常常必然非光滑.

例题 7.4 最小化 $-x$, 约束 $x \leq 0$. 比较 cx_+ 和 $\frac{c}{2}(x_+)^2$ 两种惩罚.

解答. 原最优解为 $x = 0$, 最优乘子为 $\mu^* = 1$. 线性惩罚在 $c > 1$ 时唯一最优于零; 在 $c = 1$ 时所有 $x \geq 0$ 都有目标值零, 因此值的精确性不代表解的精确性. 二次惩罚在 $x > 0$ 上目标为 $-x + cx^2/2$, 导数为 $-1 + cx$, 最优解 $x = 1/c$ 始终违反约束, 目标值为 $-1/(2c)$. 只有令 $c \rightarrow \infty$ 才消除违反量. $\square$

7.3 方向导数与最陡下降

对凸函数 f 及 $x \in \text{dom } f$, 方向导数取单侧极限

$$f'(x; d) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha d) - f(x)}{\alpha}.$$

若 $0 < a < b$, 凸性给 $f(x + \alpha d) \leq (1 - a/b)f(x) + (a/b)f(x + bd)$, 故差商随 α 增大不减, 上述极限存在于扩展实数中. 在 $x \in \text{ri}(\text{dom } f)$ 时, 方向导数是次微分的支撑函数: $f'(x; d) = \sup_{g \in \partial f(x)} g^\top d$. 在边界或域外方向上使用此公式必须另核对适用条件.

对本节的实值凸函数, $\partial f(x)$ 为非空紧凸集. $f'(x; d) < 0$ 意味着沿 d 走足够小的正步长确实降低目标. 与之相反, 任意一个负次梯度方向不一定下降, 因为方向导数取所有次梯度的最大内积.

命题 7.2 设 g^* 为 $\partial f(x)$ 中欧氏范数最小的向量. 若 $g^* \neq 0$, 单位球上的最陡下降方向是 $d^* = -g^*/\|g^*\|$, 并且 $\min_{\|d\| \leq 1} f'(x; d) = -\|g^*\|$. 若 $g^* = 0$, 则 x 是全局最优解.

证明. 投影最优性给 $(g - g^*)^\top g^* \geq 0$ 对所有 $g \in \partial f(x)$ 成立. 因此 $g^\top d^* \leq -\|g^*\|$, 而 $g = g^*$ 达到等号. 对任意单位球内 d , 支撑函数至少为 $g^{*\top} d \geq -\|g^*\|$. 两个方向的界吻合. 若 $0 \in \partial f(x)$, 次梯度不等式给 $f(z) \geq f(x)$ 对所有 z 成立. $\square$

算法中常把未归一化的 $-g^*$ 写作搜索方向, 再用步长吸收范数. 原第 196 页的表述应在这个意义下理解; 它不是单位球约束问题在 $\|g^*\| \neq 1$ 时的原样最优解. 计算最小范数次梯度需要整个次微分, 代价可能很高. 更重要的是, 非光滑点附近活跃次梯度集合可突变; 仅依当前最陡方向和精确线搜索, 不能据此推出全局收敛. 原第 197–198 页的示意例用于强调这个失效机制, 并未给出可复算的函数表达式. 后面改用到最优解的距离作为进展量, 不要求每一步

目标下降.

7.4 一个次梯度的计算

若 $f(x) = \sup_{z \in Z} \phi(x, z)$, 每个 $\phi(\cdot, z)$ 凸, 且 z_x 在 x 达到上确界, 则任取 $g \in \partial_x \phi(x, z_x)$ 都有 $g \in \partial f(x)$. 证明只需把三件事连起来:

$$f(y) \geq \phi(y, z_x) \geq \phi(x, z_x) + g^\top(y - x) = f(x) + g^\top(y - x).$$

因此不必算出整个次微分. 对有限个可微函数的最大值, 可选任何一个活跃分支的梯度.

拉格朗日对偶也是这种结构. 若 x_μ 达到 $q(\mu) = \inf_{x \in X} \{f(x) + \mu^\top g(x)\}$, 则

$$q(\nu) \leq f(x_\mu) + \nu^\top g(x_\mu) = q(\mu) + g(x_\mu)^\top(\nu - \mu).$$

于是 $g(x_\mu)$ 是凹函数 q 的超梯度, $-g(x_\mu)$ 是 $-q$ 的次梯度. 在 $\mu \geq 0$ 上最大化 q 对应迭代 $\mu_{k+1} = [\mu_k + \alpha_k g(x_{\mu_k})]_+$: 违反约束使相应乘子增大, 是计算公式与经济解释相吻合的地方.

7.5 投影次梯度法的距离估计

设 X 非空闭凸, f 凸且在迭代点有次梯度. 投影次梯度迭代为

$$x_{k+1} = P_X(x_k - \alpha_k g_k), \quad g_k \in \partial f(x_k), \quad \alpha_k > 0. \quad (7.2)$$

投影保证可行性, 但不保证目标序列单调. 例如 $f(x) = |x|$ 在零点允许次梯度 $g = 1$, 一步可把最优点移到 $-\alpha$.

先回顾投影的非扩张性. 设 $p = P_X(u)$, $q = P_X(v)$. 投影不等式给 $(u - p)^\top(q - p) \leq 0$ 及 $(v - q)^\top(p - q) \leq 0$. 相加得 $\|p - q\|^2 \leq (p - q)^\top(u - v) \leq \|p - q\|\|u - v\|$, 故 $\|p - q\| \leq \|u - v\|$.

引理 7.3 对迭代(7.2), 任意 $y \in X$ 都有

$$\|x_{k+1} - y\|^2 \leq \|x_k - y\|^2 - 2\alpha_k(f(x_k) - f(y)) + \alpha_k^2\|g_k\|^2.$$

若 $f(x_k) > f(y)$ 且 $0 < \alpha_k < 2(f(x_k) - f(y))/\|g_k\|^2$, 则到 y 的距离严格减小.

证明. 用 $P_X(y) = y$ 与非扩张性, 再展开平方, 得

$$\begin{aligned} \|x_{k+1} - y\|^2 &\leq \|x_k - \alpha_k g_k - y\|^2 \\ &= \|x_k - y\|^2 - 2\alpha_k g_k^\top(x_k - y) + \alpha_k^2\|g_k\|^2. \end{aligned}$$

次梯度不等式给 $g_k^\top(x_k - y) \geq f(x_k) - f(y)$, 代入即得. 严格步长条件使右边的修正量为负. $\square$

定理 7.4 设生成的次梯度满足 $\|g_k\| \leq C$.

1. 若 $\alpha_k = \alpha > 0$, 则当 $f^* = \inf_X f > -\infty$ 时, $\liminf_k f(x_k) \leq f^* + \alpha C^2/2$. 若 $f^* = -\infty$, 则 $\inf_k f(x_k) = -\infty$.
2. 若 $\alpha_k \rightarrow 0$ 且 $\sum_k \alpha_k = \infty$, 则 $\liminf_k f(x_k) = f^*$, 因而历史最好值 $\min_{0 \leq j \leq k} f(x_j)$ 趋于 f^* .

证明. 固定 $y \in X$. 若从某一步开始总有 $f(x_k) - f(y) > \alpha C^2/2 + \delta$, 距离引理使平方距离每步至少减少 $2\alpha\delta$, 不可能永远非负. 故 $\liminf f(x_k) \leq f(y) + \alpha C^2/2$. 对 y 取下确界得到第一项; 当 $f^* = -\infty$ 时可令 $f(y)$ 任意小.

第二项若失败, 可选 $y \in X$ 与 $\delta > 0$ 使从某步起 $f(x_k) - f(y) \geq \delta$. 再取足够大的 k 使 $\alpha_k C^2 \leq \delta$. 距离引理于是给 $\|x_{k+1} - y\|^2 \leq \|x_k - y\|^2 - \alpha_k \delta$. 求和与 $\sum \alpha_k = \infty$ 矛盾. 下界 $f(x_k) \geq f^*$ 完成证明. 这个论证不要求最优解存在. $\square$

如果还要求迭代点本身收敛, 可增加 f 下半连续、最优解存在以及 $\sum_k \alpha_k^2 < \infty$. 距离引理此时给到每个最优点的平方距离仅有可求和的向上误差, 所以该距离有极限, 且序列有界. 由上一定理取得目标值趋于 f^* 的子列, 再取其收敛子列; 下半连续性保证极限最优. 到这个极限点的距离已有极限且子列距离趋零, 故整个序列趋于该最优解. 必须把这个点收敛结论与仅有最好值收敛的较弱结论区分开.

7.6 步长、目标值估计与误差次梯度

常数步长带来固定误差邻域, 递减步长以渐慢的移动换取精度. 若知道 f^* , 可选动态步长

$$\alpha_k = \frac{f(x_k) - f^*}{\|g_k\|^2}$$

并在 $g_k = 0$ 时停止. 距离引理给平方距离至少下降 $(f(x_k) - f^*)^2/\|g_k\|^2$. 用统一界 C^2 替代分母也可保证下降. 实际中常以目标值估计 f_k 替代 f^* ; 估计过低会造成围绕最优集合的振荡, 过高则可能只到达 $f \leq f_k$ 的水平集. 原讲义给的自适应办法是 $f_k = \min_{j \leq k} f(x_j) - \delta_k$, 以是否达到本次目标调整期望下降量 δ_k : 达到时放大, 未达到时缩小但保留一个正下限. 这是一类实现策略, 不能在未给参数条件时把它当作已证明的精确收敛定理.

定义 7.5 对 $\varepsilon \geq 0$, 向量 g 称为 f 在 $x \in \text{dom } f$ 的 ε 次梯度, 若对所有 z 都有 $f(z) \geq f(x) + g^\top(z - x) - \varepsilon$. 全体这样的向量组成 $\partial_\varepsilon f(x)$; 域外该集合为空.

有 $\partial_0 f(x) = \partial f(x)$, $\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2$ 时集合包含关系为 $\partial_{\varepsilon_1} f(x) \subseteq \partial_{\varepsilon_2} f(x)$, 且 $\bigcap_{\varepsilon > 0} \partial_\varepsilon f(x) = \partial f(x)$. 这些关系都直接来自定义的不等式.

若 $\phi(x, z_x) \geq \sup_z \phi(x, z) - \varepsilon$, 任取 $g \in \partial_x \phi(x, z_x)$, 则

$$f(y) \geq \phi(y, z_x) \geq \phi(x, z_x) + g^\top(y - x) \geq f(x) + g^\top(y - x) - \varepsilon.$$

所以近似求解内部最大化就能得到误差可控的次梯度. 对偶算法里, 原子问题不必每次算到完全精确.

以 $g_k \in \partial_{\varepsilon_k} f(x_k)$ 代替精确次梯度, 距离估计变成

$$\|x_{k+1} - y\|^2 \leq \|x_k - y\|^2 - 2\alpha_k(f(x_k) - f(y) - \varepsilon_k) + \alpha_k^2 C^2. \quad (7.3)$$

重复前面的矛盾证明, 常数 α, ε 给 $\liminf f(x_k) \leq f^* + \varepsilon + \alpha C^2/2$; 若 $\alpha_k \rightarrow 0$, $\sum \alpha_k = \infty$, $\varepsilon_k \rightarrow \bar{\varepsilon}$, 则 $\liminf f(x_k) \leq f^* + \bar{\varepsilon}$. 这里所谓“到达误差最优集合”首先是目标最好值的保证, 并不自动意味着所有迭代点最后都留在该集合中.

最后说明误差次梯度与增量方法的联系. 若 $g \in \partial f(\bar{x})$, 则把次梯度不等式改写到 x 得

$$g \in \partial_\varepsilon f(x), \quad \varepsilon = |f(x) - f(\bar{x})| + \|g\| \|x - \bar{x}\|.$$

若 f 在相关区域为 C -Lipschitz 且 $\|g\| \leq C$, 则 $\varepsilon \leq 2C\|x - \bar{x}\|$. 又由定义逐项相加,

$$\partial_{\varepsilon_1} f_1(x) + \cdots + \partial_{\varepsilon_m} f_m(x) \subseteq \partial_{\sum_i \varepsilon_i} \left(\sum_i f_i \right)(x).$$

在一轮增量迭代中, 各分量在彼此接近却不同的点计算次梯度, 因而可在轮起点理解为带小误差的次梯度. 约束投影逐次进行时, 整轮并不严格等于对次梯度和只做一次投影; 严格的整轮距离估计将在增量方法一章给出.

8 多面体近似与内外线性化

本章对应原第 16 讲后半、第 17–18 讲, 原 PDF 第 214–259 页. 切平面、单纯形分解及广义单调规划在本章统一处理. 原第 18 讲所依据的研究论文是 Bertsekas 与 Yu 的 *A Unifying Polyhedral Approximation Framework for Convex Optimization*, SIAM Journal on Optimization 21 (2011), 333–360. 本章给出幻灯片实际包含的算法与收敛结果, 不把混合情形的研究级分析压缩成无条件保证.

8.1 切平面与上下界

次梯度 $g_i \in \partial f(x_i)$ 给全局仿射下界 $\ell_i(x) = f(x_i) + g_i^\top(x - x_i)$. 对 f 取有限个下界的最大值,

$$F_k(x) = \max_{0 \leq i \leq k} \ell_i(x),$$

则 $F_k \leq f$, 且 $F_{k+1} \geq F_k$. 其上图若若干半空间的交集, 包含真正的 $\text{epi } f$, 所以称为外线性化. “外”描述上图的位置, 不是函数值较大.

切平面法从 $x_0 \in X$ 开始, 反复求解

$$x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{x \in X} F_k(x),$$

然后在新点取次梯度加入模型. 若 X 为多面体, 每轮可写成线性规划: 最小化 t , 满足 $x \in X$ 和 $t \geq \ell_i(x)$ 对所有 $i \leq k$ 成立. 原变量维数基本不变, 但约束数逐轮增多.

设 $L_k = F_k(x_{k+1})$ 及 $U_k = \min_{i \leq k} f(x_i)$. 则

$$L_k \leq f^* \leq U_k, \quad L_{k+1} \geq L_k, \quad U_{k+1} \leq U_k. \quad (8.1)$$

因此 $U_k - L_k$ 是可检验的绝对误差证书. 它来自下界模型与实际可行点, 不需知道 f^* .

定理 8.1 设 X 非空闭凸, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 凸, 每轮模型最小值达到. 切平面迭代的每个聚点都是 f 在 X 上的最优解. 更一般地, 对闭真凸 f , 同一结论在所取次梯度沿收敛子列有界时成立, 但须保证所有迭代点及极限点在相关定义域中可用.

证明. 取收敛子列 $x_{k_j} \rightarrow \bar{x}$, 令 $j > h$ 且 $k_j > k_h$. 第 k_h 步加入的平面已在生成 x_{k_j} 的模型中, 所以对每个 $z \in X$,

$$f(x_{k_h}) + g_{k_h}^\top(x_{k_j} - x_{k_h}) \leq F_{k_j-1}(x_{k_j}) \leq f(z).$$

实值凸函数连续, 且次梯度在紧邻域上有界. 令 $h, j \rightarrow \infty$, 混合内积趋零, 得 $f(\bar{x}) \leq f(z)$. 闭性给 $\bar{x} \in X$. 扩展实值版本用下半连续性取下极限; 由有界次梯度和同一不等式保证 $f(\bar{x}) \leq f(z) < \infty$, 从而极限落在有效域内. $\square$

如果 X 有界, 上述条件使序列有聚点, 因而最好值趋于 f^* . 但从一个迭代点的目标值突然变差并不违背定理: 模型在远离采样点处可能非常乐观. 即使 x_0 恰为最优点, 第一张切平面也可能把下一步推向远处. 这是下一章引入近端稳定化的原因.

若 $f = \max_{1 \leq j \leq N} (a_j^\top x + b_j)$ 为有限多面体函数, 并且次梯度计算规则每次选一个活跃的原始斜率 a_j , 则有限终止: 非最优时新点的真实值严格高于当前模型值, 因而必须加入一张尚未包含的活跃平面; 至多加入 N 张. 若任意选择活跃斜率的凸组合, 可产生无限多不同平面, 不能用同一个有限计数证明.

原讲义还给出两个变体. 一是同时用分离超平面对 X 作外近似, 在违反约束时加入约束切面. 二是中心切平面法, 在下界模型与当前上界形成的定位区域

$$\{(x, t) : x \in X, F_k(x) \leq t \leq U_k\}$$

内选较居中的点, 再作查询和切割. 它控制查询点的几何位置, 不再总取下界模型的极小点. 具体的中心定义、删面规则和复杂度必须随具体算法给出.

8.2 单纯形分解

当线性优化比非线性优化便宜, 还可从内部逐渐扩大可行集合. 设 X 是有界多面体, f 可微凸. 初始 $X_0 = \{x_0\} \subseteq X$, 第 k 轮已有 x_k 在 $\text{conv}(X_k)$ 上最优. 先解大型但线性的子问题

$$\tilde{x}_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{x \in X} \nabla f(x_k)^\top (x - x_k),$$

选择一个达到最小值的极点. 加入 $X_{k+1} = X_k \cup \{\tilde{x}_{k+1}\}$, 再求

$$x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{x \in \text{conv}(X_{k+1})} f(x).$$

最后一个问题可用系数变量 α 写成 $\min f(\sum_{v \in X_{k+1}} \alpha_v v)$, 约束 $\alpha_v \geq 0$, $\sum_v \alpha_v = 1$. 原空间即使很大, 有效优化变量数也仅为当前保存的点数.

定理 8.2 在上述条件下, 不删点的单纯形分解法有限次找到最优解.

证明. 记 $d_k = \min_{x \in X} \nabla f(x_k)^\top (x - x_k) \leq 0$, 因 $x_k \in X$. 若 $d_k = 0$, 则可微凸函数的最优性条件说明 x_k 在 X 上最优. 若 $d_k < 0$, 因 x_k 已在 $\text{conv}(X_k)$ 上最优, 对该凸包内每个 x 有 $\nabla f(x_k)^\top (x - x_k) \geq 0$. 所以 $\tilde{x}_{k+1}$ 不属于该凸包, 尤其未存入 X_k . 每个非终止步骤加入一个新极点, 而有界多面体的极点有限, 故最终必须终止. 子问题最小值存在由紧性和连续性保证. $\square$

可用 $-d_k$ 作误差上界, 因对最优解 x^* , 凸性给 $f(x_k) - f^* \leq \nabla f(x_k)^\top (x_k - x^*) \leq -d_k$. 它在不求 f^* 的情况下给停止准则.

原讲义建议丢弃满足 $\nabla f(x_{k+1})^\top (v - x_{k+1}) > 0$ 的旧极点, 因这些点不能以正权重出现在当前最优凸组合中. 这

可减小子问题, 但删点后有限终止的上述计数论证不再直接适用, 不能沿用不删点版的结论. 无界多面体需要处理极射线或人工界; 非多面体集合仍可作线性优化, 但不再有有限极点论证. 非光滑 f 则需下面的原对偶匹配次梯度, 随意选一个次梯度一般不够.

8.3 函数的内线性化及共轭关系

对闭真凸 h 与有限点集 $V = \{v_1, \dots, v_N\} \subseteq \text{dom } h$, 定义内线性化

$$\bar{h}_V(z) = \begin{cases} \min \left\{ \sum_j \alpha_j h(v_j) : \sum_j \alpha_j v_j = z, \sum_j \alpha_j = 1, \alpha_j \geq 0 \right\}, & z \in \text{conv } V, \\ +\infty, & z \notin \text{conv } V. \end{cases} \quad (8.2)$$

其上图是有限条竖直向上射线 $\{(v_j, t) : t \geq h(v_j)\}$ 的凸包. 系数在紧单纯形中, 所以可行时最小值达到. 凸性给 $h \leq \bar{h}_V$, 而在每个采样点 v_j 有等号. 增加点使内模型下降, 同时使其有效域扩大.

对 f 的外模型, 若 $y_j \in \partial f(x_j)$, Fenchel 等式给 $f(x_j) + f^*(y_j) = x_j^\top y_j$, 因而

$$F(x) = \max_j \{x^\top y_j - f^*(y_j)\}.$$

这段表述既说明外模型由斜率决定, 也为下面的对偶关系消除采样点 x_j .


命题 8.3 设 $Y = \{y_1, \dots, y_N\}$ 为上述斜率集合. 则 $F^* = \bar{f}_Y^*$. 反向地, 对任意有限 $V \subseteq \text{dom } h$, 有

$$(\bar{h}_V)^*(y) = \max_{v \in V} \{v^\top y - h(v)\}.$$

证明. 先算第二式. 任一 z 可行表示成 $\sum \alpha_v v$, 所以

$$y^\top z - \sum_v \alpha_v h(v) = \sum_v \alpha_v (y^\top v - h(v)) \leq \max_{v \in V} \{y^\top v - h(v)\}.$$

取 $z = v$ 达到对应项. 对 $h = f^*$ 、 $V = Y$, 第二式右边恰为 F . 内模型为闭真凸多面体函数, 取双共轭即得第一式. 这也证明了“外模型的共轭是内模型”并非仅是图形比喻. $\square$



图中取 $V = \{-1, 0, 1\}$, 外模型 $F(x) = \max\{0, 2x - 1, -2x - 1\}$ 位于抛物线下方, 内模型在 $[-1, 1]$ 上为 $|x|$, 区间外为 $+\infty$. 实线与虚线分别反映上图外包和内包.

8.4 广义单纯形分解与对偶切平面

现在最小化 $f(x) + c(x)$, f, c 闭真凸. 用内线性化 C_k 替代 c , 求 $x_k \in \operatorname{argmin}(f + C_k)$. 在满足次梯度和规则的正则性条件下, 可取

$$g_k \in \partial f(x_k), \quad -g_k \in \partial C_k(x_k).$$

随后求 $\tilde{x}_{k+1}$ 满足 $-g_k \in \partial c(\tilde{x}_{k+1})$, 即

$$\tilde{x}_{k+1} \in \operatorname{argmin}_x \{c(x) + g_k^\top x\},$$

并将此点加入内模型. 若 f 可微, $g_k = \nabla f(x_k)$; 若 f 不可微, 必须选能与内模型最优性相匹配的 g_k . 这就是非光滑版本比“把梯度换成任意次梯度”更细的地方.

对 $c = \delta_X$, 内模型为 $\delta_{\operatorname{conv} V_k}$, 上式变成在 X 上最小化 $g_k^\top x$. 于是经典单纯形分解是其特殊情形. 同时 Fenchel 对偶是

$$\min_y \{f^*(y) + c^*(-y)\}.$$

内模型 C_k 的共轭是 c^* 的外模型; 所以原问题的广义单纯形分解正对应偶问题的切平面精化. 原、对偶计算只要使用同一匹配最优对, 就产生相同的数学迭代信息; 应选较方便求解的一侧实现.

8.5 广义单调规划的对称对偶

令 $x = (x_1, \dots, x_m)$, 各块 $x_i \in \mathbb{R}^{n_i}$, S 为乘积空间中的线性子空间. 广义单调规划, 简称 EMP, 写成

$$\inf_{x \in S} \sum_{i=1}^m f_i(x_i), \quad f_i \text{ 闭、真、凸}. \quad (8.3)$$

若各块是一维, 它包含经典单调规划; 网络环流守恒给一个子空间, 每条弧的凸成本给一个分量. 取 $S = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ 得到 Fenchel 问题. 取 $S = \{(x, \dots, x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ 则得到函数和最小化. 仿射约束 $Ax = b$ 可增加变量 z , 把 $Ax - z = 0$ 纳入子空间, 并加入 $\delta_{\{b\}}(z)$.

引入 $z_i = x_i$ 和乘子 y_i , 得

$$L(x, z, y) = \sum_i (f_i(z_i) + y_i^\top (x_i - z_i)).$$

对 z 取下确界给 $-\sum_i f_i^*(y_i)$. 对 $x \in S$ 取下确界, 当 $y \in S^\perp$ 时为零, 否则为 $-\infty$, 因子空间可沿任意正负方向缩放. 因而对偶的最小化写法是

$$\inf_{y \in S^\perp} \sum_i f_i^*(y_i). \quad (8.4)$$

注意(8.4)的最小值是原拉格朗日对偶最大值的相反数. 强对偶时, 两个最小化问题的最优值相加为零, 不是相等.

命题 8.4 一对有限目标值的可行点 $x \in S$, $y \in S^\perp$ 同时最优且无对偶间隙, 当且仅当 $y_i \in \partial f_i(x_i)$ 对所有 i 成立. 等价条件是 $x_i \in \partial f_i^*(y_i)$.

证明. Fenchel 不等式给每个 $r_i = f_i(x_i) + f_i^*(y_i) - x_i^\top y_i \geq 0$. 正交性给 $\sum_i x_i^\top y_i = 0$, 所以原对偶目标之差是 $\sum_i r_i$. 差为零当且仅当每项为零, 而每项为零等价于共轭次梯度关系. 反向同样由零间隙和弱对偶得到最优性. $\square$

通常可用 $S \cap \text{ri}(\text{dom } f_1 \times \cdots \times \text{dom } f_m) \neq \emptyset$ 作充分条件. 原第 246 页另给更宽的向量和条件: 若原问题可行, 对所有有效可行 x 和 $\varepsilon > 0$, 集合

$$S^\perp + (\partial_\varepsilon f_1(x_1) \times \cdots \times \partial_\varepsilon f_m(x_m))$$

闭, 则零对偶间隙成立. 这里的笛卡尔积等于把各分量嵌入对应块后作向量和; 不应误读为在不同维空间里直接相加. 这项高级对偶定理在本节作为已声明的工具使用, 不用它替代后面的算法证明.

该条件覆盖各 f_i 分别属于以下类别的情形: 在整个空间实值; 多面体; 本质一维; 定义域一维. 为说明原页的术语, 本质一维指 $f_i(x) = h(a^\top x)$, h 为闭真凸一维函数; 定义域一维指 $\text{aff}(\text{dom } f_i)$ 是点或直线. 两种一维情形的误差次微分都由一个闭区间及线性约束描述, 因而为多面体; 实值情形的误差次微分紧. 紧凸集与多面体的和闭, 解释了这些类别为何适用. 定义核对来源为 Bertsekas 的 *Extended Monotropic Programming and Duality*, 2010 年修订稿, 定义 4.1–4.2. 交换原、对偶后, “实值” 可改成 “共轭实值”, 即 co-finite, 但需要相应的对偶可行性.

8.6 混合多面体近似算法

把指标集分成互不相交的三类 E, O, I : 保持精确、外线性化、内线线性化. 对 $i \in O$ 保存有限斜率集 Y_i , 对 $i \in I$ 保存有限点集 V_i . 每轮求近似 EMP 的原对偶最优对 $(\hat{x}, \hat{y})$:

$$\min_{x \in S} \left\{ \sum_{i \in E} f_i(x_i) + \sum_{i \in O} f_{i, Y_i}(x_i) + \sum_{i \in I} \bar{f}_{i, V_i}(x_i) \right\}.$$

然后按分量精化:

1. 对 $i \in O$, 取 $\tilde{y}_i \in \partial f_i(\hat{x}_i)$, 加入 Y_i .
2. 对 $i \in I$, 取 $\tilde{x}_i \in \partial f_i^*(\hat{y}_i)$, 加入 V_i .

第二步等价于求 $f_i(x_i) - \tilde{y}_i^\top x_i$ 的极小点. 算法定义隐含了近似原对偶最优对及这些查询的存在, 应在具体应用中核对; 闭真凸本身不保证任意共轭次梯度都存在.

对偶近似问题把 f_{i, Y_i}^* 变成内模型, 把 $(\bar{f}_{i, V_i})^*$ 变成外模型. 原对偶角色交换不改变点和斜率的精化过程. 与经典每轮只加一张整体切平面不同, 这里一轮可同时精化多个分量; 若分量是一维, 查询很便宜, 并能保留原成本或网络的分离结构. 混合模型既有下界分量又有上界分量, 因此其目标值一般既不是原最优值的下界也不是上界; 不能直接套用(8.1).

命题 8.5 假设每个外线性化分量是实值多面体函数, 每个内线线性化分量的共轭是实值多面体函数, 且每次加入的斜率或点从相应有限多面体表示中选取. 若近似最优对及查询一直存在, 算法有限次得到原问题的最优原对偶对.

证明. 如果某一轮所有查询都未精化模型, 则对外分量, 新查询平面已在模型中, 所以模型在 $\hat{x}_i$ 与 f_i 接触. 近似问题的匹配次梯度 $\hat{y}_i$ 于是也属于 $\partial f_i(\hat{x}_i)$. 对内分量, 在共轭侧作同一论证, 得 $\hat{x}_i \in \partial f_i^*(\hat{y}_i)$. 精确分量本已满足同一关系. 命题 8.4 证明该对原问题最优. 否则至少有一个分量加入新的表示元素, 而总元素数有限, 故不能无限精化. $\square$

命题 8.6 对纯外线性化情形 $I = \emptyset$, 若每个外分量生成的查询次梯度序列有界, 则近似原最优点序列的每个聚点原最优. 对纯内线性化情形 $O = \emptyset$, 若生成的查询点序列有界, 则近似对偶最优点序列的每个聚点对偶最优.

证明. 证明第一项. 对任一有效可行 $x \in S$, 两个先后轮次 $k > \ell$ 的模型最优性给

$$\sum_{i \in E} f_i(\hat{x}_i^k) + \sum_{i \in O} [f_i(\hat{x}_i^\ell) + \tilde{y}_i^{\ell T} (\hat{x}_i^k - \hat{x}_i^\ell)] \leq \sum_i f_i(x_i).$$

沿同一收敛子列取 $k, \ell \rightarrow \infty$, 有界次梯度使所有内积趋零. 每个闭真凸函数有仿射下界, 因此在有界子列上其值有统一下界, 可以对有限和使用下半连续性, 得 $\sum_i f_i(\bar{x}_i) \leq \sum_i f_i(x_i)$. 子空间闭, 故 $\bar{x} \in S$. 第二项交换共轭和子空间, 由内外共轭关系得到. $\square$

这两个结果分别控制原聚点与对偶聚点, 不是混合情形的无条件收敛证明. 原第 258 页明确将一般混合情形的分析交给 Bertsekas–Yu 论文. 在需要混合算法的具体实现时, 应另检查查询有界性、模型精化误差和原对偶可行性, 不能仅以“每轮更多切面”替代这些条件. 近端项也可加入近似问题以稳定迭代, 并把已得的内外模型带入下一轮; 下一章解释这种稳定化为何有用.

9 近端稳定化与增广拉格朗日

本章对应原第 19–20 讲及第 21 讲的广义近端部分, 原 PDF 第 260–284 页. 主线是同一个二次正则化子问题的原问题实现、共轭实现和约束优化实现; bundle 方法则把精确目标换成切平面模型.

9.1 近端子问题的存在与基本恒等式

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 闭、真、凸. 对 $c > 0$ 及任意 $z \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\text{prox}_{cf}(z) = \operatorname{argmin}_x \left\{ f(x) + \frac{1}{2c} \|x - z\|^2 \right\}.$$

闭真凸函数有仿射下界 $f(x) \geq a^T x + b$. 加上正二次项后, 目标下水平集有界, 且目标下半连续, 故最小值达到. 二次项的严格凸性给唯一性. 因此起点即使不在 $\operatorname{dom} f$ 内, 第一步也定义良好并落入有效域. 约束 $x \in X$ 可用 $f + \delta_X$ 吸收, 但需此和函数为真.

近端点法是

$$x_{k+1} = \text{prox}_{c_k f}(x_k), \quad c_k > 0. \quad (9.1)$$

最优性条件为

$$g_{k+1} := \frac{x_k - x_{k+1}}{c_k} \in \partial f(x_{k+1}). \quad (9.2)$$

这是一种隐式次梯度步: 使用新点的次梯度, 不是旧点的次梯度. 隐式性使每步更贵, 也带来稳定性. 若 x_k 已经最优, 则 $0 \in \partial f(x_k)$, 因而 $x_{k+1} = x_k$; 近端点法不会像无稳定化切平面法那样主动离开最优点.

引理 9.1 对任意 $y \in \text{dom } f$, 有

$$\|x_{k+1} - y\|^2 \leq \|x_k - y\|^2 - 2c_k(f(x_{k+1}) - f(y)) - \|x_k - x_{k+1}\|^2. \quad (9.3)$$

若 $x_k \in \text{dom } f$, 还满足

$$f(x_{k+1}) + \frac{1}{2c_k}\|x_{k+1} - x_k\|^2 \leq f(x_k).$$

证明. 由(9.2), $g_{k+1}^\top(x_{k+1} - y) \geq f(x_{k+1}) - f(y)$. 展开 $x_k - y = (x_{k+1} - y) + c_k g_{k+1}$ 的平方, 移项得到第一式. 第二式是用 x_k 作为子问题的比较点. 若 x_k 不是最优点, 子问题唯一极小点不等于 x_k , 此时目标确实严格下降. $\square$

与显式次梯度距离估计相比, 这里没有 $+c_k^2\|g\|^2$ 误差, 反而多了一个负的移动距离项. 不需假设所有次梯度有统一范数界.

9.2 收敛、增长阶与有限终止

定理 9.2 若 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \infty$, 则 $f(x_k) \rightarrow f^* = \inf f$. 若最优集合 X^* 非空, 则 x_k 趋于其中一个点.

证明. 从第一步起目标值单调不减. 将(9.3)求和并删去非正项, 对任意 $y \in \text{dom } f$ 及 $N \geq 1$ 有

$$2 \sum_{k=0}^{N-1} c_k (f(x_{k+1}) - f(y)) \leq \|x_0 - y\|^2.$$

因 $f(x_N) \leq f(x_{k+1})$, 得

$$f(x_N) \leq f(y) + \frac{\|x_0 - y\|^2}{2 \sum_{k=0}^{N-1} c_k}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 再对 y 取下确界, 得值收敛, 也包括 $f^* = -\infty$ 的情形.

若 $x^* \in X^*$, 距离不等式使 $\|x_k - x^*\|$ 单调不减, 故序列有界. 取一个收敛子列, 下半连续性与值收敛保证其极限 $\bar{x} \in X^*$. 到 $\bar{x}$ 的距离同样单调并沿该子列趋零, 所以整个序列趋于 $\bar{x}$. $\square$

参数 c_k 越大, 对离开当前点的二次惩罚越弱, 子问题越接近原目标. 但大 c_k 也可能使子问题数值求解困难. 若目标在最优集合附近有较陡增长, 一个近端步可跨越更多距离.

命题 9.3 设 $X^* \neq \emptyset$, $d(x) = \text{dist}(x, X^*)$. 假设在相关近邻内

$$f(x) - f^* \geq \theta d(x)^p, \quad \theta > 0, \quad p \geq 1.$$

若 x_{k+1} 在该近邻且非最优, 则

$$d(x_k) \geq d(x_{k+1}) + c_k \theta d(x_{k+1})^{p-1}. \quad (9.4)$$

证明. 记 $u = x_{k+1}$, $v = x_k$, $g = (v - u)/c_k$. 取 $z_u = P_{X^*}(u)$, 次梯度不等式与柯西不等式给

$$\theta d(u)^p \leq f(u) - f^* \leq g^\top(u - z_u) \leq \|g\|d(u),$$

故 $\|g\| \geq \theta d(u)^{p-1}$. 再取 $z_v = P_{X^*}(v)$, 展开并用同一次梯度不等式,

$$\begin{aligned} d(v)^2 &= \|u - z_v + c_k g\|^2 \\ &\geq d(u)^2 + 2c_k \theta d(u)^p + c_k^2 \|g\|^2 \\ &\geq (d(u) + c_k \theta d(u)^{p-1})^2. \end{aligned}$$

取非负平方根即得结论. $\square$

当 $p = 2$ 且 $c_k \rightarrow \bar{c} > 0$, 有 $\limsup d(x_{k+1})/d(x_k) \leq 1/(1 + \theta\bar{c}) < 1$, 即线性距离收敛. 当 $1 < p < 2$ 且 $c_k \geq \underline{c} > 0$, 有

$$d(x_{k+1}) \leq \left(\frac{d(x_k)}{\underline{c}\theta} \right)^{1/(p-1)},$$

幂指数大于一, 所以距离收敛超线性. 下界 $\underline{c}$ 在此结论中不能省略; 若 c_k 不断趋零, 正则化可能越来越强.

当 $p = 1$, 非终止步满足 $d(x_k) - d(x_{k+1}) \geq \theta c_k$. 若 $\sum c_k = \infty$, 永远不终止将使非负距离下降到负数, 所以有限终止. 若增长界全局成立且 $c_0 \geq d(x_0)/\theta$, 第一步即最优. 有最优解的多面体凸函数具有相应的线性误差界, 这是原第 265 页有限终止结论的基础.

例题 9.1 对 $f(x) = |x|$, 显式求一个近端步并解释有限终止.

解答. 子问题 $\min_u |u| + (u - x)^2/(2c)$ 的最优性条件是 $0 \in \partial|u| + (u - x)/c$. 在 $u > 0$ 时解为 $u = x - c$, 在 $u < 0$ 时为 $u = x + c$, 在 $u = 0$ 时条件是 $|x| \leq c$. 因而

$$\text{prox}_{c|\cdot|}(x) = \text{sign}(x) \max\{|x| - c, 0\}.$$

非零步使绝对值减少 c , 累计参数之和超过 $|x_0|$ 时便到达零. 此例同时表明参数变化不能在有限终止讨论里被忽略. $\square$

9.3 共轭实现与 Moreau 包络

对二次函数 $r_k(x) = \|x - x_k\|^2/(2c_k)$, 共轭由配方给 $r_k^*(v) = x_k^\top v + (c_k/2)\|v\|^2$. 所以近端子问题的 Fenchel 对偶可写为

$$y_{k+1} = \operatorname{argmin}_y \left\{ f^*(y) - x_k^\top y + \frac{c_k}{2} \|y\|^2 \right\}. \quad (9.5)$$

二次函数处处有限, 保证适用强对偶. 原对偶问题都有唯一解, 并满足

$$y_{k+1} \in \partial f(x_{k+1}), \quad x_{k+1} = x_k - c_k y_{k+1}.$$

因此可以先求共轭侧的子问题, 再重建原点. 选择哪侧只由结构便利决定, 不是另一种不同的近端迭代. 若 c_k 有正下界且 x_k 收敛, 则 $y_{k+1} \rightarrow 0$. 没有参数条件时, 不能仅由 $x_k - x_{k+1} \rightarrow 0$ 就除以可能趋零的 c_k .

定义 Moreau 包络

$$e_c f(z) = \inf_x \left\{ f(x) + \frac{1}{2c} \|x - z\|^2 \right\}, \quad u(z) = \text{prox}_{cf}(z).$$

它把非光滑凸函数变成可微凸函数, 并且 $\nabla e_c f(z) = (z - u(z))/c$. 为说明可微性, 比较在 z 和 $z + h$ 处的最优解, 得

$$\begin{aligned} e_c f(z + h) - e_c f(z) &\leq \frac{1}{c}(z - u(z))^T h + \frac{1}{2c}\|h\|^2, \\ e_c f(z + h) - e_c f(z) &\geq \frac{1}{c}(z - u(z + h))^T h + \frac{1}{2c}\|h\|^2. \end{aligned}$$

近端映射非扩张: 对两点的最优性条件作差, 次梯度单调性给

$$\|u(z) - u(w)\|^2 \leq (u(z) - u(w))^T (z - w).$$

故 $u(z + h) - u(z) = O(\|h\|)$, 上下界的线性主部相同, 余量为 $O(\|h\|^2)$, 得到梯度公式. 同一单调性还给 $\|\nabla e_c f(z) - \nabla e_c f(w)\| \leq \|z - w\|/c$.

包络与 f 有相同最优值和最优集合: 显然 $e_c f(z) \geq f^*$, 最优点达到等号; 反向, 包络最优点的梯度为零, 故 $z = u(z)$ 且 $0 \in \partial f(z)$. 近端步于是也是步长 c_k 的包络梯度步. 原第 278 页由此指出可以在平滑包络上考虑 Newton 或拟 Newton 加速, 但该建议不等于给出它们的无条件收敛结论.

9.4 近端切平面与 bundle 方法

切平面下界 $F_k \leq f$ 与二次稳定项组合成

$$u_k \in \operatorname{argmin}_{x \in X} \left\{ F_k(x) + \frac{1}{2c_k} \|x - y_k\|^2 \right\}.$$

u_k 是查询点, y_k 是近端中心, 两者不必相同. 如果每轮都把中心移到查询点, 就是近端切平面法. 参数很大时稳定作用弱, 又接近普通切平面法; 参数很小时可能过于保守. 存储的切面很多时, 二次子问题也会变贵.

bundle 方法保留一个稳定中心, 用真实下降检验决定是否移动. 假设中心已被查询且 $F_k(y_k) = f(y_k)$, 定义预测下降

$$\delta_k = f(y_k) - \left(F_k(u_k) + \frac{1}{2c_k} \|u_k - y_k\|^2 \right) \geq 0. \quad (9.6)$$

取固定 $\beta \in (0, 1)$. 若 $f(y_k) - f(u_k) \geq \beta \delta_k$, 令 $y_{k+1} = u_k$, 称实步. 否则中心不动, 称空步. 两种情形都在 u_k 求次梯度并加入新切面. 空步虽然没有接受查询点, 却修正了过度乐观的模型.

当 $\delta_k = 0$, 强凸性使 $u_k = y_k$. 此时 y_k 最小化模型加稳定项, 稳定项在中心梯度为零; 因模型与 f 相切, 其最优性条件也是原问题的最优性条件. 所以零预测下降可以作精确停止证书.

定理 9.4 为给出可完整证明的基本版本, 设 $X = \mathbb{R}^n$, f 实值凸, 初始水平集 $\{x : f(x) \leq f(y_0)\}$ 紧, $c_k = c > 0$, 始终保留全部切面. 则上述 bundle 法的中心目标值趋于 f^* , 中心的每个聚点最优.

证明. 中心目标值单调不减, 因而中心留在紧水平集内. 记 $s_k = (y_k - u_k)/c \in \partial F_k(u_k)$. 强凸性给

$$\delta_k \geq \frac{\|u_k - y_k\|^2}{2c}.$$

对任意 z , 模型次梯度不等式给

$$f(z) \geq F_k(u_k) + s_k^T (z - u_k) = f(y_k) + s_k^T (z - y_k) - \varepsilon_k,$$

其中 $\varepsilon_k = \delta_k - \|u_k - y_k\|^2/(2c) \in [0, \delta_k]$. 故 s_k 是中心处的 ε_k 次梯度, 并有 $\|s_k\| \leq \sqrt{2\delta_k/c}$.

若有无限多个实步, 中心目标的总下降有限, 而每个实步下降至少 $\beta\delta_k$, 所以实步上的 $\delta_k \rightarrow 0$. 用任一最优点 $z = x^*$ 代入上式, 中心有界使内积趋零, 从而实步前的中心目标趋于 f^* . 单调性使所有中心目标也趋于 f^* .

若只有有限多个实步, 从某一步起中心固定为 y . 写 $Q_k = F_k + \|\cdot - y\|^2/(2c)$, $q_k = Q_k(u_k)$. 模型单调增加, 故 q_k 不减且不超过 $f(y)$. 一张固定旧切面与二次项给统一的强制有界下水平集, 所以查询点有界, 在这些点的次梯度也有界. 强凸性给

$$q_{k+1} - q_k \geq \frac{1}{2c} \|u_{k+1} - u_k\|^2,$$

故相邻查询点之差趋零. 新切面在 u_k 接触 f , 所以

$$q_{k+1} \geq f(u_k) + g_k^\top(u_{k+1} - u_k) + \frac{1}{2c} \|u_{k+1} - y\|^2.$$

与 $q_k = F_k(u_k) + \|u_k - y\|^2/(2c)$ 相减, 得模型误差 $f(u_k) - F_k(u_k) \rightarrow 0$. 但空步检验说明

$$f(u_k) - F_k(u_k) > (1 - \beta)\delta_k + \frac{1}{2c} \|u_k - y\|^2.$$

所以 $\delta_k \rightarrow 0$, 再用上述误差次梯度不等式得到 $f(z) \geq f(y)$ 对所有 z , 即固定中心已经最优. 两种情形均完成值收敛, 聚点最优由连续性得到. $\square$

实用 bundle 算法常聚合旧切面、调整参数或设置允许误差. 它们应保留足够的模型信息, 需要各自的分析; 原讲义的通式不意味着任意删面、任意参数更新仍满足本定理.

9.5 增广拉格朗日作为对偶近端法

考虑凸等式问题 $\min\{f(x) : x \in X, Ex = d\}$. 定义扰动值函数

$$p(u) = \inf\{f(x) : x \in X, Ex - d = u\}, \quad q(\mu) = \inf_{x \in X} \{f(x) + \mu^\top(Ex - d)\} = -p^*(-\mu).$$

假设 p 闭、真、凸, 对偶最优乘子存在, 所需子问题下确界达到. 在凹对偶目标上作近端最大化,

$$\mu_{k+1} = \arg \max_{\mu} \left\{ q(\mu) - \frac{1}{2c_k} \|\mu - \mu_k\|^2 \right\},$$

其共轭实现是在扰动变量上最小化 $p(u) + \mu_k^\top u + (c_k/2)\|u\|^2$, 然后令 $\mu_{k+1} = \mu_k + c_k u_{k+1}$. 代入 p 的定义可实现为

$$x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{x \in X} \left\{ f(x) + \mu_k^\top(Ex - d) + \frac{c_k}{2} \|Ex - d\|^2 \right\}, \quad (9.7)$$

$$\mu_{k+1} = \mu_k + c_k(Ex_{k+1} - d).$$

花括号中的函数是增广拉格朗日函数. 普通二次惩罚只加最后一项; 增广拉格朗日还不断校正线性乘子, 因而不必单靠让惩罚参数趋于无穷来消除违反量.

验证其对偶近端身份也可直接用最优性. 设 $u_{k+1} = Ex_{k+1} - d$. 扰动子问题的最优性给 $-\mu_k - c_k u_{k+1} \in \partial p(u_{k+1})$. 令 $\mu_{k+1} = \mu_k + c_k u_{k+1}$, 共轭次梯度关系表明 x_{k+1} 最小化普通拉格朗日函数 $L(x, \mu_{k+1})$, 并且 u_{k+1} 为 q 在新乘子处的超梯度. 因而 $u_{k+1} = (\mu_{k+1} - \mu_k)/c_k$ 正好满足对偶近端最优性.

若 $\sum c_k = \infty$, 对 $-q$ 应用定理 9.2, 乘子趋于一个对偶最优解. 若还满足 $c_k \geq \underline{c} > 0$, 则残差 $Ex_{k+1} - d \rightarrow 0$. 由

$$q(\mu_{k+1}) = f(x_{k+1}) + \mu_{k+1}^\top (Ex_{k+1} - d)$$

得 $f(x_{k+1}) \rightarrow f^*$. 若原点序列有聚点且 X 闭、 f 下半连续, 该聚点原最优. 乘子收敛与原变量有界性是不同事项, 不能把后者省略.

对切平面模型 $F_k + \delta_X$ 同样可作原或共轭侧的近端子问题. 不受约束时, F_k^* 正是共轭目标的内线性化; 有约束时还涉及与 δ_X 的共轭卷积, 不能机械把它当作单纯的有限点凸包. 在完整 Fenchel 模型中两种实现仍等价. 若只在通过进展检验后移动中心, 对应外模型的 bundle 与共轭内模型的 bundle 两种表达.

9.6 广义正则化与上界最小化

广义近端迭代写成 $x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_x \{f(x) + D_k(x, x_k)\}$. 这里不再有二次项自动保证存在性, 必须另假设子问题达到最小值. 若 $D_k(x, x_k) \geq D_k(x_k, x_k)$, 则比较点 x_k 给

$$f(x_{k+1}) \leq f(x_{k+1}) + D_k(x_{k+1}, x_k) - D_k(x_k, x_k) \leq f(x_k).$$

若 f 凸, $D_k(\cdot, x_k)$ 凸且在 x_k 可微, 两者满足相对内部相交条件, 则算法在 x_k 停住意味着 x_k 最优: 正则项在其极小点 x_k 梯度为零, 和函数的最优性于是给 $0 \in \partial f(x_k)$. 这些条件也保证非最优点的严格目标改善. 对非凸 f , 这种全局最优结论一般失效, 不能只凭下降性声称收敛到全局极小点.

Bregman 正则化取 $D_k(x, y) = [\phi(x) - \phi(y) - \nabla \phi(y)^\top (x - y)]/c_k$, 在 ϕ 可微的区域使用. 凸性使其非负并在 $x = y$ 为零; 它不一定对称, 也不一定满足三角不等式. 熵与镜像下降将在后一章计算.

上界最小化, 即 MM 方法, 则构造 $M_k(x, y) \geq f(x)$ 及 $M_k(y, y) = f(y)$, 令 $x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_x M_k(x, x_k)$. 比较得到 $f(x_{k+1}) \leq M_k(x_{k+1}, x_k) \leq f(x_k)$. 若要写成 $f + D$ 形式, 应令 $D_k(x, y) = M_k(x, y) - f(x)$, 而不是把上界值减去一个只依赖 y 的常数后再次加到 f 上. 原第 284 页有关 MM 的两种通式没有保持这一对应, 本稿采用与上界最小化定义一致的写法.

例题 9.2 对 $f(x) = R(x) + \|Ax - b\|^2$, 其中 R 闭真凸, 构造一个容易求解的 MM 上界.

解答. 取 $\tau \geq \|A\|^2$ 并且 $\tau > 0$, 令

$$M(x, y) = R(x) + \|Ax - b\|^2 - \|A(x - y)\|^2 + \tau \|x - y\|^2.$$

最后两项之和非负, 故 $M(x, y) \geq f(x)$ 且 $M(y, y) = f(y)$. 展开平方后,

$$M(x, y) = R(x) + \|Ay - b\|^2 + 2(Ay - b)^\top A(x - y) + \tau \|x - y\|^2.$$

因此最小化 M 等价于计算 R 的近端映射, 中心为 $y - A^\top(Ay - b)/\tau$, 参数为 $1/(2\tau)$. 原页写的系数一对应 $\|A\| \leq 1$ 的情形; 不核对谱范数便不能保证它是上界. EM 是统计模型中另一类上界最小化方法, 原页只提名称, 并未给特定似然模型, 本章不据此捏造一个通用的全局收敛定理. $\square$

10 内点障碍与增量方法

本章对应原第 21 讲内点部分与第 22 讲, 原 PDF 第 285–300 页, 并接续第 16 讲第 212–213 页的增量方法引入. 障碍法从严格可行区域逼近边界最优点, 增量法则利用目标的巨大分量和结构; 两者处理的是不同的计算困难.

10.1 障碍法及其极限

设 $f, g_1, \dots, g_r$ 为连续凸函数, 可行集 $C = \{x : g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, r\}$, 严格可行集 $S = \{x : g_j(x) < 0, j = 1, \dots, r\}$ 非空. 在 S 上取连续障碍函数 B , 要求当点从内部趋于边界时 $B \rightarrow +\infty$. 常用的是

$$B(x) = -\sum_{j=1}^r \ln(-g_j(x)), \quad B(x) = -\sum_{j=1}^r \frac{1}{g_j(x)}.$$

这些函数都使靠近约束边界变得昂贵. 与违反约束后再处罚的惩罚法不同, 障碍函数只在严格可行区使用.

取 $\varepsilon_k > 0, \varepsilon_k \downarrow 0$, 每轮求

$$x_k \in \operatorname{argmin}_{x \in S} \{f(x) + \varepsilon_k B(x)\}.$$

子问题最小值达到仍需假设, 例如需要相应有界下水平集; 障碍阻止接近有限边界, 并不自动阻止逃向无穷远.

定理 10.1 在上述条件下, 障碍法所生成序列的每个聚点都是原约束问题的最优解.

证明. 取 $x_{k_j} \rightarrow \bar{x}$. 因 C 闭, $\bar{x} \in C$. 若它不是最优, 则有 $z \in C$ 满足 $f(z) < f(\bar{x})$. 取一个严格可行点 s , 对充分小的 $t > 0$, $\tilde{z} = (1-t)z + ts$ 严格可行: 凸性给 $g_i(\tilde{z}) \leq (1-t)g_i(z) + tg_i(s) < 0$. 连续性还给 $f(\tilde{z}) < f(\bar{x})$. 子问题最优性于是给

$$f(x_{k_j}) + \varepsilon_{k_j} B(x_{k_j}) \leq f(\tilde{z}) + \varepsilon_{k_j} B(\tilde{z}).$$

若 $\bar{x} \in S$, 障碍值连续, 故左边附加项趋零. 若 $\bar{x} \in \partial S$, 障碍值趋于 $+\infty$, 故该附加项下极限非负. 两种情形都推出 $f(\bar{x}) \leq f(\tilde{z})$, 矛盾. $\square$

严格可行性在证明中有明确作用: 保证每个较优可行点都能由严格可行点逼近. 缺少这种可逼近性时, 不能沿用这段证明.

例题 10.1 最小化 $\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, 约束 $x_1 \geq 2$, 用对数障碍求近似解并考察病态性.

解答. 原最优解是 $(2, 0)$. 子问题为

$$\min_{x_1 > 2, x_2} \left\{ \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) - \varepsilon \ln(x_1 - 2) \right\}.$$

驻点条件给 $x_2 = 0$ 及 $x_1 - \varepsilon/(x_1 - 2) = 0$, 所以 $x_1 = 1 + \sqrt{1 + \varepsilon}$, 另一根不在严格可行区. 随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋于 2. 子问题在该点的 Hessian 为

$$\operatorname{diag} \left(1 + \frac{\varepsilon}{(x_1 - 2)^2}, 1 \right).$$

因为 $x_1 - 2 = \varepsilon/(\sqrt{1+\varepsilon} + 1) \sim \varepsilon/2$, 第一特征值约为 $4/\varepsilon$, 而第二个恒为 1. 越接近边界, 条件数越差, 说明简单固定步长梯度法会困难, 应用 Newton 方向和保持严格可行的线搜索. $\square$

若 f, g_j 可微, 对数障碍子问题的驻点可写成

$$\nabla f(x_\varepsilon) + \sum_j \mu_j \nabla g_j(x_\varepsilon) = 0, \quad \mu_j = \frac{\varepsilon}{-g_j(x_\varepsilon)} > 0.$$

于是 $\mu_j g_j(x_\varepsilon) = -\varepsilon$, 是互补松弛的平滑近似. 在凸问题的其他可行条件成立时, 这些乘子给对偶可行解, 原对偶间隙不超过 $r\varepsilon$. 这解释了沿中心路径降低障碍参数为何具有可检验的精度含义.

10.2 锥的对数障碍

二阶锥 $\mathcal{Q}_d$ 的内部写成 $t > \|u\|$. 标准障碍为

$$B(u, t) = -\ln(t^2 - \|u\|^2), \quad t > \|u\|.$$

定义域必须指定正分支; 仅写 $t^2 > \|u\|^2$ 会错误地包含 $t < 0$ 的另一支. 对 $\text{SOCPmin}\{c^\top x : A_i x - b_i \in \mathcal{Q}_{d_i}\}$, 近似问题是

$$\min_x \left\{ c^\top x + \varepsilon \sum_i B_i(A_i x - b_i) \right\}, \quad A_i x - b_i \in \text{int } \mathcal{Q}_{d_i}.$$

Newton 方向利用障碍的 Hessian, 线搜索必须让所有锥残差保持在内部.

半正定锥的障碍是 $-\ln \det Z$, 定义在 $Z \succ 0$. 对对偶 SDP

$$\max_{\mu} b^\top \mu \quad \text{满足} \quad Z(\mu) = D - \sum_i \mu_i A_i \succeq 0,$$

障碍问题为最大化 $b^\top \mu + \varepsilon \ln \det Z(\mu)$, 限制 $Z(\mu) \succ 0$. 其导数是 $b_i - \varepsilon \text{tr}(Z^{-1} A_i)$. 在驻点令 $X_\varepsilon = \varepsilon Z^{-1} \succ 0$, 则 $\langle A_i, X_\varepsilon \rangle = b_i$, 因而得到一个原可行矩阵. 同时

$$X_\varepsilon Z = \varepsilon I, \quad \langle D, X_\varepsilon \rangle - b^\top \mu = \langle Z, X_\varepsilon \rangle = n\varepsilon.$$

这既是矩阵互补条件的近似, 也是直接的原对偶误差证书. 原讲义在第 288 页提到内点复杂度分析, 未陈述自协调障碍或完整复杂度定理; 本章不把仅有这些障碍公式当成已经证明多项式复杂度.

10.3 大规模分量和与极限环

设 $f(x) = \sum_{i=1}^m f_i(x)$, m 很大. 分量可代表每个数据样本的损失、分离对偶成本或情景成本. 例如最小二乘和 ℓ_1 正则化,

$$\lambda \|x\|_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (c_i^\top x - d_i)^2,$$

其中 $\|x\|_1 = \sum_j |x_j|$. 随机规划中的期望 $\mathbb{E}[F(x, \omega)]$ 也可用样本分量近似, 或逐次查询随机分量. 两阶段模型 $F_1(x) + \mathbb{E}_\omega[\inf_y F_2(x, y, \omega)]$ 先选择 x , 待情景 ω 出现后再优化补救变量 y ; 若相应联合模型凸且部分最小化有效, 情景成本同样提供凸分量. 多约束问题和分布式优化也可把不同约束或节点的信息组织成逐次更新.

全梯度或全次梯度需要遍历所有分量. 增量法每次只处理 i_k :

$$x_{k+1} = P_X(x_k - \alpha_k g_{i_k}(x_k)), \quad g_i(x) \in \partial f_i(x).$$

一个由 m 次分量更新组成的轮次, 工作量与一次全次梯度近似相当, 却在中间不断更新点的位置. 这可能显著提升实际效果, 但固定步长一般产生极限环.

例题 10.2 依次对 $f_1(x) = \frac{1}{2}(1-x)^2$ 和 $f_2(x) = \frac{1}{2}(1+x)^2$ 作增量梯度步, 使用固定 $\alpha \in (0, 2)$.

解答. 从轮起点 a 出发, 第一步为 $u = (1-\alpha)a + \alpha$, 第二步为 $v = (1-\alpha)u - \alpha = (1-\alpha)^2 a - \alpha^2$. 因 $(1-\alpha)^2 < 1$, 轮起点趋于 $a_* = -\alpha/(2-\alpha)$, 中间点趋于 $u_* = \alpha/(2-\alpha)$. 原总目标是 $1+x^2$, 唯一最优点为零; 两点极限环的振幅随步长趋零而趋零, 固定步长却不会消失. $\square$

例题 10.3 对 $|1-x| + |1+x| + |x|$ 按三个分量的顺序更新. 取 $0 < \alpha < 1/2$, 轮起点 $a \in (0, \alpha)$. 展示固定步长极限环对起点的依赖.

解答. 这一轮依次得到 $a+\alpha, a, a-\alpha$. 下一轮从 $a-\alpha < 0$ 出发依次得到 $a, a-\alpha, a$. 因而轮末点在 a 和 $a-\alpha$ 间交替, 振荡位置取决于 a . 总目标在 $[-1, 1]$ 上为 $2+|x|$, 最优点仍为零. 此处无需虚构非唯一最优集合来解释振荡. $\square$

10.4 循环次序的整轮估计

为把原讲义的“有界次梯度”写成可核对的充分条件, 假设各 f_i 在所有相关点之间为 C -Lipschitz, 所用次梯度范数不超过 C . 若 X 紧且函数在其开邻域实值凸, 这类统一界通常成立. 一轮从 x_k 开始, 以同一个步长 α_k 依次作

$$\psi_0 = x_k, \quad \psi_i = P_X(\psi_{i-1} - \alpha_k g_i(\psi_{i-1})), \quad x_{k+1} = \psi_m.$$

本节下标 k 计整轮, 与前节计单次分量更新的下标不同.

引理 10.2 对任意 $y \in X$, 有

$$\|x_{k+1} - y\|^2 \leq \|x_k - y\|^2 - 2\alpha_k(f(x_k) - f(y)) + \alpha_k^2 m^2 C^2.$$

证明. 非扩张性给 $\|\psi_i - \psi_{i-1}\| \leq \alpha_k C$, 所以 $\|\psi_{i-1} - x_k\| \leq (i-1)\alpha_k C$. 每步次梯度距离估计求和, 再用

$$f_i(\psi_{i-1}) \geq f_i(x_k) - C\|\psi_{i-1} - x_k\| \geq f_i(x_k) - (i-1)\alpha_k C^2,$$

得到误差 $\alpha_k^2 C^2 [m + 2 \sum_{i=1}^m (i-1)] = \alpha_k^2 m^2 C^2$. $\square$

由与次梯度法同样的距离矛盾论证, 固定步长给 $\liminf_k f(x_k) \leq f^* + \alpha m^2 C^2 / 2$. 若 $\alpha_k \rightarrow 0, \sum \alpha_k = \infty$, 则轮末历史最好值趋于 f^* . 若还有最优解存在、下半连续性和 $\sum \alpha_k^2 < \infty$, 则轮末点趋于一个最优点; 轮内距离至多 $mC\alpha_k \rightarrow 0$, 所以所有分量迭代点同样收敛. 逐轮投影与“先加全部次梯度再投影”并不相同, 但整轮距离估计把两者的差异控制在二阶步长误差内.

10.5 独立随机次序与概率保证

若每步 i_k 独立于过去, 在 $\{1, \dots, m\}$ 中均匀抽取, 则在当前信息 $\mathcal{F}_k$ 条件下,

$$\mathbb{E}[\|x_{k+1} - y\|^2 \mid \mathcal{F}_k] \leq \|x_k - y\|^2 - \frac{2\alpha_k}{m}(f(x_k) - f(y)) + \alpha_k^2 C^2. \quad (10.1)$$

这由对每个分量的距离估计取条件平均得到. 与循环整轮误差 $m^2 C^2$ 相比, 随机单步的误差只有 C^2 , 但目标下降项也除以 m .

命题 10.3 在上述统一有界和 Lipschitz 条件下, 固定步长 α 满足

$$\liminf_k f(x_k) \leq f^* + \frac{\alpha m C^2}{2} \quad \text{几乎必然.}$$

若 $\alpha_k \rightarrow 0$ 且 $\sum \alpha_k = \infty$, 则 $\liminf_k f(x_k) = f^*$ 几乎必然.

证明. 固定 $y \in X$ 与 $\delta > 0$. 固定步长时, 在 $f(x_k) > f(y) + \alpha m C^2/2 + \delta$ 的区域, 条件期望中的平方距离每步至少减少 $2\alpha\delta/m$. 停在第一次进入该水平集的时刻, 对停止后的非负距离取期望并逐步求和. 若永远不进入有正概率, 该求和中的期望累计减少将无穷大, 与初始有限距离矛盾. 从任意确定时刻重新应用同一论证, 得每个尾部都进入该水平集, 即下极限不超过这个阈值. 对可数个逼近 f^* 的 y 和趋零的 δ 取交集, 得第一项.

递减步长时, 取足够晚的起点使 $\alpha_k C^2 \leq \delta/m$. 在 $f(x_k) > f(y) + \delta$ 区域, 条件漂移不超过 $-\alpha_k \delta/m$. 由于 $\sum \alpha_k = \infty$, 同样的停止求和论证保证每个尾部都进入这个水平集. 令 $\delta \downarrow 0$ 并用可数逼近点, 得第二项. $\square$

如果要求点序列几乎必然收敛, 可再加 $\sum \alpha_k^2 < \infty$ 及最优解存在, 用带可求和误差的非负超鞅收敛定理获得到最优集合的距离收敛. 本命题没有把下极限保证误称为每次目标都收敛. 每轮开始随机打乱全部分量的顺序, 即不放回随机重排, 在实践中也常用; 它与这里的独立有放回抽样不同, 不能直接以(10.1)逐步条件平均.

10.6 增量近端与次梯度的组合

对 f_i 的约束近端步 $z = \operatorname{argmin}_{x \in X} \{f_i(x) + \|x - v\|^2/(2\alpha)\}$, 在次梯度和规则适用时, 有 $g \in \partial f_i(z)$ 使

$$z = P_X(v - \alpha g).$$

因为最优性条件是 $v - z - \alpha g \in N_X(z)$, 恰为投影条件. 这是新点次梯度的隐式更新; 对只有扩展实值定义的函数, 必须核对相对内部等条件以保证可拆出这样的 g .

设 $F_i = f_i + h_i$, 总目标 $F = \sum_i F_i$. 可对较容易的 f_i 用近端, 对其他 h_i 用显式次梯度:

$$z_k \in \operatorname{argmin}_{x \in X} \left\{ f_{i_k}(x) + \frac{1}{2\alpha_k} \|x - x_k\|^2 \right\}, \quad x_{k+1} = P_X(z_k - \alpha_k h'_{i_k}(z_k)).$$

也可以调换次序或把近端步先放在整个空间上, 但相应的可行性和误差分析需重新检查.

为把原第 298 页的“小常数”明确化, 假设 f_i, h_i 都在相关区域为 C -Lipschitz, 所用隐式和显式次梯度均有界于 C , 并满足上述近端拆分条件. 近端距离估计加上次梯度距离估计, 再把 $F_i(z_k)$ 比较到 $F_i(x_k)$, 得单步界

$$\|x_{k+1} - y\|^2 \leq \|x_k - y\|^2 - 2\alpha_k(F_{i_k}(x_k) - F_{i_k}(y)) + 5\alpha_k^2 C^2.$$

其中 $\|z_k - x_k\| \leq \alpha_k C$, 所以替换两个函数值至多引入 $4\alpha_k^2 C^2$, 显式步另有 $\alpha_k^2 C^2$. 每个完整分量步移动至多 $2\alpha_k C$. 循环一轮, 再比较到轮起点, 误差上界是

$$[5m + 8 \sum_{i=1}^m (i-1)] \alpha_k^2 C^2 = (4m^2 + m) \alpha_k^2 C^2 \leq 5m^2 \alpha_k^2 C^2.$$

因此原讲义的统一写法 $\beta \alpha_k^2 m^2 C^2$ 可在这些明确充分条件下取 $\beta = 5$. 固定步长的循环值界为 $F^* + 5\alpha m^2 C^2/2$, 独立均匀抽样的几乎必然下极限界为 $F^* + 5\alpha m C^2/2$. 递减步长时二阶误差消失, 得到与前面相同的最好值收敛结论. 这些数值常数是本稿为补齐论证给出的保守界, 不是原作者宣称的最佳常数.

例题 10.4 对 $\lambda \|x\|_1 + \frac{1}{2} \sum_i (c_i^\top x - d_i)^2$, 给出两个可直接实现的分量近端公式.

解答. 一维绝对值近端公式逐坐标应用, 给

$$\text{prox}_{\alpha \lambda \|\cdot\|_1}(v)_j = \text{sign}(v_j) \max\{|v_j| - \alpha \lambda, 0\}.$$

因此小坐标直接被置零. 对 $q_i(x) = \frac{1}{2}(c_i^\top x - d_i)^2$, 近端最优性是 $z - v + \alpha c_i(c_i^\top z - d_i) = 0$. 左乘 $c_i^\top$ 先解标量残差, 得

$$c_i^\top z - d_i = \frac{c_i^\top v - d_i}{1 + \alpha \|c_i\|^2}, \quad z = v - \frac{\alpha(c_i^\top v - d_i)}{1 + \alpha \|c_i\|^2} c_i.$$

若将正则项均摊到 m 个分量, 每个分量应使用 λ/m 而不是 λ ; 或将它作为独立的第 $m+1$ 个分量每轮处理一次. 两种组织都保持原目标, 反复对每个样本施加完整 λ 却会把正则化强度乘上 m . $\square$

11 一阶复杂度、复合近端与镜像下降

本章对应原第 23–24 讲, 原 PDF 第 301–316 页, 并接续第 21 讲的 Bregman 正则化. 用统一的距离或势函数估计比较非光滑、光滑与加速算法, 最后计算熵近端及乘法更新. 复杂度所计的一步必须指明所需查询; 一个难解近端子问题不能视作与一次廉价次梯度计算成本相同.

11.1 从渐近收敛到迭代次数

设最优点 x^* 存在, 记 $R = \|x_0 - x^*\|$. 对次梯度法使用固定步长 α 及 $\|g_k\| \leq G$, 距离估计求和给

$$2\alpha \sum_{k=0}^{N-1} (f(x_k) - f^*) \leq R^2 + N\alpha^2 G^2.$$

因最小值不大于平均值,

$$\min_{0 \leq k < N} f(x_k) - f^* \leq \frac{R^2}{2\alpha N} + \frac{\alpha G^2}{2}. \quad (11.1)$$

若预先给定次数 N , 取 $\alpha = R/(G\sqrt{N})$ 得到误差至多 $RG/\sqrt{N}$. 若要求误差 ε , 可取 $\alpha = \varepsilon/G^2$, 再令 $N \geq R^2 G^2 / \varepsilon^2$. 因而有 $O(\varepsilon^{-2})$ 的迭代次数上界. 这里输出的是历史最好点, 或用凸性输出平均点, 不是自动把最后点当作最好点.

参数 R, G 若只知上界, 可用相应上界选步长; 若未知, 需要自适应或阶段式策略, 不应把依赖未知最优点的公式直接当作可无条件实现的程序.

11.2 光滑性、投影与二次模型

设 f 凸可微, 梯度在包含所用线段的凸区域内满足 $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$. 令 $\omega(z; x) = f(x) + \nabla f(x)^\top(z - x)$. 沿线段积分,

$$\begin{aligned} f(z) - \omega(z; x) &= \int_0^1 [\nabla f(x + t(z - x)) - \nabla f(x)]^\top(z - x) dt \\ &\leq \int_0^1 Lt\|z - x\|^2 dt = \frac{L}{2}\|z - x\|^2. \end{aligned}$$

凸性给另一侧 $f(z) \geq \omega(z; x)$. 所以 f 被切平面与一个二次上界夹住.

梯度投影步

$$u = P_X(x - \alpha \nabla f(x)) = \operatorname{argmin}_{z \in X} \left\{ \omega(z; x) + \frac{1}{2\alpha}\|z - x\|^2 \right\}$$

是对目标作线性化后的近端步. 投影最优性给 $\nabla f(x)^\top(u - x) \leq -\|u - x\|^2/\alpha$, 因而

$$f(u) \leq f(x) - \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{L}{2} \right) \|u - x\|^2.$$

所以 $0 < \alpha < 2/L$ 保证非零步的严格下降. 不过下一项简洁复杂度估计使用更保守的 $\alpha \leq 1/L$.

二次模型的强凸性对所有 $z \in X$ 给

$$\omega(u; x) + \frac{1}{2\alpha}\|u - x\|^2 \leq \omega(z; x) + \frac{1}{2\alpha}\|z - x\|^2 - \frac{1}{2\alpha}\|z - u\|^2.$$

结合光滑上界和凸性下界, 得到核心比较式

$$f(u) - f(z) \leq \frac{\|x - z\|^2 - \|u - z\|^2}{2\alpha} - \left(\frac{1}{2\alpha} - \frac{L}{2} \right) \|u - x\|^2. \quad (11.2)$$

它比只证明 $f(u) \leq f(x)$ 更强, 因为直接把目标误差与到任意比较点的距离变化相连.

定理 11.1 设 X 非空闭凸, 最优解存在, 取 $\alpha = 1/L$. 梯度投影法满足对所有 $N \geq 1$,

$$f(x_N) - f^* \leq \frac{L \operatorname{dist}(x_0, X^*)^2}{2N}.$$

证明. 在(11.2)取 $z = x^*$, 对 $k = 0, \dots, N-1$ 求和, 距离项望远镜消去, 得 $\sum_{k=0}^{N-1} (f(x_{k+1}) - f^*) \leq L\|x_0 - x^*\|^2/2$. 目标值单调, 每项至少为 $f(x_N) - f^*$, 再对 x^* 取最近最优优点即得. $\square$

于是光滑性把 $O(\varepsilon^{-2})$ 改善到 $O(\varepsilon^{-1})$. 若 L 未知, 可从试探步长出发, 按固定因子缩小直到 $f(u) \leq \omega(u; x) + \|u - x\|^2/(2\alpha)$. 该检验直接验证本次二次上界, 足以使用同一比较式. 在有统一 Lipschitz 常数且试探规则给已接受步长正下界时, 同阶复杂度仍成立.

11.3 复合目标的梯度近端法

设 $H = f + g + \delta_X$, 其中 f 光滑凸, g 闭真凸, X 闭凸, 和函数为真. 保留易处理但可能不可微的 g , 只线性化 f :

$$u = \operatorname{argmin}_{z \in X} \left\{ \omega(z; x) + g(z) + \frac{1}{2\alpha}\|z - x\|^2 \right\}. \quad (11.3)$$

配方给等价实现: 先 $v = x - \alpha \nabla f(x)$, 再 $u = \text{prox}_{\alpha(g+\delta_X)}(v)$. 这把不方便求近端的光滑部分交给梯度计算, 把有闭式或廉价近端的非光滑部分保留下来.

令 $q(z) = \omega(z; x) + g(z) + \|z - x\|^2/(2\alpha) + \delta_X(z)$. 子问题强凸性给 $q(u) \leq q(z) - \|z - u\|^2/(2\alpha)$. 与前节完全相同的夹逼得到

$$H(u) - H(z) \leq \frac{\|x - z\|^2 - \|u - z\|^2}{2\alpha} - \left(\frac{1}{2\alpha} - \frac{L}{2} \right) \|u - x\|^2, \quad z \in \text{dom } H. \quad (11.4)$$

因此 $\alpha \leq 1/L$ 保证复合目标下降, 并给 $H(x_N) - H^* \leq \|x_0 - x^*\|^2/(2\alpha N)$. 取 $g = 0$ 就是梯度投影, 取 $f = 0$ 就是近端点法.

多个光滑分量可以先合成一个 f , 但每步必须计算其全梯度. 这不是每次只选一个分量的增量算法; 循环增量的常步长极限环与本节完整梯度近端的定理并不矛盾. 原第 312 页关于“不能推广到多个分量”的警示应在保持这种逐分量更新结构的意义下理解.

11.4 梯度法上界的量级与动量

例题 11.1 固定 $L > 0$, 取参数 $h > 0$, 定义

$$f_h(x) = \begin{cases} Lx^2/2, & |x| \leq h, \\ Lh|x| - Lh^2/2, & |x| > h. \end{cases}$$

从 $x_0 = R > h$ 以步长 $1/L$ 作梯度下降, 说明 $O(\varepsilon^{-1})$ 上界的量级无法只靠固定步长梯度法改善.

解答. 两段在 $\pm h$ 处的值和一阶导数一致, 导数为 $L \max\{-h, \min\{x, h\}\}$, 故梯度的 Lipschitz 常数为 L . 只要 $x_k > h$, 就有 $x_{k+1} = x_k - h$. 为把函数族参数与目标精度分开, 给定小 ε , 取 $h = 2\varepsilon/(LR)$. 在线性段 $f_h(x) \leq \varepsilon$ 要求 $x \leq R/2 + h/2$. 因此至少要约 $R/(2h) = LR^2/(4\varepsilon)$ 步, 与前节上界同阶. 这是随精度变化的一族问题, 不应把函数参数 h 与目标误差 ε 混成一个固定问题的两种距离. $\square$

经典重球法加入固定动量,

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}), \quad 0 < \beta < 1.$$

另一种形式先外推 $y_k = x_k + \beta(x_k - x_{k-1})$, 再在 y_k 处作梯度投影. 对上例的线性段, 两种形式都使位移满足 $v_{k+1} = \beta v_k - h$. 从零初速度开始, $|v_k| \leq h/(1 - \beta)$, 所以固定 β 至多改善常数, 迭代次数仍为 $O(\varepsilon^{-1})$ 量级. 动量的稳定性也取决于参数与目标, 不能仅凭 $\beta \in (0, 1)$ 就宣称所有凸问题收敛.

11.5 递增外推与加速势函数

对复合目标 $H = f + g + \delta_X$, 假设 f 在所有外推点及相应线段上凸、 L -光滑. 外推点未必在 X 内, 因此只假设梯度在 X 上 Lipschitz 不足以定义或分析算法. 本节以 f 在整个空间 L -光滑作为方便的充分条件.

令 $x_{-1} = x_0 \in \text{dom } H$, $\theta_{-1} = 1$, $\theta_k = 2/(k+2)$ 对 $k \geq 0$. 取

$$\beta_0 = 0, \quad \beta_k = \frac{k-1}{k+2} \quad (k \geq 1), \quad y_k = x_k + \beta_k(x_k - x_{k-1}),$$

然后在 y_k 处作步长 $1/L$ 的复合梯度近端步. 一般系数关系为 $\beta_k = \theta_k(1 - \theta_{k-1})/\theta_{k-1}$. 这里 $\beta_k \rightarrow 1$, 但不是随意加大动量, 而是与下面的势函数恒等式匹配. 原第 307 页行文中的初始索引与其显式例子不完全一致, 本节按上述明确索引定义算法.

定理 11.2 上述算法满足对所有 $N \geq 1$,

$$H(x_N) - H^* \leq \frac{2L\|x_0 - x^*\|^2}{(N+1)^2}.$$

所以达到目标误差 ε 所需次数为 $O(\varepsilon^{-1/2})$.

证明. 记 $\Delta_k = H(x_k) - H^*$, 并定义

$$w_k = x_k + \frac{1 - \theta_{k-1}}{\theta_{k-1}}(x_k - x_{k-1}), \quad w_0 = x_0.$$

于是 $y_k = (1 - \theta_k)x_k + \theta_k w_k$, 而 $w_{k+1} = x_k + (x_{k+1} - x_k)/\theta_k$. 在(11.4)取线性化中心 y_k , 比较点 $z = (1 - \theta_k)x_k + \theta_k x^*$. 凸性给 $H(z) \leq (1 - \theta_k)H(x_k) + \theta_k H^*$. 又

$$y_k - z = \theta_k(w_k - x^*), \quad x_{k+1} - z = \theta_k(w_{k+1} - x^*).$$

所以

$$\frac{\Delta_{k+1}}{\theta_k^2} + \frac{L}{2}\|w_{k+1} - x^*\|^2 \leq \frac{1 - \theta_k}{\theta_k^2}\Delta_k + \frac{L}{2}\|w_k - x^*\|^2. \quad (11.5)$$

对 $k \geq 1$, 所选参数满足

$$\frac{1 - \theta_k}{\theta_k^2} = \frac{k(k+2)}{4} \leq \frac{(k+1)^2}{4} = \frac{1}{\theta_{k-1}^2}.$$

故势函数逐步不增. 第零步 $\theta_0 = 1$ 使 Δ_0 项消失, 给初始势至多 $L\|x_0 - x^*\|^2/2$. 迭代得到 $\Delta_N/\theta_{N-1}^2 \leq L\|x_0 - x^*\|^2/2$, 代入 $\theta_{N-1} = 2/(N+1)$ 即得. 证明也解释了为什么要使用这组看似不直观的外推系数. $\square$

加速算法的目标值未必每步下降, 势函数下降代替了单步下降. 对纯光滑约束问题取 $g = 0$, 就得到原第 307 页的加速投影法; 对有廉价近端的 g 同一证明仍有效.

在无约束且最优解存在的情形, 对实值、全局 G -Lipschitz 的非光滑凸 f , 还可先用 Moreau 包络 $e_c f$ 平滑. 下界与误差界为

$$0 \leq f(x) - e_c f(x) \leq \frac{cG^2}{2}.$$

因为 $f(u) \geq f(x) - G\|u - x\|$, 对 u 最小化右边加二次项即可得到下界 $e_c f(x) \geq f(x) - cG^2/2$. 包络梯度常数为 $1/c$. 若取 $c = \varepsilon/G^2$, 对包络用加速法达到 $\varepsilon/2$ 误差, 则原目标总误差不超过 ε , 外层次数为 $O(GR/\varepsilon)$. 但每次包络梯度本身需要解近端子问题. 原第 308 页的 $O(\varepsilon^{-1})$ 应按这种更强的查询能力理解, 不能据此说任意廉价次梯度黑箱都已有同样复杂度. 平滑也可能破坏逐分量的增量结构.

11.6 Bregman 正则化与三点恒等式

设 ϕ 为闭真凸函数, 在其有效域内部的开凸集上可微严格凸, 定义

$$D_\phi(x, y) = \phi(x) - \phi(y) - \nabla\phi(y)^\top(x - y).$$

它非负, 对严格凸情形 $x \neq y$ 时为正; 通常不是对称距离. 二次函数 $\phi(x) = \|x\|^2/2$ 给普通平方距离. 广义近端步最小化 $H(x) + D_\phi(x, x_k)/c_k$, 在定义域、子问题存在性和次梯度和规则成立时, 有

$$\frac{\nabla\phi(x_k) - \nabla\phi(x_{k+1})}{c_k} \in \partial H(x_{k+1}).$$

也就是在梯度坐标 $\nabla\phi(x)$ 中作隐式次梯度更新.

Bregman 三点恒等式为

$$D_\phi(z, x) - D_\phi(z, u) - D_\phi(u, x) = [\nabla\phi(u) - \nabla\phi(x)]^\top(z - u). \quad (11.6)$$

逐项展开定义即得, 所有 ϕ 值相消后只剩梯度项. 对广义近端步, 次梯度不等式与此式结合给

$$c_k(H(x_{k+1}) - H(z)) \leq D_\phi(z, x_k) - D_\phi(z, x_{k+1}) - D_\phi(x_{k+1}, x_k).$$

这是欧氏近端距离估计的真正推广. 若要进一步推出点收敛, 还需用 D_ϕ 控制点间距离、核对边界行为及参数条件, 不能把形式相似当作全部证明.

把 $D_\phi(\cdot, x_k)/c_k$ 的共轭直接配算, 得

$$r_k^*(s) = \frac{1}{c_k} [\phi^*(\nabla\phi(x_k) + c_k s) - \phi^*(\nabla\phi(x_k))].$$

故 Fenchel 对偶最小化 $H^*(y) + \phi^*(\nabla\phi(x_k) - c_k y)/c_k$, 可忽略与 y 无关的常数. 若 $\nabla\phi^*$ 在相关点存在, 原点由 $\nabla\phi^*(\nabla\phi(x_k) - c_k y)$ 重建. 内外线性化、bundle 及增量组合也可接入这种正则化, 但每个组合都要保持相应的存在性与误差条件.

11.7 熵近端及指数增广拉格朗日

取非负正交锥上的熵函数

$$\phi(x) = \sum_i x_i (\ln x_i - 1), \quad 0 \ln 0 := 0.$$

负分量处取 $+\infty$. 对 $y_i > 0$,

$$D_\phi(x, y) = \sum_i \left[x_i \ln \frac{x_i}{y_i} - x_i + y_i \right].$$

原第 314 页的目标省略了仅依赖旧点的 $\sum_i y_i/c_k$, 不影响极小点. 熵近端最小化 $H(x) + D_\phi(x, x_k)/c_k$. 若 H 的非负有效域包含一个各分量严格正的点, 则一个已存在的有限极小点不能有零分量: 沿通往严格正点的线段, 零分量产生 $t \ln t$ 项, 其右导数为 $-\infty$, 而凸性控制 H 的增长至多为线性, 因此边界点不是极小点. 若没有严格正可行点, 则不能照搬“所有后续点都正”的假设.

一维 $p(t) = t(\ln t - 1)$ 在 $t \geq 0$ 上定义, 共轭计算为

$$p^*(s) = \sup_{t \geq 0} \{st - t \ln t + t\} = e^s,$$

因为导数 $s - \ln t = 0$ 给 $t = e^s$, 且目标严格凹. 因而熵近端的对偶, 使用标准共轭 $H^*(y) = \sup_x (y^\top x - H(x))$, 是

$$\min_y \left\{ H^*(y) + \frac{1}{c_k} \sum_i x_{k,i} e^{-c_k y_i} \right\}, \quad x_{k+1,i} = x_{k,i} e^{-c_k y_i}. \quad (11.7)$$

若换变量 $v = -y$, 则写成 $H^*(-v) + \sum_i x_{k,i} e^{c_k v_i} / c_k$, 重建点使用正指数. 原第 314–315 页把 $H^*(y)$ 与正指数同时写在同一约定下, 少了这一负号; 本节明确保留相容的共轭和指数符号.

对凸不等式问题 $\min\{f(x) : x \in X, g_j(x) \leq 0\}$, 在非负乘子上对凹对偶函数 q 作熵近端最大化, 则得到指数增广拉格朗日法:

$$x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{x \in X} \left\{ f(x) + \frac{1}{c_k} \sum_j \mu_{k,j} e^{c_k g_j(x)} \right\}, \quad (11.8)$$

$$\mu_{k+1,j} = \mu_{k,j} e^{c_k g_j(x_{k+1})}, \quad \mu_{0,j} > 0.$$

这里正指数是正确的: 若 x_{k+1} 使子问题最优性与原凸模型的和规则成立, 新乘子恰为各指数项的导数系数, 所以 x_{k+1} 最小化 $L(x, \mu_{k+1})$. 因而 $g(x_{k+1})$ 是 q 在新乘子处的超梯度, 而熵近端最优性为

$$-g_j(x_{k+1}) + \frac{1}{c_k} \ln \frac{\mu_{k+1,j}}{\mu_{k,j}} = 0,$$

与更新式吻合. 违反量为正使乘子按比例增加, 严格满足约束使之减少. 所有乘子保持正, 但可在极限中趋零. 这一推导建立算法等价性; 具体收敛还需非二次近端的相关条件, 不由指数公式单独保证.

11.8 镜像下降与单纯形上的乘法更新

镜像下降进一步把 H 的主要目标线性化. 设 $g_k \in \partial f(x_k)$, 在闭凸集 X 上取

$$x_{k+1} \in \operatorname{argmin}_{x \in X} \{\alpha_k g_k^\top (x - x_k) + D_\phi(x, x_k)\}.$$

最优性是 $[\alpha_k g_k + \nabla \phi(x_{k+1}) - \nabla \phi(x_k)]^\top (z - x_{k+1}) \geq 0, z \in X$. 对二次 ϕ , 它正是投影次梯度法.

设 ϕ 相对某范数 $\|\cdot\|$ 为 σ -强凸, 即 $D_\phi(u, x) \geq \sigma \|u - x\|^2/2$, 次梯度的对偶范数满足 $\|g_k\|_* \leq G$. 用最优性及(11.6), 得

$$\begin{aligned} \alpha_k (f(x_k) - f(z)) &\leq \alpha_k g_k^\top (x_k - x_{k+1}) + D_\phi(z, x_k) - D_\phi(z, x_{k+1}) - D_\phi(x_{k+1}, x_k) \\ &\leq D_\phi(z, x_k) - D_\phi(z, x_{k+1}) + \frac{\alpha_k^2 G^2}{2\sigma}. \end{aligned}$$

第二步是对 $r = \|x_k - x_{k+1}\|$ 最大化 $\alpha_k G r - \sigma r^2/2$. 求和后用凸性, 对加权平均点 $\bar{x}_N = (\sum_{k < N} \alpha_k x_k) / (\sum_{k < N} \alpha_k)$ 得到

$$f(\bar{x}_N) - f(z) \leq \frac{D_\phi(z, x_0) + (G^2/(2\sigma)) \sum_{k < N} \alpha_k^2}{\sum_{k < N} \alpha_k}. \quad (11.9)$$

欧氏平方距离被与约束几何匹配的 Bregman 量替换, 算法的基本进展机制仍是望远镜求和.

在概率单纯形 $X = \{x \geq 0 : \sum_i x_i = 1\}$ 上, 取熵 ϕ 及 $x_{0,i} > 0$. 子问题去掉常数后为

$$\min_{x \in X} \sum_i \left[x_i g_{k,i} + \frac{1}{\alpha_k} x_i \ln \frac{x_i}{x_{k,i}} \right].$$

对等式约束加乘子 λ , 驻点给 $g_{k,i} + (\ln(x_i/x_{k,i}) + 1)/\alpha_k + \lambda = 0$. 用总和为一解出公因子,

$$x_{k+1,i} = \frac{x_{k,i} e^{-\alpha_k g_{k,i}}}{\sum_j x_{k,j} e^{-\alpha_k g_{k,j}}}. \quad (11.10)$$

分母归一化保证概率总和, 指数保证正性. 目标次梯度较大的坐标减小权重, 较小的坐标增大相对权重.

熵在单纯形上相对 ℓ_1 范数是 1-强凸. 对内部线段 $x(t) = x + th$, $\sum_i x_i(t) = 1$, 柯西不等式给

$$h^T \nabla^2 \phi(x(t)) h = \sum_i \frac{h_i^2}{x_i(t)} \geq \left(\sum_i |h_i| \right)^2.$$

沿线段二次积分得 $D_\phi(u, x) \geq \|u - x\|_1^2/2$, 边界点可取极限. 对偶范数是 ℓ_∞ , 因而若 $\|g_k\|_\infty \leq G$, 可在(11.9)取 $\sigma = 1$. 从均匀分布 $x_{0,i} = 1/n$ 开始, 对任意最优点有

$$D_\phi(x^*, x_0) = \ln n + \sum_i x_i^* \ln x_i^* \leq \ln n.$$

取常数步长 $\alpha = \sqrt{2 \ln n} / (G \sqrt{N})$, 平均点误差至多 $G \sqrt{2 \ln n / N}$, 当 $n = 1$ 时问题仅有一个可行点, 无需该步长公式. 这段补充估计说明选择熵并非只为获得一个漂亮的指数更新式: 它也让初始距离与维数的依赖从欧氏几何改成 $\ln n$.

12 线性规划建模与单纯形法

本章补充 MIT 15.053 *Optimization Methods in Management Science*, Spring 2013, James Orlin 与 Ebrahim Nasrabadi 课程中的第 2-6、9 讲及教程 1、2、4-7. 它们补足 6.253 已讲的线性对偶理论所未展开的建模、标准形、单纯形计算、Phase I 与灵敏度. 原课件中的休息插图、时事、项目安排不属于数学正文; 明示排除开放许可的出版社题面只保留来源指引, 相关数学方法在此独立推导.

12.1 变量、参数与线性模型

模型要分别说明能控制的变量、预先给定的参数、比较方案的目标及限制方案的约束. 变量名称不是小事: 若约束跨多天、多个阶段或多个产品, 只记录单日总量可能丢失原问题的逻辑. 单位也应匹配; 时间必须统一为分钟或小时, 比例与总量不能随意相加. 线性模型采用可分性、比例性与确定系数等假设, 输出最优解后还要检查这些假设是否合理.

例题 12.1 教程 1 第 5-9 页的生产例: 产品 P、Q 分别需要机器 A 的 50、24 分钟和机器 B 的 30、33 分钟, 两台机器可用 40、35 小时; 单位利润为 25、30 美元. 写出连续生产模型.

解答. 令 x, y 为两产品数量, 时间统一成分钟, 得 $\max(25x + 30y)$, 约束 $50x + 24y \leq 2400$, $30x + 33y \leq 2100$, $x, y \geq 0$. 原教程第 7 页的一行目标写成 $40x + 35y$, 与同页说明及完整模型不符; 此处按单位利润 25、30 及后续完整模型计算. 若产品不可拆分, 应另要求整数; 连续模型只是其线性松弛, 不能把小数产量解释为可直接实施的整数方案. $\square$

例题 12.2 教程 1 第 10–17 页的三产品模型, 机器时间矩阵与销售上限为

$$A = \begin{pmatrix} 20 & 10 & 10 \\ 12 & 28 & 16 \\ 15 & 6 & 16 \\ 10 & 15 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = 2400 \mathbf{1}, \quad u = (100, 40, 60)^\top.$$

单位销售收入为 $(90, 100, 70)$, 材料成本为 $(45, 40, 20)$, 固定周费用 6000 美元. 求并验证最优连续生产方案.

解答. 模型为 $\max(45p + 60q + 50r - 6000)$, $A(p, q, r)^\top \leq b$, $0 \leq (p, q, r)^\top \leq u$. 固定费用不影响最优变量, 但报告实际利润时不可遗漏. 取 $r = 60$ 并使前两台机器满负荷, 解 $20p + 10q = 1800$, $12p + 28q = 1440$, 得 $p = 900/11$, $q = 180/11$. 后两台机器使用 $25140/11$ 与 $11700/11$ 分钟, 都不超过 2400; 变量上限也满足.

为证明最优, 对前两台机器约束分别用乘子 $27/22, 75/44$, 对 $r \leq 60$ 用乘子 $115/11$, 其余置零. 加权后各变量目标系数恰为 45、60、50, 给上界 $84300/11$. 候选方案达到该界, 所以最优. 扣除 6000 后利润为 $18300/11$. 原教程的数值约 7664 及 1664 是四舍五入; 产品 Q 表中 16.63 与公式不一致, 正确近似为 16.36. $\square$

广告、营养、混合配料模型的共同结构是 $\min \sum_j c_j x_j$, $\ell_i \leq \sum_j a_{ij} x_j \leq u_i$, $0 \leq x_j \leq d_j$. 索引集、系数与单位要在公式之前定义. 广告模型中 a_j 表示一次展示带来的计数, 不自动等于不重复触达人数; 若同一受众会重复看到广告, 需说明计数假设. 混合配料中若总质量固定为 P , 成分约束可写 $L_j P \leq \sum_i a_{ji} x_i + M_j \leq U_j P$, 重量守恒为 $\sum_i x_i + \sum_j M_j = P$. 这里只将纯成分 M_j 加在第 j 个成分中, 不把所有纯材料同时加进每个成分约束. 教程 2 的外部熔炉书摘以这一抽象模型替代逐字重译, 原书出处保留在来源台账中.

例题 12.3 第 2 讲的历史饮食模型允许分数份量, 成本向量 $(1, 3, 2.5, 3, 1)$, 热量 $(250, 770, 360, 190, 230)$, 脂肪热量 $(81, 360, 144, 45, 99)$, 蛋白质 $(31, 44, 14, 27, 3)$, 钠 $(480, 1170, 800, 580, 160)$. 要求总热量 600–900, 脂肪热量不超过总热量的 40%, 蛋白质至少 30, 钠不超过 1150. 写出模型并核对课件给的近似方案.

解答. 令份量向量 $x \geq 0$, 总热量 $F = a^\top x$. 目标 $\min c^\top x$, 约束 $600 \leq F \leq 900$, $d^\top x \leq 0.4F$, $p^\top x \geq 30$, $s^\top x \leq 1150$. 仅用前两项, 令热量下界与脂肪比例取等号, 解得 $x_1 = 1040/921$, $x_2 = 380/921$, 其他为 0, 成本 $2180/921 \approx 2.367$. 蛋白质及钠限制均满足. 可用热量与脂肪两条活跃约束构造非负对偶乘子证明其最优: 设热量下界乘子 $\alpha = 109/27630$, 脂肪限制乘子 $\beta = 2/2763$, 则 $250\alpha + 19\beta = 1$, $770\alpha - 52\beta = 3$; 其他食品的同一加权系数不超过其成本, 给下界 $600\alpha = 2180/921$.

原第 14 页钠数据是 1170, 第 15 页公式却写 1770; 后者也与给定近似解不相容, 本稿按第 14 页数据建模. 此处数字是 2013 课程例题, 不作为现行营养、价格或饮食建议. 整数模型中一份第 1 项与两份第 5 项成本为 3, 满足所

有条件; 连续最优值 2.367 本身只给整数下界. 但成本低于 3 时, 第 2 与第 4 项不能选, 第 3 项最多一份且不能与其他正份量组合, 热量仅 360; 或只选第 1 与第 5 项且总份数至多 2, 热量最多 500. 这些都违反 600 热量下界, 所以成本 3 确为整数最优. $\square$

例题 12.4 第 2 讲的投资组合例给历史期望收益率 (12.7, 9.9, 11.8) 与协方差矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 350 & 50 & 100 \\ 50 & 150 & 30 \\ 100 & 30 & 600 \end{pmatrix}$. 写出收益-风险模型并计算权重 (0.5, 0.2, 0.3) 的两个指标.

解答. 权重满足 $\mathbf{1}^\top x = 1, x \geq 0$, 收益为 $r^\top x$, 方差为 $x^\top Qx$. 给定最大方差 v , 可以最大化 $r^\top x$ 并要求 $x^\top Qx \leq v$. 协方差矩阵半正定使这是凸问题, 虽非线性规划. 样本权重收益为 11.87, 方差为 191.1. 每一对不同资产的协方差在二次型中出现两次, 不能只计算对角项. 改变风险上界形成有效前沿; 这是历史数学模型, 不涉及对实际证券作投资推荐. $\square$

12.2 排班与辅助变量

例题 12.5 第 2 讲与教程 1 的邮局例要求七天人数至少为 (17, 13, 15, 19, 14, 16, 11), 每人连续工作五天再休息两天. 建立最少雇员模型并比较连续与整数方案.

解答. 令 x_j 表示在第 j 天开始五天班次的人数, 下标按模 7 循环. 第 i 天上班人数为 $\sum_{k=0}^4 x_{i-k}$, 因而模型是 $\min \sum_j x_j$, 约束 $\sum_{k=0}^4 x_{i-k} \geq b_i, x \geq 0$. 单纯定义每天上班总人数不能保证同一个人连续工作五天, 这就是选择班次变量的作用.

连续方案 (4/3, 10/3, 2, 22/3, 0, 10/3, 5) 满足所有约束, 总数 67/3. 取非负乘子 $y = (1/3, 0, 1/3, 1/3, 0, 1/3, 0)$. 每个班次的覆盖乘子和都不超过 1, 而需求加权和为 67/3. 因而对所有可行 x , $\sum_j x_j \geq y^\top Ax \geq y^\top b = 67/3$, 候选方案达到下界, 证明连续最优.

整数可行方案 (4, 4, 2, 6, 0, 4, 3) 总数 23. 由连续最优值 67/3, 整数最优值至少为 $\lceil 67/3 \rceil = 23$, 该方案遂最优. 原教程第 23 页写的向量把第六项写为 6, 总和实际为 25; 其后 23 周轮换表却给第六类 4 周. 本稿采用可行的 4, 并给出上述连续下界证书以证明整数方案最优.

公平轮换可用长度 23 的班序列, 各开始日重复次数依次为 4, 4, 2, 6, 0, 4, 3. 让 23 名员工取该序列的 23 个循环平移, 每周各类人数保持不变, 每人在 23 周周期内经历相同班次多重集. 这证明了轮换的公平计数, 不自动处理跨周劳动法规或其他现实排班约束. $\square$

若允许不足与超员, 可令每天 $w_i + d_i - e_i = b_i, d_i, e_i \geq 0$, 并在目标加入正系数的不足与超员惩罚, 如 $5d_i^2 + e_i^2$. 可行集中会出现 d_i, e_i 同时正的“多余表示”, 但任何这样的解都可把两者同时减去 $\min(d_i, e_i)$, 保持等式而严格降低目标. 所以每个最优解至少一者为 0, 正好具有原意. 若惩罚系数不正, 或目标不随这些变量严格增加, 这个等价性证明可能失效.

12.3 线性变换与标准形

本章标准形统一为 $\max c^T x$, $Ax = b$, $x \geq 0$, 并预处理使 $b \geq 0$ 及 A 行满秩. 极大与极小可通过目标换号相互转换. $a^T x \leq b$ 加松弛变量 $s \geq 0$ 变成 $a^T x + s = b$; $a^T x \geq b$ 减剩余变量 $s \geq 0$ 变成 $a^T x - s = b$. 右端为负时先将整行乘以 -1 , 同时反转不等号. $x_j \leq 0$ 可替换为 $-y_j$, $y_j \geq 0$; 自由变量可拆成 $x_j = u_j - v_j$, $u_j, v_j \geq 0$. 这一表示不唯一, 但投影回原变量时可行性与目标值完全相同.

例题 12.6 教程 6 的练习为 $\min(x_1 - x_2 + x_3)$, 约束 $x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 3$, $-x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$, $x_1 - x_2 = 10$, $x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3$ 自由. 转为极大标准形.

解答. 令 $y_2 = -x_2$, $x_3 = y_3 - y_4$, 再加松弛及剩余变量, 得

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1 - y_2 - y_3 + y_4, \\ x_1 - 2y_2 - y_3 + y_4 + s_1 &= 3, \\ -x_1 - y_2 + y_3 - y_4 - s_2 &= 2, \\ x_1 + y_2 &= 10, \end{aligned}$$

所有新变量非负. 由等式消去自由变量也是可行方法, 但消去有符号限制的变量时必须保留对应不等式; 否则会把不可行方案引入. 目标常数即使不影响最优变量, 也要在恢复原目标值时计入. $\square$

教程 4 还介绍三类常用变换. $|a^T x + b| \leq d$ 等价于两条线性不等式, 要求 $d \geq 0$; $|a^T x + b| \geq d > 0$ 通常是两个半空间的并, 非凸, 不能用仅含连续变量的线性规划提升来一般表示, 因为线性像与投影保持凸性. 最小化有限个仿射函数的最大值可引入 $t \geq a_i^T x + b_i$ 并最小化 t ; 最大化有限个仿射函数的最小值则令 $t \leq a_i^T x + b_i$ 并最大化 t . 若反转优化方向, 新变量可能不被压到正确边界, 不能机械套用.

比例约束 $(a^T x + b)/(d^T x + e) \geq \rho$ 只有在分母已知严格正时才等价于 $a^T x + b \geq \rho(d^T x + e)$. 零分母处原比例未定义, 交叉相乘后的线性式却可能允许该点; 若采用这种扩展必须明确约定, 不能称严格等价. 教程中的“至少 20% 广告属于某类”因此还要有正总广告量假设或明示零投放时的比例约定.

12.4 基本可行解与顶点

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 行满秩. 选择 m 个线性无关列组成可逆矩阵 B , 对应变量为基本变量, 其他为非基本变量. 设置 $x_N = 0$ 后, $x_B = B^{-1}b$ 称基本解; 若它非负, 称基本可行解. 此时字典为

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}A_N x_N, \quad z = c_B^T B^{-1}b + \bar{c}_N^T x_N,$$

其中 $\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1}a_j$ 是检验数或约化成本. 原课程的 $-z$ 行与这里的目标字典是同一种表达, 只需按等式解回 z , 不可直接凭行首符号猜方向.

定理 12.1 标准形可行点为顶点当且仅当其正坐标对应的列线性无关. 每个非空标准形可行集有基本可行解; 若最优值有限, 存在一个最优基本可行解.

证明. 若正坐标的列相关, 存在非零 d 支持于这些坐标且 $Ad = 0$. 足够小的正负步长保持非负, 点是两个不同可行点的中点, 不是顶点. 若列无关, 将 x 写成可行点 y, z 的中点, 非负性强制所有零坐标在 y, z 也为 0, 列无关又使 $A(y - z) = 0$ 只能 $y = z$, 所以是顶点. 正坐标的独立列可补足为一个基, 因而顶点就是某个基本可行解.

任一可行点若支持列相关, 选择上述方向, 沿一个方向移动直到一个正坐标变为 0, 得支持更小的可行点. 有限次后列独立. 若从最优点出发, 足够小的正负移动都可行, 最优性强制 $c^T d = 0$, 因而沿方向降支持时保持最优. 有限最优值的取到已由多面体上的线性函数存在性证明, 所以得到最优基本可行解. $\square$

一般多面体若含直线, 可以没有顶点. 若不含直线, 通过有限面下降或标准形的支持消去可得顶点; 在有有限最优值时, 最优面也不含直线, 因而有最优顶点. “顶点处必有最优解”需要非空、有限最优值及顶点存在, 不能用于不可行或无界问题. 开约束 $0 < x < 1$ 的 $\sup x = 1$ 未取到, 也不属于闭多面体理论.

12.5 换基、检验数与终止证书

当前基本可行解满足 $\bar{c}_j \leq 0$ 对全部非基本变量时, 任何可行解都有 $z = z_0 + \sum_j \bar{c}_j x_j \leq z_0$, 因而当前解最优. 这也给对偶证书 $\pi = B^{-T} c_B$, 因为 $A^T \pi \geq c$, $b^T \pi = z_0$. 有正检验数时, 选择进入变量 x_s 并增加至 $t \geq 0$. 基本变量变为 $x_B(t) = \beta - td$, $\beta = B^{-1}b$, $d = B^{-1}a_s$.

若所有 $d_i \leq 0$, 任意 $t \geq 0$ 都可行而目标 $z_0 + t\bar{c}_s \rightarrow \infty$, 给无界证书. 否则最大可行步长为 $t^* = \min_{d_i > 0} \beta_i / d_i$, 达到该最小值的基本变量离基. 换基等价于以其行、进入列元素为主元作 Gauss-Jordan 消元: 主元行除以主元, 再消去其他行及目标行的同列系数. 只在正的 d_i 上作比值检验, 负比值不能当作更小可行步长.

例题 12.7 第 4 讲用方程组 $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 9$, $2x_1 - x_2 + 2x_3 = 6$, $x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ 说明消元. 第 5 讲的字典为

$$z = 11 - 2x_2 + 6x_5,$$

$$x_3 = 4 - 2x_2 - 2x_5, \quad x_4 = 1 + x_2 + 2x_5,$$

$$x_1 = 9 - 6x_2 - 3x_5.$$

分别完成线性消元与单纯形的一次换基.

解答. 方程组先以首行的一半消去第一列, 得 $x_1 + x_2 + x_3/2 = 9/2$, $-3x_2 + x_3 = -3$, $-2x_2 + 3x_3/2 = 1/2$. 第二行规范化后消去第二列, 得 $x_1 + 5x_3/6 = 7/2$, $x_2 - x_3/3 = 1$, $5x_3/6 = 5/2$. 最后 $x_3 = 3$, $x_2 = 2$, $x_1 = 1$.

字典中令 x_5 进入. 正限制来自 x_3 与 x_1 , 比值为 $4/2 = 2$ 与 $9/3 = 3$, 所以 x_3 离基. 解出 $x_5 = 2 - x_2 - x_3/2$, 代回得 $x_4 = 5 - x_2 - x_3$, $x_1 = 3 - 3x_2 + 3x_3/2$, $z = 23 - 8x_2 - 3x_3$. 检验数都非正, 所以 $x_1 = 3$, $x_4 = 5$, $x_5 = 2$, 其余 0 为最优, 值 23. 若原字典改为 $z = 6 - 2x_2 + x_5$, $x_3 = 4 - 2x_2 + 2x_5$, $x_4 = 2 + x_2 + 2x_5$, $x_1 = 3 - 6x_2$, 则令 $x_2 = 0$, $x_5 \rightarrow \infty$ 给可行无界射线, 正好对应第 5 讲的无界例. $\square$

12.6 Phase I 与人工变量

松弛变量表示原约束的剩余资源, 在最终解中可以为正. 人工变量只是为了构造初始基, 若它在辅助最优解中仍为正, 就不能当作原问题变量. 对 $Ax = b, x \geq 0$, 先使 $b \geq 0$, 加人工变量 $y \geq 0$, 解 $\min \mathbf{1}^\top y, Ax + y = b, x, y \geq 0$. 初始基为 $y = b$. 目标非负, 且原问题可行当且仅当辅助最优值为 0. 若原问题可行, 将其解与 $y = 0$ 代入得 0; 若辅助取到 0, 非负性强制所有 $y = 0$, 恢复原可行解.

若辅助值 0 但人工变量仍在基中且值为 0, 可在该行选择一个非人工的非零系数换出它; 若没有这种系数, 该行是冗余等式, 可以在保留等价可行集的前提下移除. 然后删除人工列, 恢复原目标, 用基本行消去目标中的基本变量, 开始 Phase II. 原讲义把人工变量比作暂时的松弛, 但两者的语义与最终允许状态完全不同.

例题 12.8 第 5 讲的初始等式为 $x_1 + x_2 + x_3 = 4, -2x_1 + x_2 - x_3 = 1, x \geq 0$. 构造并求解 Phase I.

解答. 加 y_1, y_2 后初始值为 $(4, 1)$, 辅助目标 5. 首先让 x_2 进入, 增至 1 使 $y_2 = 0$, 此时 $y_1 = 3$. 解出 $x_2 = 1 + 2x_1 + x_3 - y_2$, 代入另一行, 得 $y_1 = 3 - 3x_1 - 2x_3 + y_2$, 目标为 $3 - 3x_1 - 2x_3 + 2y_2$. 令 x_1 增至 1, y_1 变为 0, $x_2 = 3, x_3 = 0$, 辅助值 0. 所以原问题可行, 可使用 x_1, x_2 作为起始基, 再按原目标继续. $\square$

12.7 退化、循环与 Bland 规则

基本可行解的某个基本变量为 0 时称退化. 最小比值可以为 0, 此时换基但变量点和目标值不变. 同一个点可以对应多个基, 因而“每次换基就到了新点”不成立. 没有退化时每次正检验数换基都严格提高目标, 基只有有限个, 因而算法有限. 退化时需防循环.

例题 12.9 教程 7 第 10–12 页的循环例, 初始基为 x_5, x_6, x_7 , 目标字典及三行约束为

$$z = 3 + \frac{3}{4}x_1 - 20x_2 + \frac{1}{2}x_3 - 6x_4, \quad \begin{pmatrix} 1/4 & -8 & -1 & 9 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & -12 & -1/2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取进入序列 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$, 离基序列 $x_5, x_6, x_1, x_2, x_3, x_4$, 验证循环.

解答. 每次按对应行的正主元消元, 所有比值都取 0. 基序列依次为

$$(5, 6, 7) \rightarrow (1, 6, 7) \rightarrow (1, 2, 7) \rightarrow (3, 2, 7),$$

$$(3, 2, 7) \rightarrow (3, 4, 7) \rightarrow (5, 4, 7) \rightarrow (5, 6, 7).$$

第六次后矩阵与目标行恢复初始值, 变量点始终为 $x_7 = 1$ 、其余 0, 目标始终 3. 这说明合法的进入选择加普通比值规则可以无限循环, 并未说明所有选择规则都会循环. 来源课件对该例的历史作者归属未在本稿另行确认, 这里只使用已核的数学数据. $\square$

定理 12.2 (Bland 防循环规则) 极大单纯形中, 选择具有正检验数的最小编号非基本变量进入; 最小比值并列时选择编号最小的基本变量离开. 此规则不会循环, 因而在有限次换基后给最优或无界证书.

证明. 若有循环, 目标沿整个循环非降又回原值, 所以每次都退化, 可行变量点不变. 称循环中曾改变基本身份的变量为变化变量, 取编号最大的变化变量 x_t . 选一次 x_t 离基、 x_s 进入的换基; 有 $s < t$. 该次进入方向 d 满足 $d_s = 1$, $d_i = -a_{is}$ 对当时基本变量, 其他非基本分量 0, 且 $d_t < 0$. 所有变化变量在固定可行点的值都为 0. 若某个当时基本的变化变量 $i < t$ 有 $a_{is} > 0$, 它也具有零最小比值, 按离基规则应先于 t 离开, 矛盾. 因而对全部变化变量 $i < t$, 都有 $d_i \geq 0$.

另选循环中 x_t 进入的一个字典. 按进入规则, 该字典中编号小于 t 的非基本变量检验数都非正, 而 $\bar{c}_t > 0$. 编号大于 t 的非基本变量不是变化变量, 始终非基本, 所以它们在前一个方向 d 中为 0. 同一满足 $Ad = 0$ 的代数方向的目标变化可在任意字典中计算. 退化时它不一定允许正的可行步长, 此处只使用零空间恒等式. 在前一个字典它等于进入变量的正检验数 $\bar{c}_s > 0$; 在后一个字典却为 $\sum_{j \in N} \bar{c}_j d_j < 0$, 因为 t 项严格负, 较小编号项非正, 较大编号项为 0. 矛盾. 基有限, 无循环就保证有限性. $\square$

教程 7 第 15 页把并列离基写成“编号最小行, 不考虑变量编号”; 这不是上述标准 Bland 规则. 若行随换基不按当前基本变量编号重新排序, 不能用行位置替代变量编号. 本稿采用可证明防循环的变量编号版本.

退化与多最优解也不同. 非基本变量有零检验数且允许正步长时, 可以沿该方向得到不同的同值可行解; 若只有零步长, 只能得到同一点的另一基. 因而“存在零检验数”本身不能无条件证明有不同的最优变量点.

12.8 基不变范围与影子价格

固定最优基 B , 右端扰动 $b + \Delta b$ 时, 基本解为 $B^{-1}b + B^{-1}\Delta b$. 检验数不变, 因而只要这一向量仍非负, 原基仍最优, 最优值精确变化为 $\pi^T \Delta b$, 其中 $\pi = B^{-T}c_B$. 对单个右端分量, 每个基本变量的非负条件给一个线性区间, 相交即有效范围. 超出范围后应换基, 旧影子价格可能仅为一个对偶界.

成本扰动 $c + \Delta c$ 不改变基本可行解, 但改变检验数. 新基仍最优当且仅当 $c_N + \Delta c_N - (c_B + \Delta c_B)^T B^{-1}A_N \leq 0$. 非基本变量单独改变利润时, 它的允许增加正好是负检验数的绝对值; 基本变量的改变会同时影响多个检验数, 需逐一求区间. 软件报告中的极大数如 10^{30} 通常表示无上限, 不能把它当作可测的有限容许量.

例题 12.10 教程 5 的二维模型为 $\max(30K + 50S)$, $2K + 3S \leq 10$, $K + 2S \leq 6$, $K + S \leq 5$, $K \leq 4$, $S \leq 3$, $K, S \geq 0$. 求基点、第一条约束的影子价格与 S 利润的允许变动范围.

解答. 前两条取等号得 $(K, S) = (2, 2)$, 值 160. 乘子 $(10, 10)$ 对前两约束给目标法向量 $(30, 50)$, 其他置零, 所以由对偶证书知最优. 将第一右端改为 $10 + \Delta$, 同一交点为 $K = 2 + 2\Delta$, $S = 2 - \Delta$, 值 $160 + 10\Delta$. 所有其余不等式及非负性给 $-1 \leq \Delta \leq 1$, 故影子价格 10 在该范围精确有效.

若目标变为 $30K + (50 + \eta)S$, 保持该点最优要求 $(30, 50 + \eta)$ 是活跃法向量 $(2, 3), (1, 2)$ 的非负组合. 解乘子得第一为 $10 - \eta$, 第二为 $10 + 2\eta$, 因而 $-5 \leq \eta \leq 10$. 两端某个乘子为 0, 目标与边平行, 可出现多最优解. 区间内部基点不变而目标值按 2η 改变. $\square$

若多个右端同时改变, 单项允许范围不能逐项独立套用. 设方向对应的单项最大幅度为 $r_i > 0$, 若 $\sum_i |\Delta b_i|/r_i \leq 1$, 则扰动向量是零扰动与各轴允许端点的凸组合. 同一基可行右端区域由线性不等式定义而凸, 所以新右端仍可行, 检验数不变, 影子价格仍有效. 这是 100% 规则的证明; 它是充分条件, 不是必要条件. 无穷允许幅度可通过有限近似端点取极限处理.

例题 12.11 第 6 讲虚构的 mc2 生产例最优变量为 $(18, 16.4, 3, 0, 32)$, 利润 46.12 百万美元. 其新磁盘约束影子价格 0.8、右端 20、允许减少 16.4 及增加 0.6; 产品 A 需求上限的影子价格 1.04、右端 18、允许减少 18 及增加 0.75; 产品 C 上限影子价格 0.6、右端 3、允许减少 3 及增加 0.6. 应用这些报告数字.

解答. 单位产量为千件, 利润单位为百万美元. 新磁盘从 20 降至 15 仍在 $[3.6, 20.6]$ 内, 利润变化为 $-5 \times 0.8 = -4$ 百万美元. 将 A 需求上限从 18 增至 18.5, 变化 $0.5 \times 1.04 = 0.52$ 百万美元; 若广告成本 0.4 百万美元, 在其余假设不变时净增加 0.12 百万美元. 这只是模型内比较, 不预设现实需求一定按假设改变.

同时把 A 上限降至 15、C 上限降至 2, 100% 比率为 $3/18 + 1/3 = 1/2$, 所以原影子价格有效, 利润降低 $3 \times 1.04 + 1 \times 0.6 = 3.72$ 百万美元. 若 A 降 1 而 C 增 0.5, 比率 $1/18 + 0.5/0.6 < 1$, 利润变化 $-1.04 + 0.3 = -0.74$ 百万美元. 非活跃资源约束的影子价格为 0, 小范围增加该资源并不提高利润; 活跃约束也可能乘子为 0, 不能把“活跃”与“有价值”当作等价. $\square$

约化成本还有经济解释 $\bar{c}_j = c_j - \pi^T a_j$: 收入减去按影子价格计的资源成本. mc2 的产品 D 收益 0.6, 使用 0.5 单位新磁盘及 1 单位电子阅读器容量, 对应资源价 0.8 及 0.3, 所以 $\bar{c}_D = 0.6 - 0.5 \times 0.8 - 0.3 = -0.1$. 收益升至 0.7 才消除负检验数; 等号处未必立即要求正生产, 还要看允许进入方向与退化. 新产品 F 收益 0.65、使用 0.4 单位新磁盘与 1 单位阅读器容量, 约化成本为 $0.65 - 0.4 \times 0.8 - 0.3 = 0.03 > 0$, 表示当前对偶价格不再能证明原方案最优, 可以通过换基寻求改进. 若模型同时改变多个成本或矩阵中的基列, 必须重新检查全部基可行性与检验数, 单一报告范围不足以说明结论.

13 分析与计算的联系

本章对应原第 25 讲复习与收束, 第 317–339 页. 该讲把全课程重新归为凸分析、对偶、算法三部分. 以下以可核的解证书串联它们, 不重复抄写前文已经证明的结果.

13.1 从模型到证书

一个凸问题能否求解, 至少有四个不同问题. 首先, 是否存在可行点并且最优值有限; 其次, 最优值是否取到; 然后, 是否有零对偶间隙与最优乘子; 最后, 计算过程是否以可证明的速度产生足够好的近似. 凸性只使局部最优等于全局最优, 并不自动回答后三个问题.

第1章把凸性变成全局切平面下界与投影条件. 第2章用相对内部控制低维域, 用衰退锥判定紧水平集与解的存在. 第3章说明线性像和部分极小化可能丢失闭性, 并以分离与共轭把点集描述转换成半空间描述. 第4章的扰动函数将零对偶间隙解释为原点的高度不在闭凸化中下降, 将乘子存在解释为原点有非竖直支持平面. 第5章把这个支持斜

率写成次梯度, 将其用于最优性与灵敏度.

对可行候选 x 与对偶可行乘子, 原目标是上界, 对偶值是下界. 二者之差才是直接的停止证书. 若有不可行迭代, 目标值可能低于原最优值, 不能独立当成上界. 次梯度距离估计、近端势函数和障碍的原始-对偶间隙, 分别提供不同的可证明进展量. “目标看起来下降”与“已达到指定精度”不是同一个结论.

13.2 算法利用的结构

当目标不可微而次梯度廉价, 第7章以距离递推分析投影次梯度. 它允许目标上升, 步长选择影响值误差与点收敛, 所以逐步下降并非必要的进展指标. 当支持平面容易保存, 第8章建立外部多面体下模型; 当线性优化子问题容易, 单纯形分解维护内部可行凸包. 两者在共轭下相互对应, 但它们给出的界方向和子问题条件不同.

第9章通过二次正则化产生唯一的近端点, 并用到最优集合的距离解释其收敛. 在对偶侧应用同一近端步骤, 就出现增广拉格朗日乘子更新; 加上多面体近似则产生束方法. 第10章的障碍法从严格可行域内部逼近边界, 其参数趋零可能带来病态, 需要适合的内层求解. 大和目标则可利用循环或随机增量, 此时单次工作量减少, 但固定步长可能只到误差邻域.

对光滑目标, 第11章的二次上界使梯度投影由次梯度的 $O(\varepsilon^{-2})$ 次数改进到 $O(\varepsilon^{-1})$; 外推与势函数进一步给 $O(\varepsilon^{-1/2})$ 次数阶. 这些次数界以相应梯度、投影或近端查询为单位, 并不忽略每次查询的成本. 非光滑平滑化需要同时计算近似误差与平滑函数的 Lipschitz 常数. Bregman 正则化和熵镜像下降适应单纯形等几何结构, 但不能不核对定义域、正分量与三点不等式条件就直接搬用欧氏分析.

线性规划还具有有限基结构, 第12章的单纯形法沿基换元, 用约化成本与比值检验给最优或无界证书. 退化时算法可能换基而不移动点, 防循环规则在这里有实际数学作用. 灵敏度则是在基保持可行与最优的范围内, 把对偶乘子变为精确的参数斜率.

13.3 一个复合模型

例题 13.1 对 $\lambda > 0$, 考虑 $F(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|^2 + \lambda\|x\|_1$. 给出最优性证书、一个可实现迭代及可证明的停止判断.

解答. 光滑部分梯度为 $A^T(Ax - b)$, Lipschitz 常数可取 $L = \|A\|^2$. 全空间有限连续与闭真 ℓ_1 项满足和法则, 所以最优性等价于存在 $s \in \partial\|x\|_1$ 使 $A^T(Ax - b) + \lambda s = 0$. 各坐标上, $x_j \neq 0$ 时 $s_j = \text{sgn}(x_j)$, $x_j = 0$ 时 $s_j \in [-1, 1]$. 因而非零坐标满足精确梯度等式, 零坐标满足 $|[A^T(Ax - b)]_j| \leq \lambda$.

取 $0 < \alpha \leq 1/L$ (若 $A = 0$, 直接 $x = 0$ 最优), 迭代 $z = x - \alpha A^T(Ax - b)$, 再逐坐标取 $x_j^+ = \text{sgn}(z_j)(|z_j| - \alpha\lambda)_+$. 这是梯度近端法, 软阈值由一维次梯度条件直接求得. 若使用外推, 应按第11章的参数与势函数证明分析, 不能只在该式前随意加一个动量项.

还可构造一个直接的对偶界. 将残差变量 $r = Ax - b$ 拆出并用乘子 y , 极小化 $\frac{1}{2}\|r\|^2 + \lambda\|x\|_1 + y^T(Ax - b - r)$, 得对偶 $q(y) = -\frac{1}{2}\|y\|^2 - b^T y$, 约束 $\|A^T y\|_\infty \leq \lambda$. 对任意残差候选 r , 若 $\|A^T r\|_\infty > \lambda$, 将其按比例缩成对偶可行 y ; 若已满足, 直接取 $y = r$. 因而 $F(x) - q(y) \geq 0$ 是一个可计算误差上界. 仅检查软阈值后坐标变动小, 并不等于检查

了这一目标误差. □

这个例子同时使用凸性、次微分、对偶、近端与次数分析. 它说明全书各部分的联系, 也说明模型与算法的每项假设都应在实际应用处重新核对.

14 6.253 作业题与解答

本章收录官方课程库存中的五份作业, 共 27 个原编号主问题. 原件题头均写明 Dimitri P. Bertsekas, Spring 2010; 文件名中的 S12 和末页的 Spring 2012 是 OCW 发布课程标识, 不能据此把作业改为 2012 年. 除另行标明的 AI 补证或修正外, 解答根据同名官方解答重构; 原题中的外部教材引用由课程附带的 MIT6_253S12_summary.pdf 核实. 本章“锥”沿用原题对正数倍封闭的约定, 不额外要求包含原点. $L_C = \text{rec } C \cap (-\text{rec } C)$ 表示闭凸集的线性空间.

14.1 作业 1: 凸集与凸函数

习题 14.1 原题 1. (a) 设非空 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. 证明: 若 C 凸, 则 $(\lambda_1 + \lambda_2)C = \lambda_1 C + \lambda_2 C$; 举例说明非凸时不一定成立. (b) 证明任意锥族的交 $\bigcap_{i \in I} C_i$ 是锥. (c) 证明锥在线性变换下的像和逆像都是锥. (d) 证明两个锥的向量和 $C_1 + C_2$ 是锥. (e) 证明 C 为凸锥当且仅当 $C + C \subseteq C$ 且对每个 $\gamma > 0$ 有 $\gamma C \subseteq C$.

解答. (a) 同一点相加给 $(\lambda_1 + \lambda_2)C \subseteq \lambda_1 C + \lambda_2 C$. 反向, 对 $x_i \in C$,

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = (\lambda_1 + \lambda_2) \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} x_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} x_2 \right),$$

括号内由凸性属于 C . 非凸反例为 $C = \{0, v\}$, $v \neq 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$: $2C = \{0, 2v\}$, 而 $C + C = \{0, v, 2v\}$.

(b) 若 x 属于每个 C_i , 则 γx 也属于每个 C_i . (c) 若 $z = Ax$, $x \in C$, 则 $\gamma z = A(\gamma x) \in AC$; 若 $Ax \in C$, 则 $A(\gamma x) = \gamma Ax \in C$, 所以逆像也对正数倍封闭. (d) 若 $x = x_1 + x_2$, 则 $\gamma x = \gamma x_1 + \gamma x_2 \in C_1 + C_2$. (e) 凸锥中 $x + y = 2[(x + y)/2] \in C$. 反向, 两个假设给出锥性, 并使 $tx + (1 - t)y \in C$ 对 $0 < t < 1$ 成立; 两端点本来就在 C , 故 C 凸. □

习题 14.2 原题 2. 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空凸, $f = (f_1, \dots, f_m)$, 各 $f_i : C \rightarrow \mathbb{R}$ 凸. 设 $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 在包含 $f(C)$ 的某个凸集 D 上凸且按分量单调不减: 对 $u, v \in D$, $u \leq v$ 蕴含 $g(u) \leq g(v)$. 证明 $h(x) = g(f(x))$ 在 C 上凸. 若再有 $m = 1$, g 严格单调递增且 f 严格凸, 证明 h 严格凸.

解答. 对 $x, y \in C$, $0 \leq t \leq 1$, 各分量凸性给 $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$. 这两个向量都属于 D , 因而

$$h(tx + (1 - t)y) \leq g(tf(x) + (1 - t)f(y)) \leq th(x) + (1 - t)h(y).$$

在标量情形, $x \neq y$ 且 $0 < t < 1$ 时第一处不等式因严格凸性和严格单调性变为严格不等式, 即得严格凸性. □

习题 14.3 原题 3. 证明下列函数凸: (a) $f_1(x) = \log(\sum_{i=1}^n e^{x_i})$; (b) $f_2(x) = \|x\|^p, p \geq 1$; (c) $f_3(x) = e^{\beta x^\top A x}$, 其中 A 为半正定对称矩阵, $\beta > 0$; (d) $f_4(x) = f(Ax + b)$, 其中 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 凸, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m$.

解答. (a) 令 $S = \sum_i e^{x_i}, p_i = e^{x_i}/S$. 则 $\nabla^2 f_1 = \text{diag}(p) - pp^\top$, 所以

$$z^\top \nabla^2 f_1(x) z = \sum_i p_i z_i^2 - \left(\sum_i p_i z_i \right)^2 = \frac{1}{2S^2} \sum_{i,j} e^{x_i+x_j} (z_i - z_j)^2 \geq 0.$$

AI 修正: 官方双重求和式遗漏因子 $1/2$; 该遗漏不影响非负性结论, 但这里写出正确等式. (b) 任意范数凸, t^p 在 $[0, \infty)$ 上凸且单调不减, 用原题 2. (c) $x^\top A x$ 凸, $e^{\beta t}$ 凸且递增, 再用原题 2. (d) 仿射映射保凸组合, 将 $A(tx + (1-t)y) + b = t(Ax + b) + (1-t)(Ay + b)$ 代入 f 的凸性不等式即可. $\square$

习题 14.4 原题 4. 设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空有界. 证明 $\text{cl}(\text{conv } X) = \text{conv}(\text{cl } X)$. 特别地, 若 X 紧, 则 $\text{conv } X$ 紧.

解答. $\text{cl } X$ 紧. 由 Carathéodory 定理, $\text{conv}(\text{cl } X)$ 是紧集 $\Delta_{n+1} \times (\text{cl } X)^{n+1}$ 在映射 $(\alpha, x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto \sum_i \alpha_i x_i$ 下的像, 故紧且闭. 因 $\text{conv } X \subseteq \text{conv}(\text{cl } X)$, 取闭包得到一个包含. 另一方面 $\text{cl}(\text{conv } X)$ 是包含 $\text{cl } X$ 的凸集, 因而包含 $\text{conv}(\text{cl } X)$. 若 X 本身紧, 即有 $\text{conv } X = \text{cl}(\text{conv } X)$ 且紧. 这里复用定理 1.12 及其紧性推论. $\square$

习题 14.5 原题 5. 构造一个非凸集 X 中的点, 它具有延长性质, 却不属于 $\text{ri } X$. 延长性质指: 对每个 $x \in X$ 且 $x \neq \bar{x}$, 从 x 到 $\bar{x}$ 的线段能够越过 $\bar{x}$ 再延长一段, 延长后的点仍属于 X .

解答. 取 X 为平面上两条不同的相交直线之并, $\bar{x}$ 为交点. 任何 $x \in X$ 与 $\bar{x}$ 都在其中一条完整直线上, 因此可越过交点延长. 但 $\text{aff } X = \mathbb{R}^2$, 而 X 不包含交点附近的任何平面开球, 故 $\bar{x} \notin \text{ri } X$. X 非凸, 因为分别从两条线上选取非交点, 所得线段通常离开两条直线. $\square$

14.2 作业 2: 相对内部与最优解稳定性

习题 14.6 原题 1. (a) 设 C 非空凸锥, 证明 $\text{cl } C$ 与 $\text{ri } C$ 都是凸锥. (b) 若 $C = \text{cone}\{x_1, \dots, x_m\}$, 证明 $\text{ri } C = \{\sum_{i=1}^m a_i x_i : a_i > 0\}$.

解答. (a) 闭包和相对内部的凸性见第 2 章. 正数倍映射 $x \mapsto \gamma x$ 是 $\text{aff } C$ 上的同胚, 且 $\gamma C = C$, 因此 $\gamma \text{cl } C = \text{cl } C$, $\gamma \text{ri } C = \text{ri } C$. (b) 令 $A(a) = \sum_i a_i x_i$. 相对内部在线性像下交换, 故 $\text{ri } C = \text{ri}(A\mathbb{R}_+^m) = A(\text{ri } \mathbb{R}_+^m) = A\mathbb{R}_{++}^m$. 即使生成向量线性相关或包含零向量, 此公式仍成立. $\square$

习题 14.7 原题 2. 设 C_1, C_2 凸, 证明 $C_1 \cap \text{ri } C_2 \neq \emptyset$ 当且仅当 $\text{ri}(C_1 \cap \text{aff } C_2) \cap \text{ri } C_2 \neq \emptyset$.

解答. 反向由相对内部包含于原集合即得. 正向取 $x \in C_1 \cap \text{ri } C_2$, 令 $D = C_1 \cap \text{aff } C_2$. D 非空凸, 取 $z \in \text{ri } D$. 若 $z = x$, 已有结论. 否则 $x_t = (1-t)x + tz$ 在 $0 < t \leq 1$ 时属于 $\text{ri } D$, 而在充分小的 $t > 0$ 时由 x 的相对内点性质属于 $\text{ri } C_2$. 因此交集非空. $\square$

习题 14.8 原题 3. (a) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在以 x^* 为中心的某个球形邻域内凸. 证明: x^* 为局部极小点当且仅当沿经过 x^* 的每条直线都是局部极小点, 即每个 $d \in \mathbb{R}^n$ 对应的 $g(\alpha) = f(x^* + \alpha d)$ 在 $\alpha = 0$ 有局部极小值. (b) 设 $0 < p < q$, $f(x_1, x_2) = (x_2 - px_1^2)(x_2 - qx_1^2)$. 证明 $(0, 0)$ 沿每条经过原点的直线局部极小, 但当 $p < m < q$ 且 $y \neq 0$ 时 $f(y, my^2) < 0$, 因而并非二维局部极小点.

解答. (a) 必要性直接成立. 若球内有 y 使 $f(y) < f(x^*)$, 则对每个 $0 < t < 1$, $f(x^* + t(y - x^*)) \leq (1-t)f(x^*) + tf(y) < f(x^*)$. 这在线方向 $d = y - x^*$ 上产生任意近的下降点, 与线上的局部极小矛盾. 原文 sphere 在这里必须按包含内部的球形邻域理解. (b) 沿方向 $d = (d_1, d_2)$, $g(\alpha) = \alpha^2(d_2 - p\alpha d_1^2)(d_2 - q\alpha d_1^2)$. 若 $d_2 \neq 0$, 充分小的 $|\alpha|$ 使两括号同号, 因而 $g(\alpha) \geq 0$. 若 $d_2 = 0$, 则 $g(\alpha) = pq\alpha^4 d_1^4 \geq 0$. 但 $f(y, my^2) = y^4(m-p)(m-q) < 0$, 且 $(y, my^2) \rightarrow (0, 0)$ 当 $y \rightarrow 0$. $\square$

习题 14.9 原题 4. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 满行秩, $c \in \mathbb{R}^n$. (a) 用投影定理证明 $\min_{Ax=0} (\|x\|^2/2 + c^\top x)$ 的唯一解为 $x^* = -(I - A^\top(AA^\top)^{-1}A)c$. (b) 设 $Q \succ 0$ 对称, $A\bar{x} = b$. 用 $y = Q^{1/2}(x - \bar{x})$ 将 $\min_{Ax=b} \{(x - \bar{x})^\top Q(x - \bar{x})/2 + c^\top(x - \bar{x})\}$ 化为 (a), 并证明 $x^* = \bar{x} - Q^{-1}(c - A^\top \lambda)$, $\lambda = (AQ^{-1}A^\top)^{-1}AQ^{-1}c$. (c) 将 (b) 用于 $\min_{Ax=b} (x^\top Qx/2 + c^\top x)$, 证明 $x^* = -Q^{-1}[c - A^\top \lambda - A^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1}b]$, 其中 λ 如 (b).

解答. (a) 配方后目标为 $\|x + c\|^2/2 - \|c\|^2/2$, 故在 $\ker A$ 上投影 $-c$. $P = I - A^\top(AA^\top)^{-1}A$ 满足 $AP = 0$, 而 $c - Pc \in \text{range}(A^\top) = (\ker A)^\perp$, 所以投影为 $-Pc$. 投影定理给唯一性. (b) 新约束为 $AQ^{-1/2}y = 0$, 新目标为 $\|y\|^2/2 + (Q^{-1/2}c)^\top y$. 令 $B = AQ^{-1/2}$, 用 (a) 再乘 $Q^{-1/2}$ 得所示结果. $BB^\top = AQ^{-1}A^\top \succ 0$, 所需逆矩阵存在. (c) 取 $\bar{x} = Q^{-1}A^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1}b$. 这满足 $A\bar{x} = b$, 且对全部可行 x , $x^\top Q\bar{x} = b^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1}b$ 为常数. 展开 (b) 目标, 它与 (c) 目标只差常数, 代回即得公式. 也可直接验算

$$Ax^* = b, \quad Qx^* + c = A^\top(AQ^{-1}A^\top)^{-1}(AQ^{-1}c + b),$$

并由严格凸性确认唯一性. $\square$

习题 14.10 原题 5. 设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 闭凸, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ 闭凸, $X \cap \text{dom } f \neq \emptyset$, 且 f 与 X 没有共同非零衰退方向. 记非空紧的极小点集为 X^* , $f^* = \inf_{x \in X} f(x)$. (a) 证明每个 $\varepsilon > 0$ 对应某个 $\delta > 0$, 使 $x \in X$, $f(x) \leq f^* + \delta$ 蕴含 $\text{dist}(x, X^*) \leq \varepsilon$. (b) 若 f 全空间实值, 证明每个 $\delta > 0$ 对应某个 $\varepsilon > 0$, 使 $x \in X$, $\text{dist}(x, X^*) \leq \varepsilon$ 蕴含 $f(x) \leq f^* + \delta$. (c) 证明任何 $x_k \in X$, $f(x_k) \rightarrow f^*$ 的序列有界, 且所有聚点属于 X^* .

解答. 每个非空有限水平集 $K_\gamma = X \cap \{f \leq \gamma\}$ 闭凸, 其衰退锥为 $\text{rec } X \cap \text{rec } f = \{0\}$, 故紧. (a) 若结论失败, 可取 $f(x_k) \leq f^* + 1/k$, $\text{dist}(x_k, X^*) > \varepsilon$. 全序列在紧集 K_{f^*+1} 中, 子序列趋于 $\bar{x} \in X$. 下半连续性给 $f(\bar{x}) \leq f^*$, 因而 $\bar{x} \in X^*$, 与距离条件矛盾. (b) 若失败, 存在 $x_k \in X$, $x_k^* \in X^*$ 使 $\|x_k - x_k^*\| \leq 1/k$ 而 $f(x_k) > f^* + \delta$. 紧性使一个子序列 $x_k^* \rightarrow x^* \in X^*$, 从而 $x_k \rightarrow x^*$. 全空间实值凸函数连续, 得 $f(x_k) \rightarrow f^*$, 矛盾. (c) **AI 补证:** 官方解答只证聚点性质, 未明确补齐有界性. 序列的尾部位于 K_{f^*+1} , 有限个首项也有界, 故全序列有界. 任一聚点由 X 闭及 f 下半连续性属于 X^* . $\square$

14.3 作业 3: 回缩、分离与部分极小化

习题 14.11 原题 1. (a) 用二阶锥 $C = \{(u, v, w) : \|(u, v)\| \leq w\}$ 、衰退方向 $d = (1, 0, 1)$ 及渐近序列 $x_k = (k, \sqrt{k}, \sqrt{k^2 + k})$ 说明非多面体闭凸锥不一定可回缩. (b) 将 C 写成无限多个闭半空间的交, 说明无限个可回缩嵌套集合序列的逐项交不一定可回缩.

解答. (a) $x_k \in \partial C$, $\|x_k\| \rightarrow \infty$, 且 $x_k/\|x_k\| \rightarrow d/\|d\|$. $d \in C = \text{rec } C$. 然而

$$(k-1)^2 + k - (\sqrt{k^2 + k} - 1)^2 = 2(\sqrt{k^2 + k} - k) > 0.$$

所以 $x_k - d \notin C$ 对全部 $k \geq 1$ 成立, 该渐近序列不可回缩. (b) Cauchy-Schwarz 不等式及取等给 $\|(u, v)\| = \max_{s^2+t^2=1}(su+tv)$, 因而 $C = \bigcap_{s^2+t^2=1} \{(u, v, w) : su+tv \leq w\}$. 每个半空间构成一个可回缩的常值嵌套序列, 其无限逐项交是不可回缩的常值序列 $C_k = C$. $\square$

习题 14.12 原题 2. 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空凸, $M \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空仿射. 证明 $M \cap \text{ri } C = \emptyset$ 当且仅当存在包含 M 的超平面 H , 使 $\text{ri } C$ 位于 H 的一个开半空间内.

解答. 必要性直接成立. 正向, 因 $\text{ri } M = M$, 适当分离定理给 $a \neq 0$ 使 $a^\top m \leq a^\top x$ 对所有 $m \in M, x \in C$ 成立, 且两集不同时包含在同一超平面内. 在仿射集上, 此上界强制 a 垂直于 M 的方向空间, 故 $a^\top m = b$ 为常数. 于是 $H = \{x : a^\top x = b\}$ 包含 M, C 在其闭上侧. 若某个相对内点也取等, 线性泛函在 C 上的相对内点取得最小值, 必在 C 上恒为 b , 与适当分离矛盾. 因而所有相对内点都严格位于上侧. $\square$

习题 14.13 原题 3. 设 C_1, C_2 非空凸, $B = \{x : \|x\| \leq 1\}$. 若存在 $\varepsilon > 0$ 使 $C_1 + \varepsilon B$ 与 $C_2 + \varepsilon B$ 分别位于超平面 H 的两个开半空间, 称 H 强分离 C_1, C_2 . (a) 证明下列三个条件等价: (i) 存在强分离超平面; (ii) 存在 $a \in \mathbb{R}^n$ 使 $\inf_{C_1} a^\top x > \sup_{C_2} a^\top x$; (iii) $\inf_{x_i \in C_i} \|x_1 - x_2\| > 0$, 即 $0 \notin \text{cl}(C_2 - C_1)$. (b) 若 C_1, C_2 不交, 证明教材命题 1.5.3 中的五个条件中的任一个都保证强分离. 经课程官方汇总原文核实, 五个条件为:

- (1) $C_2 - C_1$ 闭;
- (2) C_1 闭, C_2 紧;
- (3) C_1, C_2 均为多面体;
- (4) 两集闭且 $\text{rec } C_1 \cap \text{rec } C_2 = L_{C_1} \cap L_{C_2}$;
- (5) C_1 闭, C_2 多面体, 且 $\text{rec } C_1 \cap \text{rec } C_2 \subseteq L_{C_1}$.

解答. (a) (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 $H = \{x : a^\top x = b\}$, 第一集在上侧. 将每个 $x_1 \in C_1$ 向 $-a$ 方向移动 ε 得 $a^\top x_1 > b + \varepsilon\|a\|$, 同理 $a^\top x_2 < b - \varepsilon\|a\|$; 取上下确界仍有正间隔. (ii) $\Rightarrow$ (iii): 设间隔为 $\eta > 0$. a 非零, 且 $\|a\|\|x_1 - x_2\| \geq a^\top(x_1 - x_2) \geq \eta$. (iii) $\Rightarrow$ (i): 令 $D = \text{cl}(C_1 - C_2)$, $z = P_D(0) \neq 0$. 投影不等式给 $z^\top(x_1 - x_2) \geq \|z\|^2$. 固定 C_2 中一点给 C_1 上泛函的有限下界, 固定 C_1 中一点给 C_2 上泛函的有限上界; 两集各自非空又给反方向的有限界, 故 $\inf_{C_1} z^\top x$ 与 $\sup_{C_2} z^\top x$ 均为有限实数, 且前者比后者至少大 $\|z\|^2$. 取两高度中点作 b , 再取 $0 < \varepsilon < \|z\|/2$, 即得强分离.

(b) 官方解答明确以“条件 (2)–(5) 各蕴含条件 (1)”完成证明; 这里补齐该依赖的可核内容. 条件 (2) 由紧集分量取收敛子序列, 使闭集与紧集的差闭; 条件 (3) 由多面体线性像为多面体. 条件 (4) 令 $D = C_2 \times C_1$, $A(x_2, x_1) = x_2 - x_1$. 则 $\text{rec } D \cap \ker A$ 中的点为 (d, d) , 其中 d 是共同衰退方向; 假设使它属于 L_D . 定理 3.5 给 $AD = C_2 - C_1$ 闭. 条件 (5) 在同一定理的回缩版本中取 $X = C_2 \times \mathbb{R}^n$, $D = \mathbb{R}^n \times C_1$; X 为多面体, 共同的零像方向 (d, d) 由条件属于 L_D , 故差集仍闭. 因两集不交, $0 \notin C_2 - C_1 = \text{cl}(C_2 - C_1)$, 再用 (a). 五条件来源是官方汇总命题 1.5.3, 非猜测外书缺题. $\square$

习题 14.14 原题 4. 若全部水平集 $V_\gamma = \{x : f(x) \leq \gamma\}$ 凸, 称 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ 拟凸. 设 X 凸且 $X \cap \text{dom } f \neq \emptyset$, $f^* = \inf_X f$. (a) 假设 f 不在 X 中任何非退化线段上恒等于某个实数 c . 证明 f 在 X 上每个局部极小点都是全局极小点. (b) 再设 X 闭, f 闭且真. 对 $\Gamma = \{\gamma : \gamma > f^*\}$, 令 $R_f = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \text{rec } V_\gamma$, $L_f = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} L_{V_\gamma}$. 仿照教材命题 3.2.4, 证明下列条件任一个都使 f 在 X 上取到最小值: (1) $\text{rec } X \cap R_f = L_X \cap L_f$; (2) X 是多面体, $\text{rec } X \cap R_f \subseteq L_f$.

解答. (a) 沿用优化中的惯例, 局部极小点 x^* 必须满足 $f(x^*) < \infty$. 若存在 $y \in X$ 使 $f(y) < f(x^*)$, 拟凸性给 $f((1-t)x^* + ty) \leq f(x^*)$. 局部极小性又使足够小的 $t \geq 0$ 上此值不小于 $f(x^*)$, 因而在一条非退化线段上恒等于实数 $f(x^*)$, 矛盾. **AI 条件说明:** 若把 $+\infty$ 的点也称作局部极小点, 原陈述不成立. 例如 $f(x) = x$ 对 $x < 0$, 其余为 $+\infty$, 在 $X = \mathbb{R}$ 上拟凸且无实数常值线段, 但任何 $x > 0$ 的邻域内均为 $+\infty$. 此处明确正常的有限目标值约定.

(b) 选严格递减的有限实数 $\gamma_k \downarrow f^*$; 若 $f^* = -\infty$, 取 $\gamma_k \rightarrow -\infty$. $K_k = X \cap V_{\gamma_k}$ 均非空闭凸且嵌套. 共同衰退锥为 $\text{rec } X \cap R_f$, 共同线性空间为 $L_X \cap L_f$. 条件 (1) 下, 在共同线性空间 L 的正交补中选取各 K_k 离原点最近的点. 若此序列无界, 取规范化极限方向 d ; 闭凸射线判据使 $d \in \bigcap_k \text{rec } K_k = L$, 而所选点及 d 均在 $L^\perp$, 与 $d \neq 0$ 矛盾. 因而序列有界, 子序列极限属于全部 K_k . 条件 (2) 下, X 是可回缩集, 对 $C_k = V_{\gamma_k}$ 使用定理 3.3, 得交非空. 两种情形中交内点均满足 $f(x) \leq \inf_k \gamma_k = f^*$. 因 f 真, 这同时排除了 $f^* = -\infty$, 所以确有有限最小值. $\square$

习题 14.15 原题 5. 设 $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow (-\infty, \infty]$ 闭真凸, $X = \{x : \inf_z F(x, z) < \infty\}$, 并假设各纤维 $F(x, \cdot)$ 对 $x \in X$ 闭. (a) 若某个 $\bar{x} \in X$ 的纤维极小点集非空紧, 证明所有 $x \in X$ 都有非空紧的纤维极小点集. (b) 若所有纤维在 $\mathbb{R}^m$ 上可微, 证明对每个 $d \in \mathbb{R}^m$, $\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \nabla_z F(x, z + \alpha d)^\top d$ 与 $x \in X, z \in \mathbb{R}^m$ 无关.

解答. 官方解答重构并补齐依赖. 闭凸集含有从某一点出发的射线, 就有相应全局衰退方向. 对 $\text{epi } F$ 应用该判据, 得每个非空纤维水平集的衰退锥均为 $K = \{d : (0, d, 0) \in \text{rec}(\text{epi } F)\}$, 与纤维基点无关. 更一般地, 纤维的衰退函数满足 $F(x, \cdot)^\infty(d) = F^\infty(0, d)$. (a) 在 $\bar{x}$ 的紧极小点集, 补零高度后的衰退锥为 $\{0\}$, 因而 $K = \{0\}$. 每个纤维的非空闭凸水平集遂有界且紧. 在其中任一非空有限水平集上用下半连续性取最小值, 得到最优值有限、极小点集非空紧. 这也复用了定理 3.6 的纤维论证. (b) 对一维凸可微函数 $\psi(t) = F(x, z + td)$, ψ' 单调, 且对 $t > 0$, $[\psi(t) - \psi(0)]/t \leq \psi'(t) \leq [\psi(2t) - \psi(t)]/t$. 若 $s = \lim_{t \rightarrow \infty} [\psi(t) - \psi(0)]/t$ 有限, 右端也趋于 s ; 若 $s = +\infty$, 左端也使导数趋于 $+\infty$. 故导数极限为 $s = F^\infty(0, d)$, 与 x, z 无关. $\square$

14.4 作业 4: 共轭、支持函数与鞍点

习题 14.16 原题 1. 设 $p > 1$, $f(x) = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n |x_i|^p$. 若 $1/p + 1/q = 1$, 证明 $f^*(y) = \frac{1}{q} \sum_i |y_i|^q$.

解答. 此题对应正文例题3.2中的幂函数共轭, 复用其标量结论. 对每个坐标, 最大点满足 $y_i = \text{sgn}(x_i)|x_i|^{p-1}$, 从而 $y_i x_i = |x_i|^p = |y_i|^q$, 最大值为 $(1 - 1/p)|y_i|^q = |y_i|^q/q$. 坐标互不耦合, 各自上确界求和即为 f^* . $\square$

习题 14.17 原题 2. (a) 设 f_1, f_2 闭真凸. 证明 $f_1 \leq f_2$ 当且仅当 $f_1^* \geq f_2^*$, 两个不等式均指逐点成立. (b) 设 C_1, C_2 非空闭凸. 证明 $C_1 \subseteq C_2$ 当且仅当对每个 y , $\sigma_{C_1}(y) \leq \sigma_{C_2}(y)$. 举例说明去掉闭性后结论可能失败.

解答. (a) 从 $x^\top y - f_1(x) \geq x^\top y - f_2(x)$ 取上确界, 得正向. 对 $f_1^* \geq f_2^*$ 再取共轭, 并用 $f_i^{**} = f_i$, 得反向. 官方正向公式最后一个上确界误写为 f_1 ; 此处改正为 f_2 . (b) $C_1 \subseteq C_2$ 等价于 $\delta_{C_1} \geq \delta_{C_2}$. 指示函数的共轭是支持函数, 用 (a). 若 $C_1 = [0, 1]$, $C_2 = (0, 1)$, 两者支持函数相同但 $C_1 \not\subseteq C_2$. 因而闭性不能同时取消. **AI 精化:** 反向推论其实只需 C_2 闭凸, 不需 C_1 闭; 原题 “ C_1, C_2 的闭性必要” 应理解为取消闭性假设会使统一陈述失败, 不能理解为两边的闭性分别必要. $\square$

习题 14.18 原题 3. 设 $X_1, \dots, X_r \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空. 求以下四个集合的支持函数: $X_1 + \dots + X_r$; $\text{conv } X_1 + \dots + \text{conv } X_r$; $\bigcup_{j=1}^r X_j$; $\text{conv}(\bigcup_{j=1}^r X_j)$.

解答. 前两个支持函数均为 $\sum_{j=1}^r \sigma_{X_j}(y)$, 后两个均为 $\max_{1 \leq j \leq r} \sigma_{X_j}(y)$. 第一式由 $\sup_{x_j \in X_j} y^\top \sum_j x_j = \sum_j \sup_{x_j \in X_j} y^\top x_j$; 第二式由线性泛函在集合及其凸包上的上确界相同. 对有限并, 在每个分支上取上确界后再取有限最大值即可, 再次取凸包不改变结果. 非空性使各支持函数不取 $-\infty$, 所以这些含 $+\infty$ 的公式无不定和问题. $\square$

习题 14.19 原题 4. 设 X, Z 为非空紧实区间. 对函数 $\phi(x, z)$, 假设每个 $z \in Z$ 的 $\phi(\cdot, z)$ 在 X 上有唯一极小点 $\hat{x}(z)$, 每个 $x \in X$ 的 $\phi(x, \cdot)$ 在 Z 上有唯一极大点 $\hat{z}(x)$, 且两映射均连续. 证明存在鞍点 (x^*, z^*) . 据此研究 $\phi(x, z) = x^2 + z^2$, $X = Z = [0, 1]$ 的鞍点.

解答. 设 $X = [a, b]$. 连续映射 $T(x) = \hat{x}(\hat{z}(x))$ 从 X 到自身. 若 $a = b$, 直接有不动点; 否则 $T(a) - a \geq 0$, $T(b) - b \leq 0$, 中间值定理给 $T(x^*) = x^*$. 令 $z^* = \hat{z}(x^*)$, 则 $x^* = \hat{x}(z^*)$, 因而对全部 $x \in X, z \in Z$, $\phi(x^*, z) \leq \phi(x^*, z^*) \leq \phi(x, z^*)$. 例中 $\hat{x}(z) = 0$, $\hat{z}(x) = 1$, 唯一鞍点为 $(0, 1)$, 鞍点值为 1. 目标对 z 也凸不妨碍此受限区间上的鞍点存在. $\square$

习题 14.20 原题 5. 在扰动框架中设 $F(x, u) = f_1(x) + f_2(Ax + u)$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, f_1, f_2 为相应空间上的闭凸函数. 证明 $q(\mu) = -f_1^*(A^\top \mu) - f_2^*(-\mu)$. 原题指出这是教材第 5.3.5 节的 Fenchel 对偶框架.

解答. 使用本书扰动对偶的定义 $q(\mu) = \inf_{x,u} [F(x,u) + \mu^\top u]$. 令 $z = Ax + u$, 则

$$q(\mu) = \inf_{x,z} \{f_1(x) - (A^\top \mu)^\top x + f_2(z) + \mu^\top z\} = -f_1^*(A^\top \mu) - f_2^*(-\mu).$$

AI 条件说明: 原题只写“闭凸”, 未显写真性. 若 f_1, f_2 均为真函数, 两个分离下确界只取有限值或 $-\infty$, 公式明确成立. 不能把它宣称为包括不真函数的无条件等式: 例如 $f_1 \equiv +\infty, f_2 \equiv 0, A = 0, \mu \neq 0$, 则由定义 $q(\mu) = +\infty$, 但右端 $-f_1^*(0) - f_2^*(-\mu) = +\infty - \infty$ 未定义. 这种退化情形须按 q 的定义处理. 公式本身不宣称强对偶. $\square$

14.5 作业 5: 乘子、扰动与整数规划

习题 14.21 原题 1. 原凸规划为 $\min\{f(x) : x \in X, g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, r\}$. 设 $X = \{x : l_i(x) = 0, i = 1, \dots, m; g_j(x) \leq 0, j = r+1, \dots, \bar{r}\}$. 将所有等式和 $\bar{r}$ 个不等式均显式写出, 称为扩展表示. 证明: 若扩展表示无对偶间隙且有对偶最优解, 则原表示也如此.

解答. 设扩展最优乘子为 $\lambda_i^* \in \mathbb{R}$ 与 $\mu_j^* \geq 0$, 则 $f^* = \inf_x [f(x) + \sum_i \lambda_i^* l_i(x) + \sum_{j=1}^{\bar{r}} \mu_j^* g_j(x)]$. 对 $x \in X$, 等式项为零, 新增不等式项非正, 所以 $f^* \leq f(x) + \sum_{j=1}^r \mu_j^* g_j(x)$. 对 X 取下确界得 $f^* \leq q(\mu_1^*, \dots, \mu_r^*) \leq f^*$, 最后一步为弱对偶. 因而截取前 r 个不等式乘子就是原问题的最优乘子. **AI 修正:** 官方解答误把等式乘子也写成非负; 等式乘子无符号限制, 且它们不是仍保留抽象集约束的原问题的对偶变量. $\square$

习题 14.22 原题 2. 对参数规划 $\min\{f(x) : x \in X, g(x) \leq u\}$, 两个不同参数 $\bar{u}, \tilde{u}$ 的有限最优值分别为 $\bar{f}, \tilde{f}$, 最优乘子分别为 $\bar{\mu}, \tilde{\mu}$, 且均无对偶间隙. 证明 $\tilde{\mu}^\top(\tilde{u} - \bar{u}) \leq \bar{f} - \tilde{f} \leq \bar{\mu}^\top(\tilde{u} - \bar{u})$.

解答. 记 $q_u(\mu) = \inf_{x \in X} [f(x) + \mu^\top(g(x) - u)]$. 则 $\bar{f} = q_{\bar{u}}(\bar{\mu}) \geq q_{\bar{u}}(\tilde{\mu}) = q_{\tilde{u}}(\tilde{\mu}) + \tilde{\mu}^\top(\tilde{u} - \bar{u}) = \tilde{f} + \tilde{\mu}^\top(\tilde{u} - \bar{u})$. 交换两组参数再整理即得另一侧. 两个估计表达最优乘子对最优值变动的支持界. $\square$

习题 14.23 原题 3. 设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空凸, $g_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 X 上凸. 证明 $g_j(x) < 0$ ($j = 1, \dots, r$) 在 X 中无解当且仅当存在 $\mu \geq 0, \sum_j \mu_j = 1$, 使 $\mu^\top g(x) \geq 0$ 对全部 $x \in X$ 成立. 提示: 考虑 $\min_{x \in X, y \in \mathbb{R}} \{y : g_j(x) \leq y\}$.

解答. 若有此乘子, 对全部分量严格负的 $g(x)$, 非负权重和为 1 会给 $\mu^\top g(x) < 0$, 矛盾. 反向按提示构造辅助凸规划. 其值为 $v = \inf_X \max_j g_j(x)$; 无严格可行解时 $0 \leq v < \infty$. 在 $\text{ri } X$ 选一点 x_0 , 再取 $y_0 > \max_j g_j(x_0)$, 即有 Slater 点. 故辅助问题无间隙且最优乘子存在. 其对偶函数为

$$q(\mu) = \begin{cases} \inf_{x \in X} \mu^\top g(x), & \sum_j \mu_j = 1, \\ -\infty, & \sum_j \mu_j \neq 1. \end{cases}$$

最优乘子 $\mu \geq 0$ 满足和为 1, 且其下确界等于 $v \geq 0$, 即得所需不等式. 先确认辅助最优值有限, 再用乘子存在定理. $\square$

习题 14.24 原题 4. 设 X 凸, f, g_j 在 X 上凸, 原题假设“至少有一个可行解”. 本题沿用教材第 5.3 节目标和约束在 X 上实值的约定, 因而这个可行解具有有限目标值; 此条件说明并非新增一项原题假设. 记扰动函数 $p(u) = \inf\{f(x) : x \in X, g(x) \leq u\}$, $M = \{(u, w) : \exists x \in X, g(x) \leq u, f(x) \leq w\}$. 证明下列等价: (i) 对偶最优值 $q^* = \sup_{\mu \in \mathbb{R}^r} q(\mu)$ 有限; (ii) p 真; (iii) M 不含竖直线. 此处按扰动对偶定义 $q(\mu) = \inf_u [p(u) + \mu^\top u]$, 对负分量乘子自动为 $-\infty$.

解答. AI 修正证明. 因 $p(0) < \infty$, p 不恒为 $+\infty$, 且 $q(\mu) \leq p(0)$. 若 $p(u_0) = -\infty$, 则所有 $q(\mu) = -\infty$, 所以 (i) 蕴含 (ii). 若 p 真凸, 有仿射下界 $p(u) \geq a^\top u + b$, 取 $\mu = -a$ 得 $q(\mu) \geq b > -\infty$, 再结合 $q(\mu) \leq p(0) < \infty$ 得 (i).

对任意固定 u , $p(u) = -\infty$ 当且仅当每个 $w \in \mathbb{R}$ 都有某个 x 满足 $g(x) \leq u, f(x) \leq w$, 即当且仅当 $\{u\} \times \mathbb{R} \subseteq M$. 这直接证明 (ii) 与 (iii) 等价. 不需声称 $\text{epi } p = \text{cl } M$; 该等式在 p 不闭时错误, 例如 2010 年期中题 2 的 $p(0) = 1$, 而 $\text{cl } M$ 在 $u = 0$ 含全部 $w \geq 0$. **AI 条件说明:** 若把本题推广到扩展实值目标, 却允许所有可行点的目标均为 $+\infty$, 原等价性可能失败. 例如 $X = \mathbb{R}, g(x) = x, f = \delta_{[1, \infty)}$. 形式可行点 $x \leq 0$ 全部目标无穷; 此时 $p(u) = 0$ 对 $u \geq 1$, 其余为 $+\infty$, 是真凸函数, 且 $M = [1, \infty) \times [0, \infty)$ 无竖线, 但 $q(\mu) = \mu$ 对 $\mu \geq 0, q^* = +\infty$. 因而证明中 $p(0) < \infty$ 不能取消. $\square$

习题 14.25 原题 5. 设 $F(x, y)$ 真凸, $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom } F$, $\partial_x F, \partial_y F$ 分别为固定另一变量后的次微分. (a) 证明 $\partial F(\bar{x}, \bar{y}) \subseteq \partial_x F(\bar{x}, \bar{y}) \times \partial_y F(\bar{x}, \bar{y})$, 并给出严格包含的例子. (b) 若 $F(x, y) = h_1(x) + h_2(y) + h(x, y)$, 其中 h_1, h_2 真凸, h 全空间实值凸且可微, 证明 (a) 中的包含为等号.


解答. (a) 全次梯度不等式中先固定 $y = \bar{y}$, 再固定 $x = \bar{x}$, 即得两分量分别为偏次梯度. 对 $F(x, y) = |x + y|$, 在 $(0, 0)$ 处, $\partial F = \{(t, t) : |t| \leq 1\}$, 而 $\partial_x F \times \partial_y F = [-1, 1]^2$, 严格包含. (b) 次微分和法则可用, 因 h 全空间有限, 且 $h_1(x) + h_2(y)$ 的定义域为笛卡尔积. 得 $\partial F = [\partial h_1(\bar{x}) \times \partial h_2(\bar{y})] + \{\nabla h(\bar{x}, \bar{y})\}$. 两偏次微分分别为 $\partial h_1(\bar{x}) + \nabla_x h$ 与 $\partial h_2(\bar{y}) + \nabla_y h$, 故等号成立, 包括某个次微分为空的情形. $\square$

习题 14.26 原题 6. 设 $\min\{f(x) : x \in X, g(x) \leq 0\}$ 的拉格朗日函数 $L(x, \mu) = f(x) + \mu^\top g(x)$ 对每个 $\mu \geq 0$ 都在 X 上取到下确界. 证明: 若有对偶间隙, 则 $q(\mu) = \inf_X L(x, \mu)$ 在每个对偶最优解处不可微. 提示: 若 q 在最优 μ^* 处可微, 则 $\partial_j q(\mu^*) \leq 0, \mu_j^* \partial_j q(\mu^*) = 0$; 结合拉格朗日极小点证明没有间隙.

解答. 反设某最优 μ^* 处 q 可微, 此处可微指原题使用的通常全空间导数. 在非负正交域上的最大化一阶条件给 $\nabla q(\mu^*) \leq 0, (\mu^*)^\top \nabla q(\mu^*) = 0$. 取 $x^* \in \text{argmin}_X L(x, \mu^*)$. 对每个 $\mu, q(\mu) \leq L(x^*, \mu) = q(\mu^*) + g(x^*)^\top (\mu - \mu^*)$, 所以 $g(x^*)$ 为凹函数 q 的超梯度; 可微性给 $g(x^*) = \nabla q(\mu^*)$. 因而 x^* 可行, 且 $(\mu^*)^\top g(x^*) = 0$. 于是 $q^* = L(x^*, \mu^*) = f(x^*) \geq f^* \geq q^*$, 无间隙, 矛盾. 若没有对偶最优解, 原题结论为关于空集的命题, 并不保证最优乘子存在. $\square$

习题 14.27 原题 7. 考虑 $\min(10x_1 + 3x_2)$, 约束 $5x_1 + x_2 \geq 4, x_1, x_2 \in \{0, 1\}$. (a) 画约束-费用点集 $\{(4 - 5x_1 - x_2, 10x_1 + 3x_2) : x_i \in \{0, 1\}\}$. (b) 描述相应的 MC/MC 框架. (c) 解原、对偶问题并联系 (a) 图.

解答. (a) 四点依次为 $(4, 0), (3, 3), (-1, 10), (-2, 13)$.



(b) 对各点加非负正交域得到 $M = \{(u, w) : \exists x, g(x) \leq u, f(x) \leq w\}$; 原最优值是 M 与竖轴交点的最低高度, 对偶值为支持直线 $w + \mu u = \xi, \mu \geq 0$, 的最大截距. (c) 原问题只有 $(1, 0), (1, 1)$ 可行, 最优解 $(1, 0), f^* = 10$. 枚举四个拉格朗日值给

$$q(\mu) = \min\{4\mu, 3 + 3\mu, 10 - \mu, 13 - 2\mu\} = \begin{cases} 4\mu, & 0 \leq \mu \leq 2, \\ 10 - \mu, & 2 \leq \mu \leq 3, \\ 13 - 2\mu, & \mu \geq 3. \end{cases}$$

因此唯一最优乘子 $\mu^* = 2, q^* = 8$, 间隙为 2. 支持线 $w + 2u = 8$ 经过 $(4, 0), (-1, 10)$, 在竖轴的截距为 8; 真正可行的整数点最低费用仍为 10. $\square$

15 6.253 期中考试题与解答

本章按原件分别保留 Spring 2010 和 Spring 2012 的考试, 不把两年的问题合并成一场考试. 官方库存提供的是含题面的解答文件, 2010 年有 2 个主问题、11 个编号作答项, 2012 年有 2 个主问题、14 个编号作答项. 判断题原要求不必说明理由; 为便于复核, 本稿补入简洁证明或反例. 官方给出的答案与 AI 独立补解、修正均在相应处区分.

15.1 2010 年春季期中考试

原件署名 Prof. Dimitri P. Bertsekas. 判断题每项 8 分, 共 48 分; 第 2 题各项 10、15、5、15、7 分, 共 52 分; 全卷 100 分. 原件未载具体考试日期或时长, 不能补造.

习题 15.1 原题 1. 判断以下陈述真伪, 不必说明理由.

- (1) 若凸集 X_1, X_2 可由超平面分离, 且 X_1 开, 则二者不交.
- (2) 若凸函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足某个 $\gamma > 0$ 下 $|f(x)| \leq \gamma$ 对所有 x 成立, 则 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$ 有解.
- (3) 集合 $\{(x_1, x_2) : |x_1| + |x_2| = 1\}$ 的支持函数为 $\sigma(y) = \max\{y_1, y_2\}$.
- (4) 若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ 凸, 且 $\partial f(\bar{x}) \neq \emptyset$, 则 f 在 $\bar{x}$ 下半连续.
- (5) 对 $M = \{(u, w) : u \in \mathbb{R}, |u| \leq w\}$, MC/MC 对偶函数对所有 $\mu \in \mathbb{R}$ 都有 $q(\mu) = 0$.

(6) 若 f 凸, S 是线性子空间, $\bar{x} \in S$, $\partial f(\bar{x}) \cap S^\perp \neq \emptyset$, 则 $\bar{x}$ 在 S 上最小化 f .

解答. 官方答案: 真、真、假、真、假、真. 以下理由为 AI 补证. (1) 分离超平面的一侧含 X_1 , 而开集不可能包含位于界面上的点, 故 X_1 在开侧, 与另一闭侧中的 X_2 不交. (2) 实际上 f 必为常数. 若 $f(y) > f(x)$, 将线段沿 $y - x$ 方向延长, 凸性给 $f(x + t(y - x)) \geq f(x) + t[f(y) - f(x)]$ 对 $t > 1$, 与有界矛盾. 任一点皆为最优解. (3) 正确支持函数为 $\max\{|y_1|, |y_2|\}$, 因线性泛函在菱形的四个顶点 $\pm e_i$ 取最大值; 例如 $y = (-1, 0)$ 原式给 0 而真值为 1. (4) 取 $s \in \partial f(\bar{x})$, 则 $f(x) \geq f(\bar{x}) + s^\top(x - \bar{x})$. 对 $x \rightarrow \bar{x}$ 取下极限即可. (5) $q(\mu) = \inf_u(|u| + \mu u)$, 当 $|\mu| \leq 1$ 为 0, 当 $|\mu| > 1$ 为 $-\infty$, 故并非对所有乘子都为 0. (6) 取 $s \in \partial f(\bar{x}) \cap S^\perp$. 对 $x \in S$, $s^\top(x - \bar{x}) = 0$, 次梯度不等式给 $f(x) \geq f(\bar{x})$. $\square$


习题 15.2 原题 2. 考虑 $\min\{f(x) : g(x) \leq 0, x \in X\}$, 其中 $f(x) = e^{-x_1}$, $g(x) = x_1^2/x_2$, $X = \{(x_1, x_2) : x_2 > 0\}$.

- (1) g 在 X 上是否凸? (10 分)
- (2) 画 $M = \{(u, w) : \exists x \in X, g(x) \leq u, f(x) \leq w\}$. (15 分)
- (3) 原问题最优值 f^* 是多少? (5 分)
- (4) 对偶最优值与对偶间隙是多少? (15 分)
- (5) 将约束改为 $g(x) \leq u, u > 0$, 是否有对偶间隙? (7 分)

解答. 官方解答重构. (1) g 为凸函数 t^2 的透视函数. 直接算得

$$\nabla^2 g(x) = \frac{2}{x_2^3} \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & -x_1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

(2) $u < 0$ 时无点; $u = 0$ 强制 $x_1 = 0$, 故 $w \geq 1$. 若 $u > 0$, 对任何 $w > 0$, 可选足够大的 x_1 使 $e^{-x_1} \leq w$, 再选 $x_2 \geq x_1^2/u$ 且 $x_2 > 0$. 因而 $M = \{(u, w) : u > 0, w > 0\} \cup \{(0, w) : w \geq 1\}$.



图中浅色内部属于 M , 竖轴仅粗线段及其向上延长属于 M ; 水平轴不属于 M . (3) 可行集是 $\{(0, x_2) : x_2 > 0\}$, 每点费用均为 1, 所以 $f^* = 1$ 且取到. (4) 对 $\mu \geq 0$, $e^{-x_1} + \mu x_1^2/x_2 \geq 0$, 而先令 $x_1 \rightarrow \infty$, 再使 x_2 增长足够快, 可使二项同时趋零. 所以 $q(\mu) = 0$ 对全部 $\mu \geq 0$ 成立, $q^* = 0$, 间隙为 1. 在 MC/MC 延伸到全实数的定义下, $\mu < 0$ 时 $q(\mu) = -\infty$. (5) 对固定 $u > 0$, 取 $x_1 \rightarrow \infty$, $x_2 = x_1^2/u$ 得 $p(u) = 0$, 不取到. 新对偶函数 $q_u(\mu) = -\mu u$, 最优乘子 $\mu = 0$, 值为 0, 故没有间隙. 也可用 $x_1 = 0, x_2 > 0$ 的严格可行性验证 Slater 条件. $\square$

15.2 2012 年春季期中考试

原件署名 Prof. Dimitri Bertsekas, 第 1 题 60 分, 第 2 题 40 分, 共 100 分. 原件未载各子项分值、具体考试日期或时长.

习题 15.3 原题 1. 以下 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空凸, A, b 维数适当, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ 凸且真. 判断真伪, 不必说明理由. (60 分)

- (1) 若 $\text{epi } f$ 闭, 则 f 连续.
- (2) 若 $\text{epi } f$ 闭, 则 $\text{dom } f$ 闭.
- (3) $\text{ri } X = \text{int } X$.
- (4) X 与 $\text{ri } X$ 的衰退锥相同.
- (5) 存在分离 X 与 $-X$ 的超平面.
- (6) 二维函数 $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2$ 强制趋于无穷, 即是 coercive.
- (7) 若 f 闭且 $\text{dom } f$ 紧, 则共轭 f^* 全空间实值.
- (8) 若 $\min\{f(x) : x \in X, Ax = b\}$ 的最优值有限且 X 开, 则无对偶间隙.
- (9) 若 f 为一个实值函数与 X 的指示函数之和, 则对每个 $x \in X$, 至少存在一个 f 的次梯度.
- (10) 若 $f(x) = b^\top x$ 且 x^* 在 X 上最小化 f , 则 X 在 x^* 的法锥包含 $-b$.

解答. 官方答案: 前 6 项假, 后 4 项真. **AI 独立审定:** 按原题写出的条件, 第 8 项为假; 第 9 项若未假设实值部分凸, 也为假. 以下保留原题并说明条件差别.

(1) 假. 闭上图保证下半连续, 不保证边界连续. 取 $f(s, t) = t^2/s$ 对 $s > 0$, $f(0, 0) = 0$, 其余取 $+\infty$. 其上图为 $\{(s, t, w) : s \geq 0, w \geq 0, t^2 \leq sw\}$, 是闭凸集. 但 $(s, t) = (\varepsilon^2, \varepsilon) \rightarrow (0, 0)$ 时 $f = 1$, 与原点值 0 不同, 即使只在定义域内也不连续. (2) 假. $f(x) = 1/x$ 对 $x > 0$, 其余为 $+\infty$, 闭真凸而定义域为开半轴. (3) 假. 平面中的水平线段 $[-1, 1] \times \{0\}$ 内部空, 相对内部为 $(-1, 1) \times \{0\}$. (4) 假. 取 $X = \{(x_1, x_2) : x_1 > 0, x_2 \geq 0\} \cup \{(0, 0)\}$. 则 $\text{rec } X = X$: 从原点出发要求衰退方向就在 X 中, 而这些方向确能使各点保持在 X . $\text{ri } X = \{x_1 > 0, x_2 > 0\}$, 其衰退锥却是闭非负正交域 $\mathbb{R}_+^2$, 包含 $(0, 1)$. (5) 假. 取 X 为以原点为中心的开单位球, 则 $X = -X$ 且有内点, 不可能由非零法向量的超平面分离. (6) 假. 沿 $(t, -t)$, 范数趋无穷而费用恒为 0. (7) 真. 由闭性和紧定义域, f 在定义域有有限下界 m . 因而 $f^*(y) \leq \max_{x \in \text{dom } f} y^\top x - m < \infty$; 任取有限目标点又给有限下界, 所以 $f^*(y) \in \mathbb{R}$.

(8) **AI 修正: 按原题为假.** 取 $n = 1$, $X = \mathbb{R}$, 等式约束 $x = 0$, 并令

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ +\infty, & x < 0. \end{cases}$$

f 真凸, 原问题最优值为 1. 对等式乘子 $\lambda \in \mathbb{R}$, $q(\lambda) = \inf_x [f(x) + \lambda x]$ 在 $\lambda \geq 0$ 时为 0, 在 $\lambda < 0$ 时为 $-\infty$. 所以对偶值为 0, 间隙为 1. X 开并未使约束点落入 $\text{ri}(\text{dom } f)$; 原题缺少相应资格条件. 若补充存在 $\bar{x} \in \text{ri}(X \cap \text{dom } f)$ 满

足 $A\bar{x} = b$, 强对偶定理才可用. 不把官方的 True 机械翻译为无条件结论.

(9) **AI 条件审定: 字面条件不足.** 取 $X = [0, \infty)$, $f(x) = -\sqrt{x}$ 对 $x \geq 0$, 其余为 $+\infty$. 这是凸真函数, 且可写成实值函数 $h(x) = -\sqrt{\max\{x, 0\}}$ 与 δ_X 之和. 若 $s \in \partial f(0)$, 对所有 $t > 0$ 必须 $-\sqrt{t} \geq st$, 即 $s \leq -1/\sqrt{t}$, 无有限 s 可行. 因而第 9 项按未加凸性的原文为假. 官方解答隐含实值部分 h 全空间凸. 在这个补充条件下, $\partial h(x) \neq \emptyset$ 对全部 x 成立, $0 \in \partial \delta_X(x)$ 对全部 $x \in X$ 成立, 次微分加法则给 $\partial f(x) = \partial h(x) + N_X(x) \neq \emptyset$, 所以官方 True 在此条件下成立.


(10) 真. 最优性是 $b^\top(x - x^*) \geq 0$ 对所有 $x \in X$, 正是 $-b \in N_X(x^*)$ 的定义. $\square$

习题 15.4 原题 2. 考虑 $\min(x^2 + y^2)$, 约束 $a - x - y \leq 0$, $x, y \in \{0, 1\}$. (40 分) (a) 画约束-费用点集 $\{(a - x - y, x^2 + y^2) : x, y \in \{0, 1\}\}$, 并画扰动函数 $p(u) = \min\{x^2 + y^2 : a - x - y \leq u, x, y \in \{0, 1\}\}$. p 是否下半连续? (b) 取 $M = \text{epi } p$ 的 MC/MC 框架. 哪些 a 使问题可行且有对偶间隙? 哪些 a 使问题可行且无间隙? 哪些 a 使问题可行且有唯一对偶最优解? (c) 选一个可行无间隙的 a , 写出最大截距问题, 并求全部原、对偶最优解. (d) 将约束改成 $a - x - y < 0$, 重新回答 (a)、(b).

解答. (a) **AI 独立补图与补解:** 官方此处标有 *To be added*, 因而图及枚举推导不是现成的官方完整答案. 令 $s = x + y$, 则 $s \in \{0, 1, 2\}$ 且 $x^2 + y^2 = s$. 不同约束-费用点只有三个: $(a, 0), (a - 1, 1), (a - 2, 2)$; 中间点由 $(1, 0), (0, 1)$ 两个解共同产生. 因而

$$p(u) = \begin{cases} 0, & u \geq a, \\ 1, & a - 1 \leq u < a, \\ 2, & a - 2 \leq u < a - 1, \\ +\infty, & u < a - 2. \end{cases}$$

图以下使用横坐标 $u - a$, 因此对所有 a 只需水平平移, 没有固定某个参数冒充一般结论.



实点是函数取值, 空心点不取; 三个实点也正是约束-费用点的平移图. 在每个跳点, 函数取左右极限中较低的值, 所以 p 下半连续; 或由 $\text{epi } p$ 是三个闭正交域平移的有限并直接判断.

(b) 以下对偶推导为 AI 验算, 与官方区间答案一致. 对 $\mu \geq 0$,

$$q_a(\mu) = \min_{s=0,1,2} \{s + \mu(a - s)\} = \begin{cases} a\mu, & 0 \leq \mu \leq 1, \\ 2 + (a - 2)\mu, & \mu \geq 1. \end{cases}$$


可行当且仅当 $a \leq 2$. 在可行范围, 原最优值为 0 ($a \leq 0$)、1 ($0 < a \leq 1$)、2 ($1 < a \leq 2$). 对偶值为 0 ($a \leq 0$)、 a ($0 < a \leq 2$). 因此可行且有间隙的参数为 $(0, 1) \cup (1, 2)$; 可行无间隙的为 $(-\infty, 0] \cup \{1, 2\}$. 全部最优乘子为

$$\operatorname{argmax}_{\mu \geq 0} q_a(\mu) = \begin{cases} \{0\}, & a < 0, \\ [0, 1], & a = 0, \\ \{1\}, & 0 < a < 2, \\ [1, \infty), & a = 2. \end{cases}$$

所以可行且有唯一对偶最优解的参数为 $(-\infty, 0) \cup (0, 2)$. $a > 2$ 时原问题不可行且对偶上无界, 不列入这些区间.

(c) 取 $a = 1$. 最大截距问题为 $\max_{\mu \geq 0} \inf_{u \in \mathbb{R}} \{p(u) + \mu u\}$. 原最优解集合为 $\{(1, 0), (0, 1)\}$, 最优值 1; 对偶唯一最优解 $\mu = 1$, 对偶值 1. 支持线 $w + u = 1$ 同时经过三个约束-费用点.

(d) 严格约束的扰动函数是



AI 补证: 原约束-费用点集仍为三个点, 但可行性要求 $u > a - s$, 因而上图中的水平阶梯改成左开右闭. 在 $u = a$, $p_{<}(a) = 1$ 而从右趋近的函数值为 0, 故不下半连续; 其余两跳点也不下半连续. 严格可行当且仅当 $a < 2$. 原最优值为 0 ($a < 0$)、1 ($0 \leq a < 1$)、2 ($1 \leq a < 2$). 虽然 $\operatorname{epi} p_{<}$ 不闭, 仿射泛函下确界在其闭包上不变, 所以对偶函数仍为 q_a . 可行有间隙的参数为 $[0, 2)$, 可行无间隙的为 $(-\infty, 0)$, 可行且唯一对偶解的为 $(-\infty, 0) \cup (0, 2)$. 在 $a = 0$ 对偶最优集仍为 $[0, 1]$, 因而不是唯一解. $\square$

16 15.053 作业题与解答

本章按 2013 年课程的八份作业版本逐题整理. 作业 1、2 的两个版本共用前两题, 因而只写一次; 第三题分别保留组 1 与组 2. 去重后有 24 道主问题、104 个第一层作答块; 整题无子问时计一块, 同一 (c) 下的 (i)–(vi) 仍是一个第一层块. 作业 3 的题目数据与唯一官方解答来自电子表格, 已实际读取其六张工作表, 不是根据 PDF 中的“见工作簿”猜补.

题面采用数学条件与数据的中文重述. 凡原题说明取自外部教材, 保留原课程题号及出处关系, 不重译外书叙事. 解答以官方解答为对照重构, 其错误、遗漏与独立补证均在相应题中标明. 原题中的连续产量按线性规划处理; 若要整数产量, 必须另加整数条件. 数值建模题由 `tools/audit_lp_homework.py` 实际计算, 可行性、对偶界、精确换基及枚举结果留在源码审读记录中.

16.1 作业 1: 变量、变换与产品组合

原交期为 2013 年 2 月 12 日. 官方资源的组 1 文件对应姓氏首字母 A–H, 组 2 对应 I–Z; 组 1 题面页首误印 “Second Group”, 官方解答又误印 A–F. 这里以资源版本与实际第三题内容建立映射, 不据这些错字重分组.

习题 16.1 作业 1 第 1 题 (两组共用). 三种保护套依次为 iPod、iPhone、iPad. 全部产线用于单一产品时, 日产量依次为 6000、5000、3000 件; 每周 5 个工作日, 每日 8 小时. 每件仓储体积为 0.04、0.045、0.21 立方英尺, 总仓储上限 6000. 周最低产量为 5000、0、4000 件, 周最高需求为 10000、15000、8000 件; 单件利润为 4、6、10 美元.

(a) 说明线性假设, 用每天生产三产品的时间比例 x_1, x_2, x_3 建模并说明各约束. (b) 改用周产量 y_1, y_2, y_3 建模. (c) 改用一周 iPod 生产小时 z_1 、iPhone 生产小时 z_2 和全部生产小时 z_3 建模, 目标单位为千美元. (d) 写出 z 与 x 的关系. (e) 按工作簿以千件为产量单位求解. (f) 推广到 n 种产品: x_j 为生产天数, p_j 为日产量, P 为周生产天数, s_j 为单位体积, S 为仓储上限, r_j 为单位利润, b_j, d_j 为最低与最高需求, 写代数模型.

解答. 官方解答重构并修正单位与约束. (a) 假设产量与生产时间成正比, 允许分数时间, 没有切换损耗, 所有产量均售出. 模型为

$$\begin{aligned} \max & 120000x_1 + 150000x_2 + 150000x_3, \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 1 && \text{(时间)}, \\ & 1200x_1 + 1125x_2 + 3150x_3 \leq 6000 && \text{(仓储)}, \\ & 5000 \leq 30000x_1 \leq 10000, \quad 0 \leq 25000x_2 \leq 15000, \\ & 4000 \leq 15000x_3 \leq 8000 && \text{(最低产量与需求上限)}. \end{aligned}$$

(b) 目标为 $4y_1 + 6y_2 + 10y_3$, 时间约束为 $y_1/6000 + y_2/5000 + y_3/3000 \leq 5$, 仓储约束为 $0.04y_1 + 0.045y_2 + 0.21y_3 \leq 6000$, 并加给定产量上下界. 官方 (b) 把第三项误写为 $y_1/3000$, 应为 $y_3/3000$.

(c) iPad 生产时间是 $h = z_3 - z_1 - z_2$. 要求 $z_1, z_2, h \geq 0, z_3 \leq 40$. 周产量是 $(750z_1, 625z_2, 375h)$, 因而目标为 $3z_1 + 3.75z_2 + 3.75h$ (千美元), 仓储为 $30z_1 + 28.125z_2 + 78.75h \leq 6000$, 产量上下界分别代入这三个产量. 官方列式遗漏总时间上限, 且目标未换成千美元, 这里补正. (d) $z_1 = 40x_1, z_2 = 40x_2, z_3 = 40(x_1 + x_2 + x_3)$.

(e) 工作簿把 iPod 最低产量改为恰好 5 千件, 与 (b) 的下界不同; 两者的最优值相同. 一组最优千件产量是 $(5, 7.5, 8)$, 利润 145000 美元, 与官方工作簿一致; 另一组是 $(5, 85/6, 4)$. 证明最优可观察每个生产日的利润分别为 24000、30000、30000 美元, 而 iPod 至少占 5/6 天, 所以利润不超过 $30000 \cdot 5 - 6000 \cdot (5/6) = 145000$. 两组都达到上界. 因而最优产量不唯一, 不应把不同求解器输出视为错误.

$$(f) \max \sum_{j=1}^n r_j p_j x_j, \text{ 约束 } \sum_j x_j \leq P, \sum_j s_j p_j x_j \leq S, b_j \leq p_j x_j \leq d_j, x_j \geq 0. \quad \square$$

习题 16.2 作业 1 第 2 题 (两组共用). 判断能否严格改写为单个线性规划, 能时写出模型, 不能时指出障碍, 不要求求解.

(a) x_1, x_2 自由, 最小化 $\max\{2.3x_1 + x_2, 4.3x_1 - 0.5x_2, 2.5x_1 + 3.5x_2\}$, 约束 $x_1/(x_1 + x_2) \leq 0.5$, $10x_1 + 28x_2 = 3.4$, $x_1 + x_2 \geq 0$. (b) 最小化 $|0.8x_1 + 0.9x_2|$, 约束 $|0.9x_1 + 1.2x_2| \leq 10$, $x_1 \geq 0$, x_2 自由.

解答. (a) AI 独立修正官方解答. 比例本身要求 $x_1 + x_2 \neq 0$, 与给定非负条件合起来是严格正. 在此域上可以交叉乘得到 $x_1 \leq x_2$, 并引入 t 满足 $t \geq 2.3x_1 + x_2$, $t \geq 4.3x_1 - 0.5x_2$, $t \geq 2.5x_1 + 3.5x_2$. 但严格正条件不是普通 LP 的闭线性不等式.

由等式 $x_2 = (3.4 - 10x_1)/28$, 原可行域恰为 $-17/90 < x_1 \leq 17/190$. 若仅保留 $x_1 + x_2 \geq 0$, 会错误地加入 $(-17/90, 17/90)$, 其比例未定义. 在这个区间, 三个仿射函数的最大者始终是第三个, 它等于 $0.425 + 1.25x_1$. 所以原问题的下确界是 $17/90$, 但不取到; 官方闭 LP 却在新增点取到该值. 任何非空且目标有有限下界的普通 LP 都取到最小值, 故这不是严格等价的 LP 改写. 若明示采用零投放处的扩展定义, 上述闭 LP 可作为修改后的问题, 不能称原题的等价模型. 官方第三个上图约束还误用了反向不等号.

(b) 官方解答重构. 最小化 t , 加 $t \geq 0.8x_1 + 0.9x_2$, $t \geq -0.8x_1 - 0.9x_2$, $-10 \leq 0.9x_1 + 1.2x_2 \leq 10$, 保留原变量符号条件. 正确最小化方向使 t 在最优处等于绝对值. $\square$

习题 16.3 作业 1 第 3 题, 组 1: 混合配料 (原课程注明据 *Applied Mathematical Programming* 第 1 章第 11 题). 原料 A、B、C、D 的日供应上限为 (4000, 5000, 3500, 5500) 加仑, 单位成本为 (0.60, 0.52, 0.48, 0.35) 美元. 制成 Deluxe、Standard、Economy, 数学数据如下.

成品	A 最大比例	C 最小比例	D 最大比例	售价
Deluxe	0.60	0.20	0.10	7.9
Standard	0.15	0.60	0.25	6.9
Economy	无	0.50	0.45	5.0

(a) 建立利润最大 LP. (b) 按工作簿求最优配料与利润. (c)(i) 求 Economy 值得生产的最低售价 (精确至 5 美分); 原题此处错写 Deluxe, 按前句及官方解答保留 Economy 的实际意图. (ii) 分别删去三成品的 D 最大比例约束, 哪一条最有价值? 原题后一句错写 A, 按前句 D 说明讨论. (iii) Deluxe 售价改为 7.95、8.00、8.05 时, 分别求利润增量. (iv) 预测并验证涨价 5% 时的利润; 对 1%–10% 涨价写出利润公式. (v) 用原基公式预测售价 8.5 时的增量, 再实际求解, 找原公式有效的最高售价 (精确至 5 美分). (vi) 能否多买少量 A, 最高可接受购买价是多少? (d) 推广到 n 种原料、 m 种成品: 售价 p_j , 成本 c_i , 供应 a_i , 成分比例下界 r_{ij} 及上界 q_{ij} , 写代数模型.

解答. 官方解答重构, 数值与有效范围由 AI 独立验算. (a) 令 $x_{ij} \geq 0$ 为投入成品 j 的原料 i 加仑数, $T_j = \sum_i x_{ij}$. 目标为 $\max \sum_{ij} (p_j - c_i)x_{ij}$, 供应约束为 $\sum_j x_{ij} \leq a_i$. 比例直接写为 $x_{Aj} \leq q_{Aj}T_j$, $x_{Cj} \geq r_{Cj}T_j$, $x_{Dj} \leq q_{Dj}T_j$, 其中 Economy 无 A 上限. $T_j = 0$ 时表示不生产该成品, 所有配料也为 0; 这种质量比例的零产量约定须说清, 无须写未定义的 0/0.

(b) 最优配料矩阵 (行依次 A-D, 列依次三成品) 为

$$X = \begin{pmatrix} 4000 & 0 & 0 \\ 4750 & 250 & 0 \\ 2500 & 1000 & 0 \\ 1250 & 1250/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

成品为 (12500, 5000/3, 0), 利润 $308960/3 = 102986.6667$. 所有供应与成分约束直接代入可核. 实际求解同时给对偶上界同值, 完整乘子及残差在计算记录中.

(c)(i) 最低临界售价为 $1619/312 = 5.1891026$ 美元, 按 5 美分精度报约 5.20. 在临界点有包含 Economy 的同值最优方案, 超过临界点可提高利润. 一种竞争方案的成品量为 (216250/17, 0, 32500/17); 将它与 (b) 方案的利润作比较即得该临界值, 全部 LP 约束及对偶价格验证其为阈值.

(ii) 分别删除 Deluxe、Standard、Economy 的 D 上限, 利润依次为 129945、104903.3333、103402.1429, 因而删除 Deluxe 的上限最有价值. (iii) 增量依次为 625、1250、1875, 因为相应范围内 Deluxe 产量保持 12500.

(iv) 原基公式不是对全部 1%-10% 有效. 设新售价为 p , 则在本题所问范围内

$$V(p) = \begin{cases} 308960/3 + 12500(p - 7.9), & 7.9 \leq p \leq 8.21, \\ (125000p - 64495)/9, & 8.21 \leq p \leq 8.69. \end{cases}$$

第二段用完 A、B、C, 全部用于 Deluxe, D 投入 12500/9, 总 Deluxe 为 125000/9. 两段交于 8.21; 逐段的可行配料及非负对偶证书也给全局最优, 不能仅按短区间线性外推. 涨价 5% 使 $p = 8.295$, 实际利润 $972380/9 = 108042.2222$, 增量 5055.5556. 原题 “可假设 1%-10%” 与单一基公式有效范围不一致, 这里给完整分段结果.

(v) 原公式预测增加 7500; 实际利润 110889.4444, 增加 7902.7778. 精确最高有效售价 8.21 (按题目精度约 8.20)

. (vi) 增加 A 一加仑后的利润 102994.6731, 增量 8.0064103, 已扣原成本 0.60. 所以少量新 A 的总购买价低于 8.6064103 美元/加仑时有净收益, 等号时无净增益. 官方把基准利润写成 102903 等数, 这里按同一模型重算.

(d) 目标为 $\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (p_j - c_i)x_{ij}$; 约束 $\sum_j x_{ij} \leq a_i$, $r_{ij} \sum_k x_{kj} \leq x_{ij} \leq q_{ij} \sum_k x_{kj}$, $x_{ij} \geq 0$. 无成分限制时相应取 $r_{ij} = 0$, $q_{ij} = 1$. $\square$

习题 16.4 作业 1 第 3 题, 组 2: 电子产品测试 (原课程注明据 Heizer 与 Render, *Operations Management*, 2010, B.29). 六产品依次为内置调制解调器 I、外置调制解调器 E、电路板 C、USB 存储 U、硬盘 H、扩展内存 M. 每件在三设备上测试所需分钟为

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 12 & 6 & 18 & 17 \\ 2 & 5 & 3 & 2 & 15 & 17 \\ 5 & 1 & 3 & 2 & 9 & 2 \end{pmatrix}.$$

三设备每周可用小时为 (130, 130, 100), 小时人工费为 (16, 12, 18) 美元. 产品售价为 (200, 120, 180, 130, 430, 260), 材料成本为 (35, 25, 40, 45, 170, 60), 需求上限为 (2000, 1500, 1800, 1200, 1000, 1000).

(a) 写利润最大 LP. (b) 按工作簿求最优方案. (c)(i) 三设备增加一分钟各值多少, 应增加哪种设备时间? (ii) 设

备 2 每周时间改为 131、132、133 小时, 分别求增量. (iii) 预测并验证 135 小时的增量, 写 $130+t$ 小时, $1 \leq t \leq 10$ 时的公式. (iv) 预测 150 小时增量并实际求解; 找该公式最长有效增量范围 (精确至一小时). (v) 人工费改为 (18, 13, 20) 时, 最优方案如何改变? (vi) 单独改变设备 3 人工费, 原生产组合保持最优的范围是什么 (精确至一美元)? (d) 用产品数 m 、设备数 n 、设备小时 a_i 、人工费 c_i^L 、材料成本 c_j^M 、售价 r_j 、需求上限 b_j 和测试分钟 q_{ij} 写代数模型. 原题把 b_j 误称材料可用量, 依数据及官方模型保留其需求上限含义.

解答. 官方解答重构, 灵敏度范围由 AI 独立修正. (a) 令 x_j 为产品周产量, 单位净利润为 $c_j = r_j - c_j^M - \sum_i c_i^L q_{ij}/60$. 模型为 $\max c^T x$, $Qx \leq (7800, 7800, 6000)^T$, $0 \leq x \leq b$. 工作簿的电路板单位利润缓存值 138.9333 与当前数据不符, 按数据应为 $140 - (16 \cdot 12 + 12 \cdot 3 + 18 \cdot 3)/60 = 135.3$, 本稿据题面与表中输入重算.

(b) $x_I = 15600/29 = 537.9310$, $x_E = 39000/29 = 1344.8276$, 其余 0, 利润 211666.8966. 前两设备满负荷, 第三设备剩余 1965.5172 分钟. 对偶价格 (美元/分钟) 为 (21.3919540, 5.7448276, 0); 加权后的每产品资源价格至少为净利润, 候选方案达到上界, 所以最优. 官方解答 PDF(b) 的混料利润提示 102986.7 误植, 题面与工作簿对应本题的 211666.9.

(c)(i) 增加一分钟依次增加 21.3919540、5.7448276、0 美元. 未计购置费时设备 1 时间最有价值, 是否实际购买还要比较成本. (ii) 增量依次 344.6896552、689.3793103、1034.0689655. (iii) 135 小时增量 1723.4482759; $V(t) = 211666.8965517 + 344.6896552t$. 同一基的产量为 $x_I = (15600 - 180t)/29$, $x_E = (39000 + 420t)/29$.

(iv) 150 小时即 $t = 20$, 线性公式预测 6893.7931, 实际只增加 3693.1034. 上式有效至 $t = 75/7 = 10.7142857$ 小时, 此时外置产品达到 1500 件上限; 按整数小时报告 10 小时. 再增加设备 2 时间, 原六产品模型的最优利润为 215360, 不再增加. (v) 生产组合不变, 利润降为 211142.4138.

(vi) 令设备 3 小时人工费为 h . 保持 I、E 为正基本产品时, 前两设备价格由两产品净利润方程给出

$$\pi_1 = 9409/435 - 23h/1740, \quad \pi_2 = 821/145 + 2h/435.$$

其余四产品的检验数依次为 $11(h - 1480)/116$, $(16h - 25275)/435$, $(11h - 128800)/580$, $(197h - 473100)/1740$. 要求 $\pi_1, \pi_2 \geq 0$ 且这些检验数非正, 得数学范围 $-1231.5 \leq h \leq 1480$; 人工费非负时为 $0 \leq h \leq 1480$. 等号 1480 处可能出现其他同值组合, 原组合仍最优. 官方“所有工资率均稳定”不正确.

$$(d) \max \sum_{j=1}^m (r_j - c_j^M - \frac{1}{60} \sum_{i=1}^n c_i^L q_{ij}) x_j, \text{ 约束 } \sum_j q_{ij} x_j \leq 60a_i, 0 \leq x_j \leq b_j. \quad \square$$


16.2 作业 2: 图解、单纯形与重新定价

原交期为 2013 年 2 月 21 日. 两组第三题使用作业 1 的另一组模型, 但均修改参数, 因而须分别求解.

习题 16.5 作业 2 第 1 题 (两组共用). 考虑 $\max(x_1 + 2x_2)$, 约束 $x_1 - x_2 \geq -2$, $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 \leq 2.5$, $x_2 \leq 3$, $x_1, x_2 \geq 0$.

(a) 画可行域, 判断是否无界. (b) 哪些约束冗余? (c) 用图解法求最优解并说明方法. (d) 最优解是否唯一, 若不唯一给两个, 若唯一说明图形理由. (e) 加入 $2x_1 + x_2 \geq \alpha$, 分别求它冗余、原最优解不再最优、问题不可行的 α 范围. (f) 改目标为 $x_1 + \beta x_2$, 求 (2.5, 1.5) 最优的 β 范围.

解答. 官方解答重构并补足唯一性. (a) 可行域是下图五边形, 顶点为 $(0, 0), (2.5, 0), (2.5, 1.5), (1, 3), (0, 2)$, 故有界.



(b) 前两约束相加给 $2x_2 \leq 6$, 故 $x_2 \leq 3$ 冗余. 其他三条及两条非负约束各有不受其他约束蕴含的边界.

(c) 将等利润直线向目标增大方向平移, 最后接触 $(1, 3)$, 最优值 7. 也可将 $x_1 + x_2 \leq 4$ 乘 $3/2$, 将 $-x_1 + x_2 \leq 2$ 乘 $1/2$, 得 $x_1 + 2x_2 \leq 7$. (d) 达到该界必须让两条不等式同时等号, 唯一交点为 $(1, 3)$, 所以唯一; 图形上目标线不与相邻边平行.

(e) $2x_1 + x_2$ 在原可行域的最小值 0、最大值 6.5, 原最优值 5. 因而新增约束在 $\alpha \leq 0$ 时冗余; 原最优点在 $\alpha > 5$ 时被排除, 其中 $5 < \alpha \leq 6.5$ 仍有别的可行方案; $\alpha > 6.5$ 时不可行. (f) $(1, \beta)$ 是 $(1, 0)$ 与 $(1, 1)$ 的非负组合恰当且仅当 $0 \leq \beta \leq 1$, 这正是该顶点活跃约束的法向锥. 两端允许整条相邻边同值. $\square$

习题 16.6 作业 2 第 2 题 (两组共用; 原课程注明据 *Applied Mathematical Programming* 第 2 章第 6 题). 三轮胎每件利润为 6、4、8 美元, 每 100 件在成型、硫化、装配三工序所需小时分别为矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = (12, 14, 16)^T.$$

(a) 建 LP, 假设全部售出. (b) 补齐工作簿中的初表, 用单纯形法给出到最优表的换基序列. (c)(1) 给初始产量与全部松弛; (2) 给最优产量与利润. (d)(i) 成型从 12 增至 13 小时的利润增量; (ii) 装配从 16 增至 17 小时的增量; (iii) 讨论影子价格与松弛的关系 (原题附加分).

解答. 官方解答重构并修正互补松弛的逆命题. (a) 令 x 以 100 件为单位, $\max(600x_1 + 400x_2 + 800x_3)$, $Ax \leq b$, $x \geq 0$. 若以件为单位, 将时间系数除 100 并采用原利润系数即可.

(b) 初始表用松弛 s_1, s_2, s_3 为基. 先让 x_3 进入、 s_1 离开, 得

$$x_3 = 3 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}s_1, \quad s_2 = 8 - 2x_1 - x_2 + \frac{1}{2}s_1, \quad s_3 = 10 - x_1 + \frac{1}{2}s_1,$$

且 $z = 2400 + 200x_1 - 200s_1$. 再让 x_1 进入、 s_2 离开, 得最优字典

$$x_1 = 4 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}s_1 - \frac{1}{2}s_2,$$

$$x_3 = 1 - \frac{1}{4}x_2 - \frac{3}{8}s_1 + \frac{1}{4}s_2,$$

$$s_3 = 6 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{4}s_1 + \frac{1}{2}s_2,$$

$$z = 3200 - 100x_2 - 150s_1 - 100s_2.$$

所有非基本变量检验数非正, 所以已最优. 实际脚本还采用 Bland 合法序列, 两种序列得到同值最优解.

(c)(1) 初始产量全 0, 松弛为 (12, 14, 16). (2) 产量为 400、0、100 件, 松弛为 (0, 0, 6) 小时, 利润 3200. (d)(i) 同一最优基在增加一小时成型时间后仍可行, $x_1 = 4.25, x_3 = 0.625$, 利润增加 150. (ii) 装配原有 6 小时闲置, 增加一小时的收益. (iii) 非零松弛强制相应非负对偶价格为 0; 正影子价格强制约束活跃. 活跃约束的价格仍可能为 0, 官方“活跃约束必有非零价格”的一般断言不成立. $\square$

习题 16.7 作业 2 第 3 题, 组 1. 使用习题 16.4 的电子测试数据, 将三人工费改为 (18, 15, 12). 新增外置硬盘, 每件售价 127、材料成本 50 美元, 三测试时间为 (3, 2, 6) 分钟, 不设需求上限.

(a) 求最优利润与产量. (b) 新外置硬盘在最优组合中为 0, 售价至少增加多少才值得生产 (精确至一美元)? (c) 设备 2 可用小时改为 $130+t, t = 1, 2, 3$, 求利润增量. (d) 估计并验证 140 小时利润, 写 $1 \leq t \leq 10$ 的公式. (e) 预测 150 小时的增量并实际求解, 找公式最长有效增量范围 (精确至一小时).

解答. 官方解答重构并独立修正错字与精度. (a) 原六产量为 (15600/29, 39000/29, 0, 0, 0, 0), 新产品 0, 利润 211420.3448. 官方两项都写 x_E , 正确分别是 I 与 E. 对偶价格为 (21.4379310, 5.6672414, 0) 美元/分钟.

(b) 新产品净利润为 $127 - 50 - (18 \cdot 3 + 15 \cdot 2 + 12 \cdot 6)/60 = 74.4$. 按资源价格计的成本为 $3\pi_1 + 2\pi_2 = 75.6482759$, 故售价的临界增加为 1.2482759 美元, 临界售价 128.2482759; 若只按整数美元报价则要 129. 临界价处可有正生产的同值最优组合, 再提高才能严格改善利润.

(c) 增量为 340.0344828、680.0689655、1020.1034483. 官方第一项 340.3451 为误植. (d) 140 小时利润 214820.6897, 增量 3400.3448; 公式 $V(t) = 211420.3448276 + 340.0344828t$. 基本产量变化与习题 16.4(c)(iii) 相同. (e) 150 小时公式预测增加 6800.6897, 实际利润 217612.5, 增量 6192.1552; 此时原 I、E 和新外置硬盘的产量为 (262.5, 1500, 487.5). 原公式精确有效至 $t = 75/7$ 小时, 按整数小时为 10 小时. $\square$

习题 16.8 作业 2 第 3 题, 组 2. 使用习题 16.3 的原料与成分数据, 售价改为 (7.7, 6.8, 4.9), 且 Deluxe 日产量不超过 12000 加仑.

(a) 求利润与最优配料. (b) Economy 的最低值得生产售价是多少 (精确至 5 美分)? (c) Standard 售价改为 $6.8 + s, s = 0.05, 0.10, 0.15$, 求利润增量. (d) 预测 Standard 售价 7.2 时利润, 写 $0.05 \leq s \leq 0.25$ 的公式. (e) 用该公式预测售价 7.5 的增量, 实际求解核对.

解答. 官方解答重构并独立修正算术. (a) 一组最优配料为

$$X = \begin{pmatrix} 3675 & 0 & 0 \\ 4725 & 275 & 0 \\ 2400 & 1100 & 0 \\ 1200 & 1375/3 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = (12000, 5500/3, 0), \quad V_0 = 97801.25.$$

配料不唯一: 在不违反供应和比例的范围内, A、B 可在两种成品之间等量互换, 总成本与成品量不变. 实际求解输出的另一矩阵及对偶上界也已核对.

(b) 精确阈值 5.70625 美元, 按 5 美分精度可报约 5.70 或 5.75. 例如含 2200 加仑 Economy 且无 Standard 的竞争方案, 在该售价处与原方案同值; 对偶检验亦给相同阈值. (c) 增量分别 $275/3 = 91.6667$, $550/3 = 183.3333$, 275. (d) $V(s) = 97801.25 + (5500/3)s$, 所问区间原成品量不变. 售价 7.2 即 $s = 0.4$, 实际仍适用, 利润 98534.5833. (e) $s = 0.7$, 增量 1283.3333, 实际利润 99084.5833, 公式仍正确. 官方把 1283.3333 误写为 12.8334, 此处按真实模型验证. $\square$

16.3 作业 3: 两阶段法、退化与参数表

原文期为 2013 年 2 月 28 日. 全部题原要求电子表格提交; 这里把工作簿中的矩阵、参数与答案完整转写为可阅读的数学问题. 单纯形表统一按 $-z + \sum_j \bar{c}_j x_j = \text{RHS}$ 读取, 正 $\bar{c}_j$ 才表示极大问题的改善方向.

习题 16.9 作业 3 第 1 题. 原问题为

$$\max(x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4), \quad \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 & -1 \\ 2 & -4 & 2 & -4 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad x \geq 0.$$

给三等式分别加人工变量 $y_i \geq 0$, 第一阶段最大化 $-y_1 - y_2 - y_3$. 完成第一阶段换基, 给其最优基本可行解; 再恢复原目标, 给原问题最优基本可行解.

解答. 官方电子表格解答重构并补精确值. 第一阶段可得到 $x = (5/6, 3/4, 8/3, 0)$, $y = (0, 0, 0)$, 辅助值 0; 基为 x_1, x_2, x_3 . 从人工基依次让 x_1, x_3, x_2 进入并让 y_3, y_2, y_1 离开即可达到此基. 人工目标不超过 0, 故已经最优且原问题可行.

删去人工列, 恢复原目标, 让 x_4 进入、 x_1 离开, 得 $x = (0, 7/11, 56/11, 10/11)$, 值 $96/11 = 8.7272727$. 原矩阵乘此向量恰等于右端. 最优等式对偶乘子为 $(8/11, 13/22, 1/11)$, 满足 $A^T \pi \geq (1, 2, 2, -3)^T$, 且 $b^T \pi = 96/11$, 所以最优. 官方答案栏把 z 四舍五入到 8.7, 不能用它替代精确值. $\square$

习题 16.10 作业 3 第 2 题. 对下面退化例使用 Bland 规则, 求最优基:

$$z = 3 - 20x_1 + \frac{3}{4}x_2 - 6x_3 + \frac{1}{2}x_4, \quad \begin{pmatrix} -8 & 1/4 & 9 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -12 & 1/2 & 3 & -1/2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

所有变量非负, 初始基为 s_1, s_2, s_3 . 基编号把 s_1, s_2, s_3 依次视为 5、6、7.

解答. 官方工作簿解答重构并独立精确换基. 此例与第12章例12.9的循环数据同型: 四列交换为旧 (x_2, x_1, x_4, x_3) , 第三右端由 1 改为 2. 因此保留新数据, 不直接照搬旧最优产量.

Bland 基序列为 $(5, 6, 7) \rightarrow (2, 6, 7) \rightarrow (2, 1, 7) \rightarrow (2, 4, 7) \rightarrow (2, 4, 3) \rightarrow (2, 4, 5)$. 前三次是零步长, 后两次允许正步长. 最优产量 $x_2 = x_4 = 2$, $s_1 = 3/2$, 其余 0, 目标为 $11/2$. 最终非基本变量 x_1, x_3, s_2, s_3 的检验数分别为 $-2, -21/2, -3/2, -5/4$, 给最优证书. 脚本实际以有理数完成五次主元, 无循环. $\square$

习题 16.11 作业 3 第 3 题. 每部分从下表重新开始, 只改变一个单元格的值, 使要求成立; 多解时任取一解. 正数统一用 +1. 列 G-M 对应 $x_1, \dots, x_7$, 列 P 为右端, 行 11 为目标, 行 12-14 为约束; 当前基为 x_5, x_6, x_7 .

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	P
11 (-z)	-12	-5	-3	-20	0	0	0	-120
12	7	4	-3	-4	1	0	0	8
13	-1	1	2	-3	0	1	0	4
14	4	-3	0	-1	0	0	1	3

(a) 当前解最优, 且一条边也最优. (b) 当前解最优, 且存在最优射线. (c) 当前解不最优, 下次主元使 x_5 非基本. (d) 当前解不最优, 下次主元使 x_3 基本. (e) 当前解退化. 对 (f)、(g) 先将 P13 的 4 改为 0, 再改变一个单元格: (f) 基不最优且下次换基退化, 点不变; (g) 基不最优且下次换基非退化, 点改变.

解答. 官方答案重构并逐项检验. (a) 改 G11 为 0, 令 x_1 沿零检验数方向增加, 比值为 $8/7$ 与 $3/4$, 可到下一不同顶点, 整条线段同值. (b) 改 J11 为 0; x_4 列的三个约束系数均负, 可无限增加, 目标不变. (c) 改 H11 为 1, x_2 进入, 正比值 $8/4 = 2$, $4/1 = 4$, 所以 x_5 离开. (d) 改 I11 为 1, x_3 进入, 唯一正限制为 $x_6 = 4 - 2x_3$, 因而 x_6 离开. (e) 改 P12 为 0, 一个基本变量为 0 即可.

(f) 改 I11 为 1, x_3 进入时行 13 的比值为 $0/2 = 0$, 产生退化换基. (g) 改 G11 为 1, x_1 列在零右端行 13 的系数为负, 该行不限制正步长; 行 14 给 $3/4$, 是非退化步长. 官方工作簿说明另写“把 P14 的 1 改为 0”, 但原初表 P14 实际为 3 且 PDF 明确指定 P13 的 4. 本稿按 PDF 题面作答并保留这一版本冲突, 不混改两处. $\square$

习题 16.12 作业 3 第 4 题. 所有变量非负, 参数表为

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	右端
$-z$	0	-2	A	B	0	C	0	-8
x_1	1	-2	-1	4	0	1	0	4
x_7	0	0	D	0	0	E	1	2
x_5	0	1	-3	5	1	0	0	F

每部分给尽可能完整、简洁的条件. (a) 何时当前解可行且不退化? (b) 何时可行且退化? (c) 假设可行且不退化, A, B, C 满足什么条件使当前解最优? (d) 在 (a)、(c) 条件下, 给多最优解的附加条件. (e) 假设可行且不退化, 何时当前解是唯一最优解? (f) 假设 $A, B \leq 0$, 什么 C, E 条件使 x_6 进入时 x_7 有资格离基? (g) 什么 A, D 条件使算法可立即证明目标向上无界? (h) 在 (a)、(c) 条件下, 何时最优射线?

解答. 官方工作簿解答重构, (f)、(h) 由 AI 独立修正与补全. 初始基本值为 $(4, 2, F)$. (a) $F > 0$. (b) $F = 0$. (c) $A, B, C \leq 0$. 因不退化, 任何正检验数都允许小正步长改善目标, 因而这也必要.

(d) A, B, C 至少一个为 0. 非退化保证沿该非基本变量方向有正可行步长, 即得到不同的同值点. (e) $A, B, C < 0$: 目标式 $z = 8 - 2x_2 + Ax_3 + Bx_4 + Cx_6$ 迫使所有非基本变量为 0; 反之任一零检验数都给另一最优解.

(f) 要成为改善的进入变量须 $C > 0$. 正比值来自 x_1 的 4 及 x_7 的 $2/E$, 后者有资格当最小比值恰当且仅当 $E \geq 1/2$. 等号时并列可选 x_7 ; 若指定 Bland 离基则会选择编号更小的 x_1 . 官方写 $C \leq 0$ 与进入方向相反, 是错误.

(g) $A > 0, D \leq 0$, 且当前基可行 (即 $F \geq 0$). x_3 列为 $(-1, D, -3)^T$, 无正系数限制步长, 目标随 x_3 无限增加. 原题只要求 A, D , 但从当前表直接用原始单纯形作无界证书须保留可行性前提.

(h) 完整条件为

$$A = 0 \quad \text{且} \quad [D \leq 0 \text{ 或 } (C = 0 \text{ 且 } D + E \leq 0)].$$

证明: 最优射线的非基本方向满足 $d_2 = 0$, 且只可支持于 A, B, C 中为 0 的列. 第一行给 $-d_3 + 4d_4 + d_6 \leq 0$, 第三行给 $-3d_3 + 5d_4 \leq 0$, 故非零射线必须 $d_3 > 0$, 从而 $A = 0$. 若 $D \leq 0$, 取纯 x_3 方向即可. 若 $D > 0$, 第二行 $Dd_3 + Ed_6 \leq 0$ 要求 $E < 0, d_6 > 0$, 因而 $C = 0$; 又 $d_6 \leq d_3$, 必须 $D + E \leq 0$. 反过来取 $d_3 = d_6 = 1, d_4 = 0$ 满足这时所有限制. 官方只给 $A = 0, D \leq 0$, 是充分条件但漏了组合射线. $\square$

16.4 作业 4: 灵敏度报告与零和博弈

原交期为 2013 年 3 月 7 日; 原作业无电子表格提交.

习题 16.13 作业 4 第 1 题 (原课程注明据 *Applied Mathematical Programming* 第 3 章第 1 题; 此处独立重述数学模型与问题). 三产品依次为椅、凳、桌, 连续产量为 x , 最大化 $3x_1 + 3x_2 + 5x_3$, 资源为

$$\begin{pmatrix} 1.2 & 1.7 & 1.2 \\ 0.8 & 0 & 2.3 \\ 2 & 3 & 4.5 \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} 1000 \\ 1200 \\ 2000 \end{pmatrix}, \quad x \geq 0.$$

三资源依次为弯管小时、焊接小时、金属管磅数. 已给最优产量 $(700, 0, 400/3)$, 利润 $8300/3$, 焊接松弛 $1000/3$, 其余资源松弛 0. 灵敏度报告如下; ∞ 是原表的极大数标记 10^{30} .

产品	检验数	目标系数	允许增加	允许减少	资源	影子价格	右端	允许增加	允许减少
椅	0	3	2	7/9	弯管	7/6	1000	200	1400/3
凳	-83/60	3	83/60	∞	焊接	0	1200	∞	1000/3
桌	0	5	1.75	2	材料	4/5	2000	5000/9	1000/3

(a) 给最优组合与利润. (b) 三资源各增加一单位值多少, 并仅看焊接松弛猜其影子价格. (c) 材料报价 0.70 美元/磅, 是否购买? 买 550 磅时最优利润增加多少, 区分资源带来的贡献与采购费. (d) 强制至少生产 50 个凳, 利润影响如何? (e) 新凳需弯管 1.2 小时、焊接 3 小时、材料 2.4 磅, 单位贡献 2.5 美元, 若生产一件, 总贡献是多少? (f) 新遮阳棚需弯管 1.8 小时、焊接 0.5 小时、材料 1.3 磅, 单位贡献需达到多少才值得生产? (g) 以 1.50 美元/小时出售 200 小时弯管容量, 总贡献如何改变? (h) 椅的单位贡献降至 2.40, 求新最优组合与贡献. 各问须说明计算依据.

解答. 官方解答重构并补足 (e) 实际问值. (a) 如题给的连续组合, 利润 $8300/3 = 2766.6667$. (b) 增量为 $7/6, 0, 4/5$; 焊接有正松弛, 互补松弛给价格 0.

(c) 材料的影子价格 0.8 大于报价 0.7, 且 550 在允许增加 $5000/9$ 内. 原生产目标贡献增加 $0.8 \cdot 550 = 440$, 采购费 385, 净增加 55. (d) 每件凳的检验数为 $-83/60$, 50 件使利润减少 $415/6 = 69.1667$. 不能仅凭局部检验数任意放大; 这里令 $x_2 = 50$, 解活跃的弯管与材料等式得到 $x_1 = 632.5, x_3 = 130$, 焊接仍可行, 故计算确实有效.

(e) 新凳资源的对偶成本为 $(7/6)1.2 + (4/5)2.4 = 3.32$, 净检验数 $2.5 - 3.32 = -0.82$. 若强制生产一件, 活跃的两资源右端变为 998.8、1997.6, 新椅产量 699.16 、新桌产量 $400/3 - 0.16$ 仍可行, 总贡献为 $8300/3 - 0.82 = 2765.8467$. 因检验数负, 自由决策时不应生产; 官方仅说“不生产”, 未回答“生产一件时”的数值.

(f) 阈值为 $(7/6)1.8 + (4/5)1.3 = 3.14$. 单位贡献超过 3.14 可改善利润, 等号表示同值进入机会. (g) 减少 200 小时在允许减少范围内, 生产贡献减少 $700/3$, 出售收入 300, 净贡献增加 $200/3 = 66.6667$. (h) 降低 0.6 小于允许减少 $7/9$, 原组合仍最优, 利润 $8300/3 - 0.6 \cdot 700 = 7040/3 = 2346.6667$. $\square$

习题 16.14 作业 4 第 2 题. 四种木家具依次为椅、书桌、桌、衣柜. 最优连续产量为 $(0, 0, 140, 25)$, 总收入 18000 美元. 三工序切割、打磨、涂装的已用小时分别为 $(480, 800, 800)$, 可用量为 $(480, 800, 900)$, 松弛为 $(0, 0, 100)$. 报告含三个未知数:

产品	最优量	检验数	收入系数	允许增加	允许减少	资源	影子价格	允许增加	允许减少
椅	0	-130	40	B	∞	切割	12.5	1120	160
书桌	0	A	90	C	∞	打磨	15	100	560
桌	140	0	100	100	10	涂装	0	∞	100
衣柜	25	0	160	240	80				

(a) 椅收入系数至少增加多少才可能进入最优生产? (b) 打磨增加 50 小时, 最大可支付多少? (c) 桌收入系数 100 降至 95, 新组合与收入是多少, 或说明资料不足. (d) 涂装 900 降至 700 小时, 从“收入不变”“减少 100 美元”“可能影响收入但无法确定量”中选择最准确者. (e) 书桌需切割 2、打磨 5、涂装 7 小时, 求 A . (f) 求 B .

解答. 官方解答重构. (a) 增加 130, 临界收入系数 170; 等号时可消除负检验数, 不强制所有最优解都生产椅. (b) 50 小时在允许 100 内, 最大支付 $50 \cdot 15 = 750$. (c) 降 5 在允许 10 内, 原组合不变, 收入 $18000 - 5 \cdot 140 = 17300$. (d) 选第三项; 减少 200 超过允许减少 100, 原报告只能证明前 100 小时不变, 无法算剩余部分影响. (e) $A = 90 - 12.5 \cdot 2 - 15 \cdot 5 - 0 \cdot 7 = -10$. (f) 非基本椅的允许增幅是负检验数绝对值, $B = 130$. $\square$


习题 16.15 作业 4 第 3 题. 一局棒球的简化零和博弈中, 打者可准备曲球或快球, 投手可投内角高快球、外角高快球、内角高曲球. 打者得分概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

双方都采用保守混合策略; 未得分则出局. (a) 建打者的行方 LP. (b) 建投手的列方 LP. (c) 图解打者最优策略与保证得分概率. (d) 不求解投手 LP, 给其最优策略可保证的最大出局概率, 简述依据.

解答. 官方解答重构并修正模型抄写. (a) 打者概率 $x \geq 0$, $x_1 + x_2 = 1$, 最大化 v , $P^T x \geq v\mathbf{1}$. (b) 投手概率 $y \geq 0$, $\mathbf{1}^T y = 1$, 最小化 w , $Py \leq w\mathbf{1}$. v, w 可取自由变量; 因所有概率非负, 加 $v, w \geq 0$ 也不改变本题最优值.

(c) 令 $p = x_1 \in [0, 1]$, 三列给得分概率 $0.5 - 0.2p$, $0.2 + 0.1p$, $0.3 + 0.1p$. 对每个 p , 最坏列始终为第二列 (第一列至少与它等值, 第三列多 0.1), 所以保证值 $0.2 + 0.1p$ 在 $p = 1$ 最大, 值 0.3. 打者最优是始终准备曲球.



官方 (a) 把准备快球时遇到曲球的 0.3 误抄为 0.2, (c) 又把三条保证值约束的方向倒置; 本稿始终按题面矩阵与 maximin 方向.

(d) LP 对偶 (或有限零和博弈极小极大定理) 使双方保证值同为 0.3, 所以投手可保证出局概率至少 0.7, 且不能保证更高. 这里说的是面对最佳应对的保证概率, 不是任意打者策略下的精确出局概率. $\square$

16.5 作业 5: 整数建模与逻辑约束

原题交期印为 “Thursday April 2th, 2013”, 但 2013 年 4 月 2 日是星期二. 此处保留这个来源冲突, 不猜成另一日期.

习题 16.16 作业 5 第 1 题. 六段广告长度依次为 12、18、22、35、40、59 秒. 每段不可拆分, 每个广告时间块至多 60 秒. 至少需要多少块?

解答. 官方解答重构并补具体安排. 总时长 186 秒, 三块至多 180 秒, 所以至少 4 块. 安排为 $\{59\}$ 、 $\{40, 18\}$ 、 $\{35, 22\}$ 、 $\{12\}$, 每块都不超 60, 故最少 4 块. 可建二元装箱模型: u_{ij} 表示广告 i 是否置于块 j , y_j 表示块是否用, 最小化 $\sum_j y_j$, 约束 $\sum_j u_{ij} = 1$, $\sum_i t_i u_{ij} \leq 60 y_j$. 用 6 个候选块保证有平凡可行方案. $\square$

习题 16.17 作业 5 第 2 题. 四个项目 A–D 的净现值、所需资本、产量分别为

$$v = (25, 20, 19, 28), \quad c = (11, 9, 14, 17), \quad p = (28, 20, 25, 30).$$

资本与净现值单位为百万美元, 产量单位为百万桶. 项目要么选、要么不选.

(a) 建净现值最大整数模型, 资本不超过 32, 产量至少 73. (b) 增加三条逻辑限制: (i) 选 A 必选 B; (ii) A 与 C 恰选一个; (iii) A、B、D 至少选一个. (c) 另考虑三年逐年限制, 资本矩阵、产量矩阵和上、下限为

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 3 & 5 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \\ 8 & 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}, \quad \bar{c} = (18, 10, 7), \quad \underline{p} = (20, 25, 30).$$

写净现值最大模型. (d) 推广到 n 项目、 L 年, 以 $\text{npv}_j, c_{ij}, p_{ij}, C_i, P_i$ 表示净现值、逐年资本与产量以及限制, 写模型.

解答. 官方解答重构并修正项目下标. (a) $\max 25x_A + 20x_B + 19x_C + 28x_D$, $11x_A + 9x_B + 14x_C + 17x_D \leq 32$, $28x_A + 20x_B + 25x_C + 30x_D \geq 73$, $x \in \{0, 1\}^4$.

(b)(i) $x_A \leq x_B$. (ii) $x_A + x_C = 1$. (iii) $x_A + x_B + x_D \geq 1$. 官方 (ii) 误写 B, (iii) 误写 C, 本稿按原逻辑修正. (c) 目标仍为 $v^T x$, 约束 $Cx \leq \bar{c}$, $Px \geq \underline{p}$, $x \in \{0, 1\}^4$. (d) $\max \sum_j \text{npv}_j x_j$, 每年 $\sum_j c_{ij} x_j \leq C_i$, $\sum_j p_{ij} x_j \geq P_i$, $x_j \in \{0, 1\}$.

原题只要求建模, 不保证数据可行. 实际枚举 16 个项目集合, (a) 及 (c) 各自均无可行方案. (a) 任意两项目产量不足 73, 任意三项目资本至少 34 超过 32. (c) 第三年资本限 7 只容许最多两项目, 能达到的第三年产量最多 18, 小于 30. 不能编造“最优选择”替代这些冲突. $\square$

习题 16.18 作业 5 第 3 题. 给二元 x_1, x_2 , 用线性约束表示 (a) $w = x_1 \text{ AND } x_2$; (b) $y = x_1 \text{ OR } x_2$; (c) $z = x_1 \text{ XOR } x_2$. AND 仅在两输入均 1 时为 1, OR 在至少一输入为 1 时为 1, XOR 在恰一输入为 1 时为 1. (a)、(b) 不可另加辅助变量; (c) 可加辅助变量.

解答. 官方解答重构并补变量范围. (a) $0 \leq w \leq 1$, $w \leq x_1, w \leq x_2, w \geq x_1 + x_2 - 1$. (b) $0 \leq y \leq 1$, $y \geq x_1, y \geq x_2, y \leq x_1 + x_2$. 二元输入使连续 w, y 也被唯一迫成相应 0 或 1; 官方若不声明 $w \geq 0$, 两输入 0 时允许负 w , 若不声明 $y \leq 1$, 两输入 1 时允许 $y = 2$.

(c) 用 (a) 约束定义 $a = \text{AND}(x_1, x_2)$, 并令 $z = x_1 + x_2 - 2a$, $0 \leq z \leq 1$. 对 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 依次得到 $(w, y, z) = (0, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)$, 逐行证明等价. $\square$

习题 16.19 作业 5 第 4 题. 原整数规划为

$$\max(10x_1 + 22x_2 + 5x_3 + 15x_4 + 17x_5 + 12x_6 + 4x_7),$$

$$5x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 9x_4 + 16x_5 + 5x_6 + 10x_7 \leq 700, \quad x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}, \quad x_4, \dots, x_7 \in \{0, \dots, 200\}.$$

各小问独立, 只加相应约束或变量. 使用大 M 时取保证逻辑有效的最小值.

(a) 一条线性约束表示 $x_2 = 1 \Rightarrow x_1 = 0$. (b) 一条表示 x_1, x_3 不能都 1. (c) 加一个整数 w_4 与一条约束, 使 x_8 除 6 余 3; 原题确写 x_8 , 原模型未定义其范围, 不猜成另一变量. (d) 加三个二元 w_5, w_6, w_7 和两约束, 使 $x_5 \in \{9, 15, 20\}$. (e) 加三二元 w_1, w_2, w_3 且至多四约束, 使 $x_4 \geq 50$, $x_5 \leq 25$, $x_6 + x_7 \leq 100$ 至少两项成立. (f) 表示 $2x_4 + x_5 \leq 50$ 与 $4x_4 - x_5 \geq 20$ 恰好一项成立. (g) 建模成本 $F = f_4(x_4)$, 其中 $0 \leq x_4 \leq 50$ 时 $F = 20x_4$, $51 \leq x_4 \leq 100$ 时 $F = 1000$, $101 \leq x_4 \leq 200$ 时 $F = -500 + 15x_4$.

解答. (a)、(b)、(c)、(d) 据官方解答重构, (e)–(g) 的逻辑与成本解释由 AI 独立修正. (a) $x_1 + x_2 \leq 1$. (b) $x_1 + x_3 \leq 1$. (c) $x_8 = 6w_4 + 3$, $w_4 \in \mathbb{Z}$, 明示 x_8 为新增的余数约束量; 其余用途与上下界未给. (d) $x_5 = 9w_5 + 15w_6 + 20w_7$, $w_5 + w_6 + w_7 = 1$.

(e) 原资源约束与整数性已给 $x_4 \leq 77$, $x_5 \leq 43$, $x_6 + x_7 \leq 140$. 若把每个蕴含独立失活, 足够且分别最紧的常数为 50、18、40. 但原题要求整个逻辑模型的最小值, 还可利用“至少两项”的联系收紧: 若 $x_5 > 25$, 必须 $x_4 \geq 50$, 两者至少耗 $450 + 416 > 700$, 不可能; 若 $x_6 + x_7 > 100$, 也须 $x_4 \geq 50$, 至少耗 $450 + 505 > 700$, 仍不可能. 因而原逻辑在资源域上恰等价于 $x_5 \leq 25$ 且 $x_6 + x_7 \leq 100$.

保留原题要求的三个二元变量与至多四约束, 可写

$$x_4 \geq 50 - 50(1 - w_1), \quad x_5 \leq 25 + 0(1 - w_2),$$

$$x_6 + x_7 \leq 100 + 0(1 - w_3), \quad w_1 + w_2 + w_3 \geq 2.$$

联立模型的最小非负常数为 $(50, 0, 0)$: 对任意满足后两条件的点取 $w_2 = w_3 = 1, w_1 = 0$, 即满足全部约束; $x_4 = 0$ 也应被容许, 故第一常数不能小于 50. 若坚持共用一个 M , 最小仍为 50. 官方用 300 未满足“最小”要求. 脚本实际枚举资源域的 $(x_4, x_5, x_6 + x_7)$ 逐一核对联立逻辑.

(f) 原整数域让两否定分别为 $2x_4 + x_5 \geq 51$, $4x_4 - x_5 \leq 19$. 令 $w \in \{0, 1\}$, 加

$$2x_4 + x_5 \leq 50 + 104(1 - w),$$

$$2x_4 + x_5 \geq 51 - 51w,$$

$$4x_4 - x_5 \geq 20 - 63w,$$

$$4x_4 - x_5 \leq 19 + 289(1 - w).$$

$w = 1$ 恰表示第一项成立、第二项不成立; $w = 0$ 恰相反. 原资源域上 $u = 2x_4 + x_5$ 的最大值 154, $v = 4x_4 - x_5$ 的最小与最大值为 $-43, 308$, 并可达到 $u = 0$. 因此这四个失活界的最小 M 分别是 104、51、63、289. 脚本枚举原域

全部 1765 对 (x_4, x_5) 逐一验证与 XOR 真值一致. 官方两个蕴含加二元和为 1 只保证“至少一项”, 两项同时成立时也允许, 并未实现原题的排他条件.

(g) 用二元 t_1, t_2, t_3 和整数 y_1, y_2, y_3 :

$$\sum_i t_i = 1, \quad x_4 = \sum_i y_i, \quad 0 \leq y_1 \leq 50t_1, \quad 51t_2 \leq y_2 \leq 100t_2, \quad 101t_3 \leq y_3 \leq 200t_3,$$


$$F = 20y_1 + 1000t_2 - 500t_3 + 15y_3.$$

恰一个区间激活, 其他 $y_i = 0$, 所以等式精确给所需成本. 原资源还使 $x_4 \leq 77$, 因而本模型的第三段实际不可达, 但分段函数本身仍完整编码. 如果 F 作为新增成本计入利润, 它在极大目标中应带负号. 原题没有说明 15 是未扣该成本的收入还是原有净贡献, 所以这里只定义 F ; 若 15 是收入, 目标该项为 $15x_4 - F$, 若要求用 F 替代既有成本则还需其收入数据. 官方直接以 $+F$ 替换 $+15x_4$ 会奖励成本, 不能称利润模型. $\square$

16.6 作业 6: 分支定界、覆盖割与 Gomory 割

原交期为 2013 年 4 月 11 日. 作业工作簿为实际的 .xlsb 文件, 官方解答工作簿为 .xlsx; 两者均已实际读取.

习题 16.20 作业 6 第 1 题. 用分支定界求极大整数规划, 目标系数全为整数. 下图节点的数是其 LP 松弛最优值. 在 N_4 得到的 LP 解也是整数可行解, 值 25, 作为当前最好方案.



- (a) 从 $v_9 \leq 27.2$, $v_9 \leq 26.5$, $v_9 = 26.5$, $v_9 \geq 25.2$ 中选最有信息且必正确者. (b) 给整数最优值 v^* 当前最佳上下界. (c) 依次判断 N_4, N_5, N_7, N_8, N_9 是活跃 A、可剪枝 F 或资料不足 NEI.

解答. 官方解答重构. (a) $v_9 \leq 26.5$, 因子节点增加限制而不能提高极大 LP 值. (b) 叶节点中未剪枝者的最高 LP 界为 N_5 的 26.8, N_9 也至多 26.5. 整数目标值可向下取整, 所以 $25 \leq v^* \leq 26$. 原解答只援引 N_3 的 26.5 不能单独界住另一分支, 这里补全 N_5 说明.

(c) N_4 为 F, 因 LP 最优解已整数; N_5 为 A, 因目标 26.8 非整数, LP 解不是整数方案, 其向下取整界 26 仍高于 25; N_7 为 F, 因 24.8 低于当前方案; N_8 为 F, 因 $\lfloor 25.2 \rfloor = 25$ 不能改善当前方案; N_9 为 NEI, 只知上界 26.5 不能判断是否可改善 25. $\square$

习题 16.21 作业 6 第 2 题. 六投资净现值为 (33, 45, 25, 17, 39, 23), 所需现金为 (10, 14, 8, 6, 12, 8), 现金总限 28.

(a) 建 0-1 投资模型. (b) 以 $x = (1, 0, 0, 1, 1, 0)$ 、值 89 为当前方案, 求工作簿的前五节点 LP 解与值并说明是否剪枝: N_1 无附加约束, $N_2 : x_1 = 0$, $N_3 : x_1 = 1$, $N_4 : x_1 = x_2 = 0$, $N_5 : x_1 = 0, x_2 = 1$. (c) 解释 N_2, N_3 为何有一个重复 N_1 解, N_4, N_5 为何有一个重复 N_2 解.

解答. 官方工作簿解答重构并修正 N_3 显示值. (a) $\max 33x_1 + 45x_2 + 25x_3 + 17x_4 + 39x_5 + 23x_6, 10x_1 + 14x_2 + 8x_3 + 6x_4 + 12x_5 + 8x_6 \leq 28, x \in \{0, 1\}^6$.

(b) 节点 LP 以 $0 \leq x \leq 1$ 替代二元条件, 结果为

节点	LP 产量 $(x_1, \dots, x_6)$	目标	剪枝?
N_1	$(1, 3/7, 0, 0, 1, 0)$	639/7	否
N_2	$(0, 1, 1/4, 0, 1, 0)$	361/4	否
N_3	$(1, 3/7, 0, 0, 1, 0)$	639/7	否
N_4	$(0, 0, 1, 0, 1, 1)$	87	是
N_5	$(0, 1, 1/4, 0, 1, 0)$	361/4	否

最优 LP 可以按单位现金净现值由高到低填充, 或用实际求解的对偶价格验证. 原解答工作簿给 N_3 值 91.25, 与它列出的产量不符; 正确 $639/7 = 91.2857143$. N_4 已整数且值 87 低于 89, 可剪; 其他节点的整数上界仍超过 89.

(c) N_1 解本已有 $x_1 = 1$, 增加该等式保留原最优点且缩小可行域, 所以 N_3 重复; N_2 解本已有 $x_2 = 1$, 同理 N_5 重复. 这也说明对一个已经整数的变量分支未必有效切掉当前 LP 点. $\square$

习题 16.22 作业 6 第 3 题. 对上题模型用割平面, 当前整数方案仍是值 89 的 $(1, 0, 0, 1, 1, 0)$, 题目说明它确为整数最优.

(a) 解 LP, 能否以该结果证明 89 最优? 若不能继续. (b) 取 (a) 解中三个正变量的下标 i, j, k , 加 $x_i + x_j + x_k \leq 2$, 重解并判断能否证明 89 最优. (c) 再取 (b) 解中三个正变量, 追加同形割, 重解并判断. 说明所加割为何对整数解有效.

解答. 官方解答重构并补割的有效性. (a) 解 $(1, 3/7, 0, 0, 1, 0)$, LP 值 639/7, 整数上界 91 仍大于 89, 不能证明.

(b) 正变量 1、2、5 的现金总额 36 超过 28, 三者不能全选, 所以覆盖割 $x_1 + x_2 + x_5 \leq 2$ 有效. 新 LP 解为 $(1, 0, 3/4, 0, 1, 0)$, 值 90.75, 向下取整界 90 仍大于 89, 不能证明.

(c) 正变量 1、3、5 现金和 30 超过 28, 追加 $x_1 + x_3 + x_5 \leq 2$. 新 LP 解为 $(1, 3/5, 3/5, 0, 2/5, 0)$, 值 90.6, 界 90 仍大于 89, 也不能证明. 分数 LP 解本身并非“不可能证明”的理由; 若其目标向下取整已不超过 89, 即便分数也可完成证书, 这里是具体界未足够紧. 另外实际枚举 64 个投资集合可独立验证整数最优为 89, 但这不改变题目所问三次 LP 证书的结论. $\square$

习题 16.23 作业 6 第 4 题. 0-1 背包目标为 $22x_1 + 10x_2 + 16x_3 + 11x_4 + 18x_5 + 6x_6$, 容量约束 $4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 5x_5 + 8x_6 \leq 15$. 判断下列不等式是否对所有整数可行解有效: (a) $x_1 + x_3 + x_4 \leq 2$; (b) $x_2 + x_3 + x_5 \leq 2$; (c) $x_3 + x_5 \leq 1$; (d) $x_1 + x_2 + x_4 + x_6 \leq 3$.

解答. 官方解答重构. (a) 有效, 三项全选重量 17 超过 15. (b) 无效, 仅选 2、3、5 重量恰 15 而左端 3. (c) 无效, 仅选 3、5 重量 12 而左端 2. (d) 有效, 四项全选重量 21 超过 15, 故至多三项. $\square$

习题 16.24 作业 6 第 5 题. 整数规划为 $\max(4x_1 + 3x_2), 2x_1 + x_2 \leq 11, -x_1 + 2x_2 \leq 6, x_1, x_2 \geq 0$ 且整数. 令 s_1, s_2 为两约束松弛. LP 最优表为

	x_1	x_2	s_1	s_2	右端
$-z$	0	0	$-11/5$	$-2/5$	$-133/5$
x_1	1	0	$2/5$	$-1/5$	$16/5$
x_2	0	1	$1/5$	$2/5$	$23/5$

(a) 当 x_1, x_2 整数时, 松弛是否必为整数, 说明理由. (b) 从两条约束行各导出一条 Gomory 割. (c) 用原变量表示两割, 画可行域与割. (d) 加入必要的割后重解, 最优表如下, s_3 为新增割松弛. 哪些行可导出 Gomory 割? 导出并换回原变量.

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	右端
$-z$	0	0	-2	0	-1	-26
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	$7/2$
s_2	0	0	$1/2$	1	$-5/2$	$3/2$
x_2	0	1	0	0	1	4

(e) 画新割, 图解最优方案并判断是否整数最优; 原题提示最终值应为 25.

解答. 官方解答重构, 图中原第一约束错标的系数已按题面修正. (a) $s_1 = 11 - 2x_1 - x_2, s_2 = 6 + x_1 - 2x_2$, 都是整数之差, 故必整数.


(b) 对整数等式 $x_B + \sum_j a_j x_j = b$, 向下取整得到 $x_B + \sum_j \lfloor a_j \rfloor x_j \leq \lfloor b \rfloor$, 再减原等式, 得 $\sum_j \{a_j\} x_j \geq \{b\}$. 第一行负系数 $-1/5$ 的分数部分是 $4/5$, 不是 $-1/5$. 所以两割为

$$\frac{2}{5}s_1 + \frac{4}{5}s_2 \geq \frac{1}{5}, \quad \frac{1}{5}s_1 + \frac{2}{5}s_2 \geq \frac{3}{5}.$$

(c) 代入 (a) 得到 $x_2 \leq 9/2$ 与 $x_2 \leq 4$, 后者更强, 只需加入后者. 原可行多边形的四个顶点为

$$(0, 0), \quad (11/2, 0), \quad (16/5, 23/5), \quad (0, 3).$$

下图虚线为第一轮两条割, 实线斜割为第二轮; 着色为两轮割后可行域.



(d) x_1 与 s_2 两行右端为半整数, 各自均给 $\frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{2}s_3 \geq \frac{1}{2}$, 即 $s_1 + s_3 \geq 1$. x_2 行全为整数, 没有非平凡分数割. 用 $s_3 = 4 - x_2$ 换回, 新割为 $x_1 + x_2 \leq 7$.

(e) 新 LP 最优点 $(4, 3)$, 值 25. 将原第一约束乘 1、新割乘 2 相加, 给 $4x_1 + 3x_2 \leq 11 + 14 = 25$, 该整数点达到上界. 因为所有割对原整数解有效, 这也证明了原整数规划的最优性. $\square$

17 15.053 习题课题目与解答

本章逐题对应 Spring 2013 的 Recitation 1–10, 助教为 Giacomo Nannicini 与 Ebrahim Nasrabadi. 保留原题号和第一层子问; 同一原编号重复出现时用映射说明区分. “官方解答重构”表示依据官方答案重写并独立核算, “AI 补解/修正”表示补足官方缺答、修正误植或处理原题条件缺口. 数值与换基由附带的 `tools/audit_lp_recitations.py` 实际运行复核, 计算不以软件输出替代论证. 与第12章相同的标准形、换基和灵敏度理论直接沿用该章.

17.1 Recitation 1: 建模与凸性

习题 17.1 原题 1. 一家小型配餐企业当天完成烹饪、包装、配送; 配送时间为中午 12 点至下午 2 点, 三项工序每天可用时间分别为 4、2、2 小时. 三种餐点 H (鹰嘴豆泥配饼)、M (慕萨卡) 与 T (塔布勒沙拉) 的数据如下, 产量允许非整数.

	H	M	T
烹饪速度 (份/小时)	10	5	15
包装速度 (份/小时)	20	15	25
配送速度 (份/小时)	30	15	30
每份原料成本 (美元)	1	2	0.5
每份售价 (美元)	7	12	5
每天订单上限 (份)	20	10	30

(A) 写出利润最大的线性规划, 说明变量与约束名称, 并用 Excel 求解 (原提示: 最优 M 产量介于 5 与 10) .

- (B) 弟弟能每天用一小时协助其中一项工序, 效率相同, 可用自行车配送, 工资 10 美元. 是否聘用? 应分配哪项工序? 分别计算增加一小时的利润变化.
- (C) H 的订单上限降为 10, 最优配餐是否改变? 能否不重新求解就判断?
- (D) 要求每种餐点都不超过总份数的 50%. 写出新增约束, 判断是否线性, 必要时线性化.

解答. 官方解答重构, 并修正目标方向与零产量说明. (A) 令 x_H, x_M, x_T 为三种份数, 模型为

$$\max \quad 6x_H + 10x_M + 4.5x_T,$$

$$\text{烹饪: } x_H/10 + x_M/5 + x_T/15 \leq 4,$$

$$\text{包装: } x_H/20 + x_M/15 + x_T/25 \leq 2,$$

$$\text{配送: } x_H/30 + x_M/15 + x_T/30 \leq 2,$$

$$\text{订单: } 0 \leq x_H \leq 20, \quad 0 \leq x_M \leq 10, \quad 0 \leq x_T \leq 30.$$

最优解 (8, 6, 30), 利润 243 美元. 对烹饪、包装、T 订单约束分别乘 30、60、0.1 并相加, 目标系数恰为 (6, 10, 4.5), 给上界 $30 \cdot 4 + 60 \cdot 2 + 0.1 \cdot 30 = 243$, 证明最优. 附带脚本用线性规划求解器复算了原要求的电子表格计算.

(B) 增加烹饪、包装、配送各一小时后, 最优方案分别为 (20, 10, 25/3)、(20, 0, 30)、(8, 6, 30), 利润 257.5、255、243, 增量 14.5、12、0. 扣工资后净增 4.5、2、-10, 所以应聘用并协助烹饪. 官方把第三项名称误写为包装, 此处按配送解释.

(C) 原最优 $x_H = 8 \leq 10$ 仍可行; 新可行集缩小且包含原最优点, 最优值与该方案都不变.

(D) 用 $2x_i \leq x_H + x_M + x_T$ ($i = H, M, T$) 三条线性约束. 正总产量时它们等价于比例要求; 总产量为 0 时可约定全部比例限制成立. 线性式本身允许零方案, 官方“相乘后排除零方案”的说法不正确. 原官方模型把利润目标写成 min, 也与 243 的正产量答案冲突, 应为 max. $\square$

习题 17.2 原题 2. 四个函数为 $f(x) = x^2/2 - 5$, $g(x) = x^3/4$, $h(x) = -2\log(x+5)$, $\ell(x) = x^2/2 - 2\sin x - 5$ (原图显示区间 $[-4, 4]$, h 的自然定义域是 $(-5, \infty)$).

(A) 判断四个函数哪些是凸函数.

(B) 判断下列哪些是凸函数: (a) $f + g$; (b) πh ; (c) $2.5f + h$; (d) $\max\{f/3, h/7\}$; (e) $-\ell$.

解答. 官方选择重构, AI 修正其理由. (A) 凸的是 f, h : $f'' = 1$, $h'' = 2/(x+5)^2 > 0$; $g'' = 3x/2$ 在所示区间变号, $\ell'' = 1 + 2\sin x$ 也变号. (B) 凸的是 (b)、(c)、(d), 由正倍数、和、逐点最大保持凸性. (a) 的二阶导数 $1 + 3x/2$ 在 $x < -2/3$ 为负. (e) 的二阶导数 $-1 - 2\sin x$ 变号, 所以既非凸亦非凹; 官方称其为凹函数不成立. PDF 中该符号是 ℓ , 文本抽取容易误读为 f . $\square$

习题 17.3 原题 3. 判断下列规划是否为线性规划; 若不是, 说明能否等价线性化.

(a) $\min(0.5x_1 + 3x_2)$, $x_1 + 1.35x_2 = 2.7$, $x_1 \geq 0$, x_2 自由.

(b) $\max(0.5x_1 + 3x_2)$, $0.99x_1 + x_2 \geq 2.7$, $x_1 - x_2 < 8$, $x_1, x_2 \geq 0$.

(c) $\min(0.5x_1 + 3x_2), (0.99x_1 + x_2)/x_2 \geq 2.7, x_1 - x_2 \leq 8, x_1 \geq 0, x_2$ 自由.

(d) 同 (c), 但 $x_2 \geq 1.5$.

解答. 官方分类重构, AI 补充严格等价性. (a) 是 LP, 自由变量不破坏线性. (b) 含严格不等式, 不属于通常以非严格不等式定义的 LP; 不能随意将 $<$ 换成 $\leq$ 并声称可行集相同. 本例目标沿 (t, t) 无界, 替换后虽也无界, 但这只说明最优值相同.

(c) 原分式要求 $x_2 \neq 0$. 若 $x_2 < 0$, 由 $x_1 \geq 0$ 得 $0.99x_1/x_2 \leq 0$, 不可能达到 1.7. 故可行性实际上强制 $x_2 > 0$, 分式等价于 $0.99x_1 \geq 1.7x_2$ 与 $x_2 > 0$. 该集合不闭: 取 $x_2 = \varepsilon, x_1 = (170/99)\varepsilon$ 趋于原式未定义的原点. 因而不能通过仅含连续变量的普通有限 LP 提升精确表示它. 目标下确界 0 不取到; 若只写交叉相乘而允许 $x_2 = 0$, 就错误增加了取到 0 的解.


(d) 分母严格正, 可等价替为 $0.99x_1 \geq 1.7x_2$, 其余条件保留, 得 LP. $\square$

习题 17.4 原题 4. 有 m 个工厂和 n 个客户, 工厂 i 产能 p_i , 客户 j 需求 d_j , 单位运输成本 c_{ij} . 可运输分数量, 建立满足全部需求、不超过产能的最小成本 LP, 明确变量.

解答. 官方解答重构. 令 $x_{ij} \geq 0$ 为工厂 i 运往客户 j 的数量, 则 $\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij}$, 条件 $\sum_i x_{ij} = d_j$ (每个 j) 及 $\sum_j x_{ij} \leq p_i$ (每个 i). 需求等式表示按给定需求配送, 不允许额外配送改变成本. $\square$

17.2 Recitation 2: 几何与单纯形

习题 17.5 原题 1. 一个非空二维多面体的顶点依次为 B, D, F , 下边界为射线 BA 、线段 BD, DF 和射线 FG , 可行区域向右上无界. C 在 BD 内部, E 在 DF 内部, A, G 分别在两条射线上, H 在可行域内部. 下图独立绘制其关联关系, 不为原图增添数值坐标. 对任意线性目标, 判断下列断言.



- (a) F 不可能是唯一最优点.
- (b) 若 C 最优, 则 D 也最优.
- (c) 若 A, B 最优, 则目标无界.
- (d) 若 B, F 最优, 则 G 不最优.


- (e) 若 B, D, F 都不最优, 则目标无界.
- (f) 存在目标使问题不可行.
- (g) 若 B, D, F 都不最优, 则问题不可行.
- (h) D, F 可以同时是仅有的两个最优点.
- (i) 若 D, G 最优, 则有无穷多个可行点.
- (j) 即使最优值有限, G 仍可能最优.
- (k) 存在目标使 H 最优而 A 不最优.
- (l) 若 H 最优, 则最优解无穷多, 且目标值趋于正或负无穷.

解答. 官方判断重构并补理由. (a) 假, 在 F 两条相邻边法向量之间选择严格支持方向即可唯一最优. (b) 真, 线性目标在 BD 的内部点达到最优时两端同值. (c) 假, 整条射线可以同值最优, 不表示目标值无界. (d) 假, BF 的内部点属于二维可行域内部, 若它最优则目标必须常数, G 也最优. (e) 真, 此无直线的多面体若最优值有限, 必有最优顶点. (f)、(g) 假, 目标不改变已经非空的可行集. (h) 假, 两点最优强制连线段也最优. (i) 真, DG 已含无穷多可行点, 可行域本来也是无界的. (j) 真, 可选择支持射线 FG 的目标. (k) 假, 内点 H 最优迫使目标常数, A 同时最优. (l) 假, 这时目标恒定且有限, 不趋于无穷. 这里“无界”始终指目标无界, 不只是可行区域无界. $\square$

习题 17.6 原题 2. 可行集为 $x_1 - x_2 \geq -1.5, x_1 - 2x_2 \leq 2, 4x_1 + x_2 \geq 2, x_1, x_2 \geq 0$.

- (a) 画可行域. 每个线性目标都有最优解吗? 为什么?
- (b) 分别给出: 使 $(0, 0), (0, 1.5)$ 同时最优的极小目标; 使 $(0, 1.5)$ 唯一最优的极小目标; 使目标无界的极大目标. 不存在时解释.

解答. AI 修正官方漏查可行性. 可行域的三个顶点是 $(1/10, 8/5), (1/2, 0), (2, 0)$; 从第一点沿 $(1, 1)$ 、从第三点沿 $(2, 1)$ 向无穷延伸. 可行点位于 $x_2 = x_1 + 3/2$ 的下方, $x_2 = (x_1 - 2)/2$ 与 $x_2 = 2 - 4x_1$ 的上方, 并满足非负性.



$4x_1 + x_2 \geq 2$ 排除了 $(0, 0)$ 和 $(0, 1.5)$, 后者仅给 1.5, 所以 (b) 前两项都不存在. 官方图与答案未落实这条约束, 不能照搬. 极大目标 $\max x_1$ 沿 $(2, 0) + t(2, 1)$ 趋于正无穷, 因此 (a) 答案是否定, (b) 末项可用此例. $\square$

习题 17.7 原题 3. $\max(10x_1 + 8x_2 - 3x_3)$, 约束 $2x_1 + 4x_2 - 0.5x_3 \leq 6$, $-2x_1 + 6x_2 - 4.5x_3 \leq 4$, $x_1, x_2 \geq 0$, x_3 自由.

- (a) 转为规范形, 解释新变量, 列出全部变量的初始基本可行解.
 (b) 列初始单纯形表, 做两次换基, 判断所得解是否最优.
 (c) 将首约束的 $2x_1$ 改为 $-2x_1$, 列新初表并尝试一次迭代, 说明结果.

解答. 官方解答重构, 修正第二步进入变量名称. (a) 令 $x_3 = u - v$, $u, v \geq 0$, 加松弛 s_1, s_2 . 初始 $s_1 = 6, s_2 = 4$, 其余变量 0. (b) 列顺序 $(x_1, x_2, u, v, s_1, s_2; \text{RHS})$ 的初表为

$$\begin{pmatrix} 10 & 8 & -3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1/2 & 1/2 & 1 & 0 & 6 \\ -2 & 6 & -9/2 & 9/2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

首行表示 $-z$ 行. x_1 进入、 s_1 离基后为

$$\begin{pmatrix} 0 & -12 & -1/2 & 1/2 & -5 & 0 & -30 \\ 1 & 2 & -1/4 & 1/4 & 1/2 & 0 & 3 \\ 0 & 10 & -5 & 5 & 1 & 1 & 10 \end{pmatrix}.$$

然后是 $v = x_3^-$ 进入, 比值 $3/(1/4) = 12$ 与 $10/5 = 2$, s_2 离基. 终表为

$$\begin{pmatrix} 0 & -13 & 0 & 0 & -51/10 & -1/10 & -31 \\ 1 & 3/2 & 0 & 0 & 9/20 & -1/20 & 5/2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 1/5 & 1/5 & 2 \end{pmatrix}.$$

所有检验数非正, $(x_1, x_2, x_3) = (5/2, 0, -2)$ 最优, 值 31. 官方文字把进入列误写 x_3^+ , 表中实际是 x_3^- .

(c) 仅把初表第一约束行的首元素 2 改为 -2 . 进入 x_1 的两约束列系数均为 -2 , 无离基候选. 射线 $(x_1, x_2, x_3) = (t, 0, 0)$ 对 $t \geq 0$ 可行, 目标 $10t \rightarrow \infty$; 算法报告无界, 不会完成普通的有限主元换基. $\square$

习题 17.8 原题 4. $\max(2x_1 + 4x_2)$, $0.5x_1 - 5x_2 \leq 12$, $x_1 + 2x_2 \geq -2$, $x_2 + x_3 \geq 4$, $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

- (a) 转规范形, 列初表及初始基本可行解, 注意原变量中至少有一项基本.
 (b) 选最大正检验数进入, 列离基候选和比值, 写一次换基后的表.
 (c) 一次迭代后算法会终止吗? 为什么? 最优值如何?

解答. 官方解答重构. 加变量得 $0.5x_1 - 5x_2 + s_1 = 12$, $-x_1 - 2x_2 + s_2 = 2$, $x_2 + x_3 - s_3 = 4$. 初基 $(s_1, s_2, x_3) =$

(12, 2, 4), 其余 0. 列顺序 $(x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3; \text{RHS})$:

$$T_0 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & -5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 12 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad T_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 & 0 & 0 & 4 & -16 \\ 1/2 & 0 & 5 & 1 & 0 & -5 & 32 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 1 & -2 & 10 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

x_2 进入, 只有 x_3 的列系数正, 比值 4, 故 x_3 离基. 新表中 s_3 检验数 4, 约束列系数 $(-5, -2, -1)$ 全非正, 检测无界而终止. 射线 $(x_1, x_2, x_3) = (0, 4 + t, 0)$ 可行, 目标 $16 + 4t \rightarrow \infty$. $\square$

17.3 Recitation 3: 多最优解、退化与 Phase I

习题 17.9 原题 1. 极大单纯形初表列为 $(x_1, x_2, x_3, s_1, s_2; \text{RHS})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5/4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

(A) 每次选最大检验数进入, 求最优解与最优值, 判断唯一性. (B) 从终表描述全部最优解, 可先求各最优顶点再给参数方程.

解答. 官方解答重构. (A) 先 x_2 进入、 s_2 离开, 后 x_1 进入、 s_1 离开, 两表为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 & 0 & -1 & -4 \\ 2 & 0 & 1/2 & 1 & -1/2 & 4 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1/2 & -3/4 & -6 \\ 1 & 0 & 1/4 & 1/2 & -1/4 & 2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 & 1/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

最优 $(2, 2, 0)$, 值 6. x_3 有零检验数且可增加正步长 4, 所以有不同最优点, 并非只凭零检验数判断.

(B) $z = 6 - s_1/2 - 3s_2/4$, 最优必须 $s_1 = s_2 = 0$. 令 $x_3 = t$, 则全部最优解为 $(x_1, x_2, x_3) = (2 - t/4, 2 - t/2, t)$, $0 \leq t \leq 4$, 端点为 $(2, 2, 0)$ 与 $(1, 0, 4)$. 从终表让 x_3 进入时 x_2 离开, 得第二端点; 上述等式证明没有别的最优解. $\square$

习题 17.10 原题 2. 极大表列为 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5; \text{RHS})$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & 2 & 0 & -6 \\ 1 & -4 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

(A) 给当前基本可行解、目标值与是否退化. (B) 换基一次, 给新解、新值, 与原变量点和表分别比较. (C) 证明无界并给改善目标的可行射线方程.

解答. 官方解答重构. (A) $x = (0, 0, 2, 0, 5)$, $z = 6$, 基本变量 $x_1 = 0$, 所以退化. (B) x_4 进入 (官方误称 s_1), 比值 $0/2 = 0, 2/3$, x_1 离基, 新表为

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 1/2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

变量点与值不变, 基与表改变. (C) 令 $x_1 = 0, x_2 = t, x_3 = 2, x_4 = 2t, x_5 = 5 + t, t \geq 0$, 则可行且 $z = 6 + t \rightarrow \infty$. $\square$

习题 17.11 原题 3. $\max(x_1 + 3x_2)$, $2x_1 - 2x_2 = 1$, $x_1 + x_2 \geq 5$, $x_1, x_2 \geq 0$. (A) 加剩余与人工变量, 给 Phase I 目标、辅助 LP、初表和初始解. (B) 做两次迭代, 判断 Phase I 是否完成, 是否得到原问题的基本可行解并说明.

解答. 官方解答重构. 令剩余 s_1 , 人工 s_2, s_3 , 方程 $2x_1 - 2x_2 + s_2 = 1$, $x_1 + x_2 - s_1 + s_3 = 5$, 全部非负. 极大辅助目标 $w = -s_2 - s_3 = 3x_1 - x_2 - s_1 - 6$. 列顺序 $(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3; \text{RHS})$ 的三表为

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & -3/2 & 0 & 9/2 \\ 1 & -1 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 2 & -1 & -1/2 & 1 & 9/2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1/2 & 1/4 & 1/2 & 11/4 \\ 0 & 1 & -1/2 & -1/4 & 1/2 & 9/4 \end{pmatrix}.$$

初始 $s_2 = 1, s_3 = 5$, 其余 0. 首步 x_1 进入、 s_2 离开; 次步 x_2 进入、 s_3 离开. 辅助最优值 0, 两人工变量都为 0 且已离基, 删除其列后 $(x_1, x_2) = (11/4, 9/4)$ 为原问题基本可行解, 可恢复原目标进入 Phase II. $\square$

习题 17.12 原题 4 (原课注明不考的进阶题). 原变量 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$, 人工变量 s_1, s_2, s_3 . Phase I 最优值 0 的表为

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	RHS
$-w$	0	0	-1	-3	0	-1	0
x_1	1	0	2	1	0	2	4
x_2	0	1	1	-3	0	5	1
s_2	0	0	b	1	1	-1	0

(A) $b = -2$ 时如何使人工变量离基? 给原问题基与可开始 Phase II 的约束表. (B) $b = 0$ 时怎么办? 解释末行作为原等式线性组合的意义, 给基与约束表. 原目标未给, 不必写其系数.

解答. 官方解答重构. (A) 用末行 -2 为主元让 x_3 进入、 s_2 离开. 虽主元负且该列检验数负, 末行 RHS 为 0, 这次代数换基仍保持当前点可行. 人工列删去后约束表是 $I_3x = (4, 1, 0)^T$, 基为 (x_1, x_2, x_3) , 人工变量全部 0. 恢复原目标并消去基本列即可.

(B) 末行 $s_1 + s_2 - s_3 = 0$, 人工变量去掉后成为 $0 = 0$, 是冗余原等式. 删此行与全部人工列, 约束表为 $(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{smallmatrix})$, 列为 $(x_1, x_2, x_3; \text{RHS})$, 基 (x_1, x_2) , 解 $(4, 1, 0)$. 原目标未给, 不能把残留的辅助目标行当成 Phase II 的目标行. $\square$

17.4 Recitation 4: 灵敏度与活动定价

习题 17.13 原题 1 (数学数据的独立重述). 原习题引用 Bradley、Hax 与 Magnanti 的 *Applied Mathematical Programming*, 第 3 章题 3; 外书背景行文不转载. 以下保留课程给出的模型系数、报告和全部 11 项数学任务. 记钢、机械、卡车的出口量为 e_S, e_M, e_T , 总产量为 p_S, p_M, p_T , 都以单位/年计且非负. 模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & V = 900e_S + 2500e_M + 3000e_T - 300p_S - 150p_M - 500p_T, \\ & p_S - .75p_M - p_T - e_S = 0, \\ & p_M - .05p_S - .10p_T - e_M = 0, \\ & p_T - .08p_S - .12p_M - e_T = 0, \\ & p_S \leq 300000, \quad p_M \leq 50000, \quad p_T \leq 550000, \\ & .5p_S + 5p_M + 3p_T \leq 1200000. \end{aligned}$$

钢的 300 美元进口成本包括每单位两份 100 美元矿石与 100 美元其他材料; 其余进口成本为每机械 150、每卡车 500 美元. 劳动单位为人年. 课程最优报告为出口 $(0, 8750, 232500)$ 、总产量 $(300000, 50000, 262500)$, $V = 490625000$ 美元; 卡车产能余量 287500, 劳动余量 12500. 平衡等式的影子价格为 $(-2250, -2500, -3000)$; 钢、机械、卡车、劳动产能影子价格为 $(1585, 302.5, 0, 0)$. 钢出口检验数 -1350 , 售价允许增加 1350; 卡车生产成本允许增加 1350. 钢、机械产能的允许增加分别为 $25000/7$ 、 $50000/11$, 机械产能允许减少 $350000/43 \approx 8139.535$. 钢平衡等式 RHS 允许增加 232500.

- 从报告解释最佳生产、出口组合, 给单位与净出口价值.
- 三条平衡等式表示什么? 为什么采用等式?
- 50000 单位机械分别如何使用?
- 钢售价升至 1250 美元且选择出口一单位钢时, 净出口价值怎样改变?
- 新产品使用钢、机械、卡车或劳动四类资源时, 哪类最应节约? 说明使用的资源价格口径.
- 500000 美元投资可增加 500 单位卡车产能、1000 单位机械产能或 300 单位钢产能, 应选哪个?
- 每卡车进口材料成本增加 400 美元时, 最优出口组合与净价值如何?
- 年末额外库存 10000 单位钢, 如何改钢平衡式, 净出口价值改变多少?
- 期初库存 (S_s, M_s, T_s) 、期末目标库存 (S_e, M_e, T_e) , 如何改三条平衡式?
- 新出口产品每单位使用 1.5 人年、0.3 单位机械, 其售价须达到多少才值得生产?

(k) 机械产能降至 40000, 依据报告估计净出口价值, 判断是否精确及上/下界方向.

解答. 官方解答重构, (e)、(f)、(k) 加 AI 数学说明. (a) 三种总产量依次 300000、50000、262500 单位/年, 出口 0、8750、232500 单位/年, 净出口价值 490625000 美元. 代入平衡及产能即可验证可行, 给定影子价格满足对偶条件且与该值相等, 故最优.

(b) 产量等于内部使用加出口, 此模型无库存净变化和报废项, 所以物料守恒用等式. (c) 钢生产用 $0.05 \cdot 300000 = 15000$ 机械, 卡车生产用 $0.1 \cdot 262500 = 26250$, 剩 8750 出口.

(d) 新钢出口检验数 $-1350 + (1250 - 900) = -1000$. 强制出口一单位而按同一基调整其余产量时, 净价值减少 1000 至 490624000 美元; 仅改售价但不强制出口时原方案仍最优.

(e) 必须区别生产能力与中间产品. 若问占用**产能**, 官方口径选择钢产能, 因其每单位产能影子价格 1585 高于机械 302.5 及另两项 0. 若新产品直接**消耗现成钢、机械、卡车**, 正确机会价格来自物料平衡, 分别 2250、2500、3000 美元, 此口径卡车最高; 不能把钢产能价格 1585 当成一单位钢的材料价值. 子问 (j) 使用的 2500 正是第二口径.

(f) 三种单独增量都在基有效范围内, 毛收益分别 $0 \cdot 500 = 0$, $302.5 \cdot 1000 = 302500$, $1585 \cdot 300 = 475500$. 必须三选一时选钢; 若可以不投资且仅考虑这一年净收益, 三者都不足弥补 500000 支出.

(g) 最优变量不变, 成本变化在有效范围内; $V = 490625000 - 400 \cdot 262500 = 385625000$. (h) 钢平衡 RHS 改 10000, 净价值减少 $2250 \cdot 10000 = 22500000$, 为 468125000. (i) 三条平衡 RHS 分别改 $S_e - S_s, M_e - M_s, T_e - T_s$.

(j) 单位机会成本 $1.5 \cdot 0 + 0.3 \cdot 2500 = 750$ 美元; 等于 750 可达到盈亏平衡, 严格超过 750 才有严格的边际改善.

(k) 10000 的降幅超过允许 8139.535, 不能将影子价格变化当精确最优值变化. 原对偶解仍可行, 给上界 $490625000 - 302.5 \cdot 10000 = 487600000$. 官方只扣有效区间内的损失, 得约 488162791, 也是更松的上界. AI 重新求解得实际 $V = 1399400000/3 \approx 466466666.67$, 出口 $(0, 0, 686800/3)$ 、产量 $(860000/3, 40000, 770000/3)$. 机械产能与钢/机械零出口平衡确定该点, 劳动仍有余量; 新对偶价格可取平衡 $(-3580/3, -39200/3, -3000)$, 钢/机械/卡车/劳动产能 $(0, 34985/3, 0, 0)$, 其对偶值恰等于上述实际值. 原价格外推是上界, 不保证等号. $\square$

习题 17.14 原题 2. $\max(x_1 + 4x_2)$, 三资源约束 $x_1 - x_2 \leq 2$, $x_1 + 2x_2 \leq 4$, $x_1 \leq 3$, $x_1, x_2 \geq 0$ (非负条件由课程给定的松弛单纯形表体现). 加松弛 s_1, s_2, s_3 后最优表为

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
$-z$	-1	0	0	-2	0	-8
s_1	3/2	0	1	1/2	0	4
x_2	1/2	1	0	1/2	0	2
s_3	1	0	0	0	1	3

(a) 最优解是什么? (b) 各资源影子价格是多少? (c) 分别独立改变 x_1, x_2 的目标系数, 求保持该最优解的范围, 其他数据固定.

解答. 官方解答重构. (a) $(x_1, x_2) = (0, 2)$, $(s_1, s_2, s_3) = (4, 0, 3)$, 值 8. (b) 影子价格为 $(0, 2, 0)$, 由松弛检验数的相反数读取. (c) 非基本 x_1 的系数从 1 改 c_1 , 检验数为 $c_1 - 2$, 所以 $c_1 \leq 2$. 基本 x_2 的系数从 4 改 c_2 , 减去其行的 $c_2 - 4$ 倍使目标行规范化; 非基本 x_1, s_2 检验数分别 $1 - c_2/2, -c_2/2$. 故 $c_2 \geq 2$. 在端点仍保持当前解最优, 可出现其他同值解. $\square$

习题 17.15 原题 3. 初表列为 $(x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2, s_3; \text{RHS})$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & -2 & 0 & -6 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix},$$

末行基本变量原表误标 s_2 , 按单位列应为 s_3 . 给定最优表为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & -2 & -1/2 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & 3 & 3/2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) 给最优解. (b) 求各约束影子价格. (c) 新活动使用资源列 $(0.5, 2, 5)^T$, 求盈亏平衡单位收入. (d) x_4 的目标系数最多可增加多少而保持原解最优?

解答. 官方重构并 AI 修正 (b). (a) $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 1, 1, 0)$, 松弛全 0, 值 9. (b) 正确价格 $(2, 1/2, 0)$, 官方的 $(0.5, 0, 9)$ 是误复制. (c) 价格内积 $2 \cdot 0.5 + 0.5 \cdot 2 + 0 \cdot 5 = 2$, 收入 2 为盈亏平衡, 超过 2 才严格改善. (d) x_4 非基本且检验数 -1 , 最多增加 1, 即由 -2 增至 -1 ; 等号时当前解仍最优. $\square$

17.5 Recitation 5: Phase I 与零和博弈

习题 17.16 原题 1. 初始表为

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	RHS
$-z$	2	3	5	2	0	0	0	0
s_1	5	6	-1	2	1	0	0	6
s_2	-3	-1	2	-1	0	1	0	4
s_3	-2	0	2	-2	0	0	1	3

三次换基后约束行基本变量为 x_4, x_3, s_3 , 右端 $(16/3, 14/3, 13/3)$, 目标行松弛系数 $(-3, -4, 0)$, x_1, x_2, x_3, x_4 系数缺

失为 a, b, c, d , RHS 缺失为 e . 约束行的全部系数为

$$\begin{pmatrix} 1 & 11/3 & 0 & 1 & 2/3 & 1/3 & 0 & 16/3 \\ -1 & 4/3 & 1 & 0 & 1/3 & 2/3 & 0 & 14/3 \\ 2 & 14/3 & 0 & 0 & 2/3 & -2/3 & 1 & 13/3 \end{pmatrix}.$$

(a) 求单纯形乘子与 a, b, c, d, e . (b) x_2 目标系数从 3 增至 8, 原解仍最优吗?

解答. 官方解答重构. 乘子 $\pi = (3, 4, 0)$, 约化成本 $c_j - \pi a_j$ 给 $(a, b, c, d) = (-1, -11, 0, 0)$; 最优值 $2(16/3) + 5(14/3) = 34$, 所以 $e = -34$. x_2 非基本, 其系数增加 5 后检验数 $-6 \leq 0$, 其他不变, 原解仍最优. 允许增加包含端点 11, 官方“少于 11”可放宽为“不超过 11”. $\square$

习题 17.17 原题 2. $\max(x_1 - 2x_2)$, $3x_1 + x_2 \geq 3$, $x_1 + 2x_2 = 4$, $x_1, x_2 \geq 0$. (a) 转标准形. (b) 写构造初始可行基的 Phase I 问题. (c) 列规范初表, 新增变量最多 3 个, 目标行 RHS 必须正确.

解答. 官方解答重构. (a) 第一约束减剩余 $s_1 \geq 0$: $3x_1 + x_2 - s_1 = 3$. (b) 两行加人工 $w_1, w_2 \geq 0$, 方程 $3x_1 + x_2 - s_1 + w_1 = 3$, $x_1 + 2x_2 + w_2 = 4$, 辅助目标 $\max(-w_1 - w_2) = \max(4x_1 + 3x_2 - s_1 - 7)$. (c) 列 $(x_1, x_2, s_1, w_1, w_2; \text{RHS})$ 的规范初表为 $\begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 & 0 & 0 & 7 \\ 3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 初基 $w_1 = 3, w_2 = 4$, 其余 0. 目标行 RHS 为 7, 因初始辅助目标为 -7 . $\square$

习题 17.18 原题 3. 两人零和博弈, 行玩家收益矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$. (a) 建立行玩家最优混合策略 LP, 不必求解. (b) 建立列玩家最优混合策略 LP, 不必求解.

解答. 官方结构重构, AI 修正矩阵系数. (a) 令行概率 $x_i \geq 0$, $\sum_i x_i = 1$, 收益下界 v 自由, 最大化 v , 约束 $v \leq 2x_1 + 3x_2 - 3x_3$, $v \leq 3x_1 + x_2 - 3x_3$, $v \leq -2x_1 + 3x_3$. (b) 令列概率 $y_j \geq 0$, $\sum_j y_j = 1$, 上界 w 自由, 最小化 w , 约束 $w \geq 2y_1 + 3y_2 - 2y_3$, $w \geq 3y_1 + y_2$, $w \geq -3y_1 - 3y_2 + 3y_3$. 约束各自防范对方所有纯策略, 混合策略为纯策略期望的凸组合, 因此足够. 官方中间写概率 ≥ 1 , 以及行模型末项 x_3 缺系数 3, 都不符合题给矩阵. $\square$

习题 17.19 原题 4. 两人同时喊 1 或 2. 行玩家 Odd 在数字之和为奇数时赢, 列玩家 Even 在和为偶数时赢, 败者支付数字之和 (美元). 谁占优势?

解答. 官方结果重构并修正极值方向. Odd 收益矩阵为 $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$. 若 Odd 以概率 p 喊 1, 两种列选择收益为 $3 - 5p, 7p - 4$, 应求 $\max_{0 \leq p \leq 1} \min\{3 - 5p, 7p - 4\}$. 相交于 $p = 7/12$, 值 $1/12$; 左侧较小收益递增, 右侧较小收益递减, 故为最优. Even 也以概率 $7/12$ 喊 1 使行玩家两行期望相等, 证明双方最优及 Odd 每次平均占 $1/12$ 美元优势. 官方的 $\min \max$ 是极值方向误植. $\square$

17.6 Recitation 6: 整数模型与分段线性函数

习题 17.20 原题 1. 整数规划 $\max c^T x$, $c = (21, 32, 40, 49, 57, 71, 82, 91, 100, 109)^T$, 资源约束 $\sum_{i=1}^{10} (i+1)x_i \leq 900$, $x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}$, 其余 x_i 为 $[0, 100]$ 中整数. 原显示式未重复后七项的整数声明, 以下按题名与分段整数区间的原意解释. 每小问独立, 只写新增变量和约束.

- (a) 用一条线性约束表示 “ $x_1 = 1$ 则 $x_2 = 0$ ” .
- (b) 用一条约束表示 “ $x_2 = 1$ 或 $x_3 = 0$, 但不能两者都成立” .
- (c) 加二元 w_1 与两条约束, 使 $x_5 + x_6 \geq 70$ 时 $w_1 = 1$, $x_5 + x_6 \leq 69$ 时 $w_1 = 0$.
- (d) 加三二元 w_2, w_3, w_4 与至多四约束, 确保 $x_5 \leq 92$, $x_6 \leq 40$, $x_7 + x_8 \geq 74$ 中至少一条成立.
- (e) 加一二元 w_5 与两约束, 确保 $x_9 \leq 45$ 或 $x_{10} \geq 22$.
- (f) 加一整数 w_6 与一约束, 使 x_8 除 4 余 2.
- (g) 加三二元 w_7, w_8, w_9 与两约束, 使 $x_{10} \in \{13, 39, 88\}$.
- (h) 表示成本 $f_4(0) = 0$, $f_4(x_4) = 250 + 49x_4$ ($x_4 \geq 1$) .
- (i) 表示成本 $f_5(x_5) = 57x_5$ ($0 \leq x_5 \leq 10$), 570 ($11 \leq x_5 \leq 20$), $-480 + 50x_5$ ($21 \leq x_5 \leq 100$) .

原分数为 (a)–(h) 各 4 分、(i) 8 分.

解答. 官方结构重构并给有效有限常数. (a) $x_1 + x_2 \leq 1$. (b) $x_2 = x_3$, 恰允许 $(x_2, x_3) = (0, 0), (1, 1)$. (c) $70w_1 \leq x_5 + x_6 \leq 69 + 131w_1$. 整数性保证 70 与 69 之间无遗漏整数; 若后七项允许连续, 原两个条件对 (69, 70) 的值不作要求, 不能称同一双向阈值逻辑.

(d) $x_5 \leq 92 + 8(1 - w_2)$, $x_6 \leq 40 + 60(1 - w_3)$, $x_7 + x_8 \geq 74 - 74(1 - w_4)$, $w_2 + w_3 + w_4 \geq 1$. (e) $x_9 \leq 45 + 55w_5$, $x_{10} \geq 22 - 22(1 - w_5)$. (f) $x_8 = 4w_6 + 2$, w_6 整数; 原界自动给 $0 \leq w_6 \leq 24$. (g) $x_{10} = 13w_7 + 39w_8 + 88w_9$, $w_7 + w_8 + w_9 = 1$.

(h) 加二元 u , $u \leq x_4 \leq 100u$, 成本变量 $t_4 = 250u + 49x_4$. 若原目标将 $49x_4$ 作为收益, 把新成本项纳入目标时须按所建经济模型说明符号, 不能默认重复计入同一 $49x_4$.

(i) 加二元 u_1, u_2, u_3 , 非负 y_1, y_2, y_3 , $\sum_k u_k = 1$, $x_5 = \sum_k y_k$, $0 \leq y_1 \leq 10u_1$, $11u_2 \leq y_2 \leq 20u_2$, $21u_3 \leq y_3 \leq 100u_3$, 成本 $t_5 = 57y_1 + 570u_2 - 480u_3 + 50y_3$. 恰选一段, 未选段的 $y_k = 0$, 已选段 $y_k = x_5$, 故成本等式在每个允许整数值都正确. $\square$

习题 17.21 原题 2. 从 10 处勘探点 $S_1, \dots, S_{10}$ 中恰选 5 处, 每处成本 c_j , 最小化总成本, 仅用二元变量 x_j 表示选择. 要求: (i) 同选 S_2, S_7 时不能选 S_6, S_9 的任何一个; (ii) 同选 S_1, S_3 时不能又同时选 S_5, S_6 ; (iii) 选 S_3 或 S_4 时不得选 S_6 ; (iv) S_3, S_6, S_7, S_8 至多选两个. 建整数规划.

解答. 官方结构重构, AI 修正选择数与严格号误植. 目标 $\min \sum_j c_j x_j$, $\sum_j x_j = 5$, $x_j \in \{0, 1\}$. 新增

$$x_2 + x_7 + x_6 \leq 2, \quad x_2 + x_7 + x_9 \leq 2,$$


$$x_1 + x_3 + x_5 + x_6 \leq 3,$$

$$x_3 + x_6 \leq 1, \quad x_4 + x_6 \leq 1,$$

$$x_3 + x_6 + x_7 + x_8 \leq 2.$$

每式恰排除相应禁止组合. 官方误写 $\sum c_j x_j = 5$ 以及最后 < 2 , 均不符合题意. 脚本已对 $2^{10} = 1024$ 个二元组合逐一比对逻辑条件与上述线性条件. $\square$

习题 17.22 原题 3. 图中分段线性函数由直线 $4 - x$, $1 + x/2$, $-5 + 2x$ 的上包络组成, 折点 $(2, 2)$, $(4, 3)$, 图示部分为 $(0, 4)$ 至 $(6, 7)$. 变量 x 与其他变量还满足一组线性约束, 因此不能仅看图决定其值.



(a) 将最小化 $f(x)$ 写成线性模型, 是否需要整数变量? 可不写其他线性约束. (b) 为什么不能同样处理最大化? 给一个替代模型, 必要时加二元或整数变量.

解答. 官方上图模型重构, AI 修正最大化说明与界条件. (a) 令 $t \geq 4 - x$, $t \geq 1 + x/2$, $t \geq -5 + 2x$, 最小化 t , 不需整数变量. 在最优处 $t = f(x)$, 其余原约束保留. 不需要额外强制 $t \geq 0$ 或 $x \geq 0$, 除非原定义域确已给出.

(b) 最大化同一个上图变量 t 会允许其无界增大. 但有一个不添加任何界的可靠方法: 对同一原可行集分别最大化三条仿射式, 再取三个最优值的最大值, 因为 $\sup_x \max_k \ell_k(x) = \max_k \sup_x \ell_k(x)$. 每个子问题都是 LP, 不需整数变量.

若要求一份选择分段的整数模型, 且按原图所示范围明确采用 $0 \leq x \leq 6$, 可令二元 u_1, u_2, u_3 恰一项为 1, $x = y_1 + y_2 + y_3$, $0 \leq y_1 \leq 2u_1$, $2u_2 \leq y_2 \leq 4u_2$, $4u_3 \leq y_3 \leq 6u_3$, 最大化 $4u_1 - y_1 + u_2 + y_2/2 - 5u_3 + 2y_3$. 边界处相邻表达式同值, 故选哪段都正确. 若原附加约束还允许图外 x , 不能悄悄把 6 作为上界; 应采用前述三个 LP 或从真实界重新构造分段模型. 官方说明曾把区间写为 $[0, 3)$ 、将 $u_2 = 1$ 误写成 2、并把凸/凹函数的优化方向颠倒, 均以本解的等价性检验为准. $\square$

17.7 Recitation 7: 分支定界


习题 17.23 原题 1. 极大 0-1 规划节点 11 中前三变量已固定, 可行整数当前最好值 15, 下一步对 x_4 分支至节点 12 ($x_4 = 1$) 和 13 ($x_4 = 0$). 节点 11 图示 LP 值 16, 模型为 $\max(18x_4 + ax_5 + 10)$, $8x_4 + 10x_5 \leq 5$, $0 \leq x_4, x_5 \leq 1$. (A) $x_4 = 1$ 时节点 12 应剪枝吗? (B) $x_4 = 0, a = 12$ 时节点 13 应剪枝吗? (C) $x_4 = 0, a = 8$ 时呢? 解释.

解答. 官方解答重构. (A) $10x_5 \leq -3$ 与 $x_5 \geq 0$ 冲突, 不可行剪枝. (B) $x_5 \leq 1/2$, LP 解 $x_5 = 1/2$, 上界 16 高于 15 且非整数, 普通分支定界暂不剪枝. (C) LP 上界 14 不超过 15, 按界剪枝. 原图节点 11 的 16 与给出的完整模型不一致: 对 $a = 12$ 或 8, 根 LP 至少允许 $(x_4, x_5) = (5/8, 0)$, 值 21.25. 子节点判断仅依赖明确模型与当前最好值, 不采用该错误的父节点标签. 因剩余只含一个二元变量, 还可利用额外整数推理提前判断 $x_5 = 0$, 但 (B) 按原题所问的 LP 剪枝规则回答. $\square$

习题 17.24 原题 2. 原题显示目标 $\max(x_4 + 5x_2)$, 约束 $-4x_1 + 3x_2 \leq 6$, $3x_1 + 2x_2 \leq 18$, $x_1, x_2 \geq 0$ 且整数. x_4 在其他条件中未定义. (A) 在平面画出整数可行解集. (B) 用几何法解每个 LP 松弛, 完成分支定界并解释几何过程. 以下另列 AI 明确修正版: 将目标中的 x_4 改为 x_1 , 其他条件不变; 原官方答案漏了整题.

解答. AI 补解, 不声称修正版是原题唯一意图. 若将 x_4 当独立无上界变量, 原目标无界; 若不定义它, 原问题不完整. 修正版的整数点可精确列为

$$\begin{aligned} & \{(0, j) : 0 \leq j \leq 2\} \cup \{(1, j) : 0 \leq j \leq 3\} \cup \{(2, j) : 0 \leq j \leq 4\} \\ & \cup \{(3, j) : 0 \leq j \leq 4\} \cup \{(4, j) : 0 \leq j \leq 3\} \\ & \cup \{(5, j) : 0 \leq j \leq 1\} \cup \{(6, 0)\} \end{aligned}$$



根 LP 顶点 $(0, 0), (6, 0), (42/17, 90/17), (0, 2)$; 最优交点 $(42/17, 90/17)$, 值 $492/17$. 对 $x_1 \leq 2, x_1 \geq 3$ 分支, 分别求得 $(2, 14/3), (3, 9/2)$, 上界 $76/3, 51/2$.

左节点再分 $x_2 \leq 4, x_2 \geq 5$, 前者最优 $(2, 4)$ 值 22 为整数, 后者不可行. 右节点同样分, $x_2 \geq 5$ 不可行, $x_2 \leq 4$ 的 LP 解 $(10/3, 4)$ 值 $70/3$. 图中灰虚线为垂直分支线 $x_1 = 2, 3, 4$ 与水平分支线 $x_2 = 4, 5$, L, R, R_0 分别标左子、右子及右子加 $x_2 \leq 4$ 后的 LP 最优点. 将后者分为 $x_1 \leq 3$ 与 $x_1 \geq 4$, 得整数解 $(3, 4)$ 值 23、 $(4, 3)$ 值 19, 剪枝后

无活跃节点, 故整数最优 23. 几何上每次分支删去两相邻整数水平/竖直线之间的开条带, 松弛边界交点给各节点上界. $\square$

习题 17.25 原题 3. 背包 $\max(19x_1 + 23x_2 + 30x_3 + 40x_4), 6x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 13x_4 \leq 25, x_i \in \{0, 1\}$. 用分支定界求解; 一约束 LP 松弛可按单位重量收益填装.


解答. AI 修正官方节点值与整数总收益. 单位重量收益降序为 $19/6 > 40/13 > 30/10 > 23/8$. 根松弛 $(1, 0, 3/5, 1)$ 值 77, 分数变量 x_3 分支. 以下按深度优先列完整树的叶子与待分节点, 固定条件均累积于父条件; 最初当前最好值 0.

固定条件	LP 上界	处理
无	77	分 x_3
$x_3 = 0$	305/4	分 x_2
$x_3 = 0, x_2 = 0$	59	整数 $(1, 0, 0, 1)$
$x_3 = 0, x_2 = 1$	986/13	分 x_4
上述 $x_4 = 0$	42	界剪枝
上述 $x_4 = 1$	227/3	分 x_1
上述 $x_1 = 0$	63	整数 $(0, 1, 0, 1)$
上述 $x_1 = 1$	不可行	剪枝
$x_3 = 1$	997/13	分 x_4
$x_3 = 1, x_4 = 0$	72	整数 $(1, 1, 1, 0)$
$x_3 = 1, x_4 = 1$	229/3	分 x_1
上述 $x_1 = 1$	不可行	剪枝
上述 $x_1 = 0$	303/4	分 x_2
上述 $x_2 = 0$	70	界剪枝
上述 $x_2 = 1$	不可行	剪枝

所有叶子都已封闭, 最好整数方案 $(1, 1, 1, 0)$ 重量 24、收益 72. 官方将 $19 + 23 + 30$ 写成 73, 根 LP 写成 75.75, 都与题给系数不符. 此题在官方解答中误标 Problem 2, 本章按原题面映射为 Problem 3. $\square$

17.8 Recitation 8: 整数凸包与割平面


习题 17.26 原题 1. 原图整数可行点经逐点核实为 $(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 2)$. 下图独立绘出这些数学数据; 原图中的连续多边形只用于对比, 有效不等式以全部整数点为准. 判断 (a) $x \leq 4$; (b) $x \geq 2$; (c) $y \geq 1$; (d) $y \leq 6$; (e) $x + y \geq 3$ 哪些有效.



解答. 官方判断重构. (a) 无效, 点 $(5, 2)$ 违反; (b)–(e) 全有效, 点集中 $x \geq 2, y \geq 1$, 最大 $y = 3 \leq 6$, 最小 $x + y = 3$. 原题 (d) 行自带 “Yes”, 本章仍保留其数学判断任务. $\square$

习题 17.27 原题 2. 整数集 F 由 $-3x_1 + 5x_2 \leq 12, 4x_1 + 3x_2 \leq 20, x_1 + x_2 \leq 11/2, x_1, x_2 \geq 0$ 且整数定义. (a) 画 LP 松弛, 求整数点凸包, 先从图识别再给定义不等式. 原提示两斜线分别过 $(-4, 0), (1, 3)$ 和 $(5, 0), (2, 4)$. (b) 对 $X = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}^2 : x_1 + x_2 \leq 11/2\}$, 判断 F, X 的包含关系, 给 X 的有效不等式并说明为何对 F 也有效.

解答. 官方解答重构并精确核点. LP 顶点为 $(0, 0), (5, 0), (7/2, 2), (31/16, 57/16), (0, 12/5)$. 图中虚线为松弛边界, 实线为整数凸包.



凸包为 $x_1, x_2 \geq 0, -x_1 + x_2 \leq 2, x_2 \leq 3, x_1 + x_2 \leq 5$. 枚举 17 个整数点后, 极点恰为 $(0, 0), (5, 0), (2, 3), (1, 3), (0, 2)$; 它们都属于 F , 给出的多边形包含所有整数点, 所以恰等于 $\text{conv } F$. (b) $F \subsetneq X$, 例如 $(-1, 0) \in X \setminus F$. 整数和 $x_1 + x_2 \leq 5.5$ 等价于 ≤ 5 , 因此 $x_1 + x_2 \leq 5$ 对 X 有效, 对其子集 F 也有效. $\square$

习题 17.28 原题 3. 所有变量包括松弛均非负整数, 极大 LP 松弛初表列为 $(x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3; \text{RHS})$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ -4 & 4 & 2 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

给定最优基为 (s_1, x_2, x_1) , 最优表为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -7/3 & 0 & -2/3 & -2/3 & -34/3 \\ 0 & 0 & -3/2 & 1 & 1/4 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 7/6 & 0 & 1/12 & 1/3 & 11/3 \\ 1 & 0 & 2/3 & 0 & -1/6 & 1/3 & 5/3 \end{pmatrix}.$$

(a) 从最后两条约束各推导一条 Gomory 割. (b) 当前基本解满足任一割吗?

解答. AI 修正官方首割的系数. 由 $x_2 + (7/6)x_3 + (1/12)s_2 + (1/3)s_3 = 11/3$, 将系数和 RHS 向下取整给 $x_2 + x_3 \leq 3$ (非负整数变量使左端整数且不超过 $11/3$); 用原等式减去该不等式, 得

$$\frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{12}s_2 + \frac{1}{3}s_3 \geq \frac{2}{3}.$$

另一行 $x_1 + (2/3)x_3 - (1/6)s_2 + (1/3)s_3 = 5/3$, 取整得 $x_1 - s_2 \leq 1$, 相减得

$$\frac{2}{3}x_3 + \frac{5}{6}s_2 + \frac{1}{3}s_3 \geq \frac{2}{3}.$$

当前解 $(x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, s_3) = (5/3, 11/3, 0, 1, 0, 0)$ 对两割左边都为 0, 均违反. 官方首割把 x_3 分数部分写成 $1/3$, 应为 $7/6 - 1 = 1/6$, 此处从初矩阵与基独立重算了全部终表. $\square$

习题 17.29 原题 4. $K = \{x \in \{0, 1\}^7 : 11x_1 + 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 + 5x_5 + 4x_6 + x_7 \leq 19\}$. (a) 判断以下是否有效覆盖不等式并解释: (a) $x_4 + x_5 + x_6 \leq 2$; (b) $x_1 + x_2 + x_6 \leq 2$; (c) $x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \leq 3$; (d) $x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 3$; (e) $x_1 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$; (f) $x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 4$. (b) 有效覆盖中哪些最小? (c) 进阶: 将 $x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$ 在 RHS 不变下加入更多变量, 求一条扩展覆盖并比较强弱.


解答. 官方解答重构, AI 加严格强弱证据. 覆盖 C 有效当且仅当总重量超过 19; 最小覆盖要求删任何项后都不超过 19. 六集合重量依次 14、21、17、20、27、26, 所以有效者为 (b)、(d)、(e)、(f), 其中 (b)、(d) 最小, (e)、(f) 非最小: (e) 删一项重量 5 后仍 22, (f) 删项 6 的重量 4 后仍 22.

(c) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$ 有效, 因这五项中最轻的四项重量 $5+5+6+6 = 22 > 19$. 由 $x_1 \geq 0$, 它蕴含原覆盖, 且在 LP 松弛上严格更强: 取 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (1/8, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 0, 0)$, 重量 $143/8 = 17.875 \leq 19$, 原覆盖和 3 满足, 新覆盖和 $25/8 > 3$ 违反. 官方所举全五项 $3/4$ 的点本身超过背包容量, 本解提供了仍在原 LP 松弛内的反例. $\square$

17.9 Recitation 9: 最短路与网络流

本节原题顺序为 1、3、3、5, 以下依次映射为 1、3(a)、3(b)、5; 括号用于区分重复原号, 不改变题内子问编号.

习题 17.30 原题 1. 有向弧及长度为 $SA : 1, SB : 6, SC : 3, AD : 6, AB : 4, BD : 1, BT : 5, CE : 2, DT : 2, ET : 4$. 一次 Dijkstra 迭代包含选一个永久节点并扫描其出弧. 已做两次, 永久集合 $\{S, A\}$, 距离按 (S, A, B, C, D, E, T) 为 $(0, 1, 5, 3, 7, \infty, \infty)$. 再做一次, 给全部永久状态与距离.



解答. 官方解答重构. 未永久节点中 C 距离 3 最小, 将 C 永久化, 扫描 CE 得 $d_E = \min(\infty, 3 + 2) = 5$. 新永久集合 $\{S, A, C\}$, 距离 $(0, 1, 5, 3, 7, 5, \infty)$. 不在同一迭代继续扫描尚未永久的 E . $\square$

习题 17.31 原题 3(a), 即第一个 Problem 3. Boston、Raleigh 年产能分别 400、300 台电脑, 单位生产成本 800、900 美元. Los Angeles 需求 400, Austin 需求 300, 可经 Chicago 转运. 单位运费 (美元):

出发地	Chicago	Austin	Los Angeles
Boston	80	220	280
Raleigh	100	140	170
Chicago	—	40	50

(a) 建立包含生产与运输成本的最小费用流模型. (b) 至多 200 台经 Chicago 时怎样修改? (c) Raleigh 产能为 500 时怎样修改网络, 并说明处理供给多余的一般方法.

解答. 官方网络结构重构并补足 (c) 的容量口径. (a) 增虚拟源 s , 弧 $s \rightarrow B$ 费用 800 容量 400, $s \rightarrow R$ 费用 900 容量 300; 其余弧按运费表且无额外容量上限. 正供给定义为流出减流入, 节点 s 供给 700, L, A 供给分别 $-400, -300$, 其余 0. 变量 $f_{ij} \geq 0$, 最小化 $\sum c_{ij}f_{ij}$, 每节点满足 $\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = b_i$, 弧不超过容量. 一单位流代表一台电脑, 虚拟源弧计生产成本.

(b) 将 C 拆为 C_{in}, C_{out} , 原入弧到前者, 出弧从后者出发, 中间弧费用 0、容量 200, 两节点净供给 0.

(c) 若 500 是**最大产能**, 只需把 sR 容量改 500, 源净供给仍为需求总数 700, 无需强制多生产 200 台. 若选择“一切潜在供给均先计入”的等式模型, 则源供给 900, 增虚拟需求节点 200 与 $s \rightarrow d$ 零费用弧, 其流量表示**未使用的产能**, 不经过生产弧, 因而不多付生产费用. 官方虚拟汇方案采用后一口径; 不能把未使用产能解释为实际已生产且免费销毁的电脑. $\square$

习题 17.32 原题 3(b), 即第二个 Problem 3. 判断真伪: (1) 最小费用流节点供给 -1 等价于需求 1; (2) 若所有节点 $\sum b_i \neq 0$, 原网络的等式流平衡 LP 必不可行; (3) 无向图可能有欧拉道路而无欧拉回路; (4) 各弧长度彼此不同则最短路唯一.

解答. 官方解答重构. (1) 真, 流出减流入 $= -1$ 恰是净流入 1. (2) 真, 全部左端相加每弧抵消为 0, RHS 必须和为 0. (3) 真, 一个只有单边的连通图有两个奇度点, 存在欧拉道路却无闭合欧拉回路. (4) 假, 弧 $s \rightarrow t$ 长 3, 另两弧 $s \rightarrow a, a \rightarrow t$ 长 1、2, 两条不同最短路同为 3 且各弧长度不同. $\square$

习题 17.33 原题 5. 两道多选题.

1. 删除一条长度 k 的弧后, s 到 t 最短距离可能: (a) 增加 $[0, k]$ 中任意量; (b) 增加超过 k 的量; (c) 变成无穷; (d) 减少. 选所有可能者.
2. 网络 $G = (N, A)$ 有 n 节点、 m 弧 (连通与欧拉断言按相应无向图理解). 哪些断言正确? (i) 不同 $s-t$ 路径数可能大于 $2m$; (ii) $m < n - 1$ 则图不连通; (iii) m 为奇数则不能有欧拉回路; (iv) m 为偶数则每个 $s-t$ 割都包含偶数条边.

解答. 第 1 题官方解答重构, 第 2 题 AI 修正官方自相矛盾的选项总答. 1. 选 (a)、(b)、(c). 删除弧使路径集合缩小, 最短距离不下降. 平行替代路线长 $k+r$ 可让增量为任意 $r \geq 0$ (也可用多段简单路径替代平行弧); 若删除唯一连接, 则无路可达. 弧长 k 不限制绕路的额外长度.


2. 仅 (i)、(ii) 正确. (i) 六个串联菱形组成简单有向网络, 每菱形有两条各含两弧的路线, 总弧数 24, 不同路径 $2^6 = 64 > 48 = 2m$. (ii) 连通无向图含生成树, 至少 $n - 1$ 条边; 有向图若连其底层无向图都不连通, 也不可能强连通. (iii) 三角形 3 条边, 每点度 2, 有欧拉回路, 故假. (iv) 路径 $s-a-t$ 共 2 边, 割 $\{s\}$ 只有 1 边, 故假. 官方先列 (i)、(ii)、(iii), 随后却用三角形说明 (iii) 为假, 此处按反例修正, 并补上其未解释的 (iv). $\square$

17.10 Recitation 10: 决策树与信息价值

原课文件日期为 2013 年 5 月 3 日, 其中注明因版权删除的婴儿/玩具照片与公司标识均不恢复. 下列决策树只由题给概率与金额独立绘制.

习题 17.34 原题 1. 现在可以买 400 美元不可退改的机票, 或 450 美元可退 430 美元的机票 (退票净成本 20). 一周后仅还有一次购买机会, 票价以相同概率为 300 或 600 美元. 画决策树, 求最小期望支出的策略.

解答. 官方解答重构. 三个初始决策及其后续策略如下, 金额为最终总支出.



现在买不可退票支出 400; 等待期望 450; 先买可退票时低价分支支出 $450 - 430 + 300 = 320$, 高价留票支出 450, 期望 385. 故选择可退票并按树执行, 期望最低 385 美元. $\square$


习题 17.35 原题 2. Tom 想赢一个价值 3 美元的绿色猴子玩偶. 游戏费 1 美元, 五个壳中有一个藏球, 每壳概率 0.2, 猜中即获玩偶. (A) 用决策树判断是否应玩. (B) 在决定是否玩之后, 可询问第三个壳是否藏球, 回答保证正确, 最多值得为该信息支付多少? (C) 若先获信息再决定是否玩, 答案怎样变?

解答. (A) 官方解答重构: 玩的两末端净收益为 2 (概率 $1/5$) 和 -1 (概率 $4/5$), 期望 -0.4 ; 不玩为 0, 应不玩. 决策树可写为 选择 $\rightarrow$ {不玩: 0; 玩 $\rightarrow$ (赢: 2, $1/5$; 输: -1 , $4/5$)}.

(B) AI 区分原文字中的承诺时点. 若“决定后”表示决策已不可改变, (A) 已选择不玩, 询问信息无法产生玩偶收益, 信息价值 0. 若题意改为**已承诺玩**再询问, “是”时选第三壳必得净收益 2, “否”时从余四壳选, 净期望 $3/4 - 1 = -1/4$. 获信息后的净期望为 $(1/5)2 + (4/5)(-1/4) = 1/5 = 0.2$; 与已承诺玩且无信息的 -0.4 相比, 信息增量价值为 0.6 美元. 官方 0.2 是这棵条件树的**净期望收益**; 在已经承诺玩、以 -0.4 为比较基准时, 不能将 0.2 同时称为增量信息价值. 原题未明确“决定后”是否可撤回, 所以两种承诺口径必须分开.

还有一种事先知道信息服务可购买、但必须先决定是否玩再获回答的协议. 此时可先选择承诺玩并购买信息, 未计信息费的净期望为 0.2; 无信息时最优是不玩、收益 0, 所以该协议的最高信息费为 0.2 美元, 官方数值在这一口径下成立. 这与已被迫承诺玩后以 -0.4 为基准计算 0.6 的条件信息价值不同.

(C) 官方解答重构. 先知道结果后, “是”时玩, 得 2; “否”时不玩, 得 0. 下树显示最优策略:




期望 0.4 美元, 与无信息最佳策略 0 相比, 信息价值 0.4 美元. “完美信息”在此仅完美回答第三壳是否藏球, 不是告诉球位于五壳中的哪一壳. □

习题 17.36 原题 3 的概率模型独立重述. 原课程以 1998–99 年 Gerber 案例及外部报道为背景, 本题仅使用给定决策参数, 不转载报道或作现行医学事实判断. 企业可主动调整或被动等待; 报告有利/不利各概率 $1/2$. 收益变化单位为百万美元:

策略	报告	收益变化	条件概率
主动	有利	+1, -1	0.8, 0.2
主动	不利	0, -1.25	0.25, 0.75
被动	有利	0, -2	0.25, 0.75
被动	不利	+0.5, -10	0.2, 0.8

(A) 建决策树并求最优策略. (B) 若仅被动且最坏 -10 结果发生时获补偿, 至少补偿多少才会选择被动?

解答. 官方解答重构并给精确补偿阈值. 用“策略 $\rightarrow$ 报告 $\rightarrow$ 收益”的树, 上表四行即全部报告节点及末端概率. 下图的括号列出每个报告节点的两末端, 边上报告概率均为 $1/2$:



主动期望 $\frac{1}{2}(0.8 - 0.2) + \frac{1}{2}(-0.75 \cdot 1.25) = -27/160 = -0.16875$; 被动期望 $\frac{1}{2}(-0.75 \cdot 2) + \frac{1}{2}(0.2 \cdot 0.5 - 0.8 \cdot 10) = -47/10 = -4.7$. 因主动期望较大, 选主动.

(B) 补偿 X 仅在概率 $(1/2)0.8 = 0.4$ 的末端发生, 被动期望 $-4.7 + 0.4X$. 达到主动期望须 $X \geq 725/64 = 11.328125$ 百万美元; 等号时无差异, 更大时严格选择被动. 官方 11.329 为近似值. 若“补偿损失”另有限制不得超过原 1000 万美元损失, 阈值无法达到; 即使补足 10 百万, 被动期望仍 $-0.7 < -0.16875$. 不能把超过损失的阈值当成可由部分损失补偿自动实现的方案. $\square$

18 15.053 期中 2 综合练习

本章对应 OCW 网页归类的 Midterm Exam 2 practice problem set. PDF 本身标题为 *Practical Problem Set, 2013*, 是综合练习, 不能当作已经公开的正式期中试卷. 原编号为 1、2、3、4、5、5, 后两题在本章映射为 5(a)、5(b). 题面 PDF 的九报价版本与官方解答 PDF 的七报价旧版本不同, 下文完整保留题面版本, 注明答案的版本差异和 AI 补解.

习题 18.1 原题 1. 组合拍卖允许对一整组物品报价, 每份报价不可拆分. 有六种物品 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 收到下列九份报价:

报价 j	物品集合 S_j	总价 p_j
1	$\{1, 5\}$	10
2	$\{1, 2, 4\}$	20
3	$\{3\}$	8
4	$\{5\}$	4
5	$\{2, 4\}$	15
6	$\{2, 3, 4, 5\}$	30
7	$\{1, 2, 3\}$	18
8	$\{2, 4, 6\}$	25
9	$\{3, 5, 6\}$	16

(a) 每物品最多卖一次, 建使拍卖收入最大的整数规划, 仅用二元 x_j 表示接受报价 j .

(b) 物品 1、2、3 各有两份, 4、5、6 各一份, 即多重集 $\{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6\}$. 各报价仍只能接受一次, 修改模型. 原文上一句仍写 “ $\{1, \dots, 5\}$ ”, 与明确多重集和报价 8、9 不一致, 此处以列出的多重集为准.

(c) 一般物品集合 $N = \{1, \dots, n\}$, 每物品 i 有 $\lambda_i \geq 1$ 份, 有 b 报价 (S_j, p_j) , 写代数模型.

解答. 官方通用结构重构, 九报价实例由 AI 独立补解. (a) 最大化 $10x_1 + 20x_2 + 8x_3 + 4x_4 + 15x_5 + 30x_6 + 18x_7 + 25x_8 + 16x_9$, 所有 $x_j \in \{0, 1\}$, 六条约束为

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_7 &\leq 1, & x_2 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 &\leq 1, \\ x_3 + x_6 + x_7 + x_9 &\leq 1, & x_2 + x_5 + x_6 + x_8 &\leq 1, \\ x_1 + x_4 + x_6 + x_9 &\leq 1, & x_8 + x_9 &\leq 1. \end{aligned}$$

每条限制同一物品不会被重复出售, 二元变量确保报价整体接受. (b) 只把前三条 RHS 改 2, 后三条仍 1; 二元域仍保留, 不允许同一报价接受两次. (c) 通式为 $\max \sum_{j=1}^b p_j x_j$, $\sum_{j:i \in S_j} x_j \leq \lambda_i$ (每个 i), $x_j \in \{0, 1\}$.

实际枚举全部 $2^9 = 512$ 组合核验: (a) 接受 1、3、8, 收入 43; (b) 接受 1、3、7、8, 收入 61, 两者均为唯一最优组合. 官方答案只列前七报价、五物品模型, 不能直接声称覆盖本题九报价版本; 其通式仍可用于新版本. $\square$

习题 18.2 原题 2 (模型数据独立重述). 课程引用 Cornuéjols 与 Tütüncü 的 *Optimization Methods in Finance* 的收款箱例, 这里只重述给定数学数据, 不转载外书叙述. 四地区西部、中西部、东部、南部每天收款分别 600000、250000、725000、350000 美元. 候选收款箱依次为 Los Angeles、Chicago、Boston、Houston, 每箱年运营费 90000 美元, 总部 Seattle 可免费处理. 五目的地的平均清算天数为

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 6 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 5 & 4 \\ 6 & 5 & 2 & 5 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

资金年利率 4%, 年机会成本 (千美元) $C_{ij} = 0.04 a_i D_{ij} / 1000$, 即

$$C = \begin{pmatrix} 48 & 96 & 144 & 144 & 120 \\ 40 & 20 & 50 & 50 & 40 \\ 174 & 145 & 58 & 145 & 203 \\ 98 & 70 & 84 & 42 & 126 \end{pmatrix}.$$

令 $y_j = 1$ 表示候选箱 j 开设 ($j = 1, \dots, 4$), $x_{ij} = 1$ 表示地区 i 向目的地 j 寄送 ($j = 1, \dots, 5$, 5 是 Seattle).

(a) 写包含开箱和延迟机会成本的目标函数.

(b) 写禁止向未开箱寄送的约束, 共多少条?

(c) 写每地区目的地分配约束.

(d) 汇总完整模型, 还有哪些条件必须补上?

(e) 给 (b) 的另一种表达. 原文误引用 “Problem 3.b”, 应按本题 (b) 理解.

(f) 开三个或四个候选箱时另加 50000 美元年费, 不计 Seattle. 建模并说明目标如何变.

解答. 官方结构重构, AI 修正其汇总模型的连接约束. (a) 以千美元计, $\min 90 \sum_{j=1}^4 y_j + \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^5 C_{ij} x_{ij}$. 延迟导致的在途资金为“每日金额乘天数”, 再乘年利率, 不再额外乘 365.

(b) $x_{ij} \leq y_j$ ($i = 1, \dots, 4, j = 1, \dots, 4$), 共 16 条; Seattle 不受开箱限制. (c) $\sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1$ (每个 i), 共 4 条. (d) 合并上述目标与 20 条约束, 补全 $x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}$. (e) 可替为 $\sum_{i=1}^4 x_{ij} \leq 4y_j$ (每个候选箱 j), 共 4 条. 由于二元变量, 箱关闭时四个分配都为 0, 箱开时最多四地区, 与 16 条版本在整数点上等价. 官方汇总式漏乘 4, 写成 $\sum_i x_{ij} \leq y_j$, 会错误禁止两个地区共用同一箱. 16 条版本的连续松弛通常更强.

(f) 二元 w , $\sum_j y_j \leq 2 + 2w$, 目标加 $50w$. 在极小目标下 w 只在开三或四箱时取 1, 足以保证最优方案计费正确. 若要求每个可行点也精确记录是否收费, 再加 $3w \leq \sum_j y_j$.

附带脚本枚举 16 种开箱组合并对每地区选最低成本允许目的地: 最优只开 Boston, 西部、中西部发 Seattle, 东部、南部发 Boston, 年成本 $90 + 120 + 40 + 58 + 84 = 392$ 千美元. 加额外年费后方案仍相同. 这也是对“每箱可服务多地区”的实际验算. $\square$

习题 18.3 原题 3. 选择所有适用选项.

- (a) 原整数集 P 为 $x/2 + y \leq 1, 2x + y \leq 2, x, y \leq 0, x, y \in \mathbb{Z}$. 它与下列哪项等价? (i) $x + y \leq 1, x, y$ 整数; (ii) $x \leq 1, y \leq 1, x, y$ 整数; (iii) 两者; (iv) 两者都不是.
- (b) 极大整数规划与其 LP 松弛, 在最优值存在的相应情形记 Z_{IP}, Z_{LP} . 哪些可能? (i) IP 不可行而 LP 可行; (ii) IP 可行而 LP 不可行; (iii) $Z_{IP} = Z_{LP}$; (iv) $Z_{IP} > Z_{LP}$; (v) $Z_{IP} < Z_{LP}$.
- (c) 对极大 LP 松弛添加有效 Gomory 割, 最优值记 Z_{GC} , 假定两个最优值都存在. 哪些可能? (i) $Z_{LP} = Z_{GC}$; (ii) $Z_{LP} > Z_{GC}$; (iii) $Z_{LP} < Z_{GC}$.
- (d) 极大 0-1 规划分支树节点 v 的有限松弛值为 $LP(v)$, 子节点 c_1, c_2 对某二元变量取 0、1. 哪些可能? (i) 两子松弛都不可行; (ii) $LP(v) = LP(c_1)$; (iii) $LP(v) > \max\{LP(c_1), LP(c_2)\}$; (iv) $LP(v) < \min\{LP(c_1), LP(c_2)\}$.

解答. (a) AI 修正原符号条件下的官方答案. 原条件 $x, y \leq 0$ 使两斜约束自动满足, 所以 P 恰为非正整数象限. 选 (iv): (i) 还含 $(2, -1)$, (ii) 还含 $(1, 1)$, 均不等于 P . 官方选 (i), 显然未按原显示的非正条件处理. 若另行修正原条件为 $x, y \geq 0$ 并且在选项 (i) 补同样的非负域, 则三个点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 恰满足 (i); 这是一份条件不同的 AI 解释版本, 不能替代原题.

(b) 官方答案重构: 选 (i)、(iii)、(v). 整数点集合是 LP 集合子集, 因此 (ii)、(iv) 不可能. 约束 $x = 1/2, x \in \mathbb{Z}$ 示 (i); 最大化 $x, 0 \leq x \leq 1$ 示 (iii); 将上界改 $1/2$ 示 (v).

(c) 官方答案重构: 选 (i)、(ii). 加有效割只缩小松弛可行集, 不能提高极大值. 恒零目标可保持相同值; $\max x, 0 \leq x \leq 1/2$ 加整数割 $x \leq 0$ 可严格下降.

(d) 官方答案重构: 选 (i)、(ii)、(iii). 父约束 $x = 1/2$ 可使两子都不可行; $\max x, 0 \leq x \leq 1$ 在子 $x = 1$ 保持值 1. 对二元 x, t 加 $t \leq x, t \leq 1 - x$, 最大化 t , 根松弛 $(x, t) = (1/2, 1/2)$ 值 $1/2$, 两子都只能 $t = 0$, 示 (iii). 子集关系排除 (iv). 比较两个子值时, 不可行子可用 $-\infty$ 作为极大值约定. $\square$

习题 18.4 原题 4.

(a) 用整数规划表示 “ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 4$ 或 $3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \leq 3$ 至少一条成立” . 原题面未给变量上下界; 官方答案另加 $x_j \geq 0$ 整数, 但仍无上界.

(b) $f(y) = 10y$ (整数 $0 \leq y \leq 50$) , 500 ($51 \leq y \leq 100$) , $5y$ ($y \geq 101$) . 将

$$\min f(x_1) + 6x_2, \quad 1001x_1 + 978x_2 \leq 27365, \quad 503x_1 + 631x_2 \leq 16783, \quad x_1, x_2 \text{ 整数}$$

改写为整数规划. 原题未给非负约束, 且 f 未定义在负整数上.

解答. AI 保留原条件缺口并给明确模型版本. (a) 令二元 w , 原逻辑可直接交给支持指示约束的整数求解器: $w = 0 \Rightarrow \sum_j x_j \leq 4$, $w = 1 \Rightarrow 3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \leq 3$, x_j 整数. 选择哪条成立即构成精确逻辑模型. 若要求仅用普通线性不等式的大常数模型, 必须先有**真实有限界** $l_j \leq x_j \leq u_j$, 再写


$$\sum_j x_j \leq 4 + M_1 w, \quad 3x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \leq 3 + M_2(1 - w),$$

其中 $M_1 = \max\{0, \sum_j u_j - 4\}$, $M_2 = \max\{0, 3u_1 - l_2 - l_3 + u_4 - 3\}$. 原题没有这些界, 不能声称任一猜测的有限 M 都等价. 即便按官方补非负, 点 $(0, t, 0, 0)$ 对任意 $t \geq 0$ 都满足第二条, 第一条的放松量需至少 $t - 4$, 无统一有限 M_1 .

(b) 原显示模型在 $x_1 < 0$ 处未定义. 若将 f 的定义域作为 $x_1 \geq 0$ 纳入, 而 x_2 仍自由整数, 取 $x_1 = 0, x_2 = -k$ 就可行, 目标 $-6k \rightarrow -\infty$, 因此模型无界. 可精确改写为三个整数线性子问题: 分别加 $0 \leq x_1 \leq 50$ 、 $51 \leq x_1 \leq 100$ 、 $x_1 \geq 101$, 目标依次为 $10x_1 + 6x_2$ 、 $500 + 6x_2$ 、 $5x_1 + 6x_2$, 原两约束及整数域保留, 从三子问题取最小值. 三个都无界向下, 与定义域版本相符. 单模型也可用三二元 v_k 、 $\sum_k v_k = 1$, 以指示约束同时指定对应区间和成本变量 $t = f(x_1)$, 最小化 $t + 6x_2$.

若**另行补充** $x_2 \geq 0$, 原两资源约束给 $0 \leq x_1 \leq 27$, 后两成本段不可能出现, 精确线性整数模型仅需 $\min(10x_1 + 6x_2)$ 、原约束和 $x_1, x_2 \geq 0$ 整数, 最优 $(0, 0)$ 值 0. 这份补条件版本不冒充原题. 官方三段分解给第三段变量只加下界 $y_3 \geq 101v_3$ 而无关约束; 例如 $v_1 = 1, v_3 = 0, y_1 = 0, y_3 = 1$ 会把 $x_1 = 1$ 错计成本 5 而非 10, 故原官方模型也不能直接照译. $\square$

习题 18.5 原题 5(a), 原标题 Branch and Bound. 极大整数规划的目标系数为整数, 分支树中的数是各节点 LP 松弛值; N_4 的 LP 最优点是整数, 当前最好值 28.



(a) N_9 松弛值 v_9 的最佳已知断言是哪项: (i) $v_9 \leq 28.2$; (ii) $v_9 = 30.5$; (iii) $v_9 \leq 30.5$; (iv) $v_9 \geq 28$? (b) 给整数最优值的最佳上下界. (c) 给 $N_4, N_5, N_8, N_{10}, N_{11}$ 各标活跃 A、已剪 F、或信息不足 NEI.

解答. 官方解答重构. (a) 选 (iii), 子节点松弛集合包含于父 N_6 松弛集; 不与兄弟 N_8 的 28.2 比较. (b) 下界 28 来自已知整数方案. 尚可能改善的叶子 N_5, N_9, N_{11} 中, 最大已知松弛上界 30.5, 整数目标向下取整得上界 30, 所以 $28 \leq v^* \leq 30$. (c) 依次 F、A、F、F、A. N_4 已整数; N_8 的整数目标至多 $\lfloor 28.2 \rfloor = 28$, N_{10} 至多 27, 都不能改善; N_5, N_{11} 的非整数松弛值大于 28, 按当前信息需保留. 不把非整数 LP 点本身用作整数当前最好值. $\square$

习题 18.6 原题 5(b), 第二个 Problem 5, 原标题 Gomory Cut. 纯整数规划的最优松弛表有五个变量列 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , 最后一列为 RHS:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2.4 & -0.25 & 0 & -26.6 \\ 1 & 0 & 2.65 & -0.2 & 0 & 3.3 \\ 0 & 1 & 0.24 & 0.4 & 0 & 4.5 \\ 0 & 0 & 0.3 & -4.3 & 1 & 0.9 \end{pmatrix},$$

全部变量非负. 从第一条约束行推导 Gomory 割, 给步骤.

解答. 官方方法重构, AI 修正最终变量名称. 第一约束 $x_1 + 2.65x_3 - 0.2x_4 = 3.3$. 系数向下取整给 $x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 3$. 与原等式相减, 得 $0.65x_3 + 0.8x_4 \geq 0.3$. 注意 $\lfloor -0.2 \rfloor = -1$, 其分数部分为 0.8. 官方末式写成 $0.65x_2 + 0.8x_3 \geq 0.3$, 变量错位; 这里从给定行直接计算, 不采用误植. 当前基本解 $x_3 = x_4 = 0$ 违反该割, 而所有非负整数可行点满足. $\square$

19 题目来源与版本索引

19.1 计数与原件对应

本册增补 97 道主问题和 308 个第一层作答块. 主问题按原 Problem 或 Question 计数, 原题未分问時計一个作答块; 更深的嵌套要求逐项保留, 不用文件数量代替题目数量. 15.053 作业 1、2 两组的共同题只写一次, 不同的第三题均保留. 编号后的内链可回到完整题面与解答.

原课程资料	主问题	第一层作答块
6.253: 2010 五组作业	27	48
6.253: 2010、2012 期中卷	4	25
15.053: 作业 1-6 及组别版本	24	104
15.053: 十次习题课	36	112
15.053: 期中 2 综合练习	6	19
合计	97	308

6.253 的**作业页面**属于 2012 课程, 但所提供五组题面实际标 Spring 2010; 两份**期中卷**分别标 2010 和 2012. 2012 卷 Q2(a) 原解写 “To be added”, 本册明确标 AI 独立补解. 两年卷的判断题与构造题分别保留, 不并成一份卷.

15.053 的**作业页面**有 PS1、PS2 各两组及 PS3–6, 共八份题面版本. PS3 解答的 .xls 后缀不代表真实格式, 实际为 XLSX; 本稿读过所有六张表, 包括独立的退化示例. 九份工作簿的 30 张表均实际提取, 数值解与原/对偶证书另由脚本验算. **习题课**1–9 原为 2012 版, 在 2013 页获准刊载; 习题课 10 按实际原件保留数学内容. **综合练习**原题头为 *Practical Problem Set*, 页面说明用于期中 2 练习, 不能据文件名当成正式考试.

19.2 缺漏、版权例外与解答标记

原官方库存未提供 15.053 实际期中卷及七份小测题面; 三份复习指南只给考试范围, 已在课程说明中列出, 不凭空补成试卷. 习题课 9 和综合练习的重复题号保留原编号映射. 习题课 10 已删除的版权图片不恢复, 数学区域和点集图按题目数据独立绘制.

部分作业、习题课 4 及综合练习的背景模型引自外部教材, 本稿仅独立表述其数学数据、模型与全部作答要求, 不翻译教材故事段落. 含这类背景的原题与解答文件、6.253 出版者授权概念摘要只在来源清单保留链接与哈希. 原 13 章中共轭模型例题**3.2**及循环例题**12.9**与增补题的对应关系在题解内注明; 同类模型的不同数据不视为同一道题.

“官方解答重构”表示沿原解路线重述并核算; “AI 补充”表示补上原解省略的论证; “AI 独立解答”表示原无解、原解无法成立或需另建模型. 发现题面条件不足、原答案算错或原编号遗漏时, 先保留原问题事实, 再明确给出所需条件和可成立的结论. 完整逐题页码、第一层子问与来源文件的对应清单见源码中的 `assessment-coverage.json`; 原件 URL 及 SHA-256 见 `sources/assessment-resources.json`.

19.3 逐题内链索引

各组下列编号为本册习题编号, 点击可回到题面; 原题号、重复编号及组别在相应题面保留. 原文件页码和第一层子问见逐题电子清单. **6.253 作业 1 (2010 春季)**: [14.1](#)、[14.2](#)、[14.3](#)、[14.4](#)、[14.5](#).

6.253 作业 2 (2010 春季): [14.6](#)、[14.7](#)、[14.8](#)、[14.9](#)、[14.10](#).

6.253 作业 3 (2010 春季): [14.11](#)、[14.12](#)、[14.13](#)、[14.14](#)、[14.15](#).

6.253 作业 4 (2010 春季): [14.16](#)、[14.17](#)、[14.18](#)、[14.19](#)、[14.20](#).

6.253 作业 5 (2010 春季): [14.21](#)、[14.22](#)、[14.23](#)、[14.24](#)、[14.25](#)、[14.26](#)、[14.27](#).

6.253 期中考试 (2010 春季): [15.1](#)、[15.2](#).

6.253 期中考试 (2012 春季): [15.3](#)、[15.4](#).

15.053 作业 1: [16.1](#)、[16.2](#).

15.053 作业 1 (组 1): [16.3](#).

15.053 作业 1 (组 2): [16.4](#).

15.053 作业 2: [16.5](#)、[16.6](#).

15.053 作业 2 (组 1): [16.7](#).

15.053 作业 2 (组 2): [16.8](#).

- 15.053 作业 3: 16.9、16.10、16.11、16.12.
- 15.053 作业 4: 16.13、16.14、16.15.
- 15.053 作业 5: 16.16、16.17、16.18、16.19.
- 15.053 作业 6: 16.20、16.21、16.22、16.23、16.24.
- 15.053 习题课 1: 17.1、17.2、17.3、17.4.
- 15.053 习题课 2: 17.5、17.6、17.7、17.8.
- 15.053 习题课 3: 17.9、17.10、17.11、17.12.
- 15.053 习题课 4: 17.13、17.14、17.15.
- 15.053 习题课 5: 17.16、17.17、17.18、17.19.
- 15.053 习题课 6: 17.20、17.21、17.22.
- 15.053 习题课 7: 17.23、17.24、17.25.
- 15.053 习题课 8: 17.26、17.27、17.28、17.29.
- 15.053 习题课 9: 17.30、17.31、17.32、17.33.
- 15.053 习题课 10: 17.34、17.35、17.36.
- 15.053 期中 2 综合练习: 18.1、18.2、18.3、18.4、18.5、18.6.

参考文献

- [1] Dimitri P. Bertsekas. *6.253 Convex Analysis and Optimization: Complete Lecture Notes*. MIT OpenCourseWare, Spring 2012, 340 页. <https://ocw.mit.edu/courses/6-253-convex-analysis-and-optimization-spring-2012/pages/lecture-notes/>.
- [2] Massachusetts Institute of Technology. MIT OpenCourseWare Privacy and Terms of Use. <https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/>. 访问日期: 2026-10-08.
- [3] James Orlin, Ebrahim Nasrabadi. *15.053 Optimization Methods in Management Science*. MIT OpenCourseWare, Spring 2013. Lecture notes L2–6, L9; tutorials 1, 2, 4–7. <https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/pages/lecture-notes/>; <https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/pages/tutorials/>.
- [4] Dimitri P. Bertsekas. *Extended Monotropic Programming and Duality*. 2010 revised manuscript, definitions 4.1–4.2. https://web.mit.edu/dimitrib/www/Extended_Mono.pdf. 仅用于核对术语与相关高级工具, 不转载全文.