

Introduction

一、复变函数的产生及研究对象

并非来源于生产实际问题的推动，是为了数学自身的发展，解决数学内部矛盾；以复变解析函数为研究对象。

Cauchy, Reiman, Weirestrass 积分角度 几何角度 级数角度

二、用途

已成为流体力学、电磁学、工程力学、热学等领域中研究平面问题的最有效的方法之一。

三、学习方法

类比法

第一章 复数与复变函数

第一节 复数的概念与运算

1.1 复数及其代数运算

1.2 复数的几何表示

1.3 复数的乘幂与方根

1.4 复数在几何上的应用举例

1.1 复数及其代数运算

$x^2 + 1 = 0$ 在实数范围内无解. 为了建立代数方程的普

遍理论, 引入一个新数 i , 称为**虚数单位**.

对虚数单位的规定:

(1) $i^2 = -1$.

(2) i 可以和实数在一起按一定的法则进行四则运算.

虚数单位的**特性**:

$$i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = i \cdot i^2 = -i, \quad i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1, \quad \dots$$

$$i^{4n} = 1, \quad i^{4n+1} = i, \quad i^{4n+2} = -1, \quad i^{4n+3} = -i, \quad i^{4n+4} = 1.$$

复数 形如 $z=x+iy$ ，其中 x 和 y 是任意两个实数.

把这里的 x 和 y 分别称为复数 z 的**实部**和**虚部**，记作

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

$x = 0, y \neq 0 \Rightarrow z = iy$ 称为纯虚数 $R \subset C$

$x \neq 0, y = 0 \Rightarrow z = x$ 看做实数

复数相等充要条件 实部和虚部分别相等

复数为0充要条件 **注意：**一般情况下，复数不能比较大小

复数的代数运算 设两复数 $z_1=x_1+iy_1$ 和 $z_2=x_2+iy_2$

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_2 y_1 + x_1 y_2)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

共轭复数 实部相同、虚部绝对值相同符号相反的一对复数

z 共轭的复数记作 \bar{z}

$$z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy$$

$$z = x - iy \Rightarrow \bar{z} = x + iy$$

共轭复数的性质

$$(1) \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 ; \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 ; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} .$$

$$(2) \bar{\bar{z}} = \overline{(\bar{z})} = z \quad (3) z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 = |z|^2 .$$

$$(4) z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z).$$

例1 将下列复数表示成 $x+iy$ 的形式

$$(1) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7 \quad (2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i}$$

解

$$(1) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7 = \frac{(1-i)^{14}}{(1+i)^7 (1-i)^7} = \frac{[(1-i)^2]^7}{2^7} = \frac{(-2i)^7}{2^7} = i.$$

$$\begin{aligned} (2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i} &= \frac{i(1+i)}{(1-i)(1+i)} + \frac{(1-i)i}{i \cdot i} = \frac{i-1}{2} + \frac{i+1}{-1} \\ &= -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i \end{aligned}$$

练习：把 $z = \frac{i}{(i-1)(i-2)(i-3)}$ 表示成 $x + iy$ 的形式.

例2 设 z_1, z_2 是两个复数, 证明

$$\operatorname{Re}\left(z_1 \bar{z}_2\right)=\frac{1}{2}\left(z_1 \bar{z}_2+\bar{z}_1 z_2\right)$$

$$\operatorname{Im}\left(z_1 \bar{z}_2\right)=\frac{1}{2 i}\left(z_1 \bar{z}_2-\bar{z}_1 z_2\right)$$

分析 $z+\bar{z}=2 \operatorname{Re}(z), \quad z-\bar{z}=2 i \operatorname{Im}(z).$

证明 $\operatorname{Re}\left(z_1 \bar{z}_2\right)=\frac{1}{2}\left(z_1 \bar{z}_2+\overline{z_1 \bar{z}_2}\right)=\frac{1}{2}\left(z_1 \bar{z}_2+\bar{z}_1 z_2\right)$

同理可证第二个等式.


1.2 复数的几何表示

复平面

$$z = x + iy \longleftrightarrow (x, y) \longleftrightarrow P(x, y)$$

x 轴为实轴, y 轴为虚轴

$$z = x + iy \longleftrightarrow \overrightarrow{OP}$$



复数的模 向量的长度

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$


$$|x| \leq |z|, |y| \leq |z|$$

$$|z| \leq |x| + |y|$$

$$z\bar{z} = |z|^2 = |z^2|$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

z 与 \bar{z} 关于实轴对称



复数的辐角 以 x 轴的正向为始边, 以向量 \overrightarrow{OP} 为终边的角 θ 称为 z 的辐角, 记做 $\text{Arg}z$. $\text{Arg}z = \theta_1 + 2k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

$z = 0$ 辐角不确定

辐角的主值 满足 $-\pi < \theta \leq \pi$ 的复数 z 的辐角称为辐角

的主值. 记做 $\theta_0 = \arg z$ $\tan(\arg z) = y/x$

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & x > 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & x = 0, y \neq 0 \\ \arctan \frac{y}{x} \pm \pi & x < 0, y \neq 0 \\ \pi & x < 0, y = 0 \end{cases}$$
$$-\frac{\pi}{2} < \arctan \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$$
$$\text{Arg}z = \arg z + 2k\pi$$
$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

复数的三角表示和指数表示

利用直角坐标与极坐标之间的关系 $x = r \cos \theta,$
 $y = r \sin \theta,$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{三角表示式}$$

再利用Euler公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

$$z = r e^{i\theta} \quad \text{指数表示式} \quad \text{其中 } r = |z|, \quad \theta = \operatorname{Arg} z$$

例3 把复数 $z = 1 - \cos \alpha + i \sin \alpha, 0 \leq \alpha \leq \pi$

化为三角表示与指数表示并求辐角的主值.

解 $z = 1 - \cos \alpha + i \sin \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} i$

$$= 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left[\sin \frac{\alpha}{2} + i \cos \frac{\alpha}{2} \right] = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right) \right]$$

$$z = 2 \sin \frac{\alpha}{2} e^{i \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right)}$$

$$\arg z = \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}$$

练习：写出复数 $z = -2 - 3i$ 的辐角.

练习：求复数 $z = \frac{3+i}{2-i}$ 的模、辐角、共轭复数.

练习：给出复数 $z = \sin \frac{\pi}{3} - i \cos \frac{\pi}{3}$ 的三角表示形式.

例4 证明 $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2)$, 并由此证明

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$


证明 $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)\overline{z_1 + z_2} = z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2$

由**例2**知,

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\bar{z}_2) \\ &\leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1\bar{z}_2| \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2 \end{aligned}$$

复球面与无穷大

复数可以用平面上的点表示，这是复数的几何表示法的一种，另外还可以用球面上的点表示复数.



球面上的点, 除去北极 N 外, 与复平面内的点之间存在着一一对应的关系. 我们用球面上的点来表示复数.

∞ 扩充复平面.

对于复数的无穷远点而言，它的实部、虚部、辐角等概念均无意义，**规定**它的模为正无穷大。

■关于 ∞ 的四则运算法则如下：

(1) 加法 $\alpha + \infty = \infty + \alpha = \infty \quad (\alpha \neq \infty);$

(2) 减法 $\alpha - \infty = \infty - \alpha = \infty \quad (\alpha \neq \infty);$

(3) 乘法 $\alpha \cdot \infty = \infty \cdot \alpha = \infty \quad (\alpha \neq 0);$

(4) 除法 $\frac{\alpha}{\infty} = 0, \quad \frac{\infty}{\alpha} = \infty \quad (\alpha \neq \infty), \quad \frac{\alpha}{0} = \infty \quad (\alpha \neq 0).$

1.3 复数的乘幂与方根

复数乘积和商的模与辐角

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

$$|z_1 z_2| = r_1 \cdot r_2 = |z_1| \cdot |z_2| \quad \text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

注意：集合意义下的相等

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg} z_1 - \text{Arg} z_2.$$

两个复数相乘的几何意义

$$z_1 \cdot z_2 =$$

$$r_1 \cdot r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)].$$

复数的乘幂


$$z_k = r_k (\cos \theta_k + i \sin \theta_k)$$

$$(k = 1, 2, \dots, n),$$

$$z_1 z_2 \cdots z_n = r_1 r_2 \cdots r_n [\cos(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n) + i \sin(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)].$$

$$z_1 = z_2 = \cdots = z_n = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta). \quad r=1, \text{De Moivre公式}$$



补例： 设 $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $z_2 = \sqrt{3} + i$, 求 $z_1 \cdot z_2$ 及 $\frac{z_1}{z_2}$,
并说明其几何意义.

补例： 求 $\frac{(\cos\varphi - i\sin\varphi)^2}{(\sin\varphi + i\cos\varphi)^3}$.

练习： 设 $\frac{(1+i)^2(\cos\sqrt{3}-i)^3}{(1-i)^2(\cos\sqrt{3}+i)^3}$, 求 $|\bar{z}|$.

复数的 n 次方根 对给定的复数 z , 方程 $w^n=z$ 的解 w 称为 z 的 n 次方根 记作 $\sqrt[n]{z}$ or $z^{\frac{1}{n}}$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

$$\rho^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

$$\rho^n = r, \quad \cos n\varphi = \cos \theta, \quad \sin n\varphi = \sin \theta.$$

$$\rho = r^{\frac{1}{n}}, \quad n\varphi = \theta + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots),$$

$$w_k = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

$$w_k = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \\ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots).$$

当取 $k=0,1,2,\cdots,n-1$ 时, 可得 n 个相异根如下

$$w_0, w_1, \cdots, w_{n-1} \qquad w_k = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i(\theta+2k\pi)}{n}}$$

例5 求方程 $w^4+16=0$ 的四个根.


解 $w_k = \sqrt[4]{z} = 16^{\frac{1}{4}} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{4} \right) \quad k = 0, 1, 2, 3$

$$w_0 = \sqrt{2}(1+i), \quad w_1 = \sqrt{2}(-1+i),$$

$$w_2 = -\sqrt{2}(1+i), \quad w_3 = \sqrt{2}(1-i).$$

一般情况下, $\sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}}$

n 个根就是以原点为中心、
半径为 $r^{\frac{1}{n}}$ 的圆的内接正多边形
的 n 个顶点所表示的复数.



例7：求 $\sqrt[4]{1+i}$.

练习：求方程 $z^2 - (3-i)z - 3i = 0$ 的根.

1.4 复数在几何上的应用举例

例6 用复数形式的方程来表示连接两点

$z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$ 的直线和直线段.

$$z - z_1 = t(z_2 - z_1), t \in (-\infty, +\infty)$$

$$z - z_1 = t(z_2 - z_1), t \in [0, 1]$$

例7 说明下列方程所表示的平面图形.

$$(1) |z + i| = 2 \quad (2) |z - 2i| = |z + 2| \quad (3) |z| > 1, \operatorname{Im}(z) > 0$$