

哈 尔 滨 工 业 大 学

## 硕士学位论文中期报告

题 目：一类具一般增长的非齐次分数阶椭圆型方程  
的 Harnack 不等式

院        (系)                 数学学院                

学            科                 基础数学                

导            师                 雷强                

研    究    生                 李云鹏                

学            号                 22S012004                

中期报告日期                 2024 年 6 月                

研究生院制

# 目 录

1	课题主要研究内容及进度情况 .....	1
2	目前已完成的研究工作及结果 .....	1
2.1	准确解部分 .....	1
3	后期拟完成的研究工作及进度安排 .....	7
4	存在的困难与问题 .....	7
5	如期完成全部论文工作的可能性 .....	7
6	参考文献 .....	7

## 1 课题主要研究内容及进度情况

$$\mathbb{R}, dx, \int_{\Omega} u(x) dx,$$

$$1 + 1$$

$$= 2.$$

## 2 目前已完成的研究工作及结果

### 2.1 准确解部分

对方程 xx 证明了 Peano 存在性定理和 Picard 存在唯一性定理，如下所示。

$$\begin{cases} {}^C D_{0+}^{\alpha} x(t) = f(t, x(t), x(qt)), & t \geq 0, \\ x(0) = x_0 \text{ is given.} \end{cases} \quad (1)$$

**定理 1** Eq. (1) always has a mild solution on a small interval  $[0, h]$ .

**证明** 记  $M < \infty$  是集合  $\{\|f(t, u, v)\| : t \in [0, 1], u, v \in B_{2\|x_0\|}(0)\}$  的一个上界，并取  $0 < h \leq 1$  充分小，使得  $\Gamma(\alpha + 1)^{-1} h^{\alpha} M \leq \|x_0\|$ . 对于正整数  $m$ ，作  $t_n^m := nh/m$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots, m$ ，然后按下式构造  $(x_n^m)_{n=0}^m \subset \mathbb{R}^n$ ,

$$x_n^m = x_0 + \Gamma(\alpha)^{-1} \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} (t_n - s)^{\alpha-1} f(s, x_{k-1}^m, x_{q_{k-1}}^m) ds, \quad n = 1, 2, \dots, m, \quad (2)$$

其中  $q_k^m := \lfloor qt_k^m \rfloor$ . 利用这些有限长的序列，分段线性插值地构造连续函数  $(x^m)_{m=1}^{\infty} : [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ，即

$$x^m(t) := \frac{t_n^m - t}{t_n^m - t_{n-1}^m} x_{n-1}^m + \frac{t - t_{n-1}^m}{t_n^m - t_{n-1}^m} x_n^m, \quad t_{n-1}^m \leq t \leq t_n^m.$$

另外，为方便起见，对于  $\delta > 0$ ，记  $D(\delta) := \{(s, t) \in [0, h] \times [0, h] : 0 \leq t - s < \delta\}$ .

现在证明  $\|x^m(t_n)\| \leq 2\|x_0\|$ ,  $0 \leq t \leq h, n = 0, 1, 2, \dots, m, m \in \mathbb{N}_+$ . 施归纳于  $n$ .  $n = 0$  时显然。假设对于  $0 \leq k < n$  成立  $\|x^m(t_k)\| \leq 2\|x_0\|$ ，根据  $M$  和  $h$  的定义，

$$\begin{aligned} \|x^m(t_n)\| &\leq \|x_0\| + \Gamma(\alpha)^{-1} \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} (t_n - s)^{\alpha-1} \|f(s, x_{k-1}^m, x_{q_{k-1}}^m)\| ds \\ &\leq \|x_0\| + \Gamma(\alpha)^{-1} \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} (t_n - s)^{\alpha-1} M ds \\ &= \|x_0\| + \Gamma(\alpha)^{-1} M \int_0^{t_n} (t_n - s)^{\alpha-1} ds \\ &= \|x_0\| + \Gamma(\alpha + 1)^{-1} M t_n^{\alpha} \\ &\leq \|x_0\| + \Gamma(\alpha + 1)^{-1} M h^{\alpha} \leq 2\|x_0\|, \end{aligned}$$

这样就完成了归纳。于是对任何  $t \in [0, h]$ ,  $t$  必然落在某个区间  $[t_{n-1}^m, t_n^m]$  中, 从而

$$\|x^m(t)\| \leq \frac{t_n^m - t}{t_n^m - t_{n-1}^m} \|x_{n-1}^m\| + \frac{t - t_{n-1}^m}{t_n^m - t_{n-1}^m} \|x_n^m\| \leq 2\|x_0\|.$$

因此对每个  $t \in [0, h]$  都有  $(x^m(t))_{m=1}^\infty$  在  $\mathbb{R}^n$  中相对紧.

然后讨论连续函数列  $(x^m)_{m=1}^\infty$  的等度连续性. 首先, 对于  $0 \leq k \leq n \leq m$ , 有

$$\begin{aligned} & \Gamma(\alpha) \|x_n^m - x_k^m\| \\ & \leq \sum_{j=1}^k \int_{t_{j-1}^m}^{t_j^m} \left( (t_k^m - s)^{\alpha-1} - (t_n^m - s)^{\alpha-1} \right) M \, ds + \sum_{j=k+1}^n \int_{t_{j-1}^m}^{t_j^m} (t_n^m - s)^{\alpha-1} M \, ds \\ & = M \cdot \left( \int_0^{t_k^m} \left( (t_k^m - s)^{\alpha-1} - (t_n^m - s)^{\alpha-1} \right) \, ds + \int_{t_k^m}^{t_n^m} (t_n^m - s)^{\alpha-1} \, ds \right) \\ & = M\alpha^{-1} \cdot \left( (t_k^m)^\alpha - (t_n^m)^\alpha + 2(t_n^m - t_k^m)^\alpha \right) \leq 2M\alpha^{-1} (t_n^m - t_k^m)^\alpha. \end{aligned}$$

而至于  $0 \leq s \leq t \leq h$ , 不妨设  $s \in [t_{k-1}^m, t_k^m]$ ,  $t \in [t_{n-1}^m, t_n^m]$ . 如果  $k < n$ , 那么

$$\begin{aligned} & \|x^m(t) - x^m(s)\| \\ & \leq \|x^m(t) - x^m(t_{n-1}^m)\| + \|x_{n-1}^m - x_k^m\| + \|x^m(t_k) - x^m(s)\| \\ & \leq \|x_n^m - x_{n-1}^m\| + \|x_{n-1}^m - x_k^m\| + \|x_k^m - x_{k-1}^m\| \\ & \leq 2M\Gamma(\alpha+1)^{-1} \left( (t_n^m - t_{n-1}^m)^\alpha + (t_{n-1}^m - t_k^m)^\alpha + (t_k^m - t_{k-1}^m)^\alpha \right) \\ & \leq 2M\Gamma(\alpha+1)^{-1} (2(h/m)^\alpha + (t-s)^\alpha), \end{aligned}$$

而若是  $k = n$ , 则有

$$\begin{aligned} \|x^m(t) - x^m(s)\| & \leq \|x_n^m - x_{n-1}^m\| \\ & \leq 2M\Gamma(\alpha+1)^{-1} (t_n^m - t_{n-1}^m)^\alpha \\ & \leq 2M\Gamma(\alpha+1)^{-1} (h/m)^\alpha, \end{aligned}$$

总之

$$\|x^m(t) - x^m(s)\| \leq 2M\Gamma(\alpha+1)^{-1} (2(h/m)^\alpha + (t-s)^\alpha). \quad (3)$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}_+$  和  $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon) > 0$  分别满足  $2M\Gamma(\alpha+1)^{-1}\delta_0^\alpha < \varepsilon/2$  和  $4M\Gamma(\alpha+1)^{-1}(h/N)^\alpha < \varepsilon/2$ . 由式(3)可知,  $\|x^m(t) - x^m(s)\| < \varepsilon$  对任何  $m > N$  及  $(s, t) \in D(\delta_0)$  成立. 至于  $1 \leq m \leq N$ , 由于每个  $x^m$  都是  $[0, h]$  上的一致连续函数, 故存在有限个只依赖于  $\varepsilon$  的正数  $(\delta_m)_{m=1}^N$ , 使得对于  $(s, t) \in D(\delta_m)$  成立  $\|x^m(t) - x^m(s)\| < \varepsilon$ . 现在取  $\delta = \delta(\varepsilon) := \min_{0 \leq m \leq N} \delta_m > 0$ , 那么当  $0 \leq s \leq t \leq h$  且  $t - s < \delta$  时,  $\|x^m(t) - x^m(s)\| < \varepsilon$  对于任何  $m \in \mathbb{N}_+$  成立. 这说明  $(x^m)_{m=1}^\infty$  是  $C[0, h]$

中的一致等度连续函数列。

使用 Arzelà-Ascoli 定理, 我们得到  $\{x^m: m \in \mathbb{N}_+\}$  在  $C([0, h], \mathbb{R}^n)$  中相对紧, 故有一致收敛子列, 这个子列仍记为  $(x^m)_{m=1}^\infty$ , 并设其极限函数为  $x \in C([0, h], \mathbb{R}^n)$ . 任给  $\varepsilon > 0$ , 由于  $f$  在紧集  $[0, h] \times \overline{B_{2\|x_0\|}}(0) \times \overline{B_{2\|x_0\|}}(0) \subset [0, h] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  上一致连续, 故存在  $\delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0$  使得  $\|f(t, u, v) - f(t, x, y)\| < \varepsilon \alpha \Gamma(\alpha) h^{-\alpha} / 4$  对  $t \in [0, h]$  以及满足  $\|u - x\| + \|v - y\| < \delta_1$  的  $u, v, x, y \in B_{2\|x_0\|}(0)$  成立。取  $N_1 = N_1(\delta_1) \in \mathbb{N}_+$ , 使得当  $m > N_1$  且  $t \in [0, h]$  时成立  $\|x^m(t) - x(t)\| < \delta_1/2$ , 从而

$$\begin{aligned} & \left\| \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x^m(s), x^m(qs)) ds - \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds \right\| \\ & \leq \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \frac{\varepsilon \alpha \Gamma(\alpha) h^{-\alpha}}{4} ds = \varepsilon \Gamma(\alpha) h^{-\alpha} t^\alpha / 4 \leq \varepsilon \Gamma(\alpha) / 4. \end{aligned} \quad (4)$$

由  $(x^m)_{m=1}^\infty$  的等度连续性, 存在  $\delta_2 = \delta_2(\varepsilon) > 0$  使得  $\|x^m(t) - x^m(s)\| < \min(\delta_1/2, \varepsilon/4)$  对任何  $m \in \mathbb{N}_+$  及  $(s, t) \in D(\delta_2)$  成立。取  $N_2 = N_2(\delta_2) \in \mathbb{N}_+$  使得  $h/N_2 < \delta_2$ . 一方面, 注意到  $m > N_2$  时总有  $t_n - t_{n-1} < \delta_2 < \delta_1/2$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots, m$ , 于是  $\|f(t, x_{n-1}^m, x_{q_{n-1}}^m) - f(t, x^m(t), x^m(qt))\| < \varepsilon \alpha \Gamma(\alpha) h^{-\alpha} / 4$ ,  $t \in [t_{n-1}^m, t_n^m]$ , 从而

$$\begin{aligned} & \Gamma(\alpha) \left\| x^m(t_n) - x_0 - \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^{t_n} (t_n - s)^{\alpha-1} f(s, x^m(s), x^m(qs)) ds \right\| \\ & \leq \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} (t_n - s)^{\alpha-1} \|f(s, x_{k-1}^m, x_{q_{k-1}}^m) - f(s, x^m(s), x^m(qs))\| ds \\ & \leq \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} (t_n - s)^{\alpha-1} \frac{\varepsilon \alpha \Gamma(\alpha) h^{-\alpha}}{4} ds \\ & = \int_0^{t_n} (t_n - s)^{\alpha-1} \frac{\varepsilon \alpha \Gamma(\alpha) h^{-\alpha}}{4} ds \leq \varepsilon \Gamma(\alpha) / 4. \end{aligned} \quad (5)$$

另一方面, 任意  $t \in [0, h]$ , 设  $t \in [t_{n-1}, t_n]$ , 则对任何  $m \in \mathbb{N}_+$  成立

$$\|x^m(t) - x^m(t_n)\| < \varepsilon/4. \quad (6)$$

根据<sup>[2]</sup> Proposition 3.2,  $x, f \in C([0, h], \mathbb{R}^n)$  蕴涵  $t \mapsto \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds \in C([0, h], \mathbb{R}^n)$ , 因此可取  $N_3 = N_3(\varepsilon) \in \mathbb{N}_+$  充分大 (从而  $h/N_3 > 0$  足够小), 使得  $m > N_3$  且  $(s, t) \in D(h/N_3)$  时,  $\Gamma(\alpha)^{-1} \left\| \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau, x(\tau), x(q\tau)) d\tau - \int_0^s (s-\tau)^{\alpha-1} f(\tau, x(\tau), x(q\tau)) d\tau \right\| < \varepsilon/4$ . 于是当  $t \in [0, h]$  时, 设  $t \in [t_{n-1}, t_n]$ , 有

$$\begin{aligned} & \Gamma(\alpha)^{-1} \left\| \int_0^{t_n} (t_n - s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds \right. \\ & \quad \left. - \int_0^t (t - s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds \right\| < \varepsilon/4. \end{aligned} \quad (7)$$

现在取  $N = N(\varepsilon) := \max \{N_1, N_2, N_3\}$ , 根据 Eqs. (4) to (7) 以及三角不等式, 当  $m > N, t \in [0, h]$  时, 设  $t \in [t_{n-1}, t_n]$ , 那么可以估计

$$\begin{aligned}
& \left\| x^m(t) - x_0 - \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) \, ds \right\| \\
& \leq \|x^m(t) - x^m(t_n)\| \\
& \quad + \left\| x^m(t_n) - x_0 - \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^{t_n} (t_n-s)^{\alpha-1} f(s, x^m(s), x^m(qs)) \, ds \right\| \\
& \quad + \left\| x_0 + \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^{t_n} (t_n-s)^{\alpha-1} f(s, x^m(s), x^m(qs)) \, ds \right. \\
& \quad \quad \left. - x_0 - \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^{t_n} (t_n-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) \, ds \right\| \\
& \quad + \left\| x_0 + \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^{t_n} (t_n-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) \, ds \right. \\
& \quad \quad \left. - x_0 - \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) \, ds \right\| < \varepsilon,
\end{aligned}$$

即  $\lim_{m \rightarrow \infty} x^m(t) = x_0 + \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) \, ds, 0 \leq t \leq h$ . 而极限的唯一性导致

$$x(t) = \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) \, ds, 0 \leq t \leq h,$$

从而  $x \in C([0, h], \mathbb{R}^n)$  是方程(1)在  $[0, h]$  上的一个弱解。  $\square$

**定理 2** 如果  $f(t, \cdot, \cdot)$  对  $t \in [0, \infty)$  一致地局部 Lipschitz, 即对任何  $r > 0$ , 存在不依赖于  $t$  的  $L = L(r) \geq 0$ , 使得

$$\|f(t, x, y) - f(t, u, v)\| \leq L \cdot (\|x - u\| + \|y - v\|) \quad (8)$$

对任何  $t \in [0, \infty)$  以及  $x, y, u, v \in B_r(0)$  成立, 那么方程(1)的弱解局部存在, 并在存在区间上唯一。

**证明 (存在性)** 构造 Picard 序列  $(x_n)_{n=0}^\infty : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$  满足

$$\begin{cases} x^{n+1}(t) := x_0 + \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x^n(s), x^n(qs)) \, ds, & n \in \mathbb{N}, \\ x^0(t) := x_0. \end{cases}$$

记  $M < \infty$  是集合  $\{\|f(t, u, v)\| : t \in [0, 1], u, v \in B_{2\|x_0\|}(0)\}$  的一个上界, 并取  $0 < h \leq 1$  充分小, 使得  $\Gamma(\alpha+1)^{-1} h^\alpha M \leq \|x_0\|$ . 可以归纳地证明  $\|x^n(t)\| \leq 2\|x_0\|, t \in$

$[0, h], n \in \mathbb{N}$ . 取  $L := L(2\|x_0\|)$ , 那么对于  $t \in [0, h], n \in \mathbb{N}_+$ ,

$$\begin{aligned} \|x^{n+1}(t) - x^n(t)\| &\leq L\Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \\ &\quad (\|x^n(s) - x^{n-1}(s)\| + \|x^n(qs) - x^{n-1}(qs)\|) \, ds. \end{aligned} \quad (9)$$

现在归纳地说明

$$\|x^{n+1}(t) - x^n(t)\| \leq \frac{L^n M}{\Gamma(\alpha)^{n+1} \alpha} t^{(n+1)\alpha} \prod_{k=1}^n (1 + q^{k\alpha}) \mathbf{B}(\alpha, k\alpha + 1), \quad t \in [0, h], n \in \mathbb{N}. \quad (10)$$

当  $n = 0$  时,

$$\begin{aligned} \|x^1(t) - x^0(t)\| &= \|x^1(t) - x_0\| \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left\| \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x_0, x_0) \, ds \right\| \\ &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} M \, ds \\ &= \Gamma(\alpha)^{-1} \alpha^{-1} t^\alpha M. \end{aligned}$$

假定式(10)在  $n$  取  $n-1$  时成立, 然后

$$\begin{aligned} &\|x^{n+1}(t) - x^n(t)\| \\ &\leq \frac{L}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} (\|x^n(s) - x^{n-1}(s)\| + \|x^n(qs) - x^{n-1}(qs)\|) \, ds \\ &\leq \frac{L^n M}{\Gamma(\alpha)^{n+1} \alpha} \left( \prod_{k=1}^{n-1} (1 + q^{k\alpha}) \mathbf{B}(\alpha, k\alpha + 1) \right) \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} (s^{n\alpha} + (qs)^{n\alpha}) \, ds \\ &= \frac{L^n M}{\Gamma(\alpha)^{n+1} \alpha} \left( \prod_{k=1}^{n-1} (1 + q^{k\alpha}) \mathbf{B}(\alpha, k\alpha + 1) \right) (1 + q^{n\alpha}) \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} s^{n\alpha} \, ds \\ &= \frac{L^n M}{\Gamma(\alpha)^{n+1} \alpha} \left( \prod_{k=1}^{n-1} (1 + q^{k\alpha}) \mathbf{B}(\alpha, k\alpha + 1) \right) (1 + q^{n\alpha}) t^{n\alpha+\alpha} \mathbf{B}(\alpha, n\alpha + 1) \\ &= \frac{L^n M}{\Gamma(\alpha)^{n+1} \alpha} t^{(n+1)\alpha} \prod_{k=1}^n (1 + q^{k\alpha}) \mathbf{B}(\alpha, k\alpha + 1). \end{aligned}$$

由数学归纳原理, 式(10)成立. 注意到

$$\prod_{k=1}^n (1 + q^{k\alpha}) \leq \prod_{k=1}^n \exp(q^{k\alpha}) = \exp \sum_{k=1}^n (q^\alpha)^k \leq \exp \frac{q^\alpha}{1 - q^\alpha}$$

和

$$\prod_{k=1}^n \mathbf{B}(\alpha, k\alpha + 1) = \prod_{k=1}^n \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(k\alpha + 1)}{\Gamma((k+1)\alpha + 1)} = \Gamma(\alpha)^n \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\Gamma((n+1)\alpha + 1)},$$

我们有

$$\|x^{n+1}(t) - x^n(t)\| \leq \frac{L^n M t^{(n+1)\alpha}}{\Gamma((n+1)\alpha + 1)} \exp \frac{q^\alpha}{1 - q^\alpha}, t \in [0, h]. \quad (11)$$

由 Cauchy-Hadamard 公式和 Stirling 公式易知 Mittag-Leffler 函数  $E_\alpha(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \Gamma(\alpha n + 1)^{-1} z^n$  对于任何  $z \in \mathbb{C}$  收敛, 然后根据 Weierstrass M 判别法就得到函数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (x^{n+1} - x^n)$  在  $[0, h]$  上绝对一致收敛, 于是函数列  $(x^n)_{n=0}^{\infty}$  在  $[0, h]$  上存在一致极限  $x$ . 这说明任取  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ , 使得  $\|x^n(t) - x(t)\| < \varepsilon$  对于  $n > N$  和  $t \in [0, h]$  成立. 这样一来, 当  $t \in [0, h]$  时,

$$\begin{aligned} & \left\| \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x^n(s), x^n(qs)) ds - \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds \right\| \\ & \leq \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} L \cdot (\|x^n(s) - x(s)\| + \|x^n(qs) - x(qs)\|) ds \\ & \leq 2\varepsilon L \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} ds = 2\varepsilon L \alpha^{-1} t^\alpha, \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x^n(s), x^n(qs)) ds = \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds.$$

现在在式(2)中命  $n \rightarrow \infty$  就得到

$$x(t) = x_0 + \Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} f(s, x(s), x(qs)) ds, \quad 0 \leq t \leq h.$$

On the other hand, with the help of<sup>[7]</sup> Proposition 3.2, one can deduce by induction that  $(x^n)_{n=0}^{\infty} \subseteq C^{0,\alpha} \cap AC[0, h] \subseteq C[0, h]$ . Then  $x$ , as the uniform limit of  $(x^n)_{n=0}^{\infty}$ , is also continuous on  $[0, h]$ . Now we can say  $x$  is a mild solution of Eq. (1) on  $[0, h]$ , and the proof of existence is complete.

(唯一性) 设  $0 < T < \infty$ ,  $x, y \in C[0, T]$  都是方程(1)的弱解. 记  $L := L(\max(\max_{0 \leq t \leq T} \|x(t)\|, \max_{0 \leq t \leq T} \|y(t)\|))$ , 并作  $S := \{t \in [0, T] : x(t) \neq y(t)\}$ ,  $t_* := \inf S$ , 下证  $t_* = \infty$ . 反证, 假设  $0 \leq t_* \leq T$ , 分三种情况讨论.

如果  $t_* = T$ . 那么在  $[0, T)$  上有  $x = y$ , 而  $x, y$  都是连续的, 因此必在闭区间  $[0, T]$  上处处相等, 此时  $S = \emptyset, t_* = \infty$ , 矛盾.

如果  $0 < t_* < T$ . 那么在  $[0, t_*)$  上有  $x = y$ . 选取  $\delta > 0$  充分小, 使得  $t_* + \delta \leq T$  且



$q \cdot (t_* + \delta) < t_*$ , 然后就有  $x(qt) = y(qt)$ ,  $0 \leq t \leq t_* + \delta$ . 于是当  $t \in [0, t_* + \delta]$  时,

$$\begin{aligned} \|x(t) - y(t)\| &\leq L\Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \\ &\quad (\|x(s) - y(s)\| + \|x(qs) - y(qs)\|) ds \\ &= L\Gamma(\alpha)^{-1} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \|x(s) - y(s)\| ds. \end{aligned}$$

此时利用分数阶的 Gronwall 不等式??就得到在  $[0, t_* + \delta]$  上都有  $x = y$ , 故  $t_* \geq t_* + \delta$ , 而这是不可能的。

如果  $t_* = 0$ . 选取  $\delta \in (0, T]$  充分小, 使得  $2L\Gamma(\alpha+1)^{-1}\delta^\alpha < 1$ . 当  $t \in [0, \delta]$  时,

$$\begin{aligned} &\|x(t) - y(t)\| \\ &\leq \frac{L}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} (\|x(s) - y(s)\| + \|x(qs) - y(qs)\|) ds \\ &\leq \frac{2L}{\Gamma(\alpha)} \left( \max_{0 \leq s \leq t} \|x(s) - y(s)\| \right) \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} ds \\ &= 2L\Gamma(\alpha+1)^{-1} t^\alpha \max_{0 \leq s \leq t} \|x(s) - y(s)\|. \end{aligned}$$

上式两边对  $t \in [0, \delta]$  取最大值, 得到

$$\max_{0 \leq t \leq \delta} \|x(t) - y(t)\| \leq 2L\Gamma(\alpha+1)^{-1}\delta^\alpha \max_{0 \leq t \leq \delta} \|x(t) - y(t)\|,$$

结合  $\delta$  的选取知道只可能有  $\max_{0 \leq s \leq \delta} \|x(s) - y(s)\| = 0$ , 即等式  $x = y$  至少在  $[0, \delta]$  上成立, 故  $t_* \geq \delta$ , 矛盾.

综合以上各种情况知  $t_* \notin [0, T]$ , 只可能是  $t_* = \infty$ , 此时必有  $S = \emptyset$ , 故而  $x$  和  $y$  在整个  $[0, T]$  上相等. 而如若  $x, y$  是  $[0, \infty)$  上方程(1)的弱解, 上述结果则表明它们在任何有限区间  $[0, T]$  上相等, 因而在  $[0, \infty)$  上相等. 唯一性证毕.  $\square$

### 3 后期拟完成的研究工作及进度安排

### 4 存在的困难与问题

### 5 如期完成全部论文工作的可能性

### 6 参考文献