

动态规划在经济管理中的应用

修贤超

<https://xianchaoxiu.github.io>

背包问题

- 一位旅行者携带背包去登山, 已知他所能承受的背包重量限度为 a kg, 现有 n 种可供他选择背入背包, 第 i 种物品的单件重量为 a_i kg, 其价值是携带数量 x_i 的函数 $c_i(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。问旅行者应如何选择携带各种物品的件数, 以使总价值最大
- 设 x_i 为第 i 种物品装入的件数, 则背包问题可归结为整数规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n c_i(x_i) \\ \text{s.t. } &\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq a \\ x_i \geq 0 \text{ 且为整数 } (i = 1, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

动态规划顺序解法

- **阶段:** 将可装入物品按 $1, \dots, n$ 排序, 每段装一种物品, 共划分为 n 个阶段, 即 $k = 1, \dots, n$
- **状态变量:** 在第 k 段开始时, 背包中允许装入前 k 种物品的总重量为 s_{k+1}
- **决策变量:** 装入第 k 种物品的件数, 记 x_k
- **状态转移方程:** $s_k = s_{k+1} - a_k x_k$
- **允许决策集合:** $D_k(s_{k+1}) = \{x_k \mid 0 \leq x_k \leq [s_{k+1}/a_k], x_k \text{ 为整数}\}$
- **最优指标函数:** 表示在背包中允许装入物品的总重量不超过 s_{k+1} kg, 采用最优策略只装前 k 种物品时的最大使用价值, 记 $f_k(s_{k+1})$

动态规划顺序解法

■ 顺序递推方程

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \max_{x_k=0,1,\dots,[s_{k+1}/a_k]} \{c_k(x_k) + f_{k-1}(s_{k+1} - a_k x_k)\} \\ f_0(s_1) = 0 \end{cases}$$

- 用前向动态规划方法逐步计算出 $f_1(s_2), f_2(s_3), \dots, f_n(s_{n+1})$ 及相应的决策函数 $x_1(s_1), x_2(s_3), \dots, x_n(s_{n+1})$, 最后得到的 $f_n(a)$ 即为所求的最大价值, 相应的最优策略则由反推计算得出
- 当 x_i 仅表示装入 (取 1) 和不装 (取 0) 第 i 种物品, 即 0-1 背包问题

例 1

- 有一辆最大货运量为 10t 的卡车，用以装载 3 种货物，每种货物的单位重量及相应单位价值如下。应如何装载可使总价值最大

货物编号 i	1	2	3
单位重量 $(t)(a_i)$	3	4	5
单位价值 c_i	4	5	6

- 设第 i 种货物装载的件数为 x_i ($i = 1, 2, 3$)，则问题可表为

$$\begin{aligned} \max z &= 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases} \end{aligned}$$

例 1

■ 当 $k = 1$ 时, 有

$$f_1(s_2) = \max_{0 \leq 3x_1 \leq s_2, x_1 \text{ 为整数}} \{4x_1\}$$

或

$$f_1(s_2) = \max_{0 \leq x_1 \leq s_2/3, x_1 \text{ 为整数}} \{4x_1\} = 4[s_2/3]$$

s_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f_1(s_2)$	0	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12
x_1^*	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3

例 1

■ 当 $k = 2$ 时, 有

$$f_2(s_3) = \max_{0 \leq 4x_2 \leq s_3, x_2 \text{ 为整数}} \{5x_2 + f_1(s_3 - 4x_2)\}$$

或

$$f_2(s_3) = \max_{0 \leq x_2 \leq s_3/4, x_2 \text{ 为整数}} \{5x_2 + f_1(s_3 - 4x_2)\}$$

s_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_2	0	0	0	0	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1 2	0 1 2	0 1 2
$c_2 + f_2$	0	0	0	4	4 5	4 5	8 5	8 9	8 9 10	12 9 10	12 13 10
$f_2(s_3)$	0	0	0	4	5	5	8	9	10	12	13
x_2^*	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1

例 1

- 当 $k = 3$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_3(s_4) &= \max_{0 \leq x_3 \leq [s_4/5]} \{6x_3 + f_2(s_4 - 5x_3)\} \\ &= \max_{x_3=0,1,2} \{3x_3 + f_2(10 - 5x_3)\} \\ &= \max \{f_2(10), 6 + f_2(5), 12 + f_2(0)\} \\ &= \max \{13, 6 + 5, 12 + 0\} \\ &= 13 \end{aligned}$$

- 最大价值为 13

- $x_3^* = 0$, 倒推可得 $x_1^* = 2, x_2^* = 1$

小结

- 背包问题
- 生产经营问题
- 设备更新问题
- 复合系统工作可靠性问题
- 货郎担问题
- 马氏决策规划

Q&A

Thank you!

感谢您的聆听和反馈