

第 1 章

多極子展開

1.1 電気多極子

1.1.1 スカラーポテンシャル

cgs-Gauss 単位系におけるスカラーポテンシャルのポアソン方程式は

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -4\pi\rho(\mathbf{r}) \quad (1.1)$$

である*1。この解はルジャンドル多項式と球面調和関数の加法定理

$$P_l(\cos \theta) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_l^m(\theta, \varphi) Y_l^{m*}(\theta', \varphi') \quad (1.2)$$

を用いて

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') r'^l P_l(\cos \theta') \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{r^{l+1}} \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') r'^l Z_l^m(\theta, \varphi) Z_l^{m*}(\theta', \varphi') \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{r^{l+1}} Z_l^m(\theta, \varphi) \left[\int d\mathbf{r}' O_l^m(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \right] \\ &=: \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{r^{l+1}} Z_l^m(\theta, \varphi) Q_l^m \end{aligned} \quad (1.3)$$

というように整理できる。Notation が増えて申しわけないが、途中で導入した $O_l^m(\theta, \varphi)$, Q_l^m は

$$O_l^m(\mathbf{r}) := r^l Z_l^{m*}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} r^l Y_l^{m*}(\theta, \varphi) \quad (1.4)$$

$$Q_l^m := \int d\mathbf{r}' O_l^m(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \quad (1.5)$$

というのを導入した。これは電気多極子モーメントになっている。実際展開して計算してみよう。 $l=0, m=0$ は

$$Q_0^0 = \int d\mathbf{r}' Z_0^0(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') = \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \quad (1.6)$$

で全電荷になっている。電気双極子に相当するものとして $l=1$ のものがある。 $l=1, m=1$ では

$$\begin{aligned} Q_1^1 &= \int d\mathbf{r}' r' Z_1^{1*}(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \\ &= \int d\mathbf{r}' \left\{ -\frac{r' \sin \theta'}{\sqrt{2}} e^{-i\varphi'} \right\} \rho(\mathbf{r}') \\ &= \int d\mathbf{r}' \left\{ -\frac{x+iy}{\sqrt{2}} \right\} \rho(\mathbf{r}'), \end{aligned} \quad (1.7)$$

*1 よく見る SI 単位系から cgs-Gauss に直すには、ざっくり言うとな電荷密度や電流密度に 4π をつけて、時間微分が入ってそうなところには $1/c$ を付けばよい。

$l = 1, m = 0$ では

$$\begin{aligned}
Q_1^0 &= \int d\mathbf{r}' r' Z_1^0(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' r' \cos \theta' \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' z \rho(\mathbf{r}'),
\end{aligned} \tag{1.8}$$

$l = 1, m = -1$ では

$$\begin{aligned}
Q_1^{-1} &= \int d\mathbf{r}' r' Z_1^{-1*}(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' \frac{r' \sin \theta'}{\sqrt{2}} e^{-i\varphi'} \rho(\mathbf{r}') \\
&= \int d\mathbf{r}' \frac{x + iy}{\sqrt{2}} \rho(\mathbf{r}'),
\end{aligned} \tag{1.9}$$

というようになっている。これは $m = 0$ では電気双極子モーメントの z 成分、 $m = 1$ では電気双極子モーメントの $-(x + iy)/\sqrt{2}$ 成分、 $m = -1$ では電気双極子モーメントの $(x - iy)/\sqrt{2}$ 成分、を表している。ここで変な方向の成分が出てきた。これは Spherical basis と呼ばれる基底である。光の偏光の表し方に似ている。直線偏光で表すと x, y 方向の重ね合わせで任意の偏光は書けるが、円偏光 $x + iy, x - iy$ の重ね合わせでも任意の偏光を表せるというイメージの基底である。

また、上の計算を見てわかるように $O_l^{m*}(\mathbf{r})$ というのが多極子の形を決めるのがわかる。 $l = 2$ の電気四重極子の形を見るため、 O_l^m を整理していこう。 $l = 2, m = 2$ のとき、

$$\begin{aligned}
O_2^2(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{2*}(\theta, \varphi) \\
&= r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi)^2 \\
&= r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi - 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{8}} (x^2 - y^2 - 2ixy) = \sqrt{\frac{3}{8}} (x - iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.10}$$

$l = 2, m = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_2^1(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{1*}(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{2}} r^2 \sin \theta \cos \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}} (-xz + iyz) = -\sqrt{\frac{3}{2}} z(x - iy),
\end{aligned} \tag{1.11}$$

$l = 2, m = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
O_2^0 &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{0*}(\theta, \varphi) \\
&= \frac{r^2}{2} (3 \cos^2 \theta - 1) = \frac{3z^2 - r^2}{2},
\end{aligned} \tag{1.12}$$

$l = 2, m = -1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_2^{-1}(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{-1*}(\theta, \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}} r^2 \sin \theta \cos \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}} (xz + iyz) = \sqrt{\frac{3}{2}} z(x + iy),
\end{aligned} \tag{1.13}$$

$l = 2, m = -2$ のとき、

$$\begin{aligned}
O_2^{-2}(\mathbf{r}) &= r^2 \sqrt{\frac{4\pi}{5}} Y_2^{2*}(\theta, \varphi) = r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 \\
&= r^2 \sqrt{\frac{3}{8}} \sin^2 \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \sqrt{\frac{3}{8}} (x^2 - y^2 + 2ixy) = \sqrt{\frac{3}{8}} (x + iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.14}$$

というようになっていく。 $l = 3$ の電気八極子も展開して求めていく。 $l = 3, m = 3$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^3(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{3*}(\theta, \varphi) = -\frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi)^3 \\
&= -\frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi + i(\sin^3 \varphi - 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi)) \\
&= -\frac{\sqrt{5}}{4} \left\{ x^3 - 3xy^2 + i(y^3 - 3x^2y) \right\} = -\frac{\sqrt{5}}{4} (x - iy)^3,
\end{aligned} \tag{1.15}$$

$l = 3, m = 2$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^2(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{2*}(\theta, \varphi) = \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos \varphi - i \sin \varphi)^2 \\
&= \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi - 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \frac{\sqrt{30}}{8} \left\{ zx^2 - zy^2 - 2ixyz \right\} = \frac{\sqrt{30}}{8} z(x - iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.16}$$

$l = 3, m = 1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^1(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{1*}(\theta, \varphi) \\
&= -r^3 \sqrt{\frac{3}{16}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) (\cos \varphi - i \sin \varphi) \\
&= -\sqrt{\frac{3}{16}} (5z^2 - r^2) (x - iy),
\end{aligned} \tag{1.17}$$

$l = 3, m = 0$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^0(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^0(\theta, \varphi) \\
&= \frac{r^3}{2} (5 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta) \\
&= \frac{z(5z^2 - 3r^2)}{2},
\end{aligned} \tag{1.18}$$

$l = 3, m = -1$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^{-1}(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{-1*}(\theta, \varphi) \\
&= r^3 \sqrt{\frac{3}{16}} \sin \theta (5 \cos^2 \theta - 1) (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\
&= -\sqrt{\frac{3}{16}} (5z^2 - r^2) (x + iy),
\end{aligned} \tag{1.19}$$

$l = 3, m = -2$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^{-2}(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{-2*}(\theta, \varphi) = \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 \\
&= \frac{\sqrt{30}r^3}{8} \sin^2 \theta \cos \theta (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\
&= \frac{\sqrt{30}}{8} \left\{ zx^2 - zy^2 + 2ixyz \right\} = \frac{\sqrt{30}}{8} z(x + iy)^2,
\end{aligned} \tag{1.20}$$

$l = 3, m = -3$ のとき

$$\begin{aligned}
O_3^{-3}(\mathbf{r}) &= r^3 \sqrt{\frac{4\pi}{7}} Y_3^{3*}(\theta, \varphi) = \frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos \varphi + i \sin \varphi)^3 \\
&= \frac{\sqrt{5}r^3}{4} \sin^3 \theta (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi + i(-\sin^3 \varphi - 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi)) \\
&= \frac{\sqrt{5}}{4} \left\{ x^3 - 3xy^2 + i(-y^3 - 3x^2y) \right\} = \frac{\sqrt{5}}{4} (x + iy)^3,
\end{aligned} \tag{1.21}$$

というようになる。これで多極子展開したときのスカラーポテンシャル

$$\phi(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Q_l^m \frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \tag{1.22}$$

の中身がわかった。

1.1.2 電場

スカラーポテンシャルがわかったら、電場を調べたくなるものである。なので電場を調べよう。電場はスカラーポテンシャルの勾配であるので、多極子展開したスカラーポテンシャルをいれて計算していくと

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= -\nabla\phi(\mathbf{r}) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Q_l^m \nabla \left(\frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \\ &= -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l Q_l^m \left(-\frac{(l+1)Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+2}} \mathbf{e}_r + \frac{\nabla Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \end{aligned} \quad (1.23)$$

ここで球面調和関数の微分を行う前に角運動量演算子を思い出そう。3次元極座標における角運動量演算子は

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} = -i \left(\mathbf{e}_\varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \mathbf{e}_\theta \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (1.24)$$

であった。これを次のようにする。

$$-\frac{i}{r^2} \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{L}} = \frac{1}{r} \left(\mathbf{e}_\theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \quad (1.25)$$

これはまさに3次元極座標における勾配の θ, φ 成分である。よって電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{Q_l^m}{r^{l+2}} \left(-\frac{(l+1)\mathbf{r}Z_l^m(\theta, \varphi) + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m(\theta, \varphi))}{r} \right) \quad (1.26)$$

となる。後ろの括弧で囲まれた項がベクトル球面調和関数の1つとして知られ、都合によりこれを $\sqrt{l+1}$ で割ったもの、

$$\mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) := -\frac{(l+1)\mathbf{r}Z_l^m(\theta, \varphi) + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Z_l^m(\theta, \varphi))}{r\sqrt{l+1}} \quad (1.27)$$

$$\mathbf{Y}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) := -\frac{(l+1)\mathbf{r}Y_l^m(\theta, \varphi) + i\mathbf{r} \times (\hat{\mathbf{L}}Y_l^m(\theta, \varphi))}{r\sqrt{(l+1)(2l+1)}} \quad (1.28)$$

$$(1.29)$$

で定義される。^{*2}これを使うと電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sqrt{l+1} \frac{Q_l^m}{r^{l+2}} \mathbf{Z}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) = -\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sqrt{4\pi(l+1)} \frac{Q_l^m}{r^{l+2}} \mathbf{Y}_{lm}^{(l+1)}(\theta, \varphi) \quad (1.30)$$

$$(1.31)$$

と書ける。

1.1.3 電気多極子のパリティ

電気多極子の定義は

$$Q_l^m = \int d\mathbf{r} r^l Z_l^m(\theta, \varphi) \rho(\mathbf{r}) \quad (1.32)$$

であった。空間反転では $\theta \rightarrow \pi - \theta$, $\varphi \rightarrow \varphi \pm 2\pi$ としてやればよいので、空間反転に関するパリティは球面調和関数による $(-1)^l$ である。時間反転に関しては、電荷は時間反転に関して偶パリティであるため全体としても偶パリティである。

^{*2} 楠瀬先生は $Z_{lm}^{(l)}$ は使っておらず、勝手に定義したものなのであまり一般的ではないかもしれない。

1.2 磁気多極子

1.2.1 ベクトルポテンシャル

磁場に関するガウスの法則

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.33)$$

より

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) \quad (1.34)$$

となるベクトル関数 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ がある。これをベクトルポテンシャルという。これを cgs-Gauss 単位系のアンペールの式に入れると

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})) &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \\ \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r})) - \nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \\ \nabla^2 \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.35)$$

最後はクーロングージ条件

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}) = 0 \quad (1.36)$$

を用いた。この微分方程式の形自体はスカラーポテンシャルのときと同じなので、以下のように解は同じ形になる。

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \frac{Y_l^m(\mathbf{r})}{r^{l+1}} \times \frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}') O_l^m(\mathbf{r}') \end{aligned} \quad (1.37)$$

ここで残った積分が問題である。電流は3成分あるベクトルと回転に対する変換性を表す $O_l^m(r)$ そのまま組み合わせるのは筋が悪く、ベクトルだけを表す部分と系を特徴づける定数に分けてやりたい。

案 1

なので多重極展開をする前にいろいろと細工をする。まず電流は保存している、つまり $\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r})$ であることを利用した恒等式

$$j_i(\mathbf{r}) = \partial_k(r_{ij}j_k(\mathbf{r})) \quad (1.38)$$

よりベクトルポテンシャルは

$$\begin{aligned} A_i(\mathbf{r}) &= \frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' \frac{\partial'_k(r'_{ij}j_k(\mathbf{r}'))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= -\frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' [r'_{ij}j_k(\mathbf{r}')] \partial'_k \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \\ &= \frac{1}{c} \int d\mathbf{r}' [r'_{ij}j_k(\mathbf{r}')] \partial_k \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \\ &= \frac{1}{c} \partial_k \int d\mathbf{r}' \frac{r'_{ij}j_k(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \end{aligned} \quad (1.39)$$

となる。ここで $r'_{ij}j_k(\mathbf{r}')$ を以下のように対称成分と反対称成分に分ける。

$$\begin{aligned} r'_{ij}j_k(\mathbf{r}') &= \frac{r'_{ij}j_k(\mathbf{r}') + r'_{kj}j_i(\mathbf{r}')}{2} + \frac{r'_{ij}j_k(\mathbf{r}') - r'_{kj}j_i(\mathbf{r}')}{2} \\ &= \frac{r'_{ij}j_k(\mathbf{r}') + r'_{kj}j_i(\mathbf{r}')}{2} + \frac{\epsilon_{ikm}\epsilon_{mpq}r'_p j_q(\mathbf{r}')}{2} \end{aligned} \quad (1.40)$$

これは今の段階だと読み取るのは難しいが、電流の渦成分と放射成分に分けたのに対応する。

反対称成分によるベクトルポテンシャル $\mathbf{A}_M$ を考える。

$$\begin{aligned} A_{i,M}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2c} \partial_k \int d\mathbf{r}' \frac{\epsilon_{ikm}\epsilon_{mpq}r'_p j_q(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \frac{1}{2c} \epsilon_{ikm} \partial_k \int d\mathbf{r}' \frac{\epsilon_{mpq}r'_p j_q(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \end{aligned} \quad (1.41)$$

これを成分表示からベクトル表示に直すと

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_M(\mathbf{r}) &= \frac{1}{2c} \nabla \times \int d\mathbf{r}' \frac{\mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \nabla \times \left[\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \left(\frac{Y_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \right) \frac{1}{2c} \int d\mathbf{r}' [\mathbf{r}' \times \mathbf{j}(\mathbf{r}')] O_l^m(\mathbf{r}') \right] \end{aligned} \quad (1.42)$$

目標:

変形していく。

ここで、以前やった

に注意すると ∇O_l^m は

と書けるので、第一項の中身は

7

1.3 電荷磁荷対応

これまでに3種類の多極子が現れたが、時間空間反転対称性の偶奇性から物性を整理することを考えると、これだけでは分類しきれないのがわかる。では4種類目はどこから現れるかというと、電荷 ρ と電流 $\mathbf{j}$ を磁荷 ρ_m と磁化電流密度 $\mathbf{j}_m$ に置き換えたものを考えることで得る方法がある。

1.3.1 電気多極子 $\leftrightarrow$ 磁気多極子

まず初めに電気多極子の電荷密度を置き換えたものを見る。電荷と分極密度 $\mathbf{P}$ の間には

$$\rho(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (1.48)$$

という関係があるので、これとのアナロジーで磁荷と磁化密度 $\mathbf{M}$ の間には

$$\rho_m(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) \quad (1.49)$$

という関係が成り立っているとする。このとき、電気多極子の電荷を磁荷に置き換えたものを $\tilde{Q}_l^m$ とすると

$$\tilde{Q}_l^m = \int d\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r}) \rho_m(\mathbf{r}) = - \int d\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r}) \nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.50)$$

ここである恒等式を示す。まず

$$\begin{aligned} c \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}))) &= \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) = \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} x_i O_l^m(\mathbf{r}) \partial_j j_k(\mathbf{r}) \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \left[\partial_j \{ x_i O_l^m(\mathbf{r}) j_k(\mathbf{r}) \} - \varepsilon_{ijk} \partial_j \{ x_i O_l^m(\mathbf{r}) \} j_k(\mathbf{r}) \right] \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ikj} x_i j_k(\mathbf{r}) (\partial_j O_l^m(\mathbf{r})) = \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.51)$$

というように変形できる。また

$$\begin{aligned} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}))) &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} x_i O_l^m \partial_j \partial_p M_q \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} \{ \partial_j (x_i O_l^m \partial_p M_q) - \partial_j (x_i O_l^m) \partial_p M_q \} \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} \{ -\partial_p (\partial_j (x_i O_l^m) \partial_p M_q) + \partial_p \partial_j (x_i O_l^m) M_q \} \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kpq} \partial_j (\delta_{ip} O_l^m + x_i \partial_p O_l^m) M_q \\ &= \int d\mathbf{r} \varepsilon_{pjk} \varepsilon_{kpq} (\partial_j O_l^m) M_q + \int d\mathbf{r} (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) \partial_j (x_i \partial_p O_l^m) M_q \\ &= 2 \int d\mathbf{r} \mathbf{M} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{r} \mathbf{M} \cdot \{ \nabla \cdot (\mathbf{r} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r})) \} - \int d\mathbf{r} \partial_p (x_q \partial_p O_l^m) M_q \end{aligned}$$

というように変形できる。第二項の積分の中身は

$$\nabla \cdot (\mathbf{r} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r})) = \nabla \cdot \left(\mathbf{r} \frac{\partial}{\partial r} r^l Z_l^m(\theta, \varphi) \right) = \nabla \cdot (\mathbf{e}_r l r^l Z_l^m(\theta, \varphi)) = l \nabla O_l^m(\theta, \varphi) \quad (1.52)$$

第三項の積分の中身は

$$\partial_p (x_q \partial_p O_l^m) M_q = (\partial_p x_q) \partial_p O_l^m M_q + x_q M_q \partial_p \partial_p O_l^m = \mathbf{M} \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) + \mathbf{r} \cdot \nabla^2 O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.53)$$

となる。 $O_l^m(\mathbf{r})$ はラプラス方程式の解であるのでこれの第二項は0となる。以上より

$$\int d\mathbf{r} (\mathbf{r} O_l^m(\mathbf{r})) \cdot (\nabla \times (\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}))) = (l+1) \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.54)$$

と言える。示したかった恒等式

$$c(l+1) \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.55)$$

が導けた。これをもともと考えてた式に入れると

$$\begin{aligned} \tilde{Q}_l^m &= \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = M_l^m \end{aligned} \quad (1.56)$$

というように磁気多極子を得られた。

では電流を磁流に置き換える。電流は $\mathbf{j} = c\nabla \times \mathbf{M}$ であるので、磁流を $\mathbf{j}_m = c\nabla \times \mathbf{P}$ であると考え、 M_l^m の電流を磁流に置き換えたものを $\tilde{M}_l^m$ とすると先ほどの変形を使って

$$\begin{aligned} \tilde{M}_l^m &= \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m \\ &= \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times (\nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r}))) \cdot \nabla O_l^m \\ &= \int d\mathbf{r} \mathbf{P}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (1.57)$$

というように電気多極子 Q_l^m が得られる。最後は部分積分をして、 $\rho = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ を使った。

1.3.2 電気トロイダル多極子

では、相方がまだ出ていない磁気トロイダル多極子に対しても電荷・磁荷変換を行う。そうしたものを $\tilde{T}_l^m$ として、 $\mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{G}$ という量も導入すると、

$$\begin{aligned} \tilde{T}_l^m &= \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r}))) O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \partial_j (r_i P_k O_l^m(\mathbf{r})) - \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} \partial_j (r_i P_k) O_l^m(\mathbf{r}) - \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} \varepsilon_{ijk} r_i P_k \partial_j O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{P}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times (\nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{r}))) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \\ &= \int d\mathbf{r} \mathbf{G}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \equiv G_l^m \end{aligned} \quad (1.58)$$

というようになにか得られた。 G_l^m を電気トロイダル多極子、 $\mathbf{G}$ を電気トロイダル分極と呼ぶ。

電荷・磁荷変換を施したマクスウェル方程式は

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (1.59)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 4\pi\rho_m \quad (1.60)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_m \quad (1.61)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = 0 \quad (1.62)$$

というようになる。この式を見ると $\phi(\mathbf{r})$, $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ を電荷・磁荷変換を施したポテンシャル $\tilde{\phi}(\mathbf{r})$, $\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r})$ は

$$\mathbf{B} = -\nabla \tilde{\phi}(\mathbf{r}) \quad \mathbf{E} = \nabla \times \tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) \quad (1.63)$$

となる。これを解くと

$$\tilde{\phi}(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l M_l^m \frac{Z_l^m(\theta, \varphi)}{r^{l+1}} \quad (1.64)$$

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left[\sqrt{\frac{4\pi(l+1)}{(2l+1)l}} Q_l^m \frac{\mathbf{Y}_{lm}^{(l)}}{ir^{l+1}} - \sqrt{4\pi(l+1)} G_l^m \frac{\mathbf{Y}_{lm}^{(l+1)}}{r^{l+2}} \right] \quad (1.65)$$

となることが予想される。

1.4 まとめ

いろいろな量が出てきた。それらの関係をまとめておこう。電荷・磁荷・電流・磁流、分極・磁化・磁気トロイダル分極・電気トロイダル分極の関係は次のようになっている。

$$\rho(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}), \quad \rho_m(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{M}(\mathbf{r}) \quad (1.66)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}) = c\nabla \times \mathbf{M}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{j}_m(\mathbf{r}) = c\nabla \times \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (1.67)$$

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{T}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{P}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{r}) \quad (1.68)$$

$$\mathbf{T} = \frac{1}{l+1} \mathbf{r} \times \mathbf{M}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{G}(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \mathbf{r} \times \mathbf{P}(\mathbf{r}) \quad (1.69)$$

こうして得られた多極子をまとめると、

$$Q_l^m = \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \mathbf{P}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.70)$$

$$M_l^m = \int d\mathbf{r} \rho_m(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \mathbf{M}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.71)$$

$$T_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{T}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{M}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.72)$$

$$G_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{G}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{l+1} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{P}(\mathbf{r})) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \frac{1}{c(l+1)} \int d\mathbf{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j}_m(\mathbf{r})) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.73)$$

また、空間反転に関するパリティは

$$\mathcal{P}\rho = +\rho, \quad \mathcal{P}\rho_m = -\rho_m, \quad \mathcal{P}\mathbf{j} = -\mathbf{j}, \quad \mathcal{P}\mathbf{j}_m = +\mathbf{j}_m \quad (1.74)$$

$$\mathcal{P}Q_l^m = (-1)^l Q_l^m, \quad \mathcal{P}M_l^m = (-1)^{l+1} M_l^m, \quad \mathcal{P}T_l^m = (-1)^l T_l^m, \quad \mathcal{P}G_l^m = (-1)^{l+1} G_l^m \quad (1.75)$$

時間反転に関するパリティは

$$\mathcal{T}\rho = +\rho, \quad \mathcal{T}\rho_m = -\rho_m, \quad \mathcal{T}\mathbf{j} = -\mathbf{j}, \quad \mathcal{T}\mathbf{j}_m = +\mathbf{j}_m \quad (1.76)$$

$$\mathcal{T}Q_l^m = +Q_l^m, \quad \mathcal{T}M_l^m = -M_l^m, \quad \mathcal{T}T_l^m = -T_l^m, \quad \mathcal{T}G_l^m = +G_l^m \quad (1.77)$$

となる。

1.5 分極密度による表示 (おまけ)

あまりモチベーションはわからないが、トロイダル分極を密度表示するというのも考えられる。

$$\rho_t(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{T}(\mathbf{r}) \quad \rho_g(\mathbf{r}) = -\nabla \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}) \quad (1.78)$$

これを用いて磁気トロイダル多極子と電気トロイダル多極子を表示すると

$$T_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{T}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \rho_t(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.79)$$

$$G_l^m = \int d\mathbf{r} \mathbf{G}(\mathbf{r}) \cdot \nabla O_l^m(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} \rho_g(\mathbf{r}) O_l^m(\mathbf{r}) \quad (1.80)$$

となる。これらトロイダル分極密度のパリティは

$$\mathcal{P}\rho_t = +\rho_t, \quad \mathcal{P}\rho_g = -\rho_g \quad (1.81)$$

$$\mathcal{T}\rho_t = -\rho_t, \quad \mathcal{T}\rho_g = +\rho_g \quad (1.82)$$

となる。また、密度があるなら流れもあるだろうということで流れを考えると

$$\mathbf{j}_t = c\nabla \times \mathbf{G}(\mathbf{r}) = c\mathbf{P} \quad \mathbf{j}_g = c\nabla \times \mathbf{T}(\mathbf{r}) = c\mathbf{M} \quad (1.83)$$

というようになる。

1.6 コメント

もともとポアソン方程式だけ見ると引数や演算子に時間が入ってこないため、時間反転のことを考えれない。どこから時間反転の話が入ってくるかというと、ソースである電流から来ているように見える。またある意味、単磁荷を導入したのも時間反転を導入するためである。なんというか、ここら辺は物理的直観で導出したなんとも不思議な性質である。

相対論的電磁気学という面から多極子を見るというのもありなのだろうか？ 一種の極限でこのような性質が見れるというものもあるし、モノポールを入れた電磁気の一種として見るのも面白いのかもしれない。また、角運動量演算子のような位置と微分が絡まった演算子のバリエーションがさらに増えたものも考えられる。