

Chapter 5

数理统计的基本知识

第五章作业（2019.05.27交）：习题五5.1, 5.9, 5.10(1), 5.11, 5.14, 5.18

5.1 已知样本观测值为

15.8	24.2	14.5	17.4	13.2	20.8
17.9	19.1	21.0	18.5	16.4	22.6

计算样本均值、样本方差与样本二阶中心矩的观测值。

解： 样本均值 \bar{X} 的观测值

$$\bar{x} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} x_i = 18.45,$$

样本方差 S^2 的观测值

$$s^2 = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 \approx 10.7755,$$

样本二阶中心矩 U_2 的观测值

$$\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 = 9.8775.$$

□

5.9 设总体 $X \sim N(40, 5^2)$,

- (1) 抽取容量为36的样本, 求样本均值 \bar{X} 在38与43之间的概率;
- (2) 抽取容量为64的样本, 求 $|\bar{X} - 40| < 1$ 的概率;
- (3) 抽取样本容量 n 多大时, 才能使概率 $P\{|\bar{X} - 40| < 1\}$ 达到0.95?

解: 已知总体 $X \sim N(40, 5^2)$, 则统计量

$$u = \frac{\bar{X} - 40}{5/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

- (1) 因 $n = 36$, 所以有

$$u = \frac{\bar{X} - 40}{5/6} \sim N(0, 1).$$

由此得所求概率

$$\begin{aligned} P\{38 < \bar{X} < 43\} &= P\left\{-2.4 < \frac{\bar{X} - 40}{5/6} < 3.6\right\} = \Phi(3.6) - \Phi(-2.4) \\ &= 0.99984 - (1 - 0.9918) = 0.99164. \end{aligned}$$

- (2) 因 $n = 64$, 所以有

$$u = \frac{\bar{X} - 40}{5/8} \sim N(0, 1).$$

由此得所求概率

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - 40| < 1\} &= P\left\{-1.6 < \frac{\bar{X} - 40}{5/8} < 1.6\right\} \\ &= 2\Phi(1.6) - 1 = 2 \times 0.9452 = 0.8904. \end{aligned}$$

- (3)

$$P\{|\bar{X} - 40| < 1\} = P\left\{-\frac{\sqrt{n}}{5} < \frac{\bar{X} - 40}{5/\sqrt{n}} < \frac{\sqrt{n}}{5}\right\} = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5}\right) - 1.$$

依题意有,

$$2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5}\right) - 1 = 0.95, \quad \text{即} \quad \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5}\right) = 0.975.$$

查表得 $\Phi(1.96) = 0.975$, 从而有

$$\frac{\sqrt{n}}{5} = 1.96,$$

解得 $n \approx 96$.

□

5.10 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体中抽取容量为16的样本,

(1) 已知 $\sigma = 2$, 求概率 $P\{|\bar{X} - \mu| < 0.5\}$;

解:

(1) 已知总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 样本容量 $n = 16$, 得

$$\frac{\bar{X} - \mu}{2/4} \sim N(0, 1).$$

有

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - \mu| < 0.5\} &= P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{2/4}\right| < 1\right\} \\ &= 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826. \end{aligned}$$

□

5.11 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 收取容量为20的样本 X_1, X_2, \dots, X_{20} ,

(1) 已知 μ , 求概率 $P\left\{43.6 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 150.4\right\}$;

(2) 未知 μ , 求概率 $P\left\{46.8 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 154.4\right\}$ 。

解:

(1) 已知总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 其中 μ 已知, 样本容量 $n = 20$, 则统计量

$$\chi^2 = \frac{1}{2^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(20),$$

所以有

$$\begin{aligned} P \left\{ 43.6 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 150.4 \right\} &= P \left\{ 10.9 \leq \frac{1}{2^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 37.6 \right\} \\ &= P\{10.9 \leq \chi^2 \leq 37.6\} \\ &= P\{\chi^2 \geq 10.9\} - P\{\chi^2 > 37.6\}. \end{aligned}$$

查表知

$$\chi_{0.95}^2(20) = 10.9, \quad \chi_{0.01}^2(20) = 37.6.$$

所以,

$$P \left\{ 43.6 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2 \leq 150.4 \right\} = 0.95 - 0.01 = 0.94.$$

(2) 已知总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 其中 μ 未知, 样本容量 $n = 20$, 则统计量

$$\chi^2 = \frac{(20-1)S^2}{2^2} = \frac{1}{2^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(19),$$

所以有

$$\begin{aligned} P \left\{ 46.8 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 154.4 \right\} &= P \left(11.7 \leq \frac{1}{2^2} \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 38.6 \right) \\ &= P\{11.7 \leq \chi^2 \leq 38.6\} \\ &= P\{\chi^2 \geq 11.7\} - P\{\chi^2 > 38.6\}. \end{aligned}$$

查表知

$$\chi_{0.90}^2(19) = 11.7, \quad \chi_{0.005}^2(19) = 38.6$$

所以,

$$P \left\{ 46.8 \leq \sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2 \leq 154.4 \right\} = 0.90 - 0.005 = 0.895.$$

□

5.14 设总体 $X \sim (\mu, \sigma^2)$, 抽取样本 X_1, X_2, \dots, X_n , 样本均值为 \bar{X} , 样本方差为 S^2 .

如果再抽取一个样本 X_{n+1} , 证明: 统计量

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sim t(n-1).$$

解: 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.

若再抽取一个样本 X_{n+1} , 则 $X_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$.

由于所有样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是相互独立的,

所以 \bar{X} 与 X_{n+1} 也相互独立的, 则

$$X_{n+1} - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2).$$

由此得到标准化的统计量

$$U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n} \sigma^2}} \sim N(0, 1).$$

又由于统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

因为 \bar{X} 与 S^2 是独立的, 所以统计量 U 与 χ^2 也是相互独立的. 则按照 t 分布的定义可知, 统计量

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{\chi^2}{(n-1)}}} = \sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sim t(n-1).$$

□

5.18 设总体的分布函数为 $F(x)$, 概率密度为 $f(x)$, 抽取样本 X_1, X_2, \dots, X_n , 求:

- (1) 样本最大值 $\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度；
(2) 样本最小值 $\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度。

解：

- (1) 因为样本与总体服从相同的分布，所以 X_i 的分布函数及概率密度分别是

$$F_i(x) = F(x), \quad f_i(x) = f(x), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

又因为样本 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$)相互独立，则样本最大值的分布函数

$$F_{\max}(x) = [F(x)]^n,$$

对 x 求导得概率密度

$$f_{\max}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x).$$

- (2) 样本最小值 $\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数

$$F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^n,$$

对 x 求导得概率密度

$$f_{\min}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1}f(x).$$

□

作业情况：

- 1 本次作业大家完成得挺好，但仍有11位同学未交作业，希望同学们下次补上；
2 5.9(2)(3)计算错误的较多；有部分同学5.11、5.18没有写出解题过程，须注意。