

一、填空题

1. 若矩阵A为正交矩阵, 且 $|A| > 0$ , 则 $|A| = \underline{1}$ ;
2. 已知四阶实对称矩阵A的特征值分别为1, 2, 2, 4, 则矩阵 $A - 2E$ 的秩等于 $\underline{2}$ ;
3. 若 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (2, 3, 4)^T$ ,  $\alpha_3 = (3, 4, \lambda)^T$ 为 $\mathbb{R}^3$ 空间中的一组基, 则 $\lambda$ 的取值应满足 $\underline{\lambda \neq 7}$ ;
4. 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (0, 2, 5)^T$ ,  $\alpha_3 = (2, 4, 7)^T$ 是线性相~~相~~关的;
5. 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$
有唯一解, 则 $\lambda$ 满足 $\underline{\lambda \neq 1 \text{ 且 } \lambda \neq -2}$

二、选择题

1. 向量 $\beta = (5, 0, 7)^T$ 在基 $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (2, 1, 3)^T$ ,  $\alpha_3 = (3, 1, 2)^T$ 下的坐标为 ( C ):
  - (A)  $(0, 1, 1)^T$
  - (B)  $(2, -1, 1)^T$
  - (C)  $(2, 3, -1)^T$
  - (D)  $(5, -2, 2)^T$
2. 已知矩阵 $A_{5 \times 4}$ 的秩为4, 则下列说法不正确的是 ( D ):
  - (A) 方程组 $AX = 0$ 仅有零解
  - (B) 矩阵A的行向量组一定线性相关
  - (C) 矩阵A的列向量组一定线性无关
  - (D) 矩阵A的行向量组中任意4个向量一定线性无关
3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & \lambda \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(-1, 2, 2)$ , 则 $\lambda =$  ( A ):
  - (A) 1
  - (B) 2
  - (C) -2
  - (D) -1
4. 已知A, B均为n阶方阵, 则下列说法正确的是 ( D ):
  - (A) 若 $R(A) = R(B)$ , 则A与B相似
  - (B) 若A与B具有相同的特征值, 则A与B相似
  - (C) 若A, B为正定矩阵, 则AB也为正定矩阵
  - (D) 若 $|A| = |B| \neq 0$ , 则A与B等价
5. n阶方阵A具有n个互不相同的特征值是A与对角矩阵相似的 ( B ):
  - (A) 充要条件
  - (B) 充分而非必要条件
  - (C) 必要而非充分条件
  - (D) 既非充分也非必要条件

三、计算题

1、讨论向量  $\beta = (1, 0, 3, 1)^T$  能否经向量组  $\alpha_1 = (1, 1, 2, 2)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 2, 1, 3)^T$ ,  $\alpha_3 = (1, -1, 4, 0)^T$  线性表示。

解: 即判断线性方程  $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$  是否有解。

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore R(A) = R(B) = 2$ ,  $\beta$  能经  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示

2、已知向量空间  $\mathbb{R}^3$  中的两组基分别为 (I)  $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$ ,  $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ , 和 (II)  $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$ ,  $\beta_2 = (2, 3, 3)^T$ ,  $\beta_3 = (3, 7, 1)^T$ , 试求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

解:  $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \cdot P$

$$\therefore P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} \cdot (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 6 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

3、试求线性方程组  $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$  的解空间的一组基和维数:

$$\text{解: } \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} t_1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} t_2$$

$\therefore$  解空间的基为

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 2, 1)^T$$

维数为 2

4、已知三维向量  $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$  正交, 试求一非零向量  $\alpha_3$ , 使得  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  两两正交;

解: 设  $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ , 则由题意知:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得: } X = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} t$$

$$\text{取 } \alpha_3 = (-1, 0, 1)^T$$

1、设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ , 求矩阵A的

列向量组的秩和它的一个最大线性无关组。

解:  $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$

$\therefore r(A) = 4$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$  为最大线性无关组。

2、判断二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3$  的正定性。

解  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

$\Delta_1 = 1 > 0$

$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 > 0$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0$

$\therefore$  二次型正定

3、已知3阶矩阵A的特征值为  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$ , 对应的特征向量依次为  $\xi_1 = (0 \ 1 \ 1)^T, \xi_2 = (1 \ 1 \ 1)^T, \xi_3 = (1 \ 1 \ 0)^T$ , 试求矩阵A;

解:  $\therefore$  存在3个互不相同特征值  $\therefore A$  可对角化

即  $P^{-1}AP = \Lambda$ , 其中  $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3), \Lambda = \text{diag}(2, -2, 1)$ .

$\therefore A = P\Lambda P^{-1}$

代入求解可得

$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

4、设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 问  $\lambda$  为何值时, 矩阵A能对角化。

解:  $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & \lambda \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda-1)(\lambda+1) = 0$   
 $\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$

当  $\lambda = 1$  时

$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \lambda \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

当  $r(A-E) = 1$  时, 即  $\lambda = -1$  时, A可对角化

### 五、试求解下列试题

求一个正交变换  $X = QY$ , 把实二次型

$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$  化为标准型, 并写出正交变换.

解:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (5-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$$

当  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$  时.

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$$

$$\text{正交化得 } \beta_1 = (-1, 1, 0)^T, \beta_2 = (1, 1, -2)^T$$

$$\text{单位化得 } \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$$

$$\text{当 } \lambda_3 = 5 \text{ 时 } A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \xi_3 = (1, 1, 1)^T$$

$$\text{单位化 } \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$$

$$\therefore Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$$

$$f(Y) = -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$$

### 六、证明题

设  $\lambda_1, \lambda_2$  是矩阵  $A$  的两个不同的特征值, 其对应的特征向量分别为  $\alpha_1, \alpha_2$ , 试证明向量  $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$  不是矩阵  $A$  的特征向量.

证明: 反证法. 假设  $\beta$  是矩阵  $A$  的特征向量.

不妨设  $\beta$  所对应的特征值为  $\lambda$ , 则有

$$A\beta = \lambda\beta$$

$$\therefore A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2$$

$$\therefore A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$$

$$\therefore \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = \lambda\alpha_1 + \lambda\alpha_2$$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda)\alpha_1 + (\lambda_2 - \lambda)\alpha_2 = 0$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2$  线性相关

$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ , 与题设矛盾