

一、填空题

1. 已知 n 阶方阵 A 有一个特征值为3, 则矩阵 $A^2 - 3A + 9E$ 必有一个特征值为 9;
2. 设五阶方阵 A 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(1, 2, 4, 4, 4)$, 则 $A - 4E$ 的秩等于 2;
3. 设 A 为三阶方阵, 且 $|A| = -2$, 则 $|(2A)^{-1}| = -\frac{1}{16}$;
4. 已知向量空间 \mathbb{R}^3 中的任意一个向量均可经向量组 $\alpha_1 = (1, -1, -1)^T$, $\alpha_2 = (-1, \lambda, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 线性表示, 则 λ 的取值应满足 $\lambda \neq 1$;
5. 若 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, \lambda)^T$, $\alpha_3 = (1, \lambda, 2)^T$ 不能构成向量空间 \mathbb{R}^3 中的一组基, 则 λ 的取值应满足 $\lambda = 1$;
6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $y = -2$

二、选择题

1. 设 A 和 B 均为 n 阶方阵, 则下列说法正确的是 (C)
 (A) 若 A 和 B 均为对称矩阵, 则 AB 也为对称矩阵 (B) 若 $R(A) = R(B)$, 则 A 与 B 相似
 (C) 若 A 和 B 均为正交矩阵, 则 AB 也为正交矩阵 (D) 若 $R(A) = R(B)$, 则 A 与 B 合同
2. 下列关于初等矩阵的表述正确的是 (A)
 (A) 初等矩阵都可以经过初等变换化为单位矩阵;
 (B) 初等矩阵所对应的行列式的值都等于1;
 (C) 初等矩阵相乘仍为初等矩阵;
 (D) 初等矩阵相加仍为初等矩阵
3. 向量 $\beta = (1, 2, 2)^T$ 在基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 下的坐标为 (D)
 (A) $(1, 0, 2)^T$ (B) $(-1, 1, 2)^T$ (C) $(-1, 0, -2)^T$ (D) $(-1, 0, 2)^T$
4. 已知三阶矩阵 A 的特征值为0, +2, -2, 则下列说法不正确的是 (B)
 (A) 矩阵 A 是不可逆矩阵 (B) 特征值+2和-2所对应的特征向量是正交的
 (C) 矩阵 A 的主对角线元素之和为0 (D) $AX = 0$ 的基础解系只有一个向量
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (\lambda - 1)x_1^2 + \lambda x_2^2 + (\lambda + 1)x_3^2$, 当满足 (C) 时, 是正定二次型:
 (A) $\lambda > -1$ (B) $\lambda > 0$ (C) $\lambda > 1$ (D) $\lambda \geq 1$
6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则下列选项中的 (B) 是齐次方程组 $AX = 0$ 只有零解的充要条件.
 (A) A 的列向量组线性相关 (B) A 的列向量组线性无关
 (C) A 的行向量组线性相关 (D) A 的行向量组线性无关

1、已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 且满足 $A^2 - AB = E$, 其中 E 为单

位矩阵, 求矩阵 B ;

解: 因为 $|A| = -1 \neq 0$, 所以 A 可逆

等式两端同时右乘 A^{-1} 得: $A - B = A^{-1}$

$$\text{经计算可得 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore B = A - A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2、已知向量空间 \mathbb{R}^4 中的两组基分别为 (I) $\alpha_1 = (1, 1, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 2, 1, 2)^T$,

$\alpha_3 = (0, 0, 3, 1)^T$, $\alpha_4 = (0, 0, 0, 1)^T$ 和 (II) $\beta_1 = (1, -1, 0, 0)^T$, $\beta_2 = (1, 0, 0, 0)^T$,

$\beta_3 = (0, 0, 2, 1)^T$, $\beta_4 = (0, 0, 3, 2)^T$, 试求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

解: 设由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵为 P

则由定义可知

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \cdot P$$

$$\therefore P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^{-1} \cdot (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

3、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = (1, 1, -2)^T$, 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试求 λ 的值;

$$\text{解: } (A|\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & -\lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda-\lambda^2 & -\lambda-2 \end{pmatrix}$$

由于 $Ax = \beta$ 有无穷解, $\therefore \lambda = -2$

4、设三阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 $1, 1, -2$, 已知对应于特征值 1 的两个线性无关的特征向量分别为 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, 试求对应于特征值 -2 的全部特征向量。

解: 设对应于特征值 -2 的特征向量为 $(x, y, z)^T$

$$\text{则有 } \begin{cases} x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

$$\text{解之得 } \begin{cases} x = -t \\ y = -t \\ z = t \end{cases}$$

$$\text{令 } t = 1 \text{ 得 } \xi = (-1, -1, 1)^T$$

\therefore 对应于特征值 -2 的全部特征向量为 $k\xi$, k 为任意常数。

1. 给定向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)^T$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)^T$, $\alpha_5 = (2, 0, 1, -1)^T$, 求向量组的秩和它的一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示。

解: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha_5 = \frac{1}{2}\alpha_1 \\ + \frac{1}{2}\alpha_2 + \alpha_3 \end{matrix}$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为一极大线性无关组, 秩为 4

2. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 6x_3^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$, 试求 (1) 该二次型的矩阵 A; (2) a 取何值时, 该二次型是正定的。

解: (1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ a & 2 & 6 \end{pmatrix}$

(2) $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = 2 > 0$

$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ a & 2 & 6 \end{vmatrix} = 8 - 2a^2 > 0 \Rightarrow -2 < a < 2$

$\therefore -2 < a < 2$ 时, 二次型正定

3. 已知向量 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5, 3)^T$, $\alpha_3 = (3, -2, 1, 6)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + 2x_3 + x_4 = 11 \\ bx_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 31 \\ c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 = c_5 \end{cases}$$

的 3 个解, 试求此线性方程组的通解;

解: 其对应的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 & 1 \\ b & 1 & 3 & 5 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}$, $\beta = (11, 31, c_5)^T$

通解 $X = \alpha_1 + k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3$

由于 $\alpha_1 - \alpha_2 = (3, 1, -2, 1)^T$, $\alpha_2 - \alpha_3 = (-5, 3, 4, -3)^T$ 线性无关
所以 $AX=0$ 的基础解系中至少含有 2 个向量

$\therefore 4 - R(A) \geq 2 \Rightarrow R(A) \leq 2$

$\therefore A$ 中前 2 行线性无关

$\therefore R(A) \geq 2$

$\therefore R(A) = 2$

4. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & \lambda \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 试确定常数 λ 的取值。

解: $|A - \lambda_0 E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda_0 & 0 & 1 \\ 3 & 1-\lambda_0 & \lambda \\ 4 & 0 & 5-\lambda_0 \end{vmatrix}$

$= (1-\lambda_0)(\lambda_0^2 - 7\lambda_0 + 6) = -(\lambda_0 - 1)^2(\lambda_0 - 6) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 6$

当 $\lambda = 1$ 时, 得 $(A - \lambda E)X = 0$

由于 A 与 Λ 相似, 所以 $3 - R(A - E) = 2$

$\therefore R(A - E) = 1 \Rightarrow \lambda = 3$

三、试求解下列试题

求一个正交变换 $X = QY$, 把实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 化为标准型, 并写出正交线性变换。

解: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(1-\lambda)^2 = 0$$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 7$

当 $\lambda_3 = 7$ 时求 $(A - 7E)X = 0$ 得 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$

单位化得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 求 $(A - E)X = 0$ 得: $\xi_2 = (-1, 1, 0)^T, \xi_3 = (-1, 0, 1)^T$

正交化得 $\beta_2 = (-1, 1, 0)^T, \beta_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T$

单位化得 $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \eta_3 = \frac{2}{\sqrt{6}}(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)^T$

$\therefore Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3), X = QY$

$\therefore f(Y) = y_1^2 + y_2^2 + 7y_3^2$

六、证明题

(1) 若二阶实方阵 A 满足 $|A| < 0$, 试证明 A 可与对角矩阵相似;

(2) 若 n 阶方阵 A 和 B 相似, 试证明 A 和 B 有相同的特征值。

证明 ① $|A| < 0$, 说明 A 有两互不相同的实根

显然得 A 可与对角矩阵相似

② 只须证明 A 与 B 有相同的特征多项式

即 $|A - \lambda E| = |B - \lambda E|$

因 A 与 B 相似, 所以存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = B$$

$$\therefore |B - \lambda E| = |P^{-1} \cdot A \cdot P - \lambda E| = |P^{-1} \cdot A \cdot P - P^{-1} \cdot \lambda E \cdot P|$$

$$= |P^{-1} \cdot (A - \lambda E) \cdot P| = |A - \lambda E|$$

证毕。