常用中草药手册

广州部队后勤部卫生部　编

人民卫生出版社

一九六九年

常用中草药手册

开本：787×1092/64 印张：17 插页：4 字数：280千字

广州部队后勤部卫生部 编


人 民 卫 生 出 版 社 出 版
（北京书刊出版业营业许可证出字第〇四六号）
·北京崇文区哈子胡同 15 号·

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售


统一书号：14048·3246 1969年12月第1版—第1次印刷
定 价：1.31元 印数：1—500,000

A9
664




毛主席为延安中国医大题词

（1941 年 7 月）



毛主席为第一届全国卫生会议题词

（1950年）



最高指示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词（一九五四年九月十五日），一九五四年九月十六日《人民日报》

没有正确的政治观点，就等于没有灵魂。

《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（一九五七年二月二十七日）

为什么人的问题，是一个根

本的问题，原则的问题。……这个根本问题不解决，其他许多问题也就不易解决。

《在延安文艺座谈会上的讲话》（一九四二年五月）

人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。

《论联合政府》（一九四五年四月二十四日）

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

引自《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向——上海市的调查报告》（《红旗》杂志，一九六八年第三期）

我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生

的习惯作斗争。

《文化工作中的统一战线》（一九四四年十月三十日）

我们的文艺，既然基本上是为工农兵，那末所谓普及，也就是向工农兵普及，所谓提高，也就是从工农兵提高。……只有从工农兵出发，我们对于普及和提高才能有正确的了解，也才能找到普及和提高的正确关系。

《在延安文艺座谈会上的讲话》（一九四二年五月）

备战、备荒、为人民。

引自《三论节约闹革命》（一九六七年六月十四日《人民日报》社论）

中国人民有志气，有能力，

一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

引自《人民日报》第一版（一九六九年十月九日）

最高指示

把医疗卫生工作的重点
放到农村去。

全国都要学习解放軍。

出版者的話

春风杨柳万千条，六亿神州尽舜尧。

当前，全国亿万军民高举“九大”团结胜利的旗帜，以跃进的姿态跨入了七十年代。在毛主席的无产阶级医疗卫生路线指引下，医药卫生战线和其他各条战线一样不断地创造出空前的奇迹。特别是中国人民解放军，在这方面为我们广大医务工作者作出了光辉的榜样。

《常用中草药手册》是广州部队的同志们编写的。广州部队医疗卫生战线上的同志们，高举**毛泽东思想伟大红旗，努力活学活用毛主席著作，遵照毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略**

方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示，狠批了刘少奇的反革命修正主义医疗卫生路线，加深了对伟大领袖毛主席无限热爱的无产阶级感情，坚决捍卫、贯彻和落实毛主席的医疗卫生路线。他们走出营房，深入连队，上山下乡，扎根农村，在发掘和使用中草药防治疾病的过程中，发扬了一不怕苦、二不怕死的革命精神和自力更生、艰苦奋斗的光荣传统，扎扎实实地大搞群众运动，自采、自制中草药近千种，积累了丰富的经验。他们在发动群众过程中，把革命精神和科学态度结合起来，因而收到了很好的效果，使祖国的医药学宝库发出了灿烂的光辉。这对加强战备，巩固和发展农村合作医疗制度起到了极大的作用。这是无产阶级文化大革命的丰硕成果！这是毛主席无产阶级医疗卫生路线的伟大胜利！

这本手册共收载了常用中草药400种（其中大部分产于我国南方，有一、二百种我国北方也能采集到），叙述了60多种农村常见病多发病，330多个经过实践证明具有一定疗效的处方。这本手册内容通俗易懂，为赤脚医生和其他医药卫

生人员自采、自制、自用中草药提供了很多宝贵经验。

由于我们活学活用毛主席著作不够，出版工作中存在着不少缺点和错误，希望全国的读者对我社的出版工作进行批评、指导。

人民卫生出版社

一九六九年十二月

編写說明

一、本书编写的指导思想是：贯彻伟大领袖毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针和“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的光辉指示，迅速普及中草药防病治病的知识，使祖国医药学更好地为广大工农兵服务，以利于战备、促进合作医疗制度的巩固和发展，促进中西医结合，更好地贯彻和落实毛主席的无产阶级医疗卫生路线。

二、本书内容力求通俗易懂，为了符合自采、自制、自用的要求，书中介绍了认药、采药、制药、用药的一般知识，以便广大医务卫生人员在实践中能尽快地掌握。

三、书中选载中草药 400 种，并附类似品种40种。其中多数是临床常用、产量大、较为有效的；少数是疗效较好而产量不多的。约百余种见于我国大部地区，其余多见于我国南方。

四、书中载常见病 66 种，防治处方 333 条，

大部分是我们经过临床实践，取得一定效果的，但有的防治例数还不多，观察总结还不够细，仅供参考。

五、书中所列中草药正名，皆为民间通用名。正名旁括弧内的名称为该药的植物名。凡未加植物名的，表示正名即植物名。图注中正名后均附有药物的科、属。

六、凡剧毒药除在“性味功能”项目中注明外，另在正名右上角加“*”符号。

七、书中处方剂量，均按中医传统习惯以一斤为十六两计。除儿科疾病外，其它疾病所列处方均为成人量，儿童用时应酌减：2～3岁用¼量，4～7岁用⅓量，8～12岁用½量。“干品”系指干燥加工后的药物；“鲜品”系指采后洗净的新鲜药物。

八、书末附有《正名、别名索引》，按笔划排列，以便检索。

目　录

中草药的一般知识

一、怎样认药……2
（一）拜工农兵为师，在实践中学习……2
（二）学习一点植物学常识……9
二、怎样采药……25
1．掌握采集季节……25
2．了解生长环境……26
3．搞好加工贮藏……28
4．注意保护药源……29
三、怎样制药……31
1．蜜丸……31
2．水丸……31
3．散剂……32
4．膏药……32
5．药酒……33
6．糖浆……33

7. 片剂……33
四、怎样用药……34
（一）在“辨证施治”的基础上用药……34
1. 四诊八纲……34
2. 六因……38
（二）用药的一般原则……40
1. 具体情况，具体分析……40
2. 了解药物性能……41
3. 掌握配方原则……44
4. 注意观察效果，不断总结经验……46

常用中草药

一、解表类（适应感冒、流感、上呼吸道炎、疟疾等疾病）……48
丁癸草……48
九层塔(罗勒)……50
九头狮子草……54
土常山(华山矾)……56
大头陈（球花毛麝香）……58
山薄荷(薄)……60
山香……62
水蜈蚣……64
水翁……66
玉叶金花……68
过山龙（细脉斑鸠菊）……70
苍耳……72

牡荆……74
防风草……78
茉莉花……80
狗肝菜……82
相思子……84
星宿菜……86
鸭脚木……88
倒扣草……90
凉粉草……92
桑树……94
排錢草……96
黄牛茶(黄牛木)·100
黄皮……102
野芫荽(洋芫荽)·104
野葛……106
紫苏……108
鹅不食草（石胡荽）……112
绿薄荷……114
蜂窝草（锡绣防风）……116
路边菊(鸡儿肠)·118
榕树……120
薄荷……122
二、清热解毒类（适应各种炎症、中毒、菌痢、热性病、疔疮等疾病）……124
八角莲……124
三極苦……126
土牛膝(兰草)…128
大青……130
大沙叶……132
山芝麻……134
千里光……136
水杨梅(水团花)·138
六角英(爵床)…140
六棱菊……142
古山龙……146
古羊藤(马莲鞍)·148
白花草(胜红蓟)·150
地胆头(地胆草)·152

老鼠拉冬瓜（马
　　脆儿）……154
耳草……158
羊蹄草(一点红)·160
岗梅(梅叶冬青)·162
卤地菊……164
刺黄连……166
金花草(乌韭)…168
金果榄……170
金银花(忍冬)…174
贯众……178
鱼腥草(蕺菜)…180
草龙……182
胆木(乌檀)……184
鬼针草（三叶鬼
　　针草）……186
鬼灯笼……188
海芋……190
栀子……192
黄连……194
野菊花……196
蛇泡簕(茅莓)…198
银锁匙（粉叶轮
　　环藤）……200
紫背天葵……202
犁头草（长萼堇
　　菜）……204
榄核莲（圆锥须
　　药草）……206
蒲公英……208
三、清热利湿类(适应各种类型肝炎、胆囊炎、肠胃炎、痢疾、白带等疾病)……210
人苋(铁苋菜)…210
入地龙(酸藤果)·212
土大黄……214
马齿苋……216
马蹄金……218
天香炉(金锦香)·220
木棉……222
风箱树……224

凤尾草……226
火炭母……230
龙葵……232
田基黄(地耳草)·236
白马骨……238
白背叶……242
母草……244
地桃花（肖梵天花）……246
吐烟花……248
冰糖草(野甘草)·250
扭肚藤……252
鸡蛋花……254
鸡骨草（广州想思子）……256
刺苋菜(刺苋)···258
锡叶藤……262
茵陈蒿……264
盆上芫茜（天胡荽）……266
兖州卷柏……268
美人蕉……270
鸭跖草……272
铁线草……276
崩大碗(积雪草)·278
野牡丹……280
猪笼草……282
紫茉莉……284
番石榴……286
溪黄草（线纹香茶菜）……288
辣蓼……290
算盘子……292
翠云草……294
四、祛风寒湿类(适应风湿性关节炎、产后腰腿痛、劳损、坐骨神经痛等疾病)……296
一朵云（光叶海桐）……296
十八症（光轴荸荠）……298

八角枫·····300
三十六根（卵叶
娃儿藤）·····302
三加皮（三叶五
加）·····304
土茯苓（光叶蕻
葜）·····306
大叶双眼龙（巴
豆）·····308
大风艾(艾纳香)·310
大血藤·····312
马鞍藤（二叶红
薯）·····314
小叶买麻藤····316
小叶双眼龙（毛
果巴豆）·····318
山苍树(木姜子)·320
山药·····322
牛白藤·····324
龙须藤·····326
牛枫荷（翻白叶
树）·····328
过江龙(槟藤子)·332
阴香·····334
走马胎（大叶紫
金牛）·····336
杜仲藤·····338
丢了棒(白桐树)·340
枫荷桂(樟树)···342
枫香树·····344
枫香寄生（扁枝
槲寄生）·····346
刺桐·····348
苦荬(假茉莉)···350
金刚藤(蕻葜)···352
金毛狗脊·····354
金线吊乌龟（头
花千金藤）···356
狗脚迹(梵天花)·358
威灵仙（铁脚威
灵仙）·····360
穿破石(黄芝)···362

虎舌红（乳毛紫金牛）……438
侧柏……440
卷柏……442
茜草……444
荠菜……446
鸭脚艾（甜菜子）·448
益母草……450
槲花（槲木）……452
黄独……454
六、润肺化痰类（适应肺结核、肺炎、支气管扩张、支气管炎等疾病）……456
七指蕨……456
五指毛桃（粗叶榕）……458
石蚕（石上藕）…460
石仙桃……462
石斛……464
白鹤灵芝……466
瓜蒌……468
吉祥草……470
麦斛……472
麦门冬（麦冬）…474
岗菊（猪仔笠）…478
余甘子……480
沙参（轮叶沙参）·482
铁包金（细纹勾儿茶）……484
阔叶十大功劳…488
七、止咳定喘类（适应咳嗽、哮喘、百日咳、肺气肿等疾病）……492
土丁桂……492
山白芷（白牛胆）·494
天文草（拟千日菊）……498
千日红……496
无患子……500

木蝴蝶·····502
毛大丁草·····504
石黄皮(肾蕨)···506
东风橘(酒饼簕)·508
白鹤藤·····510
百部(细花百部)·512
灯笼草(酸浆)···516
杜衡·····518
青蒟·····520
蚌花(紫万年青)·522
紫花前胡·····524
曼陀罗（白花曼陀罗)·····526
鼠曲草·····528
蔓胡颓子·····530
八、止痛类(适应各种内外伤疼痛、头痛、胃痛、神经痛等疾病)·····534
七叶莲(鹅掌藤)·534
九里香·····538
大叶风沙藤（异形南五味子)··540
大叶山桂·····542
大金不换（金不换)·····544
水田七(裂果薯)·548
牛皮消·····550
乌药·····552
风沙藤（南五味子)·····554
火索麻·····556
石菖蒲·····558
两面针·····560
鸡骨香·····564
刺果苏木·····566
金不换（华千金藤)·····570
金钮扣(水茄)···572
金鸡爪（隔山香)·····574

单根木（海南狗
牙花）……576
姜三七(土田七)·578
降眞香……580
素馨花……582
救必应(铁冬青)·584
银不换（毛叶轮
环藤）……586
黑老虎(臭饭团)·588
鹰不泊(筋梾)…590
九、鎮靜催眠类(适应神经衰弱、失眠、高
血压等疾病)……592
马尾松……592
长春花……594
白千层……596
含羞草……598
夜香牛……600
钩藤……602
酢浆草……604
豨莶草……608
磨盘草……610
十、补益类(适应贫血、消瘦、营养不良、
阳萎、遗精等疾病)……612
土党参(金錢豹)·612
土人参（锥花土
人参）……614
千斤拔（蔓性千
斤拔）……616
五指山参（箭叶
秋葵）……620
天门冬……622
牛大力（美丽崖
豆藤）……624
巴戟天……626
龙眼……628
仙茅……630
地稔……632

羊乳……634
岗稔(桃金娘)…636
何首乌……638
鸡血藤……640
灵芝……644
青筋藤(翼核果)·646
金樱子……648
益智……650
黄花倒水莲……652
猪屎豆……654
盘龙参(绶草)…656
黑皮根（陵水暗罗）……658
十一、消导驱虫类（适应消化不良、小儿疳积、肠道寄生虫症等疾病）……660
土荆芥……660
大草蔻(艳山姜)·662
大高良姜……664
布渣叶(破布叶)·668
灰叶……670
串珠酒饼（假鹰爪）……672
鸡眼草……674
鸡矢藤……676
苦栋……678
鸦胆子……680
香附(莎草)……682
独脚金……684
姜黄……686
假蒟……690
酸豆(罗晃子)…692
十二、清肝明目类（适应急性结膜炎、角膜炎、视网膜炎、夜盲症等疾病）……694
木贼(纤弱木贼)·694
水黄连（多枝唐松草）……696
谷精草……698

青葙子(青葙)···700
草决明(决明)···702
十三、利水通淋类(适应各种水肿、肾炎、尿路感染、尿路结石等疾病)·····710
三白草·····710
无根藤·····712
木防己·····714
木通·····716
车前草(大车前)·720
玉龙鞭(假败酱)·722
玉蜀黍·····724
石韦·····726
石蠡蓼(粉防己)·728
叶下珠·····730
茎·····732
苧麻·····734
金絲草·····736
铺地蜈蚣·····704
蔓荆·····706
金錢草·····738
金锁匙(毛木防己)·····740
海金沙藤(海金沙)·····742
猫须草(肾茶)···744
淡竹叶·····746
葫芦茶·····748
粪箕笃·····750
路兜簕·····752
蕺菜·····754
樟柳头(闭鞘姜)·756
十四、散瘀化结类(适应淋巴结核、肝脾肿大、肿瘤等疾病)·····758
了哥王·····758
大叶蛇泡簕(粗叶悬钩子)···760
白花蛇舌草····762

半枝莲（狭叶韩信草）……766
老鼠簕……768
十五、拔毒止痒类(适应疖、痈、癣、疥疮、皮炎、湿疹等疾病)……774
大飞扬(飞扬草)·774
大叶桉……776
飞机草……780
马缨丹……782
小飞扬(千根草)·784
木芙蓉……786
乌桕……788
火殃簕……790
仙人掌……792
过塘蛇(水龙)…794
红乌桕(山乌桕)·796
杠板归(贯叶蓼)·798
扶桑……800
岗松……802
虎耳草……804
虾钳菜……806
热痱草(石荠苧)·808
倒地铃……812
黄花蒿……814
黄花母（白背黄花稔)……816
断肠草(钩吻)…818
黑面神……820
雾水葛……822
蓖麻……824
漆大姑（毛果算盘子)……826
莪术……770
蒲葵……772
十六、外伤类（适应跌打伤、扭挫伤、创伤、骨折等疾病)……828

九节茶(草珊瑚)·828
大罗伞(朱砂根)·830
大驳骨 (黑叶爵床)·····832
飞龙掌血·····834
小罗伞(百两金)·836
小驳骨(裹篱樵)·838
山大颜(九节)···840
千打锤·····842
牛耳枫·····844
白花丹·····846
白薯莨·····848
尖尾枫·····850
红絲线(山蓝)···852
羊角扭·····854
走马箭 (荫藎)··856
鱼藤·····858
盐肤木 (滨盐肤木)·····860
透骨消(连錢草)·862
蛇葡萄·····864
落地生根·····866
横经席 (薄叶胡桐)·····868
潺槁(潺槁木姜)·870
鳝柞(柞木)····872
十七、蛇虫咬伤类 (适应各种毒蛇咬伤、蜈蚣咬伤、黄蜂螫伤)·····874
一支黄花·····874
一支箭 (瓶尔小草)·····876
七叶一枝花····878
三角草·····880
土半夏(犁头尖)·882
土瓜(王瓜)····884
广东万年青 (粤万年青)·····886
水芙蓉(紫苏草)·888
毛麝香·····890
东风菜·····892

瓜子金……894
半边莲……896
半边旗……898
苍白秤钩风……900
鸡爪三七（伽蓝菜）……902
虎杖……904
独脚乌桕（圆叶千金藤）……906
野香薷……908
蛇王藤……910
蛇莓……912
望江南……914
韩信草……916
鹅脚板（异叶茴芹）……918
寮刁竹（徐长卿）……920

常见疾病的防治

一、疾病预防……924
普通感冒、流行性感冒……924
流行性脑脊髓膜炎……924
痢疾……925
二、内科疾病……927
普通感冒(伤风)·927
流行性感冒……930
流行性腮腺炎…931
疟疾……926
钩端螺旋体病…926
防暑凉茶……926
杀蝇灭蚊……927
麻疹……932
传染性肝炎……933
痢疾……936

疟疾……939
肺结核(肺痨)…940
急性支气管炎…941
慢性支气管炎…942
支气管哮喘……944
大叶性肺炎……945
胃、十二指肠溃
　疡……946
急性胃肠炎……948
慢性胃炎……949
便秘……951
蛔虫病……952
蛲虫病……953
肾炎……954
风湿性关节炎…955
贫血……957
神经衰弱……958
多汗症、盗汗…959
头痛……960
肋间神经痛……961
坐骨神经痛……961
三、外科疾病……962
常见的皮肤感染·962
下肢溃疡……966
急性乳腺炎（乳
　痈）……967
急性阑尾炎……968
痔……968
脱肛……970
尿路感染……971
尿路结石……972
扭伤……973
骨折……974
损伤性腰腿痛…976
烧、烫伤……977
毒蛇咬伤……979
毒虫咬螫伤……980
癌肿……981
四、五官科疾病……982

急性结膜炎……982
化脓性中耳炎…984
鼻炎……985
鼻衄……986
急、慢性扁桃体炎……987
急、慢性咽喉炎…988
口腔溃疡……990
龋齿……991
骨鲠……991
五、妇产科疾病……992
月经不调……992
白带……994
子宫脱垂……995
产后腰腿痛……995
缺乳……996
六、儿科疾病……997
上呼吸道炎……997
消化不良……998
夏季热……1000
小儿疳积……1000
小儿臀红……1001
七、皮肤科疾病……1002
湿疹……1002
皮炎……1004
癣……1006
脓疱疮……1008
荨麻疹……1009
搔痒症……1010
正名、别名索引……1011
编后记……1041

最高指示

我们能够学会我们原来不懂的东西。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。

《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》（一九四九年三月五日）

读书是学习，使用也是学习，而且是更重要的学习。

《中国革命战争的战略问题》（一九三六年十二月）

中草药的一般知识

一、怎样认药

我国地大物博，药源十分丰富，正如革命群众所说："祖国山河无限好，一草一木都是宝。"这样多的中草药，怎样认呢？伟大领袖毛主席教导我们：**'世上无难事，只怕有心人。'入门既不难，深造也是办得到的，只要有心，只要善于学习罢了。"**

（一）拜工农兵为师，在实践中学习

毛主席教导我们："**最聪明、最有才能的，是最有实践经验的战士。**"对中草药的使用和辨认也是工农兵最有经验。我们必须拜他们为师，恭恭敬敬地学，老老实实地学。有些老药农、老药工认识上千种中草药，常常是只看到根或叶，就能准确地认出是什么药。这是因为他们经过千百次实践，掌握了某些植物的共同点和特殊点的

缘故（人民群众又往往把这些特点形象地体现在名称上）。运用民间认药的丰富经验，是我们学习中草药的重要途径。这些经验概括起来，就是用“看”、“摸”、“嗅”、“尝”的方法来综合判断。

1. **看** 细致地观察植物的全貌，并掌握它的叶、茎、花、果、根的特点，是认药最重要的手段。

⑴ 看形。许多植物的叶形是各有特点的。譬如半枫荷一棵树生两种叶子，有的象枫叶，有的象荷叶。五指柑的叶子象五个手指一样由五个小叶组成。犁头草的叶形象犁头。马鞍藤的叶子，顶部凹陷，象马鞍。植物叶子的排列也有一定规律，七叶一枝花通常是七片叶子轮生，夏天茎顶抽出花梗着生一花，花的苞片和叶子一样，所以又叫“重楼”，也叫“铁灯台”。

茎的外形也各有特色。扁藤的茎扁得象腰带，所以又叫“腰带藤”。大叶风沙藤、十大功劳的茎都有很厚的栓皮；白千层的树皮象许多层白纸一样。香附、水蜈蚣的茎都是三角形的；薄荷、益母草、山香、紫苏、热痹草的茎都是方形

的；大驳骨、小驳骨、狗肝菜、九头狮子草、红絲线、牛膝、倒扣草茎上都有明显膨大的节。

花、果的外形较复杂。半边莲的花很象半边荷花，花冠偏在一侧。串珠酒饼的花象鹰爪一样，花后结的果又象串起来的珠子。盘龙参的花排成行列围绕花茎盘旋而上，很象一条龙盘在柱子上。韩信草和半枝莲在花谢后可以看到很多匙形的苞片，前者很象耳挖杓，所以又叫“耳挖草”，后者因排列在花枝的一侧很象牙刷，所以也叫“牙刷草”。磨盘草和蓖麻很相似，前者的果顶部是收拢的，每个果瓣上有一个短刺；后者的果顶部是扩展的，每个果瓣上有两个长刺。天香炉的果象一个小香炉；倒吊笔的果象一枝倒吊的毛笔；算盘子的果象许多红色的算盘珠；羊角扭的果象一对羊角；榄核莲的果很象橄榄核。

(2) 看色。有些植物的花、苞片、叶子的颜色很特殊，让人一看就认识。玉叶金花在开花的时候，一撮黄花配上一、两片和叶子一样的白色苞片。塘边藕开花的时候，顶生的三片叶子变白，所以又叫“三白草”。狗肝菜、红絲线、九头狮子草这三种植物很相似，但狗肝菜叶子很绿，干后

还是青的，所以又叫“青蛇仔”；红絲线叶子上毛多，干了以后变黑；九头狮子草叶子狭长，常有八、九个碧绿色的大苞片，象狮子头一样。有些植物的叶子上绿下紫，象羊蹄草、蚌花、紫苏等。金银花的花初开全是白的，以后变黄，所以一株同时可以见到金花、银花；马纓丹的花是多种颜色的，所以又叫“五彩梅”。黄花倒水莲的花象一串倒吊的金钟，所以又叫“吊钟黄”。白鹤灵芝的花很多，象一排排展翅欲飞的白鹤。

(3) 看“眼”。植物叶子上的腺体、茎上的皮孔，老药农叫“眼”。看“眼”也可以区别叶形很相似的不同植物。小叶双眼龙的叶柄顶部有一对象螃蟹眼睛一样突出的“眼”，所以叫“双眼龙”。红乌桕和乌桕的叶柄顶部也有一对凹陷的“眼”。蛇王藤的叶形变化很大，但叶柄的顶端都有两个“圆眼”，所以又叫“双目灵”。狗脚迹和地桃花的叶背中脉上有一个带縫的“眼”。

有些植物茎上有突起的点状皮孔。岗梅的紫色茎上有很多白色的皮孔，象秤星，所以又叫“点秤星”。水杨梅和风箱树花很相似，但前者茎上有皮孔，后者沒有。裸花紫珠和大叶紫珠很相

似，也是前者茎上有皮孔，后者沒有。

⑷ 看点。有些植物的叶子上有一些散在的凸起的痣点。如大沙叶，透光一看痣点象星星一样布滿叶面，所以也叫“滿天星”。大、小罗伞的叶子背面边缘有一行黑点，透光一看整个叶片都散布着小黑点。三桠苦、降眞香、黄皮、鷹不泊、两面针、大叶桉、柠檬桉、白千层的叶子透光一看都有很多油珠样小点。胡颓子的叶背是银白色的，上面分布着很多锈点。

(5) 看毛。白鶴藤的叶背有一层象絲绸样闪闪发光的毛，所以又叫“白背絲绸”。白朴树的叶背有很厚一层绒毛，所以又叫“白背叶”。大叶紫珠的叶有很长的灰白色茸毛，上面短而粗，下面密而长；裸花紫珠的毛短而且是黄褐色的。虎舌红的叶子是紫色的，有很多疣状突起和紫色的粗毛，象老虎舌头。毛稔全株都长着紫红色的毛。

(6) 看刺。有些植物长一些刺。两面针的叶子上下两面中脉上和幼枝上都有刺；单面针只在叶背和幼枝上长刺。杠板归的茎、叶柄、叶背都有锐利的倒钩刺，民间又叫它作“老虎脷”。蛇泡簕、金樱子的枝、叶柄上都有钩刺；穿破石、

柘、簕柞茎枝上有锐刺；木棉、刺桐茎皮上有圆锥形的皮刺。

(7) 看翅。盐肤木的叶上有翅可以与漆树鉴别。葫芦茶的叶柄有翅很象倒放的葫芦。六稜菊的叶子下延包茎成翅状。

(8) 看断面。剪断或砍断根茎来观察横断面也很重要。铁包金外皮紫黑，木质金黄；穿破石常生长在石堆中，根的外皮金黄色，菲薄如纸，挖出后很快爆裂，所以又叫“金蝉脱壳”。大罗伞的根是肉质的，淡紫红色，切面可见到小“血点”，所以叫“朱砂根”。桫拉木的根外层黄色，木质部五层，所以又叫“五层龙”。龙须藤的根子断面象梅花心，并有小“血点”，所以叫“五花血藤”。大血藤、鸡血藤、山鸡血藤切断后都流红色树汁象血一样。但是大血藤是整个断面流；鸡血藤是皮下、木质的每一层都流；山鸡血藤只是皮下流“血”而且少。

2. 摸 是用手触摸、揉捻的办法来观察植物。锡叶藤的表面粗涩，因而也叫“涩叶藤”。木贼的茎也很涩，可用来打磨金属，所以又叫“锉草”。有些植物摘叶后，叶子就流白色乳汁，如五

指毛桃、狗牙花、萝芙木、大飞扬、小飞扬、杜仲藤、娃儿藤等。有些叶子揉后有黄色的汁液，如溪黄草和黄花倒水莲；红絲线的叶子撕烂后，用开水一泡就成红色；旱莲草揉后，汁液变黑色。黑老虎、风沙藤、大叶风沙藤的叶子揉后有粘性。

3. **嗅** 就是揉碎叶子、剝开果实子、切开根茎用鼻子来嗅，根据不同的气味来鉴别类似品种。如毛麝香有似麝香的味；薄荷、山香、山薄荷、大头陈都有薄荷味；大风艾、六稜菊有冰片味；九层塔、野香薷有香草味；野芫荽、盆上芫茜有芫荽味；假蒟、山蒟、青蒟都有胡椒味；鱼腥草有鱼腥味；白花草有蒿草的臭味。鸡屎藤揉之有鸡屎味。金鸡爪的果实有柠檬味或枸橼味，所以又叫“柠檬香咸草”或“枸橼当归”。山苍树的根子兼有豆豉和姜的味道，所以叫“豆豉姜”；豺皮樟的根有香樟味；水蜈蚣的根有菖蒲味；毛大丁草有煤油味。赪桐和臭茉莉很相似，但臭茉莉的叶子很臭，赪桐的叶子不臭。

4. **尝** 用咀尝药，一般微量是不会中毒的，但对有大毒的要特别注意。鹰不泊、桂皮、大叶

山桂、阴香、双眼龙都有辛辣味；两面针皮、十八症、天文草、九里香的叶子都有麻舌感；杠板归、入地龙、酢浆草的叶都很酸；余甘子、岗梅根先苦后甜；锡叶藤根、大血藤、龙须藤、岗稔根、入地龙根都很涩；三桠苦叶、榄核莲叶、救必应皮、黄连都很苦；冰糖草、相思藤的叶都有甜味；牛大力、岗菊的根有薯味。

（二）学习一点植物学常识

认药除靠经验识别外，还要学习一点植物学常识。植物学上有很多专用名词和术语，不太好懂，但在描写植物形态时往往又要使用，因此，我们选择了一些常用的名词、术语，作了扼要的解释，并附以插图，供参考应用。

1. 一般名称

乔木——高大的树木，有明显的主干，如樟树、阴香等。

灌木——比较矮小的树木，分枝较多，主干不明显。如鸦胆子、了哥王等。

木质藤本——茎长，木质较硬，本身不能直立，多匍匐地面或攀援、缠绕他物上升的植物。

如鸡血藤、过江龙等。

草质藤本——茎长而细小，草质，较柔软，不能直立，攀援或缠绕他物生长。如蛇王藤、毛蒟等。

草本——一般草类，木质较少，含水分多，茎叶柔软。如夜香牛、叶下珠等。

一年生——当年开花，结果后即干枯死亡的植物。如白花草、鬼针草等。

二年生——当年只生根、茎、叶等营养器官，第二年开花结果，以后干枯死亡的植物。如青蒿等。

多年生——生活两年以上的草本植物或木本植物。有的其地上部分可死去，但其地下部分仍能生活多年。如九里明、土牛膝等。

2. 根

根，是植物的主要营养器官之一。有吸收养料、水分和固定的作用。常见的有下列数种（见图1）。

木根——含木质较硬的根。如各种乔木、灌木的根。

肉根——肥嫩而多肉质的根。如仙茅根。

块根——肥大成块状的根。如独脚乌桕。

球根——根圆球形。如大头菜。

须根——细长而少肉质的根。如金丝草。

宿根——根不随地上茎枯萎，次年又生出茎叶。如鱼腥草。




图 1　常见根的形态

3. 茎

茎，是植物下接根部、上承枝叶的部分，起支持和输导作用。



图 2　常见茎的形状

匍匐茎——沿地面生长的茎，茎的每节上有芽和不定根。如透骨消。

缠绕茎——不能直立而须缠绕他物才能上升的茎。如鸡矢藤。

攀援茎——不能直立而须攀援他物才能上升的茎。攀援茎上生长卷须或吸盘等攀援器官。如蛇葡萄。

平卧茎——沿地面横卧的茎，茎上不生芽和不定根。如小飞扬。

根状茎——有明显的节与节间，节上可生出地上枝和芽，向下形成不定根。如茅根。

块茎——短而肥大的地下茎，外部一般有明显的节与节间之分，顶端有芽，节上有干膜状小鳞叶。如姜黄。

鳞茎——由肥厚多汁的鳞叶包围的短缩的地下茎。如红花酢浆草。

4. 叶 ，

叶，是植物制造养料（光合作用）和蒸发水分的主要器官。

叶脉——叶片上见到的脉纹叫做叶脉。

主脉——从叶柄发出，直到叶尖的称主脉或

中脉。

侧脉——主脉的分枝称侧脉。

细脉——侧脉的分枝称细脉。

叶脉按排列方式构成不同形状(见图 3)。




图 3　常见叶脉形状

叶柄——连接茎和叶片的部分称叶柄。

托叶——生在叶柄基部的小叶或其他形状的

附属体叫托叶。

叶腋——叶柄与茎枝连接上方的叉窝。

叶鞘——叶的基部扩大，包围着茎的部分。




图 4　叶片各部分名称


叶尖——指叶的先端，它有各种不同的形状（见图 5）。

叶基——叶片下缘靠叶柄部位称叶基或基部（见图 6）。

叶缘——指叶的边缘，常见有下列各种（见图 7）。




钝状




急尖



渐尖



短尖




微凹




浑圆


图 5　常见叶尖形状




圆形



楔形




钝形



心脏形



箭形



斜形

图 6　常见叶基形状




图 7　常见叶缘形状

叶形——指叶片的全形，常见有下列各种（见图 8）。

革质叶——叶片厚韧象皮革。如大叶山桂。

纸质叶——叶片薄嫩象纸。如车前草的叶。

肉质叶——叶片厚嫩多汁。如马齿苋叶。

互生叶——每节生叶一片，交互着生。如火炭母、白花丹。

对生叶——每节生叶两片，相对排列。如薄




图 8　常见叶片形状

荷、毛麝香。

轮生叶——每节上围茎生出三片以上的叶。如七叶一枝花、轮叶沙参。

簇生叶——每节上从一点生出两片以上的叶。如马尾松、银杏。





图 9　叶的着生形状

复叶——一个总叶柄上生两片以上的叶称复叶。按排列形状有不同名称(见图 10)。



三出复叶　　掌状复叶　　奇数羽状复叶



偶数羽状复叶　二回羽状复叶　三回羽状复叶

图 10　常见复叶形状

5. 花

花，是种子植物的生殖器官。典型的花由花托、花被(花萼和花冠)、雌蕊群、雄蕊群等组成。具备上述各部分的花叫“完全花”，缺少任何一部分的花叫“不完全花”。雌、雄蕊群在同一花内并存的，叫“两性花”；仅有一种的叫“单性花”。

花序——指花在花茎上排列次序的规律性，常见花序有下列数种(见图 13)。





图 11　花的各部名称






图 12　花冠的各种形状



图 13　常见花序形状

6. 果

果，是由受精后的雌蕊发育而成的。胚珠发育为种子，子房形成果实。

核果——外果皮薄，中果皮肉质，内果皮坚硬木质化，形成一核。如桃子和苦栋的果。

浆果——外果皮柔薄，中果皮和内果皮多肉多汁，难以分离，内含一至数枚种子。如龙葵、葡萄等。

荚果——果皮成荚，含种子一至数枚。如望江南、扁豆等。


蒴果——果形多样，具多数种子，成熟后开裂方式不一。如蓖麻、棉等。

瘦果——果皮坚硬，干燥不开裂，内含种子一枚。如土大黄、蒲公英等。

翅果——具有一个或数个翅状附属物的果实。如槭树的果。

离果(双悬果)——两室相联合，每室一个种子，成熟时在联合面分开成两个分果，分果不裂开。如金鸡爪、胡萝卜的果。

坚果——果皮厚硬，木质，一般含一粒或二粒种子，与果皮分离。如夏枯草、栗子等。



核果



浆果



荚果



蒴果



瘦果



翅果



离果



坚果



蓇葖果



聚合果

图 14　常见果实形状

荚蒾果——果形多样，皮较厚，内含种子一到多粒，成熟后，沿腹缝开裂。如羊角扭、古羊藤。

聚合果——由一花内数个离生雌蕊共同形成的果实。如蛇莓、蛇泡簕等。

二、怎样采药

毛主席历来教导我们要“**自力更生**”、“**艰苦奋斗**”。我们要用中草药防病治病，就应当自己动手，就地取材，组织力量自采自用，以减少国家和人民的负担。在采药过程中，既要有一不怕苦、二不怕死的革命精神，又要有科学态度，注重调查研究。

1. **掌握采集季节**　药用植物的药用部分，因为采集季节不同，治疗效果差异很大。药材有效成分的高低和采集季节有密切关系，因此我们一定要掌握好采集的时机。

(1) 采集根和根茎以秋末、春初为好。此时植物养分大都贮存在根和根茎内，药力较足。如牛大力、葛根、羊乳、土党参、金鸡爪等。

(2) 采集茎、叶，以花朵初开植物生长的全盛时期为好。如三棱苦、大青等，而桑叶、枇杷叶则宜秋后采收，以减少药物的副作用。

(3) 采花，以含苞待放时为好。盛开后容易散落、破碎，影响质量。最好是在晴天上午采，以便迅速晾晒干燥。如金银花的花期很短，两广地区常在清明到谷雨间冒花，从打苞到开放只有五至七天时间，选择花苞挺直如针、色白的时期来采，过早和过晚都影响质量。

(4) 采皮，以春夏之交为好。这时植物生长旺盛，皮内养分较多，皮和木质部也容易剥离，如救必应皮、阴香皮等。但用根皮的最好在秋后采，如两面针根皮。

(5) 采集果实和种子以成熟时期为好。个别品种则需要未成熟时采收，如桑椹、草决明等。采集时间最好是早晨，以防果荚爆裂。

(6) 采集全草多半在花期，或连根拔或割地上部分，不要等到凋谢时采。有的要采嫩苗，如茵陈蒿。

(7) 采集花粉要在花期，如松花粉。

2. 了解生长环境 药用植物的生长分布与

海拔高度、地势、方向、土壤、水分、气候、地理位置有非常密切的关系。如果我们了解了这些特点，找起药来就容易；否则就象“瞎子摸鱼”一样，费力很大，收获很小。以华南某地为例，药用植物生长的大体情况如下：

⑴ 靠近海边生长一些不怕盐碱的植物，如苦荬、路兜簕、老鼠簕、卤地菊、蔓荆子、马鞍藤等。

(2) 村旁旷地常成片生长一年或多年生草本植物，如豨莶草、白花草、羊蹄草、旱莲草、地胆头、夜香牛、艾、马齿苋、酢浆草等。

(3) 稻田边、水渠旁多生长怕干旱的草本植物，如白花蛇舌草、水线草、盆上芫茜、崩大碗、母草、田基黄、辣蓼、水蜈蚣等。

(4) 山坡丘陵地带常见有耐旱的草本植物和灌木、亚灌木，如茅根、黑面神、漆大姑、入地龙、双眼龙、盐肤木、岗稔、岗松、岗梅、排钱草、算盘子、葫芦茶、金银花等。

(5) 高山密林多生长乔木和大藤本植物，如阴香、樟树、千打锤、山苍树、鸭脚木、降眞香、过江龙、鸡血藤、大血藤等。

(6) 阴凉潮湿的山谷中常见溪黄草、石蚕、石仙桃、石斛、麦斛、七叶一枝花、翠云草、竞州卷柏、石韦、八角莲。

(7) 千米左右的山顶和深谷中，常见有五加科的半枫荷、寮刁竹、黄连、水黄连、紫背天葵等。

(8) 密植的松、柏、竹林下一般没有药用植物生长。

3. 搞好加工贮藏 药用植物采收后应迅速使之干燥，以免霉烂、变质，造成浪费。方法有：

(1) 晒干：利用沙滩、地面，或搭架子，把药物摊开在阳光下曝晒，这是最经济简便的方法。

(2) 阴干：将药物置于阴凉通风干燥的地方，利用空气流动，逐渐蒸发植物中的水分而达到干燥的目的。一般用于花类、芳香性的药物，如木棉花、毛麝香、薄荷、大风艾、阴香等。

(3) 烘干：利用烘房或火炕低温烘烤，使药物干燥，特别适用于南方潮湿多雨的情况。主要用于富有淀粉、糖分的药物。如金不换、黄独，花类如木棉花、曼陀罗花等。

(4) 有些药物干燥前要加工：如肉质多汁的天门冬、羊乳、百部等要用沸水烫或上笼屉蒸一下，然后晒干。带毛刺的要燎掉或搓掉毛刺再晒，如金樱子、金毛狗脊、香附子等。有的要乘湿切片，然后晒干，如两面针、乌药、鸡血藤、大叶风沙藤等。有的晒半干后就要扎把，然后再晒干保存，防止因全干后枝断叶落。有的要先刮去粗皮、栓皮再晒，如十大功劳、救必应、大叶风沙藤等。

药物贮藏最好选择高爽、干燥、空气流通的房间，搭架分层放置，室内放置生石灰箱，保持空气干燥，定期检查，注意晾晒。有些容易走油跑味的药物，宜放在密闭的缸、罐内保存。

4. 注意保护药源 毛主席教导我们："**任何地方必须十分爱惜人力物力，决不可只顾一时，滥用浪费。**"用中草药防病治病，是贯彻毛主席"**备战、备荒、为人民**"的伟大方针，发展人民的医药卫生事业的一项长期任务。我们应当爱惜祖国的一草一木，合理使用，决不可以滥加采伐。

(1) 要有计划地采，作到用什么采什么，用多

少采多少。除了必需的贮存以外，不要采集过多，以免造成积压浪费。

(2) 要保护幼苗。一般要做到用地上部分的不要连根拔，可于离地一两寸处割取或留主茎剪取侧枝。

用根或根茎的最好留下一部分根、块根，以便来年再长。

用叶的药物不要把全株叶子一次采光，应适当保留一部分，以利生长。

用树皮的药物最好结合采伐同时采皮。生剥时注意不要环剥，要有间隔的纵剥，避免剥皮后造成植物死亡。

(3) 要留种。用全草的药物在大面积采集时，应适当留一些生长茁壮的植株，以备传种接代，千万不要“一锅端”。

(4) 要充分利用。如用根的药物，应当考虑茎、叶是否也可入药。用茎的也要考虑花、叶的利用问题。例如黑老虎，过去只用根而且限定指头粗的，实际上都可以用；九里香，过去用根，现在提倡用叶，效果很好；山苍树，过去主要用根，现在提倡用子、枝叶和根，这样就可以更充

分的利用药源。

(5) 要结合开垦荒地和树木采伐，把有用的根、皮、全草认真地采集起来，不要随意烧掉烂掉。

三、怎样制药

人民要求普及，跟着也就要求提高。使用中草药也必须在普及的基础上逐步提高，例如在剂型问题上，开始多采用生药直接煎煮的办法（即湯剂）。这种办法虽然简便，但也有它的缺点。因此，我们学习一些简单的制药方法是很有必要的，改变了剂型就有利于服用、貯存、运输和携带。

1. **蜜丸** 先将药料粉末充分拌匀，加入炼过的蜂蜜（蜂蜜炼到起红色泡沫拉之成黃絲为度），药粉和蜜的比例为 1:1 或 1:1.5 左右，用木棍搅拌使二者混合均匀，再用手揉（象揉面粉样），然后搓条，切段制成大、小不同的丸粒。一般每丸重一錢或二錢，最大为三錢。

2. **水丸** 先准备一个表面光滑、刷水不漏

的竹制药簸（象筛子一样）。先用毛刷蘸水刷湿药簸的一边，撒上薄薄一层药粉，然后持簸向一个方向反复旋转至药粉全湿粘着为度，另用干刷将药粉轻轻刷下，使之形成细小颗粒，然后再边喷水、边加药粉，边旋转，直至摇成需要大小之丸粒，晒或烘干即得。

3. 散剂 将一种或多种药物干燥后磨成细粉混合而成，可作内服或外用。加工工具：药碾、石磨、石臼、碾米机、磨粉机均可利用。粉末之粗细，根据不同情况选用不同的筛箩，一般是内服的要细些，便于溶解、吸收，奏效快。

4. 膏药 膏药是我国劳动人民用以贴敷疮疡、皮肤病、腰腿痛等疾病的一种制剂。方法是先将药料配好，装入玻璃缸或瓦罐内，加油浸（豆油、花生油、茶油均可），油量一般是超过药料2～3横指为度（或按配方量），浸泡5～7天，然后倒入铁锅煎炸。等到药料煎成炭状，再除去药渣，炼油。这时火要大，一边加火，一边搅，看到烟雾在油面上团团打转，一直炼到把油滴滴在水内成珠不散，即到火候。然后减火加入黄丹，边加边搅拌至丹全部熔化为止。将锅离火

待稍凉再加入樟脑、冰片、乳香、没药等芳香药，最后把膏倒入凉水内，浸泡一昼夜以上去火毒，取出分摊于牛皮纸或布上即成。在炼油过程中一定要注意安全，防止起火，最好用密闭式炉灶。

5. **药酒** 一种是冷浸法，即将药料浸入40～60度的白酒内，容器密闭，隔数日搅拌一次，一般浸一个月左右即可使用。另一种是热浸法，将药料浸入酒中，隔水加热至沸，然后连药一并倒入密闭的大口瓶或缸内，一至二周左右即可使用。

6. **糖浆** 适用于儿童服用。可先制单糖浆，取水450毫升煮沸，加蔗糖850克搅拌，待蔗糖溶解后，继续加热煮开，用脱脂棉滤过，加水至1000毫升充分搅匀即得。然后将药料加水煎煮，去渣浓缩（一般每毫升浓缩液含生药量1克），再将浓缩液和单糖浆按一定比例（一般为1:1）配合即可。如果不加糖浆，浓缩液内加入适量防腐剂，如苯甲酸或尼泊金也可以，能较长期贮存备用。

7. **片剂** 这里主要介绍因陋就简的土办法。将药料磨粉，如果想使药片体积小、含量高，可将一部分药料煎成浓缩液，和另一部分药粉混合。制片时，在药粉中加上适量的淀粉糊或米浆

用力搅拌，或用手搓，使之成为小颗粒状。如果含水分过多时，可放在通风的地方晾一晾，再打片。土制打片机多种多样，可以用木料或废铁自制。

四、怎样用药

毛主席教导我们：“**不同质的矛盾，只有用不同质的方法才能解决。**”我们运用中草药防治疾病，也必须遵循这条原则。

（一）在“辨证施治”的基础上用药

中医治病，首先通过“四诊”，诊察病人的体质、主观和客观症候，运用“八纲”，结合病因，进行分析、综合，弄清病症的性质，作出诊断，这叫做“辨证”。在此基础上定出治疗原则，然后选方用药，这叫做“施治”。全过程就叫做“辨证施治”。为了能正确地掌握和使用中草药，在这里扼要地介绍一下有关“四诊八纲”的简单知识。

1. 四诊八纲：

四诊即望、闻、问、切。“望”就是观察病人的精神状态，体质情况，皮肤和其他部分色泽

的变化，以及五官、舌苔等。“闻”包括两方面，一是听病人发出的声音（言语、呼吸、咳嗽等声音），一是嗅病人的气味（呼吸、口腔、分泌物、排泄物的气味）。“问”就是询问病人发病经过和自觉症状。“切”就是摸脉和触诊。下面只把几种常见的舌象、脉象作一简介，因为它是中医诊断中比较重要的客观指标。

舌象，包括两部分，一是舌质，二是舌苔。

舌质淡红，是正常的；鲜红色是热症、实症；淡白是虚症、寒症；绛色（深红色）是里热症；紫色多为瘀血症；舌卷缩色淡的，多属虚症。

舌苔薄白而润，是正常的；薄白而滑，多属表寒症；白厚而腻的，是湿症或痰饮症；黄苔多属里热；黄腻多属湿热；黄而干燥，是热病伤津；黄而干燥起刺，是实热症；灰白多属寒湿，灰黑多为肠胃有湿浊，灰滑多属食积、痰饮；黑而润滑的是大寒症，黑而干燥的属大热症。

脉象，常见的有：

浮脉：脉搏跳动很表浅，用手指一摸即可摸到，多属表症。如为浮而快多属风热，浮而无力多为伤暑。

沉脉：轻按不明显，重按才能摸清脉的跳动，多属于里症。沉迟属于里寒症，沉弦属于痰饮，沉而有力为里实症。

数脉：数即“快”的意思，正常的脉是每呼吸一次跳动四次，如果超过四次即称数脉，多属热症。浮数是表热，沉数是里热。

迟脉：每呼吸一次脉跳三次以下，称为迟脉迟而有力的多见于心腹冷痛，迟而无力的为虚寒症。

虚脉：脉大而软，按之无力，多见于伤暑、虚劳、气血不足。

实脉：脉充实有力，长大而坚实，多属有实火。

滑脉：脉跳动圆滑流利，多见于孕妇，滑大，多见于风痰、食滞。

弦脉：脉跳动象弓弦一样，按之不移称弦脉，多见于痰饮、月经不调、心腹痛。

细脉：脉细如丝，多为气血两衰（如大出血，血压下降时），或久病体虚、劳损等。

缓脉：每呼吸一次，脉跳四次，和缓均匀，为正常之脉象，如缓而无力多属虚症、寒症、湿症。

八纲即表、里，寒、热，虚、实，阴、阳。这是根据四诊的结果概括出来的，用以明确疾病的主要矛盾和矛盾的主要方面。为了叙述方便，下面分为四组来谈。

表里：是指病变部位的深浅，如开始得病，病人有发热恶寒，头痛，四肢酸痛等症状，表示病在表，称“表症”，治疗上用解表药。如病人出现高热、口渴、烦躁、神志不清、腹胀满、大便秘结、小便如茶，或有呕吐、腹泻等症状，表示病在里，称为“里症”，治疗上当用清热凉血，通里攻下的药物。

寒热：是指两类性质相反的症候。如面色苍白，手足凉，口不渴，喜吃热饮食，大便稀薄，舌润苔白滑，脉迟，经常怕冷，多属于“寒症”，在治疗上当用温热的药，以温阳散寒；如果面色潮红，手足温，口渴，喜吃冷饮食，大便干结，舌苔黄燥，脉数(快)，多为热症。在治疗上当用寒凉的药物以清热泻火。

虚实：是指人体和病势的盛衰而言。如精神不振，四肢无力，声音低微，皮肤色浅，弹性减弱，呼吸弱，出虚汗，腹隐痛喜按，脉细无力，

为虚症，宜用温补的药物。如见精神亢奋，声音有力，皮肤红润，腹满胀痛，或有硬块，呼吸粗而有力，脉实有力等为实症，应用攻泻药。

阴阳：是八纲总的概括，如表症、热症、实症可统称为“阳症”；里症、寒症、虚症可统称为“阴症”。由于病人的体质不同，得病的原因不同，病情的轻重不同等等，在临床上常常是表里相兼，寒热错杂、虚实互见，但不管怎样，通过全面、细致的辨证，总是有所侧重，从中找出疾病的主要矛盾和矛盾的主要方面，突出重点，照顾一般，对症下药，就可获得良好的疗效。

2. 六因：六因即风、寒、暑、湿、燥、火六种不同的致病原因，过去中医书上称为“六淫”或“六气”。这些都属于外因，致于发病与否，主要取决于内因，但外因是致病的条件，也不可忽视。把某些致病的原因，归纳为“六因”，这是由于古人限于当时的条件，不可能发现各种不同的具体致病因素，只能根据临床症状来推求致病原因，比如受了风吹雨淋，得了感冒，出现怕冷，发热，头痛等症状时，一般通称是“受风”或“伤风”。在炎热的夏天，中了暑气，出现发热，头痛，四

肢发软，出汗，口渴等症状时，通称“伤暑”。但是中医所称的“六因”，有时不一定是指发病的原因，而是代表许多疾病的固有症状，因此在用药方面和“八纲”同样具有很大的意义。

风，一般分外风、内风。外风，是指受风得病，有一般外感症状，有热象的为外感风热，偏寒的为外感风寒。前者应用祛风散热的药，后者应用祛风散寒的药。内风，是指风自内发，“中风”就是内风的一种，即突然昏倒，不省人事，或出现半身不遂，口眼歪斜，说话困难等症，宜用平肝、养血、熄风的药来治疗。

寒，一般分表寒，里寒。表寒，是指受寒得病，有恶寒、无汗，口不渴，四肢骨节酸痛等症状，宜用散寒解表的药物。里寒，临床表现有腹痛，腹泻，肠鸣，口淡无味，恶心，怕吃生冷食物等症状，宜用温中散寒的药物。

暑，一般分伤暑、中暑。伤暑，就是夏天受了暑气，有发热，头痛，出汗多，口渴烦躁，四肢酸软无力等症状，宜用清解暑热的药物。中暑，是指在暑天烈日下，突然昏倒，不省人事，出现虚脱，应用补气回阳的药物，及时抢救。

湿，一般分外湿、内湿。外湿，是指有精神困倦，头重，四肢沉重，关节疼痛，屈伸不利，轻度浮肿等症状，宜解表化湿。内湿，是指有黄疸，胸水，腹水，痰多，疲倦，四肢浮肿，腹泻，小便不通，宜清热利湿，或健脾渗湿的药物。

燥，一般多指燥气伤了津液，多见于秋季，出现皮肤干燥，口唇干裂，干咳无痰，胸痛，大便秘结等症状。宜用滋阴润燥的药物。

火，一般分实火、虚火。实火，出现牙龈肿痛，咽喉肿痛，目赤，斑疹，高热不退，烦躁口渴，小便褐色，宜用清热泻火药物。虚火，一般多见唾液分泌减少、口干，手足心发热潮湿，舌尖红，宜用滋阴降火的药物。

（二）用药的一般原则

1．**具体情况，具体分析**：用药治病首先要突出政治，抓好病人活思想，深入细致地做好思想工作，使病人树立起为革命治病和战胜疾病的信心；其次是调查研究，必须弄清病情，根据病人具体情况，对症下药，决不可粗枝大叶。因此，在用药的时候，对于病情的轻重、患病时间的长

短、体质的强弱、年龄的大小、性别的不同、气候的变化等等，都要认真地全面地考虑。在用量上，老人、小孩、妇女、体弱的病人都要用得少一些；药性猛烈或有毒的药，要严格控制用量；过于苦寒的药，多用了会损伤脾胃；辛温大热的药不宜用于体虚有火的病人。行气破血，散瘀泻下的药，孕妇禁忌。夏天要注意少用辛温大热的药，冬天要少用苦寒性凉的药。从药物的质地来说，质轻易浮的药，用量要小一些，质重味厚的药，用量可大一些。从配剂来说，汤剂用量可稍大，丸散剂用量较小；鲜药用量可较大，干药用量要减少。在服药时间上，一般是：补药在食前服，健胃药在饭后服，驱虫药和泻下药，大多空腹服，镇静催眠药在睡前服。

2. 了解药物性能：药物性能就是药物的性味和功能。只有掌握了中草药的性能，才能正确运用中草药。每种药物都有它的性味、功能，例如：野菊花性寒味苦，功能是清热解毒、散瘀消肿，因而它可治疗一些高热疾病、急性炎症、无名肿毒等等。中草药的性能也是按传统的中药理论“四气、五味”来定的。

“四气”，即寒、热、温、凉四种不同的药性。这些药性可从人体对药物的反应来认识。譬如因淋雨受凉，畏寒怕冷，喝一碗生姜汤，则汗出病解。说明生姜是温性的，因为它从病人身上反应出了散寒的作用。再如口干唇裂，舌苔薄黄，不想吃饭，民间叫作“上火”，服一些黄连，症状即消失。因此，我们知道黄连是寒性的，因为它有泻火的作用。至于寒和凉、热和温只是程度上的不同，沒有性质上的差别，微寒相当于凉，微热相当于温。还有一种既不偏温，也不偏凉的药物称为平性的药。概括地来说，寒凉性的药物都有清热泻火、凉血、解毒的作用；温热性的药物都有温中散寒、助阳通络的作用。但也不能简单地认为，所有的寒凉药都可治一切温热病，所有的温热药都可治一切虚寒病。因为每一种药都有它一定的主治范围，所以决不能生搬硬套。

“五味”即辛、酸、甘、苦、咸五种味道，可通过味觉来辨别。五味各有不同的治疗作用，带有辛(辣)味的药，能发汗解表、行气止痛，如绿薄荷、大头陈可治外感，九里香、鸡骨香可治胃痛。带有酸味的药，能涩肠固脱、收敛止血，如

火炭母、辣蓼草可治腹泻、痢疾，旱莲草可止血。带有甘味的药，能滋补强壮、缓急调中，如土党参、牛大力可治体虚无力，冰糖草调和药性，保护胃肠。带有苦味的药，能清热解毒、燥湿泻火，如野菊花、橄核莲能退热消炎，土大黄、溪黄草能治黄疸型肝炎。带有咸味的药，能软坚散结、润肠通便，如穿山甲、乌贼骨能治淋巴结核、甲状腺肿大，草决明可通大便。另外还有一种淡味的药，能渗湿利水，如淡竹叶、珍珠草等。还有一种带有涩味的药，也有收敛止血的作用，如龙柏叶、侧柏叶可治内外伤出血。这样就不只是“五味”，但一般习惯上仍称“五味”。

我们知道每一种中草药都包含了气和味（动物药、矿物药也是如此），如果单从“四气”、“五味”来看似乎很简单，但有些药物的气味却是很复杂的，如有的气同而味异，有的气异而味同，还有的一气而兼数味。也正是由于这种复杂的情况，才反应出了各种药物的不同的治疗作用。这是劳动人民在长期治病用药的实践中摸索出来的用药规律。我们在学习和运用时，除了掌握它的共性之外，还要掌握每一药物的特殊治疗作用

（即个性）。

3. 掌握配方原则：临床使用中草药最好是单味药即能达到治疗目的，既简便又容易掌握，但往往由于病情复杂，人的体质不一样，单味药不能达到治疗目的，所以必须选用多种药物配伍成方，以加强药效，兼顾全面，力求病人早日恢复健康。

方剂的组成，并不是随便把几种药凑在一起就算一个处方，也不是品种越多，疗效就越大，而是在辨证的基础上根据药物的性能选药配方，其基本原则是：

(1) 在一个处方中首先确定出主治的药物，即解决主要矛盾的药物，或者说是治主症的药物。譬如治疗一个外感风寒的病人，其主要症状是恶寒发热，那么在处方中就要首先确定发汗解表的药，如选用紫苏和大头陈为主治药，病人服药后汗出病解，则这两味药在处方中就是主治药物。

(2) 辅治药物，即治疗主症以外的其他症状的药物。还以治感冒为例，如病人除发热外还有口渴、咽痛，那么可配上玉叶金花、岗梅；有的病人还感四肢酸痛，可再配上嫩桑枝。这些药物

均称为辅治药物。

(3) 相助药物：即协助主治药物或其他药物发挥更大作用的药物。例如治疗胃痛，常用两面针根皮，因该药有小毒，不宜多用，但量小又达不到止痛目的，所以方中可配上鸡骨香，就会增强其止痛作用。再如用海金沙藤、茅根利尿，如果方中配上五指毛桃补气，其利尿作用就会更强。

(4) 相抑药物：即利用某种药物的作用，抑制另一种药物的作用，以减少其毒性和不良反应。例如治疗外感时常将紫苏、薄荷配在一起，这两种药虽都有发汗解表的作用，但在药性上紫苏为辛温，薄荷属辛凉，以薄荷之凉来控制紫苏之温，这样，既能加强发汗解表的作用，又可纠正药物的偏性。又如用中药麻黄发汗时，常配以白芍，以防发汗过多。用双眼龙治疗腰腿痛，病人往往出现头晕耳鸣（可能是毒性反应），若配上牛大力、千斤拔或五指毛桃，则反应就不会出现。

总之，两种以上的药物组成一个复方，不外产生两方面的作用，一是互相协助，增强药效，一是互相抑制，减少不良反应。在配方中寒热并存的症候，可以寒药和热药并用，虚实相兼的症

候也可以补药和泻药并投，但必须有所侧重。这说明中草药在治疗上的配伍应用是广泛而又灵活的。不必局限于固定的处方，特别是中草药的生长，地区性很强，南方有的，北方可能沒有，北方有的，南方不一定有，因而必须根据本地区所产药物，在熟悉其性能和“辨证施治”的基础上，选药配方，灵活应用。

4．注意观察效果，不断总结经验： 用中草药防病治病，还必须遵照毛主席“**要认真总结经验。**”的伟大教导，注意观察效果，不断总结提高。首先要坚持“四个第一”，充分调动人的主观能动作用，防止单纯药物观点。其次是要有科学态度，进行力所能及的检查，尽量作出确诊；观察病情要细致认真，作一些必要的记录；摸索药物的性能要看到正反两方面的作用；评价疗效要实事求是，不夸大，也不缩小，排除假象，抓住本质；有些疾病不但要看眼前的效果，还要看远期的疗效。然后以毛主席的光辉哲学思想为指针，把实践的经验集中起来，加以分析研究，从中找出规律性的东西来。这样我们就可以通过实践，认识，再实践，再认识，不断前进，不断提高。

最高指示

许多人生疮害病，想个什么办法呢？一切这些群众生活上的问题，都应该把它提到自己的议事日程上。

《关心群众生活，注意工作方法》（一九三四年一月二十七日）

应该使每一个同志懂得，只要我们依靠人民，坚决地相信人民群众的创造力是无穷无尽的，因而信任人民，和人民打成一片，那就任何困难也能克服，任何敌人也不能压倒我们，而只会被我们所压倒。

《论联合政府》（一九四五年四月二十四日）

常用中草药

一、解　表　类

（适应感冒、流感、上呼吸道炎、疟疾等疾病）

丁　癸　草

别名　丁贵草、人字草。

识别特征　(1) 一年生或多年生披散或伏地草本，茎纤细，多分枝。

(2) 每一叶柄顶端有2片叶子，倒卵形，长约1厘米，宽约3毫米。

(3) 花黄色，小，花后结由2～6个节组成的豆荚，表面有小针刺。

生长环境　生于稍干旱的旷野、草地、疏林。

广东、广西、福建、四川、湖南、云南等地均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集较好。洗净，晒干备用，或为鲜用。

性味功能　甘淡凉。清热解表，去瘀消肿。

主治用法 (1)感冒，眼结膜炎，肝炎，胃肠炎，痢疾，小儿疳积；(2)毒蛇咬伤，跌打肿痛。

每用干品 5 錢～2 两，水煎服。外用鲜品捣烂敷患处。



图 1　丁癸草(蝶形花科，丁癸草属)

Zornia diphylla (L.) Pers.

九层塔(罗勒)

别名 光明子(种子)、香草、千层塔。

识别特征 (1) 一年生芳香草本，高1～1.5米，多分枝。茎四方形，略带紫色。

(2) 叶对生，卵形或卵状披针形，长2～6厘米，宽1～3.5厘米，全缘或有疏齿，有多数腺点。

(3) 花白色，略带紫红色，二唇形集成顶生有多轮的总状花序，形似宝塔，故称“九层塔”。小坚果，长圆形。

生长环境 多为人工栽培。

采集加工 药用全草及种子。子秋季采集，全草夏秋采集，阴干备用。

性味功能 辛温，香烈，含挥发油。祛风消肿，散瘀止痛，疏风解表。

主治用法 (1)胃肠胀气，消化不良，胃痛，肠炎腹泻；(2)外感风寒，头痛，胸痛；(3)跌打瘀肿，风湿痹痛；(4)蛇咬伤，湿疹皮炎；(5)种子能治眼病。

每用干品3～5钱，水煎服。捣烂外敷蛇伤，煎水洗湿疹、皮炎。



图 2　九层塔(唇形科，罗勒属)

Ocimum basilicum L.

附：丁 香 罗 勒

丁香罗勒，华南一带有栽培。为多年生直立草本，较罗勒高大，可达两米，功用与罗勒基本相同。



图 2-1　丁香罗勒(唇形科，罗勒属)

Ocimum gratissinum L.

九头獅子草

别名　野黄散、九节蒿、项开口、辣叶青药。

识别特征　(1) 多年生草本，高约 20～50 厘米，地上部分深绿色。茎有棱，分枝较多，节膨大呈膝状。

(2) 叶对生，尖卵形，有毛，长 3～7 厘米，宽 8～15 厘米，有短柄。

(3) 花唇形，紫红色，长约 3 厘米，长在叶腋或枝顶，每花有叶状苞片两枚，常多朵聚集成束，所以叫“九头狮子草”。

生长环境　喜生于荒野、山地灌木林下、路旁、田埂，也有栽培。长江以南各省均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切段，晒干。

性味功能　甘凉。解表发汗，行气活血，解毒消肿。

主治用法　(1)感冒发热，喉痛，小儿高热惊风；(2)白带，月经不调；(3)蛇咬伤，跌打损伤，无名肿毒。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服或浸酒用。蛇伤、肿毒亦可用鲜品捣烂敷患处。

注　九头狮子草与狗肝菜很相似，两者的区别点在于叶和花。九头狮子草的叶较狭长，为披针形（狗肝菜

为卵状椭圆形)，花紫红色较大(狗肝菜的花淡红色，较小)。




图 3　九头狮子草(爵床科,狗肝菜属)

Dicliptera japonica Makino

土常山(华山矾)

别名　江黄仔、猪婆柴、华灰木、米碎柴。

识别特征　(1) 落叶灌木，高 1～2 米，小枝有密毛。

(2) 叶互生，长圆形或倒卵形，长 4～7 厘米，宽 2～4 厘米，边缘有细锯齿，背面被白色长柔毛。

(3) 花小，白色，集成圆锥花序，顶生或腋生。果球形，熟时蓝黑色，有毛，约绿豆大。

(4) 根圆柱形，断面黄色或淡黄色。

生长环境　生于山野、密林丛中。

我国南部均有分布。

采集加工　药用根，夏秋采集。采后洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热解表，化痰除烦。

主治用法　(1)感冒发热，口渴心烦，疟疾；(2)腰腿痛。

每用干品 3～5 錢，水煎服。




图 4　土常山(山矾科，山矾属)

Symplocos Chinensis (Lour.) Druce

1.花枝；2.果枝。

大头陈(球花毛麝香)

别名　地松茶、石棘，千锤草。

识别特征　(1) 一年生粗壮直立草本，高约0.5～1米，有腺毛。

(2) 叶对生，卵形至矩圆状披针形，长2.5～5厘米，边缘有钝齿，揉之有芳香气。

(3) 花蓝紫色，集成顶生的球形头状花序。

生长环境　喜生于坡地、旷野、灌木杂草丛中。

我国南部均有分布。

采集加工　药用全草，秋冬采集。洗净，晒干备用。

性味功能　辛微苦凉，气香。疏风解表，芳香化浊。

主治用法　(1)感冒，咳嗽，发热头痛；(2)消化不良，腹胀腹泻。

每用干品5錢～1两，水煎服。



图 5　大头陈(玄参科，毛蕊香属)

Adenosma indianum (Lour.) Merr.

1.花枝；2.苞；3.花；4.蒴果。

山薄荷(荒)

别名　马蒿、独脚球、兰香草。

识别特征　(1) 直立灌木，高 25～60 厘米，有毛，揉碎后有薄荷香气。

(2) 叶对生，卵状矩圆形，长 2～5 厘米，边缘有锯齿，两面有灰色柔毛。

(3) 花蓝色，集成腋生或顶生的聚伞花序。

生长环境　多生于干旱的坡地、路旁、荒野。

我国南方各省野生，北方有栽培。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，阴干，切段备用。

性味功能　辛温气香。祛风解表，散瘀止痛。

主治用法　(1)风寒感冒，咳嗽头痛；(2)风湿痛，腰肌劳损，瘫痪麻木，跌打瘀积肿痛。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服或浸酒内服。



图 6　山薄荷(马鞭草科，豬屬)
Caryopteris incana Miq.

山　　香

别名　毛老虎。

识别特征　(1) 一年生直立草本，高0.5～2米。茎四方形。揉碎后有香气。

(2) 叶对生，卵形，长4～9厘米，边缘有小锯齿，两面有毛。

(3) 花腋生，蓝色，二唇形。

生长环境　喜生于村边、路旁、旷野草地上。

产于我国南方大部地区。

采集加工　药用全草，夏季采集。洗净，切碎或扎把，晒干备用。

性味功能　苦辛凉，有香气。疏风解表，驱风止痛。

主治用法　(1)感冒发热，头痛；(2)胃肠胀气。

每用干品3～5錢，水煎服。鲜品捣烂外敷可治蛇伤，煎水外洗治皮炎、湿疹。



图 7　山香(唇形科，山香属)

Hyptis Suaveolens (L.) Poir.

1.花枝；2.果枝；3.种子。

水 蜈 蚣

别名 三荚草、球头草、顶棍草。

识别特征 (1) 多年生草本，高约 15～25 厘米。根茎近圆柱形，细长有节，匍匐平卧于地下，象蜈蚣，故称“水蜈蚣”。全株有芳香气。

(2) 叶线形，长 5～15 厘米，光滑，亮绿色，柔软。

(3) 花序顶生，球形，淡绿色或白色，下有狭长叶状苞片 3 片，所以又叫“三夹草”。

生长环境 喜生于沟边、路旁、堤畔、洼地、田边等潮湿地方。

多见于我国南方各省。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能 辛平。疏风解表，消肿止痛。

主治用法 (1)风热或风寒感冒，服后有发汗作用；(2)百日咳，支气管炎，咽喉肿痛；(3)疟疾；(4)蛇咬伤，皮肤疮疖，跌打扭伤；(5)皮肤搔痒。

每用干品 1～2 两，水煎服。亦有人作糖浆治小儿百日咳。蛇伤、疖肿、跌打用鲜品捣烂外敷。皮肤搔痒，煎水外洗。



图 8　水蜈蚣(莎草科，水蜈蚣属)

Kyllinga brevifolia Rottb.

水　　翁

别名　水榕。

识别特征　(1) 乔木，高可达 15 米。常生于水边，有时根伸入水中，故称“水翁”。小枝圆柱形或四棱形，茎皮厚。

(2) 叶对生，椭圆形，长 7～22 厘米，宽 2.5～7.5 厘米，每侧有侧脉 8～12 条在边缘联结，干时叶的背面有黑斑点。

(3) 花小，绿白色。果球形，直径约 1 厘米，熟时紫黑色。

生长环境　喜生于水边、山谷。

多见于广东、广西。

采集加工　药用花、枝皮、叶。夏秋采收，晒干备用。

性味功能　苦寒。花：清热，解表，消滞。皮叶：清热去湿。

主治用法　(1)夏季感冒，消化不良，腹部闷胀，每用干花 1 两，水煎服(亦可作凉茶)。(2)皮煎水外洗，治皮肤搔痒。(3)嫩叶捣烂加酒敷乳腺炎。




图 9　水翁(桃金娘科，水榕属)

Cleistocalyx operculatus (Roxb.)
Merr. et Perry

玉叶金花

别名 白纸扇、凉茶藤、白头公。

识别特征 (1) 藤状灌木，高1～3米，小枝有柔毛。

(2) 叶对生，两面有毛，卵状披针形，长5～8厘米，宽2～3.5厘米。

(3) 花黄色，管状，常有一枚叶状白色萼片相衬，所以叫“玉叶金花”或“白纸扇”。

(4) 果圆球形，揉碎后有粘性。

生长环境 生于山坡、林缘、村边灌木丛。我国东南至西南部均有分布。

采集加工 药用藤叶，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 甘淡凉。清热解表。

主治用法 (1)流感，感冒，中暑；(2)支气管炎，扁桃体炎，咽喉炎；(3)肾炎水肿，肠炎腹泻；(4)蛇咬伤。

每用干品5钱～1两，水煎服。常作凉茶配料。



图 10　玉叶金花(茜草科，玉叶金花属)

Mussaenda pubescens Ait. f.

过山龙(细脉斑鸠菊)

别名　发痧藤。

识别特征　(1) 藤本，有微毛，茎外皮棕褐色，扭屈枝条时，吱吱作响，嚼之有苦味。

(2) 叶互生，椭圆状披针形，长3.5～8厘米，柄短，通常全缘，上面有微毛。

(3) 头状花序，直径约1厘米，花淡紫红色。

生长环境　喜生于山沟、溪边或山路旁的疏林、灌木丛中。

见于广东、海南。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦微温。舒筋活络，祛风解表。

主治用法　(1)风湿痛，腰肌劳损；(2)感冒发热，疟疾。

每用干品5錢～1两，治疟疾每用4两，水煎服。孕妇忌服。



图 11　过山龙(菊科，斑鳩菊属)

Vernonia andersonii Clarke

苍　耳

别名　苍耳草、苍子。

识别特征　(1) 一年生粗壮草本，高约 1 米，茎有明显的纵棱，有毛。

(2) 叶互生，心形，长 6～15 厘米，边缘有不规则的齿裂，基部有明显三条主脉。

(3) 花淡绿色，为顶生或腋生头状花序。

(4) 果倒卵形，绿色或黄色，有小钩刺。

生长环境　喜生于村边，荒地。

全国各地均有分布。

采集加工　药用全草及果实。果实于秋冬成熟时采集，晒干备用。全草夏秋采集，洗净，晒干备用。

性味功能　果甘溫，根微苦平，有小毒。祛风散寒，通窍活络，化滞止痛。

主治用法　(1) 风寒感冒（用全草）；(2) 上頷竇炎，鼻炎，耳鸣，耳聋（用果）；(3) 近人用根治高血压，头晕，头痛；用全草与槟榔治血吸虫病；单用全草治麻疯。

每用干品 1～1.5 两，干根 5 錢～1 两，果实 2～3 錢，水煎服。

鮮品捣烂外敷乳疮、外伤出血，煎水外洗荨麻疹。



图 12　苍耳(菊科，苍耳属)

Xanthium sibiricum Patrin.

牡　荆

别名　五指柑。

识别特征　(1) 落叶灌木或小乔木，高 2～5 米。茎四棱形，嫩枝有灰色绒毛，茎叶有香气。

(2) 叶对生，为掌状复叶，有小叶 3～5 片，顶生 3 小叶，椭圆形或椭圆状披针形，长 6～9 厘米，宽 2～3 厘米，侧生 2 小叶，边缘有锯齿。

(3) 圆锥花序顶生，花淡紫色。果长圆形，熟时棕色。

生长环境　喜生于村边、路旁或田野山坡地。

主产于我国长江以南地区。

采集加工　叶、子皆入药。夏秋采叶，秋天采子，晒干备用。

性味功能　微辛苦平。解表化湿。

主治用法　(1)流感，感冒、肠炎，痢疾，每用干品 4 錢～6 錢，鲜叶 1～2 两，水煎服；肠炎、痢疾亦可用种子研粉，每服 0.5～1 錢。(2)咳嗽，哮喘，用子，煎水，研粉或制糖浆内服。(3)皮炎，湿疹，脚癣，用叶煎水外洗。




图 13　牡荆(马鞭草科，牡荆属)

Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc.

附：黄　　荆

黄荆，亦名五指柑、布荆，与牡荆相似，但叶背密被白色绒毛，呈粉白色，叶缘无或只有小锯齿，可以相区别。两者功用相同，均可入药。



图 13-1　黄荆（马鞭草科，牡荆属）

Vitex negundo L.

防　风　草

别名　排风草、土藿香、落马衣、秽草。

识别特征　(1) 1～2 年生直立草本，高 1～2 米。茎四方形，有毛。

(2) 叶对生，卵圆形，长 4～10 厘米，边缘有疏齿，揉碎有难闻气味，所以又叫“秽草”。

(3) 花腋生，密集成花轮，淡紫红色，二唇形。小坚果，圆形，熟时黑褐色。

生长环境　喜生于山边、坡地、村边潮湿处。

多见于长江以南地区。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把或切段备用。

性味功能　辛苦微温。祛风解表，消肿止痛。

主治用法　(1)风湿骨痛；(2)感冒发热，呕吐腹痛；(3)皮肤湿疹，搔痒。

每用干品 3～5 錢，水煎服。外用适量煎水洗患处。



图 14　防风草(唇形科，防风草属)

Anisomeles indica (L.) O. Ktze.

1.花枝；2.花；3.雄蕊和花冠；4.雌蕊和花萼。

茉　莉　花

识别特征　(1) 常绿藤状灌木，高约 1 米左右，小枝有短毛，稍有棱角。

(2) 叶对生，椭圆形，长 5～9 厘米，宽约 3.5～5.5 厘米。

(3) 花白色，甚芳香。

生长环境　各地有栽培。

主产于我国南方。

采集加工　药用花、叶、根。夏秋采花蕾及初开放花朵，采后，晒干备用。

性味功能　辛凉。花、叶：清热解表；根：止痛（有毒）。

主治用法　(1)外感发热，腹胀腹泻，每用干花或干叶 1～2 錢，与它药配合，水煎服。(2)目赤肿痛，用干花煎水洗眼。(3)跌打骨折，每用根少许配合他药作散外敷。




图 15　茉莉花(木犀科，素馨属)

Jasminum sambac (L.) Ait.

狗 肝 菜

别名 金龙棒、青蛇仔、梨根青。

识别特征 (1) 一年或二年生草本，高约30～80厘米，下部常伏地，枝条披散。茎有四条线棱，节膨大成膝状。

(2) 叶对生，卵形，长2～7厘米，宽2～4厘米，先端急尖至渐尖，上面青绿色，纸质。

(3) 花唇形，淡紫红色，长约1.3厘米，花的叶状苞片比九头狮子草小。

生长环境 喜生于村前、屋后、荒地、路旁、草丛、沟边阴湿处。

多见于我国南方。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能 甘淡凉。清热凉血，生津利尿。

主治用法 (1)感冒高烧，风湿性关节炎，麻疹，每用干品1～4两，鲜品4～8两，水煎服。(2)带状疱疹，疖肿，用鲜品捣烂外敷。



图 16　狗肝菜(爵床科，狗肝菜属)

Dicliptera chinensis (L.) Nees

相 思 子*

别名 相思豆、相思藤、红豆。

识别特征 (1) 草质藤本，长可达数米，全株无毛，枝、叶、根均稍有甜味。

(2) 叶互生，偶数羽状复叶；小叶8～15对，对生，长方形，长约1厘米，宽不到0.5厘米，易脱落。

(3) 花小，红色，生在叶腋。花后结斜长圆形多数豆荚，种子椭圆形，绿豆大，三分之二是红色，三分之一为黑色，有毒。

(4) 根，外皮灰黄色，柔韧。

生长环境 喜生于山边、疏林灌木丛、近海荒地。

主产于云南、广东、广西、台湾。

采集加工 药用根及种子。冬春采子；全年采根。根，切片，晒干备用。

性味功能 根，甘平。清暑解表。种子，有大毒（不能内服），杀虫，拔毒排脓。

主治用法 (1)咽喉肿痛，每次用干根2～3錢，水煎服。(2)疥癣，痈疮，用子研粉调涂。(3)根亦作凉茶配料。

注 相思豆毒性强烈，含有多种毒蛋白。中毒症状是腹泻、呕吐，虚脱，尿闭，幻视，溶血。用时要特别慎重。




图 17　相思子(蝶形花科，相思子属)

Abrus precatorius L.

星 宿 菜

别名 黄鳝草、大田基黄。

识别特征 (1) 多年生直立草本，高 40～60 厘米，基部近淡褐色或红色，根皮红色。

(2) 叶互生或近对生，矩圆状披针形，长 5～11 厘米，宽 2～3 厘米，背面有黄色腺点。

(3) 花白色，顶生总状花序。果球形，直径约 0.3 厘米。

生长环境 多生于路旁、溪边草丛、稻田埂。

产于我国东南、华南各省。

采集加工 药用全草，夏季采集。洗净，晒干，切段或扎把备用。

性味功能 淡凉。清热解表，凉血散瘀。

主治用法 (1)感冒，流感，急性结膜炎；(2)急慢性肝炎；(3)白带过多；(4)蛇咬伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。用鲜品捣烂酒调敷蛇伤。



图 18　星宿菜(报春花科，珍珠菜属)

Lysimachia fortunei Maxim.

1.花枝；2.花(放大)；3.根；4.果序的一部分。

鸭　脚　木

别名　伞托树、鹅掌柴。

识别特征　(1) 常绿乔木。树皮粗厚，灰白色，小枝有皮孔，并具白色髓心，有特殊气味。

(2) 叶互生，为掌状复叶，总柄长达25厘米，小叶6～8片，长卵圆形，长7～17厘米，宽3～6厘米。

(3) 花小，白色，集成伞形花序，芳香。果球形，直径约0.5厘米，熟时紫色。

生长环境　喜生于山地、沟边的疏林或灌木丛中。

产于我国长江以南各省。

采集加工　药用皮、叶，全年可采。皮，洗净，蒸透，切片，晒干备用。

性味功能　苦涩凉，微香。发汗解表，祛风除湿。

主治用法　(1)流感发热，咽喉肿痛，风湿骨痛，跌打瘀积肿痛，每用干皮5錢～1两，水煎服。(2)皮炎、湿疹，可用叶煎水外洗。




图 19　鸭脚木(五加科，鹅掌柴属)

Schefflera octophylla (Lour.) Harms.

倒　扣　草

别名　倒钩草、倒刺草。

识别特征　(1) 一年或二年生草本，高可达1米，全株有柔毛。茎直立或半直立，分枝较多，呈四棱形，节膨大成膝状，入秋地上部分成暗红色。

(2) 叶对生，倒卵形，长4～10厘米，宽1.5～4厘米，先端常钝圆。

(3) 顶生穗状花序，象一个长鞭，小苞片的尖象刺一样，摸之刺手。

生长环境　喜生于耕地、荒地、路旁、村边草丛中。

主产于长江以南各地。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热解表，利水通淋。

主治用法　(1)感冒发热，暑热头痛，疟疾，痢疾；(2)尿路结石，慢性肾炎。

每用干品1～2两，煎水服。




图 20　倒扣草(苋科，牛膝属)

Achyranthes aspera L.

凉 粉 草

别名 仙人冻、仙草。

识别特征 (1) 一年生草本，高 15～45 厘米。茎方形，下部伏地，上部直立，被疏长毛。

(2) 叶对生，卵形或卵状矩圆形，长 2～4 厘米，揉碎后有粘手感。枝叶加水煎汁可制凉粉，故称“凉粉草”。

(3) 花小，淡红色，二唇形，多朵成一花轮，再集成顶生的总状花序。

生长环境 喜生于坡地、沟谷的小杂草丛中。

产于我国南部各地。

采集加工 药用全草，春夏采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 甘淡凉。清热解暑。

主治用法 (1)中暑感冒；(2)高血压；(3)肌肉、关节疼痛；(4)糖尿病。

每用干品 1～2 两，水煎服。



图 21　凉粉草(唇形科，仙草属)

Mesona chinensis Benth.

桑　　树

别名　白桑。

识别特征　(1) 落叶小乔木，通常高 2～5 米。嫩枝有毛，老枝灰白色，有皮孔，全株有白色乳汁。

(2) 叶互生，卵形或广卵形，长 5～10 厘米，宽 4～8 厘米，边缘有锯齿，基出三脉。

(3) 果腋生，由多数小果聚合而成，肉质，长 1～2.5 厘米，熟时紫红色，酸甜可食，即桑椹。

(4) 根黄色。

生长环境　多为栽培，亦有野生。全国各地均有分布。

采集加工　药用根、皮、果实、枝、叶，5～6 月采枝，8～9 月采果，秋后采叶及根，果蒸后晒干。

性味功能　桑白皮(根)，甘寒，泻肺利水；枝，苦平，祛风湿；叶，甘寒，散风热；果，甘酸平，补肝肾。

主治用法　(1)皮，治肺热咳嗽吐血，皮肤水肿，每用 3～5 錢，水煎服。(2)桑枝，治风湿关节炎，腰腿痛，每用 3～5 錢，水煎服。(3)叶，治风热感冒，咳嗽，每用 2～3 錢，水煎服。(4)桑椹，治慢性肝炎，贫血，神经衰弱，每用 3～5 錢，水煎服。



图 22　桑树(桑科，桑属)

Morus alba L.

1.着雌花的枝；2.着雄花的枝；3.雄花；4.雌花。

排 钱 草

别名 尖叶阿婆錢、牌錢树、笠碗子树。

识别特征 (1) 直立小灌木，高0.5～1米。茎有短绒毛，且有棱线。

(2) 叶互生，为羽状3小叶，小叶卵状长圆形，长6～10厘米，侧生小叶长约为顶生小叶的一半，背面有绒毛。

(3) 花白色，包藏在一长串小硬币样叶状苞片內，故名"排錢草"。果为多数荚果。

生长环境 喜生于山野、旷地、路旁灌木丛中。

主产于云南、广东、广西、福建、台湾。

采集加工 药用根、叶。夏秋采叶，全年采根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能 淡涩凉。解表清热，活血散瘀。

主治用法 (1)感冒发热，每用干叶3～6錢，水煎服。(2)疟疾，肝脾肿大，风湿骨痛，跌打瘀肿，每用干根5錢～1两，水煎服。(3)妇女血崩，用根炭5錢～1两，水煎服。



图 23　排錢草(蝶形花科，山绿豆属)

Desmodium pulchellum (L.) Desv.

附：毛排錢草

毛排錢草，形态与排錢草相似，区别点是：小叶、苞片、萼、荚果都被绒毛，荚果有荚节3～4个。功用相同。



图 23-1　毛排錢草(蝶形花科，山绿豆属)

Desmodium blandum Van Meeuwen

黄牛茶(黄牛木)

别名　雀笼木。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高 2～10 米。树皮淡黄色，光滑，似黄牛皮，故称“黄牛木”。

(2) 叶对生，椭圆形至长椭圆形，长 5～9 厘米，宽 2～3.5 厘米，两面无毛，有微小黑色小腺点。

(3) 花序腋生或侧生，有花 2～3 朵，粉红色。蒴果，椭圆形。

生长环境　喜生于荒野灌木丛或村边、路旁、山谷疏林中。

产于我国南部各地。

采集加工　药用根、树皮、嫩叶。根、皮全年可采，洗净，切碎，晒干备用；叶，春夏采集，晾干。

性味功能　甘淡微苦凉。清热解暑，化湿消滞。

主治用法　(1)感冒发热；(2)肠炎腹泻；(3)咳嗽声嘶。

每用干根或皮 5 錢～1 两，或叶 3～5 錢，水煎服。嫩叶作茶，可预防感冒、痢疾。



图 24　黃牛茶(金絲桃科，黃牛木屬)

Cratoxylon ligustrinum　(Spach.) Bl.

黄　皮

别名　黄弹子。

识别特征　(1) 乔木，高 5～10 米。小枝、叶柄、嫩叶背、花序轴均有小疣体和软毛。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，小叶 5～13 片，椭圆形，先端尖，基部偏斜，长 6～13 厘米，宽 2.5～6 厘米，有油点及香气。

(3) 花白色。果近球形，果皮黄色，肉白色，味甜酸。

生长环境　为栽培的果树。

多见于广东、广西、福建、台湾、云南。

采集加工　药用叶、核。夏季收核，秋季采叶(早采影响结实)，阴干备用。

性味功能　苦辛微温。疏风解表，行气止痛。

主治用法　(1)流感，感冒，疟疾，每用干叶 5 錢～1 两，水煎服。(2)胃痛，腹部痉挛性疼痛，用核 3～5 錢，水煎服。



图 25　黄皮(芸香科，黄皮属)

Clausena lansium (Lour.) Skeels

野芫荽(洋芫荽)

别名　香信、假芫茜。

识别特征　(1) 多年生草本，高 20～40 厘米，全株有特异香气。

(2) 根生叶倒披针形，长 10～18 厘米，宽 3～5 厘米，边缘有刺状齿。

(3) 花茎直立，有纵槽纹，中部以上分枝，有短硬而具疏刺的叶，花白色或淡绿色。果极小。

生长环境　喜生于村边、路旁、荒野草地。

主产于广东、广西。

采集加工　药用全草。采后，阴干备用。

性味功能　微苦辛温。疏风除热，芳香健胃。

主治用法　(1)感冒胸痛；(2)消化不良，胃肠不适，肠炎腹泻；(3)蛇咬伤。

每用干品 3～5 錢，水煎服。



图 26　野芫荽(伞形科，洋芫荽属)

Eryngium foetidum L.

野　葛

别名　苦葛。

识别特征　(1) 革质藤本。茎青绿色，有条纹，长可达数米。

(2) 叶互生为羽状 3 小叶，小叶菱形，顶生小叶较大，直径 5～12 厘米，侧生小叶较小，斜卵形。

(3) 花紫色，顶生或腋生。花后结长椭圆形、扁平的豆荚。

(4) 块根圆柱形，粉质，外皮灰黄色，味微甜而苦。

生长环境　生于路边、山坡草丛或灌木丛中。我国大部地区均有分布。

采集加工　药用根及花。秋冬采根，洗净，刮去外皮，切片，晒干备用。夏秋采花，晒干备用。

性味功能　甘平。清热解表，生津止渴，透发麻疹。

主治用法　(1)外感风寒，头痛，无汗，怕风；(2)麻疹未透；(3)肠炎，痢疾；(4)慢性酒精中毒。

每用干根 3～5 錢，水煎服。慢性酒精中毒，用花 2～3 錢，水煎服。




图 27　野葛(蝶形花科，葛属)

Pueraria thunbergiana (S. et Z.) Benth.

紫　　苏

别名　红紫苏。

识别特征　(1) 一年生草本，高 1 米左右。茎近四方形，绿色或红色，有毛，全株有香气。

(2) 叶对生，卵形或卵圆形，长 4～11 厘米，宽 2.5～9 厘米，边缘有锯齿，上面绿色，下面紫色，或两面均为紫色，故称"紫苏"。

(3) 总状花序腋生或顶生，花冠紫红色。小坚果倒卵圆形。

生长环境　野生于村边、路旁或荒地，但也常有栽培。

长江以南各省有野生，全国各地均有栽培。

采集加工　药用茎，叶及种子，秋季采集。阴干备用。

性味功能　辛温，有香气。发散风寒，理气宽胸，舒郁化痰，解鱼蟹毒。

主治用法　(1)苏叶治风寒感冒，特别适用于有胃肠症状的，也治吃鱼蟹中毒，每用干品 2～5 錢，水煎服；(2)苏梗理气安胎，治疗胸闷不舒，打呃，胃肠胀气，妊娠胎动不安，每用干品 3～5 錢，水煎服；(3)苏子降气定喘，治疗咳嗽喘急，每用 1～4 錢，水煎服。




图 28　紫苏(唇形科，紫苏属)

Perilla frutescens (L.) Britt. var. crispa (Thunb.) Decne

附：白　　苏

白苏，多为野生，形态与紫苏相似，区别点是：白苏毛密而长，叶绿，花及小坚果为白色。功用基本相同，但不如紫苏好。




图 28-1　白苏(唇形科，紫苏属)

Perilla frutescens (L.) Britt.

鹅不食草(石胡荽)

别名　地胡椒、球子草、小拳头。

识别特征　(1) 一年生伏地草本，长 8～20 厘米，多分枝。茎纤细匍匐，着地后生根，有小毛，揉之有辛辣味。

(2) 叶互生，倒披针形，长 1～2 厘米，边缘上部有疏钝齿，无柄。

(3) 头状花序腋生，球形，花黄色，全为管状。

生长环境　喜生于稻田、湿润草地或洼地。

我国各省均有分布。

采集加工　药用全草，春夏可采。洗净，晒干备用。

性味功能　辛溫。通窍散湿，祛风消肿。

主治用法　(1)过敏性鼻炎，慢性鼻炎，常作成软膏剂。即将鹅不食草研为细粉，加少许冰片或薄荷，作成 10% 凡士林软膏，涂鼻粘膜。(2)百日咳，疟疾。(3)风湿性腰腿痛。(4)跌打骨折，毒蛇咬伤。

每用干品 1～3 錢，或鲜品 3～5 錢，水煎服。外用鲜品捣烂敷跌打扭伤及蛇伤。




图 29　鹅不食草(菊科，石胡荽属)

Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.

绿　薄　荷

别名　留兰香、香花菜。

识别特征　(1)多年生草本，高约 1 米。分枝极多，茎枝深紫色或深绿色，有香气。

(2) 叶对生，长椭圆形，长 5～9 厘米，宽约 3 厘米，边缘有尖齿，上面皱缩。

(3) 花小，白色，二唇形，略带淡紫色，轮状，排成顶生穗状花序。

生长环境　为栽培植物，喜生于较湿润的地方。

采集加工　药用叶及嫩枝，全年可采。多为鲜用。

性味功能　甘微温，气芳香。祛风散寒。

主治用法　(1)感冒咳嗽，虚劳咳嗽；(2)胃肠胀气。

每用鲜品 5 錢～1 两，水煎服。



图 30　绿薄荷(唇形科，薄荷属)

Mentha viridis L.

1.枝叶；2.花。

蜂窝草(锡绣防风)

别名　蜂巢草。

识别特征　(1) 一年生草本，高近 80 厘米，全株有绒毛，茎四棱形，多分枝。

(2) 叶对生，卵状披针形，长 3～5 厘米，边缘有粗齿。

(3) 花腋生，集成轮状，唇形，白色，花落后留下很多残存的花萼，形状象蜂窝，故称“蜂窝草”。

生长环境　生于村边、路旁、荒野草丛中。

主产于广东、广西。

采集加工　药用全草，夏秋采集。切碎，晒干备用。

性味功能　苦辛温，芳香。驱风解表，止咳化痰。

主治用法　(1)感冒，咳嗽；(2)风火牙痛，肠胃不适；(3)百日咳。

每用干品 3～5 錢，水煎服。




图 31　蜂窝草(唇形科，绣球防风属)

Leucas zeylanica (L.) R. Br.

路边菊（鸡儿肠）

别名　马兰。

识别特征　(1) 多年生草本，高 30～60 厘米。根茎柔弱匍匐状，地上茎瘦圆。

(2) 叶互生，矩圆状披针形，长 3～4 厘米，近无柄，边缘有疏齿。

(3) 头状花序，直径约 0.6 厘米，中央为黄色管状花，外围为紫色舌状花。

(4) 果小，无冠毛。

生长环境　喜生于坡地、田边、沟边潮湿处。

产于我国南部各省。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切段晒干。

性味功能　辛苦凉。清热解表，健脾去积。

主治用法　(1) 外感风热，肝炎，消化不良，胃溃疡。每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(2)中耳炎，用鲜根捣烂醋调取汁滴耳。(3)疖肿，用叶捣烂外敷。



图 32　路边菊(菊科，鸡儿肠属)

Boltonia indica (L.) Benth.

榕　　树

别名　细叶榕、正榕。

识别特征　(1) 常绿大乔木，高可达 20 余米，分枝茂密，枝上生多数气根，即榕树须，枝叶折断有白色乳汁。

(2) 叶互生，卵状椭圆形或倒卵形，长 4～8 厘米，宽 2～4 厘米，上面光亮，基出三脉。

(3) 花序扁球形，腋生，外形似果(无花果)，熟时黄红色。

生长环境　多生于山谷、平地、村旁，也有栽培。

产于广东、广西、云南、福建、浙江、贵州、台湾。

采集加工　药用气根（榕树须)，全年可采。晒干备用。

性味功能　淡凉。清热解表，发汗透疹。

主治用法　流感，感冒，扁桃体炎，眼结膜炎，疟疾，百日咳，麻疹不透。

每用干品 1～3 錢，水煎服。煎水外洗可治湿疹、阴痒。




图 33　榕树(桑科，榕属)

Ficus microcarpa L.

薄　荷

别名　蕃荷菜。

识别特征　(1) 多年生草本，高达 50 厘米。茎方形，下部伏地，全株有强烈薄荷香气。

(2) 叶对生，卵形，或矩圆状卵形，长 2～5 厘米，边缘有小锯齿，两面有疏毛。

(3) 花细小，淡红色，紫色或白色，轮生于叶腋成头状花序。小坚果，长卵圆形，淡褐色。

生长环境　我国各省均有栽培。

采集加工　药用茎、叶。在南方夏秋割两次，割后要摊开阴干，扎把备用。

性味功能　辛凉，气香。清热解表，祛风消肿，止痒。

主治用法　(1)风热感冒，头痛，咽喉炎，咳嗽；(2)宿食不消，心腹胀气；(3)皮肤搔痒。

每用干品 1～3 錢，鲜品 2～8 錢，水煎服。外用适量煎水洗患处。



图 34　薄荷(唇形科，薄荷属)

Mentha arvensis L.

二、清热解毒类

（适应各种炎症、中毒、菌痢、热性病、疔疮等疾病）

八　角　莲

别名　八角盘、六角莲、独叶一枝花。

识别特征　(1) 多年生草本。地下茎块状，粉质，白色，地上茎短，直立。

(2) 叶 1 片，很少 2 片，盾形，有 4～9 个角，直径 12～25 厘米，基出掌状脉 4～8 条，叶柄长 13～18 厘米。

(3) 花暗紫色。果卵圆形、熟时黑色。

生长环境　多生于大山接近山顶的深谷或湿润草丛中。

主产于广东、广西、江西、四川等省区。

采集加工　药用根块，全年可采。洗净，去须根，晒干备用。

性味功能　甘微苦凉，有小毒。清热解毒，燥湿泻火。

主治用法　(1)淋巴结炎，腮腺炎；(2)痈疮，疖肿，毒蛇咬伤。

每用干品 2～3 錢，水煎服。用鮮根或干根搗烂外敷或研末加酒醋调涂局部治蛇伤、痈疮疖肿。




图 35　八角莲(小檗科，八角莲属)
Dysosma pleianthum (Hance.) Woods.
1. 植物全形；2. 根茎；3. 果枝；4. 叶(放大)。

三 棓 苦

别名 三叉虎、斑鸠花、三枝枪。

识别特征 (1) 灌木或小乔木，通常高 2～5 米。树皮灰白色，全株味苦。

(2) 叶对生，为指状 3 小叶，有长叶柄。小叶片两端尖，椭圆状披针形，长 7～12 厘米，宽 2～5 厘米。有油点。

(3) 花黄白色，小，集成腋生圆锥花序。果内含 4 枚黑色种子，果皮尝之有麻辣味。

(4) 根皮白色，须根很少。

生长环境 生于林边、丘陵、山谷、溪边、灌木丛中。

主产于我国南部各地。

采集加工 药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用；叶阴干备用。

性味功能 苦寒。清热解毒，燥湿止痒。

主治用法 (1)防治流感、流脑、乙型脑炎，治疗扁桃体炎，咽喉炎，黄疸型肝炎，每用干叶 3～5 錢，水煎服。(2)风湿性关节炎，坐骨神经痛，腰腿痛，每用干根 3 錢～1 两，水煎服。(3)虫蛇咬伤，疖肿，跌打扭伤，用鲜叶捣烂外敷。(4)湿疹、皮炎、痔疮，用叶煎水外洗。



图 36　三桠苦(芸香科，吴茱萸属)

Evodia lepta (Spreng) Merr.

1.植物之一部分；2.果实。

土牛膝(兰草)

别名 六月霜、多须公、大泽兰。

识别特征 (1) 多年生直立亚灌木状草本，高可达 2 米。茎圆柱形，有褐红色斑和细纵条纹。

(2) 叶对生，尖卵形或卵状披针形，长 3～11 厘米，宽 2～5 厘米，有疏齿。

(3) 顶生头状花序，花白色，夏秋开花，布满全株，好象被上霜雪，所以又叫“六月雪”。

(4) 根多数，条状，圆柱形，故又称“多须公”。

生长环境 喜生于旷地、山坡及草地上。

我国南部及西南部各省均有分布。

采集加工 药用根。于秋冬或初春采挖，洗净，切段，晒干备用。

性味功能 苦凉。清咽利喉，清热解毒。

主治用法 (1)为喉科常用药，用于防治白喉，治疗扁桃体炎，咽喉炎；(2)感冒高烧，麻疹肺炎；(3)痈疽疖肿，毒蛇咬伤。

每用干根 3～5 錢，鲜用 1～2 两，水煎服。

蛇伤肿毒，取叶捣烂敷患处。

孕妇忌用。



图 37　土牛膝(菊科，泽兰属)

Eupatorium chinense L.

大　　青

别名　淡婆婆、猪屎青、路边青。

识别特征　(1) 灌木，高可达 1.5 米。嫩茎青绿色。

(2) 叶对生，长椭圆形，长 6～18 厘米，宽 2.5～7 厘米，揉碎有臭味。

(3) 花白色，顶生，集成聚伞花序。果卵圆形，黄豆大，熟时紫红色。

生长环境　喜生于荒地、田头、路边、村旁的草地上。

主产于我国长江以南各省。

采集加工　药用根、叶。叶，夏秋采集，洗净晒干；根，秋季采，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热泻火，凉血解毒，散瘀止血。

主治用法　(1)肠炎，菌痢；(2)咽喉炎，扁桃体炎，腮腺炎，感冒发热；(3)齿龈出血。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 2～4 两，水煎服。外用鲜叶捣烂敷疮疡。




图 38　大青(马鞭草科，赪桐属)

Clerodendron cyrtophyllum Turcz.

大　沙　叶

别名　大叶满天星。

识别特征　(1) 灌木，高 1～4 米，小枝有棱和有明显的节。

(2) 叶对生，椭圆状披针形，长 8～15 厘米，宽 3～6 厘米。叶上散生多数突起的小“痣点”。

(3) 花白色，生于小枝的顶部。果球形，直径约 6 毫米，干后变黑，有皱纹。

生长环境　喜生于山地、路旁、林缘或疏林下。

多产于广东各地。

采集加工　全株入药，四季可采。洗净，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热解毒，活血去瘀。

主治用法　(1)感冒发热，防治中暑；(2)肝炎；(3)跌打损伤。

每用干品 5～8 錢，水煎服，或煎水当茶饮。



图 39　大沙叶(茜草科，大沙叶属)

Pavetta hongkongensis Brem.

山　芝　麻

别名　山油麻、岗芝麻、假芝麻。

识别特征　(1) 灌木，高约 1 米，分枝较少。小枝有绒毛，茎皮纤维丰富。

(2) 叶互生，长圆状披针形，长 4～8 厘米，宽 1.5～2.5 厘米，上面近无毛，背面有灰白色绒毛，叶脉特点是基出三脉。

(3) 花淡紫色，生在叶腋。果外形如芝麻果，有毛。

(4) 根直生，较粗壮，皮黑色，尝之很苦。

生长环境　喜生于荒山、丘陵、荒坡、路边向阳干旱地带。

主产于我国南方各地。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热解毒，消肿止痒。

主治用法　(1)感冒高热不退，扁桃体炎，咽喉炎，肠炎腹泻，每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(2)毒蛇咬伤，腮腺炎，皮肤湿疹，用干根研粉，米酒调涂患处。



图 40　山芝麻(梧桐科，山芝麻属)

Helicteres angustifolia L.

1.花枝；2.果。

千　里　光

别名　千里及、九里明。

识别特征　(1) 多年生藤本，攀援状，高达1～2米。茎木质，有纵条纹，稍呈“之”字形上升，有微毛。

(2) 叶互生，具短柄，通常椭圆状披针形，长4～12厘米，边缘有粗齿，两面有小毛。

(3) 头状花序多数，花黄色，直径约1厘米。果圆筒状，长约4毫米，冠有白色毛。

生长环境　喜生于向阳山坡、林缘、灌木丛中。

主产于我国南方大部地区。

采集加工　药用全草，全年可采。鲜用或洗净晒干备用。

性味功能　微苦凉。清热解毒，去腐生肌，清肝明目。

主治用法　(1)疮疖痈肿，湿疹，皮炎，毒蛇咬伤；(2)急性结膜炎；(3)咽喉肿痛。

每用干品5钱～1两，水煎服。外用鲜品捣烂敷患处，治眼病煎水熏洗。



图 41　千里光(菊科，千里光属)

Senecia scandens Buch-Ham.

水杨梅(水团花)

别名　假杨梅、穿鱼柳。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高可达 4 米。小枝柔弱而有明显的白色皮孔。

(2) 叶对生，光滑，倒披针形，长 4～12 厘米，宽 1.5～3 厘米，柄长。

(3) 花白色，腋生或顶生，有长柄，集成圆的头状花序，但较风箱树略小。

(4) 根系发达，不怕砍伐，根皮棕色。

生长环境　生于河岸溪边、山谷疏林下潮湿地方，亦见于山坡路旁。

主产于我国南部地区。

采集加工　药用根、花、果、叶。根全年可采，洗净切片晒干备用。花果于将开放时采集，晒干用或鲜用。叶多鲜用。

性味功能　苦涩凉。清热解毒，散瘀止痛。

主治用法　(1)感冒发热，上呼吸道炎，腮腺炎(用根)；(2)痢疾，急性胃肠炎(用花果)；(3)跌打扭伤，骨折(用叶)。

每用干根 5 錢～1 两，鲜根 1～2 两，水煎服。花果 3～5 錢，水煎服。跌打损伤，用鲜叶(量不拘)捣敷患处。



图 42　水杨梅(茜草科，水团花属)

Adina pilulifera (Lam.) Franch ex Drake

六角英(爵床)

别名　鼠尾红、大鸭草、小青草。

识别特征　(1) 一年生草本，伏地或披散，长10～40厘米。茎绿色有毛，表面多具纵棱六条，故称“六角英”，节稍膨大呈膝状。

(2) 叶对生，有短毛，椭圆形，长1～2厘米。

(3) 花小，粉红色，唇形，密集成穗状。果线形，有毛。

生长环境　喜生于草地、田边、山坡阴湿地。

我国大部分地区有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　微苦凉。清热解毒，消滞散瘀。

主治用法　(1)感冒发烧，咽喉肿痛；(2)小儿疳积；(3)痈疮疖肿，乳痈；(4)肝炎；(5)跌打损伤。

每用干品3～4錢，鲜品1两，水煎服。外用鲜品捣烂敷局部。




图 43　六角英(爵床科，爵床属)

Justicia procumbens L.

六　棱　菊

别名　三棱艾、鸡着裤、六耳棱。

识别特征　(1) 多年生粗壮草本，高 0.4～1 米，多分枝。茎枝有绿色的翅，密生淡黄色的短毛。

(2) 叶互生，椭圆形，长 5～10 厘米，上部叶较小，边缘有疏齿，基部渐窄，下延成翅，与茎上的翅相连。

(3) 头状花序多数，花白而略带粉红。

生长环境　喜生于干旱山坡、路边。

多见于广东、广西、云南、福建。

采集加工　药用全草，夏季采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　辛微温，气微香。消肿拔毒，散瘀止痛。

主治用法　(1)为敷疮常用药，疮疖肿毒，烧烫伤，皮肤湿疹，跌打损伤，毒蛇咬伤，可以捣烂外敷患处，或煎水外洗；(2)风湿骨痛，肾炎水肿，每用干品 0.5～1 两，水煎服。



图 44　六棱菊(菊科，臭灵丹属)

Laggera alata (Roxb.) Sch.-Bip.

1.花枝；2.叶枝(示叶基部下延成翅)。

附：六　耳　铃

六耳铃，也是菊科艾纳香属的一种，功用和六棱菊相似。




图 44-1　六耳铃(菊科，艾纳香属)

Blumea sinuata (Lour.) Merr.

古 山 龙

别名 黄连藤。

识别特征 (1) 木质大藤本。老茎具纵条纹，藤直径可达碗口粗细，表皮褐色，断面鲜黄色，味极苦，故称“黄连藤”。

(2) 叶互生，广卵形，长 5～15 厘米，宽 10 厘米左右，基出 3～5 脉，叶柄长。

(3) 花细小，腋生。核果长圆形，长约 3 厘米，黄色。

(4) 根黄色。

生长环境 喜生于大山森林谷地或山腰密林中。

主产于广东海南、云南。

采集加工 药用藤茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 苦寒，有小毒。清热解毒。

主治用法 (1)肠炎，菌痢；(2)扁桃体炎，支气管炎；(3)疖肿；(4)疟疾。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。此外，可煎水洗皮炎、湿疹、脓疱疮、脚癣感染。




图 45　古山龙(防己科，古山龙属)

Arcangelisia loureiri (Pierre) Diels

古羊藤(马莲鞍)

别名　南苦参。

识别特征　(1) 缠绕藤本。嫩枝有棕色毛，老枝无毛，折断有乳汁。

(2) 叶对生，椭圆形，基部心形。叶脉的特点是侧脉近平行排列，两面都有褐色毛。

(3) 花腋生，黄色。果两个对生，象一对"牛角"近于"一"字形排列，有棕色毛。

(4) 根纺锤形，表皮褐色，粉质。

生长环境　喜生于山野坡地、路边。

广西、广东多见。

采集加工　药用根、叶，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　甘苦凉。清热解毒。

主治用法　(1)感冒发烧；(2)肠炎腹泻，心胃气痛；(3)跌打瘀积肿痛，腰酸腿痛；(4)慢性肾炎。

每用干品 1～2 錢，水煎服，或用干根研粉，每服 5 分～1 錢。体弱虚寒者忌服。




图 46　古羊藤(萝藦科，马莲鞍属)

Streptocaulon griffthii Hook. f.

1.花枝；2.蓇葖果；3.种子。

白花草(胜红蓟)

别名　咸虾花、白花臭草、藿香蓟。

识别特征　(1) 一年生草本，高约1米。茎直立，多分枝，绿色稍带紫色，全株有粗毛，揉之有异臭，所以叫“白花臭草”。

(2) 叶对生，或近茎顶的叶互生，尖卵形，长2～4厘米，两面粗糙，边缘有钝齿。

(3) 头状花序，细小，花白色或浅蓝色，全为管状花。

生长环境　喜生于荒地、草地、田边、村前、屋后。

多产于我国南方各省。

采集加工　药用叶及嫩茎，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　微苦凉，微有异臭。清热解毒，消肿止血。

主治用法　(1)感冒发热；(2)外伤出血；(3)疮疖，湿疹。

每用干品0.5～1两，水煎服。外用鲜品捣烂敷患处；绞汁滴耳，可治中耳炎。



图 47　白花草(菊科，藿香蓟属)

Ageratum conyzoides L.

地胆头(地胆草)

别名　草鞋根、土公英、苦地胆。

识别特征　(1) 多年生草本，高一般 30～40 厘米，茎粗壮，全株有毛。

(2) 叶大部分根生，常伏地生长，矩圆状披针形，长 6～14 厘米，两面有粗糙毛，边缘有浅齿。

(3) 花淡紫色，头状花序，集于枝顶。

(4) 果纺锤形，有硬刺毛。

生长环境　喜生于田埂、山坡、路边或村旁旷野草地上。

我国南部各省均有分布。

采集加工　药用全草，春夏秋三季采集。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能　苦凉。清热解毒，利水消肿。

主治用法　(1)感冒，流感，急性扁桃体炎，咽喉炎，结膜炎；(2)毒蛇咬伤，疖肿，湿疹，下肢溃疡；(3)肾炎，脚气水肿，肝炎。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜品捣烂敷蛇伤、疖肿。鲜品煎水洗下肢溃疡、湿疹。

注：另一品种：白花地胆头，全株多茸毛，茎高60厘米左右，茎上分枝较多，叶椭圆形，花梗粗壮，开白花。功效不如本品。



图 48　地胆头(菊科，地胆草属)

Elephantopus scaber L.

老鼠拉冬瓜(马庹儿)

别名　老鼠拉金瓜。

识别特征　(1) 柔弱草质藤本，长 1～2 米，有卷须，块根薯状。

(2) 叶互生，三角状卵形，长 3～8 厘米，有钝齿或分裂，两面粗糙，有白色小斑点。

(3) 花腋生，白色。果卵状椭圆形，长 1.2～2 厘米，果柄线状，长 1.5 厘米以上。

生长环境　生于荒地灌木丛、林边、溪边及村边潮湿处。

我国南部均产。

采集加工　药用根或全草，秋季采集。洗净，切段晒干备用。

性味功能　甘苦微涩，微寒。消肿拔毒，除痰散结，清肝利水。

主治用法　(1)痈疮疖肿，皮肤湿疹；(2)咽喉肿痛，腮腺炎；(3)尿路感染、结石；(4)急性结膜炎，小儿疳积。

每用干根 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜根、叶捣烂或干根研粉调敷患处。




图 49　老鼠拉冬瓜(葫芦科，马㼎儿属)

Melothria indica Lour.

附：茅　　瓜

茅瓜，称为大种老鼠拉冬瓜，或山上老鼠拉冬瓜、土白蔹，根与瓜均比老鼠拉冬瓜为大，但用途相同。




图 49-1　茅瓜(葫芦科，马胶儿属)

Melothria heterophylla (Lour.) Cogn.

1.花枝；2.果。

耳　草

别名　鲫鱼胆草、黑心草、细叶龙胆草。

识别特征　(1) 草本，基部常伏地，高 30～60 厘米。节上生根，小枝有短粗毛，嫩时四棱形。

(2) 叶对生，卵状披针形，长 3～5 厘米，宽 2～3 厘米，上面光滑，背面常有小毛，嚼时味苦。

(3) 花白色，小而无柄，花朵聚生。

(4) 果球形，生于叶腋内，熟时不开裂。

生长环境　生于坡地、潮湿的草地。

主产于云南、广东、广西。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，鲜用或晒干备用。

性味功能　苦凉。清热解毒，散瘀消肿。

主治用法　(1)感冒发热，咽痛咳嗽，每用干品 3～5 錢，水煎服。(2)肠炎，痢疾，用法同上。(3)疮疖痈肿，乳痈，皮肤湿疹，毒蛇咬伤。用鲜叶捣烂外敷，或煎水洗患部。




图 50　耳草(茜草科，耳草属)

Oldenlandia auricularia (L.) F.-Muell.

羊蹄草(一点红)

别名 叶下红、野芥兰。

识别特征 (1) 一年生直立草本，高通常10～50厘米，有白色疏毛。

(2) 叶基生，琴形分裂，先端犁头形，上面生的叶卵状披针形，基部多少抱茎，有不规则的锯齿，叶背紫红色。

(3) 顶生头状花序，具长柄，花紫红色。

生长环境 喜生于村边、荒地、园地、路边。广东、广西、福建、贵州、湖南等地多见。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能 苦凉。清热解毒，消炎利水。

主治用法 (1)感冒发烧，咽喉肿痛，口腔溃疡；(2)外伤感染，疖肿疮疡，皮肤湿疹，跌打扭伤，铁釘刺伤；(3)肠炎，痢疾；(4)尿路感染；(5)蛇咬伤。

每用鲜品4～8两，干品5錢～1两，水煎服。外用鲜品捣烂敷患处，拔脓的作用较好。皮炎湿疹可以煎水外洗。



图 51　羊蹄草(菊科，一点红属)

Emilia sonchifolia (L.) DC.

1.植物全形；2.花(放大)。

岗　　梅(梅叶冬青)

别名　假青梅、秤星木、点秤根。

识别特征　(1) 灌木，高 1～2 米。茎枝上有白色皮孔。

(2) 叶互生，膜质，阔卵形长 3～8 厘米，宽 2～5 厘米，边缘有疏齿，背面有细腺点。

(3) 花白色，腋生。果卵圆形，有棱，黄豆大小，熟时黑色。

(4) 根较粗壮，黄白色，尝之先苦后甜。

生长环境　喜生于村边、旷野、路旁、山坡灌木丛中。

主产于我国南部地区。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微苦微甘凉。清热解毒，消肿散瘀。

主治用法　(1)流感，感冒高热，急性扁桃体炎，咽喉炎，每用干根 5 錢～1 两，鲜根 1～2 两，水煎服。(2)跌打损伤，疮疖痈肿，用鲜叶捣烂外敷。(3)叶与根皆可作成凉茶，用以防治感冒。



图 52　岗梅(冬青科，冬青属)

Ilex asprella Champ.

1.花枝；2.果枝。

卤 地 菊

别名 黄花龙舌草、黄花冬菊、黄花蛔蚘菊。

识别特征 (1) 多年生草本，地上茎匍匐地面或斜举，多分枝，有短硬毛，节节生根。

(2) 叶对生，多为卵状长圆形，长 1.5～4.5 厘米，上面绿色，背面灰绿色，边缘上部有三浅裂，样子象“三尖刀”。

(3) 头状花序，花黄色，中央为管状花，外围一列为舌状花。

生长环境 喜生于沟边、田边、海边潮湿处。主产于福建、广东、浙江，其它各地也有分布。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，晾干扎把备用。

性味功能 甘淡凉。清热解毒，祛痰止咳。

主治用法 (1)流感、感冒；(2)白喉；(3)咽喉炎，急性扁桃体炎，支气管炎，肺炎，哮喘；(4)高血压；(5)疔疮，疖肿。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。疔疮、肿毒，用鲜品适量，捣烂，外敷患处。



图 53　卤地菊(菊科，蛇鳞菊属)
Wedelia prostrata Hemsl.

刺　黄　连

别名　树黄连。

识别特征　(1) 落叶小灌木，高2～3米。茎直立有棱，断面黄色，尝之味苦。叶腋内有锐刺3枚。

(2) 叶丛生，椭圆形，长2～6厘米，先端钝而有小尖刺。

(3) 花黄色。果圆形，红色。

生长环境　喜生于潮润山坡、丘陵小灌木丛中。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根、茎，全年可采。洗净，切片晒干。

性味功能　苦寒。清热解毒。

主治用法　(1) 肠炎，菌痢；(2) 疮疖感染。

每用干品3～5錢，水煎服。



图 54　刺黄连(小檗科，小檗属)
Berberis virgetorum Schneid.

金花草(乌韭)

别名　石发、地柏枝、孔雀尾。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物，高可达60厘米。

(2) 叶柄棕褐色，长达25厘米。叶为3～4回羽状复叶，长20～40厘米，小叶倒披针形，边缘有齿。

(3) 孢子囊群着生于叶背的边缘。

生长环境　生于山坡疏林下。

主产于我国长江以南地区。

采集加工　药用全草，全年可采。鲜用或洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　苦凉。清热，解毒，利湿。

主治用法　(1)流感，感冒，咳嗽，扁桃体炎，腮腺炎，肠炎，痢疾，每用鲜品3～5两或干品2～3两，水煎服。(2)煎水外洗治疗烫火伤及皮肤湿疹。




图 55　金花草(陵齿蕨科，乌蕨属)

Stenoloma chusanum (L.) Ching

金 果 榄

别名 金古榄、金牛胆。

识别特征 (1) 缠绕藤本，茎有纵纹。

(2) 叶互生，三角状箭形，长约 13 厘米，宽约 9 厘米，嫩时有毛，基出脉 5～7 条。

(3) 花白色，总状花序，腋生。果扁圆形，1～3 个聚生，熟时红色。

(4) 块根呈串珠样，有球状结节 3～9 个；根皮黄色，断面白色，粉质，味很苦。

生长环境 喜生于山沟、村边树丛、疏林下。广东、广西、贵州、湖南等地均有分布。

采集加工 药用块根，全年可采，但以秋冬采的质量较好。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 苦寒。清热解毒，利咽止痛。

主治用法 (1) 白喉，急性咽喉炎，扁桃体炎，热咳失音，菌痢，每用干根 1～3 錢，水煎服。

(2) 疔毒，跌打，蛇伤，可捣烂或磨汁外敷。




图 56　金果榄(防己科，青牛胆属)

Tinospora capillipes Gagnep.

1.果枝；2.块根。

附：尖叶金果榄

尖叶金果榄，叶尖，可与金果榄相区别。功用相同。



图 56-1　尖叶金果榄(防己科，青牛胆属)

Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.

金银花(忍冬)

别名　双花、二宝花。

识别特征　(1) 缠绕藤本。茎左缠、中空，多分枝，老枝暗红色，嫩枝有毛。

(2) 叶对生，卵形至长卵形，长3～8厘米，宽1.5～4厘米，嫩叶有毛。

(3) 花成对腋生，故称“双花”、“二宝花”；花冠长管状，初开时白色带有紫斑，具香气，后变黄色，故称“金银花”。

生长环境　喜生于丘陵、山谷、路旁、村边灌木丛中。

我国各地均有分布。

采集加工　药用花、茎、叶。花于春末夏初含苞待放时采集。采后晒干(用硫磺熏过，可减少生虫、发霉，便于保存)。茎、叶全年可采，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热解毒。

主治用法　(1)外感发烧咳嗽。制成凉茶，可预防中暑、感冒及肠道传染病；(2)肠炎，菌痢，麻疹，腮腺炎；(3)败血症，疮疖肿毒，阑尾炎，外伤感染，小儿痱毒；(4)湿热腿痛(用藤)。

每用干花2～4錢，藤1～2两，水煎服。亦可作成流浸膏，局部外涂，治疗子宫颈炎。



图 57　金银花(忍冬科，忍冬属)

Lonicera japonica Thunb.

1.花枝；2.果枝。

附：山　银　花

山银花亦名土忍冬，分布于广东、广西、四川、云南、湖南，功效基本相同。主要区别为花萼密被柔毛，而金银花的花萼柔毛较少或近无毛。



图 57-1　山银花(忍冬科，忍冬属)

Lonicera confusa DC.

1.花枝；2.花冠展开；3.雌蕊；4.子房纵切面。

贯　众

别名　神箭根、小金鸡尾。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物，高1米左右。根茎直立，密被棕褐色鳞片，断面有褐色麻点。

(2) 奇数羽状复叶丛生，长8～24厘米，小叶10～20对，镰刀状，互生，基部上缘耳形，下缘圆形，边缘有锯齿，叶背散生褐色孢子囊群。

生长环境　喜生于石隙、溪旁及山林湿润处。

主产于我国长江以南，河南、陕西亦有分布。

采集加工　药用根茎，全年采集。去掉鳞片及须根，洗净，晒干备用。

性味功能　苦涩微寒，有小毒。清热解毒。

主治用法　用于预防流行性感冒，流行性脑膜炎。

每用干品1～3錢，水煎服。




图 58　贯众(鳞毛蕨科，贯众属)
Cyrtomium fortunei J. Sm.

鱼腥草(蕺菜)

别名 狗贴耳、臭菜。

识别特征 (1) 多年生草本，高约 30～60 厘米。茎下部匍匐地面，节上生根，上部直立，有时略带紫红色，全草有鱼腥气味，故称"鱼腥草"。

(2) 叶互生，常为阔卵形，叶面暗绿色，背面紫红色，基出五脉，叶柄基部鞘状抱茎。

(3) 花小，淡黄色，穗状花序顶生，或与叶对生，长约 2 厘米。果近球形。

生长环境 喜生于塘边、沟边潮湿处。

主产于长江以南，河南，陕西亦有分布。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用或鲜用。

性味功能 酸辛微寒。清热，解毒，利水。

主治用法 (1)乳腺炎，蜂窝组织炎，中耳炎；(2)肺脓肿；(3)尿路感染，肾炎水肿；(4)肠炎、痢疾。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 2～4 两，水煎服。鲜品捣烂外敷疮疖肿毒。




图 59　鱼腥草(三白草科，蕺菜属)

Houttuynia cordata Thunb.

草　龙

别名　水映草、田石梅、针筒草。

识别特征　(1) 一年生直立草本，高 20～60 厘米，分枝多。茎枝黄绿色或淡紫色，有 3～5 棱。

(2) 叶互生，披针形，长 2～10 厘米，宽 0.5～1 厘米。

(3) 花单生于叶腋内，黄色，无柄，针筒状。蒴果绿色或淡紫色，长柱形，长约 2～3 厘米，内有多个针状种子，所以叫“针筒草”。

生长环境　生于湿地、沟边、塘边、田埂、草地、稻田中。

多见于广东、广西、湖南。

采集加工　药用全株，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　淡凉微涩。清热解毒，去湿消肿。

主治用法　(1)感冒发烧，咽喉肿痛，口腔发炎；(2)肠炎腹泻；(3)疮疡疖肿。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。口腔炎可煎水含漱；疮疡用鲜品捣烂外敷。




图 60　草龙(柳叶菜科，水龙属)

Jussiaea linifolia vahl

胆　　木(乌檀)

别名　山熊胆、熊胆树。

识别特征　(1) 乔木,高可达 5 米以上。枝条有白色皮孔，树干灰色，剥皮后木质由浅黄色渐渐变成棕黄色，味极苦。

(2) 叶对生，长圆形，长 8～14 厘米，宽 4～7 厘米，有 8 对侧脉，两面都明显。托叶大，圆锥形。

(3) 花白色，顶生密集,象个绒球。果圆形。

生长环境　喜生于高山近顶或半腰阴蔽潮湿地带。

主产我国南部。

采集加工　药用枝、干、皮，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热解毒，消肿止痛。

主治用法　(1) 急性扁桃体炎，咽喉炎，乳腺炎，肠炎，菌痢，尿路感染，胆囊炎，每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(2) 下肢溃疡，脚癣感染，疖肿脓疡，皮炎湿疹，可煎水外洗。




图 61　胆木(茜草科，乌檀属)

Nauclea officinalis Pierre ex. Pitard

鬼针草(三叶鬼针草)

别名　金盏银盘、盲肠草、一包针。

识别特征　(1) 一年生草本，高0.3～1米。茎直立多分枝，近方形有棱。

(2) 叶对生，为一回羽状复叶，下部的有时为单叶，小叶3枚或5～7枚，卵状椭圆形，长2.5～7厘米，边缘有锯齿。

(3) 头状花序多数，中央的花黄色，外围有一、二圈白色的花，故又称“金盏银盘”。

(4) 花后每一花序结多数有芒刺的瘦果，能粘在衣服上，故又叫“一包针”。

生长环境　喜生于路旁、田边、荒地上。

全国各地均有分布。

采集加工　药用全草。于开花前采割，洗净，晒干切段或扎把备用。

性味功能　甘淡微寒。清热解毒，散瘀活血。

主治用法　(1) 用于防治流感、感冒，治疗咽喉肿痛、小儿发热、惊风；(2) 毒蛇、毒虫咬伤；(3) 肠炎腹泻，阑尾炎；(4) 跌打扭伤；(5) 痔疮、慢性溃疡，痒疹。

每用干品1～2两，鲜品3～5两，水煎服。或用鲜品捣烂外敷、煮水洗患处。

注：尚有同属植物复三叶鬼针草与细裂鬼针草，叶形与本种稍有区别，但效用相同，均可入药。



图 62　鬼针草(菊科，鬼针草属)

Bidens pilosa L.

1.植物上部；2.一丛有倒钩刺的果。

鬼　灯　笼

别名　苦灯笼、岗灯笼。

识别特征　(1)小灌木，高 0.3～1 米。

(2) 叶对生，矩圆形至矩圆状披针形，长5～12厘米，宽 2.4～4 厘米，全缘或波形。

(3) 聚伞花序腋生，有花 5～9 朵，花冠白色，花萼紫色，有五棱角，形似灯笼。果球形，熟时蓝绿色。

生长环境　喜生于村边、路旁，荒地或灌木丛中。

我国南方均有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微苦凉。清热解毒，止咳定痛。

主治用法　(1)感冒发烧，咽痛，咳嗽；(2)肺结核；(3)胃痛，腹痛；(4)疔疮疖肿。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。亦可用鲜叶及根皮捣敷疖肿。



图 63　鬼灯笼(马鞭草科，赪桐属)

Clerodendron fortunatum L.

海　芋*

别名　广东狼毒、痕芋头、野芋。

识别特征　(1) 多年生粗大草本，高可达2～3米。地上茎粗壮，直立，皮黑褐色，多粘液。

(2) 叶聚生于茎顶，戟形或心脏形，长 30～90 厘米，宽 20～60 厘米，先端钝尖，基部心形，叶柄粗壮，长可达 1 米。

(3) 肉穗花序，棍棒状，象玉米棒。浆果熟时淡红色。

生长环境　喜生于山谷、山野林荫、溪旁、村边阴湿地。

我国南方常见生长。

采集加工　药用根茎，全年可采。加工时以布或纸垫手，不要直接接触，以免中毒。用刀削去外皮，切片，以清水浸漂 5～7 天，多次换水，去毒，取出晒干备用。鲜用时，切片与大米一起放入锅内同炒，至米焦后，再加水煮到米烂，去渣内服。

性味功能　淡寒，有大毒（生用入口可发生剧烈麻痹感，易使口腔、舌唇发生严重肿胀麻木）。清热解毒，拔毒散结，去腐生肌。

主治用法　(1)流行性感冒，高烧，中暑；(2)肺结核；(3)疔疮肿毒，虫蛇咬伤。

每用干品 3～5 錢，鮮品 1～2 两，加水久煮后服。外用可与其它草药同捣，敷疖肿、瘭疽、虫蛇咬伤，但只能敷患处，不可敷健康皮肤。有人用干粉调煤油涂敷治疗神经性皮炎。



图 64　海芋(天南星科，海芋属)
Alocasia odora (Roxb.) C. koch

栀　子

别名　黄栀子、山栀、白蟾。

识别特征　⑴灌木，高 1～2 米。托叶基部与叶柄合生成鞘，包在茎上。

⑵ 叶对生或三叶轮生，两面光滑，革质，卵状椭圆形，长约 10 厘米，宽约 4 厘米。

⑶ 花白色，高脚碟形，有香气。

⑷ 果长圆形，象花瓶，长 1.5～4 厘米，外表有 5～8 条棱，熟时橙黄色，即中药的栀子。

生长环境　喜生于山坡、丘陵灌木丛中，亦有栽培。

全国各地均有分布。

采集加工　药用根、叶、果。全年采根，秋冬采果。根，洗净，切片，晒干备用。果，蒸后晒干备用。

性味功能　苦寒。清热解毒，凉血泻火。

主治用法　⑴黄疸型肝炎，蚕豆黄；⑵感冒高热，菌痢；⑶肾炎水肿；⑷鼻衄，口舌生疮；⑸乳腺炎，疮疡肿毒。

每用干根 1～2 两，果 2～4 錢，水煎服。亦可将果研粉用水或酒调敷局部，治疮疡、扭伤，效果很好。



图 65　栀子(茜草科，栀子属)

Gardenia jasminoides Ellis

1.果枝；2.花枝。

黄　　连

别名　鸡爪黄连。

识别特征　(1) 多年生草本，高约 30 厘米。(2) 叶从根茎长出，有长柄，指状三小叶；小叶又深裂，裂片边缘有细齿。

(3) 花白绿色，有花 5～9 朵，顶生。果簇生，有柄。

(4) 根茎横走，黄色，有多数须根，形似鸡爪。

生长环境　喜生于高山荫蔽潮润的草丛中。主产于四川，长江以南大部地区均有分布。

采集加工　药用根、茎、叶，秋冬采集。洗净，去须、根，晒干备用。

性味功能　苦寒。泻火，燥湿，清热，解毒。

主治用法　(1)痢疾，百日咳，肺结核，急性肠炎；(2)化脓性中耳炎，眼结膜炎；(3)疖肿疔疮，化脓感染。

每用干品 2～3 錢，水煎服。亦可研粉制成软膏、油剂涂湿疹、脓疱疮。



图 66　黄连(毛茛科，黄连属)

Coptis chinensis Franch.

野　菊　花

别名　野黄菊、苦薏。

识别特征　(1) 多年生草本，高 30～60 厘米。茎基部常匍匐，上部多分枝，稍有毛，揉之有香气。

(2) 叶互生，卵形，长 4～6 厘米，羽状不规则分裂，裂片每边 2～3 个，边缘有尖齿，两面均有毛。

(3) 头状花序单生，花黄色，中央为管状花，外围有一列舌状花。

生长环境　喜生于丘陵、旷野、路旁及灌木丛中。

我国各地都有野生。

采集加工　药用花或全草。秋季采花，蒸后晒干。全草割取嫩枝，洗净，晒干备用。

性味功能　苦凉。清热解毒，凉血降压。

主治用法　(1)防治感冒，流感，流脑，百日咳（用全草或花）；(2)疖疮肿毒，小儿痱毒，乳痈；(3)高血压（用花）；(4)毒蛇咬伤，跌打损伤；(5)宫颈糜烂（用花作成流浸膏局部涂敷）。

每用全草干品 3～5 錢，花 2～3 錢，水煎服。疮瘍疖肿，毒蛇咬伤，跌打损伤，可用鲜品捣烂外敷。



图 67　野菊花(菊科，菊属)

Chrysanthemum indicum L.

蛇泡簕(茅莓)

别名 红梅消、三月泡、牙鹰簕、早禾泡。

识别特征 (1) 攀援状灌木。茎、枝、叶柄、花梗有毛及钩刺。

(2) 叶互生，为羽状三小叶，很少是五枚；小叶卵圆形，有锯齿，背面白色，顶端一片较大。

(3) 春天在叶腋或枝顶开粉白色小花。结红色球形果，由多数小圆果组成的聚合果，味酸甜可食。

生长环境 喜生于坡地、路旁、荒地的灌木丛、草丛中。

见于我国大部地区。

采集加工 药用根，秋冬采集。洗净，切段，晒干备用。茎、叶多随采鲜用。

性味功能 甘苦凉。清热解毒，祛风除湿。

主治用法 (1)感冒高热，咽喉肿痛；(2)急、慢性传染性肝炎，肝脾肿大；(3)咳血，吐血；(4)肾炎水肿，尿路感染；(5)跌打瘀痛，风湿骨痛。

每用干根5錢～1两，水煎服。亦可用茎叶煎水外洗皮炎、湿疹，捣烂外敷疮痈肿毒。



图 68　蛇泡簕(蔷薇科，悬钩子属)

Rubus parvifolius L.

银锁匙(粉叶轮环藤)

别名　黑皮蛇、百解、金线风、假山豆根。

识别特征　⑴緾绕草质藤本。茎纤细有纵条纹，嫩时有白色长毛，老时无毛。

⑵ 叶互生，阔三角状卵形至卵形，盾状着生，两面近无毛，长约 2.5～6.5 厘米，宽 1.5～4.5 厘米，背面粉绿色。

⑶ 根黑色，横走，断面有放射状纹理如车轮。

生长环境　生于疏林或灌木丛中。

广东、广西均有出产。

采集加工　药用根和叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热解毒，祛风，利水。

主治用法　⑴咽喉肿痛，白喉，牙痛；⑵尿路感染及结石；⑶风湿骨痛；⑷蛇伤肿毒。

每用干根 5 錢～1 两，水煎服。

鲜品捣烂可外敷蛇伤肿毒。



图 69　银锁匙(防己科，轮环藤属)
Cyclea hypoglauca (Schauer) Diels

紫背天葵

别名　丹叶、散血子。

识别特征　(1) 矮小草本。无地上茎，地下茎块状，肉质。

(2) 基生叶1片，卵状心形，直径3.5～7厘米，边缘有不规则锯齿，基出脉7～9条，两面被粗毛，背面紫色，故称"紫背天葵"。

(3) 花淡红色，花茎纤细丝状。果三角形，有3个膜质的翅。

主产于我国南部地区。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热解毒，润燥止咳，散瘀消肿。

主治用法　(1)外感高热，中暑发烧；(2)肺热咳嗽；(3)跌打肿痛。

每用干品2～3錢，水煎服。鲜品捣烂可敷恶疮疔毒。




图 70　紫背天葵(秋海棠科，秋海棠属)

Begonia fimbristipula Hance

犁头草(长萼堇菜)

别名　犁咀菜、铧头草、地丁草、紫花地丁。

识别特征　(1)多年簇生草本。茎很短，叶近根生。

(2) 叶长三角形，似犁头，故叫“犁头草”，长 2～4 厘米，宽 1～3 厘米，边缘有不规则疏齿。

(3) 花淡紫色，腋生，花柄长于叶。果圆柱状三角形，熟时分裂为三瓣。种子细小。

生长环境　喜生于田边、耕地、园地、草地。

产于我国南部各地。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　淡凉。清热，凉血解毒。

主治用法　急性结膜炎，咽喉炎，疔疮肿毒，乳腺炎。

每用干品 5 錢～1 两，或鲜品 1～2 两，水煎服。用鲜品捣烂敷乳腺炎、疔痈。



图 71　犁头草(堇菜科，堇菜属)

Viola inconspicua Bl.

1.植物全形；2.果。

橄核莲(圆锥须药草)

别名　苦胆草、斩蛇剑、穿心莲、一见喜。

识别特征　(1) 一年生草本，高 50～80 厘米。茎方形而有棱，分枝很多，节呈膝状膨大，尝茎叶很苦。

(2) 叶对生，深绿色，尖卵形，类似辣椒叶，长 2～8 厘米，宽 1.5～3 厘米。

(3) 花多近唇形，白色，排成顶生或腋生、疏散的花序。果似橄榄核但稍扁，长约 1.5 厘米，宽约 0.5 厘米，表面中央有一条纵沟。

生长环境　华南各省多有栽培。

采集加工　药用全草或叶。夏季采叶，晾干，秋季采全草，洗净，切段，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热解毒，消肿止痛。

主治用法　(1)急性菌痢，胃肠炎；(2)感冒发烧，扁桃体炎，咽喉炎，肺炎；(3)疮疖肿毒，外伤感染；(4)肺结核；(5)毒蛇咬伤。

每用干品 3～5 錢，水煎服；干粉 5 分～1 錢，冲服，每日三次。外用浸酒或以酒调粉涂患部。



图 72　榄核莲(爵床科，穿心莲属)

Andrographis paniculata (Bum. f.) Nees

1.植物上部；2.植物下部和根部。

蒲 公 英

别名 黄花地丁、婆婆丁。

识别特征 (1) 多年生草本，折断有白色乳汁。

(2) 叶基生，多伏地，有柄，长圆形，呈不规则羽状分裂，裂片内弯，顶裂片三角形。

(3) 花茎单一，高 15～30 厘米，头状花序，单生于茎顶，黄色，全为舌状花。

(4) 根纺锤形直或分枝，肥厚，肉质。

生长环境 喜生于山野、田间、路旁、坡地、荒地。

见于全国大部地区。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用或鲜用。

性味功能 苦甘寒。清热解毒，凉血利尿，催乳。

主治用法 (1)主要用于治疗乳痈、疔疮、肿毒、皮肤溃疡；(2)眼疾肿痛；(3)消化不良，便秘；(4)蛇虫咬伤；(5)尿路感染。

每用干品 5 錢～1 两或鲜品 1～2 两，水煎

服。外用鲜品适量，捣烂敷患处。



图 73　蒲公英(菊科，蒲公英属)

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.

1.全株；2.瘦果。

三、清热利湿类

（适应各种类型肝炎、胆囊炎、肠胃炎、痢疾、白带等疾病）

人苋（铁苋菜）

别名　猫眼菜、海蚌含珠、蚌壳草。

识别特征　(1) 一年生草本，一般高 10～30 厘米。

(2) 叶互生，卵状菱形或椭圆形，长 2～5 厘米，宽 1～3 厘米，先端渐尖，边缘有钝齿，基出 3 脉。

(3) 花序腋生，雄花序穗状；雌花序藏于对合的叶状苞片内，所以叫“海蚌含珠”。果小，三角状半圆形，表面有毛。

生长环境　喜生于土质潮湿的地方，如村边、田头、路旁草地。

主产于我国南部各地。

采集加工　药用全草，夏季采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　微苦凉。清热利湿，收敛止血。

主治用法　(1)肠炎，痢疾；(2)吐血，衄血，

便血；(3)咳嗽气喘；(4)皮炎，湿疹。

每用干品 1～2 两，水煎服；皮炎、湿疹可煎水外洗。



图 74　人苋(大戟科，铁苋属)

Acalypha australis L.

1.果枝；2.穗状花序；3.雄花；

4.雌花；5.蒴果。

入地龙(酸藤果)

别名　酸藤头。

识别特征　(1) 藤状灌木，常伏地蔓生。

(2) 叶互生，嫩时稍肉质，倒卵形，长 3～6 厘米，宽 1～2 厘米，尝之有酸味。

(3) 果球形，黄豆大，熟时红色或紫黑色，味酸甜。

生长环境　喜生于山坡、荒地、田埂、村落附近的灌木丛中。

我国南方各省均有分布。

采集加工　药用根、叶、熟果。根，全年可采，洗净，切片，晒干备用。果，夏季采集，蒸熟，晒干备用。

性味功能　根，酸涩平，祛瘀止痛，收敛止泻。果，酸甘平，强壮补血。

主治用法　(1)跌打瘀痛；(2)肠炎腹泻；(3)咽喉肿痛；(4)胃酸缺乏，食欲不振。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。治胃酸缺乏、齿龈出血，用鲜叶 1～2 两或果 2～3 錢，水煎服。



图 75　入地龙(紫金牛科，酸藤果属)

Embelia laeta (L.) Mez.

1.枝和叶；2.果枝。

土 大 黄

别名 红筋大黄。

识别特征 (1) 多年生草本，高约 1 米。茎直立，绿紫色，有多数纵沟纹。

(2) 叶互生，根出叶有长柄，卵状长椭圆形，长 20～30 厘米，宽 12～20 厘米，下面有明显的疣状突起；茎生叶卵状披针形，近茎顶的叶小而成苞叶状。

(3) 花小，淡绿色。果卵形，有三条翅边，褐色。

(4) 根肥厚，圆锥形，有分枝，黄色，有香气。

生长环境 多栽培或野生于田埂、溪边、村旁。

主产于黄河以南各地。

采集加工 药用根。9～10 月采收，洗净，切片，晒干备用。

性味功能 酸凉。清热利湿，健脾开胃。

主治用法 (1) 急性肝炎；(2)消化不良，便秘；(3)肺热咳血；(4)无名肿痛。

每用干根 3～5 錢，水煎服。

亦可煎水洗治皮炎、湿疹。




图 76　土大黄(蓼科，酸模属)

Rumex madaio Makino

1.花枝；2.根；3.叶(放大)。

马　齿　苋

别名　瓜子菜、马齿菜。

识别特征　(1) 一年生伏地肉质草本。茎淡紫红色，全株味酸。

(2) 叶互生，肉质，紫红色，形似瓜子，长1～2厘米。

(3) 花小，黄色，腋生或顶生。蒴果，椭圆形，从中部开裂，内有多数黑色种子。

生长环境　多生于村旁、路边、田园等潮湿处。

全国各地均有野生。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，蒸后，晒干备用，或鲜用。

性味功能　酸凉。清热去湿。

主治用法　(1)肠炎菌痢，肾炎，脚气水肿，每用干品1～2两，鲜品2～6两，水煎服。(2)肺结核，百日咳，每用干品8錢～1两，水煎服。(3)疖肿感染，除内服外，还可捣敷患处。



图 77　马齿苋(马齿苋科，马齿苋属)

Portulaca oleracea L.

1.植物全形；2.花；3.去花瓣的花；

4.蒴果，示环状盖裂。

马 蹄 金

别名 黄胆草、小金錢草、小马蹄草、螺丕草。

识别特征 (1) 多年生纤弱伏地草本，节上生根。

(2) 叶互生，圆形或肾形，直径 0.6～2 厘米基出脉 7～9 条。

(3) 花小，腋生，白色。果小，膜质，近球形。

生长环境 喜生于湿润的草地、田边。

多见于我国长江以南地区。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能 辛平。清热利湿。

主治用法 急性黄疸型肝炎，急性胆囊炎。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。



图 78　马蹄金(旋花科，马蹄金属)

Dichondra repens Forst.

天香炉(金锦香)

别名　金钟草、仰天钟。

识别特征　(1) 一年生草本，高约 60 厘米。茎四棱形，有紧贴粗毛。

(2) 叶对生，线形至线状披针形，长 2～5 厘米，宽 0.3～1 厘米，先端短尖，两面有粗毛，有纵脉 3～5 条。

(3) 花淡紫红色或白色，排成顶生无柄的头状花序。果罐状。

生长环境　生于荒野草地。

产于我国南部。

采集加工　药用全草，秋冬采集。洗净，晒干备用。

性味功能　淡平，气微香。清湿热，理胃肠，解毒镇痛。

主治用法　(1)急性细菌性痢疾，肠炎，阑尾炎，每用干品 1～2 两，水煎服。(2)治齿槽脓肿，与其它药物配伍，煎水含嗽。



图 79　天香炉(野牡丹科，金锦香属)

Osbeckia chinensis L.

1.花枝；2.叶；3.果序。

木　　棉

别名　红棉、英雄树、攀枝花。

识别特征　(1) 落叶大乔木，高 10 米左右。茎、枝有圆锥样硬刺，枝平展。

(2) 叶互生，为掌状复叶，小叶 5～7 片，长圆形至长圆状披针形，长 10～20 厘米，宽 5～7 厘米。

(3) 春天先开花后生叶，花大，红色，肉质，五瓣，簇生于枝顶。果长圆形，长 10～15 厘米，裂开后见有棉毛的种子多数。

生长环境　喜生于村边、山谷疏林中，多为栽培。

主产于我国南方。

采集加工　药用花及根、皮。初春采花，全年采根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘凉。清热利湿。

主治用法　(1)肠炎，菌痢，每用干花 3～5 錢，水煎服。(2)慢性胃炎，胃溃瘍，产后浮肿，每用干根、皮 5 錢～1 两，水煎服。



图 89　木棉(木棉科，木棉属)

Gossampinus malabarica (Dc.) Merr.

风　箱　树

别名　球花树、水泡木、大叶水杨梅。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高 1～4 米。茎枝棕色，光滑，中空有白髓心。

(2) 叶对生或有的 3 叶轮生，叶面光滑，背面有小毛，长椭圆形，长 10～15 厘米，宽 2～6 厘米。

(3) 花白色，有柄，集成圆的头状花序，很象一个绒球，直径 3 厘米左右。

(4) 根部发达，根皮浅红色。

生长环境　生于稍荫蔽的水沟、溪旁、堤畔、村边近水处。

主产于我国南部地区。

采集加工　药用根和花序。根全年可采，洗净，切片晒干；花序夏季采集，晒干备用。

性味功能　苦凉。清热利湿，收敛止泻，祛痰止咳。

主治用法　(1)感冒发烧，咽喉肿痛；(2)肠炎腹泻，细菌性痢疾；(3)咳嗽。

每用干根 1～2 两，水煎服。治腹泻、痢疾，用花序 15～20 个，水煎服。



图 81　风箱树(茜草科，风箱树属)

Cephalanthus occidentalis L.

凤 尾 草

别名 井栏草、小叶凤尾草。

识别特征 (1) 陆生矮小蕨类植物，高35～45厘米，根状茎短，直立，有黑褐色鳞片。

(2) 叶簇生于根茎，为羽状复叶；叶柄长，且有棱，灰绿色或褐色而有光泽；叶片卵圆形，小叶片，线状披针形，基部常下延。

(3) 孢子囊群通常沿叶背边缘连续着生，褐色。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能 甘淡微苦寒。清热利湿，凉血止痢。

主治用法 (1)菌痢，肠炎，外感发热，尿路感染，白带，咽喉肿痛，每用干品1～2两，水煎服。(2)腮腺炎，疔疮，湿疹，可捣烂外敷。



图 82　凤尾草(凤尾蕨科，凤尾蕨属)

Pteris multifida Poir.

附：剑叶凤尾蕨

剑叶凤尾蕨，亦称凤尾草，井边茜。与凤尾草的区别点：多为两回羽状复叶，生于叶腋顶一枚为剑状，有柄。功用相同。



图 82-1　剑叶凤尾蕨(凤尾蕨科，凤尾蕨属)

Pteris ensiformis Burm. f.

火 炭 母

别名 火炭星、斑鸠饭。

识别特征 (1) 蔓生草本，高可达1米。有节，茎红色。

(2) 叶互生，椭圆形，长5～10厘米，宽约3厘米，叶脉紫红色，上面有人字形的紫斑纹。

(3) 花小，白色或淡红色，集成头状花序，腋生。浆果，外面半透明，内有黑色小核，果可吃，味酸。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 微酸凉。清利湿热，消滞解毒。

主治用法 (1)痢疾、肠炎、消化不良、肝炎、扁桃体炎、咽喉炎，每用干品1～2两，水煎服。(2)疖肿，跌打扭伤，用鲜品捣烂外敷。(3)皮炎，湿疹，搔痒，可煎水外洗。



图 83　火炭母(蓼科，蓼属)

Polygonum chinense L.

龙　葵

别名　苦葵、天茄子、老鸦眼睛草。

识别特征　(1) 一年生草本，高 30～60 厘米。多分枝，嫩枝稍具棱。

(2) 叶互生，似辣椒叶，长 6～10 厘米，宽 4～6 厘米，全缘或有波状齿。

(3) 花白色，4～10 朵簇生成下垂花序。浆果球形熟时黑色，味甜。

生长环境　喜生于村边、路旁、荒地草丛中。全国各地均有野生。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切段晒干备用，亦可鲜用。

性味功能　酸微寒，有小毒。清热解毒，利水消肿。

主治用法　(1)小便不利，淋浊，白带；(2)疮痈肿毒，皮肤湿疹；(3)感冒发热，喉痛，咳嗽。

每用干品 4～6 錢，鲜品 1～2 两，水煎服。外用鲜品捣烂外敷，或煎水洗患处。



图 84　龙葵(茄科，茄属)

Solanum nigrum L.

附：少花龙葵

少花龙葵为龙葵的变种，分布于我国南方，全株较龙葵纤弱，花序仅有花2～5朵。功效与龙葵基本相同，但无毒。



图 84~1　少花龙葵(茄科，茄属)

Solanum nigrum L. var. pauciflorum Liou

1.花果枝；2.果序(稍放大)。

田基黄(地耳草)

别名　雀舌草、痧子草、合掌草、降龙草。

识别特征　(1) 一年生矮小纤弱草本，高5～30厘米，茎稍呈四方形。

(2) 叶对生，卵形，长0.5～1厘米，基部抱茎，基出三脉，有微小黑色腺点。

(3) 花黄色，腋生或顶生。蒴果，三瓣裂开。

生长环境　喜生于田基、沟边潮湿草丛中。

多产于我国南部。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　甘淡平。清热解毒，渗湿利水，消肿止痛。

主治用法　(1) 急慢性肝炎，早期肝硬化，肝区疼痛，阑尾炎，每用干品5錢～1两，鲜品1～2两，水煎服。(2) 疖肿痈疽，毒蛇咬伤，跌打扭伤，可用鲜品捣烂外敷。



图 85　田基黄(金丝桃科，金丝桃属)

Hypericum japonicum Thunb.

1.植物上部；2.花；3.植物下部。

白 马 骨

别名 满天星。

识别特征 (1) 小灌木，高1米左右，分枝多，茎灰白色，揉碎有臭味。

(2) 叶丛生，聚生于小枝上，柄短，倒卵形或椭圆形，长1～4厘米，宽0.7～1.3厘米。

(3) 花白色，丛生于小枝顶端或叶腋间，无柄。果小，球形。

(4) 根皮白色，质坚。

生长环境 喜生于山野疏林、荒地，路旁及灌木丛中。

主产于我国南部、中部各省。多为栽培。

采集加工 药用全株，随时可采。洗净，晒干备用。

性味功能 淡，微辛凉。舒肝解郁，清热利湿，消肿拔毒。

主治用法 (1)急慢性肝炎；(2)风湿性腰腿痛；(3)痈肿恶疮，蛇伤。

每用干品5錢～1两，鲜品1～2两，水煎服。亦可捣烂外敷痈疮、蛇伤。



图 86　白马骨(茜草科，六月雪属)
Serissa serissoides (Dc.) Druce

附：六　月　雪

六月雪与白马骨极为相似，不同之点是叶较小，花萼短于花冠筒，两者都可入药，功用相似。



图 86-1　六月雪(茜草科，六月雪属)

Serissa foetida Comm.

白 背 叶

别名 野桐、白面戟、白背桐。

识别特征 (1) 灌木或小乔木，高 2～5 米。小枝，叶柄，叶背，花序和果均被白色茸毛，故称“白背叶”。

(2) 叶互生，阔卵形，长 7～14 厘米，宽 5～10 厘米，上面深绿色，背面灰白色。

(3) 花小，组成穗状花序，顶生或腋生。果圆球形，有羽毛软刺，状如小绒球。

生长环境 喜生于村边、路旁、荒地灌木丛中。

多产于我国中南部至西南部各地。

采集加工 药用根、叶，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 微苦涩平。舒肝活血，清热去湿，收涩固脱。

主治用法 (1)慢性肝炎，脾脏肿大；(2)肠炎腹泻；(3)脱肛，子宫下垂。

每用干根 5 錢～1 两，水煎服；外伤出血，可用干叶研细粉外敷；鹅口疮，可用根煎水，局部涂洗；跌打扭伤，用鲜叶捣敷。



图 87　白背叶(大戟科，野桐属)

Mallotus apelta (Lour.) Muell.-Arg.

1.花枝；2.果枝。

母　草

别名　四方草、小叶蛇针草、铺地莲。

识别特征　(1) 披散一年生草本，高 8～20 厘米。茎四方形，下部匍匐。

(2) 叶对生，卵形，长 8～15 毫米，较薄，边缘淡紫色，有疏齿。

(3) 花唇形，紫色，腋生。果椭圆形，有长柄。

生长环境　喜生于稻田、沟边、村旁、草地阴湿处。

主产于我国南方各省。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　微苦淡凉。清热利湿。

主治用法　(1)细菌性痢疾，肠炎，腹泻，消化不良；(2)蛇咬伤。

每用干品 1～2 两，鲜品 4～6 两，水煎服。鲜品捣烂敷蛇伤。



图 88　母草(玄参科，母草属)

Lindernia crustacea (L.) F.-Muell.

地桃花(肖梵天花)

别名　八卦拦路虎、痴头婆。

识别特征　(1) 直立分枝小灌木，高约 1 米，多少被柔毛，茎皮纤维丰富。

(2) 叶互生，具长柄，叶形变化很大。下部的近圆形，掌状 3～5 浅裂，直径 3～9 厘米；上部的叶较狭，卵形至阔披针形，边缘有不规则锯齿，叶脉 3～7 条，中脉基部有一个眼（腺体）。

(3) 花鲜红色，五瓣，形似桃花，单生于叶腋。果扁球形，直径约 7 毫米，有倒刺。

生长环境　喜生于路旁、荒地、林缘等干旱处。

主产于我国南方各省。

采集加工　药用根、叶，全年可采。多为鲜用。

性味功能　甘淡凉。祛风利湿，清热解毒。

主治用法　(1)风湿痹痛，肠炎痢疾，每用干根 1～2 两，水煎服。(2)毒蛇咬伤，跌打损伤，用鲜叶捣烂外敷。




图 89　地桃花(锦葵科，梵天花属)

Urena lobata L.

吐 烟 花

识别特征 (1) 多年生肉质伏地草本，多汁，节上生根。茎紫红色，光滑。

(2) 叶互生，斜卵形，长 2～6 厘米，宽 1.3～3 厘米，基部偏斜，两边不等，边缘有圆齿，上面深绿色，背面带紫红色。

(3) 花腋生，白色带红。

生长环境 喜生于山沟阴湿的岩石上。

主产于广东。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，蒸后晒干备用，或鲜用。

性味功能 甘凉微涩。清热利湿。

主治用法 (1)急慢性肝炎，神经衰弱，干品 2～5 錢，每用鲜品 1～2 两，水煎服。(2)过敏性皮炎，可煎水外洗；下肢溃瘍及疖肿，可用鲜品捣烂外敷。



图 90　吐烟花(荨麻科，赤车属)

Pellionia repens (Lour.) Merr.

1.植株之一部分；2.雄花。

冰糖草(野甘草)

别名　土甘草。

识别特征　(1) 多年生草本或小灌木，高30～50厘米，多分枝。茎有棱，枝叶嚼之有甜味，故叫“冰糖草”。

(2) 叶对生或轮生，卵状披针形，长约1厘米，宽约0.5厘米，边缘有疏齿。

(3) 花白色，一朵或成对生于叶腋。果小，卵形或球形，熟时开裂。

(4) 根长而直，黄色。

生长环境　喜生于村旁、路边、坡坎、沟旁等阴湿草地。

主产于我国南部，北京亦有野生。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　甘凉。清热利湿。

主治用法　(1)感冒发热；(2)肠炎腹泻；(3)脚气水肿，小便不利。

每用干品5錢～1两，水煎服。外用鲜品绞汁擦治热痱。



图 91　冰糖草(玄参科，野甘草属)

Scoparia dulcis L.

扭 肚 藤

别名 白花茶、青藤仔花、假素馨。

识别特征 (1) 藤状灌木，高可达2～4米。全株绿色，小枝稍有毛。

(2) 叶对生，卵状披针形，长3～7厘米，宽1.5～3厘米，边缘有不规则波纹，背脉上有柔毛。

(3) 花白色，高脚碟形，芳香。果球形。

生长环境 生于坡地、村旁灌木丛中。

产于我国南部。

采集加工 药用茎、叶，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 微苦凉。清热利湿。

主治用法 (1)肠炎，痢疾，消化不良；(2)风湿性关节炎；(3)跌打骨折。

每用干品5錢～1两，水煎服。研粉作外敷药，治跌打骨折。



图 92　扭肚藤(木犀科，素馨属)
Jasminum amplexicaule Buch.-Ham.

鸡 蛋 花

别名 缅栀子。

识别特征 (1) 乔木。茎光滑，肉质，有白色乳汁，易折断。

(2) 叶聚生于枝顶，常为长圆形，长达40厘米，宽7厘米。

(3) 花芳香，上部白色，下部黄色，很象鸡蛋的蛋白和蛋黄的颜色，故称“鸡蛋花”。

生长环境 多为栽培，见于我国南部地区。

采集加工 药用花，夏秋采集。晒干备用。

性味功能 甘平，气香。清热利湿。

主治用法 (1)预防中暑，可作凉茶配料；(2)痢疾，夏季腹泻，每用干品4～8錢，水煎服。




图 93　鸡蛋花(夹竹桃科，鸡蛋花属)
Plumeria rubra L. var. acutifolia
(Poir) Bailey

鸡骨草(广州相思子)

别名　黄食草、小叶龙鳞草。

识别特征　(1) 披散小灌木，高约 0.5 米，茎纤细，小枝有毛。

(2) 叶互生，为偶数羽状复叶，小叶 8～11 对，外形与相思子类似，但两面均有毛，易脱落。

(3) 花淡红色，生在叶腋。花后结豆荚，种子矩圆形与相思子相似，但全体呈黑褐色。

(4) 根皮褐色，内面淡黄色，柔韧，有甜味。

生长环境　喜生于荒野、村边、灌木丛中。主产于广东、广西。

采集加工　药用根、茎、叶，春秋采集。洗净，晒至半干，扎把，再晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热利湿，舒肝止痛。

主治用法　(1)急慢性肝炎，肝硬化腹水；(2)胃痛，小便刺痛；(3)风湿骨痛，蛇咬伤，跌打。

每用干品 1～2 两，水煎服。

注：鸡骨草种子有大毒，用时一定要把豆荚（果）全部摘除。



图 94　鸡骨草(蝶形花科，相思子属)

Abrus cantoniensis Hance.

1.植物全形；2.叶(放大)。

刺苋菜(刺苋)

别名　籀苋菜、野籀苋、野苋菜。

识别特征　(1) 一年生直立草本，高0.4～1米。茎有棱，稍呈红色，每一叶腋内有锐刺二枚，故称“刺苋”。

(2) 叶互生，绿色，常为卵形，长4～10厘米，宽1.5～4厘米。

(3) 花绿白色，丛生于叶腋或成稠密顶生穗状花序。

生长环境　喜生于荒地、田埂、村边、草坡等地。

主产于广东、广西、湖南。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切段晒干备用

性味功能　甘淡微寒。清热去湿，收敛止泻。

主治用法　细菌性痢疾，急慢性胃肠炎。

每用干品1～2两，水煎服。亦用于治疗毒蛇咬伤。



图 95　刺苋菜(苋科，苋属)

Amaranthus spinosus L.

1.植物全形(右面示根)；2.雄花(放大)；

3.雌花(放大)。

附：野　　苋

野苋，又名细苋，绿苋，产于我国大部地区，形态与刺苋菜相似，区别点是野苋叶腋无刺，穗状花序细长。功用与刺苋菜相同，效果稍差。



图 95-1　野苋(苋科，苋属)

Amaranthus viridis L.

锡 叶 藤

别名 涩叶藤、水车藤。

识别特征 (1) 木质藤木，长 3～5 米，小枝粗糙。

(2) 叶互生，长圆状倒卵形，长 5～15 厘米，宽 3～6 厘米，边缘有波状齿，两面极粗糙，可以打磨金属器具，故叫“锡叶藤”。

(3) 花白色，成顶生或腋生的圆锥花序。果长卵形，熟时褐黄色而光亮。

生长环境 喜生于山坡丘陵、疏林灌木丛中。

广东、广西均有分布。

采集加工 药用藤茎。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能 涩凉。收敛，止泻，固精。

主治用法 肠炎腹泻，肝脾肿大，遗精。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。



图 96　锡叶藤(第伦桃科，锡叶藤属)
Tetracera asiatica (Lour.) Hoogl.

茵　陈　蒿

别名　茵陈、绵茵陈。

识别特征　(1)多年生草本，高一般为 30～80 厘米。茎直立，上部多分枝，嫩枝有白色绵毛，揉之有香气。

(2) 叶互生，羽状深裂，裂片细线形，宽约 1 毫米，两面有白色絲状绵毛。

(3) 头状花序多数，花黄绿色，全为管状。

生长环境　喜生于潮湿的荒地、路旁或砂土地带。

全国大部地区有分布，并有栽培。但以西北的质量为好。

采集加工　药用全草。春季苗高 3～5 寸时割取，过早太嫩，过迟成蒿，均不宜药用。采后，洗净，晒干备用。

性味功能　苦平微寒。清热利胆，去湿利尿。

主治用法　主要用于黄疸型肝炎，胆囊炎。每用干品 5 錢～1 两，水煎服。



图 97　茵陈蒿(菊科，艾属)

Artemisia capillaria Thunb

1.花枝；2.头状花序。

盆上芫茜(天胡荽)

别名　花边灯盏、过路蜈蚣、小叶铜錢草。

识别特征　(1) 多年生伏地草本，茎纤弱，节上生根，全草有香气。

(2) 叶互生，圆形或近肾形，直径6～15毫米，边缘5～7浅裂，并有锯齿。

(3) 花小，白色。果扁圆形。

生长环境　生于村前屋后、田间、排水沟边等肥沃湿润处。

我国南方各省均有分布。

采集加工　药用全草，全年可采。采后，洗净，晒干备用，或鲜用。

性味功能　甘淡微辛凉。除痰止咳，清热利湿。

主治用法　(1) 传染性黄疸型肝炎，肝硬化腹水；(2) 伤风感冒，咳嗽咽痛。

每用干品3～5錢，鲜品1～2两，水煎服。



图 98　盆上芫茜(伞形科，天胡荽属)
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.
1.全株；2.果序；3.悬果。

兖州卷柏

别名　地柏杖、地侧柏。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物，高 15～45 厘米，茎细长，上部多分枝。

(2) 主茎上叶紧贴，基部的叶密集而互相复盖；侧叶复瓦状，椭圆形，长 1.5～2.5 毫米；中叶二列排列在中间，长为侧叶的三分之一到四分之一。

(3) 孢子囊穗四棱形。

生长环境　喜生于林荫潮湿处及山路土坎阴湿地。

主产于黄河以南各地。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用或鲜用。

性味功能　淡凉。清热，利湿，祛痰，止血。

主治用法　(1) 急性黄疸型肝炎，胆囊炎，痢疾，肺病咳血，每用干品 1～2 两，水煎服。(2) 烫火伤，研粉加麻油局部调敷。(3) 创伤出血，研粉撒布。



图 99　兖州卷柏(卷柏科，卷柏属)

Selaginella involvens (Sw.) Spring

1.植物全形；2.一部分叶枝的表面。

美 人 蕉

识别特征 (1) 多年生直立草本，高可达 1.5 米，全株绿色。

(2) 叶大，互生，矩圆形，长 10～30 厘米，宽约 10 厘米。

(3) 从基部抽出花茎，开红色花，单生或成对，组成总状花序，被有蜡质白粉。

(4) 果长卵形，指头大，绿色，表面有软刺。

生长环境 多为栽培，亦有野生于湿润草地。全国各地均可见。

采集加工 药用根茎和花。根，全年可采，洗净，去须，切片，晒干备用，或鲜用。

性味功能 甘淡凉。清热利湿。

主治用法 (1)主要用于急性黄疸型肝炎，每用干根 5 錢～1 两，鲜根 2～3 两，水煎服。常在一周左右见到退黄效果。(2)花可治外伤出血，每用干品 3～5 錢，水煎服。



图 100　美人蕉(美人蕉科，美人蕉属)

Canna indica L.

鸭跖草

别名　竹节菜、竹叶菜、碧蝉蛇。

识别特征　(1) 多年生草本，长30～60厘米。茎肉质圆而多汁，多分枝，匍匐或斜臥，有节，节上生不定根，全草被疏毛。

(2) 叶互生，叶片象小的竹叶，长4～8厘米。

(3) 花腋生或顶生，紫蓝色，3～4朵生在一个花苞內。

(4) 果扁椭圆形，熟时开裂。

生长环境　喜生于潮湿的荒地、田边、溪边、村前屋后。

多产于广东、广西、湖南、江西、福建、浙江等地。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干扎把备用。通常多用鲜品。

性味功能　甘淡微寒。利水消肿，清热解毒。

主治用法　(1) 心脏性水肿，脚气水肿，肾炎水肿，尿路感染及结石；(2)扁桃体炎，咽喉炎；(3)肠炎腹泻；(4)毒蛇咬伤，疖肿。

每用干品1～2两，鲜品3～4两，水煎服。蛇伤、疖肿也可用鲜品捣烂外敷。



图 101　鸭跖草(鸭跖草科，鸭跖草属)

Commelina communis L.

1.花枝；2.花。

附：水　竹　草

水竹草，亦名花叶鸭跖草，叶淡紫绿色，有银白色条纹。功用同鸭跖草。




图 101-1　水竹草(鸭跖草科，水竹草属)

Zebrina pendula Schnizl.

铁　线　蕨

别名　铁线蒌、乌脚枪、黑脚蒌。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物，高约 20～50 厘米，根茎短。

(2) 叶簇生，叶柄长 10～25 厘米，坚韧，褐黑色，光亮，基部被棕褐色鳞片；叶为叉状分裂，小叶片 8～15 对，小叶斜方状扇形，互生，长约 1 厘米。

(3) 孢子囊群着生于叶背上缘及外缘，褐色。

生长环境　喜生于山野林下稍荫蔽处。

长江以南多见。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　淡凉。清热利湿，祛瘀消肿。

主治用法　(1) 流感发热，传染性肝炎，痢疾，尿路结石，跌打内伤，每用干品 1～2 两，水煎服。(2) 疔毒，蛇伤，火伤，研粉调涂患处。




图 102　铁线草(铁线蕨科，铁线蕨属)

Adiantum flabellulatum L.

1.植物全形；2.小羽片，示孢子囊群。

崩大碗(积雪草)

别名　落得打、雷公根、灯盏草、破铜錢。

识别特征　(1) 多年生匍匐草本。茎纤细，节上生根。

(2) 叶片圆形或肾形，直径 1.5～4 厘米，基部凹心形，如缺口的饭碗，所以叫“崩大碗”。

(3) 花紫红色。果扁圆形。

生长环境　喜生于草地、田埂、沟边低湿处。

我国南方各省均有分布。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　甘凉。清热利湿。

主治用法　(1) 传染性肝炎，麻疹；(2) 感冒，扁桃体炎，咽喉炎，支气管炎；(3) 尿路感染。

每用鲜品 2～8 两，干品 1～2 两，水煎服。



图 103　崩大碗(伞形科，积雪草属)

Centella asiatica (L.) Urban

野　牡　丹

别名　猪古稔、大金香炉。

识别特征　(1) 灌木，高达 1 米左右。茎和叶柄密被紧贴的褐色鳞片状粗毛。

(2) 叶对生，广卵形至卵形，长 5～10 厘米，宽 3～6 厘米，基出脉 5～7 条，上面有紧贴的粗毛，背面密被长柔毛。

(3) 花大，粉红色，通常三朵，生于枝顶，似牡丹花。果罐形。

生长环境　生于荒野、山坡、路边、溪边。主产于我国南部。

采集加工　药用全株，夏秋采集。洗净，晒干，切碎备用。

性味功能　涩平。解毒消肿，化滞消积，收敛止血。

主治用法　(1) 肠炎，菌痢，肝炎；(2) 跌打损伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜叶捣烂敷患处。



图 104　野牡丹(野牡丹科，野牡丹属)

Melastoma candidum D. Don

猪 笼 草

别名 猪仔笼。

识别特征：(1) 食虫的草本植物。茎直立，高约1米。

(2) 叶互生，椭圆形，长约10厘米，先端延伸成卷须，末端结成一个长约15厘米，宽约3厘米猪笼形的膜质囊状体，上端有盖，昆虫进入囊内，囊盖立即关闭。

(3) 花单性，雌雄异株，为总状花序。

生长环境 喜生于向阳湿润的洼地、浅涧田埂等处。

主产于广东、广西。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能 甘淡凉。清热利湿，化痰止咳。

主治用法 (1) 黄疸型肝炎；(2) 胃及十二指肠溃疡疼痛；(3) 尿路结石；(4) 高血压；(5) 感冒咳嗽，百日咳。

每用干品5錢～1两，或鲜品1～2两，水煎服。



图 105　猪笼草(猪笼草科，猪笼草属)
Nephenthes mirabilis (Lour.) Druce
1.植株的一部分(示卷须顶端扩大成一囊状体)；
2.雄花；3.雌花；4.花序的一部分。

紫　茉　莉

别名　胭脂花、入地老鼠。

识别特征　(1) 多年生直立草本，多分枝，高0.5～1米。茎微紫红色，稍肉质，有纵条纹。

(2) 叶对生，三角状卵形，长4～10厘米，宽4～6厘米。

(3) 花紫红色，也有黄色、白色的，形似喇叭。果卵形，有棱，熟时黑色。

(4) 根粗壮，纺锤形似老鼠，表皮褐黑色，内面粉质。

生长环境　多生于村旁、园地、路边的草地上。

各地亦有栽培。

采集加工　药用块根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热利湿。

主治用法　(1)尿路感染，前列腺炎，白带，糖尿病，每用干品5钱～1两，鲜品1～2两，水煎服。(2)跌打疮痛，可用鲜根捣烂外敷。

注：根、茎及种子均有泻下作用。孕妇忌服。




图 106　紫茉莉(紫茉莉科，紫茉莉属)

Morabilis jalapa L.

番 石 榴

别名 鸡矢果、广东石榴、交桃。

识别特征 (1) 灌木或小乔木，高一般 2～5 米。树皮褐色，嫩枝四棱，有毛。

(2) 叶对生，长圆形，革质，上面无毛或稍有毛，背面有毛，叶脉明显，揉碎有香气。

(3) 花白色，单生或两、三朵生于叶腋。果球形，熟时黄白色，肉厚，芳香可食。

生长环境 多为栽培，亦有野生。

福建、广东、广西、云南、四川、贵州、台湾都有分布。

采集加工 药用叶，亦可用未成熟的果实、茎、皮。叶全年可采，晒干备用。

性味功能 涩平，气香。收敛止泻。

主治用法 (1)急性胃肠炎，消化不良性腹泻，每用干叶 3～5 錢，水煎服。(2)皮肤湿疹，搔痒，热痱，鲜茎、叶煎水外洗。




图 107　番石榴(桃金娘科，番石榴属)

Psidium guajava L.

1.花枝；2.果。

溪黄草(线纹香茶菜)

别名　熊胆草、风血草。

识别特征　(1) 多年生草本，高约 40～60 厘米。茎直立方形，多分枝，稍被毛。

(2) 叶对生，卵状披针形，长 3～6 厘米，宽 2～3 厘米，边缘有粗齿，揉碎后有黄色汁液，故称“溪黄草”。

(3) 花细小，白色略带紫色，圆锥花序疏散。

生长环境　喜生于山谷溪旁、水沟边、田埂等湿润处。

见于广东、广西、湖南。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，切段或晒至半干，扎把再晒干备用。

性味功能　甘苦凉。清热，利湿，退黄。

主治用法　主要用于急性黄疸型肝炎，急性胆囊炎。

每用干品 5 錢～1 两，鲜用 2～3 两，水煎服。




图 108　溪黄草(唇形科，香茶菜属)

Plectranthus striatus Benth.

辣　蓼

别名　水蓼、柳蓼、白辣蓼。

识别特征　(1) 一年生草本，高约半米，多分枝，节部膨大，茎红色或青绿色。

(2) 叶互生，披针形，长 5～7 厘米，上面中脉两旁常有人字形黑纹，揉之有辣味。

(3) 花淡红色，顶生或腋生总状花序。果小，熟时褐色，三角形。

生长环境　喜生于湿地、路旁、沟边。

全国各地均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采收。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　辛温。利湿、消滞，杀虫止痒。

主治用法　(1)菌痢，肠炎，风湿肿痛，每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。(2)皮肤湿疹，煎水洗患处。



图 109　辣蓼(蓼科，蓼属)

Polygonum hydropiper L.

1.花枝；2.花。

算盘子

别名　野南瓜、柿子椒、金骨风。

识别特征　⑴直立多分枝灌木，高 1～2 米，嫩枝密被锈色短茸毛。

⑵ 叶互生，长椭圆形，长 3～6 厘米，宽 0.8～2 厘米，两端楔尖，上面除中脉外近秃净，背面被短柔毛。

⑶ 花小，数朵簇生于叶腋。果扁球形，红褐色，有 8～10 条纵沟，直径 1 厘米，很象小“南瓜”或“算盘子”。

生长环境　生于路边、村边、山野灌木丛中。

长江以南各省区均有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微苦涩凉。清热，消滞，止泻。

主治用法　⑴感冒发热，咳嗽，喉痛；⑵食滞腹痛，痢疾，腹泻；⑶湿热腰痛。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。



图 110　算盘子(大戟科，算盘子属)

Glochidion puberum Hutch.

1.果枝；2.雌花(放大)；3.雄花(放大)。

翠　云　草

别名　蓝地柏、绿绒草、龙须。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物，长 30～60 厘米。茎纤细，横走，节上生根。

(2) 主茎上叶较大，疏生，斜卵圆形，不对称；排列成平面的叶，卵状椭圆形，两侧近对称，嫩时上面碧蓝色，所以叫做“翠云草”或“蓝地柏”；中叶两行斜卵状长圆形。

(3) 孢子囊穗单生于枝顶，四棱形。

生长环境　喜生于山谷、林下阴湿的岩石上。

主产于我国南方各地山区。

采集加工　药用全草，全年可采。阴干备用或鲜用。

性味功能　微苦寒。清热利湿。

主治用法　(1)急性黄疸型肝炎，胆囊炎；(2)肠炎痢疾；(3)肾炎水肿。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。烫火伤用全草炙存性，研末，用麻油调敷。



图 111　翠云草(卷柏科，卷柏属)

Selaginella uncinata (Desv.) Spring

1.植物全形；2.孢子叶和孢子囊(放大)。

四、祛风寒湿类

（适应风湿性关节炎、产后腰腿痛、劳损、坐骨神经痛等疾病）

一朵云（光叶海桐）

别名　万里香、崖花子、火泡树。

识别特征　(1)小乔木，高约 3～4 米，上部枝有时呈轮生状。(2)叶互生，常密集在枝顶，叶片长椭圆状披针形，长 5～10 厘米，宽 2～3 厘米，两端尖，边缘，微波状，两面光滑。(3)花淡黄色，集成伞房花序。果卵形，三瓣开裂。(4)根皮黄色，微香。

生长环境　喜生于较高的山坡、疏林下或灌木丛中。产于长江以南各地，陕西也有分布。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。叶多为鲜用。

性味功能　甘苦辛微温，有香气。活血通络，解痉止痛，消肿解毒。

主治用法　(1)风湿性关节炎，坐骨神经痛，跌打骨折，小儿麻痹后遗症，产后风瘫，心胃气痛，牙痛；每用干品 3～5 錢，水煎服。(2)毒蛇

咬伤，疮疖肿毒，过敏性皮炎，每用鲜叶捣烂外敷或煎水外洗。(3)外伤出血，用叶研粉外撒。



图 112　一朵云(海桐花科，海桐花属)

Pittosporum glabratum Lindl.

十八症(光轴苧蒟)

识别特征 (1) 直立亚灌木，高 1～1.5 米。茎节膨大，全株绿色，有香辣味。

(2) 叶互生，有透明腺点，常为卵状长圆形，两侧不对称，长 10～16 厘米，宽 4～6 厘米，叶脉 7 条。

(3) 花单性，花序长可达 16 厘米。果球形。

(4) 根茎木质化，尝之有麻舌感。

生长环境 生于高山密林的阴暗山沟中。

主产于广东、广西、云南。

采集加工 药用根及老茎，全年可采。洗净，切片晒干。

性味功能 辛温。祛风散寒，散瘀止痛。

主治用法 (1)风湿筋骨痛，跌打肿痛，胃寒疼痛；(2)毒蛇、蜈蚣咬伤。

每用干品 1～2 錢，水煎或浸酒内服。亦可研粉局部调涂。




图 113　十八症(胡椒科，胡椒属)

Piper boehmeriaefolium Wall. var. tonkinense C. DC.

1.果枝；2.浆果。

八　角　枫

别名　二珠葫芦、白锦条、包子树、白龙须。

识别特征　(1) 落叶灌木或小乔木，高可达15米。树皮淡灰黄色，嫩枝有黄褐色茸毛。

(2) 叶互生，叶形不一，通常圆形或阔卵形，长15～18厘米，宽4～12厘米，全缘或3～7浅裂，基出3～5脉，基部常偏斜，有长柄。

(3) 花腋生，白色或黄色，1～4朵合成聚伞花序。果卵形，长6～9厘米，熟时黑色。

(4) 根白色多须，所以又叫“白龙须”。

生长环境　生于向阳的山地、丘陵地，在村边、屋前后亦常见。

我国大部地区均有分布。

采集加工　药用茎、叶、根。夏季采嫩茎叶，四季均可采根，洗净，晒干备用。

性味功能　辛微温，有小毒。祛风除湿，散瘀止痛。

主治用法　(1)风湿骨痛，麻木瘫痪；(2)跌打损伤。

每用干根3～5錢或干茎叶8錢～1两，水煎服。亦可加入其它药浸酒内服。用嫩茎叶捣烂可外敷跌打损伤。孕妇禁用。




图 114　八角枫(八角枫科，八角枫属)

Alangium chinense (Lour.) Rehd.

1.花枝；2.果枝；3.花；4.核果。

三十六根(卵叶娃儿藤)

别名　双飞蝴蝶。

识别特征　(1) 木质藤本。枝条圆柱形有条纹，折断有乳汁。

(2) 叶对生，卵圆形，上面一般都沒有毛，下面密生短毛。

(3) 腋生管状小花。果似小辣椒，内藏多数种子，其顶端均有白色絲质的毛。

(4) 根长条，粉质，常二、三十条丛生，黄白色味辛辣，麻舌。

生长环境　喜生于山沟、林下、山路两旁、滨海沙滩草丛。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　辛温，有小毒。祛风，定喘，散瘀，止痛。

主治用法　(1)风湿筋骨痛，跌打瘀积肿痛；(2)哮喘。

每用干品 1～3 錢，水煎服。鮮品捣烂敷毒蛇咬伤。

注：本属除卵叶娃儿藤外，还有毛叶娃儿藤、毛果娃儿藤。



图 115　三十六根(萝藦科，娃儿藤属)

Tylophora ovata (Lindl.) Hook. et Steud.

1.花枝；2.花；3.蓇葖果；4.种子。

三加皮(三叶五加)

别名　白簕花、鹅掌簕、槐豉菜。

识别特征　(1) 多年生攀援状灌木。茎、枝、叶柄及叶背主脉均有小钩刺。

(2) 叶互生为指状复叶，有小叶 3 片，长卵形，长 4～8 厘米，宽 2.5～4.5 厘米，边缘有锯齿。

(3) 花白色，顶生伞形花序。果球形，稍扁，熟时紫黑色。

生长环境　喜生于村边、路旁、旷野灌木丛中。

主产于华南各地。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛苦凉。清热解毒，祛风除湿。

主治用法　(1)感冒高热骨痛，风湿性关节炎，坐骨神经痛；(2)咳嗽，胸痛；(3)尿路结石。

每用干根 1～2 两，或鲜叶 5 錢～1 两，水煎服。



图 116　三加皮(五加科，五加属)

Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.

1.花果枝；2.花(放大)；3.果(放大)。

土茯苓(光叶菝葜)

别名 山遗粮、毛尾薯。

识别特征 (1) 多年生藤本，茎圆而光滑。(2) 叶互生，革质，椭圆状披针形，长 5～10 厘米，基出三脉明显，上面深绿色，背面粉白色，叶腋常有两条卷须。

(3) 花小，黄绿色，长在叶腋。果球形，熟时蓝紫色，内有种子两粒。

(4) 根茎不规则结节状，肥厚，表皮暗褐色，质硬，内面粉性肉质。

生长环境 多生于干旱山坡、丘陵的小灌木丛中。

产于我国南方大部分地区。

采集加工 药用根茎，秋季采集。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 甘淡平。祛湿热，利筋骨。

主治用法 (1)风湿骨痛；(2)心胃气痛，腹泻；(3)肾炎；(4)恶疮肿毒。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。



图 117　土茯苓(菝葜科，菝葜属)

Smilax glabra Roxb.

1.着果之枝；2.块茎；3.茎附卷须。

大叶双眼龙*（巴豆）

别名　双眼龙、巴仁、芒子。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高 3～5 米。幼枝被疏毛，多分枝。

(2) 叶互生，卵形，长 5～12 厘米，宽 3～7 厘米，边缘有细齿，基出 3 脉，叶片近基部的边缘上有腺体 2 个。

(3) 花单生，细小，集成顶生总状花序。果卵形，长约 2 厘米，内有三枚种子，即中药“巴豆”。

生长环境　喜生于村边、旷野、山脚疏林，有时亦见于密林中。

我国南部有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛温，有毒。温中散寒，祛风消肿。

主治用法　风湿性腰腿痛，胃寒痛。

每用干品 1～2 錢，水煎服。叶可捣敷蛇伤或作杀虫剂。



图 118　大叶双眼龙(大戟科，巴豆属)

Croton tiglium L.

1.花枝；2.蒴果。

大风艾(艾纳香)

别名　冰片艾、大艾、大枫艾。

识别特征　(1) 多年生木质草本，高1～3米。全株有灰色绒毛，揉碎时有冰片香气，也叫“冰片艾”。

(2) 叶互生，长圆状披针形，长可达25厘米，边缘有不明显的钝齿，基部有多对翅状的小叶片。

(3) 头状花序，花黄色，管状。

生长环境　喜生于村边、旷地、路旁、谷地的草地上，亦有栽培。

主产于华南各省。

采集加工　药用叶、嫩枝及根。叶，夏秋采集，质量较好。采后，阴干扎把备用。鲜叶用以提炼冰片。

性味功能　辛温，芳香。祛风消肿，活血散瘀。

主治用法　(1)风湿痛，跌打瘀痛，产后骨痛，受凉腹痛，腹泻。每用干根5錢～1两，水煎服。(2)跌打损伤，疮疖痈肿，皮肤搔痒，用鲜叶捣烂外敷或煎水洗患处。



图 119　大风艾(菊科，艾纳香属)

Blumea balsamifera (L.) DC.

大 血 藤

别名 血藤、红藤、山红藤。

识别特征 (1) 攀援木质大藤本，长达 10 米。茎褐色，圆形，有条纹，砍断时有红色汁液流出，故称“大血藤”。

(2) 叶互生，为指状三小叶，顶生小叶卵圆形，长 8～16 厘米，宽 4～9 厘米，侧生小叶较大，斜卵形，两侧不对称，中脉偏向内侧。

(3) 花腋生，黄色或黄绿色。果卵状长圆形，长近 1 厘米，表面有白粉，熟时暗兰色。

生长环境 喜生于大山密林、溪边，常缠绕它树上。

主产于长江以南各地。

采集加工 药用藤茎，全年可采。放置 3～5 天，再洗净，切片，晒干备用。

性味功能 微苦涩温。祛风湿，通经络。

主治用法 风湿筋骨痛，肢节酸痛，麻木拘挛，水肿，血虚头昏。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。



图 120　大血藤(大血藤科，大血藤属)

Sargentodoxa cureata (Oliv.)
Rehd. et Wils.

1.花枝；2.雄花。

马鞍藤(二叶红薯)

别名　红花马鞍藤、马蹄草。

识别特征　(1) 多年生匍匐草本，茎叶都含有粘性白色乳汁。茎红紫色，光滑，节上生根。

(2) 叶互生，阔圆形或阔椭圆形，长3～7厘米，宽2～5厘米，先端凹陷，形似马鞍，故叫“马鞍藤”。

(3) 花腋生，喇叭形，白色或紫红色。果卵圆形。

生长环境　喜生于滨海堤岸斜坡或沙地的草丛中。

主产于我国南方沿海地区。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，切段晒干。

性味功能　微苦辛温。祛风除湿，拔毒消肿。

主治用法　(1)风湿性腰腿痛，腰肌劳损，每用干品5錢～1两，水煎服。(2)疮疖肿痛，用鲜叶捣烂外敷。孕妇忌服。




图 121　马鞍藤(旋花科，牵牛属)

Ipomoea pes-caprae Roth.

小叶买麻藤

别名　脱节藤、竹节藤。

识别特征　(1) 常绿大藤本，长 10 米以上。茎皮灰褐色，皮孔明显，节膨大成膝状。

(2) 叶对生，常为椭圆形，长 4～10 厘米，宽 2.5～3.5 厘米，叶脉的特点是：侧脉很细，在叶背连接成网状。

(3) 花极小，穗状花序腋生。果卵圆形，长 1.5～2 厘米。

生长环境　生于山野林间或山坡、丘陵、村边的灌木丛中。

主产于福建、广东、广西、江西、湖南。

采集加工　药用藤茎，全年可采。切片，晒干备用。

性味功能　苦温。祛风去湿，活血散瘀。

主治用法　(1)风湿性腰腿痛，筋骨酸软；(2)跌打损伤；(3)毒蛇咬伤。

每用干品 2～3 錢，鲜品 5 錢～1 两，水煎服。



图 122　小叶买麻藤(买麻藤科，买麻藤属)

Gnetum parvifolium (Warb.) C. Y. Ching

小叶双眼龙(毛果巴豆)

别名　桃叶双眼龙。

识别特征　(1) 直立灌木，高 1～2 米，分枝少，被灰黄色绒毛。

(2) 叶互生，卵状椭圆形，形似桃叶，长 5～10 厘米，宽 1.5～2 厘米，叶柄顶部有 2 个突出腺体。

(3) 总状花序顶生，淡绿色。果扁球形，有粗毛，直径达 1 厘米，故称“毛果巴豆”。

生长环境　喜生于山坡、灌木杂草丛中。

主产于我国南部。

采集加工　药用根，秋季采集。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛苦温，有小毒。祛寒驱风，散瘀活血。

主治用法　(1)风寒湿痹，产后风瘫；(2)毒蛇咬伤。

每用干品 3～5 錢，水煎或浸酒服。外用鲜叶捣烂或干根研粉调敷患处。孕妇忌用。




图 123　小叶双眼龙(大戟科，巴豆属)

Croton lachnocarpus Benth.

1.植物上部；2.叶；3.植物下部和根。

山苍树(木姜子)

别名　豆豉姜、毕澄茄、山鸡椒、过山香。

识别特征　(1) 落叶小乔木，通常高约 5 米。茎绿色，有皮孔，老时变灰褐色，小枝细长嫩脆，全株具浓烈的姜的香气。

(2) 叶互生，长椭圆状披针形，长 10～11 厘米，宽 1.5～2.5 厘米。质薄，上面绿色，背面粉绿色，干后变黑。

(3) 花小，黄色，多与叶同时开放，伞形花序。果球形，直径 4～5 毫米，熟时黑色，气味芳香。

(4) 根砍断有豆豉和姜的香气。

生长环境　喜生于山坡、丘陵的灌木丛或疏林中。

主产于长江以南各地。

采集加工　药用根、茎、叶及果实。果实秋冬采集，阴干备用；根、茎、叶全年可采，洗净，阴干备用；根最好随用随切。

性味功能　辛温，有姜味。祛风散寒，理气止痛。

主治用法　(1)外感头痛；(2)风湿骨痛，外伤瘀痛，四肢麻木；(3)心胃气痛；(4)产后瘀滞腹痛，月经不调。

每用干根茎 5 錢～1 两；果 1～3 錢；叶 3～

5錢，水煎服。

注：山苍树是重要经济树木，应注意保护，不要滥加采伐。




图 124　山苍树(樟科，木姜子属)

Litsea cubeba (Lour.) Pers.

1.果枝；2.花枝；3.花序；4.花；
5.除去花被的花；6.果。

山　　葛

别名　葛酱、石南藤、酒饼藤。

识别特征　(1) 草质藤本。茎有棱，节膨大而生根。

(2) 叶互生，常为卵状披针形，长6～12厘米，宽2.5～4.5厘米；基出脉5～7条，近中脉的一对，互生，常自叶基1～3厘米处发出；叶揉碎后有香气。

(3) 花小，绿色或淡黄色，集成穗状花序。果球形，熟时黄色。

生长环境　多生于森林中或大石上，往往循树干攀援上长，亦见于山沟疏林中。

采集加工　药用全株，秋季采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　辛温。祛风湿，强腰膝。

主治用法　风湿痛，风寒骨痛，腰膝无力，四肢肌肉萎缩，咳嗽气喘。

每用干品2～3錢，水煎服。



图 125　山蒟(胡椒科，胡椒属)

Piper hancei Maxim.

牛　白　藤

别名　大叶龙胆草、土加藤、甜茶。

识别特征　(1) 藤状灌木，高 3～5 米。老枝圆形黄色粗壮，幼枝四棱形。

(2) 叶对生，卵状披针形，长约 4～10 厘米，宽 2.5～4 厘米，背面有毛，叶嚼之有甜味。

(3) 花白色，细小，密集。

(4) 果小，球形，顶部突出，直径约 3 毫米，形似石榴。

生长环境　喜生于山谷、坡地、林下、灌木丛中。

我国南部和西南部均有分布。

采集加工　药用根、茎、叶，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热解暑，祛风除湿。

主治用法　(1)防治中暑，感冒咳嗽（用叶制凉茶）；(2)腰腿痛（用根、藤），每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(3)痔疮出血，疖疮痈肿（用根），每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(4)皮肤湿疹，搔痒，带状疱疹，用鲜叶煎水外洗。



图 126　牛白藤(茜草科，耳草属)

Oldenlandia hedyotidea (DC.) Hand.-Mazz.

龙　须　藤

别名　羊蹄藤、乌郎藤。

识别特征　(1) **攀援灌木，长 2～7 米。茎上有细卷须，小枝有短柔毛。**

(2) 叶互生，卵形或心形，长 5～10 厘米，宽 4～6 厘米，顶端微缺或两裂，基部浑圆或心形，有 7 条主脉，明显，叶柄很长。

(3) 花白色，腋生。果是一枚扁平的豆荚，有种子 3～5 粒。

生长环境　喜生于山坡、疏林、灌木丛中。

长江以南各省均有分布。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片，蒸熟，晒干备用。

性味功能　苦涩凉。祛风除湿，通经活络。

主治用法　风湿性关节炎，腰腿痛，跌打损伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服或浸酒服。




图 127　龙须藤(苏木科，羊蹄甲属)

Bauhinia championi Benth.

1.花枝；2.荚果。

半枫荷(翻白叶树)

别名　红半枫荷、异叶翼子木。

识别特征　(1) 常绿乔木，高可达一、二十米，嫩枝密生黄色茸毛。

(2) 叶互生，部分叶形似枫叶，部分叶形似荷叶，上面绿色，背面白色，有短绒毛。

(3) 花青白色。果卵形，有毛。

(4) 根粗壮坚硬，皮红色，断面黄色或淡红色。

生长环境　喜生于干旱山地、丘陵的疏密林中。

主产于我国南部各地。

采集加工　药用根，全年可采。洗净切片，蒸后晒干备用。

性味功能　甘淡微温。祛风除湿，活血通络。

主治用法　风湿痹痛，腰肌劳损，跌打瘀积肿痛，产后风瘫。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服或浸酒服。



图 128　半枫荷(梧桐科，翅子树属)

Pterospermum heterophyllum Hance

1.花枝；2.花；3.嫩枝叶；4.果。

附：金缕半枫荷

金缕半枫荷与半枫荷科属不同，功用大致相同。



图 128-1　金缕半枫荷(金缕梅科，半枫荷属)
Semiliquidambar cathayensis H. Y. Chang

附：白 牛 枫 荷

白牛枫荷与牛枫荷科属不同，功用大致相同。




图 128-2　白牛枫荷(五加科，木五加属)

Dendropanax proteus Benth.

过江龙（榼藤子）

别名　过岗扁龙、眼鏡豆。

识别特征　(1) 木质大藤本。茎扭曲，粗大，常纏绕在大树上，外皮棕褐色。

(2) 叶互生，为二回偶数羽状复叶，小叶 2～4 对，长圆形，长 1.5～3 厘米，先端钝或微凹，基部偏斜，叶的顶端有两条卷须。

(3) 花淡黃色，长在叶腋上，为穗状花序。花后结长可达 1 米，扁平而弯曲的豆荚（內有数个扁平近圆形种子），象眼鏡，所以叫“眼鏡豆”。

生长环境　生于大山沟或山坡密林中，常纏绕在它树上。

多见于广东、广西、云南、台湾。

采集加工　药用藤及种子。藤，全年可采集，洗淨，切片，蒸后晒干备用；种子（仁）冬春采集，剝掉外壳，经过煮炒，晒干碾粉备用。

性味功能　微苦涩，微凉。祛风除湿，通经活络。

主治用法　风湿性腰腿痛，跌打損伤，每用干藤 5 錢～1 两，水煎服。黃疸，营养性水肿，每用仁粉 1～3 錢，冲开水服。

注：本品茎皮浸液含皂素，能催吐泻下，有强烈的刺激性，误入眼中可引起结膜炎。



图 129　过江龙(含羞草科，榼藤子属)

Entada phaseoloides (L.) Merr.

1.花枝；2.花；3.荚果之一部分；

4.种子；5.植物生态。

阴　　香

别名　山玉桂、土肉桂、假桂枝。

识别特征　(1) 常绿大乔木，高约十余米。树皮灰褐色，有肉桂香气。

(2) 叶互生，卵形至长椭圆形，长6～10厘米，宽2.5～4厘米，上面深绿色，光亮，背面粉绿色，离基三出脉。

(3) 花淡绿色，圆锥花序，顶生。果卵形，熟时黑紫色。

生长环境　喜生于大山、深谷密林或疏林中。

主产于福建、广东、广西、云南。

采集加工　药用皮，全年可采。洗净，阴干备用。

性味功能　辛温，气香。祛风散寒，温中止痛。

主治用法　(1) 寒性胃痛，胃胀，腹泻；(2)风湿骨痛。

每用干品2～3钱，水煎服或制散，每服5～8分。



图 130　阴香（樟科，樟属）

Cinnamomum burmanni (Nees) Bl.

1.花枝；2.核果。

走马胎(大叶紫金牛)

别名　走马藤、山猪药。

识别特征　(1) 直立亚灌木，高约 1～2 米。(2) 叶通常集生于枝顶，长椭圆形，长 15～35 厘米，主脉紫红色，侧脉暗红色，边缘有细锯齿。

(3) 花粉红色或紫红色。果球形，熟时红色。

生长环境　喜生于潮湿的山地、山谷或溪边的树林下。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根、叶。根全年可采，洗净，切片晒干；叶多为鲜用或晒干研粉备用。

性味功能　微辛微温。祛风除湿，活血散瘀。

主治用法　(1)风湿性关节炎，产后风瘫，半身不遂；(2)跌打肿痛。

每用干根 3 錢～1 两，水煎服。鲜叶捣烂外敷疮疖肿痛，下肢溃疡，跌打扭伤。



图 131　走马胎(紫金牛科，紫金牛属)

Ardisia gigantifolia Stapf

杜　仲　藤

别名　小白皮藤、假杜仲。

识别特征　(1) 木质藤本，有白色乳汁，树皮折断后有弹性的橡胶絲。

(2) 叶对生，长圆形，长 5～11 厘米，宽 2～4 厘米。

(3) 花白色稍带粉红色，高脚碟形，顶生或腋生。果双生，牛角形，种子顶部有絲状白色长毛。

生长环境　喜生于高山密林的沟谷或山路两旁。

主产于广东、广西、云南。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微辛平。通经活络，行气活血。

主治用法　(1)风湿性腰腿痛；(2)肾亏腰痛，阳萎；(3)高血压。

每用干品 1～3 錢，水煎服或配方用。



图 132　杜仲藤(夹竹桃科，杜仲藤属)

Parabarium micranthum (Wall.) Pierre

1.果枝；2.种子。

丢了棒(白桐树)

别名　咸鱼头、追风棍。

识别特征　(1)灌木或小乔木，高 2～5 米，嫩枝被绒毛。

(2) 叶互生，阔卵形至卵状长圆形，长 10～20 厘米，宽 6～12 厘米，边缘有不规则粗齿，嫩时有疏毛，老时无毛，叶柄顶端有腺体 2 枚。

(3) 腋生总状花序，花绿白色。果卵状球形，直径近 1 厘米，熟时红色，3 裂。

生长环境　喜生于荒地灌木丛、疏林下。

我国南部有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　淡平，有小毒。祛风除湿，散瘀止痛。

主治用法　(1)风湿性关节炎，腰腿痛，外伤瘀痛；(2)脚气水肿。

每用干品 4～6 錢，鲜品 6 錢～1 两，水煎服。体弱、孕妇忌用。



图 133　丢了棒(大戟科，白桐树属)

Claoxylon polot (Burm. f.) Merr.

枫荷桂(檫树)

别名　独脚樟、天鹅枫。

识别特征　(1) 落叶大乔木，高可达二、三十米。树皮幼时黄绿色，光滑，老时变灰褐色，有不规则纵裂。

(2) 叶互生或聚生于新枝的顶部，革质，有三裂、两裂、不分裂三种叶形，长 10～22 厘米，宽 4～15 厘米，离基三出脉。

(3) 花小，黄色，总状花序。果球形，熟时蓝黑色，直径约 0.5 厘米，表面有蜡质粉状物，果柄肥大呈棒状。

生长环境　生于山野杂木林中。

产于我国长江以南大部地区。

采集加工　药用树皮、根、叶，全年可采。晒干备用。

性味功能　甘淡微温。祛风逐湿，活血散瘀。

主治用法　(1)腰肌劳损，腰腿痛，风湿性关节炎，半身不遂，每用干品 5 錢～1 两，水煎服或浸酒服。(2)扭挫伤筋，外用根、皮或叶捣烂浸酒敷患处。

注：枫荷桂是上等木材，不可滥加采伐，宜结合伐木采根及皮。



图 134　枫荷桂(樟科，檫树属)

Pseudosassatras laxiflora (Hemsl.) Nakai

枫 香 树

别名 枫树、路路通(果)。

识别特征 (1) 落叶大乔木，高可达 30 米，树皮通常不规则的裂开。

(2) 叶互生，有长柄，通常掌状三裂，长宽略等，约 6～10 厘米，裂片卵状三角形，中央裂片较长，边缘有具腺体的锯齿。

(3) 花单性，细小，排成头状花序和短穗状花序。头状花序成熟时变硬，球形，直径 2.5～3 厘米，有刺。果开裂散出种子，形成许多小孔，所以又叫“路路通”。

生长环境 喜生于村旁、坡地、丘陵或山腰的树林中。

产于我国大部分地区。

采集加工 药用果。冬季采集，晒干备用。

性味功能 苦涩微温，气香。祛风去湿，行气活血。

主治用法 (1)风湿性腰腿痛，心胃气痛；(2)月经不调，少乳；(3)荨麻疹、湿疹、皮炎除内服外，尚可煎水外洗。

每用干果 3～6 錢，水煎服。孕妇忌服。

注：枫香树脂亦名白胶香，有活血生肌、解毒止痛的作用，用于治疗疮疡肿毒，作散内服或外用皆可。



图 135　枫香树(金缕梅科，枫香属)

Liquidambar formosana Hance

枫香寄生(扁枝槲寄生)

别名　蟹爪寄生、路路通寄生。

识别特征　(1) 寄生性小灌木。小枝扁平，常有 2～3 叉状分枝，节略扁，节下狭缩，象螃蟹爪，表面有纵纹，干后褐黑色。

(2) 叶退化为鳞片状，生于花下，微小，只见于最幼的节上。

(3) 花细小，常 3 朵簇生在节上。果椭圆形，顶端截平，熟时黄色。

生长环境　寄生于枫树上。

产于我国大部地区。

采集加工　药用全株。夏秋剪取枝条，晒干备用。

性味功能　微苦平。祛风去湿，舒筋活络。

主治用法　风湿性关节炎，腰肌劳损，瘫痪。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。孕妇忌服。



图 136　枫香寄生(桑寄生科，槲寄生属)

Viscum articulatum Burm. f.

刺　　桐

别名　海桐、空桐树、鸡桐木。

识别特征　(1) 落叶乔木，高 5～10 米，有稀疏圆锥状刺，树皮灰色，粗糙。

(2) 叶互生为羽状三小叶，小叶菱形或斜卵形，顶生小叶宽大于长，可达 15 厘米。

(3) 春天常先开花后出叶，花深红色，成总状花序。花后结一串珠状豆荚，长 15～30 厘米。

生长环境　多为栽培。

见于我国南部。

采集加工　药用皮（海桐皮）和叶。剥取树皮，刮去棘刺，洗净，晒干备用。

性味功能　苦平。祛风湿，通经络。

主治用法　(1)风湿性腰腿痛，每用干皮 3～5 錢，水煎服或浸酒服。(2)小儿疳积、蛔虫症，每用干叶粉 8 分～1 錢，冲服。



图 137　刺桐(蝶形花科，刺桐属)

Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr.

苦蔸(假茉莉)

别名　许树、水胡满。

识别特征　(1) 灌木，高 1～2 米，枝条褐色。(2) 叶对生，常为椭圆形，长 2～6 厘米；叶柄长约 1 厘米，有沟纹；揉碎后微有臭气。(3) 花腋生，白色稍带红色。果倒卵形。

生长环境　喜生于滨海滩头、路边、坡地杂草丛中。

主产于我国南方沿海地区。

采集加工　药用根，夏秋采集。洗净，刮去青皮，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒，有小毒。清热解毒，散瘀除湿，舒筋活络。

主治用法　(1)风湿筋骨痛；(2)胃痛；(3)疟疾，肝炎的肝脾肿大。

每用干品 2～3 錢，水煎服。亦可用鲜叶捣烂敷跌打肿痛，煎水洗疥癣。

注：叶有毒，不宜内服。



图 138　苦蔸(马鞭草科，赪桐属)

Clerodendron inerme (L.) Gaertn.

1.花枝；2.果。

金刚藤(菝葜)

别名　筋骨柱子、蓬灯果、金刚刺、马鞍宫、铁菱角。

识别特征　(1) 多年生攀援状灌木，茎圆，有锐刺。

(2) 叶互生，革质，卵状圆形，主脉 5～7 条，通常有三条特别明显，叶柄短，其下常有卷须二条。

(3) 花单性，腋生，雌雄异株。浆果球形，熟时红色。

(4) 块茎不规则，有的形似菱角，坚硬，棕褐色，味涩。

生长环境　喜生于山坡、丘陵或村边的灌木丛中。多见于长江以南地区，江北部分地区亦有生长。

采集加工　药用块根，全年可采。洗净，切片，晒干，或切片用盐水浸泡数小时，蒸熟晒干备用。

性味功能　甘淡凉。祛风除湿。

主治用法　(1)主要用于腰腿痛，风湿性关节炎；(2)肠炎腹泻。

每用干品 1～2 两，水煎服。治风湿性关节炎亦可浸酒内服。外用，研粉炒热加酒调敷关节红肿部位。




图 139　金刚藤(菝葜科，菝葜属)

Smilax china L.

金 毛 狗 脊

别名 狗脊、金毛狗、黄狗头。

识别特征 (1) 多年生树形蕨类植物，高约2～3米。

(2) 根茎平卧，粗大，密生金黄色茸毛，似黄狗毛，故称“金毛狗”。

(3) 叶簇生，叶柄长达1米左右，粗1～2厘米，棕褐色。叶为三回羽状复叶，小叶长约1.5厘米，宽约3毫米，边缘有浅齿。

(4) 孢子囊群沿小叶片背面中脉两侧排成两行。

生长环境 生于大山沟、林下阴湿处。

主产于我国长江以南地区。

采集加工 药用根茎，全年可采。除去金毛及须根，洗净，切片，蒸后晒干备用。金毛，干燥后研粉备用。

性味功能 苦甘温。除风湿，强腰膝。

主治用法 (1)风寒骨痛，腰肌劳损，半身不遂，遗尿，每用干品3～5錢，水煎服，亦可浸酒用。(2)金毛粉撒布，止外伤出血。




图 140　金毛狗脊(蚌壳蕨科，金毛狗脊属)

Cibotium barometz (L.) J. Sm.

1.叶；2.羽片(放大)；3.根茎；4.裂片，示孢子囊群着生位置。

金线吊乌龟(头花千金藤)

别名　金线吊蛤蟆。

识别特征　(1) 多年生缠绕藤本，全株平滑无毛。茎基部木质，枝纤弱，有纵沟纹。

(2) 叶互生，盾状着生三角状近圆形，长5～9厘米，长和宽近相等，基出掌状5～9脉，纸质。

(3) 花序腋生。果球形，成熟后紫红色，内果皮坚硬，呈扁平马蹄形。

(4) 块根多为椭圆形，长约3厘米，宽约2厘米，外表灰黑色，侧生须根，断面粉白色，干后外皮皱缩，暗褐色。

生长环境　喜生于阴湿的山坡、路边、溪边草丛中，或矮林边缘。

产于长江以南各地。

采集加工　药用块根，秋末冬初采集，除去须根，洗净，切片晒干备用。

性味功能　苦辛寒。祛风，利水，清热，化痰。

主治用法　(1)风湿疼痛，腰肌劳损，肾炎水肿，胃痛，肺结核，每用干品3～5钱，水煎服。(2)无名肿毒，毒蛇咬伤，用鲜品捣烂外敷。




图 141　金线吊乌龟(防己科，千金藤属)

Stephania cepharantha Hyata

1.雄花枝；2.果枝；3.雄花；4.雄花序；

5.块根。

狗脚迹(梵天花)

别名　小桃花。

识别特征　(1) 直立分枝灌木，高约 0.5 米，全株有绒毛，茎皮纤维丰富。

(2) 叶互生，叶形不一，通常卵形，长 1.5～3.5 厘米，有 3～5 个深裂，裂片倒卵形或菱形，上面中脉两侧常有紫黑色斑纹，很象狗的脚印。

(3) 花鲜红色，五瓣，单生于叶腋。果扁平，有倒刺。

生长环境　山野及荒郊草地极为常见。

我国东南部各省均有出产。

采集加工　药用全株，以根为好，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　苦平。祛风除湿，解毒消肿。

主治用法　(1)风湿痹痛，腰肌劳损，跌打瘀积肿痛；(2)毒蛇咬伤，疮疡肿毒。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜品捣烂敷患处。



图 142　狗脚迹(锦葵科，梵天花属)

Urena sinuata L.

1.花枝；2.果；3.叶，示叶边缘有黑斑。

威灵仙(铁脚威灵仙)

别名　青龙须。

识别特征　(1) 缠绕藤本,长可达数米，茎有纵棱。

(2) 叶对生,为羽状复叶，常有小叶 5 片，偶为 3 片，小叶对生，多为卵形，长 3～7 厘米,基出 3 脉，叶柄长而扭曲。

(3) 花白色,有毛。果扁平卵形，顶部有白色羽毛的白色花柱存留。

生长环境　多生于河边、荒地或山坡旷野的小灌木丛中。

我国大部地区有产。

采集加工　药用根，秋季采集。洗净,切段,晒干备用。

性味功能　苦温。祛风湿，通经络。

主治用法　(1)风湿筋骨痛，跌打瘀痛，肢体麻木，痛风，偏头痛，每用干品 3～5 錢，水煎服。(2)骨刺哽喉，每用干品 1 两，水煎，慢慢含咽。



图 143　威灵仙(毛茛科，铁线莲属)

Clematis chinensis Osbeck

1.花枝；2.瘦果，示羽状宿存长花柱。

穿破石(蔓芝)

别名　饭团簕、野梅子、山荔子。

识别特征　(1) 直立或攀援灌木，长 2～4 米，枝有粗壮而锐利的刺，折断后有白色乳汁。

(2) 叶互生，卵形，长 3～8 厘米，宽 2～3.5 厘米，侧脉 8～10 对。

(3) 头状花序，腋生。果肉质似饭团，直径 5 厘米左右，熟时黄色。

(4) 根发达，表皮橙黄色，挖出后爆裂脱落，故有“金蝉脱壳”之称。

生长环境　多生于山沟林荫下或溪边灌木丛中。

主产于广东、广西、福建、浙江、安徽、湖南。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　淡微苦微凉。凉血散瘀，舒筋活络。

主治用法　(1)肺结核；(2)风湿性腰腿痛，跌打肿痛；(3)闭经。

每用干品 3 錢～1 两，水煎服。




图 144　穿破石(桑科，葨芝属)

Cudrania cochinchinensis (Lour.)
Kudo et Masam.

附：柘

柘，亦称穿破石，灌木。叶卵圆形，先端钝尖或渐尖，有时三浅裂，基部钝圆，一般长3厘米左右，被微毛，叶腋有利刺，老时刺少，根与蓑芝相似，功用相同。



图 144-1　柘(桑科，聂芝属)

Cudrania tricuspidata (Carr.) Bureau

扁藤(扁茎崖爬藤)

别名　腰带藤、扁担藤、羊带风。

识别特征　(1) 木质大藤本，有卷须。茎扁平，腰带状，有节，宽可达5～10厘米，断面有环纹。

(2) 叶互生，为掌状5小叶，小叶卵状长椭圆形，长7～18厘米，宽3～5厘米。

(3) 花淡绿色。浆果肉质，卵圆形如雀蛋大，熟时黄色。

生长环境　喜生于高山密林下，缠绕它树上。主产于我国南部各地。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片晒干。

性味功能　辛微涩温。祛风燥湿。

主治用法　(1)风湿性腰腿痛，半身不遂，肌肉风湿痛，每用干品1～1.5两，水煎服。或浸酒服用。(2)鲜叶捣烂外敷，治下肢溃疡。



图 145　扁带藤(葡萄科，崖爬藤属)

Tetrastigma planicaule (Hook.) Gagnep.

骨碎补(槲蕨)

别名　猴姜、石岩姜、爬岩姜。

识别特征　(1) 附生蕨类植物。根茎横走，肉质肥厚，密被金黄色卷曲的长鳞片。

(2) 叶二型：营养叶基生，小形，无柄，卵圆形，边缘浅裂；生殖叶有柄，羽状深裂；有裂片7～13对，基部下延于柄上成狭翅。

(3) 孢子囊群生于裂片背面侧脉之间。

生长环境　附生于树干或山林石壁上。

多产于我国长江以南各省区。

采集加工　药用根茎，全年可采。洗净，刮去绒毛，切片，蒸后晒干备用。

性味功能　苦温。祛风湿，强筋骨，理跌打。

主治用法　风湿性关节炎，腰肌劳损，瘫痪麻痹，跌打瘀痛。

每用干品3～5錢，水煎服。




图 146　骨碎补(水龙骨科，槲蕨属)

Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.

豺皮樟

别名　白叶仔、清香剑、豹皮樟。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，多分枝，纤细，嫩枝有毛，木质硬，全株有樟香气。

(2) 叶互生，革质，倒卵状椭圆形，长 2.5～5 厘米，宽 1～2.2 厘米，上面绿色，背面粉绿。

(3) 花小，腋生。果球形，胡椒大小，无柄。

生长环境　喜生于山野灌木或疏林中。

主产于广东、广西、福建。

采集加工　药用根、叶，全年可采。洗净，切片，阴干备用。

性味功能　辛甘温，有香气。祛风除湿，行气止痛。

主治用法　(1)风湿性关节炎，跌打损伤，腰腿痛；(2)闭经，经期腹痛；(3)消化不良，心胃气痛，感冒头痛。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服或浸酒服。




图 147　豺皮樟(樟科，木姜子属)

Litsea rotundifolia Hemsl. var. oblongifolia (Nees) Allen

1.果枝；2.花枝；3.花；4.雌蕊，示子房纵切；5.雄蕊；6.果。

倒 吊 笔

别名 墨柱根、刀柄、章表。

识别特征 (1) 乔木，全株有白色乳汁，茎有皮孔。

(2) 叶对生，矩圆状卵形，长 6～12 厘米，两面有毛。

(3) 花白色或稍带粉红色，生于枝顶。果长圆柱形，形似倒吊的毛笔，故称“倒吊笔”，长达 20 厘米，种子有多数絲状白色长毛。

生长环境 生于村边、山野、丘陵、疏林中，亦有栽培。

我国南方有出产。

采集加工 药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能 甘凉。祛风湿，通经络，散结化郁。

主治用法 (1)风湿性关节炎，腰腿痛，淋巴结核，黄疸型肝炎，肝硬化腹水，每用干根 1～2 两，水煎服。(2)感冒发烧，每用干叶 2～3 錢，水煎服。亦作凉茶配料。



图 148　倒吊笔(夹竹桃科，倒吊笔属)

Wrightia pubescens R. Br.

1.花枝；2.花冠纵切面；3.花(去花冠)；
4.雄蕊；5.果。

臭　茉　莉

别名　臭屎茉莉、大髻婆。

识别特征　(1) 亚灌木，高 1～2 米，小枝有毛。

(2) 叶大，对生，阔卵形，长 11～15 厘米，边缘有粗齿，揉碎后有特殊臭气，故称“臭茉莉”。

(3) 花白色或淡粉红色，密生于枝顶，排成聚伞花序。

生长环境　各地均有栽培，亦散生于村边、园边、旷地上。

采集加工　药用根、叶，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　淡平。祛风活血，消肿降压。

主治用法　(1) 风湿性关节炎，腰腿痛，瘫痪，脚气水肿，每用干根 1～2 两，水煎服；(2)痔疮，脱肛，用干根适量，煎水坐浴；(3)高血压，每用干叶 1～2 两，水煎服。




图 149　臭茉莉(马鞭草科，赪桐属)

Clerodendron fragrans Vent.

宽筋藤(中华青牛胆)

别名　舒筋藤、伸筋藤。

识别特征　(1) 木质大藤本。嫩枝有毛，老茎褐黑色有凸出白色皮孔，皮易脱落，断面有菊花样花纹。

(2) 叶互生，心脏形基出脉 5～7 条，叶柄有毛。

(3) 花腋生。核果熟时鲜红色，半球形，长近 1 厘米。

生长环境　生于山地密林、疏林，常缠绕在他树上。

产于广东、广西、湖南。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微苦凉。舒筋活络，清热利湿。

主治用法　风湿筋骨痛，腰肌劳损，跌打扭伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。




图 150　寬筋藤(防己科，青牛胆属)

Tinospora sinensis (Lour.) Merr.

海 南 蕷

别名 山胡椒。

识别特征 (1) 草质或木质藤本。茎有细条纹，节膨大，全株有香辣味。

(2) 叶互生，长卵形，长7～12厘米，宽3～4厘米；叶脉5条，近中脉一对基部与中脉平行，至离叶基1厘米处分开上升。

(3) 花单性，集成穗状花序。果球形。

生长环境 喜生于深山沟谷密林下，攀援于树木、岩石上。

主产于广东、广西。

采集加工 药用全株，以根为好，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 辛热，有气香。祛风除湿，芳香健胃。

主治用法 (1)风湿痛；(2)胃痛，消化不良，腹胀。

每用干品3～5錢，水煎服或浸酒服。



图 151　海南蒟(胡椒科，胡椒属)

Piper hainanense Hemsl.

桑 寄 生

识别特征 (1) 寄生性小灌木。枝无毛有凸起瘤点(皮孔)，小枝略有短毛。

(2) 叶近对生或互生，革质，卵圆形或长椭圆状卵形，两面无毛。

(3) 花序腋生，有花 1～3 朵，长管状，紫红色；有红褐色毛茸。

(4) 果椭圆形，内有粘质。

生长环境 我国南部各省区均有分布，寄生于许多不同种类的树上（如构、白兰、八角枫、木棉、桑树等)。

采集加工 药用全株，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能 苦涩平。祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎催乳。

主治用法 (1)风湿骨痛，腰肌劳损，小儿麻痹后遗症，四肢麻木；(2)缺乳，胎动不安；(3)高血压，浮肿。

每用干品 3～5 錢，水煎服。或煎水代茶饮。



图 152　桑寄生(桑寄生科，桑寄生属)

Loranthus parasiticus (L.) Merr.

梧　桐

别名　桐、青桐。

识别特征　(1) 落叶乔木，高一般 5～10 米，树干直立，表皮绿色，光滑。

(2) 叶互生，掌状，长宽各 16～20 厘米，有 3～5 个裂，叶柄约与叶等长。

(3) 花淡黄色，顶生。果一侧开裂，有豌豆大的种子 2～4 个，着生于果壳的边缘。

生长环境　全国有栽培。以江苏、浙江、湖南、江西多产。

采集加工　药用花、种子、叶、根。六月采花，九月采子，叶、根随时可采。晒干备用。

性味功能　花、子，甘平；根、叶，苦凉。花、叶：清热解毒；子：健脾消滞；根：除风去湿。

主治用法　(1)水肿，每用干花 3～5 錢，水煎服；(2)烧、烫伤，干花研粉调涂；(3)伤食腹泻，用子炒焦研粉，冲服，每服 1 錢；(4)风湿骨痛，跌打骨折，哮喘，用根或叶 5 錢～1 两，水煎服；(5)痈疮肿毒，干叶研粉，调蜜敷患处。



图 153　梧桐(梧桐科，梧桐属)

Firmiana simplex (L.) W. F. Wight

1.花枝；2.雌花；3.蓇葖果。

杪　拉　木

别名　五层龙。

识别特征　(1) 攀援灌木，高 1～2 米，小枝有稜。

(2) 叶对生，椭圆形或长椭圆形，长 5～11 厘米，宽 2～5 厘米，边缘有钝齿。

(3) 花小，淡黄色，3～6 朵聚生于叶腋。果球形。

(4) 根皮金黄色，断面常有五圈环纹，故名“五层龙”。

生长环境　喜生于山坡、丘陵干燥的灌木丛中。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　涩温。通经活络，祛风除湿。

主治用法　风湿性关节炎，腰肌劳损，体虚无力。

每用干品 5 錢～ 1 两，水煎服，或浸酒服。




图 154　桫拉木(希藤科，桫拉木属)

Salacia prinoides (Willd.) DC.

1.花枝；2.花；3.果。

野颠茄*（颠茄）

别名　红颠茄、山马铃。

识别特征　(1) 直立亚灌木，高 30～60 厘米。茎有棕色硬而脆的钩刺和劲直的长刺。

(2) 叶互生，外形似茄叶，长 5～12 厘米，宽 5～10 厘米，边缘有不规则浅裂，两面有毛，叶脉、叶柄均有小钩刺。

(3) 腋生穗状花序，花白色。果肉质，球形，直径 2～4 厘米，熟时橙红色。

生长环境　生于村边、路旁、荒地。

产于华南地区。

采集加工　药用根、叶，夏秋采集。根洗净，切段，晒干备用。

性味功能　苦辛温，有毒。散瘀止痛，镇咳平喘。

主治用法　风湿性腰腿痛，慢性支气管炎，哮喘。

每用干根 2～3 钱，水煎服。鲜叶捣烂外敷治跌打损伤。

注：本品有毒，用量不宜过大。




图 155　野蓼茄(茄科，茄属)

Solanum surattense Burm. f.

楤木(鸟不企)

别名　刺龙苞。

识别特征　(1) 灌木，高约 3 米，枝有疏刺，被黄色茸毛。

(2) 叶互生，奇数二回羽状复叶，有小叶 7～15 片，小叶卵形至长卵形，长 7～15 厘米，宽 3～8 厘米，两面有黄毛，边缘有细齿。

(3) 花白色，集成伞状花序。果球形，有 5 棱。

生长环境　生于村边、山谷近水潮湿处。

产于全国大部分地区。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛温。祛风除湿。

主治用法　风湿性腰腿痛，急、慢性肝炎。

每用干品 1～2 两，水煎服。




图 156　楤木(五加科，楤木属)

Aralia decaisneana Hance.

赪　桐

别名　赪桐花、状元红、红菱。

识别特征　(1) 直立灌木，高约 1～2 米。

(2) 叶大，对生，卵圆形，直径 15～30 厘米，边缘有锯齿，背面有圆形腺点，无臭味，叶柄长 5～10 厘米。

(3) 圆锥花序顶生，长可达 30 厘米或更长。花红色。

生长环境　喜生于山脚、村边、路旁灌木丛中。

主产于我国南部。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘微凉。祛风湿，清肺热，排脓解毒。

主治用法　(1)风湿骨痛，腰肌劳损；(2)劳伤咳嗽，咳血；(3)疔疮疖肿。

每用干根 1～2 两，水煎服。鲜叶捣烂外敷，治疔疮疖肿。




图 157　赪桐(马鞭草科，赪桐属)
Clerodendron kaempferi (Jacq.) Sieb.

樟　　树

别名　香樟木、乌樟。

识别特征　(1) 常绿乔木，高可达20～30米。树皮幼时绿色，老时变为褐色有不规则纵裂，全株有樟脑香气。

(2) 叶互生，卵形，长6～12厘米，宽3～5厘米，上面绿色光亮，背面粉绿色，离基三出脉，主脉腋内有隆起的腺体。

(3) 小花，黄绿色，腋生。果卵形或球形，豌豆大小，熟时紫黑色。

生长环境　喜生于山岗、坡地、河岸、路边，多为人工栽培。

主产于我国东南部和中部地区。

采集加工　药用根、果。秋末冬初采果实，晒干备用；根全年可采，洗净，阴干备用，最好随用随切。

性味功能　辛微温。祛风散寒，消食化滞。

主治用法　(1)胃肠炎，胃寒腹痛，食滞，腹胀，每用干果3～5钱，水煎服。(2)风湿骨痛，跌打损伤，感冒头痛，每用干根5钱～1两，水煎服。




图 158　樟树(樟科，樟属)

Cinnamomum camphora (L.) Sieb.

薜　荔

别名　凉粉果、老鸦饅头藤、木瓜藤、壁石虎。

识别特征　(1) 常绿攀援藤本，折断有白色乳汁。

(2) 幼株以气根匍匐于树干、石面或墙壁上。叶互生，心状卵形，长约 2.5 厘米，基部偏斜。

(3) 老株枝硬，叶互生，大而厚，长椭圆形，长 4～10 厘米，基出三脉。

(4) 花序单生于叶腋，陀螺形（无花果），长 3～5 厘米，直径 2.5～3 厘米，可作凉粉，故又称“凉粉果”。

生长环境　多附生于墙壁、岩石或树干上。

主产于长江以南，山东亦有分布。

采集加工　药用茎、叶、果。茎、叶全年可采，洗净，切段晒干；果于夏秋季采，剖开挖去子仁晒干。

性味功能　果：酸平，通经，催乳；茎叶：驱风活络。

主治用法　(1)茎叶名“薜荔络石藤”，治风湿性腰腿痛，每用干品 3～5 錢，水煎服或浸酒服。(2)果实名“广东王不留行”，治缺奶、闭经，每用干品 3～8 錢，水煎服。




图 159　薜荔(桑科，榕属)

Ficus pumila L.

1.果枝；2.果(纵切面)。

五、活血止血类

（适应各种内外伤出血、月经不调、便血、尿血等疾病）

大 叶 紫 珠

识别特征 (1) 灌木至小乔木，全株有灰白色长茸毛。

(2) 叶对生，长椭圆形，长 15～24 厘米，宽 7～9 厘米，边缘有锯齿。

(3) 花小，腋生，多数集成聚伞花序，花冠紫色。果球形，径约 2 毫米，熟时紫红色。

生长环境 喜生于山坡、丘陵、村边灌木丛中。

主产于广东、广西、福建、贵州、云南。

采集加工 药用根、叶。根，全年可采，洗净，切片，晒干备用；叶，夏秋采集，晒干研末备用。

性味功能 辛苦平。止血止痛，散瘀消肿。

主治用法 (1)消化道出血，咯血，衄血，创伤出血，拔牙出血；(2)跌打肿痛，风湿骨痛。

每用干根或叶 5 錢～1 两，水煎服。外伤出血，用干粉撒敷患处。



图 160　大叶紫珠(马鞭草科，紫珠属)

Callicarpa macrophylla Vahl.

附：裸花紫珠

裸花紫珠，功用和大叶紫珠基本相同。区别点是：大叶紫珠全株被灰白色长茸毛，而裸花紫珠幼枝被粗糠状毛，老枝秃净且有皮孔；大叶紫珠比裸花紫珠叶大而毛多，大叶紫珠花序不如裸花紫珠长大，花序柄也短。



图 160-1　裸花紫珠(马鞭草科，紫珠属)

Callicarpa nudiflora Hook et Arn.

大　蓟(蓟)

别名　鸡项草、大青青菜、马刺草。

识别特征　(1) 多年生粗壮草本，高 0.5～1 米。茎直立，多分枝，有毛。

(2) 叶抱茎，基生的较大，长 7～22 厘米，上部的叶渐小，上面深绿色，有疏毛，背面粉绿色，边缘呈不规则羽状深裂，裂片一般 5～6 对，裂齿有长而直的针状锐刺。

(3) 头状花序，单生，直径 3～4 厘米，花紫红色，管状。

(4) 根纺锤状，肉质，形似萝卜，故又称“山萝卜”。

生长环境　喜生于荒野、山坡、村边、路旁潮湿地。

全国各地均产。

采集加工　药用根和全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　苦凉。凉血止血，散瘀消肿。

主治用法　(1)用于咯血、吐血、衄血、尿血、创伤出血、跌打瘀肿；(2)疮痈肿毒；(3)肝炎。

每用干品 0.5～1 两，水煎服。外用鲜根或全草，捣敷疮疖。




图 161　大蓟(菊科，蓟属)

Cirsium japonicum DC.

1.花枝；2.植物之下部；3.花。

附：小　　蓟

小蓟，多年生草本。无纺锤状块根，而有细长的匍匐根。茎直立，高20～60厘米，被白色绵毛，近顶稍分枝。叶互生，裂远比大蓟为浅，每齿具金黄色小针刺，不如大蓟长，叶面均被绵毛，老时渐脱。头状花序，较大蓟为小。两者功效基本相同。一般治疮多用大蓟，治肝炎多用小蓟。



图 161-1　小蓟(菊科，蓟属)

Cirsium segetum Bge.

马　鞭　草

别名　铁马鞭、马板草、疟马鞭。

识别特征　(1) 多年生草本，高 30～60 厘米。茎方形，节上有毛。

(2) 叶对生，不规则分裂，形似菊花叶。

(3) 花小，淡紫蓝色，集成穗状花序，呈马鞭状，长可达 25 厘米，故称“马鞭草”。果小，长圆形。

生长环境　喜生于荒地、路边、村前屋后潮湿的草地上。

全国各地均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，切段备用。

性味功能　苦寒。活血散瘀，清热解毒，通淋利尿。

主治用法　(1)闭经，月经困难；(2)流感高热，疟疾；(3)肝炎，肝硬化腹水；(4)肾炎水肿，尿路感染，尿路结石；(5)跌打扭伤，湿疹，皮炎。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。鲜品捣烂外敷治跌打扭伤，煎水外洗治湿疹，皮炎。




图 162　马鞭草(马鞭草科，马鞭草属)

Verbena officinalis L.

1.花枝上部；2.花；3.花纵切，示雄蕊和雌蕊。

五月艾(艾)

别名　艾蒿。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高50～80厘米。茎枝灰白色，有短毛及纵条纹，揉之有香味。

(2) 叶互生，羽状多回深裂，裂片狭小，成线形，有粗齿，上面深绿色，背面有灰白色小毛。

(3) 头状花序多数，花淡黄色，全为管状。

生长环境　喜生于村前屋后、荒地、田埂上。我国各地都有野生。

采集加工　药用叶或全草。于5～6月割取地上部分，阴干备用。

性味功能　苦微温，气芳香。温气血，逐寒湿，调经，安胎，止血。

主治用法　(1)吐血、衄血、便血；(2)月经不调，崩漏，胎动不安；(3)肠炎，痢疾；(4)跌打扭伤。

每用干品3～5錢，水煎服。鲜叶捣烂外敷患处，或全草与它药配方浸酒擦患处治跌打。

此外，叶可作成艾柱，用于灸法。全株可以用作驱蚊蝇、杀蛆。



图 163　五月艾(菊科，艾属)

Artemisia vulgaris L.

元　宝　草

别名　穿心草、红元宝、对月草。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高 25～60 厘米，茎圆柱形。

(2) 叶对生，长椭圆状披针形，两片叶基部连合为一体，茎贯穿其中，形如“元宝”，故称“元宝草”，上面绿色，背面灰绿色或紫色，有黑色小腺点。

(3) 花黄色，生于枝顶。蒴果椭圆形。

生长环境　喜生于耕地、荒坡、村边、路旁草地。

主产于我国南部各地。

采集加工　药用全草，秋季采集。晒干备用。

性味功能　辛苦寒。通经活络，凉血止痛。

主治用法　(1)腰腿疼痛，月经不调，衄血，吐血，每用干品 3～5 錢，水煎服。(2)跌打损伤，痈疮疔毒，毒蛇蛟伤，用鲜品捣烂外敷。




图 164　元宝草(金丝桃科，金丝桃属)

Hypericum sampsonii Hance

牛　膝

别名　山牛膝、怀牛膝、红牛膝。

识别特征　(1) 多年生草本，高可达 1 米，茎直立，四棱形，有纵条纹，红色，节膨大稍呈膝状。

(2) 叶对生，椭圆形或广披针形，长 5～12 厘米，宽 1.5～6 厘米，嫩时有毛，老时无毛。

(3) 花黄绿色，穗状花序，序轴密生长柔毛，但无倒刺触手感，可与倒扣草区别。

(4) 根红色，肉质，多条。

生长环境　多为栽培，亦有野生。

全国大部地区有分布。

采集加工　药用根，秋冬采集。洗净，晒干，生用或酒炒、盐水炒、炒炭用。

性味功能　苦酸平。活血通经，通利关节。

主治用法　(1) 生用治疗产后腹痛，月经不调，脚气水肿，难产；(2)熟用治疗腰膝痛，瘫痪，痿软，跌打瘀痛。

每用干品 2～4 錢，水煎服。



图 165　牛膝(苋科，牛膝属)

Achyranthes bidentata Bl.

1.花枝；2.根；3.花；4.雄蕊和雌蕊。

毛　　稔

别名　豺狗舌、红爆牙狼。

识别特征　(1) 直立灌木，高 1～2 米，茎枝被散生、扩展的长粗毛。

(2) 叶对生，卵状披针形，长 10～14 厘米，宽 2.5～5 厘米，上面绿色，背面常呈红色。

(3) 花紫红色，大，生于枝顶。果杯形，有红色长而硬的粗毛。

生长环境　生于荒野、草地、溪边或灌木丛中。

主产于我国南部。

采集加工　药用全株，全年可采。根，洗净切片，晒干备用。叶，晒干，研末备用。

性味功能　涩微温。收敛止血，消食止痢。

主治用法　(1)水泻便血，妇女月经过多，外伤出血，每用干根 1～3 两，水煎服。(2)外伤出血，用叶晒干研成细粉外敷。



图 166　毛稔(野牡丹科，野牡丹属)

Melastoma sanguineum Sims.

凤　仙　花

别名　指甲花、灯盏花。

识别特征　(1) 一年生直立草本，高 30～50 厘米。茎光滑，肉质，有时红色。

(2) 叶互生，狭长披针形，长可达 10 厘米，边缘有齿，叶柄两侧有疣状突点（腺体）。

(3) 夏季叶腋开粉红色、红色、白色或紫色的花。果似榄核状，绿色有毛，熟时黄色，触之即开裂，将种子弹出。

生长环境　全国各地都有栽培。

采集加工　药用根茎、花及种子。6月采花，7月采子，晒干备用。

性味功能　花甘滑，子及全株苦辛溫，有小毒。活血散瘀，通经软坚，解蛇毒。

主治用法　蛇伤，痈疮，跌打瘀积肿痛，闭经，难产。

每用干花 1～2 錢，种子 1～1.5 錢，全草 3～5 錢，水煎服。 尙可用全草捣烂敷蛇伤、跌打、疮痈。



图 167　凤仙花(凤仙花科，凤仙花属)

Impatiens balsamina L.

1.花果枝；2.开裂的果。

龙　船　花

别名　山丹、五月花、映山红、红缨花。

识别特征　(1) 小灌木，高 1.5 米左右，小枝深褐色。

(2) 叶对生，光滑无毛，倒卵状披针形，长 6～13 厘米，宽 3～4 厘米，柄短，托叶膜质。

(3) 花橙红色，顶生，高脚碟形，又叫“红缨花”。

(4) 果近球形，熟时黑色。

生长环境　生于山坡林下、路旁、村边、灌木丛中。

主产于我国南部。

采集加工　药用花、茎、叶、根。根、茎、叶全年可采，洗净晒干备用（根宜切片）。花，夏秋采集，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清肝降压，活血散瘀，清热解毒，行气止痛。

主治用法　(1)月经不调，闭经（用花）；(2)高血压（用花）；(3)肺结核咳嗽、咯血（用根）；(4)跌打损伤，瘀血疼痛，疮疖痈肿（用茎、叶）。

每用干花 3～5 錢，干根 1～2 两，水煎服。外敷多用鲜茎、叶，捣烂，或全株晒干研粉，用水调敷患处。




图 168　龙船花(茜草科，龙船花属)

Ixora chinensis Lam.

1.花枝；2.花冠纵切面；3.子房纵切面；4.果。

仙　鹤　草

别名　龙芽草。

识别特征　(1) 多年生草本，全株有柔毛，高约 0.5～1 米。茎圆而有浅纵沟，上部绿色，下部木质化，灰黄色。

(2) 叶互生，羽状复叶，小叶对生或稍对生，大小相间，卵圆形，有粗锯齿。

(3) 花顶生，黄色，五瓣，集成一个总状花序。

(4) 根表面黑色，主根粗壮，细根很多。

生长环境　喜生于村边、路旁阴湿的林荫下。

我国南北各省均产。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　苦凉。收敛止血。

主治用法　各种出血，如崩漏、带下、血痢、创伤出血。

每用干品 3～5 錢，水煎服。创伤出血，可同时用干粉外敷，疖肿可用鲜品捣敷患处。



图 169　仙鹤草(蔷薇科，龙芽草属)

Agrimonia viscidula Bunge

白桂目(桂木)

别名　胭脂公、狗果树。

识别特征　(1) 大乔木，高可达 10～20 米。(2) 叶互生，排成二列，革质，椭圆形或卵状椭圆形，长 7～15 厘米，宽 3～7 厘米，全缘或有不规则的钝齿，侧脉 6～10 对。

(3) 花序单个或成对腋生。果球形，柄甚短，肉红色，味酸，直径 2～3 厘米，表面有褐色短毛。

生长环境　喜生于山沟旁或山谷疏林。

我国南部各地均有分布。

采集加工　药用果和根。全年采根，秋季采果。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　酸平。清热开胃，收敛止血。

主治用法　(1)肺热咳血，吐血，衄血，喉痛；(2)胃酸缺乏，食欲不振。

每用干果 5 錢～1 两，干根 5 錢～1.5 两，水煎服。

注：另有一种白桂木(胭脂木、狗卵果、红桂木)，其果实称为红桂目，亦可入药，功效较白桂目稍差。



图 170　白桂目(桑科，桂木属)

Artocarpus nitidus Trec. ssp. lingnanensis (Merr.) Jarr.

白　　茅

别名　茅草、茅根、甜根草。

识别特征　(1) 多年生草本，茎直立，高约 1 米。

(2) 叶似水稻但较硬，线状披针形，边缘粗糙。

(3) 花序呈圆柱形，长 5～20 厘米，有白色絲状毛。

(4) 地下根茎匍匐横走，白色，有节，节上生须根，味甘甜。

生长环境　多生于山坡、荒地，尤能在瘠薄土地上生长。

全国各地均产。

采集加工　药用根茎、花，冬春采集。洗净，除去鱗叶，切段或扎把，晒干备用。

性味功能　甘凉。凉血止血，清热利水。

主治用法　(1)咳血、衄血、吐血、尿血；(2)尿路感染，肾炎水肿；(3)口舌生疮。

每用干根 1～2 两，鲜根 2～4 两，干花 1～2 錢，水煎服。



图 171　白茅(禾本科，白茅属)

Imperata cylindrica var. major (Nees) C. E. Hubb.

红背三七(土三七)

别名　三七草、散血丹、血三七。

识别特征　(1) 多年生直立草木，高通常0.5～1米。茎幼时紫红色，多分枝，表面光滑，有细线稜。

(2) 基生叶成一簇，多有锯齿或羽状分裂，上面深绿色，背面紫红色，故又称红背三七；茎生叶互生，羽状分裂，裂片有疏齿。

(3) 头状花序，长1.5～2厘米，花深黄色。

生长环境　喜生于肥沃湿润草地或沟旁的小灌木丛中。

我国大部分地区有野生。

采集加工　药用全草，全年可采。多为鲜用。

性味功能　淡微涩平。活血通经，祛风消肿。

主治用法　(1)跌打损伤，瘀积肿痛，风湿骨痛，每用鲜品1～2两，水煎服。(2)痈疮肿毒，乳痈，用鲜品捣敷患处。




图 172　红背三七(菊科，土三七属)

Gynuna segetum (Lour.) Merr.

附：白背三七

白背三七，全株粗大稍肉质，叶背粉绿色，功用与红背三七基本相同。



图 172-1　白背三七(菊科，土三七属)

Gynura divaricata (L.) DC.

红叶铁树(铁树)

别名　朱蕉、朱竹。

识别特征　(1) 灌木，高 1～3 米。茎直立，不分枝或极少分枝，有节，节间短，稍带红色。

(2) 叶椭圆状披针形，长 30～50 厘米，宽约 5 厘米，聚生于枝顶，绿色或紫红色。

(3) 花无柄，红色或紫色。

生长环境　栽培植物。

多见于我国南方。

采集加工　药用花、叶、根。花于夏初采集晒干。根、叶全年可采，洗净，切段，晒干备用。

性味功能　淡平微凉。凉血止血，散瘀定痛。

主治用法　(1)肺结核咯血，先兆流产，月经过多，尿血，痔疮出血；(2)肠炎菌痢；(3)风湿骨痛，跌打肿痛。

每用鲜叶 2～3 两，或干根 1～2 两，或干花 3～5 錢，水煎服。



图 173　红叶铁树(龙舌兰科，铁树属)

Cordyline fruticosa (L.) A. Cheval.

1.植物全形；2.花枝；3.叶(放大)。

血见愁(山藿香)

别名　皱面草、方枝苦草。

识别特征　(1) 一年生草本，高30～70厘米。茎方形，下部常伏地，上部直立。

(2) 叶对生，卵形，长3～6厘米，宽1.5～3厘米；两面有毛，背面较密，边缘有粗钝齿，上面有皱纹，故又称"皱面草"。

(3) 花淡红色，成对，轮状排列成腋生或顶生的总状花序。果圆形。

生长环境　喜生于村前屋后、荒地、路边草丛中。

我国南部均有分布。

采集加工　药用全草，夏季采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　淡凉。散瘀消肿，止血止痛。

主治用法　(1)跌打扭伤；(2)吐血，衄血，外伤出血；(3)毒蛇咬伤，疔疮疖肿。

每用干品5钱～1两，水煎服。外用鲜品适量捣烂敷患处。




图 174　血见愁(唇形科，草石蚕属)

Teucrium viscidum Bl.

1.花枝；2.根。

花木通(山铁线莲)

别名　三角枫、淮通、绣球藤。

识别特征　(1) 藤状灌木，茎常扭曲。

(2) 叶对生，有长柄；指状 3 小叶，卵形或椭圆形，顶生小叶大于侧生小叶，边缘有疏齿或有浅裂，稍有毛。

(3) 花多朵簇生于叶腋内，白色。果扁卵形，顶部有羽毛状宿存花柱。

生长环境　生于山坡灌木丛中。亦有栽培。

我国大部分地区有分布。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。活血通经，利水消肿。

主治用法　(1)妇女经闭，乳汁不行；(2)肾炎水肿。

每用干品 3～5 錢，水煎服。



图 175　花木通(毛茛科，铁线莲属)
Clematis montalla Buch-Ham ex DC.

旱莲草(鳢肠)

别名　墨菜、白花蟛蜞菊、莲蓬草。

识别特征　(1) 一年生半伏地草本，高 60 厘米左右。全株有粗毛，枝条红褐色，揉碎后汁液变成黑色，故又称"墨菜"。

(2) 叶对生，长披针形，长 2～5 厘米，近全缘或稍有锯齿，两面均有白色短粗毛。

(3) 头状花序单生于叶腋或顶生，花白色，中央为管状花，外层两列为舌状花，花序形如莲蓬，所以叫"旱莲草"。

生长环境　喜生于塘边、沟旁、草地、田野等湿润处。

全国大部地区都有分布。

采集加工　药用全草。夏秋采集，洗净，晒干备用。

性味功能　甘酸微寒。凉血止血，清肝热，养肾阴。

主治用法　(1)主要用于内脏出血，如肺结核咳血、胃肠出血、尿血；(2)慢性肝炎，小儿疳积发热；(3)痢疾；(4)脚癣，跌打损伤，疖肿。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服，小儿酌减。鲜品捣烂外敷跌打疮疡，煎水洗脚癣、皮炎。



图 176　旱莲草(菊科，鱧腸属)

Eclipta alba (L.) Hassk.

虎　　刺

别名　绣花针、伏牛花。

识别特征　(1) 直立小灌木，高 30～70 厘米，分枝多。枝条灰白色，成"之"字形弯曲；有刺，细直如针，故又叫"绣花针"。

(2) 叶对生，矩圆形，长 1～2.5 厘米，基部圆形，近无柄。

(3) 花白色，1～2 朵聚生于腋内，高脚碟形。

(4) 果圆形，豆粒大，熟时暗红色。

生长环境　喜生于溪边、村边、灌木丛中。主产于长江以南大部地区。

采集加工　药用全株，全年可采。采后洗净，切段，晒干备用。

性味功能　苦平。消肿利尿，活血散瘀。

主治用法　(1)急慢性肝炎，脾脏肿大；(2)风湿腰腿痛；(3)水肿。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。亦可研粉内服，每服 5 分～1 錢。




图 177　虎刺(茜草科，虎刺属)

Damnacanthus indicus Gaertn. f.

虎舌红(乳毛紫金牛)

别名　山猪怕、红毡毯、红毛针。

识别特征　(1) 矮小亚灌木，高 10～20 厘米，有暗红色粗毛。

(2) 叶互生，椭圆形，长 7～10 厘米，两面有紫红色粗毛和黑色小腺体，故称"乳毛紫金牛"。

(3) 果球形，黄豆大，幷疏生红色毛，熟时红色。

生长环境　喜生于山谷林荫下潮湿处。

我国东南部至西南部均有分布。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　辛涩微甘凉。清热利湿，凉血止血。

主治用法　(1)痢疾、黄疸、风湿骨痛；(2)肺病咯血，外伤吐血，月经过多，痛经；(3)小儿疳积。

每用干品 3～5 錢，水煎服。跌打肿痛、疮痈，亦可研粉配方作外敷剂。




图 178　虎舌红(紫金牛科，朱砂根属)
Ardisia mamillata Hance

侧　　柏

别名　扁柏。

识别特征　(1) 常绿乔木，高达 20 米，塔形，小枝扁平。

(2) 叶紧贴在小枝上，鳞形，绿色，每节 4 片，交互对生。

(3) 球果卵圆形，长 1.2～2.5 厘米，内有种子八枚。

生长环境　喜生于坡地、温暖湿润处。

多为栽培，亦有野生，见于全国各地。

采集加工　药用叶，全年可采。晒干备用。

性味功能　苦涩寒。凉血，止血，散瘀。

主治用法　(1)咯血，衄血，胃肠出血，尿血，子宫出血，紫癜。每用干品 3～5 錢，水煎服。(2)跌打扭伤，可配方研粉外敷。




图 179　侧柏(柏科，侧柏属)

Biota orientalis (L.) Endl.

1.枝；2.小枝(放大)；3.果枝；4.果(放大)。

卷　　柏

别名　佛手草、老虎爪、万年松、九死还魂草。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物，高 5～15 厘米，基部分枝，丛生。全株成莲座形，干旱卷缩如握拳状，遇雨又展开。

(2) 叶二型：侧生叶披针形，先端有长芒，内侧有微齿；中叶排成两纵行，卵状披针形，先端有长芒，边缘有微齿。

(3) 孢子叶穗四棱形。

生长环境　喜生于高山密林的岩石上。

我国大部分地区有出产。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　淡微涩平。凉血，止血。

主治用法　(1)各种出血症，如咯血，胃肠出血，尿血，月经过多，每用干品 1～3 錢，水煎服。(2)研粉撒布作外伤止血用。




图 180　卷柏(卷柏科，卷柏属)

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring

茜　草

别名　红茜、牛蔓、四轮藤、风车草。

识别特征　(1) 草质藤本，长 1～3 米，茎四方形，有倒生的毛刺。

(2) 叶对生，托叶发育成叶状，常与叶共同排成轮生状，叶卵状披针形，长约 5 厘米，宽 2 厘米，上面粗糙刺手。

(3) 花淡黄绿色，腋生及顶生，集成疏散的圆锥花序。果小，圆形，熟时黑色，多汁。

(4) 根细长，红褐色。

生长环境　生于山谷林下或灌木丛中。

我国大部地区均产。

采集加工　药用根，于秋、冬、春季采集。洗净，晒干备用。

性味功能　苦酸微寒。活血止血，通经活络，散瘀止痛。

主治用法　(1)咯血，吐血，衄血，尿血；(2)闭经，月经困难；(3)劳伤骨痛，跌打瘀痛。

每用干品 2～3 錢，水煎服。止血多炒炭用。



图 181　茜草(茜草科，茜草属)

Rubia cordifolia L.

1.花果枝；2.花；3.果实(放大)。

荠　　菜

别名　菱角菜、地菜、鸡翼菜。

识别特征　(1) 一年生或二年生草本，略有白毛。

(2) 基生叶有不规则羽状深裂，裂片有锯齿，茎生叶不分裂，常为矩圆形，基部下延抱茎。

(3) 花小，顶生或腋生，白色。短角果，三角形。

生长环境　喜生于沟边、路旁、菜地，原野中的潮湿处。

产于我国各地。

采集加工　药用全草。四、五月份开花后挖取，洗净，晒七八成干后扎把，再晒干备用。

性味功能　甘淡微凉。凉血止血，清热利水。

主治用法　(1)肺病咳血，肾结核尿血，产后子宫出血，月经过多。有人用于视网膜出血；(2)感冒发烧，麻疹；(3)肾炎水肿，乳糜尿；(4)肠炎腹泻。

每用干品 1～2 两，鲜品 4～8 两，水煎服。



图 182　荠菜(十字花科，荠菜属)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.

1.植物全形；2.果(放大)。

鸭脚艾(甜菜子)

别名　白花蒿、广东刘寄奴、四季菜。

识别特征　(1) 多年生草本,高 0.8～1.5 米。茎直立，光滑，但有纵槽，揉碎有香味。

(2) 叶互生，羽状分裂，裂片 3～5 个，故称“鸭脚艾”，顶端的裂片，通常又分三个浅裂，边缘有锐锯齿。

(3) 头状花序多数，卵圆形，花白色，全为管状。

生长环境　喜生于丘陵地带潮湿处的林边、村旁、路旁。

主产于长江以南各省。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，阴干扎把备用。

性味功能　甘辛温。通经散瘀，理气消肿。

主治用法　(1)月经不调，经闭；(2)慢性肝炎，肝硬化；(3)跌打瘀肿；(4)胃肠胀气。

每用干品 3～5 錢,水煎服。研粉外敷伤口可以止血。



图 183　鸭脚艾(菊科，艾属)

Artemisia lactiflora Wall. ex DC.

1.叶枝的一部分；2.花枝。

益 母 草

别名 茺蔚、红花艾、益明、贞蔚。

识别特征 (1) 一年生或两年生粗壮草本，高约 1 米。茎四方形，有节，被倒生细毛。

(2) 叶对生，有长柄，初生叶阔卵形，以后渐分裂成掌状三深裂，茎顶的叶片线形，2 分裂。

(3) 花淡紫色或淡红色，二唇形，轮状腋生，排成宝塔式花序。果小，三棱状，熟时褐色，即茺蔚子。

生长环境 喜生于荒地、田边、村旁等潮湿的地方。

全国各地均有分布。

采集加工 药用全草及种子(茺蔚子)。种子于夏秋成熟时采集；全草于夏季采收，洗净，晒干，切段备用。

性味功能 全草：辛苦微寒，活血调经，去瘀生新；种子：辛甘微温，益精明目，平肝降压。

主治用法 (1)妇女闭经，经痛，月经不调，产后出血过多，恶露不尽；(2)高血压；(3)肾炎水肿；(4)夜盲。

每用干品 3 錢～1 两，或制成流浸膏内服。夜盲、高血压、肾炎水肿亦可用茺蔚子 3～5 錢，水煎服。




图 184　益母草(唇形科，益母草属)

Leonurus sibiricus L.

1.植物下部；2.茎；3.叶；4.花枝。

檵　花(檵木)

别名　知微木、白花树、桎木柴。

识别特征　(1) 常绿灌木或小乔木，高 1～4 米，茎皮深灰色，幼枝具有灰褐色毛茸。

(2) 叶互生，椭圆形，长 1.5～3 厘米，有时可达 6 厘米，宽 1～2.5 厘米，基部浑圆，全缘或有小锯齿，上面深绿色有短毛，下面浅绿色有毛。

(3) 花白色簇生于小枝顶端。蒴果，熟时褐色，卵圆形。

生长环境　生于溪边、山坡、路旁灌木丛中。

产于长江以南各省。

采集加工　药用根、叶，四季均可采集。洗净，晒干备用，或随用随采。

性味功能　温平。行血止血，去瘀生新。

主治用法　(1)血积经闭；(2)跌打损伤，外伤出血。

每用干根 3～5 錢或鲜根 5 錢～1 两，水煎服。鲜叶捣烂外敷，止血效果较好。



图 185　檵花(金缕梅科，檵木属)

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.

黄　独

别名　黄药子、金丝吊蛋、黄金山药、薯瓜乳藤。

识别特征　(1) 多年生草质缠绕藤本，长约3～8米。

(2) 叶互生，心状卵形，无毛，有明显叶脉7～9条，叶柄长达4厘米，叶腋常有紫棕色球形或卵圆形的珠芽，称为“零余子”。

(3) 花小，腋生，成穗状花序。果成串排列，下弯，有3个膜质的翅。

(4) 地下块茎圆球形，生多数须根，粉质，表面暗黑色，味苦。

生长环境　喜生于山坡、路旁、村边、灌木丛中。

主产于长江以南各地。

采集加工　药用块茎及珠芽，秋末可采集。洗净，晒干备用。块茎要去须根，切片。

性味功能　苦平。凉血降火，散瘀解毒。

主治用法　(1)吐血、咯血、鼻衄等，每用块茎干品1.5～3錢，水煎服；(2)零余子治咳嗽，用量用法同上；(3)疮瘍肿毒，蛇伤，犬咬伤，可用鲜品捣烂外敷。



图 186　黄独(薯蓣科，薯蓣属)

Dioscorea bulbifera L.

1.果枝；2.块茎；3.花。

六、润肺化痰类

（适应肺结核、肺炎、支气管扩张、支气管炎等疾病）

七 指 蕨

别名 入地蜈蚣。

识别特征 (1) 矮小蕨类植物，高30～50厘米。

(2) 地下根茎横走，有许多粗壮而稍肉质的根。

(3) 叶柄单一，直立，顶部有多片叶子绕柄生长，呈掌状3裂，每裂片再分为3～5片，形似多个手指，故称“七指蕨”。

(4) 孢子囊群穗由基部抽出，挺立在叶片的中央。

生长环境 喜生于石山林荫下、荒山山坡、疏林草地。

主产于广东、广西、云南。

采集加工 药用地下茎，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能 甘凉。润肺化痰，解蛇毒。

主治用法　劳伤咳嗽，哮喘，毒蛇咬伤。每用干品 3～5 錢，水煎服。治蛇伤可用鮮品搗烂外敷。



图 187　七指蕨(七指蕨科，七指蕨属)

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

1~2.植物全形；3.穗的一部分；4.孢子囊；

5.叶片的一部分(示叶脉)。

五指毛桃(粗叶榕)

别名　猪母奶、五爪龙。

识别特征　(1) 灌木,高 1～2 米,嫩枝中空,小枝、叶柄、托叶和花序均有黄褐色短硬毛。

(2) 叶互生，叶形变化大，常见为掌状 3～5 裂，长 8～25 厘米，宽 4～18 厘米，基出 7 脉，两面有毛。

(3) 花序成对腋生，球形。果椭圆形，似小桃，有毛。

(4) 根外皮棕红色，木质淡黄色，有香味。

生长环境　生于村边、山谷疏林和灌木丛中。

产于云南、贵州、福建、广东、广西。

采集加工　药用根,全年可采。洗净,切片,晒干备用。

性味功能　辛甘微温，气芳香。健脾化湿，行气止痛，除痰止咳。

主治用法　(1)肝硬化腹水,慢性肝炎,肝胃作痛；(2)水肿，风湿性关节炎；(3)劳伤咳嗽。

每用干根 1～2 两，水煎服。

注：民间用以代替北芪。



图 188　五指毛桃(桑科，榕属)

Ficus simplicissima Lour.

1.花枝；2.叶(放大，一种型)。

石蚕(石上藕)

别名　眞金草。

识别特征　(1) 多年生附生草本，高 10 厘米左右，全草肉质。根茎匍匐，茎节明显，如蚕臥于石上，通常紫红色或黄绿色。

(2) 叶互生，卵状披针形，上面浓绿色或紫黑色，有金属光泽，通常有 3～5 条金黄色叶脉，背面暗红色。

(3) 花白色或粉红色。

生长环境　喜生于山沟有林荫潮湿的岩石上。

多产于广东、广西、云南、福建。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用，或鮮用。

性味功能　甘凉微涩。滋阴润肺，清热凉血。

主治用法　(1)肺结核咯血，(2)神经衰弱，食欲不振。

每用鮮品 3～5 錢，或干品 1～3 錢，水煎服。



图 189　石蚕(兰科，石上藕属)

Haemaria discolor (Ker-Gawl.) Lindl.

石　仙　桃

别名　石橄榄、石上莲。

识别特征　(1) 多年生附生草本，多爬在石面，树干上成群匍匐生长。

(2) 茎上生一个碧绿色的假鳞茎，肉质，长椭圆形，因而叫“石仙桃”。

(3) 每个假鳞茎生2片叶，长椭圆形，长约15厘米。

(4) 初夏由基部抽出花茎，花白色，通常8～20朵。

生长环境　喜生于深山水沟边的石壁或大树干上。

主产于福建、广东、广西、云南。

采集加工　药用全草，全年可采。鲜用，或开水烫后，晒干备用。

性味功能　甘淡凉，滋阴，清热，凉血，润肺。

主治用法　(1)肺结核咳血，慢性咳嗽；(2)急性胃肠炎及慢性胃炎。

每用鲜品1～2两，或干品3～5錢，水煎服。鲜品捣烂加酒外敷，可治跌打损伤。




图 190　石仙桃(兰科，石仙桃属)

Pholidota chinensis Lindl.

1.植物全形；2.花冠；3.合蕊柱。

石　斛

别名　吊兰花、金钗石斛。

识别特征　(1) 多年附生草本，常生于老树干或潮湿的岩石上。

(2) 茎肉质，四棱形，黄绿色，有节和纵沟纹，丛生，直立，高约 30 厘米。

(3) 叶片革质，长圆状披针形，长 7～10 厘米，先端微凹，无柄，紧抱节间。

(4) 花淡红紫色。果长圆形，有 4～6 个棱。

生长环境　喜生在大山密林下、山沟阴湿多雾的地方。

主产于我国长江以南。长江以北亦有分布。

采集加工　药用全株，全年可采。洗净，剪去须根，用沸水烫后，晒干扎把备用。

性味功能　甘淡凉。滋阴益胃，生津除烦。

主治用法　(1)热病伤津，口干烦渴，病后虚弱，肺结核潮热、盗汗；(2)慢性胃炎，胃酸缺乏，食欲不振；(3)遗精，腰膝酸软无力。

每用干品 2～4 錢，水煎服。



图 191　石斛(兰科，石斛属)

Dendrobium nobile Lindl.

白鹤灵芝

别名　癣草。

识别特征　(1) 灌木，高 1～2 米，节稍膨大。

(2) 叶对生，有短柄，尖卵形，长 3～7 厘米，宽 2～3 厘米，两面有毛。

(3) 花白色，唇形，生在叶腋或枝顶，形如成群展翅飞翔的白鹤，故叫“白鹤灵芝”。

生长环境　多为栽培，亦有野生，喜生于村边、屋旁。

见于广东、广西。

采集加工　药用枝、叶。多为鲜用，亦可剪取枝、叶晒干备用。

性味功能　甘淡平。润肺降火。

主治用法　(1)肺结核早期，每用鲜品 1 两，干品 3～5 錢，加冰糖水煎服。(2)鲜叶加煤油或 75% 酒精共捣烂，涂治各种体癣、湿疹。




图 192　白鹤灵芝(爵床科，白鹤灵芝属)

Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz.

瓜　蒌

别名　天瓜、地楼。

识别特征　(1) 多年生草质藤本。茎有棱，光滑无毛。块根多数，长圆锥形，粉质。

(2) 叶互生，膜质，近心脏形，直径约8～20厘米，通常有5～7裂，裂片边缘有疏齿，卷须细长而软。

(3) 花腋生，白色。果卵圆形，直径约6厘米。

生长环境　生于山脚、溪边、路旁，亦有栽培。

产于全国各地。

采集加工　药用果皮（瓜蒌皮）、种子（瓜蒌仁）、根（天花粉）。9月采果，秋冬挖根。根，洗净，削去外皮，切段，投入石灰水中浸泡，一星期后捞出晒干，即为天花粉。

性味功能　天花粉：甘酸寒，生津止渴，润燥排脓；瓜蒌皮：甘寒，开胸止咳，利咽通便；蒌仁：甘寒，润肠通便。

主治用法　肺热咳嗽，咽喉肿痛，胸痛（用蒌皮）；大便秘结（用蒌仁）；糖尿病，黄疸，热病口渴，乳腺炎，疮毒（用天花粉）。

每用干品3～4錢，水煎服，或配方用。




图 193　瓜蒌(葫芦科，栝楼属)

Trichosanthes kirilowii Maxim.

吉 祥 草

别名 小青胆、小叶万年青。

识别特征 (1) 多年生常绿草本。茎匍匐于地下或地上，有明显的节，节上生须根。

(2) 叶丛生于匍匐茎顶端或节上，线形或线状披针形，长 15～30 厘米，宽 1～1.6 厘米，先端长尖，无毛，中脉明显。

(3) 花紫红色，穗状花序，由叶腋抽出。浆果熟时红色。

生长环境 多为栽培。

长江以南各省均有分布。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 甘平。润肺止咳，补肾接骨。

主治用法 (1) 肺结核咳嗽，吐血，哮喘；(2)慢性肾盂肾炎；(3)遗精；(4)跌打，骨折。

每用干品 1～2 两，水煎服。外用鲜品捣烂酒炒敷患处。



图 194　吉祥草(百合科，吉祥草属)

Reineckia carnea Kunth.

麦　斛

别名　果上叶、一挂鱼、羊奶草、青兰、小扣子兰。

识别特征　(1)多年附生草本，多附在石面、树干上，成群匍匐生长。

(2) 茎上长一个卵圆形，似麦粒样的假鳞茎，花生米大，肉质，绿色无毛。

(3) 每个假鳞茎顶生一片叶，通常椭圆形，革质，硬而脆，黄绿色，中脉凹陷，叶长1～3厘米。

(4) 花白色而带红，1～2朵，着生于一条短梗上。

生长环境　多生在大山沟潮湿的岩面或树干上。

主产于广东、广西、福建、贵州、安徽、江苏、浙江。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净晒干或蒸后晾干备用。

性味功能　甘淡凉。润肺化痰，滋阴养胃。

主治用法　(1)肺结核咳嗽、咯血，慢性气管炎咳嗽，肺炎恢复期，慢性咽痛；(2)慢性胃炎，胃酸缺乏，食欲不振；(3)遗精。

每用鲜品5錢～1两，干品1～5錢，水煎服。




图 195　麦斛(兰科，石豆兰属)

Bulbophyllum inconspicuum Maxim.

麦门冬(麦冬)

别名　野韭菜。

识别特征　(1) 多年生草本，高20～30厘米。

(2) 叶自根茎的节上长出，细长，长约15～55厘米，似韭菜叶。

(3) 花淡紫色，集成总状花序，从叶丛中抽出。果球形，直径约5毫米，熟时紫黑色。

(4) 有多数细长须根，中有膨大成串珠状或纺锤形肉质块根，即麦冬。

生长环境　喜生于山坡疏林下潮湿处。全国大部分地区都有生长。

采集加工　药用块根，夏秋采集。洗净，曝晒，搓掉小支根，备用。

性味功能　甘微苦微寒。润肺止咳，清心除烦，益胃生津。

主治用法　(1)用于肺结核，慢性支气管炎的咳嗽；(2)热性病恢复期，便秘；(3)乳汁不足。每用干品2～4錢，水煎服。




图 196　麦门冬(百合科，麦门冬属)

Liriope graminifolia (L.) Baker

1.植物全形；2.果枝。

附：沿　阶　草

沿阶草，叶片较麦门冬为狭，花茎较麦门冬为短，多为栽培。一般认为作用较麦门冬好。麦冬品种较多，除本品外，尚有小麦冬。



图 196-1　沿阶草（百合科，沿阶草属）

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl.

岗菊(猪仔笠)

别名　山葛、雀脷珠。

识别特征　(1) 多年生直立草本，很少分枝，高约 20 厘米，有毛。

(2) 叶互生，披针形，长约 5 厘米，宽约 0.5 厘米。

(3) 花黄色，生于叶腋内，花后结椭圆形小荚果。

(4) 独根，呈纺锤形或球形，粉质，外皮黄褐色，有薯味。

生长环境　喜生于丘陵、坡地干旱处。

主产于广东、广西、云南。

采集加工　药用块根，初春秋末采集。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘平。润肺化痰，生津止渴，凉血消肿。

主治用法　(1) 伤风咳嗽，上呼吸道感染，发热烦渴，每用干品 3～5 錢，水煎服。(2)跌打损伤，用鲜品捣烂外敷。




图 197　岗菊（蝶形花科，猪仔笠属）

Eriosema chinense Vogel.

1.植枝；2.薯块。

余 甘 子

别名 油甘子、望果。

识别特征 (1) 灌木或小乔木，一般高 1～3 米，多分枝。

(2) 叶互生，密生成明显的二列，很象羽状复叶，线状长圆形，长约 1 厘米，先端圆而有小尖头或微凹，基部心形或钝圆，叶柄极短。

(3) 花小，黄色，具短柄，簇生于叶腋。果球形，直径约 1 厘米多，肉质，熟时黄白色，味甜酸可吃，开始酸涩，过后有甘味，故称“余甘子”。

生长环境 生于山路旁、干旱坡地、疏林中。

广布于我国华南地区。

采集加工 药用根及果实。根，全年可采，洗净，久蒸，切片，晒干备用。果实，秋季采收，用开水烫透，或用盐水浸后，晒干备用。

性味功能 果：酸甘苦凉，润肺化痰，生津止渴。根：苦涩凉，收敛，降压。

主治用法 (1)感冒发热，咳嗽，咽喉痛，口干烦渴，维生素丙缺乏症。每用鲜果（内含大量维生素丙）10～30 个，水煎服。(2)肠炎腹泻，高血压。每用干根 5～8 錢，水煎服。(3)湿疹，皮炎。用叶煎水外洗。




图 198　余甘子（大戟科，叶下珠属）
Phyllanthus emblica L.

沙参(轮叶沙参)

别名　三叶沙参、南沙参。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高约 90 厘米，折断有白色乳汁。主根圆锥形肉质，白色。

(2) 叶常 3～4 片轮生，根生叶有长柄，肾形、茎生叶，卵状披针形，长约 3～6 厘米，边缘均有齿。

(3) 花钟形腋生，蓝色。

生长环境　生于山坡、路旁，灌木丛中。

我国大部分地区都有分布。

采集加工　药用根，秋季挖取。洗净，除去须根，蒸后晒干。

性味功能　甘苦微寒　清肺泻火，养阴止咳。

主治用法　急慢性支气管炎，肺痈咳血，阴虚发热，干咳，咽喉肿痛。

每用干品 2～4 錢，水煎服。



图 199　沙参（桔梗科，沙参属）

Adenophora verticillata Fisch.

1.植物全形；2.花。

铁包金(细纹勾儿茶)

别名　乌龙根、老鼠耳。

识别特征　(1) 藤状灌木，长 1～4 米。枝条圆柱形，红褐色，坚韧。

(2) 叶互生，有短柄，矩圆形，长 0.5～1 厘米，上面绿色，背面灰白色，侧脉 5 对明显，直而平行。

(3) 花白色，数朵簇生于叶腋或枝顶。果长圆形，绿豆大，熟时紫黑色。

(4) 根长而弯曲，外皮褐黑色，内面黄色，故称“铁包金”。

生长环境　喜生于路边、村旁、山坡灌木丛中。

产于我国南部各地。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘淡平。去瘀，止咳，除痰。

主治用法　(1)肺结核，肺燥咳嗽，内伤咳血，肝炎，每用干品 1～2 两，水煎服。(2)跌打损伤，毒蛇咬伤，可浸酒外擦。



图 200　铁包金（鼠李科，勾儿茶属）
Berchemia lineata (L.) DC.

附：大叶铁包金

大叶铁包金，又名牛鼻拳，沿海各省有分布。形态与铁包金相似，但植株高大，叶片长约3.5～7厘米，宽3厘米，脉络较多。两者作用基本相同，以小叶的为好。



图 200-1　大叶铁包金（鼠李科，勾儿茶属）

Berchemia giraldiana Schn.

阔叶十大功劳

别名　土黄连、土黄檗、八角刺。

识别特征　(1) 灌木，高1～2米。茎皮褐色，粗糙，断面黄色，味苦，老时有栓皮。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，有小叶9～15枚；小叶常为矩圆形，长5～12厘米，宽4～8厘米，边缘有2～7枚大刺状齿。

(3) 花黄色，顶生总状花序。果近圆形，熟时蓝色。

生长环境　喜生于山谷、山坡近水处及阴湿地带灌木丛中。

多产于长江以南各地。陕西、河南、甘肃也有分布。

采集加工　药用根、茎、叶(功劳叶)、子(功劳子)。春夏采果，全年采根、茎、叶。洗净，晒干备用。

性味功能　苦凉。清肺胃，益肝肾。

主治用法　(1)肺结核咳嗽，咯血，潮热，腰膝无力，头晕耳鸣，失眠，每用干叶或子2～3錢，水煎服。(2)肠炎腹泻，皮肤感染，黄疸型肝炎，目赤肿痛，每用干根、茎3～5錢，水煎服。

注：中药常用的功劳叶、功劳子为冬青科枸骨的叶和子。



图 201　阔叶十大功劳（小檗科，十大功劳属）

Mahonia bealei (Fort.) Carr.

附：华南十大功劳

本品主产于广东、广西、福建、台湾、四川。功用与阔叶十大功劳基本相同。



图 201-1　华南十大功劳（小蘗科，十大功劳属）
Mahonia japonica DC.

附：细叶十大功劳

本品主产于广东、广西、湖北、四川、安徽。功用与阔叶十大功劳基本相同。



图 201-2　细叶十大功劳（小檗科，十大功劳属）
Mahonia fortunei Mouill.

七、止咳定喘类

（适应咳嗽、哮喘、百日咳、肺气肿等疾病）

土 丁 桂

别名 毛辣花、银絲草、白鸽草、白毛将。

识别特征 (1) 一年生紆弱草本，高 20～50 厘米，全株被银灰色绒毛。

(2) 叶互生，长圆形，长 4～6 毫米。

(3) 花单生于叶腋，淡蓝色。果球形，常四瓣裂开。

生长环境 喜生于干旱荒野草地上。

常见于我国南方沿海地区。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，晒至半干，扎把晒干备用。

性味功能 苦涩溫。肺虛寒咳，散瘀止痛。

主治用法 (1)支气管哮喘，咳嗽；(2)跌打內伤，腰腿痛；(3)头晕目眩，无力。

每用干品 1～3 錢，水煎服。



图 202　土丁桂（旋花科，土丁桂属）
Evolvulus alsinoides L.

山白芷(白牛胆)

别名　羊耳菊、白面风、白毛公。

识别特征　(1) 直立亚灌木，高0.6～1米，全株有绵毛。

(2) 叶互生，长圆状披针形，长可达15厘米，两面有白色绵毛，尤以背面厚密，故称“白面风”、“白毛公”。

(3) 头状花序，极密集，花淡黄色，中央为管状花，外围为舌状花。

(4) 根粗壮，坚韧，木质。

生长环境　喜生于灌木丛、林缘、阳坡。

主产于东南、华南地区。

采集加工　药用全株或根，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。茎、叶，阴干备用或鲜用。

性味功能　辛微温。除痰定喘，祛风消肿。

主治用法　(1)咳嗽；(2)肾炎水肿，风湿性腰腿痛，产后风肿；(3)皮肤湿疹，搔痒。

每用干根5錢～1两，水煎服。治皮肤病，用全株煎水洗患处。



图 203　山白芷（菊科，旋复花属）

Inula cappa DC.

千　日　红

别名　百日红、千金红。

识别特征　(1) 一年生直立草本，高 20～60 厘米。茎近圆柱形，枝微呈四棱形，有粗毛，节稍膨大，略带紫红色。

(2) 叶对生，椭圆形，长 5～10 厘米，宽 2～4 厘米，两面有粗毛，近无柄。

(3) 头状花序，顶生，白色、粉红色或紫色，密集成球形。

生长环境　多为栽培，各地均有。

采集加工　药用花头，于夏秋花期采集，晒干备用。

性味功能　甘平。止咳定喘。

主治用法　(1)支气管哮喘；(2)急、慢性支气管炎，百日咳。

每用干品 3～5 錢，或花头 10 个，水煎服。




图 204　千日红（苋科，千日红属）

Gomphrena globosa L.

天文草(拟千日菊)

别名　山天文草、雨伞草。

识别特征　(1) 多年生草本，高约60厘米。茎直立，常带紫红色，有柔毛。

(2) 叶对生，暗绿色，尖卵形，长4～7厘米，边缘有疏齿，基出3条主脉。

(3) 头状花序，呈弹头状，有长梗，花黄色。

生长环境　喜生于山野湿地或水沟旁草丛中。

多见于广东。

采集加工　药用全草，全年可采。晒干备用。

性味功能　辛苦微温，有麻舌感。止咳定喘，消肿止痛。

主治用法　(1)主要用于感冒咳嗽，慢性支气管炎，哮喘，百日咳，肺结核；(2)蛇咬伤，疮疡肿毒；(3)牙痛。

每用干品1～3钱，水煎服。鲜品捣烂敷蛇咬伤、疮疖，或塞龋洞内治牙痛。



图 205　天文草（菊科，千日菊属）

Spilanthes acmella Murr.

无　患　子

别名　木患子、洗手果。

识别特征　(1) 大乔木，高可达 10 米以上，幼枝被柔毛。

(2) 叶互生，偶数羽状复叶，有小叶 8～16 片，小叶互生或对生，长圆形或卵状披针形，长 7～15 厘米，宽 2～5 厘米，基部偏斜。

(3) 花黄绿色，细小，多数组成圆锥花序。核果熟时黄褐色，扁球形，直径约 1.5～2 厘米，基部呈髻状突起。

生长环境　喜生于村边、路旁、山地疏林中。我国各地均产，长江以南最多。

采集加工　药用根、果，全年采根，秋季采果。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦凉，有小毒。解表消滞，化痰止咳。

主治用法　(1)外感发热，伤风咳嗽，劳伤咳血，消化不良，每用干根 5 錢～ 1 两，水煎服。(2)果仁多次蒸晒去毒，研粉配方治白喉、扁桃体炎。(3)果浸水涂腿上，可以防旱蚂蝗。



图 206　无患子（无患子科，无患子属）

Sapindus mukorossi Gaertn.

1.果枝；2.花(放大)。

木 蝴 蝶

别名 朝简、玉蝴蝶、千层纸。

识别特征 (1) 乔木，高7～12米。树皮灰色，厚而有皮孔。

(2) 叶对生，3～4回羽状复叶，小叶多数卵形至椭圆形，长6～14厘米，宽4～8厘米。

(3) 花大，淡紫色，肉质。果长而扁平，边缘稍内弯似马刀，长30～90厘米，宽5～8.5厘米。种子有半透明翅，似蝴蝶，又因其薄如纸，彼此重迭，又称“千层纸”。

生长环境 生于村旁、溪边、山地疏林中。

主产于云南、广西、广东、贵州、福建、四川。

采集加工 药用种子。于秋季种子成熟时，摘取蒴果，晒干，剝出种子备用。

性味功能 微苦微寒。清肺热，利咽喉。

主治用法 (1) 急慢性支气管炎、肺结核咳嗽；(2)咽喉肿痛，扁桃体炎；(3)心胃气痛。

每用干品1～2錢，水煎服。或焙干研碎，每服5～8分。

此外，有人用树皮治疗传染性肝炎，初步见到退黄效果较好。




图 207　木蝴蝶（紫葳科，木蝴蝶属）

Oroxylon indicum (L.) Vent.

1. 复叶的一部分；2. 花序；3. 果实的一部分；4. 着膜翅的种子。

毛大丁草

别名　一柱香、白眉、白蛇胆。

识别特征　(1) 多年生草本，高 15～50 厘米。(2) 叶基生，通常 3～5 枚，深绿色，长圆形，长 3～8 厘米，幼时上面有柔毛，老时变为无毛，背面有灰白绵毛。

(3) 花茎直立，有绵毛，顶生一个头状花序，直径约 4 厘米，淡红色。

(4) 根须状细长，多数，有辛辣味。

生长环境　喜生于气候温暖、潮湿多雾地区的荒地、林边、山顶草丛中。

主产于我国南方各省。

采集加工　药用全草，以根为佳，全年可采。连根挖起，去花，洗净，晒干扎把备用。

性味功能　苦平凉。清热，止咳，消肿，止痛。

主治用法　(1)痰多咳嗽；(2)小儿疳积；(3)毒蛇咬伤，跌打扭伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。蛇伤、跌打，外用鲜品捣烂敷患处。




图 208　毛大丁草（菊科，大丁草属）

Gerbera piloselloides Cass.

石黄皮(肾蕨)

别名　圆羊齿、蜈蚣草、石上丸。

识别特征　(1) 多年生附生或陆生蕨类植物。根状茎上有卵圆形半透明的块根，表皮黄色，内面含水较多，很象黄皮果，故名“石黄皮”。

(2) 羽状复叶簇生，叶片狭披针形，有小叶片数十对，中部的小叶长2～2.5厘米，基部有耳。

(3) 孢子囊群生长在小叶背面边缘上。

生长环境　喜生于溪边、灌木丛、林下的石隙中。

主产于广东、广西、福建、贵州、浙江。

采集加工　药用球状块根，全年可采。除去鳞片，洗净，烫过，晒干备用。

性味功能　甘淡微涩微凉。清热利湿，宁肺止咳。

主治用法　感冒发热，慢性咳嗽，肠炎腹泻，小儿疳积。

每用干品3～5錢，水煎服。




图 209　石黃皮（骨碎补科，腎蕨屬）

Nephrolepis cordifolia (L.) Presl.

1. 植物全形；2. 羽叶一部分，示叶脉及孢子囊群。

东风橘(酒饼簕)

别名　蚌壳刺、狗橘树。

识别特征　(1) 有刺灌木，高 1～2 米，多分枝，刺坚硬锐利。

(2) 叶互生，长圆形，革质，长 1.5～5 厘米；先端常微凹，叶脉细而密，叶有油点，揉之芳香。

(3) 花白色，单生或簇生于叶腋。果熟时紫色，卵圆形，直径约 1 厘米，生于刺基部上方，有橘子味。

(4) 根皮褐黄色。

生长环境　野生于村边、路旁、荒野灌木丛中。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。叶，阴干备用。

性味功能　微苦凉，气香。清热解表，化痰止咳，行气止痛。

主治用法　(1)流感，感冒，咳嗽，疟疾，每用干叶或根 3～5 錢，水煎服。(2)胃痛，腰腿痛，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。




图 210　东风橘（芸香科，酒饼簕属）
Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv.

白 鹤 藤

别名 白背絲绸。

识别特征 (1) 草质藤本。

(2) 叶互生，卵形或卵状长圆形，长5～11厘米，宽3～7厘米，背面有紧贴的银灰色的有光泽的绢样柔毛，因而也叫“白背絲绸”。

(3) 花腋生或顶生，喇叭形，白色。果近球形，熟时红色。

生长环境 喜生于丘陵、沟边的灌木丛、杂草丛中。

主产于我国南部。

采集加工 药用全藤，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 微酸微苦凉。祛痰止咳，去腐生肌。

主治用法 (1)急慢性支气管炎，每用干品5錢～1两，水煎服。(2)疮疖，皮肤湿疹，脚癣感染，煎水洗。



图 211　白鹤藤（旋花科，白鹤藤属）

Argyreia acuta Lour.

百部(细花百部)

别名　大百部。

识别特征　(1) 草质藤本，嫩苗常呈紫色。(2) 叶互生，膜质或纸质，卵状三角形，先端渐尖，基部近楔形，基出平行脉 4～10 条，叶柄长。

(3) 花紫色，腋生。

(4) 肉质根，纺锤形，长 10～30 厘米；一株常有根几十条，重可达几十斤。

生长环境　喜生于坡地、旷野或沟边、村边。为海南特产，产量很大。

采集加工　药用块根，秋冬采集。洗净，用开水烫或煮，抽出木心，切片，晒干备用。

性味功能　甘苦微温，有小毒。止咳定喘，杀虫止痒。

主治用法　(1)百日咳，肺结核，支气管炎，每用干品 1～3 錢，水煎服。(2)皮炎，湿疹，荨麻疹，皮肤搔痒症，脚癣，用鲜品生擦或煎水外洗。(3)阿米巴痢疾，每用干品 2～3 錢，水煎服，一日三次，疗效甚佳。(4)制成软膏，外涂肛门，治疗蛲虫病。(5)杀虫、灭虱、除四害。



图 212　百部（百部科，百部属）
Stemona parviflora Wright

附：直立百部

直立百部，华南以外各省均产，全国多用本品。此外尚有对叶百部、狭叶百部。作用基本相同。



图 212-1　直立百部（百部科，百部属）

Stemona sessilifolia Miq.

1.花枝；2.根。

灯笼草(酸浆)

别名　水灯笼、打卜草、打额泡。

识别特征　(1) 一年生直立多分枝草本，高40～90厘米。

(2) 叶互生，似辣椒叶，长3.5～10厘米，宽2～5厘米，有柔毛，边缘有小齿。

(3) 花单生于叶腋，钟形，黄色，花萼膨大有棱，象灯笼，故名"灯笼草"。

生长环境　喜生于田野、村边、旷地的草丛中。

主产于我国南部各地。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　苦凉。清热解毒，祛痰止咳。

主治用法　(1)感冒发热，咽喉肿痛；(2)急性支气管炎。

每用干品5钱～1两，水煎服。亦可用鲜品捣烂外敷或煎水洗湿疮肿毒。




图 213　灯笼草（茄科，酸浆属）

Physalis minima L.

杜　　衡

别名　水马蹄、土细辛。

识别特征　(1) 多年生草本。根茎生多数细长的根，淡黄色，有辛香气味。

(2) 从根茎抽出 1～2 片具长柄的心形叶，长 5～10 厘米，基部耳形，上面绿色有光泽，常有白斑，背面紫色，所以叫“花脸细辛”。

(3) 花钟形，淡紫色。浆果细小，熟时黑褐色。

生长环境　喜生于潮湿阴暗的沟旁、山地。产于长江以南各地，陕西也有分布。

采集加工　药用根，冬季采集。洗净，切段晒干。

性味功能　辛温，有小毒。温经散寒，止咳定喘。

主治用法　(1)慢性支气管炎，哮喘；(2)风湿痛，四肢麻木。

每用干根 5 分～1 錢，水煎服，或研粉内服，每用 2～3 分。




图 214　杜衡（马兜铃科，细辛属）
Asarum blumei Duch.

青　　蒟

别名　蒟青、蒌叶。

识别特征　(1) 攀援状藤本，节上生根。(2) 叶互生，常为卵形，长7～15厘米，宽5～11厘米，基出7脉，网脉明显，有多而细的腺点。揉碎后有芳香气味。

(3) 花单性，穗状花序。果卵形。

生长环境　多为栽培。

主产于我国南部。

采集加工　药用藤叶，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　辛温。祛风寒，止喘咳。

主治用法　(1)风湿骨痛；(2)胃寒痛，食滞不下；(3)支气管哮喘。

每用干品3～5錢，鲜品1～2两，水煎服。




图 215　青蒟（胡椒科，胡椒属）

Piper betle L.

蚌花(紫万年青)

别名　红蚌兰花、菱角花、紫花万年青。

识别特征　(1) 多年生肉质草本，高 60～70 厘米，茎粗而短。

(2) 叶阔剑形，长约 30 厘米，嫩脆多汁易断，基部抱茎，上面绿色，背面紫色；

(3) 花白色，腋生，藏于两片蚌壳状肉质的苞片内，苞片淡紫色，故称"蚌花"。

生长环境　喜生于潮湿肥沃土地上。

产于长江以南各地，多为栽培。

采集加工　药用花、叶，全年可采，晒干备用。一般用鲜品。

性味功能　甘淡凉。清肺化痰，凉血止痢。

主治用法　(1)感冒咳嗽，咳痰带血，百日咳；(2)鼻衄；(3)菌痢。

每用鲜叶 1～2 两，或干花 20～30 朵，水煎服。




图 216　蚌花（鸭跖草科，紫万年青属）

Rhoeo discolor (L'Her.) Hance

1. 植物上部；2. 花（放大）。

紫花前胡

别名　土前胡、靡香菜。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高约 1 米。茎单一，表面有纵沟纹，有毛，紫色。

(2) 根生叶有长柄，基部鞘状抱茎，羽状复叶，小叶长卵形，顶生小叶菱形或再分裂，边缘有细齿；茎生叶与根生叶相似，但较小。

(3) 花小，紫色，顶生。果卵圆形。

(4) 根纺锤形，肥大，垂直生长。

生长环境　喜生于山坡、草地、疏林、灌木丛中。

长江以南多产，河南亦有分布。

采集加工　药用根，秋冬采集。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦辛微寒，气香。散风止咳，活血调经。

主治用法　(1)感冒头痛，支气管炎；(2)月经不调；(3)风湿性腰腿痛。

每用干品 2～3 錢，水煎服。



图 217　紫花前胡（伞形科，前胡属）

Peucedanum decursivum (Miq.) Maxim.

曼陀罗*（白花曼陀罗）

别名　曼陀罗花、洋金花。

识别特征　(1) 直立草本或小灌木，多分枝。(2) 叶互生，外形似茄叶，长9～18厘米，边缘有不规则浅裂。

(3) 花白色喇叭形，长达15厘米。果球形，乒乓球大小，有粗短的软刺。

生长环境　生于旷野、路边、田边、村前屋后。

主产华南地区，江苏、浙江一带也有栽培。

采集加工　药用花、果、叶，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　苦辛温，有大毒。止咳，平喘，镇痛。

主治用法　(1)哮喘，用干花少许，切碎和烟丝共卷成烟，每日吸2～3次。(2)胃痛，用干叶3分，水煎服。(3)跌打损伤，蛇伤，疔疮，用鲜叶捣烂敷局部，或用根配散治跌打骨折。

注：本品含莨菪和东莨菪碱及少许阿托品，有剧毒。中毒症状是，口干，皮肤潮红，无汗，散瞳，呕吐，眩晕，狂躁。抢救时可洗胃，饮浓茶，注射吗啡及强心、镇静剂。故内服要特别慎重。



图 218　曼陀罗（茄科、曼陀罗属）

Datura metel L.

1.花枝；2.果。

鼠　曲　草

别名　清明菜、米曲。

识别特征　(1) 一年生草本，高 15～30 厘米。茎直立，基部常分枝，全株有白色绵毛。

(2) 下部叶片匙形，上部叶片匙形或线形，长 2～6 厘米，基部抱茎。

(3) 顶生稠密的头状花序。花淡黄色，全为管状。

生长环境　喜生于田间、草地阴湿处。

我国各地都有分布。

采集加工　药用全草。春夏采集。洗净，晒干备用。

性味功能　甘平。清凉解毒，平喘定咳，补脾去湿。

主治用法　(1)感冒咳嗽；(2)急、慢性支气管炎，哮喘；(3)风湿性腰腿痛。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。外敷可治毒蛇咬伤与跌打损伤。




图 219　鼠曲草（菊科，鼠曲草属）

Gnaphalium multiceps Wall.

蔓胡颓子

别名　甜棒锤、蒲颓子。

识别特征　(1) 常绿藤状灌木，无刺，高 2～3 米，枝有红褐色鳞片。

(2) 叶互生，革质，椭圆形，长 3～7 厘米，上面绿色，背面银白色，密被小锈点。

(3) 花腋生或 2～3 朵聚生，花苞银白色。果椭圆形，味酸甜。

生长环境　生于丘陵、山地的灌木丛中。

主产于我国东南部各省。

采集加工　药用叶、果、根。冬、春采果，全年采根、叶。晒干备用。

性味功能　酸平。叶：平喘止咳；果：收敛止泻。

主治用法　(1)支气管哮喘，慢性支气管炎，感冒咳嗽，用干叶研粉，每服 5 分～1 錢，每日两次，或用鲜叶 3～4 錢，水煎服。(2)肠炎腹泻，每用干果 3～6 錢，水煎服。(3)跌打瘀积肿痛，吐血，每用干根 5～8 錢，水煎服。




图 220　蔓胡颓子（胡颓子科，胡颓子属）

Elaeagnus glabra Thunb.

1.花枝；2.果；3.花；4.花的纵切面；
5.叶背的鳞片（放大）；6.鳞片（放大）。

附：角花胡颓子

本品功用与蔓胡颓子基本相同。




图 220-1　角花胡颓子（胡颓子科，胡颓子属）

Elaeagnus gonyanthes Benth.

1.果枝；2.花(放大)。

八、止　痛　类

（适应各种内外伤疼痛、头痛、胃痛、神经痛等疾病）

七叶莲（鹅掌藤）

别名　汉桃叶、七叶烂。

识别特征　(1) 常绿蔓状灌木。茎圆形，有纵走细条纹，全株有特殊香味。

(2) 叶互生，掌状复叶，一般有小叶 7 片，故称“七叶莲”；小叶片长卵圆形，长 9～16 厘米，宽 2.5～4 厘米，总叶柄长 7～9 厘米。

(3) 春季开青白色小花，集成伞形花序。核果球形，熟时橙黄色。

生长环境　喜生于山谷或阴湿的疏林、岩石縫中。

主产于广东、广西、贵州。

采集加工　药用根、茎、叶，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　苦甘温。舒筋活络，消肿止痛。

主治用法　(1)风湿骨痛；(2)跌打损伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服，外用鲜叶捣烂敷患处。




图 221　七叶莲（五加科，鹅掌柴属）

Scheffera arboricola Hayata

1.花枝；2.果枝；3.果。

附：假　荔　枝

假荔枝，亦称七叶莲，为木通科植物，外形相似，花果不同，藤茎也可治疗风湿骨痛，每用5錢～1两，效较鹅掌藤稍差。




图 221-1　假荔枝（木通科，野木瓜属）
Stauntonia chinensis DC.

九　里　香

别名　千里香、月橘。

识别特征　(1) 灌木，高 1～3 米，分枝多，木质坚硬。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，小叶 3～9 片互生排列；叶形变异大，通常多为卵形或椭圆形，长 2～5 厘米，宽 1～2 厘米，基部歪斜，有油点，尝之辛辣麻舌。

(3) 花白色，浓芳香。果尖卵形，似花生米大小，熟时红色。

生长环境　多为人工栽培。

我国南部有产。

采集加工　药用叶，全年可采。阴干备用。

性味功能　微苦辛微温。行气止痛，活血散瘀。

主治用法　心胃气痛，跌打瘀积肿痛，风湿骨痛，毒蛇咬伤。

每用干品 1～3 錢，水煎服。或用粉末 1～3 分，冲水服。外用鲜叶适量，捣烂敷患处。



图 222　九里香（芸香科，九里香属）

Murraya paniculata (L.) Jack.

大叶风沙藤(异形南五味子)

别名　过山龙藤、海风藤。

识别特征　(1) 木质大藤本，有松而厚的软木塞样栓皮，除去外皮红色，清香，切段吹之可通气，断面干后疏松多小孔。

(2) 叶互生，革质，椭圆形，长 8～17 厘米，边缘常有小齿，揉之微粘手。

(3) 花腋生，黄色。果球形，似饭团，直径 2.5～5 厘米，熟时红色，酸甜可食。

(4) 根似风沙藤，有香气，但稍苦。

生长环境　喜生于大山沟密林下，攀援它树生长。

主产于广东、广西、云南、贵州。

采集加工　药用藤，全年可采。除去栓皮，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛微温，气香。行气止痛，祛风除湿。

主治用法　(1)风湿筋骨疼痛，四肢拘挛；(2)急性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎；(3)跌打损伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服，或浸酒服。



图 223　大叶风沙藤（五味子科，南五味子属）

Kadsura heteroclita (Roxb.) Craib

大叶山桂

别名　钝叶樟、山肉桂、山桂楠。

识别特征　(1) 大乔木，高可达 15 米。树皮有肉桂及樟脑香气。枝常对生，近四棱形，有毛。

(2) 叶互生，厚革质，较大，长椭圆形，长可达 10～22 厘米，宽 4～6.5 厘米，上面光亮，离基三出脉明显，叶柄粗壮。

(3) 花小，腋生。果椭圆形，长约 1 厘米。

生长环境　喜生于大山密林中。

主产于广东、广西、云南。

采集加工　药用皮，全年可采。洗净，切片，阴干备用。

性味功能　辛香温。祛风散寒，行气止痛。

主治用法　(1)胃寒疼痛，虚寒泄泻；(2)风湿骨痛，腰肌劳损；(3)肾虚阳萎，闭经；(4)蛇咬伤。

每用干粉 3～5 分，水冲服。



图 224　大叶山桂（樟科，樟属）

Cinnamomum obtusifolium Nees

大金不换(金不换)

别名　紫背金牛、大兰青、大金牛草。

识别特征　(1) 一年生草本，高 10～30 厘米，不分枝或多少有分枝，稍有毛。

(2) 叶互生，形状变异很大，通常为椭圆形，长 1～6 厘米，边缘稍反卷，有短柄。

(3) 花淡黄色，数朵组成腋生总状花序。果半圆形。

生长环境　喜生于干旱的山坡、丘陵草丛中。我国南方各地常见。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　甘淡平。活血散瘀，止痛镇咳。

主治用法　(1)胸痛咳嗽，百日咳，小儿麻痹后遗症，每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(2)角膜云翳，角膜溃疡，急性结膜炎，用鲜品捣烂，醋调外敷。




图 225　大金不换（远志科，远志属）

Polygala chinensis L.

附：小 金 不 换

小金不换，又名小花远志、小金牛草，植株、叶、花均较本品为小，果无毛，易区别。功用相同。



图 225-1　小金不换（远志科，远志属）

Polygala telephioides Willd.

水田七(裂果薯)

别名 水鸡仔、马老头、屈头鸡。

识别特征 (1) 多年生草本。有粉质的块茎形如弯曲的鸡头，故称“屈头鸡”。

(2) 叶由地下茎发出，丛生，长椭圆形，长10～15厘米，宽3～5厘米，基部下延稍抱茎，叶脉的特点是上面主、侧脉都下凹。

(3) 球状伞形花序生于花轴顶端，花淡绿色。果杯状有棱，顶部隆起。

生长环境 喜生于溪边、沟旁、田埂草地上。

主产于广东、广西。

采集加工 药用块茎，全年可采。洗净，去掉须根，晒干备用。

性味功能 苦微寒，有小毒。理气止痛，去瘀生新。

主治用法 (1)胃、十二指肠溃疡，慢性胃炎，咽喉肿痛；(2)跌打损伤，疮痈疔毒。

每用干品3～5錢，水煎服。全草捣烂外敷治疮痈肿毒。

注：另有同属植物水狗仔、水萝卜两种，与本品外形相似，功效较差。



图 226　水田七（箭根薯科，裂果薯属）

Schizocapsa Plantaginea Hance

牛 皮 消

识别特征 (1) 匍匐攀援纤细藤本。茎粗约1.5～2毫米。

(2) 叶对生，常为卵状心形，长4～12厘米，宽3～8厘米，有毛，叶脉5～7条。

(3) 叶腋抽长梗，开白色花，伞形花序。花后结膏葵果。

生长环境 喜生于山地密林或疏林潮湿地。

广东、广西、云南、贵州、湖南、湖北均有出产。

采集加工 药用根，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能 甘苦微温。化湿利水，祛风，止痛。

主治用法 (1)急、慢性肾炎，水肿；(2)胃及十二指肠溃疡，慢性胃炎；(3)白带过多。

每用干品3～5錢，水煎服。



图 227　牛皮消（萝藦科）

Cynanchum caudatum Maxim.

乌　　药

别名　台乌、矮樟、香桂樟。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高约5米。小枝有毛，木质硬。

(2) 叶互生，椭圆形至卵形，长3～6厘米，宽1.5～5厘米，革质，上面光亮绿色，背面粉绿色，有绢毛，基出三脉。

(3) 花小，黄色，腋生。果球形，直径0.5厘米，熟时黑色。

(4) 根木质膨大粗壮，略成串珠状，两端小，中部肥大，外面淡紫，内面白色，质硬。

生长环境　生于荒野、山坡或灌木林中，亦有栽培。

长江以南各省均有分布，河南亦产。

采集加工　药用根，秋冬采集。洗净，刮去外皮，切片，晒干备用。

性味功能　辛温。温中行气，散寒止痛。

主治用法　(1)寒性胃痛，胃胀，呕吐，膈肌痉挛；(2)小儿遗尿，小便频数。

每用干品2～3钱，水煎服。



图 228　乌药（樟科，山胡椒属）

Lindera strychnifolia F.-vill.

风沙藤(南五味子)

别名 白山环藤、猢狲饭团。

识别特征 (1) 藤状灌木,多分枝。茎皮紫红色,外表有白麻点即皮孔。

(2) 叶互生,长圆状披针形,长 7～11 厘米,宽 2.5～5.5 厘米,有疏微齿,揉之有粘液粘手,上面暗绿色,背面多带紫色。

(3) 花腋生,白色或淡黄色。果是聚合果,球形,似饭团,直径 2.5～3.5 厘米,熟时深红色,酸甜可食。

(4) 根外表褐色,折断红色,可见灰白色纤维,有樟脑香气。

生长环境 喜生于大山沟谷密林下,常攀援它树生长。

主产于长江以南各地。

采集加工 药用根,全年可采。洗净,切片,晒干备用。

性味功能 微甘苦微温,气香。活血祛风,散瘀止痛。

主治用法 (1)慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡,急性胃肠炎;(2)风湿筋骨痛,跌打瘀积肿痛。

每用干品 3～5 錢,水煎服。或研粉内服,每用 3～5 分。




图 229　风沙藤（五味子科，南五味子属）
Kadsura longipedunculata Finet et Gagnep.

火　索　麻

别名　癞皮树、纽荪山芝麻。

识别特征　(1) 灌木，高约 2～3 米。嫩枝有毛，茎皮有丰富纤维。

(2) 叶互生，卵圆形，长 10～12 厘米，宽 7～9 厘米，先端有不规则的分裂，边缘有锯齿，两面都有毛，叶脉的特点是基出五脉。

(3) 花红色或紫红色。果圆柱形似麻绳样扭曲，表面有灰色绒毛。

生长环境　喜生于干旱旷野、山坡、丘陵的灌木丛中。

主产于广东、广西、云南。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片晒干。

性味功能　淡微苦平。行气止痛。

主治用法　慢性胃炎，胃溃疡。

每用干品 3～5 錢，水煎服。




图 230　火索麻（梧桐科，山芝麻属）

Helicteres isora L.

石　菖　蒲

别名　水剑草、石蜈蚣。

识别特征　(1) 多年生宿根草本，全草有香气。

(2) 叶从根茎发出，线形，两行排列，长 30～50 厘米，宽 0.2～1 厘米，叶基有槽，互相迭合。

(3) 花很小，密集成玉米棒样的肉穗花序。浆果，直径约 0.2 厘米。

(4) 根茎平卧，质地坚硬肥厚，有密环纹，并有多数须根。

生长环境　喜生于山沟、溪涧潮湿有流水的石隙、石面上。

多产于长江以南各省。

采集加工　药用根茎。最好在开花前采集。洗净，去须根，切片，晒干备用。或用湿沙保存鲜根茎，随时使用。

性味功能　辛温，芳香。开窍化痰，祛风除湿。

主治用法　(1)风湿性关节炎，腰腿痛；(2)消化不良，胃炎；(3)耳鸣，耳聋，健忘；(4)热病神昏；(5)有人配方用于治疗精神病。

每用干品 2～3 錢，水煎服。




图 231　石菖蒲（天南星科，菖蒲属）

Acorus gramineus Soland.

两 面 针

别名 山椒、野花椒、入地金牛。

识别特征 (1) 藤状灌木，高 1～2 米。枝、叶轴、小叶柄和叶的中脉两面均有小钩刺。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，有小叶 5～11 片；小叶卵状椭圆形，长 4～11 厘米，宽 2～6 厘米，有油点，边缘有浅齿。

(3) 花腋生，白色。果球形，胡椒大，种子成熟时黑色，有麻辣味。

(4) 根皮黄色，常有褐色点状小斑，尝之有持久的麻舌感。

生长环境 多生于山野及灌木丛中。

产于广东、广西、湖南、云南、台湾。

采集加工 药用根及茎皮，全年可采。洗净，剥皮，晒干备用。叶多用作治跌打的外敷药。

性味功能 辛苦微温，麻舌。祛风活络，散瘀止痛，解毒消肿。

主治用法 (1)心胃气痛，风湿骨痛，腰肌劳损，跌打瘀痛；(2)毒蛇咬伤，破伤风。

每用干根 3～5 錢，水煎服，或用干粉 5 分水冲服。此外，还可以作成酊剂，止牙痛；干粉撒布治疗烫火伤。本品有毒，用量不能过大，中毒症状是头晕、眼花、呕吐等。



图 232　两面针（芸香科，花椒属）

Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.

附：单　面　针

单面针为直立灌木，亦称疏刺两面针，小叶片 3～9，较两面针大，边缘波浪状，只背中脉有刺。效用基本相同。




图 232-1　单面针（芸香科，花椒属）

Zanthoxylum dissitum Hemsl.

1.果枝；2.雄花；3.退化之雌蕊；4.果实。

鸡 骨 香

别名 滚地龙、黄牛香。

识别特征 (1) 小灌木，一般高 30～50 厘米。枝叶和花序被灰黄色绒毛。

(2) 叶互生，多为卵状椭圆形，长 4～10 厘米，边缘有疏齿，基出三脉，叶柄顶部有微突起的腺体 2 枚。

(3) 花小，集成顶生总状花序。果球形，有褐色绒毛。

(4) 根粗壮，外皮黄色，易剥离，气芳香，故称“鸡骨香”。

生长环境 喜生于干旱的山坡、丘陵、旷野、草地或小灌木丛中。

主产于我国南部。

采集加工 药用根，秋冬采集。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 微苦溫，芳香。行气止痛，舒筋活络。

主治用法 (1)跌打扭伤，风湿性关节炎；(2)胃及十二指肠溃瘍，胃肠功能紊乱，胃肠胀气。

每用干品 3～5 錢，水煎服，或用干根研末，每服 8 分～1 錢；亦可调敷治毒蛇咬伤。




图 233　鸡骨香（大戟科，巴豆属）

Croton crassifolius Geisel.

刺果苏木

别名　杠果釘。

识别特征　(1) 藤状灌木，全株有下弯的钩刺。

(2) 叶互生，偶数羽状复叶，小叶片 6～12 对；小叶长圆形，长 2～3 厘米，宽约 1～2 厘米，基部歪斜。

(3) 花黄色。荚果长圆形，长 5～7 厘米，很象芒果核，表面密生针刺，因而也叫“杠果釘”。

生长环境　生于疏林、灌木丛、海边、村边、荒地。

主产于广东、广西、台湾。

采集加工　药用叶，夏天采集。晒干备用。

性味功能　苦凉。祛瘀止痛，清热解毒。

主治用法　急慢性胃炎，胃溃疡，痈疮疖肿。

每用干品 2～3 錢，水煎服。亦可捣烂敷痈疮疖肿。



图 234　刺果苏木（苏木科，苏木属）

Caesalpinia crista L.

1.花枝；2.花；3.果。

附：南　蛇　簕

南蛇簕与刺果苏木相似，区别点是偶数羽状复叶，由 6～10 对小叶组成，果长 7～12 厘米，有种子 4～7 粒。药用根，性苦凉。用于治疗外感高热，风湿骨痛，每用干根 1～2 两，水煎服。



图 234-1　南蛇簕（苏木科，苏木属）

Caesalpinia minax Hance

金不换(华千金藤)

识别特征 (1) 木质大藤本。茎富有纤维，有条纹，灰白色，全株无毛。

(2) 叶互生，阔三角状圆形，长 10～15 厘米，宽 14～20 厘米，盾状，背面灰白色，有掌状脉 9 条，向前 5 条，向后 4 条，均明显；嫩叶，叶脉红色，折断流红色汁液。

(3) 花细小腋生。小扁果倒卵形，中间微凹。

(4) 有大型块根，不规则球形，重可达 1～2 百斤，大部暴露于地面，皮褐色，断面肉质。

生长环境 喜生于向阳干燥大山半腰的石缝、峭壁、乱石堆里。

多见于广东海南、广西、云南、四川、湖北、浙江。

采集加工 药用块根，全年可采。洗净，切片，或削成条状，晒干备用。

性味功能 苦寒。清热解毒，散瘀止痛。

主治用法 (1)胃及十二指肠溃疡疼痛，跌打肿痛，神经痛，牙痛；(2)急性胃肠炎，菌痢；(3)上呼吸道感染，咽痛。

每用干品 3～5 錢，水煎服，或作散，每用 3 分。




图 235　金不換（防己科，千金藤属）

Stephania sinica Diels

1.枝叶；2.块根；3.核果。

金钮扣(水茄)

别名　金钮头、金衫扣。

识别特征　(1) 直立亚灌木，高约 1～2 米。枝和叶柄有散生短刺，全株有柔毛。

(2) 叶互生，矩圆状卵形，长 10～15 厘米，基部两侧不等，全缘或有 2～3 浅裂。

(3) 花腋生，白色。果球形，直径约 1 厘米，熟时黄色。

生长环境　喜生于荒地、村边。

多见于华南地区。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　淡微凉，有小毒。散瘀，消肿，止痛。

主治用法　(1) 跌打瘀痛，腰肌劳损；(2)胃痛。

每用干根 5 錢～1 两，水煎服。



图 236　金钮扣（茄科，茄属）

Solanum torvum Sw.

1.花果枝；2.雄蕊；3.果；4.星状毛(放大)。

金鸡爪(隔山香)

别名 香白芷、鸡爪参、正香前胡、枸橼当归，柠檬香咸草。

识别特征 (1) 多年生草本，高 0.7～1.5 米。茎直立，圆柱形，中空，有纵沟纹。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，一般有小叶 3～5 片，长 1.5～3.5 厘米，宽 6～8 毫米。

(3) 花小，白色，顶生伞形花序。果椭圆形，扁平，种子有异香似柠檬，所以又叫“柠檬香咸草”。

(4) 根近纺缍形，外表黄色，断面粉质，多个如鸡爪，所以叫“金鸡爪”。

生长环境 多生于山区向阳坡地的灌木丛或草丛中。

多见于我国华南地区。

采集加工 药用根，秋冬可采。洗净，阴干备用。

性味功能 辛苦微温，气香。活血散瘀，行气止痛，止咳除痰。

主治用法 (1)心绞痛，胃痛；(2)慢性咳嗽；(3)毒蛇咬伤。

每用干根 3～5 錢，水煎服。




图 237　金鸡爪（伞形科，当归属）

Angelica citriodora Hance

1.花和枝；2.花；3.雌蕊。

单根木(海南狗牙花)

别名　震天雷、艾角青。

识别特征　(1) 小灌木，高约 0.5 米，全株光滑，折断后有白色乳汁。

(2) 叶对生，长卵形，长 5～10 厘米，宽 2～4 厘米。

(3) 花白色。果如两个叉开的牛角形，长约 4 厘米，熟时红色。

(4) 根直而粗长，很少分枝，故称“单根木”。

生长环境　喜生于干旱山坡、丘陵的灌木丛中。

主产于广东。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干；叶，多为鲜用。

性味功能　微苦辛温，有小毒。解毒散结，祛风止痛。

主治用法　(1)咽喉肿痛，乳腺炎；(2)风湿痛，跌打损伤，胃寒疼痛；(3)高血压。

每用干根 3～8 錢，水煎服。鲜叶捣烂外敷治蛇伤、疮疖、跌打肿痛。




图 238　单根木（夹竹桃科，狗牙花属）

Ervatamia hainanensis Tsiang

1.花枝；2.蓇葖果；3.根。

姜三七(土田七)

别名　竹叶三七。

识别特征　(1)多年生草本，高 20～30 厘米。(2) 叶基生，通常 2～3 片，形似竹叶，故称“竹叶三七”，先端短尖，基部狭而成柄，有多数弧形平行脉。

(3) 根茎呈不规则圆形，粉质，芳香而有辛辣味；根茎的分枝，顶端膨大成球形，又可长出新苗。

生长环境　均为栽培。

主产于广东、广西、江西。

采集加工　药用块根，秋、冬、春采挖块根。洗净，晒干备用。

性味功能　辛微苦温。散瘀消肿，活血止血，行气止痛。

主治用法　(1)跌打瘀痛，风湿骨痛；(2)吐血，衄血，月经过多；(3)虫蛇咬伤。

每用干品 2～3 錢，水煎服或浸酒内服。虫蛇咬伤亦可以研粉外用。



图 239　姜三七（姜科，土田七属）
Stahlianthus thorelii Gagnep.

降 真 香

别名 山油柑、山橘树、甜酒饼叶。

识别特征 (1) 灌木或小乔木，高可达5～10米。幼枝及花序被微毛，全株有香气。

(2) 叶对生，长椭圆形，长5～15厘米，宽2.5～6厘米，有油点，叶柄有节。

(3) 开白色小花，生于枝顶或叶腋。果球形，长0.6～0.8厘米，熟时黄白色，半透明，有甜味。

生长环境 喜生于山坡、山谷的林丛中。

主产于广东、广西、云南、四川。

采集加工 药用根、叶、果实、心材。根、叶，全年可采，洗净，切片，晒干或阴干；叶阴干备用。果实秋冬采集，用开水烫透，晒干备用。

性味功能 甘平，气香。行气活血，健脾，止咳。

主治用法 (1)风湿性腰腿痛，跌打瘀痛，心胃气痛，用干根5錢～1两，或心材8分～1錢5分，水煎服，亦可研粉作散内服。(2)跌打损伤，用叶捣烂外敷。(3)消化不良，用果3～5錢，水煎服。(4)感冒咳嗽，用叶3～5錢，水煎服。



图 240　降眞香（芸香科，降眞香属）

Acronychia pedunculata (L.) Miq.

素馨花

识别特征 (1) 直立灌木，小枝柔弱，有棱。

(2) 叶对生，为奇数羽状复叶，有小叶 5～7 片，小叶卵形至椭圆形，长约 1.5 厘米，宽约 1 厘米。

(3) 花白色，数朵生于枝顶，高脚碟形，甚芳香。果椭圆形。

生长环境 各地有栽培。

采集加工 夏秋采收花蕾，清晨太阳未出时采摘（因素馨花多在太阳出来后开放），隔水蒸约 20 分钟，变软后取出晒干。

性味功能 甘平。舒肝解郁，化滞止痛。

主治用法 肝炎，肝硬化的肝区痛，胸肋不舒，心胃气痛，下痢腹痛。

每用干品 2～3 錢，水煎服或加入茶中冲饮。




图 241　素馨花（木犀科，素馨属）

Jasminum officinale L. var. grandiflorum (L.) Kobuski

救必应(铁冬青)

别名　白兰香、冬青仔。

识别特征　(1) 大乔木，一般高 5～10 米。树皮厚，灰白色，内皮黄色，味极苦。

(2) 叶互生，卵形，长 4～9 厘米，宽 2～4 厘米，柄长 1～2 厘米。

(3) 花小，黄白色。果卵圆形，绿豆大小，熟时红色。

生长环境　喜生于山坡、丘陵或半山的疏林中。

主产于我国南方各地。

采集加工　药用皮，全年可采。剥取树皮，去掉表层粗皮，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热利湿，消肿止痛。

主治用法　(1)感冒发热，扁桃体炎，咽喉肿痛；(2)急性胃肠炎；(3)胃及十二指肠溃疡；(4)跌打损伤，风湿骨痛。

每用干品 3～5 錢，水煎服，或研末调油涂烧伤、疮疡，鲜叶捣烂外敷治跌打损伤。




图 242　救必应（冬青科，冬青属）

Ilex rotunda Thunb.

1.果枝；2.花；3.果。

银不换(毛叶轮环藤)

别名　毛篆箕藤。

识别特征　(1) 缠绕草质藤本。茎纤细有纵条纹，嫩枝被毛，老枝无毛。

(2) 叶互生，盾状着生，两面被柔毛，三角状阔卵形，长 4～10 厘米，宽 2.5～8 厘米，掌状脉 9～10 条。

(3) 独根似鸡肠，褐黑色，味极苦。

生长环境　喜生于潮湿山地、村旁、丘陵灌木丛中。

主产于广东南部。

采集加工　药用根茎，全年可采。洗净，切片晒干。

性味功能　苦寒。解毒，止痛，散瘀。

主治用法　(1)咽喉炎；(2)腹痛，牙痛；(3)跌打损伤。

每用干品 3～5 錢，水煎服。




图 243　银不换（防己科，轮环藤属）

Cyclea barbata (Wall.) Miers

1.花枝；2.核果；3.根。

黑老虎(臭饭团)

别名　透地连珠、钻地风、三百两银。

识别特征　(1) 木质藤本。茎皮褐黑色,干后尤明显，有稀疏白麻点。

(2) 叶互生，革质,肥厚，椭圆形，长 8～17 厘米；上面深绿色，光亮。

(3) 花腋生,黄色或稍带红色。果近球形，似饭团，直径 6～10 厘米，熟时紫黑色。

(4) 根横走,多分枝且弯曲有较密的裂纹，皮褐色，粉质，易剥离，有香气。

生长环境　喜生于山腰疏林下或山沟、山岗石边。

主产于广东、广西、江西、湖南、四川、贵州、云南。

采集加工　药用根,全年可采。洗净,切片，晒干备用。

性味功能　辛温微苦，有香气。行气止痛，活血散瘀，祛风消肿。

主治用法　(1)慢性胃炎，急性胃肠炎，胃及十二指肠溃疡；(2)风湿骨痛，跌打瘀痛；(3)经前腹痛，产后瘀痛，浮肿。

每用干品 5 錢～1 两,水煎服，或研粉内服，每用 3～5 分。



图 244　黑老虎（五味子科，南五味子属）

Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith

鹰不泊(簕欓)

别名　鸟不宿、刺倒树。

识别特征　(1) 小乔木，高通常为3～5米。茎干有粗大、三角形的红褐色刺，枝和叶的总柄有小而上弯的刺。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，小叶7～15片，斜矩圆形或斜倒卵形，有油点。

(3) 花白色，多数排成顶生的圆锥花序。果暗紫色，有麻辣味。

(4) 根皮黄色，尝之有辣味。

生长环境　喜生于溪旁、山坡、村边灌木丛中。

主产于广东、广西、湖南、江西、福建、贵州、台湾。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛微温，微香。行气，止痛，利水。

主治用法　(1)慢性肝炎；(2)肾炎性水肿；(3)风湿骨痛，跌打瘀痛。

每用干根1～2两，水煎服。此外，胃痛可用干燥果实1～2錢，水煎服。



图 245　鹰不泊（芸香科，花椒属）

Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC.

1.花枝；2.雌花；3.果。

九、镇静催眠类

（适应神经衰弱、失眠、高血压等疾病）

马　尾　松

别名　青松、铁甲松、松树。

识别特征　(1)常绿大乔木，高可达二、三十米。树皮红褐色或灰褐色，易剥落。(2)叶针形，深绿色，每二针一束，长 10～20 厘米。(3)花单性，雄花序黄色，聚生于幼枝的基部；雌花序淡紫色，单生或 2～3 个聚生于枝端。球果长卵圆形，由许多鳞片组成，熟时褐色而开裂。

生长环境　喜生于阳光充足干燥的山地、山顶、平原。我国大部分地区有分布。

采集加工　药用松针、松香、松花粉、松节、松根。松花粉要在春末夏初花期采集，摘取待开花穗，晒干取粉筛去杂质即得。

性味功能　松针：苦温；松香：甘温；松花粉：甘温；松节：苦温；松根：苦温。祛风通络，益胃安神，止血生肌。

主治用法　(1)神经衰弱，维生素丙缺乏，营养

性水肿，防治流脑，流感，每用鲜叶 1～2 两，水煎服。(2)风湿骨痛，跌打瘀痛，每用松节或松树二层皮或松根，3～5 錢，水煎服。(3)胃及十二指肠溃瘍，慢性便秘。用松花粉 1 錢冲服，或配方用。(4)疮痈肿毒，用松脂配方制膏药外贴。




图 246　马尾松（松科，松属）

Pinus massoniana Lamb.

长 春 花

别名 雁来红、日日新。

识别特征 (1) 多年生草本，高60厘米。幼枝褐红色，节稍膨大。

(2) 叶交互对生，常为长圆形，长5～7厘米，宽2～3厘米。

(3) 花1～2朵生于叶腋，粉红色，高脚碟形。果长条形。

生长环境 喜生于海滩、村边、路边、园地的草丛中。

主产于广东、广西、云南。长江以南也有栽培。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 微苦凉。镇静安神，平肝降压。

主治用法 高血压。

每用干品2～3钱，水煎服。

注：另有一种长春花，花白色，功用相同。



图 247　长春花（夹竹桃科，长春花属）

Catharanthus roseus (L.) G. Don

白千层

别名 玉树。

识别特征 (1) 乔木，高5～10米。树皮灰白色，疏松海绵状，多层，每层纸样易剥离，故称“白千层”。

(2) 叶互生，形似砍刀或偏斜鐮刀形，长4～10厘米，宽1～2.5厘米，有纵脉3～5条，揉碎有樟脑香气。

(3) 花白色，顶生，穗状。果半球形。

生长环境 广东、广西、福建、台湾都有栽培。

采集加工 药用叶、树皮，全年可采。阴干备用。

性味功能 叶辛涩温，气芳香；皮淡平。安神鎮靜，祛风止痛。

主治用法 (1)神经衰弱，失眠，每用干皮2～3錢，水煎服；(2)风湿骨痛，神经痛，肠炎腹泻，每用干叶2～3錢，水煎服；(3)过敏性皮炎，湿疹，用鲜叶煎水洗。



图 248　白千层（桃金娘科，白千层属）

Melaleuca leucadendra L.

含 羞 草

别名 知羞草、怕丑草。

识别特征 (1) 披散多分枝草本，下部伏地，有毛及钩刺，茎紫红色。

(2) 叶互生，为二回偶数羽状复叶，小叶多达21对，稍一碰触就能自动闭拢，故名“含羞草”。

(3) 花紫红色，似绒线球，生在叶腋上。

生长环境 喜生于潮湿肥沃的草地、村旁、路边、田埂。

主产于长江以南各地。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 甘涩微寒。安神镇静。

主治用法 神经衰弱，失眠。

每用干品 1～2 两，水煎服或配方用。鲜叶捣烂外敷治带状泡疹。




图 249　含羞草（含羞草科，含羞草属）

Mimosa pudica L.

夜 香 牛

别名 伤寒草、夜牵牛、消山虎、寄色草。

识别特征 (1) 一年生草本，高 20～80 厘米。茎有细棱线，稍有毛。

(2) 叶互生，多为椭圆状披针形，长 2～7 厘米，背面有柔毛，叶缘有浅齿。

(3) 头状花序疏散，直径约 0.3 厘米，紫红色。果圆柱形，有白色冠毛。

生长环境 生于田边、荒地、林缘、路旁。我国南方各地常见。

采集加工 药用全草，夏季采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能 淡凉。清肝退热，安神镇静。

主治用法 (1)感冒发热，咳嗽；(2)急性黄疸型肝炎；(3)神经衰弱，失眠，小儿夜尿；(4)疔疮肿毒，乳腺炎，蛇伤。

每用干品 5 錢～1 两 （小儿 3～5 錢），鲜品 1～2 两，水煎服。用鲜品捣烂敷疮痈、蛇伤。




图 250　夜香牛（菊科，斑鳩菊属）

Vernonia cinerea (L.) Less.

钩　藤

别名　金钩钓、双钩藤、挂钩藤、老鹰爪。

识别特征　(1) 藤状灌木，高 1～2 米。嫩枝四方形，节上有鹰爪样的钩 1～2 个，所以叫“钩藤”或“老鹰爪”。

(2) 叶互生，椭圆形，长约 9 厘米，宽约 5 厘米，上面绿色，下面粉绿色。

(3) 花黄色，腋生，集成头状花序，很象绒球，柄长。

(4) 根肥厚，淡黄色，质软，味微苦有刺喉感。

生长环境　喜生于山谷、溪边、山坡和疏林中。

长江以南各省均有分布。

采集加工　药用带钩的茎枝和根。于春秋采收。根，切段或切片，晒干备用。

性味功能　甘苦微寒。清热，平肝，熄风。

主治用法　(1)小儿高热抽搐(用钩)；(2)高血压，头晕，目眩，神经性头痛(用钩)；(3)风湿性关节炎，坐骨神经痛（用根)。

每用钩 2～5 錢（不宜久煎)，根 5～8 錢，水煎服。



图 251　钩藤（茜草科，钩藤属）

Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jackson

酢 浆 草

别名 酸味草、斑鸠酸、黄花酢浆草。

识别特征 (1) 伏地草本，长约 10 厘米。茎纤细，全株有白色柔毛，节上生根。

(2) 叶互生，为指状三小叶，柄长，小叶倒心形，长 5～10 毫米，无柄，先端凹陷，尝之有酸味。

(3) 花黄色，生于叶腋。果近圆柱形，具 5 棱，有毛。

生长环境 喜生于房前屋后、田边、沟边、园边、路旁。

全国各地均有分布。

采集加工 药用全草，四季可采。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能 酸凉。清热，凉血，安神。

主治用法 (1)感冒发热，肠炎腹泻，尿路感染，神经衰弱，每用干品 1～2 两，水煎服。(2)跌打扭伤，毒蛇咬伤，用鲜品捣烂外敷。(3)烫伤，脚癣，皮肤湿疹，用鲜汁外擦或煎水洗。




图 252　酢浆草（酢浆草科，酢浆草属）

Oxalis repens Thunb.

附：红花酢浆草

红花酢浆草，亦名大酸味草，与酢浆草相似，区别是叶片大，叶柄长，无地上茎，地下具纺锤形块根及鳞茎，花紫红色。两者功用相同。



图 252-1　红花酢浆草（酢浆草科，酢浆草属）

Oxalis corymbosa DC.

1.植物下部；2.花序；3.叶；4.花；5.花蕊。

豨莶草

别名　希仙、粘糊菜、珠草。

识别特征　(1) 一年生草本，高 0.6～1 米，多分枝。茎枝常呈紫红色，有柔毛。

(2) 叶对生，卵状三角形，长 9～14 厘米，边缘有钝齿，叶柄长短不一。

(3) 花黄色，头状花序，具柄，外苞片匙形，有粘手的小毛，叫“腺毛”，所以叫“粘糊菜”。

生长环境　喜生于路边、坡地、田头、荒地。

全国各地均有分布。

采集加工　药用全草。夏末秋初采集幼枝和叶，或割取地上部分，洗净，切段晒干。

性味功能　苦寒。安神降压，祛风止痛。

主治用法　(1)治疗神经衰弱，失眠，效果较好；(2)高血压；(3)风湿痹痛；(4)蛇虫咬伤。

每用干品 3～5 錢，水煎服。外敷治疮毒。




图 253　豨莶草（菊科，豨莶属）

Siegesbeckia orientalis L.

磨 盘 草

别名 耳响草、牛响草。

识别特征 (1) 直立亚灌木状草本，高0.4～1米，全株有灰白色柔毛，茎皮纤维丰富。

(2) 叶互生，阔卵形或卵形，长 3～7 厘米，两面有灰白色柔毛，边缘波状，或有粗齿。

(3) 花黄色，五瓣，单生于叶腋。果形磨盘状，扁圆而有棱，故称"磨盘草"。

生长环境 喜生于山坡、村旁、旷野杂草丛中。

见于全国各地。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 甘淡平。疏风清热，升清降浊。

主治用法 (1)感冒高热不退，流行性腮腺炎；(2)耳聋、耳鸣；(3)甲状腺肿；(4)遗精。

每用干品 1～2 两，水煎服。

注：蓖麻又名青麻、白麻，各地均栽培。北方尤多，形态与磨盘草相似，不同处是：花柄较粗壮，花瓣与萼略等长(后者长二倍)，成熟的心皮有长芒两枚（后者只有短芒)。蓖麻的根、种子均入药。治痢疾，鬱状餐肉，用干根 1～3 錢，水煎服。种子（冬葵子）有利尿、通便作用，每用 1～3 錢，水煎服。




图 254　磨盘草（锦葵科，蒂麻属）

Abutilon indicum (L.) Sweet

1.花果枝；2.花的纵切面。

十、补　益　类

（适应贫血、消瘦、营养不良、阳萎、遗精等疾病）

土党参（金钱豹）

别名　奶参、蔓桔梗。

识别特征　(1) 多年生缠绕草质藤本，折断后有乳汁。

(2) 叶对生，有时互生，卵状心脏形，长 3～8 厘米，宽 2～6 厘米，边缘有疏齿，叶柄细长，常扭曲。

(3) 花腋生，钟形，黄绿色。果半球形，红色，熟时紫色。

(4) 根黄白色，纺锤形，肉质，有特殊气味。

生长环境　生于山坡、山谷、溪边低湿的灌木丛中。

主产于南方各省区。

采集加工　药用根，秋冬采集。待根肉缩小变软后，洗净泥土，晒干备用。

性味功能　甘平。补虚润肺，益气生津。

主治用法　(1)病后体虚，疲劳倦怠，多汗，

食欲不振，心跳不宁；(2)肺结核，夏季热。

每用干品 3～5 錢，水煎服。



图 255　土党参（桔梗科，金錢豹属）

Campanumoea javanica Bl.

土人参(锥花土人参)

别名 土高丽参、飞来参。

识别特征 (1) 多年生直立肉质草本，高30～50厘米，茎紫红色。

(2) 叶互生或近对生，卵状披针形，长7～10厘米，宽3～3.5厘米，光滑。

(3) 花小，淡红色，集成顶生圆锥花序。果球形。

(4) 根肉质，纺锤形，很象人参。

生长环境 多为栽培。

主产于长江以南。

采集加工 药用根，秋冬采集。洗净，蒸后，晒干备用。

性味功能 甘平。补中益气，润肺生津，凉血消肿。

主治用法 (1)病后体虚，劳伤咳嗽，遗尿，月经不调，每用干品1～2两，水煎服。(2)疖肿，每用鲜叶捣烂外敷。




图 256　土人参（马齿苋科，土人参属）

Talinum patens (L.) Willd.

1.根；2.植物之一部分。

千斤拔(蔓性千斤拔)

别名　千斤墜、金牛尾。

识别特征　(1) 蔓生小灌木。茎纤细，长可达 1～2 米，嫩枝三棱形，有毛。

(2) 叶互生，为指状 3 小叶，顶生小叶长圆形，侧生小叶斜卵形，长 6～10 厘米，宽 2～3 厘米，两面有毛，基部有 3 条主脉。

(3) 花紫红色，长在叶腋，花后结长约 1 厘米的长圆形的豆荚。

(4) 根多无分枝，且很长，上粗下细似牛尾，故又称"金牛尾"。

生长环境　喜生于山坡灌木丛、路边、草丛。

我国南方各地均有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘淡涩平。舒筋活络，强腰壮骨。

主治用法　(1)腰肌劳损，偏瘫痿痹，风湿骨痛；(2)气虚脚肿，劳伤久咳；(3)咽喉肿痛。

每用干根 1～2 两，水煎服。




图 257　千斤拔（蝶形花科，千斤拔属）

Moghania philippinensis (Merr. et Rolfe) H. Y. Li

附：千　斤　红

千斤红，又名大叶千斤拔，为直立亚灌木，较蔓性千斤拔叶大、花序长、果大。两者功效基本相同，可以互用。



图 257-1　千斤红（蝶形花科，千斤拔属）

Moghania macrophylla (Willd.) O. Kuntze

五指山参(箭叶秋葵)

别名　红花马宁。

识别特征　(1) 多年生亚灌木状草本，高约0.3～1米，小枝有疏长毛。

(2) 叶互生，叶形种种，阔卵形或近圆形，基部心形或戟形，上部的叶有时箭形，3～5浅裂或深裂，两面均有疏毛，边缘有钝齿。

(3) 花红色，五瓣，单生于叶腋。果长圆形，长约2.5～4厘米，有五棱。

(4) 根肉质，萝卜状，揉碎有粘性。

生长环境　喜生于坡地、灌木丛、草丛中。主产于广东海南。

采集加工　药用根茎，冬季采集。洗净，切片，晒干。

性味功能　甘淡微温。滋养强壮。

主治用法　(1)神经衰弱，头晕；(2)腰腿痛；(3)胃痛，腹泻。

每用干品3～5錢，水煎服。




图 258　五指山参（锦葵科，黄葵属）

Abelmoschus sagittifolius (Kurz.) Merr.

天　门　冬

别名　天冬。

识别特征　(1) 多年蔓生草本，茎长可达2米。基部木质化有短刺，上部披散或攀援状。

(2) 叶退化成鳞片状，肉眼不易看到。看到的"叶"，是枝变成的，呈线形，稍弯，常2～3枚簇生。

(3) 花白色，腋生。浆果球形，熟时紫红色。

(4) 有纺锤形、肉质、簇生的块根。

生长环境　喜生于潮湿、肥沃的山坡、丘陵灌木丛中。

长江以南各地均产。

采集加工　药用块根，秋冬采集。洗净，水煮或蒸，趁热去掉外皮，切片晒干，用硫黄熏后，贮存于密封的罐中，以防虫蛀发霉。

性味功能　甘微苦微寒。滋阴润燥，清热化痰。

主治用法　(1)肺结核、慢性支气管炎等引起的咳嗽；(2)热性病恢复期，便秘；(3)糖尿病。

每用干品1～3錢，水煎服。




图 259　天门冬（百合科，天门冬属）

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.

牛大力(美丽崖豆藤)

别名　山莲藕、大力薯。

识别特征　(1) 攀援灌木，高 1～2 米。嫩枝有银灰色软毛。

(2) 奇数羽状复叶，小叶 7～17 片，小叶长圆形或卵状披针形，长 4～10 厘米，宽 1.5～3 厘米，背面常有毛。

(3) 花腋生，白色。花后结长圆形而扁平的豆荚，有毛。

(4) 根长条状，粗可达 5 厘米以上，外皮灰黄色，粉质，易折断，味甜。

生长环境　喜生于阴湿的山坡、疏林、灌木丛中。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根块，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘平。舒筋活络，补虚润肺。

主治用法　(1)腰腿痛，风湿痹痛；(2)慢性肝炎，肺结核。

每用干根 1～2 两，水煎服。




图 260　牛大力（蝶形花科，鸡血藤属）

Millettia speciosa Champ.

巴　戟　天

别名　鸡肠风、鸡眼藤。

识别特征　(1) 攀援藤本，长 1～3 米。茎圆，灰色或暗褐色，嫩枝有小粗毛。

(2) 叶对生，长椭圆形，长 5～10 厘米，宽 2～5 厘米；嫩叶常呈紫色，有小毛。

(3) 花白色，顶生。果扁球形，熟时红色。

(4) 根肥厚，肉质，呈不规则的串珠状，很象鸡肠，也叫“鸡肠风”，味微甜。

生长环境　喜生于山谷林下、溪边的疏松肥沃地上。

主产于广东、广西、福建。多为野生，亦有栽培的。

采集加工　药用根，夏、秋、冬季采集。洗净，去掉侧根，用热水泡透后，抽去木心，切段，晒干备用。

性味功能　辛甘微温。补肾壮阳，强筋骨，祛风湿。

主治用法　(1)肾虚腰膝无力，痿痹瘫痪，风湿骨痛；(2)神经衰弱，阳萎，遗精，早泄，失眠；(3)妇女不育。

每用干品 2～6 錢，水煎服。




图 261　巴戟天（茜草科，巴戟属）

Morinda officinalis How

1.花枝；2.花；3.根。

龙　　眼

别名　桂圆、亚荔枝、燕卵、川弹子。

识别特征　(1) 大乔木，高 5～10 米。

(2) 叶互生，为偶数羽状复叶，小叶 4～5 对，椭圆形至卵状披针形，长 6～10 厘米，宽 2.5～4 厘米，基部偏斜，硬革质，光亮。

(3) 花小，黄白色，有花瓣。果圆珠形，直径 1.5～2.5 厘米，外皮黄褐色，革质而脆，果肉(假种皮)味甜可吃。

生长环境　为栽培果树。

主产于四川、云南、广西、广东、福建、台湾。

采集加工　药用果肉，种子及叶。6～7 月采果，肉晒干，核，洗净晒干备用。

性味功能　龙眼肉：甘温，滋补强壮；核：涩平，收敛止血，消滞止痛；叶：淡平，解表。

主治用法　神经衰弱，病后体虚，每用龙眼肉干品 3～5 錢；外伤出血，用种子研粉外敷；胃痛，用种子 3～5 錢，水煎服。防治流感、感冒，用叶 3～5 錢煎水代茶。



图 262　龙眼（无患子科，龙眼属）

Euphoria longan (Lour.) Steud.

1.花序；2.果枝；3.花(放大)；4.星状毛。

仙　　茅

别名　独脚仙茅、地棕。

识别特征　(1) 多年生草本，高 10～40 厘米。地下常有单一、不分枝的根茎，褐黑色，肉质断面白色。

(2) 叶根生，3～6 枚，具柄，披针形，革质，长约 10～30 厘米，宽 0.6～2 厘米，有散生长毛。

(3) 花茎极短，藏于叶鞘内，花黄色。

生长环境　喜生于山坡、丘陵的草地和灌木丛旁。

长江以南均有生长。

采集加工　药用根茎。春初、秋末采集。除去须根和根头，洗净，切段，晒干备用。

性味功能　辛苦而甘温，有小毒。补肾壮阳，散寒除痹。

主治用法　(1) 肾虚腰痛，神经衰弱，阳萎；(2)妇女更年期高血压；(3)慢性肾炎；(4)无名肿毒。

每用干品 1～3 錢，水煎服。无名肿毒可用鲜品捣敷。




图 263　仙茅（仙茅科，仙茅属）
Curculigo orchioides Gaertn.

地　　稔

别名　山地稔、铺地稔。

识别特征　(1) 多年生草本。茎披散或匍匐状铺地，节着地生不定根，故称“地稔”。

(2) 叶对生，倒卵形或椭圆形，长 1.2～3 厘米，宽 0.8～2 厘米，基出 3～5 脉，两面被疏粗毛。

(3) 花 1～3 朵生于枝顶，紫红色。球形，熟时紫黑色，被粗毛，味甜可食。

生长环境　喜生于坡地、旷野、田边、路旁。产于我国南部。

采集加工　药用根、果或全草。根，全年可采，洗净，切片，晒干备用；果，秋季采收，蒸熟，晾干备用。

性味功能　涩平。涩肠止痢，舒筋活络，补血安胎。

主治用法　(1)肠炎，菌痢；(2)腰腿痛，风湿骨痛；(3)孕妇贫血，胎动不安，月经过多。

每用干根或全草 1～2 两，果 2～4 錢，水煎服。



图 264　地稔（野牡丹科，野牡丹属）

Melastoma dodecandrum Lour.

羊　乳

别名　山海螺、四叶参、白蟒肉。

识别特征　(1) 多年蔓生草本，多分枝，全株有白色乳汁。茎缠绕，带紫色，长可达1米多。

(2) 生于茎上的叶小而互生；生于侧枝上的叶多近于四片轮生，故称“四叶参”，一般为卵形或广披针形。

(3) 花钟形，乳白或带黄色。果圆锥形，有宿萼。

(4) 地下根纺锤形，肉质，有特异气味。

生长环境　喜生于海拔较高的山坡、灌木丛下潮湿肥沃的土地上。

我国大部分地区均有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，蒸透，切片，晒干备用。

性味功能　甘平。滋补强壮，祛痰润肺，排脓解毒。

主治用法　(1) 病后体虚，产后缺乳；(2)肺脓肿，乳腺炎，痈疮肿痛；(3)蛇咬伤。

每用干品5錢～2两，水煎服。




图 265　羊乳（桔梗科，党参属）

Codonopsis lanceolata Benth. et Hook. f.

1.植物的一部分；2.根。

岗稔(桃金娘)

别名　山稔。

识别特征　(1) 灌木，高 1～2 米，嫩枝密生柔毛。

(2) 叶对生，椭圆形，长 3～10 厘米，宽 1～5 厘米，基出三脉，上面光滑，背面有白色短毛。

(3) 花紫红色。果似杯状，有宿存萼片，熟时紫红色，味甜可食。

(4) 根、叶有涩味。

生长环境　喜生于丘陵、坡地、山路旁。

主产于福建、广东、广西、云南、台湾等地。

采集加工　药用根、果、叶。全年采根，洗净，切片，晒干备用；秋季采果，蒸熟，晒干备用；夏季采叶，鲜用或晒干用。

性味功能　甘涩平。收敛止泻，祛风活络，补血安神。

主治用法　(1) 急性胃肠炎，每用干叶 5 錢～1 两，水煎服。(2)慢性痢疾，风湿骨痛，腰肌劳损，气虚浮肿，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。(3)孕妇贫血，病后体虚，神经衰弱，每用干果 3～5 錢，水煎服。



图 266　岗稔（桃金娘科，桃金娘属）

Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.

何　首　乌

别名　多花蓼、马肝石、夜交藤、赤葛。

识别特征　(1) 多年生草质藤本，长约 1～2 米，多分枝，茎红色。

(2) 叶互生，卵状心形，上面绿色，背面淡绿色，长 5～9 厘米，宽 3～5 厘米。

(3) 花白色，腋生或顶生圆锥花序。果卵形，熟时黑色，平滑光亮。

(4) 块根圆锥形，或不规则球形，肥大，似地瓜，外皮棕黑色至暗红色。

生长环境　野生于山脚、石隙，亦有栽培。主产于四川、陕西，全国大部地区均有分布。

采集加工　药用块茎、藤(夜交藤)。冬季挖块茎，洗净，晒干或加黑豆同煮，使内部变黄色，晒干备用。

性味功能　苦甘涩温。补肝肾，壮筋骨。

主治用法　(1)阳萎，遗精；(2)腰膝无力，神经衰弱；(3)慢性肝炎。

每用干块茎 3～5 錢或干藤 5 錢～1 两，水煎服。




图 267　何首乌（蓼科，蓼属）
Polygonum multiflorum Thunb.

鸡血藤

别名　昆明鸡血藤、网络鸡血藤。

识别特征　(1) 木质大藤本。茎红褐色，粗糙，刀砍时有血红色粘液流出，故称“鸡血藤”。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，小叶7～9片，对生，长椭圆形，长3～6厘米，宽1.5～3厘米，顶端长尖而有微凹。

(3) 花紫红色，顶生圆锥花序，花后结长圆形而扁平的豆荚。

生长环境　喜生于山谷疏林和密林中。

长江以南大部地区有分布。

采集加工　药用藤茎，全年可采。采后稍放数天，等水分减少后切片，蒸熟，晒干备用。

性味功能　苦温。补血强筋，通经活络。

主治用法　贫血，月经不调，闭经，遗精，风湿筋骨痛，腰腿痛，胃痛。

每用干品5錢～1两，水煎服或浸酒服。对气血虚弱者，用藤熬膏內服，效用更好。




图 268　鸡血藤（蝶形花科，鸡血藤属）

Millettia reticulata Benth.

1.花枝；2.荚果。

附：山 鸡 血 藤

山鸡血藤，亦名“老人根”，即香花崖豆藤。区别点是：本种的羽状复叶有小叶3～5片，荚果、花萼被茸毛。功用不如鸡血藤好，但可代用。



图 268-1　山鸡血藤（蝶形花科，鸡血藤属）
Millettia dielsiana Harms et Diels.

灵　芝

别名　紫蓝、紫芝、菌灵芝。

识别特征　(1) 腐生菌类植物。

(2) 菌盖肾形或近圆形，表面有纹理，紫褐色，有漆样光泽，质地较硬，背面淡棕色，有多数小孔。

(3) 菌柄细长，柱形，直立或扭曲，紫黑色，有漆样光泽，着生于菌盖的底侧。

生长环境　生于大山密林中老树、枯木的根部。

我国各地均有分布。

采集加工　药用全株，全年采集。洗净，晒干备用。

性味功能　淡温。滋补强壮。

主治用法　神经衰弱，头晕失眠。

每用干品 5 分～ 1 錢，水煎服。或研粉，每服 3～5 分。




图 269　灵芝（多孔菌科，灵芝属）

Fomes japonicus Fr.

青筋藤(翼核果)

别名　青藤、铁牛入石。

识别特征　(1) 木质藤本，一般长 2～3 米。茎有纵条纹，青绿色，无毛。

(2) 叶互生，革质，有短柄，卵形或矩圆形，长 4～8 厘米。

(3) 花腋生，细小，绿白色。果小，顶部有一鸭舌形膜质的薄翅，翅长 3～5 厘米，故又叫“翼核果”。

生长环境　喜生于山野、沟边的疏林下或灌木丛中。

多见于广东、广西。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘涩温。补气补血，舒筋活络。

主治用法　(1)气血亏损，月经不调；(2)风湿筋骨痛，四肢麻木；(3)跌打损伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。



图 270　青筋藤（鼠李科，翼核果属）

Ventilago leiocarpa Benth.

1.花枝；2.果枝；3.花(放大)。

金　櫻　子

别名　黄茶瓶、糖罐子。

识别特征　(1) 攀援状灌木，枝条较多，节弯曲，有锐利的钩刺。

(2) 复叶互生，每叶常为3片小叶，5～7片的较少见；叶背主脉上及叶柄一般都有钩刺。

(3) 开白色花，一般有五片花瓣。果似花瓶，熟时红黄色，拇指头大，密生小刺，甘甜可食，所以叫“黄茶瓶”，“糖罐子”。

(4) 根红色，木质致密，坚硬。

生长环境　喜生于丘陵、坡地、村边、路旁的灌木丛中。

主产于长江以南各地，河南亦有分布。

采集加工　药用根及果实。秋冬采果，全年可采根。果，采后去除外刺，切开去净果仁及毛刺，蒸后晒干；根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　酸涩平。收敛固精，涩肠止泻。

主治用法　(1)遗精，遗尿，小便频数，白带；(2)脾虚泄泻，慢性痢疾；(3)虚体自汗，盗汗；(4)腰腿痛。

每用干根1～2两，果3～5錢，水煎服。鲜果3～5錢，水煎服，可治久咳。根磨汁外涂，可治疖肿初起。



图 271　金樱子（蔷薇科，蔷薇属）

Rosa laevigata Michx.

益　　智

别名　益智仁。

识别特征　(1) 多年生草本，高 2 米左右。(2) 叶二列，椭圆状披针形，宽 2～4 厘米，两面无毛，边缘有微齿；叶舌长 1.5～2 厘米，顶端 2 裂，（高良姜的叶舌不分裂，可资区别）。

(3) 花粉白色，有红纹，顶生总状花序。

(4) 果长圆形，直径 1 厘米左右，有小毛，熟时黄绿色，有浓烈的香辣味。

生长环境　生于阴蔽的灌木林中。

广东、广西、福建等地均产，以海南岛产量最大。

采集加工　药用果实。海南多于四、五月间采收，晒干备用。

性味功能　辛温。暖肾温脾，收涩固精，益气安神。

主治用法　(1)遗精，肾虚久泻，夜间多尿，遗尿唾液过多；(2)胃寒痛；(3)心悸。

每用 1～3 錢，水煎服。



图 272　益智（姜科，山姜属）

Alpinia oxyphylla Miq.

1.花枝；2.果枝。

黄花倒水莲

别名　黄花参、鸡仔树、吊吊黄。

识别特征　(1) 落叶灌木，高 1～2.5 米。根粗壮多分枝，肉质，黄白色，尝之先甜后苦。

(2) 叶互生，常为倒卵状披针形，长 8～20 厘米，宽 3～7 厘米，两面无毛，上面的叶脉凹陷。

(3) 夏秋在枝顶抽出一个长穗，着生很多黄色小花，向下倒垂，故名“黄花倒水莲”。果肾形。

生长环境　喜生于山谷、溪旁、灌木丛湿润处。

主产于广东、广西、江西、湖南、福建。

采集加工　药用根、叶，夏秋采集。根，洗净，晒干备用，叶，鲜用或阴干备用。

性味功能　甘微温。滋补强壮，散瘀消肿。

主治用法　(1)病后体虚，劳损性腰腿痛，跌打损伤，每用干根 3～5 錢，水煎服。(2)急慢性肝炎，每用鲜叶 2～5 两，或干根 3～5 錢，水煎服。(3)湖南民间用根浸于水缸中防黄病。



图 273　黄花倒水莲（远志科，远志属）

Polygala aureocauda Dunn.

1.花枝；2.根；3.蒴果。

猪 屎 豆

别名 野黄豆、大眼兰。

识别特征 (1) 多年生粗壮草本，高约 1 米。茎有条纹。

(2) 叶互生，为指状 3 小叶，小叶倒卵形，长 3～6 厘米，宽 2～3 厘米，背面稍有毛，侧生小叶较小。

(3) 花黄色，顶生或侧生，总状花序。花后结一下垂的圆柱形豆荚；种子扁肾形，黄棕色，光亮，芝麻大。

生长环境 喜生于村边、路旁、田边、荒野灌木丛中。

主产于广东、福建、云南。

采集加工 药用种子，秋季摘老荚果，晒干，除去荚壳备用。

性味功能 甘涩凉。补肝肾，明目，固精。

主治用法 遗精，早泄，虚劳，小便频数，遗尿，白带，眼目昏花。（某些地区用以代替中药谷蓼菜，即扁茎黄芪的种子）

每用 2～6 錢，水煎服。



图 274　猪屎豆（蝶形花科，野百合属）

Crotalaria mucronata Desv.

1.花枝；2.果枝；3.花(去花冠)。

盘龙参(绶草)

别名　米洋参、双瑚草、懒蛇上树。

识别特征　(1) 多年生矮小草本，高20～30厘米，全株肉质。

(2) 叶长在茎的基部，互生，常三、五片，线状披针形。

(3) 花小，粉红色，排成行列沿总轴扭曲盘旋形成一穗状花序，象龙盘在柱上一样。

(4) 根肉质，粗厚呈鸡爪状。

生长环境　多生在水沟、溪旁、坡地及潮湿的草地上。

全国大部分地区都有生长。

采集加工　药用全草或根，全年可采，春夏容易发现。采后洗净，用水烫透，晒干备用。

性味功能　甘淡平。滋阴凉血，益气生津。

主治用法　(1)咳嗽吐血，扁桃体炎，咽喉肿痛；(2)病后体虚，神经衰弱；(3)夏季热。

每用干品 3～5 錢，水煎服。



图 275　盘龙参（兰科，绶草属）

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames

1.植物全形；2.花枝。

黑皮根(陵水暗罗)

别名　落坎薯。

识别特征　(1) 灌木，高 1～4 米。茎枝褐黑色，有疏毛。

(2) 叶互生，长圆形，长 9～18 厘米。

(3) 花白色，单生，与叶对生。果卵形，直径约 1 厘米，熟时橙红色。

(4) 根通常单一，少分枝，肥厚，皮黑色，内部粉质，有特异香气，故称“黑皮根”。

生长环境　喜生于大山半山腰密林下。

主产于广东南部。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘平。补脾健胃，补肾固精。

主治用法　(1)慢性胃炎，脾胃亏损，食欲不振；(2)四肢无力，遗精。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服或配方用。



图 276　黑皮根（番荔枝科，暗罗属）

Polyalthia nemoralis A. DC.

十一、消导驱虫类

（适应消化不良、小儿疳积、肠道寄生虫症等疾病）

土 荆 芥*

别名 臭藜藿、杀虫芥、钩虫草，鹅脚草。

识别特征 (1) 一年生草本，高约1米。茎有棱，多分枝，枝叶、种子揉碎时有香气。

(2) 叶互生，矩圆形至矩圆状披针形，长3～16厘米，宽0.5～5厘米，边缘有钝齿，顶部叶变为线状苞片。

(3) 花小，白绿色，腋生及顶生穗状花序。果极小。

生长环境 生于田野、村边或路旁。

多见于广东、广西、福建、贵州。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，阴干，扎把备用。

性味功能 辛苦，芳香，有毒。驱虫。

主治用法 (1)钩虫感染或钩虫症，成人每早晚服干粉8分～1钱，连服3～6天。(2)煎水洗脚癣。

注：本品有毒，用量要很好掌握。广东地区称石荠苎即热痱草为土荆芥，两者不可混用。



图 277　土荆芥（藜科，藜属）

Chenopodium ambrosioides L.

1.植株上部；2.雄花；3.两性花。

大革薢(艳山姜)

别名　草薢、草豆叩。

识别特征　(1) 多年生常绿草本，高可达 2～3 米，根肥大。

(2) 叶大，互生，长椭圆披针形，长 50～80 厘米，宽 20～30 厘米，背面常有短毛。

(3) 顶生圆锥花序，花粉红色，花序常下弯，密生刺毛。

(4) 果圆形，大如胡桃，有刺毛，熟时黄色，内有三个种子团，含种子多数，有香辣味。

生长环境　喜生于山谷或溪边。

主产于广东、广西、福建、云南。

采集加工　药用种子。七、八月采集，晒干剝皮备用。

性味功能　辛涩温。燥湿祛寒，除痰截疟，健脾暖胃。

主治用法　(1)心腹冷痛，胸腹胀满；(2)痰食积滞，消化不良，呕吐腹泻。

每用干品 2～3 錢，水煎服。或作散剂。




图 278　大草蔻（姜科，山姜属）

Alpinia speciosa (Wendl.) K. Schum.

1.叶片；2.花序；3.雄蕊；4.果枝。

大高良姜

别名　大良姜、山姜。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高达 2 米左右。茎直立，单生，根茎似姜，切断面深黄色，具香辣味。

(2) 叶两列，有短柄，矩圆形或阔披针形，长 28～50 厘米，两面秃净，平行脉由中央斜出。

(3) 顶生圆锥花序，花粉红色。

(4) 果椭圆形，熟时橙红色。种子多角形，黑色，有香辣味。

生长环境　喜生于深山沟谷潮湿的树林下。主产于广东、广西。

采集加工　药用根茎及果实。根茎于秋末冬初采集。洗净，去须，切片，晒干备用。

性味功能　辛温，有姜味。温中散寒，止痛消食。

主治用法　(1)消化不良，胃肠胀痛；(2)霍乱，呕吐，噎膈。

每用干品 8 分～1 錢半，水煎服。



图 279　大高良姜（姜科，山姜属）

Alpinia galanga Willd

附：高 良 姜

高良姜，高一米左右，叶长椭圆形，较大高良姜小，功用大致相同。



图 279-1　高良姜（姜科，山姜属）

Alpinia officinarum Hance

布渣叶(破布叶)

别名　薜宝叶、火布麻。

识别特征　(1) 灌木，高 2～3 米，树皮灰黑色。

(2) 叶互生，卵状长圆形，长 5～10 厘米，宽 3～5 厘米，基部圆形，边缘上部有小锯齿，基出脉 3 条。

(3) 花淡黄色，组成圆锥花序，长在枝顶或叶腋。果倒卵形，直径约 7 毫米，熟时褐黑色。

生长环境　喜生于山谷、旷野、山坡灌木丛中。

主产于广东、广西、云南。

采集加工　药用叶，夏秋采集。阴干备用。

性味功能　微酸涩凉。清暑消滞。

主治用法　(1)感冒食滞，消化不良；(2)黄疸型肝炎。

每用干品 5～8 錢，水煎服。亦作凉茶配料。



图 280　布渣叶（椴树科，破布叶属）

Microcos Paniculata L.

1.花枝；2.花；3.雄蕊；4.果枝。

灰　叶

别名　山青、野蓝。

识别特征　(1) 小灌木，高 30～60 厘米，多分枝，密被柔毛。

(2) 叶互生，奇数羽状复叶，小叶 9～17 片，小叶长约 2 厘米，宽约 0.5 厘米，倒卵形，叶脉的特点是侧脉多而密，背面有带光泽的短絲毛。

(3) 花淡紫色，总状花序与叶对生。花后结稍弯曲的豆荚，长约 5 厘米。

生长环境　喜生于村边、路旁、荒野、河边草丛中。

主产于云南、广东、广西、福建、台湾。

采集加工　药用根、茎、叶，全年可采。根，洗净切片，晒干备用。

性味功能　微苦凉。清热消滞。

主治用法　(1)胃肠胀气，消化不良，胃炎疼痛，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。(2)风热感冒，每用全草 5 錢～1 两，水煎服。(3)湿疹，皮炎，全草煎水外洗。




图 281　灰叶（蝶形花科，灰叶属）

Tephrosia purpurea (L.) Pers.

串珠酒饼(假鹰爪)

别名　酒饼叶、鸡爪果。

识别特征　(1) 亚灌木，高 1～3 米，茎枝粗糙，有灰白色皮孔。

(2) 叶互生，上面光亮，背面粉绿色，长 4～13 厘米，有香气。

(3) 花黄白色，单生于叶腋，很象鹰爪，故称“假鹰爪”。

(4) 果多个聚生，犹如串珠，长 2～5 厘米，故称“串珠酒饼”，熟时紫黑色。

生长环境　喜生于荒野坡地、旷地、山谷、林边灌木丛中。

多产于贵州、云南、广东、广西。

采集加工　药用根、叶，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能　辛微温。健脾利湿。

主治用法　(1)胃肠胀气，消化不良，肾炎水肿，支气管炎，每用干叶 5 錢～1 两，水煎服。(2)风湿筋骨痛，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。



图 282　串珠酒饼（番荔枝科，假鹰爪属）

Desmos cochinchinensis Lour.

1.花枝；2.果。

鸡　眼　草

别名　米碎草、孩儿草、三叶人字草、白斑鸠窝。

识别特征　(1) 一年生伏地草本，多分枝。茎枝纤细而柔韧，有毛。

(2) 叶互生，有小叶 3 片；小叶倒卵形，长约 1 厘米，宽约 0.5 厘米，羽状脉明显，扯断时常沿叶脉裂断而呈人字形裂口，故称“三叶人字草”。

(3) 花小，紫红色。花后结倒卵形小豆荚。

生长环境　喜生于草地、荒野、田边湿润处。全国各地均有出产。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清肝热，消积滞。

主治用法　(1)风热感冒，目赤肿痛；(2)消化不良；(3)急性肝炎。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。




图 283　鸡眼草（蝶形花科，鸡眼草属）

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.

1.植物全形；2.叶。

鸡 矢 藤

别名 皆治藤。

识别特征 (1) 藤本，长 2～3 米，茎枝圆形，揉碎后有鸡屎味，所以叫“鸡矢藤”。

(2) 叶对生，多为卵形或椭圆形，大小形状变化很大，一般长为 5～15 厘米，宽 2～6 厘米。

(3) 花白色带有紫色，钟形，为腋生和顶生圆锥花序。

(4) 果球形，直径 5～7 毫米，熟时草黄色。

生长环境 喜生于村边、河边、沟边、竹林灌木丛中。

除东北、西北外各地均产。

采集加工 药用根、茎、叶。根于秋冬采挖，洗净，切片，晒干备用。

性味功能 茎叶微甘微涩平；根苦涩微温。消食化积，化痰止咳，祛风散湿。

主治用法 (1)小儿疳积、腹胀（用茎叶）；(2)支气管炎、百日咳、肺结核的咳嗽(用茎叶)；(3)肝炎、痢疾（用根）；(4)风湿骨痛（用根）；(5)跌打损伤，毒蛇咬伤。

每用干品 1～2 两，水煎服。外用鲜品捣烂敷跌打、蛇伤。



图 284　鸡矢藤（茜草科，鸡矢藤属）

Paederia scandens (Lour.) Merr.

苦　楝

别名　翠树、金斗木、森树。

识别特征　(1) 落叶乔木，高可达 20 米。树皮有槽纹，枝条广展，幼枝有皮孔。

(2) 叶互生，多为二回羽状复叶；小叶卵形至披针形，长 3～7 厘米，先端长尖，边缘有粗齿。

(3) 花淡紫色，组成圆锥花序。果球形或椭圆形，熟时黄色。

生长环境　喜生于旷野、村边、路旁。多为栽培。

主产江南各省，陕西、山东亦有分布。

采集加工　药用果、叶、根皮、树皮。冬春采果，夏秋采叶，全年采根及皮。去粗皮，洗净，晒干，切片备用。

性味功能　苦寒，有毒。驱虫止痛。

主治用法　(1)胃痛，蛔虫腹痛，用果 1～3 錢，水煎服。(2)疖肿，用叶捣敷。(3)蛔虫症，胆道蛔虫症，用根皮、树皮（去净粗皮），3～4 錢，水煎服。

注：过量易中毒，症状为头晕、呕吐、腹痛、无力、思睡、四肢麻木等，用时需注意！



图 285　苦楝（楝科，楝属）

Melia azedarach L.

鸦　胆　子*

别名　苦参子、老鸦胆。

识别特征　(1) 灌木至小乔木，高一般 1～3 米。枝、叶和花序有黄色柔毛。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，有小叶5～11片，小叶卵状披针形，长 5～10 厘米，边缘有粗齿，两面被柔毛。

(3) 花小，暗紫色，集成圆锥花序，腋生。果卵状椭圆形，熟时黑色，干时有皱纹，内有种子一粒，尝之极苦。

生长环境　喜生于山坡、村边、路旁灌木丛、草丛中。

我国南部各地均有分布。

采集加工　药用果实、根，秋冬采集。晒干备用。根随时可采，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　极苦寒，有毒。杀虫治痢。

主治用法　(1)阿米巴痢疾，每服子仁 1 分，(约 10～15 粒)，装胶囊内，日服三次，一周为一疗程；(2)疟疾，子仁服法同上，亦可用鸦胆子根 4 錢，水煎服；(3)早期血吸虫病，子仁服法同上，但疗程要适当延长；(4)瘊子、鸡眼，先用小刀削去硬皮，以胶布保护健康皮肤，用子仁粉撒布在患处，上面再贴胶布固定。一般 8 天左右即见脱

落。或用鸦胆子油局部涂敷。

注：本品有毒，服后胃痛呕吐者多见，应注意掌握用量。



图 286　鸦胆子（苦木科，鸦胆子属）

Brucea javanica (L.) Merr.

1.果枝；2.果实。

香附(莎草)

别名　香附子。

识别特征　(1) 多年生草本，高约 20～40 厘米。茎秃净，光亮，三棱形。

(2) 叶基生，三行排列，线形，有平行脉，基部抱茎。

(3) 茎顶抽出伞形复穗状花序，棕褐色。

(4) 地下匍匐细茎，常有一至数个纺锤形或椭圆形的硬质块茎，褐色，粉质，有香气，并有须根。

生长环境　喜生于坡地、耕地、村边、路旁及草丛中。

全国各地均产。

采集加工　药用根茎，秋冬采集。洗净晒干，燎去须毛，或放入锅内炒干，撞去须毛备用。

性味功能　辛微苦溫。理气止痛，调经解郁。

主治用法　(1)神经性胃痛，腹胀，胸膈滿闷，吞酸呕吐；(2)妇女月经不调，痛经；(3)原因不明的皮肤搔痒。

每用干品 1～3 錢，水煎服。皮肤搔痒，煎水外洗。



图 287　香附（莎草科，莎草属）

Cyperus rotundus L.

1.植物下部；2.花枝。

独　脚　金

识别特征　(1) 直立，纤弱一年生草本，高8～15厘米。茎单一，少数有分枝，象脱了谷的稻穗。

(2) 叶互生，线形，向内弯曲，长约1厘米或更短。

(3) 花黄色，腋生。蒴果椭圆形。

生长环境　喜生于干旱的田野、草地、荒坡。

多见于广东、广西。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　甘淡微凉。平肝消积，清热利尿。

主治用法　小儿疳积，疳积上眼，小儿夏季热。

小儿每用干品3～5錢，水煎服。



图 288　独脚金（玄参科，独脚金属）

Striga asiatica (L.) O. Ktze.

1.植物全形；2.花。

姜　黄

别名　荒、宝鼎香、毛姜黄。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高可达1米。

(2) 叶从根茎发出，互生，两列，长椭圆形，长约20～40厘米，叶脉平行，自中脉斜出，上面绿色，背面浅绿色，光滑无毛；叶柄粗长，基部抱茎。

(3) 穗状花序，自叶鞘中抽出，花淡红色，常为先花后叶或与叶同时生出。

(4) 根茎圆柱形，块茎自根茎侧面生出，多数，肉质有鳞片；根粗壮，自根茎生出，末端膨大呈长卵形或纺锤形，即中药郁金。

生长环境　喜生于潮湿的山谷或沟旁。

主产长江以南各省区。

采集加工　药用根茎，全年可采。洗净，去须，切片，蒸熟，晒干备用。

性味功能　辛苦温。行气、破瘀、通经。

主治用法　(1)胸腹痛，腹中气胀，腹中硬块；(2)月经不调；(3)瘀血肿痛，肩臂痹痛。

每用干品8分～1钱半，水煎服。



图 289　姜黄（姜科，姜黄属）

Curcuma longa L.

1.2.植物全形；3.花（放大）。

附：郁　　金

郁金，指姜黄须根下的膨大部分，肉质，黄色，芳香。功用是活血散瘀，舒肝解郁。每用干品 1 錢半～3 錢，水煎服。



图 289-1　郁金（姜科，姜黄属）

Curcuma aromatica Salisb.

假　　蒟

别名　蛤蒟，荜拨子，猪拨菜。

识别特征　(1) 藤本，基部匍匐，上部攀援或直立，节膨大，可生不定根。

(2) 叶互生，阔卵形，长7～14厘米，宽6～13厘米，叶脉七条，靠近中脉的一对，离叶基1～2厘米处发出，上面发亮而有皱纹，揉之有胡椒味。

(3) 花小穗状花序。果球形。

生长环境　喜生于村边、路旁、村前屋后或深山沟谷。

主产于广东、广西、云南、福建。

采集加工　药用叶、果穗。叶，全年可采，阴干备用；果穗，秋末冬初采，晒干备用。

性味功能　微辛温。温中暖胃，驱风行气。

主治用法　(1)腹胀腹痛，肠炎腹泻，食欲不振，肾炎水肿；(2)风湿痛。

每用干品3～5錢，果穗5分～1錢，水煎服。牙痛可用子5錢，煎水含漱。



图 290　假蒟（胡椒科，胡椒属）

Piper sarmentosum Roxb.

酸豆(罗晃子)

别名 酸角、罗望子。

识别特征 (1) 大乔木，高可达 10 米以上。树皮暗灰色，粗糙而有纵裂。

(2) 叶互生，为偶数羽状复叶，有小叶 7～20 对，小叶片两端稍圆，长约1～2厘米，宽约 0.5 厘米。

(3) 花黄色，有紫红色线纹。荚果长条形，象一根香肠，内有种子 3～10 个，黄褐色。熟时果肉味酸可食。

生长环境 喜生于村旁、旷野。多为人工栽培。

主产于广东、广西、云南、福建。

采集加工 药用果实。3～6 月果实将成熟时采集，脱壳晒干备用。

性味功能 酸甘凉。清热解暑，消食化积。

主治用法 (1)夏季暑热，食欲不振；(2)妊娠呕吐；(3)大便干燥，小儿疳积，蛔虫症。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。民间作酸味调料和制作清凉饮料用。

注：本品含较丰富的乙种和丙种维生素。



图 291　酸豆（苏木科，罗晃子属）

Tamarindus indica L.

1. 花枝；2. 小叶（放大）；3. 荚果。

十二、清肝明目类

（适应急性结膜炎、角膜炎、视网膜炎、夜盲症等疾病）

木贼（纤弱木贼）

别名　节节草、笔管草。

识别特征　(1) 多年生草本，茎直立，高0.5～1米。

(2) 茎中空，有节，节间长2～6厘米，表面有纵棱，粗糙。叶已退化，叶鞘紧贴茎。

(3) 孢子囊穗长圆形，黄色，轮生于茎顶，呈密穗状。

生长环境　喜生于河滩、溪边、沟边潮湿地。华南各地均有分布。

采集加工　药用茎，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　甘微苦平。清肝，明目，利湿。

主治用法　(1)高血压，目赤肿痛，角膜云翳；(2)肠炎腹泻，黄疸型肝炎；(3)尿路结石。

每用干品5錢～1两，水煎服。

注：全国大部地区出产的木贼，与本品同属不同种，均可入药。




图 292　木贼（木贼科，木贼属）

Equisetum debile Roxb.

水黄连(多枝唐松草)

别名　软水黄连、软杆子。

识别特征　(1) 多年生纤细草本，高 30～40 厘米，多分枝。

(2) 叶互生，多回奇数羽状复叶，小叶倒卵圆形，中部以上稍宽，上部三浅裂或有圆齿，长 0.8～2 厘米，宽 0.6～1.8 厘米，顶生小叶较大。

(3) 花白色，集成顶生圆锥花序。果 8～14 个。

(4) 根茎短，须根细长，尝之味苦。

生长环境　生于林下、山坡阴湿处。

主产于四川、湖南、广东。

采集加工　药用全草，夏季采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　微苦凉。清肝明目。

主治用法　(1)急性结膜炎；(2)痢疾；(3)传染性肝炎；(4)化脓感染。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。




图 293　水黄莲（毛茛科，唐松草属）

Thalictrum ramosum Boivin

1.植物全形；2.花和花被片；3.果束。

谷 精 草

别名 谷精珠、鼓槌草。

识别特征 (1) 多年生矮小草本。

(2) 叶根生，近直立，线形，长 4～15 厘米，宽 0.3～0.6 厘米，有平行脉和方格状支脉。

(3) 夏秋叶丛中抽出多数细长花茎，长10～20厘米，干时扭曲；头状花序似小锣槌，小花白色。

生长环境 喜生于低洼的沼泽地、稻田边，水沟边。

长江南北都有分布。

采集加工 药用全草，或单用花头(谷精子)。秋季采收全草。除去须根及泥土，晒干扎把，或采花阴干备用。

性味功能 辛甘微温。清肝明目，祛风止痛。

主治用法 (1)结膜炎；(2)咽喉肿痛，牙痛；(3)感冒发烧；(4)头痛。

每用干品 3～4 錢，水煎服。外用煎水洗眼。

注：谷精草有许多种，外形区别不大，功效也相同，波氏谷精草是全国分布最广的一种。




图 294　谷精草（谷精草科，谷精草属）

Eriocaulon wallichianum Mart.

青葙子(青葙)

别名　野鸡冠、鸡冠苋。

识别特征　(1)一年生直立草本，高约1米。茎淡红色，有纵条纹。

(2) 叶互生，长披针形，长5～12厘米，宽3～5厘米。

(3) 顶生穗状花序，常见花序上部粉红色，下部白色。种子扁圆形，黑色，即中药的青葙子。

生长环境　生于荒地、村边、耕地上。

多产于我国长江以南各地。

采集加工　药用种子（青葙子）和全草，夏秋采集，晒干备用。

性味功能　苦微寒。种子，清肝明目；全草，清热利湿。

主治用法　(1)高血压，头晕目眩，每用子1～3钱，水煎服。(2)支气管炎，胃肠炎，皮肤湿疹，搔痒，每用干品5钱～1两，水煎服，或煎水洗湿疹、疥癣。



图 295　青葙子（苋科，青葙属）

Celosia argentea L.

1.植物全形；2.种子。

草决明(决明)

别名　假绿豆。

识别特征　(1) 一年生草本，高可达 1 米，有特殊臭气，嫩时似花生苗。

(2) 叶互生，偶数羽状复叶，有 3 对小叶，叶片倒卵形，有小尖头，基部歪斜。

(3) 花黄色，生在叶腋。荚果近四棱形，内有菱形的种子约 25 粒。

生长环境　喜生于荒地、田头、路边、村旁草丛中。

我国大部地区有分布。

采集加工　药用种子（决明子），于秋季种子近成熟时采摘荚果，晒干，除去果皮备用。

性味功能　甘淡凉。清肝明目，利水通便。

主治用法　(1)肝炎，肝硬化腹水；(2)高血压；(3)小儿疳积，夜盲，风热眼痛；(4)习惯性便秘。

每用决明子 3～5 錢，水煎服。




图 296　草决明（苏木科，山扁豆属）

Cassia tora L.

铺地蜈蚣

别名　舒筋草、龙须草、鹿角草。

识别特征　(1) 多年生蕨类植物。茎下部伏地，上部斜上，多分枝。

(2) 叶二型：营养叶绿色稍带浅黄色，线形，长 2～7 毫米；生殖叶（长孢子的叶）三角形，膜质，浅黄色，长约 1 毫米。

(3) 孢子囊穗卵圆形，生于小枝顶部。

生长环境　喜生于山沟边、山谷陡壁、山脚路边。

主产于广东、广西、福建、湖南、四川、浙江。

采集加工　药用全草，四季可采。洗净，切段，晒干，扎把备用。

性味功能　甘凉。清肝明目，祛风，止咳。

主治用法　(1) 急性肝炎，目赤肿痛；(2)风湿筋骨痛；(3)慢性咳嗽。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。




图 297　铺地蜈蚣（石松科，石松属）

Lycopodium cernuum L.

1.植物全形；2.一个孢子囊穗（放大）。

蔓　荆

别名　水稔子、白背杨。

识别特征　(1) 直立或披散灌木，高可达 3 米。枝条常蔓生，节上生根。

(2) 叶对生，常为倒卵形，长 3～7 厘米，宽 1～2 厘米，背面密被灰白色绒毛，揉碎后有香气。

(3) 花小，腋生，淡紫色。果球形，黄豆大，熟时紫黑色。

生长环境　喜生于海滨滩头、沙地草丛中。

主产于我国沿海各省。

采集加工　药用叶、种子（蔓荆子）。夏季采叶，秋季采果，洗净，晒干备用。

性味功能　辛微苦微寒，有香气。疏风散热，平肝止痛。

主治用法　(1)感冒发热；(2)偏正头痛，眼痛眩晕；(3)风湿筋骨痛；(4)消化不良，肠炎腹泻；(5)跌打肿痛。

每用种子干品 2～3 錢，叶 2～5 錢，水煎服，亦可作散剂内服。鲜叶捣烂外敷治跌打肿痛。



图 298　蔓荆（马鞭草科，牡荆属）

Vitex trifolia L.

1.花枝；2.花。

附：单叶蔓荆

单叶蔓荆与蔓荆的功用基本相同。



图 298-1　单叶蔓荆（马鞭草科，牡荆属）

Vitex rotundifolia L.

1.花枝；2.花；3.果。

十三、利水通淋类

（适应各种水肿、肾炎、尿路感染、尿路结石等疾病）

三 白 草

别名 白面姑、塘边藕。

识别特征 (1) 多年生草本，高30～70厘米。茎下部伏地，节上生根，上部直立。

(2) 叶互生，长圆状心形，长9～14厘米，宽4～7厘米，绿色，近顶部2～3片叶于花期常呈白色，故称“三白草”，叶柄基部呈鞘状抱茎。

(3) 总状花序顶生，与叶对生。果球形。

生长环境 生于村边、沟边、塘边等阴湿处。

主产于长江以南，河北、山东亦有分布。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 甘淡凉。清湿热，利小便。

主治用法 (1) 尿路感染，尿路结石，脚气水肿，肾炎水肿，白带过多，每用干品5钱～1两，或鲜品1～4两，水煎服。(2)疔疮脓肿，外用鲜品捣烂敷患处。




图 299　三白草（三白草科，三白草属）

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

1.茎的一段；2.花枝；3.花(放大)。

无　根　藤

别名　罗网藤、无头藤。

识别特征　(1) 缠绕寄生藤本。茎线形，以盘状吸根攀附于其他植物上，绿色或黄绿色，无毛或稍有毛，全株不着地。

(2) 叶退化，甚小。

(3) 花白，小，无柄。果肉质，球形，绿豆大小。

生长环境　喜生于灌木丛中。

主产于我国长江以南地区。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切段，阴干，扎把备用。

性味功能　甘微苦凉。化湿利水，消肿散瘀。

主治用法　(1)肾炎水肿，尿路结石，尿路感染；(2)肝炎，小儿肝热；(3)感冒发热，头痛；(4)多发性疖肿。

每用干品 5 錢～1.5 两，水煎服。多发性疖肿，用鲜品适量捣烂外敷或煎水洗。



图 300　无根藤（樟科，无根藤属）

Cassytha filiformis L.

1.植物的一部分；2.花蕾；3.花；4.雄蕊；
5.退化雄蕊。

木　防　己

别名　白山番薯。

识别特征　(1) 纏绕藤本，茎木质化，高可达3米左右。小枝纤细而韧，有纵线纹，密被细毛。

(2) 叶互生，卵状披针形，长3～6厘米，宽1～3厘米，两面稍有毛，基出叶脉3～5条。

(3) 花极小，黃白色，腋生或顶生。果扁圆形，蓝黑色。

生长环境　喜生于山坡低地、灌木丛或草丛中。

我国大部地区有分布。

采集加工　药用根，秋季采集。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。行水利湿，消肿止痛。

主治用法　(1)肾炎水肿，尿路感染；(2)风湿性关节炎，神经痛。

每用干品3～5錢，水煎服。




图 301　木防己（防己科，木防己属）

Cocculus trilobus (Thunb.) DC.

木　　通

别名　羊开口、野木瓜、五叶木通。

识别特征　⑴落叶缠绕木质藤本，幼枝有条纹。

⑵ 叶互生，掌状复叶，有小叶五枚，小叶倒卵形，长3～6厘米。

⑶ 花紫色，成总状花序，生于枝端。果长圆形，长8厘米，宽3厘米，熟时紫色。

生长环境　生长在向阳山地杂木林中和河沟旁。

主产于长江以南各地，陕西、河南、山东亦有分布。

采集加工　药用藤茎及果实。藤茎全年可采，刮去粗皮，洗净，切片，晒干。果实于秋后采摘，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热利水，通经活络。

主治用法　⑴尿路感染，脚气水肿；⑵风湿骨痛；⑶月经不调，乳汁不行。

每用干藤茎3～5錢，水煎服。每用果实3～5錢，水煎服，可治腰痛，腹痛。




图 302　木通（木通科，木通属）

Akebia quinata Decne.

附：三叶木通

三叶木通，即白木通、八月瓜藤，形态与木通相似，主要区别为掌状三出复叶，边全缘或有浅齿，功用基本相同。



图 302-1　三叶木通（木通科，木通属）

Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.

var. australis (Diels) Rehd.

车前草(大车前)

别名　车轮菜、錢贯草、蛤蟆叶。

识别特征　(1) 多年生草本，幼苗多少伏地。(2) 叶根生，阔卵形，下延成长柄，长 5～15 厘米，宽 3～9 厘米，基出掌状脉 5～7 条。

(3) 穗状花序，长 6～12 厘米，花细小。果卵形，长约 3 毫米，有种子 8～16 颗。

生长环境　喜生于洼地、田边、村前屋后和菜地。

产于我国大部地区。

采集加工　药用全草及种子。种子于秋季采收，全草于夏季采收，洗净，晒干备用。

性味功能　甘淡寒。清热去湿，利水通淋。

主治用法　(1)尿路感染，尿路结石，肾炎水肿，脚气水肿；(2)感冒咳嗽，支气管炎；(3)肠炎腹泻；(4)高血压。

每用干品 5 錢～1 两，种子 3～5 錢，水煎服。



图 303　车前草（车前科，车前属）

Plantago major L.

1.植物全形；2.花序；3.花(放大)。

玉龙鞭(假败酱)

别名　大种马鞭草、大兰草、假马鞭。

识别特征　(1) 多年生草本，高约 50 厘米，全株光滑，稍肉质。

(2) 叶对生，卵圆形，长 4～6 厘米，宽 2～3 厘米；边缘有锯齿，但不分裂。

(3) 花小，淡紫色，呈顶生粗长穗状花序。

生长环境　喜生于荒野、路边、村边。

分布于广东、广西。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　微苦寒。清热解毒，利水通淋。

主治用法　(1)尿路结石，尿路感染；(2)风湿筋骨痛；(3)喉炎，急性结膜炎，痈疖肿痛。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。治喉炎可用鲜品捣烂加糖含服。治痈疮肿痛可用鲜品捣烂外敷。



图 304　玉龙鞭（马鞭草科，假败酱属）

Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl.

1.花枝；2.花序轴的一段。

玉　蜀　黍

别名　包谷、粟米。

识别特征　(1) 一年生高大草本，粮食作物。秆直立，有节，基部节上生根。

(2) 叶互生，线状披针形，叶鞘边缘有长毛。

(3) 雄花序生于秆顶；雌花序生于叶腋内，圆柱状，花柱细长，絲状，黄色至红褐色即“玉米须”。种子（颖果）呈四稜形，紧密排列于玉米芯上。

生长环境　东北、华北一带大面积播种，华南地区零星种植。

采集加工　药用花柱（玉米须）和玉米芯。收玉米时将花柱摘下，晒干备用。

性味功能　甘平。利水通淋，退黄消肿。

主治用法　(1)肾炎水肿，尿路感染，尿路结石，肝硬化腹水；(2)胆道结石，胆囊炎，黄疸型肝炎；(3)糖尿病，高血压。

每用干玉米须 8 錢～1 两，玉米芯 3～5 两，水煎服。



图 305　玉蜀黍（禾本科，玉蜀黍属）

Zea mays L.

石　　韦

别名　飞刀剑、石皮。

识别特征　(1) 附生蕨类植物，高 10～30 厘米。根茎细长而横走，密被褐色鳞片。

(2) 叶基生，叶间相距 1～2 厘米，狭披针形，长 6～20 厘米，全缘，象一把尖刀，故称“飞刀剑”；上面绿色，背面有棕色毛茸。

(3) 孢子囊群满布于叶背面全部或上部。

生长环境　生于密林的树干或岩石上。

主产于长江以南地区。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，切段晒干备用。

性味功能　淡平。清热，利水，通淋。

主治用法　肾炎水肿，尿路感染，尿路结石。

每用干品 3～5 錢，水煎服。



图 306　石韦（水龙骨科，石韦属）
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.

石蟾蜍(粉防己)

别名　山乌龟、蟾酥薯、倒地棋。

识别特征　(1) 缠绕草质藤本。嫩茎通常紫红色，有扭曲的纵条纹。

(2) 叶互生，盾状着生，圆形，直径5厘米左右，两面稍有毛，背面粉白色。

(3) 花极小。果球形，熟时红色。

(4) 根圆柱形或块状，皮棕色，有横走纹理，断面粉白色。

生长环境　喜生于山坡、丘陵、灌木林缘。

我国南方大部分地区有分布。

采集加工　药用根块，全年可采。洗净，切片，晒干备用，或鲜用。

性味功能　苦辛寒，有小毒。祛风除湿，利水通淋。

主治用法　水肿，脚气，风湿性关节炎，痛风，毒蛇咬伤，痈疮肿毒。

每用干品 3～5 錢，水煎服，亦可用鲜品捣烂或干品研粉调涂蛇伤痈肿。



图 307　石蝙蜍（防己科，千金藤属）

Stephania tetrandra S. Moore

1.果枝；2.块根。

叶 下 珠

别名 珍珠草、日开夜闭、叶后珠。

识别特征 (1) 一年生草本，直立或基部平卧，一般高 10～30 厘米，基部多分枝。

(2) 叶互生，二列，长圆形或倒卵形，长 5～10 毫米，宽 2～4 毫米，先端钝急尖，背面近叶缘处有 2～3 圈短粗毛。

(3) 花小，腋生。果熟时红色，球形，生于叶腋而向下，故名"叶下珠"。

生长环境 多见于庭园、荒地、路边、菜地。长江以南各地均有生长。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，晒半干扎把，阴干备用。

性味功能 微苦甘凉。清肝明目，渗湿利水。

主治用法 (1)小儿疳积；(2)肾炎水肿，尿路感染，尿路结石；(3)肠炎腹泻。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。



图 308　叶下 珠(大戟科，叶下珠属)

Phyllanthus urinaria L.

苹

别名　田字草、四叶草。

识别特征　(1) 水生草本，根茎匍匐泥中，纤细柔弱，节上生根。

(2) 叶单生或成束，叶柄长7～20厘米，小叶4片，倒三角形，成十字形对生，似“田”字，长宽各约1厘米。

生长环境　喜生于稻田等浅水中。

产于全国各地。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，扎把，晒干备用。

性味功能　甘凉。利水消肿，安神。

主治用法　神经衰弱，水肿。

每用干品5～8钱，鲜品1～2两，水煎服。




图 309　苹（苹科，苹属）

Marsilea quadrifolia L.

苧　麻

别名　野苧麻、野麻。

识别特征　(1) 直立灌木，高 1～2 米。枝和叶柄有柔毛，茎皮有丰富的纤维。

(2) 叶互生，阔卵形，长 7～15 厘米，宽 6～12 厘米，边缘有锯齿，基出 3 脉，上面绿色，有疏毛，背面灰白色，密生绵毛。

(3) 根切断有粘液流出。

生长环境　生于山谷疏林、村边潮湿处。

全国各地都有栽培，以长江以南为多。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微苦甘凉。解热利尿，安胎止血。

主治用法　(1)感冒发热；(2)尿路感染，肾炎水肿，孕妇水肿；(3)胎动不安，月经过多。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。跌打肿痛可用鲜叶捣烂外敷。




图 310　苧麻（荨麻科，苧麻属）

Boehmeria nivea (L.) Gaudich.

1.果枝；2.叶的一角，示刺毛。

金　丝　草

别名　黄毛草、猫毛草。

识别特征　(1) 多年生草本。茎丛生，直立，高约 10～30 厘米，有 3～6 节，节上有白色柔毛。

(2) 叶互生，线状披针形，长 2～4 厘米，宽 1～3 毫米，叶鞘边缘有毛。

(3) 夏秋抽穗，有密集的金黄色的芒长毛，似猫毛。

生长环境　多生于山麓斜坡岩缝内或沟边土坎上。

主产于广东、广西。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　甘淡凉。利水通淋、清热凉血。

主治用法　(1)尿路感染，肾炎，水肿；(2)感冒高热；(3)黄疸型肝炎；(4)糖尿病。

每用干品 1～2 两，水煎服。



图 311　金絲草（禾本科，金絲草屬）

Pogonatherum crinitum (Thunb.) Kunth.

金　钱　草

别名　落地金錢、铜錢草。

识别特征　(1) 多年生草本，长 30～90 厘米。茎下部木质化，枝条常披散或伏地，全体有绒毛。

(2) 叶互生，叶片似一枚金錢，直径约 3 厘米，两端微凹，背面有灰白色长绒毛。叶脉的特点是侧脉平行。

(3) 花紫红色，长在枝顶或叶腋。花后结一个有 3～6 节的豆荚，长 1～2 厘米。

生长环境　一般生于荒地、山坡、新开垦的坡地、低矮灌木丛中。

我国南部各省均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒半干，扎把，阴干备用。

性味功能　甘淡凉。清热，利水，通淋。

主治用法　肾炎浮肿，尿路感染，尿路结石，胆囊结石，黄疸型肝炎。

每用干品 5 錢～2 两，水煎服。




图 312　金錢草（蝶形花科，山绿豆属）

Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.

1.花枝；2.花；3.荚果。

金锁匙(毛木防己)

别名　金石榄。

识别特征　(1) 缠绕藤本，全株被毛。

(2) 叶互生，披针形或卵状椭圆形，长 3～9 厘米，宽 1.3～6 厘米，基出三脉，叶柄长 0.3～1 厘米。

(3) 花极小，黄色。果扁圆形，熟时蓝黑色。

(4) 根长，圆柱形，皮黑色，横断面有车轮状花纹。

生长环境　喜生于山谷、溪边，亦见于坡地、石隙及疏林中。

主产于广东、广西、福建、贵州、云南。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热利水，祛风除湿。

主治用法　(1)咽喉肿痛；(2)肾炎水肿，尿路结石，尿路感染；(3)风湿骨痛，坐骨神经痛，跌打瘀痛。

每用干品 3～5 錢，水煎服。毒蛇咬伤，疮毒，可内服并用鲜根捣烂敷患处。



图 313　金锁匙（防己科，木防己属）

Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels.

1. 花枝；2. 花；3. 雄蕊。

海金沙藤(海金沙)

别名　吐絲草、铁线藤。

识别特征　(1) 多年生攀援草本，茎长 1～4 米。

(2) 叶为 2～3 回羽状复叶，小叶片形状不一，常有不规则浅裂；有孢子囊的叶片，分裂较深。

(3) 孢子囊群沿裂片背面叶缘排成穗状。

生长环境　喜生于路旁或干旱的山坡、丘陵灌木丛中。

多见于我国南部各地。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，切碎，晒干备用。孢子囊即中药海金沙。

性味功能　甘寒。清热，利水，通淋。

主治用法　(1)尿路感染，尿路结石，肾炎水肿；(2)感冒发热，小便短赤；(3)肠炎痢疾。

每用干品 8 錢～1 两，水煎服。




图 314　海金沙藤（海金沙科，海金沙属）

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

1.地下茎；2.地上茎及生孢子囊之叶；3.不生孢子囊之叶；4.生孢子囊之叶（放大）；5.生孢子囊叶之一部分（放大）。

猫须草(肾茶)

别名　猫须公。

识别特征　(1) 亚灌木，高 0.5～1 米。茎枝紫褐色，四方形。

(2) 叶对生，卵状披针形，长 3～12 厘米，宽 1.5～5 厘米，边缘上部有锯齿。

(3) 顶生总状花序。花淡紫色，花絲伸出花冠外达 4～6 厘米，形如猫须，故称"猫须草"。

生长环境　见于广东，多为栽培。

采集加工　药用地上部分，全年可采。切段晒干备用。

性味功能　甘淡微苦凉。清热去湿，排石利水。

主治用法　(1)急慢性肾炎，膀胱炎；(2)尿路结石；(3)风湿性关节炎。

每用干品 1～2 两，鲜品 3～4 两，水煎服。




图 315　猫须草（唇形科，直管草属）

Orthosiphon aristatus (Bl.) Miq.

淡 竹 叶

别名 山鸡米、竹叶麦冬。

识别特征 (1) 多年生草本，高 0.5～1 米，茎节明显。

(2) 叶似竹叶，披针形，长约 5～20 厘米，宽 2～3 厘米，基部浑圆，有明显的小横脉。

(3) 秋季抽穗，结颖果，纺锤形，深褐色，易粘在衣服上。

(4) 须根黄白色，亦有膨大的肉质块根，形似“麦冬”，但较小，因而也叫“竹叶麦冬”。

生长环境 喜生于山坡疏林下，较荫蔽的地方。

主产于长江以南各地及河南。

采集加工 药用枝叶或全草。夏末开花前割取嫩枝叶或连根挖出，洗净，切段，或晒半干扎把，再晒干备用。

性味功能 甘淡凉。清热利水。

主治用法 (1)主要用于各种热病，心烦口渴，小儿高热抽搐，烦躁；(2)口舌生疮，牙龈肿痛；(3)尿路炎症，小便短赤。

每用干品 1～3 錢，水煎服或配方用。



图 316　淡竹叶（禾本科，淡竹叶属）

Lothatherum gracile Brongn.

1.植物全形；2.膨大的根（略放大）。

葫 芦 茶

别名 葫芦叶、田刀柄。

识别特征 (1) 小灌木，高 1～2 米。枝常披散，三棱形。

(2) 叶互生，椭圆状披针形，通常长 5～10 厘米，有一个带翅的叶柄，形似葫芦。

(3) 花淡紫色，长在枝顶或叶腋。花后结细长有 5～8 个节的豆荚。

生长环境 生于田边、路旁、丘陵、坡地草丛中。

主产于我国南方各地。

采集加工 药用全草，夏秋采集。切碎，晒干备用。

性味功能 甘苦微凉。清热解暑，利水消滞，杀虫防腐。

主治用法 (1)制茶用于感冒发烧，咽喉肿痛，预防中暑。(2)肾炎水肿，黄疸型肝炎，肠炎腹泻，每用干品 1～2 两， 水煎服。(3)民间腌制咸鱼、肉类，放入本品可防蝇蛆。与其它药配合，杀蚊蝇。



图 317　葫芦茶（蝶形花科，山绿豆属）

Desmodium triquetrum (L.) DC.

粪箕笃

别名　三角藤、犁壁藤。

识别特征　(1) 缠绕草质藤本。茎扭曲，有条纹，全株无毛。

(2) 叶互生，三角状卵形，长 3～9 厘米，宽 2～6 厘米，先端钝或微凹；成盾状着生，掌状基出脉 10～11 条。

(3) 花小，腋生。果扁长圆形，中间微凹，熟时红色。

生长环境　喜生于村边、路旁灌木丛中。

产于我国南部。

采集加工　药用根或全草，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　苦寒。清热利水。

主治用法　肾炎水肿，尿路感染及结石。

每用干品 5 钱～1 两，水煎服。




图 318　粪箕笃（防己科，千金藤属）

Stephania longa Lour.

1.花果枝；2.果束。

露兜簕

别名　野菠萝。

识别特征　(1) 直立有刺灌木，高 1～2 米。茎有节，粗大。

(2) 叶聚生于茎顶，长披针形，硬革质，长约 1.5 米，宽 3～5 厘米，边缘及背面中脉有钩刺。

(3) 花肉穗状似菠萝。果熟时黄色，聚生，形如菠萝，有短刺，故又名“野菠萝”。

生长环境　喜生于海岸、溪边、村头、路旁。

多产于广东、广西。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。发汗解热，利水化湿。

主治用法　(1)感冒发热；(2)肾炎水肿，尿路感染；(3)肝炎。

每用干根 5 錢～2 两，水煎服。

附：本品有较强的发汗作用，用时宜注意：




图 319　露兜簕（露兜树科，露兜簕属）

Pandanus tectorius Parkins

蕹　菜

别名　鸡肉菜、辣米菜、田葛菜、塘葛菜。

识别特征　(1) 一年生矮小草本，高 20～40 厘米，近基部有分枝。

(2) 叶互生，常为卵形，长 5～10 厘米，基生叶葫芦形，羽状分裂，上部叶有粗齿。

(3) 花极小，腋生，淡黄色。长角果，纤弱，长 1.5～2 厘米。

生长环境　喜生于田野、沟边、路旁湿地草丛中。

我国南方各地均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　甘淡凉。清热利水，凉血解毒。

主治用法　(1)感冒发热，咽喉肿痛，失音；(2)肺热咳嗽，咳血；(3)急性风湿性关节炎；(4)水肿。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。




图 320　蔊菜（十字花科，蔊菜属）

Nasturtium montanum Wall.

1.植物全形；2.果(放大)。

樟柳头(闭鞘姜)

别名　白石笋、广东商陆。

识别特征　(1) 多年生直立草本，通常高 1～2 米。茎圆有节，稍带紫红色。

(2) 叶互生，椭圆状披针形，长 15～20 厘米，宽约 6～7 厘米，基部抱茎，背面密生灰色绢毛，叶鞘宽而封闭，故叫“闭鞘姜”。

(3) 花白而带红色，穗状花序顶生。

(4) 根茎横走，块状，多纤维，象姜，但无辛辣味。

生长环境　生于水沟、河边、林荫、灌木丛下潮湿处。

广东、广西、福建、台湾均有生长。

采集加工　药用根茎，秋末可采。洗去泥沙，去须根，切片，蒸熟，晒干备用。

性味功能　酸寒，有小毒（鲜品尤甚）。利水，消肿，拔毒。

主治用法　(1)肾炎浮肿，肝硬化腹水，小便不利，尿道刺痛；(2)无名肿毒；(3)荨麻疹。

每用干品 1～3 錢，水煎服。鲜品(量不拘)捣烂外敷无名肿毒。干、鲜品（量不拘）煎水外洗荨麻疹。



图 321　樟柳头（姜科，闭鞘姜属）

Costus speciosus (Koenig) Sm.

十四、散瘀化结类

（适应淋巴结核、肝脾肿大、肿瘤等疾病）

了 哥 王*

别名 南岭蕘花、地棉根、山豆了。

识别特征 (1) 直立灌木，高0.3～1米，多分枝。茎枝褐红色，皮部纤维丰富。

(2) 叶对生，矩圆形或倒卵形，长2～5厘米，宽0.8～1.5厘米；叶脉的特点是侧脉很纤细，多条。

(3) 花黄绿色，数朵组成顶生短总状花序。果长卵形，绿豆大小，熟时暗红色。

生长环境 生于村边、路旁、山坡、荒地草丛中。

主产于我国长江以南各地区。

采集加工 药用根叶。夏季采叶，春秋采根，洗净切片，经多次蒸晒去毒后备用。

性味功能 苦寒，有毒，服时久煎可减低毒性。消肿散结，清热解毒。

主治用法 (1)疔疮肿毒，跌打损伤，蛇虫咬

伤，小儿头疮，每用鲜茎叶捣烂外敷或挤汁外涂；
(2)淋巴结核，哮喘，腮腺炎，百日咳，扁桃体炎。
每用干根 3～8 錢，久煎去毒后內服。




图 322　丁哥王（瑞香科，荛花属）
Wicktroemia indica C. A. Mey.

大叶蛇泡簕(粗叶悬钩子)

别名 大破布刺、老虎泡、虎掌簕、九月泡。

识别特征 (1) 藤状灌木，枝、叶柄、花梗有钩刺，密生锈色绒毛。

(2) 叶互生，叶大，长可达5～15厘米，叶形掌状，一般有深浅不一的裂3～7个。背面密生灰白色或锈色软毛，脉上常有钩刺。

(3) 花粉红色。果球形，熟时红色，是由多个小果组成的聚合果。

生长环境 喜生于路旁、村边、灌木丛中。

主产于广东、广西、福建、湖南、贵州、云南、江西。

采集加工 药用根、叶，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能 甘淡平。活血去瘀，清热止血。

主治用法 (1)急慢性肝炎，肝脾肿大；(2)行军性血红蛋白尿；(3)乳腺炎；(4)外伤出血；(5)口腔炎。

每用干品5錢～1两，水煎服。口腔炎，煎水含漱；外伤出血，用粉末撒患处。




图 323　大叶蛇泡簕（蔷薇科，悬钩子属）

Rubus alceaefolius Poir.

白花蛇舌草

别名　蛇舌草、散草、甲猛草。

识别特征　(1) 湿生伏地草本，长约 25 厘米，茎有棱。

(2) 叶对生，线形，长 1～3 厘米，宽 1～3 毫米，近无柄。

(3) 花白色，通常一朵或成对腋生，短柄。

(4) 果小，直径约 0.2 厘米，外形象石榴。

生长环境　生于田边、休耕地、沟旁或潮湿的草地上。

主产于广东、广西、云南、福建、江苏、浙江、安徽等地。

采集加工　药用全草，夏秋采取。洗净，晒干备用。

性味功能　甘淡凉。清热解毒，活血利尿。

主治用法　(1)各种感染，如尿路感染，扁桃体炎，咽喉炎，阑尾炎；(2)急性黄疸型或无黄疸型肝炎；(3)恶性肿瘤，有的可以控制或改善症状；(4)疮疖痈肿，跌打瘀痛，毒蛇咬伤。

每用干品 1～2 两，鲜品 4～8 两，水煎服。亦可用鲜品捣烂外敷患处。



图 324　白花蛇舌草（茜草科，耳草属）

Oldenlandia diffusa (Willd.) Roxb.

附：水　线　草

水线草，亦名繖房花耳草，与本品很相似。区别是水线草稍纤弱，花2～5朵聚生于叶腋，花柄较长。两者功效基本相同，一般认为治癌以白花蛇舌草为好。分布地区以水线草为广。




图 324-1　水线草（茜草科，耳草属）

Oldenlandia corymbosa L.

半枝莲(狭叶韩信草)

别名　牙刷草、并头草。

识别特征　(1) 一年生草本，高 15～30 厘米，下部伏地。茎四棱形，不分枝或很少分枝。

(2) 叶对生，狭卵形至披针形，长 1～2 厘米，宽变化大，全缘或有疏齿。

(3) 花蓝色，二唇形，顶生的总状花序，长约 7～14 厘米，排列于花茎一侧，形似牙刷，故又称“牙刷草”。

生长环境　喜生于田边、水沟边、近水湿地。我国南方各地多有分布。

采集加工　药用全草，春夏采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能　微苦凉。清热解毒，治癌。

主治用法　(1)用以治疗癌症，见到改善症状的效果；(2)阑尾炎，肝炎；(3)毒蛇咬伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服，如有腹泻可减量。治疗癌症单用或与白花蛇舌草同用。



图 325　半枝莲（唇形科，黄芩属）

Scutellaria barbata Don

1.果枝；2.根枝；3.叶(放大)；4.花；5.果。

老鼠簕

别名　软骨牡丹。

识别特征　(1) 有刺灌木，高0.5～1.5米。茎圆柱形，光滑，淡绿色。

(2) 叶对生，质硬，光亮，多为矩圆形，长9～14厘米，边缘有深波状带刺的齿；叶柄较短，基部有一对锐利的刺，所以叫“老鼠簕”。

(3) 花唇形，淡蓝色，长约1厘米，为顶生的穗状花序。果椭圆形。

生长环境　喜生于滨海的沙滩、潮湿地。

我国南部沿海地区有分布。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片晒干备用。

性味功能　微咸凉。消肿散瘀，除痰止痛。

主治用法　(1)急慢性肝炎，肝脾肿大，淋巴结肿大；(2)胃痛；(3)哮喘。

每用干品1～2两，水煎服。




图 326　老鼠簕（爵床科，老鼠簕属）

Acanthus ilicifolius L.

莪　　术

别名　蓬莪术、臭屎姜、黑心姜。

识别特征　(1) 多年生宿根，直立草本，高可达1米左右，全株光滑无毛。

(2) 叶大，阔卵状披针形，宽达20厘米，上面中部有一条明显的紫色条纹。

(3) 穗状花序，从根茎中抽出，花黄色。

(4) 根茎粗厚，横走有节，折断后中心部分呈淡蓝色，渐渐变黑，故称“黑心姜”，具有浓烈香味。

生长环境　喜生于山沟树林下或阴湿草丛中，也有栽培。

主产于广东、广西、四川、福建、浙江、云南。

采集加工　药用根茎，秋季采集。洗净，去须，切片，晒干备用。

性味功能　辛温，气微香。行气破血，散瘀通经。

主治用法　(1)腹内包块，闭经腹痛，风湿痛，每用干品1.5～3钱，水煎服。(2)跌打肿痛，用鲜根茎捣烂炒热加酒外敷。




图 327　莪术（姜科，姜黄属）

Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc.

蒲　葵

别名　扇叶葵。

识别特征　(1) 常绿乔木，高5米左右。茎单一直立，有密环纹。

(2) 叶大，扇形，直径达1米以上，掌状深裂，裂片披针形；叶柄长达1米左右，三稜状，边缘有倒钩刺二行。

(3) 花腋生，圆锥花序长，浅黄色。

(4) 果形如橄榄，熟时黑褐色。

生长环境　为栽培之经济植物，见于我国南部地区。

采集加工　药用种子，名葵树子，秋冬采集。晒干备用。

性味功能　甘涩平。抗癌。

主治用法　用于治疗各种癌症，初步观察可以改善临床症状。

每用干品1两，水煎1～2小时服。民间常与瘦肉同煎服。




图 328　蒲葵（棕榈科，蒲葵属）

Livistona chinensis R. Br.

十五、拔毒止痒类

（适应疖、痈、癣、疥疮、皮炎、湿疹等疾病）

大飞扬（飞扬草）

别名　大乳汁草、奶子草、九歪草。

识别特征　(1) 一年生草本，高约 20 厘米，全株被毛，折断有乳汁。茎匍匐或倾斜生长，紫红色，基部分枝。

(2) 叶对生，卵形至矩圆形，长 1.5～4 厘米，宽 0.7～1.2 厘米，边缘有小锯齿。

(3) 四季腋生稠密的聚繖花序，颜色绿或紫红。果卵状，三棱形。

生长环境　喜生于荒地、路旁、村边。

主产于云南、广西、广东、湖南、江西、台湾。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　微辛酸微凉。清热解毒，祛风止痒，通乳。

主治用法　(1)肠炎，痢疾；(2)皮炎，湿疹，皮肤搔痒，脚癣；(3)产后少乳。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服；用鮮品煎水洗皮肤病。




图 329　大飞扬（大戟科，大戟属）

Euphorbia hirta L. var. typica L. C. Wheeler

1.花枝；2.花。

大 叶 桉

别名 大叶有加利。

识别特征 (1) 常绿大乔木，高5～15米。树皮粗糙，有槽纹，暗褐色，小枝淡红色。

(2) 叶互生，革质，卵状披针形，长8～18厘米，宽4～8厘米，侧脉多数，纤细且横走，揉之有香气。

(3) 花白色，腋生或侧生。果杯状，长约1.2～1.5厘米。

生长环境 我国南部、西南部都有栽培。

采集加工 药用叶，全年可采。阴干备用。

性味功能 微辛微苦平，气香。清热解毒，防腐止痒。

主治用法 (1)用于防治感冒、流感、流脑、脑炎，每用干品2～3錢，鲜品5錢～1两，水煎服。(2)丹毒，蜂窝织炎，深部脓疡，创伤感染，同上法煎水内服；同时，用15～20%溶液，局部湿敷。(3)小儿头疮，烫伤，神经性皮炎，可煎水外洗。

本品内服用量不宜过大，免致呕吐。




图 330　大叶桉（桃金娘科，桉属）

Eucalyptus robusta Sm.

附：柠　檬　桉

柠檬桉，大乔木。皮平滑，色淡白，每年脱皮一次。幼叶互生，长椭圆形，较厚，有毛，老叶卵状披针形，叶香气甚浓。功用与大叶桉基本相同，但很少作内服用。



图 330-1　柠檬桉（桃金娘科，桉属）

Eucalyptus citriodora Hook. f.

飞　机　草

别名　香泽兰。

识别特征　(1) 多年生草本，高 1～3 米，分枝少。茎枝有黄色毛茸，枝叶揉碎有香味。

(2) 叶对生，尖卵形，长 3～10 厘米，边缘有疏齿，基出三脉，两面有毛。

(3) 头状花序，花粉红色，全为管状花。

生长环境　喜生于山坡、旷野、路旁。

主产于广东、广西、云南。

采集加工　全草入药，春夏可采。

性味功能　微辛温，气香。杀虫，止血。

主治用法　(1)用鲜叶揉碎涂下肢，防止旱蚂蝗咬伤。(2)将飞机草投入水田中。沤烂一至二天后水变红，用以处理有钩端螺旋体的疫田，以防下田感染。(3)旱蚂蝗咬后流血不止，可用鲜叶揉烂涂伤口，有止血效果。




图 331　飞机草（菊科，泽兰属）

Eupatorium odoratum L.

马 缨 丹

别名 五色梅、臭草、如意花。

识别特征 (1) 灌木，高 1～2 米。茎四棱形，有散生倒钩刺。

(2) 叶对生，卵状或矩圆状卵形，长 3～9 厘米，边缘有锯齿，上面粗糙，两面有毛，叶揉碎后有臭气，故又叫“臭草”。

(3) 腋生稠密的头状花序。花高脚碟形，红色，橙色，粉红色，黄色均有，故又叫“五色梅”。果肉质球形，熟时紫黑色。

生长环境 喜生于丘陵坡地、公路两旁、村边荒地、滨海沙滩。

主产于我国华南地区。

采集加工 药用叶、根、花，全年可采。晒干备用。

性味功能 根：甘苦寒，退大热。叶：辛凉，消肿毒，止搔痒。花：甘淡凉，止血。

主治用法 (1)流感，感冒，腮腺炎，高热不退，每用干根 1～2 两，鲜根 2～4 两，水煎服。(2)肺结核咳血，每用干花 2～3 錢，水煎服。(3)皮炎，湿疹，搔痒，用新鲜枝叶煎水外洗，止痒效果好；跌打扭伤可将鲜叶捣烂外敷。




图 332　马缨丹（马鞭草科，马缨丹属）

Lantana camara L.

小飞扬(千根草)

别名　细叶飞扬草，小乳汁草。

识别特征　(1) 一年生草本，有多数纤弱匍匐茎，长达 15 厘米，通常红色，折断有乳汁。

(2) 叶对生，倒椭圆形或披针形，长约 4～8 毫米，宽 3～4 毫米，稍带蓝紫色。

(3) 花序单生或少数簇生于叶腋。果卵状三棱形，被毛。

生长环境　喜生于田边、路旁、山坡、草地湿润处。

广东、广西、湖南、江西、福建、云南、台湾等地有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　淡微酸凉。清热利湿，收敛止痒。

主治用法　(1)急性菌痢，肠炎腹泻，每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(2) 过敏性皮炎，湿疹，皮肤搔痒，用鲜品煎水外洗。

注：铺地草，亦名小乳汁草，与本品类似，只是果脊有毛可以区别。功用相同，可入药。




图 333　小飞扬（大戟科，大戟属）

Euphorbia thymifolia L.

木　芙　蓉

别名　芙蓉、醉酒芙蓉。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，通常高 2～4 米。小枝有茸毛，茎皮纤维丰富。

(2) 叶互生，阔卵形至卵圆形，宽 10～20 厘米，掌状 3～5 裂，裂片三角形，背面有茸毛，边缘有钝齿。

(3) 花粉红色，大，单瓣或重瓣，单生于枝端。

(4) 果球形，直径2.5厘米，有五条棱，被长毛。

生长环境　多为栽培。

产于我国南部。

采集加工　药用叶、花，全年可采。晒干备用或鲜用。

性味功能　辛平，无毒。清热解毒，散瘀止血。

主治用法　(1)疔疮痈肿，乳腺炎，蛇咬伤，跌打扭伤，用鲜叶和花捣烂外敷患处，亦可晒干研粉，酒、醋、浓茶调涂。(2)月经过多，白带，久咳吐血，每用干花 10 朵，水煎服。



图 334　木芙蓉（锦葵科，木槿属）

Hibiscus mutabilis L.

乌　　桕

别名　白乌桕、檳白树。

识别特征　⑴乔木，高可达5米，有白色乳汁，树皮暗灰色有纵裂纹。

⑵ 叶互生，菱形或菱状卵形，长宽几乎相等，约3～8厘米，背面粉绿色。叶柄顶端有两个腺体。

⑶ 花极小，集成穗状花序。果卵形，直径1厘米左右，裂开分三瓣。种子黑色，外有蜡质。

生长环境　生于坡地、村边、路旁、山谷疏林等近水和阳光充足地方。

我国大部地区都有野生。

采集加工　药用根、皮、叶，全年可采。根皮洗净，切碎，晒干备用。叶多为鲜用。

性味功能　苦微溫，有小毒。清热利湿，拔毒消肿。

主治用法　⑴水肿，大小便不利，每用干根、皮1～3錢，水煎服。⑵痈疮，乳腺炎，蛇咬伤，每用鲜叶适量捣烂外敷患处。⑶疥癣，湿疹，皮炎，煎水洗。




图 335　乌桕（大戟科，乌桕属）

Sapium sebiferum (L.) Roxb.

1.花枝；2.果枝。

火殃簕

别名　霸王鞭。

识别特征　(1) 肉质植物，有白色乳汁。老枝圆柱形，有 3～6 棱；小枝绿色，有 3～5 个肥厚的翅边，在翅的凹陷处有利刺一对。

(2) 叶生于翅边上，倒卵形，长 3～8 厘米，少而早落。

生长环境　多为栽培，当绿篱用。亦有野生。广东、广西、云南、贵州有分布。

采集加工　药用茎，全年可采。采后去青皮，切片，炒透至焦黄，备用。

性味功能　苦寒，有微毒。去湿热，消肿拔毒。

主治用法　(1)急性胃肠炎，每用 1～2 錢，水煎服。(2)恶疮痈肿，用茎适量捣烂外敷。(3)疥癣、皮肤病，用汁外涂。




图 336　火殃簕（大戟科，大戟属）

Euphorbia antiguorum L.

仙　人　掌

识别特征　(1) 耐旱肉质有刺植物，常丛生呈灌木状，高 0.5～2.5 米。茎下部稍木质，叶状枝近圆柱形，分节，每节扁平肉质，刺常密集簇生，刺下有刺毛。

(2) 叶退化成鳞片状，生于刺束之下。

(3) 花黄色，单生或数朵聚生于顶节的边缘。浆果肉质，卵形，直径 5～7 厘米，熟时紫红色，有刺毛。

生长环境　生于村边、路旁等坡地，以海滨沙滩地常见。

主产于我国南方各地。

采集加工　药用全株，全年可采。鲜用或切片烘干用。

性味功能　苦凉。消肿解毒，消炎止泻。

主治用法　(1) 腮腺炎、乳腺炎（乳痈），疖疮痈肿，蛇伤，用鲜品去刺捣烂外敷。(2)心胃气痛，急性菌痢，每用鲜品 1～2 两，水煎服。




图 337　仙人掌（仙人掌科，仙人掌属）

Opuntia dillenii (Ker.-Gawl.) Haw.

过塘蛇(水龙)

别名　枇杷菜、鱼鳔草。

识别特征　(1) 浮水草本。茎下部匍匐，上部浮于水面，长可达 2～3 米，节上生絲状根，漂浮于水中，每节上有鱼鳔样的白色囊状浮器。

(2) 叶互生，倒卵形或长圆状倒卵形，长 1.5～5 厘米，宽 1～1.5 厘米。

(3) 花单生于叶腋，白色，有长柄。果长圆柱形，有 4～8 棱。

生长环境　生于水边、池塘、水沟中。

产于我国南部。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用或鮮用。

性味功能　甘淡凉。清热利尿，凉血解毒。

主治用法　(1)感冒发热，燥热咳嗽，小便淋浊；(2)痈疮，跌打，蛇伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。外用鮮品捣烂敷痈疮，跌打，蛇伤。




图 338　过塘蛇（柳叶菜科，水龙属）

Jussiaea repens L.

1.植物全形；2.花，示雌蕊；3.雄蕊(放大)，示正面；4.雌蕊(放大)，示背面。

红乌桕(山乌桕)

别名 山柳、红叶乌桕、红心乌桕。

识别特征 (1) 灌木至乔木，高3～12米。嫩枝和嫩叶红色，故称“红乌桕”，小枝灰褐色有皮孔。

(2) 叶互生，椭圆状卵形，长3～10厘米，宽2～5厘米，叶柄顶端有2个腺体。

(3) 花序顶生。果球形，熟时黑色，直径1～1.5厘米。

生长环境 喜生于山谷或山坡疏林中。

广西、广东、安徽、浙江、云南、四川、福建、台湾等地均有分布。

采集加工 药用根皮、叶，全年可采。洗净，晒干备用或鲜用。

性味功能 苦涩寒，有小毒。散瘀，消肿，利尿。

主治用法 (1)跌打扭伤，痈疮，毒蛇咬伤；(2)大便秘结，小便不利，腹水。

每用干根皮3～5錢，水煎服。外用鲜叶捣烂敷患处。




图 339　红乌桕（大戟科，乌桕属）

Sapium discolor (Champ.) Muell.-Arg.

1.花枝；2.果枝。

杠板归(贯叶蓼)

别名　老虎脷、蛇倒退、犁头刺。

识别特征　(1) 多年生攀援草本。茎有棱，紫红色，有钩刺。

(2) 叶互生，三角形，长 3～10 厘米，叶柄成盾状着生；边缘、背脉及叶柄上常有小钩刺；托叶叶状，茎从中贯穿，所以又叫“贯叶蓼”；叶嚼之有酸味。

(3) 花白色或淡红色。果球形，熟时黑色，有光泽。

生长环境　喜生于村边、坡地、路旁、溪边、草地或灌木丛中。

全国各地均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　酸凉。清热去湿，拔毒止痒。

主治用法　感冒发热，肠炎腹泻，化脓感染，毒蛇咬伤。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。亦用干粉撒布或煎水洗烫伤、皮炎、湿疹。



图 340　杠板归（蓼科，蓼属）

Polygonum perfoliatum L.

1.单叶；2.果枝；3.花枝；4.花；5.花展开示雄蕊。

扶　　桑

别名　佛桑、朱槿、大红花。

识别特征　(1) 直立多分枝灌木，高通常 2～4 米。

(2) 叶互生，卵形或狭卵形，长 7～10 厘米，边缘有粗齿。

(3) 全年开红色花，单生于上部叶腋，直径可达 10 厘米，有时有重瓣，故称“大红花”。果卵形。

生长环境　各地都有栽培。

采集加工　药用花、根、叶。根、叶，全年可采，根，洗净切片晒干；花，春夏采集，晒干备用。

性味功能　甘平。解毒消肿，清热利水。

主治用法　(1)腮腺炎，急性结膜炎，尿路感染，白带。每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(2)治疔疮痈肿毒，外用鲜叶捣烂敷患处。



图 341　扶桑（锦葵科，木槿属）

Hibiscus rosa-sinensis L.

岗　　松

别名　羊胰木、铁扫把、石松草。

识别特征　(1) 小灌木，高达 1～2 米。民间常用作扫帚，全株揉之有香气。

(2) 叶对生，线形，长 0.5～1 厘米，两面绿色，仅有中脉 1 条。

(3) 花白色，单生于叶腋。果极小。

生长环境　生于荒山干旱的坡地。

福建、广东、广西、江西多见。

采集加工　药用全草，全年可采。采后，洗净，晒干备用。

性味功能　辛温气香。祛风除湿，行气止痛。

主治用法　(1)风湿筋骨痛、胃痛腹胀，肠炎腹泻，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。(2)脚癣，皮肤搔痒，用全草煎水熏洗。



图 342　岗松（桃金娘科，岗松属）

Baeckea flutescens L.

1.花枝；2.单叶；3.花。

虎耳草

别名 金线吊芙蓉、石荷叶、絲绵吊梅。

识别特征 (1)多年生伏地草本，全株被毛。茎生匍匐枝，细长如絲，红紫色，落地后又生新苗，故称"金线吊芙蓉"。

(2) 叶肉质，心状圆形，边缘波浪形而具钝齿，上面叶脉带白纹，背面带红色。

(3) 花白色，五瓣。蒴果卵圆形。

生长环境 喜生于山谷、溪边、林下阴湿的石隙中，亦有栽培。

我国南方大部分地区有分布。

采集加工 药用全草，全年可采。采后，洗净，晒干备用或鲜用。

性味功能 苦辛寒，有小毒。祛湿消肿，凉血止血，清热解毒。

主治用法 (1)外伤出血，疖肿，脓肿，用鲜品捣烂外敷。(2)急慢性中耳炎，用鲜品捣烂榨汁滴耳。




图 343　虎耳草（虎耳草科，虎耳草属）

Saxifraga stolonifera Merrb.

虾 钳 菜

别名 白花仔、节节花。

识别特征 (1) 伏地草本，长 20～60 厘米。茎细长，多分枝，紫红色，有纵条纹，节上密生柔毛，着地节上生根。

(2) 叶对生，椭圆状披针形，长约 1～3 厘米。

(3) 每叶腋内开白色小花，聚集成球形的头状花序，长约 0.5 厘米。

生长环境 生于田基、路边、旷野草丛中。

长江以南各省均有分布。

采集加工 药用全草，春夏采集。洗净，晒干备用。

性味功能 淡凉。拔毒止痒。

主治用法 主要用于湿疹、皮炎、癣疥，煎水外洗。




图 344　虾钳菜（苋科，虾钳菜属）

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex Schult.

1.植株一部分；2.花(放大)。

热痱草(石荠苎)

别名　假鱼香。

识别特征　(1) 一年生草本，高 20～50 厘米。茎方形，多分枝，揉碎后有香味。

(2) 叶对生，卵形，长 1～4 厘米，宽 1～2 厘米，边缘有尖齿，两面有金黄色透明腺点。

(3) 花小，淡红色；二唇形，集成花轮，再排成间断的总状花序。果小，圆形。

生长环境　喜生于沟边、路旁、田埂、村边的湿润草地上。

产于我国大部地区。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，扎把晒干。

性味功能　辛温。散风止痒，祛风发表。

主治用法　(1)感冒发热，每用干品 2～4 钱，水煎服。(2)皮肤湿疹，搔痒，热痱，煎水外洗。



图 345　热痹草（唇形科，石荠䓗属）

Orthodon diantherus (Buch.-Ham.) Hand.-Mazz.

附：狭叶荠蓼

狭叶荠蓼，也叫热痱草、红花月味草，与石荠蓼功用基本相同。




图 345-1　狭叶荠苨（唇形科，石荠苨属）

Orthodon lanceolatum (Benth.) Kudo

倒 地 铃

别名 包袱草、风船葛、天灯笼。

识别特征 (1) 多年生草质藤本。茎有纵条纹，卷须纤细。

(2) 叶互生，二回三出复叶，小叶卵形或卵状披针形，边缘有粗大锯齿，叶长约 5～8 厘米，宽 1.5～2.5 厘米。

(3) 花白色，花序柄下有 2 条卷须。蒴果，膜质，膨大如灯笼，内有两个球形黑色种子，故称"天灯笼"。

生长环境 喜生于村边、荒地、灌木丛下。多见于华南。

采集加工 药用全草，夏秋采集。晒干备用。

性味功能 苦微辛凉。消肿止痛，凉血解毒。

主治用法 跌打外伤，疮疖痈肿，湿疹。

每用干品 3～5 錢，或鲜品 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜品捣烂敷患处或煎水外洗。



图 346　倒地铃（无患子科，倒地铃属）

Cardiospermum halicacabum L.

1.植物一部分；2.萼片及花瓣；3.示雄蕊着生位置；4.雄蕊；5.雌蕊；6.花蓇。

黄花蒿

别名 草蒿、臭蒿。

识别特征 (1) 一年生草本，高约1米。茎枝纤细，揉碎后有强烈香气。

(2) 叶互生为多回羽状复叶，裂片极细，线形。

(3) 头状花序小球形，花黄色，盛开时，花朵几乎布满全株。

(4) 果小，锥形，无毛。

生长环境 生于村边、路旁、荒地。

全国各地均有出产。

采集加工 药用嫩茎叶，全年可采（北方在6～9月采）。晒干、扎把备用。

性味功能 辛苦凉。解热健胃，驱风止痒。

主治用法 (1)结核潮热，盗汗，消化不良，每用干品2～4錢，水煎服。(2)疥癣，皮肤湿痒，可煎水外洗。(3)点燃可熏蚊子。



图 347　黄花蒿（菊科，艾属）

Artemisia annua L.

黄花母(白背黄花稔)

别名　黄花猛。

识别特征　(1) 多分枝小灌木，高约0.5～1米。枝有短绵毛，皮纤维丰富。

(2) 叶互生，长圆状披针形或菱形，长3～5厘米，上面绿色，背面灰白色，有短绵毛，边缘有疏齿。

(3) 花五瓣，黄色，多单生于叶腋内。

生长环境　多生于路旁、村边、荒地。

多见于我国长江以南各地。

采集加工　药用全株，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能　甘辛凉。疏风解表，散瘀拔毒。

主治用法　(1)流感，感冒，扁桃体炎，肠炎，菌痢，每用干品5錢～1两，水煎服。(2)癣疽疔疮，外用鲜叶捣烂敷患处。



图 348　黄花母（锦葵科，黄花稔属）

Sida rhombifolia L.

断肠草*（钩吻）

别名　胡蔓藤、大茶药、大炮叶。

识别特征　(1) 木质藤本，长 3～5 米。茎圆柱形，光滑，小枝条有细纵纹。

(2) 叶对生，卵状披针形，长 5～12 厘米，宽 2～6 厘米，先端渐尖，基部钝圆，两面光滑。

(3) 花喇叭形，长约 2 厘米，黄色(内有淡红色斑点)，有香气。聚伞花序顶生。果长圆形，长 1.5 厘米。

生长环境　喜生于潮湿肥沃的山坡、丘陵、村旁、路边的草丛或灌木丛中。

主产于广东、广西、浙江、福建、云南、贵州。

采集加工　药用根、叶，全年可采。多为鲜用。

性味功能　苦辛温，有剧毒。消肿拔毒，杀虫。

主治用法　(1)疔疮肿毒，疥癣，用鲜叶捣烂外敷或煎水洗患处。(2)除四害，杀虫蛆。

注：断肠草有大毒，尤以嫩叶毒性最强，含多种钩吻碱。中毒后的症状是：眩晕，视物模糊，瞳孔散大，呼吸麻痹全身肌肉松弛，剧烈的腹痛，胃肠道出血，严重的可致死。抢救的方法，应当立即采取综合治疗，早期要洗胃，保温，人工呼吸，使用兴奋药。因此在采药中要特别注意认清，不要误作其它药物使用，生药不能内服，只作外用。



图 349　断腸草（马錢科，胡蔓藤属）

Gelsemium elegans Benth.

黑 面 神

别名 铁甲将军、夜兰茶。

识别特征 (1) 灌木，高 1～1.5 米，枝条常带红褐色。

(2) 叶互生，革质，有短柄，多为阔卵形；上面深绿色，背面粉绿色，干燥后变黑，故称“黑面神”。

(3) 花单生或 2～4 朵，生于叶腋内。果球形，直径 6 毫米，藏于宿存的盘状花萼内，很特殊，易于识别。

生长环境 性耐旱，喜生于山坡、丘陵、村边。

浙江、福建、广东、广西、云南、贵州均有出产。

采集加工 药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用；叶，多为鲜用。

性味功能 微苦凉。清热散毒，化瘀消滞，收敛止痒。

主治用法 (1)急性胃肠炎；(2)扁桃体炎，咽喉炎；(3)皮肤湿疹，过敏性皮炎，皮肤搔痒，烫伤。

每用干根 5 錢～1 两，水煎服。

外用鲜叶捣烂取汁涂湿疹、皮炎、搔痒及烫伤。



图 350　黑面神（大戟科，黑面神属）

Breynia fruticosa (L.) Hook. f.

雾水葛

别名 赘脓膏。

识别特征 (1) 多年生草本，多分枝，披散或伏地，高30～60厘米，多少有毛。

(2) 叶互生，椭圆形，长1.5～4厘米，宽0.5～2厘米，两面有毛，基出三脉。

(3) 花腋生，密集成团，淡绿色或紫色。

(4) 根肉质，纺锤形，捶烂有粘滑感。

生长环境 生于荒地、路旁、灌木或疏林下。

湖北、广西、广东、福建、湖南等地均有分布。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，晒干，扎把备用或鲜用。

性味功能 甘淡凉。凉血去湿，拔脓解毒。

主治用法 (1)尿路感染，肠炎，痢疾，疖肿，乳痈，每用鲜品1～2两，干品5钱～1两，水煎服。(2)疖肿可同时取鲜品捣烂敷患处。




图 351　雾水葛（荨麻科，雾水葛属）

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn.

1.植物之一部分；2.雌花(放大)；3.雄花(放大)。

蓖　麻

别名　大麻子、红蓖麻。

识别特征　(1) 亚灌木，一般高 1～2 米。茎中空，幼嫩部分密被白粉。

(2) 叶互生，直径 20～50 厘米，掌状 5～7 深裂，边缘有锯齿，齿尖有腺体。

(3) 花小，集成总状花序。果球形，直径 1～2 厘米，表面有软刺，内含种子三枚，平滑有花纹。

生长环境　全国皆有栽培，亦有野生。

采集加工　药用叶、根。夏秋采叶，冬季采根，洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛苦寒，有小毒。清热利湿，消肿拔毒。

主治用法　(1)疮痈肿毒，乳腺炎，用叶捣烂敷患处；疥癣搔痒，可煎水外洗。(2)风湿骨痛，跌打瘀痛，每用干根 3～4 钱与它药配伍，水煎服。




图 352　蓖麻（大戟科，蓖麻属）

Ricinus communis L.

1.果枝；2.雌花。

漆大姑(毛果算盘子)

别名　毛漆、漆大伯。

识别特征　(1) 灌木，高2～3米。枝密，被淡黄色长柔毛。

(2) 叶互生，卵形或卵状披针形，长5～10厘米，宽1.5～4厘米，先端渐尖，基部浑圆，两面被长柔毛。

(3) 夏季开花，2～4朵簇生或单生于叶腋内。果卵形，稍扁，有五棱，直径约1厘米，密被长柔毛，故称“毛果算盘子”。

生长环境　生于山谷、疏林下或山脚灌木丛中。

福建、广东、广西、贵州、云南、台湾等地均有出产。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用；叶，晒干用或鲜用。

性味功能　淡涩平。解漆毒，祛湿止痒，收敛止泻。

主治用法　(1)漆树过敏，水田性皮炎，皮肤搔痒，剥脱性皮炎，荨麻疹，湿疹，鲜用或干叶煎水外洗。(2)肠炎，痢疾，每用干根1～2两，水煎服。




图 353　漆大姑（大戟科，算盘子属）

Glochidion eriocarpum Champ.

1.果枝；2.雄花；3.雌花。

十六、外　伤　类

（适应跌打伤、扭挫伤、创伤、骨折等疾病）

九节茶（草珊瑚）

别名　接骨莲。

识别特征　(1) 常绿小灌木，高可达1米余，光滑无毛。茎单生或丛生，绿色，节膨大成膝状。

(2) 叶对生，有短柄，椭圆形至卵状披针形，长6～15厘米，中部以上有疏齿，齿硬而向叶背反卷。

(3) 枝顶开黄绿色小花，芳香，集成穗状花序。结球形小果，熟时红色。

生长环境　喜生于山沟溪谷边、疏密林中之潮湿地带。

主产于长江以南各地。

采集加工　药用全株，全年可采。切段，阴干备用，或鲜用。

性味功能　苦平。活血，散瘀，接骨。

主治用法　(1)跌打骨折，风湿性关节炎，腰腿痛，每用干品5～8錢，鲜品1～2两，水煎服。亦可用鲜品捣烂或干品研粉配成散剂，调酒敷患处。(2)叶煎水治劳伤咳嗽。




图 354　九节茶（金粟兰科，草珊瑚属）

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

1.果枝；2.果；3.花；4.雄蕊。

大罗伞(朱砂根)

别名　凤凰翔、大凉伞、凤凰肠。

识别特征　(1) 常绿直立小灌木，高0.6～1.5米。

(2) 叶互生，长椭圆形，长3～10厘米，宽1.5～3厘米，边缘有波状钝齿，齿间有黑色腺点。

(3) 花白色或粉红色，顶生或腋生。果球形，黄豆大，熟时红色。

(4) 根柔软，肉质，表面稍带红色，断面有小血点，故又称“朱砂根”。

生长环境　生于山谷林下、溪边、村边的荫蔽潮湿灌木丛中。

主产于我国南部各地。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切段，晒干用；叶鲜用或晒干用。

性味功能　苦辛温。活血去瘀，消肿止痛。

主治用法　跌打肿痛，外伤骨折，风湿骨痛，胃痛。

每用干品5钱～1两，水煎服。亦可用鲜叶捣烂敷患处。一般多研粉为散，内服或配成散剂作跌打骨折的外敷药。



图 355　大罗伞（紫金牛科，紫金牛属）

Ardisia crenata Sims

大驳骨(黑叶爵床)

别名　鸭公青、十月青、大驳骨丹。

识别特征　(1) 常绿灌木，高 1～2 米。茎粗壮，节显著膨大，呈膝状。

(2) 叶对生，厚革质，无毛，椭圆形，长 5～12 厘米，先端尖，稍钝。

(3) 花白色，唇形，有红斑，形成顶生的穗状花序，长 7～10 厘米。每花都有卵形的叶状苞片两枚，沿花梗排列得很整齐。

生长环境　多为栽培。

见于华南地区。

采集加工　药用茎、叶，全年可采。切段，晒干备用。

性味功能　微酸辛平。祛风湿，理跌打。

主治用法　(1)骨折，跌打扭伤，风湿性关节炎，创伤红肿；(2)肋间神经痛。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。同时用鲜品捣烂或干品研粉，酒醋调敷患处。




图 356　大驳骨（爵床，接骨草属）

Gendarussa ventricosa (Wall.) Nees

飞龙掌血

别名　溪椒、血见飞、簕钩。

识别特征　(1) 藤状灌木，高达 2～3 米，枝上有明显的皮孔及下弯钩刺。

(2) 叶互生，为指状三小叶，叶柄长 1～2 厘米；小叶长椭圆形，长 4～7 厘米，宽 1.3～2 厘米，背面主脉有刺。

(3) 花小，腋生。果扁球形，如黄豆大，果皮有多数油点，熟时黄色，尝之有辣味稍甜。

生长环境　喜生于山野路旁、山地疏林、沟边，灌木丛中。

主产于长江以南，陕西亦见。

采集加工　药用根、皮、茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛甘微苦温。祛瘀，止痛。

主治用法　(1)风湿肿痛，外伤疼痛，肋间神经痛，每用干根皮 4～6 錢，水煎服，亦可浸酒内服。(2)疖疮肿毒，用叶捣烂外敷。




图 357　飞龙掌血（芸香科，飞龙掌血属）

Toddalia asiatica (L.) Lam.

小罗伞(百两金)

别名　珍珠伞、矮茶。

识别特征　(1) 常绿直立小灌木，高1米左右。

(2) 叶互生，披针形至广披针形，长5～12厘米，全缘或有微波状齿，齿间有黑色腺点。

(3) 花紫红色。果球形，熟时红色。

(4) 根稍肉质，表面褐色。

生长环境　喜生于山沟、山坡、路边、沟旁、林荫下或灌木丛中。

产于长江以南各地。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干；叶，晒干备用。

性味功能　苦辛平。清咽利喉，散瘀消肿。

主治用法　(1)咽喉肿痛；(2)跌打损伤，风湿骨痛。

每用干品5钱～1两，水煎服；亦可用鲜叶捣烂敷跌打损伤，疖肿。



图 358　小罗伞（紫金牛科，紫金牛属）

Ardisia crispa (Thunb.) A. DC.

小驳骨(裹篱樵)

别名　小驳骨丹、百节芒、接骨草。

识别特征　(1) 灌木，高 0.5～1 米左右。茎节呈膝状膨大，有的紫褐色，有的绿色。

(2) 叶对生，有短柄，披针形，长 4～14 厘米，宽 1～2 厘米，先端渐尖。

(3) 花白色或粉红色，唇形，每花有一对小苞片，形成一个顶生或腋生的穗状花序。

生长环境　喜生于阴湿处，多栽培作为绿篱。

见于广东、广西。

采集加工　药用全株，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　微酸辛平。祛风湿，理跌打。

主治用法　(1)骨折，跌打扭伤，风湿性关节炎，每用干品 1～2 两，水煎服，同时用鲜品捣烂或干品研粉酒醋调敷患处。(2)无名肿毒，可用鲜品捣烂敷患处。




图 359　小驳骨（爵床科，接骨草属）
Gendarussa vulgaris Nees

山大颜(九节)

别名 山大刀、大丹叶、刀伤木、九节木。

识别特征 (1) 灌木，高2米左右。茎近方形，老时变圆光滑；枝有明显的节，故又叫“九节木”。

(2) 叶对生，革质，光滑无毛，卵状长圆形，长8～12厘米，宽2～7厘米。

(3) 花浅绿或白色，腋生或顶生。果小，球形，熟时红色，半透明。

生长环境 喜生于村边、丘陵、灌木丛中。主产于我国东南各省。

采集加工 药用根、叶，全年可采。根洗净，切片晒干，叶晾干，备用。

性味功能 苦凉。清热解毒，祛风去湿，接骨生肌。

主治用法 (1)感冒发热，扁桃体炎，咽喉肿痛，白喉；(2)风湿骨痛，腰肌劳损，胸中滞痛；(3)跌打损伤，骨折；(4)毒蛇咬伤；(5)疮疡肿毒，久不收口的慢性溃疡。

每用干品1～2两，水煎服。外用鲜品适量煎水外洗，或捣烂敷患处；将根叶研粉，酒醋调敷患处，治疗骨折。




图 360　山大颜（茜草科，九节木属）

Psychotria rubra (Lour.) Poir.

1.果枝；2.花。

千　打　锤

别名　铁线树、白胶木。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高约6米。分枝多，小枝柔软，木质较硬。

(2) 叶互生，卵形或椭圆形，长5～10厘米，宽2～4厘米，离基三出脉。背面有金黄色绢毛。

(3) 花小，腋生。果球形，干时黑色，直径约0.7厘米。

(4) 根膨大成纺锤形，有浓香气。

生长环境　生于杂木林、山谷、疏林中。

主产于广东、广西。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　辛温气香。行气止痛，散瘀消肿。

主治用法　跌打肿痛，风湿骨痛，胃肠胀气。

每用干品3～5錢，鲜品5錢～1两，水煎服。




图 361　千打槌（樟科，山胡椒属）

Lindera chunii Merr.

牛　耳　枫

别名　老虎耳、岭南虎皮楠。

识别特征　(1) 灌木，高 1～5 米。

(2) 叶互生，密集，矩圆形，长 10～15 厘米，宽 4～9 厘米，背面粉绿色；叶柄长 3～15 厘米，常带紫色。

(3) 花腋生。果卵圆形，表面有一层白粉。

生长环境　生于路旁、水沟边、山坡。

主产于江西、广东、广西。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切片，晒干备用；叶多为鲜用。

性味功能　苦涩凉。清热解毒，活血散瘀。

主治用法　感冒发热，扁桃体炎，脾脏肿大，毒蛇咬伤，骨折。

每用干根 3～5 錢，鲜根 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜叶适量捣烂敷蛇伤或骨折。



图 362　牛耳枫（交让木科，交让木属）

Daphniphyllum calycinum Benth.

1.雄花枝；2.雄花；3.果序。

白　花　丹*

别名　白雪花、一见消。

识别特征　(1) 亚灌木。枝条常下弯，高 1～3 米，多分枝。茎圆柱形，常有纵棱。

(2) 叶互生，卵状披针形，长 4～7 厘米，宽 3～5 厘米，全缘或微波形，叶柄基部抱茎。

(3) 花高脚碟形，白色，或略带蓝色，集成顶生的穗状花序，特点是萼管有粘毛，具有粘性。

生长环境　喜生于山坡、村边、路旁阴湿的灌木丛中，亦有栽培。

产于我国南部各地。

采集加工　药用根、叶，全年可采。根，洗净，切段，晒干备用；叶，多鲜用。

性味功能　根：苦凉；叶：辛辣有毒。祛风除湿，散瘀消肿。

主治用法　(1)风湿骨痛，陈旧性关节扭伤，肝脾肿大，心胃气痛，每用干根 3～5 錢，水煎服。(2)跌打扭伤，蛇咬伤，恶疮，每用鲜叶 3～4 片与它药配合捣烂外敷，一般敷 15～30 分钟除去，以免局部起泡。

孕妇禁服。



图 363　白花丹（兰雪科，兰雪属）

Plumbago zeylanica L.

1.花序；2.叶枝。

白 薯 莨*

别名 山仆薯、山薯、板薯。

识别特征 (1) 草质藤本。茎长一般十余米，有锐刺。

(2) 叶互生，为指状三小叶，顶生小叶近菱形，长8～20厘米，宽约10厘米，侧生小叶较小，歪斜，中脉偏向外侧。

(3) 花单性，极小。果有3个膜质的翅。

(4) 块茎多圆球形，大的常有分枝，粉质，白色或黄色。

生长环境 喜生于山坡、旷野疏林下，或山谷潮湿的灌木丛中。

广东、广西、福建、云南均有分布。

采集加工 药用块茎，全年可采。采后埋入潮湿的沙土中备用，或洗净切片晒干备用。

性味功能 甘涩凉，有毒。解毒消肿，去瘀止血。

主治用法 主要用于痈疽、恶疮，跌打扭伤。

用鲜品（量不拘）捣烂敷患处或煎水外洗。



图 364　白薯莨（薯蓣科，薯蓣属）

Dioscorea hispida Dennst.

尖　尾　枫

别名　尖尾风。

识别特征　(1) 灌木至小乔木，高 2～5 米，小枝四棱形。

(2) 叶对生，常为披针形，长 10～20 厘米，宽 2～5 厘米，边缘有细齿，尝之辣口。

(3) 花小，紫红色，集成顶生或腋生的聚伞花序。果小，扁球形。

生长环境　生于山坡、灌木丛中。

多产于广东、广西、福建、四川、江西。

采集加工　药用叶，阴干备用或鲜用。

性味功能　辛温辣，气香。行气活血，祛风消肿。

主治用法　跌打损伤，骨折，风湿性腰腿痛，毒蛇咬伤，每用干叶研粉配他药外敷，亦可用鲜叶适量捣烂外敷。



图 365　尖尾枫（马鞭草科，紫珠属）

Callicarpa longissima (Hemsl.) Merr.

红丝线(山蓝)

别名　红蓝、观音草。

识别特征　(1) 小灌木，枝条披散，高约 0.5～1 米。老茎灰白，嫩茎绿色，节明显膨大，呈膝状，且能着地生根。

(2) 叶对生，尖卵形，两面有毛，揉烂后放在开水中片刻即有红色线条出现，稍久，水全部变红。

(3) 花近唇形，紫蓝色，长在叶腋或枝顶，每花有一对不等大的尖卵形叶状苞片，长约 2 厘米。

生长环境　多为栽培，亦有野生于山坡、荒地、路旁。

我国南方各省均有分布。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能　淡凉。散瘀，止血。

主治用法　(1)跌打瘀肿，急性扭挫伤；(2)内伤咳血。

每用干品 5 錢～1 两，鲜品 1～2 两，水煎服。外用鲜品适量捣敷患处。



图 366　红絲线（爵床科，观音草属）

Peristrophe roxburghiana (Schult.) Bremek

羊角扭*

别名 羊角藕、羊角拗。

识别特征 (1) 直立或攀援状灌木。高达2米，全株有乳汁。茎猪肝色有白色皮孔。

(2) 叶对生，长圆形，长5～10厘米，宽3～4厘米。

(3) 花黄白色。果双生叉开，如一对羊角，故称“羊角扭”，种子顶部有絲状白色长毛。

生长环境 生于荒野、坡地、疏林下或灌木丛中。

产于广东、广西、福建、贵州南部。

采集加工 药用叶，随采随用或晒干备用。

性味功能 苦寒，有毒。消肿，止痒，杀虫。

主治用法 跌打扭伤，疥癣，用鲜叶煎水外洗或捣烂外敷。枝、叶又可杀虫灭蛆。

注：此药有剧毒，不能内服！



图 367　羊角扭（夹竹桃科，羊角扭属）

Strophanthus divaricatus (Lour.) Hook. et Arn.

1.果枝；2.种子。

走马箭(葫藶)

别名　走马风、八棱麻。

识别特征　(1) 直立亚灌木，高达 1 米以上。茎易折断，内有髓心。

(2) 叶对生，奇数羽状复叶；小叶 5～7 枚，椭圆状披针形，长 5～14 厘米，宽 2～4 厘米，边缘有细锯齿，叶揉之有臭气。

(3) 花白色，顶生伞房花序。果卵圆形，直径约 3～4 毫米，熟时红色。

生长环境　喜生于山地、村边、林下灌木丛中，亦有栽培。

产于我国大部地区。

采集加工　药用根及茎叶，全年可采。洗净，切碎，晒干备用。

性味功能　酸平。根：祛风消肿，舒筋活络。茎叶：发汗利尿。

主治用法　(1)风湿筋骨痛，跌打损伤，每用干根 1～2 两，水煎服。(2)肾炎水肿，脚气水肿，每用全草 4～8 錢，水煎服。(3)风疹搔痒，全草煎水外洗。



图 368　走马箭（忍冬科，接骨木属）

Sambucus javanica Reinw.

1.花枝；2.花。

鱼　　藤*

别名　毒鱼藤。

识别特征　(1) 木质藤本，全株无毛。枝条有麻点(皮孔)。

(2) 叶互生，为奇数羽状复叶，小叶片通常为5枚，间有3～7枚，长圆形，长5～10厘米，宽2～4厘米，先端渐尖而钝，基部圆形。

(3) 花粉红色，长在叶腋。花后结斜卵形豆荚，扁而薄，长约3厘米。

生长环境　生于山沟密林、山脚疏林。

广东、广西、台湾均有分布。

采集加工　药用根、茎，全年可采。洗净，切片，晒干，研成粉末备用。

性味功能　辛温，有毒。散瘀止痛，杀虫。

主治用法　(1)跌打肿痛（皮肤未破)，用干粉加酒炒热敷患处。(2)根、茎，灭蝇蛆。

注：本品含有毒鱼藤酮，毒杀昆虫效果很好。禁内服，以防中毒！



图 369　鱼藤（蝶形花科，鱼藤属）

Derris trifoliata Lour.

盐肤木(滨盐肤木)

别名　盐霜柏、盐白木。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，一般高 2～5 米，嫩枝、叶柄及花序均有毛，茎中心有髓质。

(2) 叶互生，奇数羽状复叶，小叶 7～13 片，斜卵形，长 5～12 厘米，宽 2～5 厘米，基部偏斜，边缘有锯齿；叶轴有狭翅。

(3) 花白色，多数组成圆锥花序。果圆形，直径约 5 毫米，熟时红色，外面有一层白霜，尝之味咸。

生长环境　喜生于旷野、坡地、丘陵的灌木丛中。

产于广东、广西。

采集加工　药用根，叶，全年可采。洗净，切片晒干。

性味功能　咸凉。凉血降火，去瘀生新。

主治用法　(1)麻疹，感冒发热，咳嗽带血；(2)跌打骨折。

每用干根 1～2 两，水煎服。预防中暑，可用叶作凉茶饮，根叶研粉调敷骨折。

注：本品种为全国各地出产的盐肤木的变种。




图 370　盐肤木（漆树科，漆树属）

Rhus chinensis Mill. var. roxburghii (DC.) Rehd.

透骨消(连钱草)

别名 金錢薄荷、通骨消、金錢艾、活血丹。

识别特征 (1) 多年生匍匐草本，高5～20厘米。茎细长，四棱形，节上生根。

(2) 叶对生，有短柄，圆形或肾形，长1～3厘米，宽0.5～3厘米，边缘有圆齿，形似连錢，所以叫“连錢草”。

(3) 花淡紫色或粉红色，二唇形，腋生。坚果，长圆形。

生长环境 喜生于田野、路旁、林缘、溪边潮湿地上，亦有栽培。

见于我国大部地区。

采集加工 药用全草，全年可采，以夏季为最好。洗净，晒干备用或鲜用。

性味功能 辛温，气香。活血通络，祛风消肿。

主治用法 (1)跌打扭伤，骨折；(2)风湿骨痛；(3)尿路结石；(4)亦有人用治小儿疳积、黄疸、肺痈、感冒咳嗽。

每用干品3錢～1两，鲜品1～2两，水煎服。外用鲜品捣烂或干品研粉与它药配合调敷患处。




图 371　透骨消（唇形科，连錢草属）
Glechoma hederacea L.

蛇 葡 萄

别名 野葡萄、山葡萄。

识别特征 (1) 草质藤本，外形似葡萄。嫩枝有细毛，卷须与叶对生。

(2) 叶互生，较葡萄叶小，长宽相等，约为5～7厘米，边缘有粗齿。

(3) 花淡黄色，花序与叶对生。果球形，直径约0.5厘米，熟时紫蓝色。

生长环境 喜生于山地、沟谷边灌丛和疏林中。

主产于我国南方各地。

采集加工 药用根茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 甘苦凉。清热，祛风湿，消肿。

主治用法 (1)脚气水肿，每用5錢～1两，水煎服。(2)风湿性腰腿痛，每用5錢～1两，水煎服。(3)跌打损伤肿痛，恶疮肿毒，用鲜品捣烂外敷。




图 372　蛇葡萄（葡萄科，蛇葡萄属）

Ampelopsis brevipedunculata
(Maxim.) Koehne

落 地 生 根

别名 打不死。

识别特征 (1) 多年生肉质草本，一般高约0.4～1米。茎圆柱形，中空，节明显，紫红色。

(2) 叶对生，为单叶或羽状复叶；小叶3～5片，具短柄，对生，厚而肉质，长椭圆形，长5～20厘米，宽可达10厘米，边缘有圆齿，叶落地可以发芽生根。

(3) 花大，钟形，紫红色，下垂。

生长环境 喜生于湿润草地、水沟、林荫树下或岩石縫上。

主产于云南、广东、广西、福建、台湾。

采集加工 药用全草，全年可采。多为鲜用。

性味功能 淡涩凉。消肿止痛，拔毒生肌。

主治用法 跌打损伤，疮瘍肿毒，烫火伤。鲜叶捣烂敷患处，一般不作內服。




图 373　落地生根（景天科，伽蓝菜属）

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

1.植枝；2.花序。

横经席(薄叶胡桐)

别名　跌打将军、碎骨莲、皮子黄。

识别特征　(1) 灌木或小乔木，高 1～5 米。幼枝四棱形，有狭翅。

(2) 叶对生，长椭圆形至披针形，长 6～12 厘米，宽 1.5～3.5 厘米；上面中脉凸起，侧脉多数，且近平行排列，故称“横经席”。

(3) 花白色，稍带粉红色，通常 3 朵，有时 1～5 朵排成聚伞花序。果卵状长圆形，顶端有尖咀。

生长环境　生于山地、疏林或密林中。

多见于广东、广西。

采集加工　药用根、叶，秋冬采集。根，洗净，切片，晒干；叶阴干备用。

性味功能　微苦平。祛瘀止痛，补肾强腰。

主治用法　跌打损伤，风湿骨痛，肾虚腰痛，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。外伤出血，取干叶研粉撒敷患处。




图 374　横经席（藤黄科，红厚壳属）

Calophyllum membranaceum
Gardn. et Champ.

潺槁(潺槁木姜)

别名　潺槁木、潺果、三苦花。

识别特征　(1) 常绿乔木，高可达 10 余米。树干青色，老时变褐；树皮有丰富的粘胶质，嫩枝有毛，全株有香气。

(2) 叶互生，革质，倒卵形至椭圆状披针形，长 6.5～10 厘米，宽约 5 厘米，上面中脉及背面被柔毛。

(3) 花小，顶生或腋生。果球形，直径约 0.7 厘米。

生长环境　喜生于疏林灌木丛中，旷野村边亦常见。

主产于广东、广西、福建、云南。

采集加工　药用根、皮、叶，夏秋采集。根，洗净，切片，晒干备用；叶、皮多为鲜用。

性味功能　甘苦涩凉。清湿热，消肿毒。

主治用法　(1)肠炎腹泻，跌打损伤，腮腺炎，痈疮，每用干根 5 錢～1 两，水煎服。(2)疮疖、乳腺炎初起，用皮、叶捣敷患处。(3)本品根、皮、叶有粘性，常用为制丸药的粘合剂，外用散药或农业上杀虫药的混合剂。



图 375　潺槁（樟科，木姜子属）

Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.

鹅柞(柞木)

别名　凿子树、檬楮、葫芦刺。

识别特征　(1)有刺的常绿灌木或小乔木，高一般2～4米。

(2) 叶互生，尖卵形，长3～7厘米，宽2～4.5厘米，边缘有微齿，叶腋有锐刺。

(3) 腋生总状花序，花淡黄色。浆果，球形，熟时黑色。

生长环境　生于丘陵地、荒地、山坡、河沟边。

产于我国大部地区。

采集加工　药用叶，全年可采。洗净，阴干备用。

性味功能　苦涩寒。散瘀消肿。

主治用法　主要用于跌打骨折、扭伤脱臼。用叶研粉，酒醋调敷；或制成酒剂(每2～3斤干叶浸10斤米酒，稍煮沸后，放凉再浸1～2周，即可使用)，用纱布在酒剂中浸湿后敷患处，随干随洒，具有较好的散瘀消肿的效果。



图 376　箭柞（大枫子科，柞木属）

Xylosma japonicum (Walp.) A. Gray.

1.花枝；2.果枝；3.雄花；4.果；5.有刺的幼枝。

十七、蛇虫咬伤类

（适应各种毒蛇咬伤、蜈蚣咬伤、黄蜂螫伤）

一 支 黄 花

别名 大叶七星剑、金边菊、黄花草。

识别特征 (1) 多年生草本，通常高 30～60 厘米。茎圆柱形，稍呈紫红色。

(2) 叶互生，卵状披针形，基部叶大，长 4～7 厘米；上部叶小，长 2～3 厘米，边缘有疏锯齿。

(3) 头状花序，花黄色，中央为管状花，外层一列舌状花。

(4) 根须状，多数。

生长环境 喜生于荒山草坡、山路旁、草丛中。

主产于长江以南各省。

采集加工 药用全草，宜于秋季采集。洗净，晒干，扎把备用或鲜用。

性味功能 辛苦凉。疏风解毒，消肿止痛。

主治用法 (1)毒蛇咬伤；(2)咽喉肿痛，扁桃体炎，感冒，咳嗽；(3)跌打扭伤，疮疖肿毒。

每用干品 3 錢～1 两，鮮品 1～2 两，水煎服。外用鮮品搗烂敷患处。




图 377　一支黃花（菊科，一支黃花属）
Solidago virgo-aurea L.

一支箭(瓶尔小草)

别名　矛盾草、一枝枪。

识别特征　(1) 多年生直立草本，高7～20厘米。根茎短，圆柱形，侧根横走，肉质。

(2) 全草一般只有一片营养叶，卵形，先端钝圆或尖形，基部下延，外形似盾；另在基部抽出一个孢子囊穗，挺直如矛，淡黄色，故称“矛盾草”。

生长环境　生于阴湿坡地。

我国除东北外，均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干备用。

性味功能　微甘酸凉。消肿解毒，止痛退翳。

主治用法　(1)毒蛇咬伤，疔疮肿毒，每用干品3～5錢，水煎服，同时用鲜品捣烂敷患处。(2)心胃气痛，每用干品3～5錢，水煎服。(3)急性结膜炎，角膜斑翳，睑缘炎，每用鲜品捣烂敷患处。

一般常干燥后研粉，蛇伤、胃痛，每服1～2分即可。




图 378　一支箭（瓶尔小草科，瓶尔小草属）

Ophioglossum vulgatum L.

七叶一枝花

别名 金盘托荔枝、金绒重楼、铁灯台、蚤休、草河车。

识别特征 (1) 多年生草本，茎单一，直立高约 0.5～1 米，一般为紫色。

(2) 叶轮生，3～8 片，一般为 7 片，排列于枝顶。小叶纸质，长圆形，长约 10～20 厘米，宽 5～10 厘米，新苗根生叶 1 片，广卵形，叶面多皱纹。

(3) 夏秋茎顶抽出花梗，顶生黄花一朵，常有轮生的叶状花被片七枚。

(4) 根茎横臥，粉质，肥大，表面粗糙有节；节间短，每节上有明显的圆形疤痕。

生长环境 喜生于山谷、溪边、丛林下温暖少风或阴湿的地方。

长江以南各地均出产。

采集加工 药用根茎，全年可采。洗净，晒干备用。

性味功能 苦微寒，有小毒。清热解毒，消肿散瘀。

主治用法 (1)为毒蛇咬伤治疗要药；(2)疮瘍肿毒，有人报告有较好的抗菌作用；(3)小儿麻疹合并肺炎，流行性腮腺炎，高热，痉挛；(4)哮

喘；(5)有人试用于治疗癌症。

每用干品 1～2 錢，或 3～5 錢，水煎服。外用研粉和酒醋调涂患处。




图 379　七叶一枝花（百合科，七叶一枝花属）
Paris polyphylla Sm.

三　角　草

识别特征　(1) 多年生草本。

(2) 叶自根茎发出，长 20～30 厘米，宽约 0.3 厘米，有一条明显的中脉，基部扩大抱茎，膜质，半透明。

(3) 花序从叶丛抽出，长于叶，花淡紫色。果三角形，故称“三角草”。

生长环境　喜生于湿润肥沃草地、庭园、地头边。

主产于我国南部。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒干用或鲜用。

性味功能　微苦凉。清热解毒，消肿止痛。

主治用法　(1)毒蛇咬伤；(2)跌打肿痛。

每用干品 1～2 两，水煎服。同时用鲜品捣烂外敷患处。




图 380　三角草（百合科，青百合属）

Chlorophytum laxum R. Br.

1.植物全形；2.果(放大)。

土半夏*（犁头尖）

别名　老鼠尾、坡芋。

识别特征　(1) 多年生草本，高 10～20 厘米。(2) 单叶，根生，有 10～20 厘米的长柄，叶片戟形或犁头状，故叫“犁头尖”，边缘微波形或有浅裂。

(3) 花序从根茎发出，玉米棒样，外有一个长筒状总花苞（佛焰苞），顶端尖细延伸成鼠尾状。

(4) 块茎近球形，粉质，黄白色，尝之有麻舌灼喉感。

生长环境　喜生于田野、沟边、路旁、村前屋后低洼湿地及杂草丛中。

我国南方各省均有野生。

采集加工　药用块茎，全年可采。多为鲜用。

性味功能　辛温，有毒。解毒、消肿、止痛。

主治用法　主要用于治疗毒蛇咬伤，无名肿毒。

外用鲜品捣烂敷患处，不作内服。



图 381　土半夏（天南星科，犁头尖属）

Typhonium divaricatum (L.) Decne.

土瓜(王瓜)

别名 老鸦瓜、假苦瓜。

识别特征 (1) 多年生藤本，有与叶对生的卷须。主根肥大呈块状，侧生须根，黄白色。

(2) 叶互生，掌状，先端渐尖，基部心形或截形，边缘有3～5浅裂和不规则锯齿与尖刺。

(3) 花腋生，白色，单性。果红色，长5～8厘米，直径2～4厘米。

生长环境 喜生于山边、荒野肥沃湿润的地方。

产于江苏、浙江、湖北、湖南、四川、广东、广西。

采集加工 药用块根，秋末挖取。洗净，切片，晒干备用。

性味功能 苦寒，有小毒。清热解毒，活血散瘀。

主治用法 毒蛇咬伤，咽喉肿痛，疮疡疔肿，跌打损伤。

每用干品3～5錢，水煎服。亦可捣烂敷患处。

注：本品有催吐作用，用量不宜过大。



图 382　土瓜（葫芦科，栝楼属）

Trichosanthes cucumeroides Maxim.

1.花枝；2.瓠果；3.块根；4.种子。

广东万年青(粤万年青)

别名 大叶万年青、万年青。

识别特征 (1) 多年生草本，高 1～2 米。根茎圆柱形直立或平卧，地下茎垂直，少分枝。

(2) 叶片长椭圆状卵形，长 10～20 厘米，宽 6～9 厘米，两面绿色。

(3) 肉穗花序从茎顶的叶腋中抽出，样子似玉米棒，外面被有大型的佛焰苞。果球形，熟时鲜红色。

生长环境 野生于石山密林水沟旁，多为栽培。

广东、广西有野生分布。

采集加工 药用全草，全年可采，多为鲜用。

性味功能 淡寒微苦。清热凉血，消肿拔毒，止痛。

主治用法 (1)蛇咬伤，咽喉肿痛，每用鲜品 5 錢～1 两，水煎服；(2)小儿脱肛，煎水外洗；(3)疔疮肿毒，用鲜叶适量，捣烂外敷患处；(4)民间有人用于治疗狂犬咬伤。



图 383　广东万年青（天南星科，粤万年青属）
Aglaonema modestum Schott

水芙蓉(紫苏草)

别名 水管筒、三叉草。

识别特征 (1) 多年生直立草本，一般高为15～30厘米。茎中空，圆柱形，浅绿色，有节，肉质，全株有香气。

(2) 叶对生或三叶轮生，披针形，无柄，基部半抱茎，长1.5～4厘米，叶上有腺点，边缘有小锯齿。

(3) 花小，腋生淡红色或白色。

生长环境 喜生于沟边、田边、沼泽等湿地上。

多见于华南各地。

采集加工 药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用。

性味功能 辛凉，气香。清热解毒，消肿止痒。

主治用法 (1)毒蛇咬伤；(2)疮痈肿毒；(3)癣，皮肤搔痒。

治蛇伤每用干品5錢～1两，水煎服，或与独脚乌桕等药浸酒内服。外用，绞汁涂皮肤癣疥，或煎水洗，捣烂敷蛇伤肿毒。




图 384　水芙蓉（玄参科，石龙尾属）

Limnophila aromatica (Lour.) Merr.

1.花枝；2.植物之下部(示节上之根)

3.叶之一部分(示油点)。

毛 麝 香

别名 凉草、五郎草、蓝花草。

识别特征 (1) 一年生粗壮草本，高 30～60 厘米，全株有粘质毛，茎四方形。

(2) 叶对生，尖卵形，长 1.5～5 厘米。边缘有钝齿，背面有黑色腺点，有特异气味。

(3) 花紫色，唇形，腋生。蒴果，圆锥形，长约 1 厘米。

生长环境 喜生于路旁、村边、荒野草丛中。多见于广东、广西。

采集加工 药用全草，叶形小而香气大的为好，夏秋采集。洗净，阴干备用。

性味功能 辛甘微温，有香气。祛风湿，消肿痛。

主治用法 (1)小儿麻痹，风湿骨痛；(2)风寒腹痛；(3)毒蛇咬伤，跌打肿痛，疮疖肿毒，荨麻疹。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。外用鲜品适量捣烂外敷或煎水洗患处。




图 385　毛麝香（玄参科，毛麝香属）

Adenosma glutinosum (L.) Druce

东 风 菜

别名 钻山狗、仙白草、白云草。

识别特征 (1) 多年生直立草本，高可达2米，茎稍带红色。

(2) 叶互生，阔卵形，基生叶大，长9～24厘米，宽6～18厘米，边缘有疏齿，背面灰白色，茎生叶较基生叶小得多。

(3) 头状花序，花白色，中部为管状花，边缘两列为舌状花。

(4) 根茎横卧，粗短，圆柱形，棕褐色，生多数细长须根。

生长环境 喜生于山坡、路边、村缘、溪边潮湿处。

见于我国大部地区。

采集加工 药用根或全株。秋冬采集，洗净，切碎，晒干备用。

性味功能 甘寒。祛风热，疗蛇伤。

主治用法 (1)毒蛇咬伤，目赤肿痛，咽喉肿痛，肠炎腹痛，每用干根5錢～1两，水煎服。

(2)干根研粉可外敷蛇伤、疖疮。




图 386　东风菜（菊科，紫菀属）

Aster scaber Thunb.

瓜 子 金

别名 小远志、通性草、黄瓜仁草。

识别特征 (1) 多年生草本，高约 10 厘米，有多数分枝。

(2) 叶互生，卵形至卵状披针形，长 1～2 厘米，宽 0.5～1 厘米，叶柄短。

(3) 花腋生，白而带紫。果卵状，马鞍形。

生长环境 喜生于丘陵、坡地、旷野草丛中。

广东、广西、湖南、浙江、江苏、山东、贵州、四川等地都有分布。

采集加工 药用全草，夏秋采集。洗净，晒干，扎把备用。

性味功能 辛微温。活血散瘀，化痰止咳。

主治用法 (1)咽喉肿痛；(2)跌打损伤，胸痛，咳嗽；(3)毒蛇咬伤。

每用干品 1～3 錢，水煎服或研粉内服。外用粉末调涂患处。



图 387　瓜子金（远志科，远志属）

Polygala japonica Houtt.

1.植物全形；2.花之側面。

半　边　莲

别名　急解索、蛇胴草、细米草。

识别特征　(1) 矮小伏地草本，肉质，节上生根，折断有黄白色乳汁。

(2) 叶互生，线状披针形，长 1～2 厘米，宽 3～5 毫米，边缘有疏齿。

(3) 花腋生，淡红或淡紫色，花瓣合成管状，一边裂开，象开了一半的莲花，故称"半边莲"。

生长环境　喜生于岸边、溪边、沟边潮湿处。

产于我国南方各地。

采集加工　药用全草，春夏采集。洗净，晒干用或鲜用。

性味功能　甘淡微寒。凉血解毒，消炎利水。

主治用法　(1)为治疗毒蛇咬伤要药，每用鲜品 1～2 两，干品 5 錢～1 两，水煎服，亦可捣烂外敷。(2)肝硬化腹水，晚期血吸虫病腹水，肾炎水肿，每用干品 1 两，水煎服。(3)扁桃体炎，阑尾炎，化脓感染，肠炎 腹泻，每用干品 5 錢～1 两，水煎服。(4)疮疖初起，毒虫咬伤，可捣烂敷患处。



图 388　半边莲（半边莲科，半边莲属）

Lobelia chinensis Lour.

半　边　旗

别名　单边旗、半边桅。

识别特征　(1) 多年生直立蕨类植物，根状茎长而横走。

(2) 叶根生，为羽状复叶，叶的顶端为深羽状裂；中部以下半边深羽裂，上侧无裂片，故称“半边旗”。

(3) 孢子囊群沿叶背边缘连续生长。

生长环境　生于山坡陡壁、山路旁、林荫下。

主产于广东、广西、福建、湖南。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒至半干，再扎把晒干备用。

性味功能　苦辛凉。清热解毒，收敛止泻。

主治用法　(1)毒蛇咬伤，疮痈疖肿；(2)肠炎痢疾。

每用干品 1～2 两，水煎服。




图 389　半边旗（凤尾蕨科，凤尾蕨属）

Pteris semipinnata L.

1.植物全形；2.叶的一部分，示孢子囊群。

苍白秤钩风

别名　穿墙风。

识别特征　(1) 木质藤本，长可达 10～20 米。藤上有条纹及疙瘩，断面有五条半环纹，层与层之间易剥离，外皮褐黑色。

(2) 叶互生，多为菱状阔卵形，长约 3.5～6 厘米，宽 4～6.5 厘米，背面粉绿色，基出脉5条。

(3) 花细小。果倒卵状长圆形，扁平，中间凹陷，直径 1 厘米，外有白粉。

生长环境　喜生于山腰或山沟疏林或灌木丛中。

主产于我国南部和西南部。

采集加工　药用藤茎，全年可采。洗净，切片，晒干备用。

性味功能　微苦寒。清热解毒，祛风除湿。

主治用法　(1)毒蛇咬伤；(2)风湿骨痛；(3)尿路感染。

每用干品 5 錢～1 两，水煎服。治蛇伤需同时用鲜茎、叶捣烂敷伤口周围。




图 390　苍白秤钩风（防己科，秤钩风属）

Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels

1.叶枝；2.雄花；3.果序一部分。

鸡爪三七(伽蓝菜)

别名　青背天葵。

识别特征　(1) 多年生肉质直立草本，高约0.5～1米，全株绿色，老枝变红，无毛。

(2) 叶对生，叶片不规则分裂，羽状，有钝齿或浅裂。

(3) 花黄色或橙红色，长1.5～2厘米，高脚碟形，集成顶生聚伞花序。

生长环境　多为栽培。

产于云南、广东、广西、福建、台湾。

采集加工　药用全草，多为鲜用。

性味功能　甘涩寒。清热解毒，散瘀消肿。

主治用法　毒蛇咬伤，疮痈脓肿，跌打损伤。

每用鲜品3～5錢，水煎服，同时以鲜品捣烂敷伤口周围。



图 391　鸡爪三七（景天科，伽蓝菜属）

Kalanchoe laciniata (L.) DC.

虎　杖

别名　斑杖、大叶蛇总管、川筋龙、斑红根。

识别特征　(1) 多年生草本，高达 2 米。茎直立，中空，表面常有紫色斑点，并有白色纵纹，节稍膨大。

(2) 叶互生，广卵形至椭圆形，长 5～10 厘米，宽约 3～5 厘米。

(3) 花白色或淡红色，顶生或腋生圆锥花序。果三角形，褐色。

(4) 根茎木质，蔓延地中，肥大，黄色，外皮棕黑色。

生长环境　生于山沟、溪边、林下阴湿地。

多产于长江以南，山东、陕西、河南亦产。

采集加工　药用根，全年可采。洗净，切片晒干备用。

性味功能　苦凉。清热解毒。

主治用法　(1)毒蛇咬伤；(2)烫火伤；(3)急性肝炎；(4)尿路感染，无名肿毒；(5)便秘。

每用干品3錢～1两，水煎服。亦可用鲜根捣烂外敷，或干根研粉调敷治无名肿毒，蛇伤，烫火伤。



图 392　虎杖（蓼科，蓼属）

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

独脚乌桕(圆叶千金藤)

别名　乌桕薯。

识别特征　(1) 多年生缠绕藤本，全株无毛。茎下部木质化，小枝纤细，圆柱形，具纵直而扭曲的沟纹。

(2) 叶互生，盾叶，三角状圆形，长宽各约2.5～4厘米；先端圆形，基部截形，上面绿色，背面粉绿色，掌状脉7～9条，叶柄长约4～5厘米。

生长环境　喜生于沟边、路旁、溪边、山谷、山坡阴湿处，常缠绕在其他植物上生长。

多见于我国南方。

采集加工　药用块根，洗净切片，晒干备用。

性味功能　苦寒，有小毒。清热解毒，止痛。

主治用法　(1) 毒蛇咬伤；(2)疔疮肿毒；(3)风湿骨痛。

每用干根3～5錢，煎水或浸酒内服。鲜根叶捣烂可外敷患处。




图 393　独脚乌桕（防己科，千金藤属）

Stephania rotunda Lour.

野 香 薷

别名 细叶七星剑。

识别特征 (1) 一年生草本。茎方形，多分枝，紫红色，全株有很浓香气，较香薷为大。

(2) 叶对生，线状披针形，长约 1～2 厘米，宽约 0.3～0.6 厘米，边缘有锯齿，两面有透明腺点。

(3) 花粉红色，二唇形，顶生或腋生总状花序。果为小坚果。

生长环境 喜生于村旁、路边、沟边、草地潮湿处。多为栽培。

我国南部均产。

采集加工 药用全草，秋季采收。洗净，切段，阴干备用。

性味功能 辛凉，气香。解蛇毒，散瘀定痛，化浊解暑。

主治用法 (1)治毒蛇咬伤要药；(2)跌打瘀痛；(3)中暑发热；(4)皮肤湿疹搔痒，多发性疖肿。

每用干品 3～5 錢，水煎服。鲜品捣烂外敷蛇伤疖肿，煎水外洗皮肤病。



图 394　野香薷（唇形科，石荠苧属）
Orthodon fordii Maxim

蛇　王　藤

别名　双目灵。

识别特征　(1) 草质藤本，茎纤细，有纵纹。(2) 叶对生，外形变化很大，常为矩圆形，长4～14厘米，宽1～6厘米，上面绿色，叶主脉及两侧偶有一条白斑；叶柄顶端有两个明显的眼(腺体)，故称“双目灵”。

(3) 花白色，腋生。果圆形，粉绿色。

生长环境　喜生于山坡、丘陵或半山林中。主产于广东南部。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，切段，晒干备用或鲜用。

性味功能　辛苦凉。清热解毒。

主治用法　(1)毒蛇咬伤；(2)疔疮，疖肿。

每用干品3錢～1两，水煎服；同时 用鲜品捣烂加酒外敷。



图 395　蛇王藤（西番莲科，西番莲属）

Passiflora cochinchinensis Spreng.

1.花枝；2.果。

蛇　莓

别名　龙吐珠、三爪龙。

识别特征　(1) 多年生伏地草本。茎多数纤细，匍匐在地面上，有柔毛。

(2) 叶互生，为指状三小叶；小叶为卵圆形，长 1～3 厘米，宽 1～2 厘米，有锯齿，叶柄长。

(3) 花黄色。果熟时红色，由多数小圆果聚集成半球形，直径约 1 厘米左右。

(4) 根肉质较粗壮。

生长环境　喜生于田野、沟边的潮湿草地上。我国大部地区均有分布。

采集加工　药用全草，全年可采。洗净，晒干备用，或鲜用。

性味功能　甘淡凉。清热解毒。

主治用法　(1)细菌性痢疾；(2)感冒发热，咽喉肿痛，咳嗽；(3)腮腺炎，毒蛇咬伤。

每用鲜品 1～2 两，干品 5 錢～1 两，水煎服。腮腺炎、毒蛇咬伤可用鲜品捣烂外敷。




图 396 蛇莓（蔷薇科，蛇莓属）
Duchesnea indica (Andr.) Focke.

望江南

别名　羊角豆、野扁豆、望江南决明。

识别特征　(1)多年生草本或小灌木，高约 1 米。茎有棱，常带紫红色。

(2) 叶互生，偶数羽状复叶，有 4～5 对小叶，小叶片长卵形，长 5～8 厘米，宽 2～3 厘米，叶柄的基部有凸起的眼（腺体）一个。叶脉常带紫红色。

(3) 花黄色。荚果长而扁，两面有红色条纹，内藏种子 30～40 粒。

生长环境　多生于山坡、村边、路旁、河边或荒地上，亦有栽培。

主产于长江以南各地，华北也有分布。

采集加工　药用全草或种子，夏秋采集。洗净，切段，晒干备用。

性味功能　苦平。解毒，通便。

主治用法　(1)毒蛇、毒虫咬伤；(2)慢性便秘，伤食胃痛，哮喘。

每用干品 3～5 錢，水煎服。蛇伤，用鲜叶捣烂外敷。




图 397　望江南（苏木科，山扁豆属）

Cassia occidentalis L.

1.枝叶；2.果；3.种子。

韩 信 草

别名 耳挖草。

识别特征 (1) 多年生草本。茎方形，下部常伏地，上部直立，高 10～25 厘米，有细毛。

(2) 叶对生，卵圆形，长 1.5～2.5 厘米，边缘有钝齿。

(3) 顶生总状花序，长 5～8 厘米，花二唇形，紫兰色，花萼一侧有盾状附属物，形似耳挖杓，故称“耳挖草”。

生长环境 生于山坡、湿润草地、水沟边、田埂。

产于广东、广西。

采集加工 药用全草，春夏采集为好。采后，洗净，晒干，扎把备用，或鲜用。

性味功能 微辛温，气香。舒筋活络，散瘀止痛。

主治用法 跌打肿痛，外伤出血，产后四肢麻木，毒蛇咬伤。

每用干品 2～3 錢，或鲜品 3～8 錢，水煎服。

外用鲜品适量捣烂敷患处。



图 398　韩信草（唇形科，黄芩属）

Scutellaria indica L.

鹅脚板(异叶茴芹)

别名 八月白、铁鏟头、大叶牛边莲、三脚蛤蟆。

识别特征 (1) 多年生草本,高0.4～1.2米,被柔毛,枝叶揉碎后有香气。

(2) 茎下部的叶为单叶,圆卵形,有粗齿,叶柄基部抱茎;上部的叶呈羽状分裂,裂片尖卵形,两侧裂片基部常偏斜。

(3) 花小,白绿色,集成伞形花序。果球形。

生长环境 生于坡地、荒野、溪旁灌木丛中。

长江以南大部地区有分布。

采集加工 药用根或全草,全年可采。根,洗净,晒干;全草,晒干,扎把备用。

性味功能 辛甘微温。散瘀,消肿,解毒。

主治用法 (1)毒蛇咬伤,蜂螫伤,每用干根3～5錢,水煎服。亦可用全草捣敷患处。(2)近有人用以试治鼻咽癌,常以鲜品榨汁滴患处,可见症状的改善。(3)四川民间用以治痢疾。




图 399　鹅脚板（伞形科，茴芹属）

Pimpinella diversifolia DC.

蓑刀竹(徐长卿)

别名　千云竹、英雄草、山刁竹、逍遥竹。

识别特征　(1) 直立草本，高 30～60 厘米，少分枝，有节，折断后有白色乳汁。

(2) 叶对生，细长，长 7～12 厘米，宽 1～1.5 厘米。

(3) 夏秋枝顶及近枝顶处开紫色小花。结两个羊角形小果，内藏多数顶端带长毛的种子。

(4) 根呈须状，细长粉质，尝之有辛辣感，嗅之甚芳香。

生长环境　喜生于高山干旱的草地上。

我国各地均有分布。

采集加工　药用全草，夏秋采集。洗净，晒至半干，扎把阴干备用。

性味功能　辛温。祛风止痛，解毒消肿，温经通络。

主治用法　(1)毒蛇咬伤，风湿骨痛，心胃气痛，跌打肿痛，带状泡疹；(2)肝硬化腹水；(3)月经不调，痛经。

每用干品 2～4 錢，水煎服，亦可用鲜品捣烂外敷治带状泡疹，毒蛇咬伤，跌打损伤；浸酒漱口，可止牙痛。




图 400　寮刁竹（萝藦科，徐长卿属）

Pycnostelma paniculatum (Bge.) K. Schum.

1.根枝；2.花枝；3.花；4.果实；5.种子。

附：大叶寮刁竹

大叶寮刁竹，与寮刁竹不同科属，但民间也用以治疗蛇伤。




图 400-1　大叶寮刁竹（兰科，竹叶兰属）
Arundina chinensis Bl.

最高指示

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

《论联合政府》（一九四五年四月二十四日）

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》，一九六四年十二月三十一日《人民日报》

常见疾病的防治

一、疾病预防

普通感冒、流行性感冒

(1) 三極苦叶三斤　大风艾叶三斤　加水 100 斤，煎成 60 斤，供 100 人一次服，每日一次。

(2) 黄皮叶四斤　大叶桉叶三斤　加水 100 斤，煎成 60 斤，供 100 人一次服，每日一次。

(3) 野菊花　黄皮叶　龙眼叶各四斤　加水 100 斤，煎成 60 斤，供 100 人一次服，每日一次。

(4) 贯众十斤　黄皮叶五斤　加水100斤，煎至60斤，供 100 人一日量，代茶饮。

流行性脑脊髓膜炎

(1) 金银花三斤　路边菊三斤　三極苦四斤加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，代茶饮。

(2) 贯众五斤　板蓝根三斤　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，代茶饮。

(3) 龙眼叶五斤　黄皮叶五斤　野菊花三斤　松针三斤　甘草适量　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，代茶饮。

(4) 贯众八斤　甘草二斤　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，每日二、三次分服。

上述各方在流行期间可以连服三至五日，间隔几天再服。

痢　疾

(1) 葫芦茶六斤　救必应一斤　高良姜五两　山苍根五两　阴香皮二两　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，代茶饮。

(2) 火炭母　凤尾草　金银花藤　番石榴叶　辣蓼各二斤　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，代茶饮。

(3) 番石榴叶五斤　葫芦茶五斤　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，分两次服。

(4) 崩大碗五斤　火炭母十斤　加水 100 斤，煎至 60 斤，供 100 人一日量，代茶饮。

疟　　疾

(1) 大风艾三錢　黄皮叶三錢　紫苏三錢　鴨胆子根三錢　金丝草二錢　大青叶根三錢　水煎服，每周一至二次。

(2) 过山龙一两半　水煎服，每周一至二次。

(3) 倒扣草八錢　马鞭草五錢　每日一剂，水煎服，连服三天。

钩端螺旋体病

(1) 在可能被钩端螺旋体污染的稻田劳动，每日用古山龙二至三錢，水煎服，用以控制感染发病。

(2) 用飞机草处理可能被钩端螺旋体污染的疫田。方法是在稻田内留少许水，将切碎的飞机草撒布于田内，数天后田水变红，再下田劳动。

防暑凉茶

有预防感冒、中暑和胃肠道传染病的作用。

(1) 布渣叶适量　水煎代茶饮。

(2) 金银花二两　野菊花二两　岗梅叶四两

卤地菊四两　为茶。

(3) 牡荆叶　揉制成茶，泡水代茶饮。

(4) 玉叶金花藤　牡荆叶等分　制茶，加薄荷少许，泡水饮用。

(5) 葫芦茶叶　白茅根　黄牛茶叶等分　制茶，泡水饮用。

(6) 地胆头四两　崩大碗四两　救必应一两　岗梅根一两　晒干切碎为茶，泡水或煎煮饮用。

杀蝇灭蚊

常用草药有：鱼藤，葫芦茶，苦楝，曼陀罗，夹竹桃，羊角扭，鸭胆子，了哥王，土荆芥，艾，青蒿，飞机草，大叶桉，小叶桉，柠檬桉，岗松，牡荆，算盘子，蓖麻叶，乌桕，双眼龙等。

方法：可将药切碎撒在蚊、蝇孳生地区，或用烟熏。

二、内科疾病

普通感冒(伤风)

病因症状　普通感冒又叫伤风，多因身体抵

抗力减弱，病毒侵入引起的。常年都有发生，但多在气候突然变化，着凉后起病。中医一般把感冒分为两种。

风寒感冒　全身不适，咽喉发痒，咳嗽鼻塞，打喷嚏，流清涕，并有头痛，全身肌肉酸痛，身上无汗，畏寒怕风，口不渴，发热。脉浮微紧，舌苔薄白。

风热感冒：咽喉肿痛发干，咳嗽鼻塞，流黄色粘稠鼻涕，头胀痛，发热，身上有汗，口渴，不想吃饭。脉浮数，舌苔薄黄或薄白而干。

治疗原则　风寒感冒，宜辛温解表；风热感冒，宜辛凉解表。

处方

风寒感冒：(1) 龙眼树叶五錢　黄皮叶五錢　茉莉花叶三錢　每日一剂，水煎服。

(2) 紫苏叶二錢　牡荆三錢　葫芦茶三錢　木蝴蝶五分　崩大碗三錢　大风艾二錢　每日一剂，水煎服。(适于咳嗽多的)

(3) 紫苏叶二錢　生姜三片　葱头五瓣　每日一剂，水煎服。

(4) 紫苏叶二錢　陈皮一錢　香附二錢　胡

颓子叶二錢　每日一剂，水煎服。(适于咳嗽气喘)

风热感冒：(1) 丁癸草或鸡眼草三錢　崩大碗三錢　酢浆草三錢　白背叶根三錢　山芝麻根五錢　每日一剂，水煎服。

(2) 倒扣草五錢　海金沙藤二錢　崩大碗三錢　大头陈五錢　每日一剂，水煎服。（适于发热不退）

(3) 金银花藤一两　野菊花三錢　布渣叶一两　火炭母一两　每日一剂，水煎服。（适于有呕吐、腹痛、泄泻等胃肠症状的）

(4) 山芝麻根一两　黄花蒿二錢　马缨丹五錢　每日一剂，水煎服。（适于高热、寒热往来）

(5) 岗梅根一两　水杨梅根一两　每日一剂，水煎服。（适于咽痛、咳嗽）

(6) 地胆头一两　白鹤藤一两　车前草一两　羊蹄草一两　每日一剂，水煎服。

(7) 山大颜一两　鬼针草一两　牡荆五錢　薄荷一錢　每日一剂，水煎服。

(8) 银胡止咳解毒丸：金银花　紫花前胡　枇杷叶　野菊花　茅根　麻黄　崩大碗　五指毛桃各等量　研粉，炼蜜为丸，每丸重三錢，每日二

至三次，每次一至二丸。（用于流感、感冒发热）

流行性感冒

病因症状　流行性感冒多因人体抵抗力减弱，流感病毒侵入引起的。通过流感病人的咳嗽和喷嚏传播。一般多在冬春气候变化时流行。传染性很强。如果预防不好，很容易传染开。主要症状是：起病很急，先有全身不舒服，以后发冷，发热可高可低，有时寒战，高热，体温可达摄氏39度以上，剧烈头痛，全身肌肉疼痛，疲倦无力，起不了床。有的伴有咽喉肿痛、咳嗽、咳痰、流鼻涕等上呼吸道症状，有的伴有腹痛、呕吐腹泻等消化道症状，个别病人还出现精神症状。一般3～5天后退热，症状逐渐消失。如果症状一直不减，咳嗽，胸疼，痰多，发热，可能合并了肺炎，应特别注意检查，早期抓紧治疗。

治疗原则　清热解毒，滋阴润燥。

处方

(1) 岗梅根一两　卤地菊一两　麦门冬五錢　每日一剂，水煎，分二次服。

(2) 山芝麻根五錢　鬼针草一两　岗梅根五

錢　淡竹叶五錢　每日一剂，水煎服。

(3) 鴨脚木皮五錢　岗梅根五錢　山芝麻根三錢　山薄荷三錢　每日一剂，水煎服。

流行性腮腺炎

病因症状　本病也叫痄腮。多流行于冬春两季，小孩多见，成人较少。本病是由病毒引起，大多因直接接触病人或通过病人的口沫来传染的，一般在发病前三天起，到消肿为止这一段时间內，容易传染给别人，因此最好不要让病人接触别人，特别是小孩。发病时耳下腮腺部肿大，有的只肿一侧，有的先后或同时两侧都肿。局部有疼痛和触痛的感觉，吃东西时更痛，唾液增多，大多伴有发热，全身不适，头痛。张口检查，可看到腮腺管口(在上頜第二臼齿旁的頰粘膜上)红肿。个别病人还可见睾丸肿大。

治疗原则　清热解毒，消肿散瘀。

处方

(1) 七叶一枝花根　研成细粉，以酒醋各半调成糊状，涂敷于患部，每日二至四次。

(2) 仙人掌一片　去刺，从中剖开，貼于患部

或捣烂敷患部。用金花草局部捣敷亦可。

(3) 羊蹄草　九里明（均鲜品）各一两　水煎服，每天一剂。同时以鲜品捣烂敷患部。

麻　疹

病因症状　麻疹是由病毒引起的传染性很强的一种疾病。多发于冬春两季。未得过麻疹的小孩最易感染。

开始二、三天叫初热期。发热，鼻塞流涕，打喷嚏，咳嗽，流泪，怕光，结膜发红，眼皮浮肿；头痛，烦躁啼哭，不想吃东西；唇颊发红，耳垂发凉。二、三天后颊部粘膜靠第一臼齿的地方出现白色小疹，周围有红晕，这是出疹前的诊断要点。

一般在发病第四天出疹，叫出疹期，先见于头面躯干而后四肢，暗红色、大小不等的斑丘疹，还有融合的趋势，一、二天出齐。有的出疹很少，或一下子很快退了，同时出现烦躁不安，神志不清，手脚抽筋的叫麻毒内陷，这是不好的变化，应及时抢救。

正常情况一般是疹出后三、五天消退，叫收

沒期。热漸退，皮肤留下色素沉着，并有细糠样脱屑。

治疗原则　初热期应以透疹为主；发疹期要凉血解毒；收沒期应滋阴润燥。疾病全程要加强护理，预防合并症如肺炎、肠炎等。

处方

(1) 野葛三錢　紫苏叶二錢　蝉蜕二錢　野芫荽二錢　每日一剂，水煎，分两次服。（用于透疹）

(2) 金银花四錢　野芫荽二錢　桑叶二錢　野菊花二錢　薄荷一錢　崩大碗一两　每日一剂，水煎，多次分服。（用于发疹期）

(3) 白花蛇舌草三錢　田基黃三錢　崩大碗四錢　七叶一枝花一錢　每日一剂，水煎，多次分服。（用于高热、咳嗽严重）

(4) 鮮茅根一两　鮮崩大碗一两　胡萝卜一两　鮮藕一两　甘蔗二两　水煎代茶饮。（用于收沒期）

传染性肝炎

病因症状　本病是由肝炎病毒所引起的。这种病毒抵抗力很强，一般煮沸 30 分钟才能杀死。它主要在消化道里。一般通过被粪便、手、蝇、

蟑螂等污染的食物或饮水，传染给抵抗力差的人而发病。

发病时有发热，疲倦，不想吃东西，特别怕吃油腻的食物，恶心呕吐，肝区疼痛，数天后巩膜和皮肤发黄，小便黄褐色。这一类型的叫急性黄疸型传染性肝炎，沒有黄疸的叫急性无黄疸型传染性肝炎。大部分病人经过治疗痊愈。但有些病人因为某种原因变成慢性，症状是疲乏无力，不想吃饭，肝区疼痛或肝肿大，大便不正常。

急性传染性肝炎应当隔离，食具要很好煮沸消毒。

治疗原则　急性黄疸型和无黄疸型肝炎，宜清热利湿；慢性肝炎，宜舒肝补脾，活血通络，如仍有急性症状，要辅以清利湿热；肝脾肿大的要活血、散瘀、软坚。

处方

急性黄疸型和无黄疸型肝炎：(1) 田基黄　葫芦茶　旱莲草　鸡骨草各一两　香附五錢　甘草三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 马蹄金　田基黄　盆上芫茜各一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 美人蕉根　古山龙藤各一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 溪黄草　白花蛇舌草　葫芦茶　红糖各一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(5) 茵陈蒿一两　葫芦茶一两　山栀子五錢　白马骨一两　牛大力一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(6) 吐烟花三两　金錢草一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(7) 盆上芫茜四两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。

慢性肝炎：(1) 鷹不泊　田基黄　茵陈蒿　白花蛇舌草等量　共研为细末，炼蜜为丸，每丸重三錢，每日服三丸。

(2) 糯稻根一至二两　每日一剂，水煎服。

(3) 虎刺二两　仙茅三錢　每日一剂，水煎服。(用于体虛患者)

(4) 白背叶根一两　鷹不泊根一两　鸡矢藤五錢　五指毛桃根一两　每日一剂，水煎服。(用于肝痛，体虛)

(5) 大叶蛇泡簕一两　五指毛桃根一两　白

背叶根一两　牛大力一两　每日一剂，水煎服。（用于肝脾肿大）

(6) 虎杖一两　白背叶根五錢　兗州卷柏五錢　地稔五錢　大罗伞根三錢　每日一剂，水煎，分两次服。（用于肝脾肿大，疼痛）

痢　　疾

病因症状　本病多由饮食不节，抵抗力减弱，吃了被细菌污染的食物所引起。有急性和慢性两种。多发生于夏秋苍蝇活跃季节。

起病急，全身不舒服，发烧，腹部阵阵疼痛；开始稀便，后来变为粘液血便或脓血便。常常出现想拉拉不出，拉完又想拉的“里急后重”的症状，大便次数一天十余次到几十次，量不多。严重的叫中毒性痢疾，多见于小儿，高热，抽筋，昏迷，往往需要抢救。急性菌痢治疗不彻底可转为慢性，大便经常不正常，带粘液。

由阿米巴原虫引起的叫阿米巴痢疾。全身症状比较轻，一般不发热，有腹痛，腹泻。每日三、五次到十余次，粪便中有血和粘液，象果酱样。味道腥臭难闻。

治疗原则　急性菌痢应清热导滞，慢性菌痢应补脾健胃，兼化湿导滞；阿米巴痢疾应杀虫止痢。

处方

急性菌痢：(1) 榄核莲六至八錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 毋草四至六两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 蛇莓珠四两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。湿热重，欲呕的加山栀二錢，生姜两片。

(4) 水杨梅花头 20～30 个　每日一剂，水煎，分两次服。或者作成浸膏片，每服 1.5～2.0 克；或者研粉，每服 1.5～3.0 克。

(5) 山香(鲜)二至三两　每日一剂，水煎，分两次服。

(6) 马齿苋四两(鲜)　刺苋菜四两(鲜)　狗肝菜一两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。

(7) 凤尾草一两五錢　半边旗一两　锡叶藤六錢　三加皮四錢　金花草五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(8) 牡荆子　研细粉，每次服 2 克，每日服

三次，连服七天。

(9) 火炭母五两　十大功劳根茎六两　骨炭二两　石榴皮二两　共研为细粉压片，每片重0.5克，每次服四片，每日四次。

(10) 凤尾草四两　每日一剂，水煎，分两次服。

(11) 金果榄散：金果榄　研细粉，每次服1克，每日三次，连服5～7天。

(12) 大青叶一两(鲜)　布渣叶一两(鲜)　辣蓼一两(鲜)　番石榴叶一两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。

(13) 古山龙一两　大青叶五錢　布渣叶五錢　番石榴叶五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

慢性菌痢：(1) 母草二至三两(鲜)　凤尾草一两(鲜)　野苋菜一两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 古羊藤散：古羊藤　明矾各等量　研为细粉，每次服一錢，每日三次，连服七天。

(3) 野菊花三錢　金银花藤五錢　陈皮二錢　布渣叶三錢　鸡血藤三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 人苋二两(鲜)　每日一剂，水煎，分两次服。

阿米巴痢疾：(1) 百部三錢　旱莲草一两　每日两剂，水煎，早晚分服。

(2) 鸦胆子仁十粒到十五粒　打碎，用龙眼肉包或装于胶囊內，日服三次，连服五至七天。

疟　　疾

病因症状　疟疾又叫“打摆子”。由按蚊传播。一般被带有疟原虫的按蚊叮咬后，二、三周发病。发病时先发冷，打寒战，盖很多被子也不行，接着就发高热，有剧烈的头痛，全身骨节痛，然后出一身大汗退热，病人感到非常疲倦。如此循环发作的，就是疟疾的特征。每天发作的常为恶性疟，隔日发作的为间日疟，隔两天发作的为三日疟。有些病人沒有彻底治疗，可以反复发作，逐渐贫血发黄，肝脾肿大，身体衰弱。不但影响身体健康，还会传染给别人，所以发现疟疾病人，要彻底治疗。预防疟疾要大力灭蚊，积极开展爱国卫生运动。

治疗原则　和解截疟。

处方

(1) 倒扣草或马鞭草一至二两　疟疾发作前二至三小时水煎服。

(2) 鹅不食草三两　每日一剂，水煎，分三次服(在发作前一小时服)。

(3) 叶下珠二两　水煎取浓汁，发作前二至三小时酒冲服。

(4) 黄皮叶二两　牡荆二两　每日一剂，水煎服。

肺结核(肺痨)

病因症状　本病是一种慢性传染病，在身体抵抗力差的时候容易受传染。一般是由排菌（结核杆菌）病人的痰和飞沫传染的。

初起时，病人自觉全身疲倦，不想吃东西，逐渐消瘦，胸闷胸痛，干咳少痰，午后有低热，口唇、颊部潮红，晚上有盗汗。

病情发展，咳嗽增多，咳泡沫痰、脓痰或痰中带血，有的可以发生大咯血。妇女常引起月经停闭。

重要问题是早期发现，早期治疗。根据初起

的症状及时进行检查，条件允许时，作爱克斯线透视或照片来确诊。

治疗原则　滋阴清热，补脾润肺。

处方

轻症：(1) 榄核莲五錢　十大功劳五錢　牛大力一两　每日一剂，水煎，分两次服。15～30天为一疗程。

(2) 穿破石一两　铁包金二两　百部三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

咳血或痰中带血：石蚕二錢　白鹤灵芝六錢　旱莲草六錢　每日一剂，水煎，分两次服。

急性支气管炎

病因症状　本病多因抵抗力减弱时（如患感冒时）细菌侵入所引起；其次吸入刺激性较强的尘埃、空气也可引起。常发生在秋冬或气候突然变化的季节。起病时很象感冒，头痛、鼻塞和周身不适，二、三天后症状不见好转，反而体温升高，喉痛，咳嗽增多，吐脓痰或粘稠的痰，同时感到胸骨后紧闷、酸痛，一周左右逐渐好转，但咳嗽常可延至二、三星期。

治疗原则　宣肺止咳，清热化痰。

处方

(1) 紫苏叶二錢　天门冬三錢　枇杷叶五錢　桑皮五錢　陈皮三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 鱼腥草一两　三十六根二錢　东风橘五錢　薄荷二錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 鸭跖草五錢　金银花藤五錢　野菊花五錢　地胆头五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 鲜大罗伞根一两　每日一剂，水煎，分两次服。

慢性支气管炎

病因症状　本病多因急性支气管炎反复发作、迁延日久而造成，肺结核、支气管哮喘、心脏病等也常并发本病。长期咳嗽，气候改变或冬天症状加剧，气候转暖时症状减轻。很少发热，吐粘液痰或脓痰。有时有气短胸闷。病程久的可引起肺气肿、支气管扩张。

治疗原则　润肺止咳，有脓痰时要清热化痰。

处方

(1) 天冬三錢　鬼针草五錢　百部三錢　山香三錢　枇杷叶三錢　陈皮二錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 蚌花叶五錢　木蝴蝶一錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 百部二錢　木贼二錢　陈皮二錢　白茅根一两　麦门冬二錢　枇杷叶二錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 木蝴蝶一錢　麦门冬三錢　鹅不食草二錢　百部二錢　陈皮二錢　木贼二錢　紫背金牛三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(5) 百部二錢　陈皮二錢　天门冬五錢　甘草二錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(6) 五指毛桃五錢　麦门冬五錢　十大功劳叶三錢　石菖蒲二錢　东风橘三錢　白茅根一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(7) 天文草三錢　木蝴蝶一錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(8) 白鹤藤五錢　陈皮三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

支气管哮喘

病因症状　本病发病原因还未十分明了，有人说是过敏引起的。往往在夜间突然发作。开始感到咽部、鼻腔发痒，咳嗽，打喷嚏，很快就喘不过气来，有哮鸣音，张口抬肩，不能平卧，额部出冷汗，面部发青，口唇发紫，颈部静脉鼓得很明显，每次发作，持续几分钟至几小时不等，往往随着吐出大量白色泡沫样痰逐渐缓解，发作间歇期间，一般沒有什么症状。多数病人在气候变化或天冷时发病，病情也较重，天暖时发病少，病情也较轻。

治疗原则　宣肺平喘。有热的要清热，久病体虚的要补虚，特别是补肾很重要。

处方

(1) 蝉蜕五錢　牡荆子五錢　将上药研为细末，炼蜜为丸，每丸重二錢，每次一丸，每日服三次。

(2) 胡颓子三錢　千日红二錢　七叶一枝花二錢　枇杷叶二錢　每日一剂，水煎，分两次服。或作为散剂，每次服五分至一錢，每日服二、三

次。

(3) 梧桐根皮五錢　冰糖一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 地龙四錢　桑叶一錢　天门冬三錢　百部三錢　骨碎补三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

大叶性肺炎

病因症状　本病多因突然受凉，抵抗力减弱，肺炎球菌乘虚而入所引起。常在冬季和早春发病。起病急，寒战，高热持续不退。病人感到一侧胸部剧烈疼痛，呼吸及咳嗽时加剧，因而不敢大喘气。开始常吐白色粘液泡沫痰，并常有血絲，后来变为铁锈色。重症病人，体溫很高，并出现神志昏迷或手足乱动，说胡话，有的四肢发冷，出冷汗，面色苍白，脉搏细数，血压下降，出现休克（中毒性肺炎），必须迅速抢救。

治疗原则　一般肺炎早期应清热解毒，后期宣肺化痰，中毒性肺炎要中西医结合抢救。

处方

(1) 榄核莲六錢　岗梅根一两　麦门冬五錢

麦斛五錢　白茅根一两　金银花五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 鱼腥草一两　桑白皮五錢　东风橘五錢　每日一剂，水煎，冲白糖分两次服。

(3) 七叶一枝花二錢　白花蛇舌草一两　田基黄一两　崩大碗一两　每日一剂，水煎，分两次服。

胃、十二指肠溃瘍

病因症状　本病发病原因还不十分明了。多和饮食不节，精神因素有关。主要症状是：(1)上腹部长期疼痛，到秋冬时增剧；(2)疼痛和饮食关系密切，胃溃瘍多在饭后一、两小时疼痛，十二指肠溃瘍多在饭后二、三小时疼痛，且有晚间空腹疼痛；(3)疼痛的性质，多有节律性的隐痛，或灼热痛，或刀割样痛，吃东西后可减轻；(4)病人常有嗳气，吐酸水，食欲不振，便秘等症状。严重的合并症是溃瘍出血（呕血、便血——拉漆黑的大便），溃瘍穿孔（上腹部突然发生剧烈的疼痛，腹壁强硬如木板），幽门梗阻（早晨吃了，晚上吐出）。以上三种严重的合并症都要及时抢救。

治疗原则　舒肝理气，活血散瘀，补脾健胃。如有出血的情况，应收敛止血。

处方

(1) 救必应胃散：救必应二两　海螵蛸四两　黑老虎二两　鸡骨香一两　两面针一两　共研为细粉，作成小颗粒，每服五分，每日三次。

(2) 毛蒟散：毛蒟　研为细粉，每次三分，每日三次。

(3) 溃疡定痛散：两面针根一两　鸡骨香二两　九里香一两　海螵蛸四两　甘草二两　共研为细粉，每服一錢，每日三次。

(4) 金香散：牛大力二两五錢　黑老虎二两　两面针根二两　陈皮五錢　海螵蛸一两五錢　香附一两五錢　共研为细粉，每服五分至一錢，每日三次。

(5) 复方金不換散：金不換四两　五指毛桃三两　甘草二两　陈皮一两　共研为细粉，每服一錢，每日三次。

(6) 复方水田七散：水田七四两　两面针根二两　十八症二两　炮姜一两　陈皮一两　共研为细粉，每服三至五分，每日三次。

(7) 紫珠散：紫珠叶　研为细粉，每服五分至一錢，每日三次。

紫珠叶一两　每日一剂，水煎，分两次服。（以上二方用于止血）

(8) 止血散：侧柏叶三两　仙鶴草三两　白茅三两　血余炭一两　共研为细末，每次一錢，每日三次。（用于止血）

急性胃肠炎

病因症状　本病多因暴饮暴食，吃了不洁食物引起。夏秋多发，特别是吃了腐败的肉类鱼虾等食物最易得本病。主要症状是剧烈呕吐和腹泻，开始吐不消化食物，以后吐又酸又苦的液体；水样大便，常带泡沫，有腐败臭气。肚子一阵阵的痛，头昏头痛，发热，口干舌燥，尿少而黄。脉数，舌苔黄厚。

治疗原则　清热化湿，消食导滞。

处方

(1) 火炭母五钱　大青叶五錢　鴨跖草五錢　番石榴叶三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 鬼针草一两　刺苋菜一两　金银花藤五

錢　鸡旦花三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 风沙藤一两　两面针根五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 算盘子根五錢　入地龙叶一两　番石榴叶一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(5) 大青叶三錢　番石榴叶三錢　鸭跖草三錢　火炭母三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(6) 岗稔叶一两　番石榴叶一两　高良姜二錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(7) 火炭母、骨炭、番石榴叶等量　研为细粉，每次服一錢，每日三次。

(8) 岗稔根二两　阴香一两　金银花藤三两　十大功劳根二两　共研为细粉，每次服八分至一錢，每日三次。

慢性胃炎

病因症状　本病多由急性胃炎转变而来。饮食不节，过冷过热，长期吃刺激性食物亦可诱发。主要症状：心窝部隐痛，食后胃部不适，食欲不振，消化不好，嗳气吞酸，恶心，甚至呕吐。偏热的手足不冷，口干，大便干，面红，喜冷食，

苔黄厚，脉弦；偏寒的手足冷，口不渴，大便稀，面苍白，喜吃热的饮食，舌苔薄白，脉多沉；气痛的如有气上冲，痛如针刺，胃肠胀满，屁多，吐酸水，胃部有灼热感。

治疗原则 偏热的清热止痛；偏寒的温中助阳；气痛的行气止痛；胃酸缺乏的滋阴益胃；胃酸偏高的舒肝理脾。

处方

寒症：(1) 单根木五錢 香附三錢 金不換三錢 曼陀罗花五分 假茼三錢 每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 复方胃痛散：良姜二錢 山茼根二錢 两面针一錢 十八症一錢 乌贼骨四錢 共研为细末，每次服五分，一日三次，饭后服。

热症：(1) 两面针 十大功劳 水田七各五錢 每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 三棪苦三錢 火炭母五錢 九里香三錢 两面针三錢 每日一剂，水煎，分两次服。

一般胃痛：鸡蛋壳五錢 救必应三錢 黑老虎三錢 白茭三錢 石菖蒲一錢 共研细粉，每次服一錢，每日两次，饭后服。

胃酸缺乏，石斛或石仙桃四錢　牡荆三錢　麦冬三錢　糯米根三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

胃酸偏高：黃连一两　阴香皮一两　研粉，每服五分，每日三次。

便　秘

病因症状　本病常因某些慢性疾病，尤其是肠道、肛门疾病所引起，和精神因素也有关系，也有的是习惯性的。主要症状是排便困难，几天才大便一次，也有一天拉几次，但每次量很少，大便坚硬，很不畅快，并有腹胀，食欲不好，口苦，头痛等。

治疗原则　要查清原因进行治疗，一般是润肠通便。

处方

(1) 三棱苦六錢　每日一剂，水煎冲红糖服。

(2) 虎杖一两　每日一剂，水煎服。

(3) 土大黃三錢　石黃皮三錢　每日一剂，水煎服。

(4) 通便丸：虎杖（微炒）一斤　松花粉二两

地胆头(炒)四两　共研为细末，水泛为丸，如绿豆大，每服十至十五粒，每日两次。

(5) 草决明一至二两．煎水代茶饮。

蛔　虫　病

病因症状　本病是一种常见的肠道寄生虫病，多见于儿童。原因是吃了带有蛔虫卵的蔬菜或其他食物（儿童主要是因玩泥土，手上污染蛔虫卵，再抓东西吃而感染），虫卵在人体内逐步发育成为蛔虫而致病。蛔虫寄生在小肠里，可以由几条到一百多条。虫少时可以全无症状；虫多时经常有腹痛，不想吃东西，消化不好，腹胀，大便时干时稀，小孩面上有白色的虫斑，身上好起风疹块，有时大便可以拉出成虫，口中也可以吐出。

蛔虫病一般沒有什么危险，但蛔虫钻进胆道內造成胆道蛔虫病；或蛔虫在肠內扭成一团，可以发生肠梗阻。遇到这些情况，要中西医结合及时治疗。

治疗原则　消积驱虫。

处方

(1) 两面针五錢　穿破石五錢　十大功劳一

两　每日两剂，水煎服。亦可试用于胆道蛔虫病。

(2) 鸡矢藤一两　刺桐叶一两　共研为细粉，每服五分至一錢，每日一至二次。

(3) 苦楝根皮四錢　槟榔五錢　水煎，每日一剂。（苦楝根皮用时，要去掉外面红皮）

蛲　虫　病

病因症状　本病多见于儿童，但成人也有感染的。蛲虫常于夜间爬出肛门，在肛门周围产卵（虫体长一厘米左右，为白色线条样，肉眼可见到），因而引起肛门奇痒。患儿常用手抓肛门而被虫卵污染手指，小孩咬手指或抓东西吃时，又可将虫卵吞入体内反复感染。在家庭或集体单位，还可以通过衣服、被褥等物品互相感染。患有蛲虫病的小孩，除肛门奇痒外，还可发生食欲不好，大便多，晚间哭闹不安。

治疗原则　杀虫止痒。

处方

葫芦茶 20 克　百部 20 克　凡士林 60 克　将葫芦茶、百部烤干压粉，加凡士林配成软膏。每

日一次，外涂肛门周围。

肾　　炎

病因症状　本病多因受凉、疲劳过度或与某种细菌感染有关，有的常在患上呼吸道炎、疖疮、扁桃体炎后发生，多见于儿童。急性的典型症状是：颜面、下肢有明显的浮肿，少尿，尿中有血和蛋白，腰痛，发热，血压偏高，并有头痛、头昏、呕吐等症状。慢性肾炎是由急性肾炎转化而来，病人经常有轻度浮肿，尿中有红血球、蛋白，由于贫血，皮肤和粘膜都出现苍白，病人精神很不好，不想吃东西，后期可以发生高血压，尿毒症。

治疗原则　急性肾炎应清热利湿，慢性肾炎应健脾温肾。

处方

急性肾炎：(1) 大青叶五錢　古山龙三錢　地胆头一两　车前草一两　淡竹叶五錢　白茅根一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 白花蛇舌草一两　川谷一两　白茅根一两　车前草五錢　叶下珠五錢　每日一剂，水煎，分

三次服。

(3) 金錢草两半　玉米须一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 路兜簕根一两　每日一剂，水煎，分两次服。

慢性肾炎：(1) 大金不换一两　金樱子二两　研末，每服一錢，每日三次。

(2) 十大功劳一两　粪箕笃二两　白茅根一两　车前草一两　叶下珠三两　上药共研为细粉，炼蜜为丸，每丸三錢，每次服一粒，每日服三次。

(3) 粪箕笃一两　鹰不泊一两　阴香五錢　苡米一两　水煎服，每日一剂。

风湿性关节炎

病因症状　本病一般叫风湿骨痛，多因受风、受潮、受寒而发病，也可能与某种细菌感染有关。急性典型症状是发热和关节肿痛，成年病人发热都不很高，而儿童较高，其特点为游走性、多发性关节炎，常见于膝、踝、髋、肘、肩、腕等大关节。局部有红肿热痛和活动不便，好了以后，不留什么痕迹，严重的可以并发风湿性心

脏病。慢性的主要症状是：经常有关节、肌肉酸痛，天气变化如骤冷、阴湿、刮风、下雨，症状就加重。

治疗原则 急性的应清热去湿，活血通络。慢性的要在去风湿的基础上，补气养血，强筋壮骨。

处方

急性：(1) 走马箭一两　牛白藤一两　大叶风沙藤一两　走马胎一两　山苍树一两　每日一剂，水煎服。

(2) 金刚藤一两　算盘子根五錢　蛇泡簕一两　金银花藤一两　榕树须一两　每日一剂，水煎服。

(3) 宽筋藤五錢　钩藤根一两　桑寄生一两　三桠苦根一两　每日一剂，水煎服。

慢性：(1) 铁包金二两　牛大力三两　岗稔二两　半枫荷三两　黑老虎二两　鸡血藤三两　两面针二两　将上药混合研成粉末，炼蜜为丸，每丸重三錢，每日三次，每次服一丸。

(2) 宽筋藤五錢　山苍树五錢　大血藤五錢　骨碎补二錢　每天一剂，水煎服。

(3) 黑老虎　大叶风沙藤　山鸡血藤　山苍

树　三桠苦　阴香各五錢　每天一剂，水煎服。

(4) 黑老虎二两　金樱根三錢　阴香五錢　半枫荷五錢　三桠苦五錢　过江龙八錢　两面针一两　山苍树六錢　鸡血藤一两　大罗伞根五錢　千斤拔八錢　仙茅二錢　青筋藤一两　共研为细粉，每次服一錢，每日三次。

(5) 七叶莲酒：七叶莲二斤，浸酒五斤，十五天后可用。每日三次，每次服 10～15 毫升或外搽患处。

(6) 宽筋藤五錢　山苍树根五錢　山鸡血藤五錢　骨碎补三錢　益智三錢　每日一剂，水煎服。

贫　血

病因症状　这里介绍的是一般疾病所引起的贫血，如痔疮出血，月经过多，胃肠道出血，钩虫感染等。主要症状是：头昏眼花，心跳，疲乏，胃口不好；同时病人皮肤、粘膜的颜色变成苍白，特别在指甲、手掌、耳垂、眼结膜比较明显。

治疗原则　要找出贫血的原因，首先治本，

同时在健脾胃的基础上补气养血。

处方

(1) 山鸡血藤3斤　切碎，加水适量，久煎，然后过滤去渣，再浓缩至500毫升，服时加少量米酒，每日三次，每次15至20毫升内服。

(2) 地稔五錢　岗稔果三錢　山鸡血藤一两　土党参五錢　黃花倒水莲三錢　牛大力一两　每日一剂，水煎，分两次服。

神经衰弱

病因症状　本病多因精神长期紧张，或生活不规律所引起。主要症状是：头晕，头痛，疲乏，记忆力减退，心烦易怒，失眠多梦；有的还有心跳气短，耳鸣，食欲不振，胀气，遗精，阳萎等症状。

治疗原则　补肾安神。

处方

(1) 豨莶草一两　钩藤一两　苍耳子二錢　每日一剂，水煎服。（用于失眠）

(2) 夜香牛六錢　松针一两　酢浆草五錢　红枣五个　每日一剂，水煎服。（用于失眠）

(3) 巴戟天四錢　金不換三錢　豨莶草八錢　钩藤四錢　每日一剂，水煎服。（用于遗精）

(4) 松针一两半　磨盘草八錢　每日一剂，水煎服。（用于头昏耳鸣）

多汗症、盗汗

病因症状　多汗症的原因不大清楚，有些是发生在传染病、重病好了以后；有些是因为得了中毒性甲状腺肿大和神经衰弱。症状是全身或一个部位出汗，通常好发于头、颈部、手掌、足底。气候炎热、情绪激动时，汗更多，有的晚上睡觉常湿透衣服，盗汗多见于结核病、佝偻病、糖尿病，常常是睡后病人出大量虚汗，以头、胸部为多。

治疗原则　固表止汗。如果是由其他疾病引起的应同时治疗原发病。

处方

(1) 糯稻根一两　每日一剂，水煎服。

(2) 鲜桑叶焙干研成粉末，水泛为丸，用米汤送服，一日三次，每次一錢。

(3) 千斤拔一两　每日一剂，水煎服。

头　　痛

病因症状　头痛的原因很多，常见的病症有以下两种：

(1) 偏头痛：头痛偏于一侧，常牵扯眼睛作痛，亦可扩展到整个头部。头痛是发作性的，可以持续几小时到几天。多见于年青妇女。易发脾气，常伴恶心，呕吐，睡眠不好。

(2) 气虚头痛：头痛时发时止，早晨比晚上厉害。疼痛的部位不定，休息一下好一些。同时多伴有头昏耳鸣，失眠多梦，心跳气短，精神紧张，记忆力不好。舌淡无苔，脉虚软。

治疗原则　偏头痛，宜舒肝解郁；气虚头痛，应益气补脾。

处方

偏头痛：(1) 白千层皮三錢　白茅根一两　大青根一两　每日一剂，水煎，分二次服。

(2) 蔓荆子三錢　野菊花四錢　草决明六錢　香附三錢　每日一剂，水煎服，或代茶饮。

气虚头痛：(1) 桑寄生八錢　单根木三錢　益智仁二錢　豨莶草四錢　每日一剂，水煎服。

(2) 苍耳子三錢　土党参三錢　榕树须五錢　五指毛桃五錢　地桃花五錢　每日一剂，水煎服。

肋间神经痛

病因症状　本病发生的原因很多，一般常见的是因胸膜炎、肺炎、肋骨骨折、肋间神经发炎或受压等所引起。主要症状是一个或几个肋间疼痛，在咳嗽、打喷嚏、深吸气时加剧，象一条带子束住胸部一样。疼痛常向肩背放散。

治疗原则　清热，祛湿、止痛。

处方

(1) 两面针三錢　樟木三錢　巴戟天三錢　楮木三錢　古山龙三錢　牛大力五錢　千斤拔五錢　每日一剂，水煎服。

(2) 夜香牛二两　救必应三錢　酢浆草五錢　大叶风沙藤五錢　每日一剂，水煎服。

坐骨神经痛

病因症状　本病是许多疾病的一个症状。最常见的原因是风湿、腰部扭伤，腰椎间盘突出和

过度负重，也可因其他疾病引起。成人多见。主要症状是：病人一侧腿痛，开始腰酸，僵直，伸腿时疼痛，以后逐步发展成剧痛。疼痛先自臀部或下腰部开始，然后顺大腿后侧下行至足背外侧。病人感到弯腰、抬腿困难，走路时脚跟不敢着地。

治疗原则　祛风除湿，活血散瘀。

处方

(1) 半枫荷五錢　两面针根五錢　三桠苦根一两　山葯五錢　山苍根五錢　过江龙五錢　每日一剂，水煎服。服药时可加少许米酒。

(2) 丢了棒一两　寮刁竹三錢　宽筋藤一两　走马箭五錢　每日一剂，水煎服。

三、外科疾病

常见的皮肤感染

病因症状

1. 疔：疔是夏秋常见的疾病，民间叫“疔子”，长在颜面等重要位置的叫疔。多因细菌侵

入皮肤上的一个毛囊和所属皮脂腺所致。初起时是一个圆形突起的小硬结节，逐渐红肿，热痛。几天后化脓变软，皮薄发亮，很快就穿头。好发于头、面、颈、背及臀部，多见于炎热季节，儿童比较多见。面部的疖要特别注意，不能用手挤压，以免感染扩散，发生败血症（中医叫疔疮走黄）。

2. 痈：痈是许多毛囊和皮脂腺发炎融合而成的。多发生在背部、后颈部、衣服容易磨擦的地方。痈和疖不同，局部皮肤呈大片坚硬的酱红色肿胀，疼痛剧烈，破溃后可见多个“脓头”。病人有较重的全身症状，如寒战、发热、头痛、全身不适等。长在脸上或背部的痈，处理不好，容易发生败血症，要特别注意。

3. 脓肿：脓肿是组织或器官里边化了脓，脓液积在里边排不出来形成一个脓腔，和正常皮肤肌肉有明显的界限，患处有红、肿、痛、热，手压有一种波动的感觉。

4. 蜂窝组织炎：蜂窝组织炎，是发生在皮肤以下、肌肉以上的急性化脓感染。它和脓肿又不一样，炎症的边界不清楚，向四周迅速扩散，摸

上去沒有波动感，红肿较硬。一般都有全身症状，如发冷发热，全身不适，食欲不振等。

5．丹毒：丹毒也是一种急性感染性疾患。多发于颜面、下肢。病人感到突然发冷发热，头痛，全身不舒服。患部皮肤出现小片红肿（鲜红色），扩展很快，边缘稍突起，和正常皮肤有明显的界限。炎症向外蔓延时，中部的红肿就逐漸减退。

治疗原则　一般的皮肤感染，已经成脓尙未穿头的要切开排脓，炎症正在发展的要清热解毒，散瘀消肿。

处方

內服：(1) 半边莲二两　白花蛇舌草二两　槟核莲五錢　每日一至两剂，水煎服。

(2) 羊蹄草二两　地胆头一两　母草一两　野菊花一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 崩大碗一两　单根木三錢　淡竹叶五錢　鹅不食草三錢　路兜簕(果)五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 刺黄连五錢　槟核莲五錢　金银花三錢　野菊花三錢　七叶一枝花二錢　每日二剂，水煎

服。

外用：(1) 消炎散：三極苦叶四两　侧柏叶二两　山大颜二两　盐肤木二两　共研为细粉，用时加适量开水调匀，放入适量酒外敷。

(2) 消炎膏：半边莲一两　蒲公英一两　田基黄一两　土荆芥一两　旱莲草五錢　乌桕五錢　刺黄连一两　共研为细末，加冰片五分，再加凡士林至一斤，调成软膏，外敷。

(3) 外用消炎酒：鲜鸡矢藤 700 克，鲜小飞扬 200 克　切碎，加入 50% 酒精 1000 毫升，搅匀，滤汁备用。用时以棉花或纱布蘸药湿敷，每日二至四次。

(4) 消肿散：九里明　潺槁叶各等量　晒干研粉，用时以凉开水或盐水调匀敷患处。

(5) 木芙蓉花或叶 25 克　凡士林 75 克　调匀成膏，涂敷患处。

(6) 古山龙 16 克　三極苦 12 克　单根木 12 克　研粉，加凡士林 60 克　制成软膏，外敷患处。

(7) 犁头草　羊蹄草　火炭母各等量　洗净，捣烂成糊状，外敷，每日两次。

(8) 九里明　马缨丹叶花各适量　捣烂成糊状，外敷患处，每日一至二次。

(9) 雾水葛全草(鲜)，捣烂外敷患处，每日一次。

(10) 老鼠拉冬瓜　旱莲草　崩大碗　龙葵各适量　捣烂敷患处，每日一次。

(11) 鱼腥草适量　捣烂外敷患处，每日一至二次。

下肢溃疡

病因症状　本病发生于小腿胫骨前面，民间也叫“臁疮腿”，多由于长疮或碰破感染，久不愈合所造成。因为这个地方沒有肌肉，皮下就是骨头，血液供应不丰富，皮肤溃烂以后，很不容易好，拖延日久就变成了慢性溃疡。溃烂的地方常流脓流水，有特殊臭味，周围皮肤变薄、变黑，经常伴有湿疹。

治疗原则　清热解毒，生肌收口。

处方

(1) 乌檀四两　煎水，洗患处，每日一次。

(2) 羊蹄草　酢浆草　漆大姑各等量　磨粉撒

患处，或配成30％的软膏敷患处，每日两次。

急性乳腺炎(乳痈)

病因症状　急性乳腺炎也叫乳痈。产后喂奶的妇女容易发生，初产妇发生的更多。多半因乳头破伤被细菌感染引起。开始的时候乳房中出现一个硬块，红肿热痛，乳汁流出不畅，不及时治疗可以变成脓肿，穿头溃烂。病人恶寒发热，头昏头痛。有的病人只见肿痛，不见明显的发红，这是因为病变在乳房深部的缘故，更应当注意。

治疗原则　早期治疗宜清热解毒，散瘀通乳。

处方

(1) 仙人掌适量剝去外皮，捣烂，加入白酒调匀外敷。

(2) 单根木一两　每天一剂，水煎服。

(3) 鸭跖草（鲜嫩部分）二两　蒲公英一两　犁头草一两　每天一剂，水煎服。或用鲜品捣烂敷患处。

(4) 犁头草二两　羊蹄草二两　金银花藤一两　木通三錢　每日二剂，水煎，分两次服。

(5) 木芙蓉叶或花　捣烂敷患处。

急性阑尾炎

病因症状　本病是一种常见的腹部外科急症，中医叫肠痈。起病时，病人先感到肚脐周围或上腹部疼痛，以后就转到右下腹部。有恶心、呕吐、发热。在右下腹部有明显的压痛，局部的肌肉很紧张，病人往往不让人触及痛的地方，平臥时右腿不敢伸直。

治疗原则　早期发现，及时服药，但要密切观察，如症状严重，或小儿患者（小儿容易早期穿孔），最好早期手术。内服中草药主要是清热解毒，散瘀止痛。

处方

(1) 白花蛇舌草五两　羊蹄草二两　两面针根三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 田基黄三两　白花蛇舌草三两　每日两剂，水煎服。

(3) 野菊花一两　橄核莲五錢　水煎，每日二剂，分服。

痔

病因症状　本病主要原因是直肠的下段静脉

曲张，血流不畅。长期大便干燥、妊娠、坐着工作很少活动的人容易发生。一般分为：

(1) 內痔：长在肛门里边粘膜下。大便时疼痛流血，血是鲜红色的，同大便不混。內痔发展到一定程度，就会脱出肛门外，开始仅在大便时脱出，便后能自行缩回，以后逐渐发展就不能自行缩入而须用手托回去。如经常脱出时，由于反复磨擦而发炎、水肿，或由于脱出的痔的基部受压而使血流不通，血管里面发生血栓(血液凝块)以致感染坏死(痔核嵌顿)。这时病人感到剧烈疼痛，并有发冷发热等症状。

(2) 外痔：长在肛门周围皮肤的下面。一般沒有症状，当其血管破裂发生血栓时，则产生剧痛，并有压痛和局部发紫，在大便、走路、坐下、咳嗽时，都可加重疼痛。

治疗原则　活血散瘀，清利湿热。出血的宜凉血止血。

处方

(1) 卷柏五錢　每日一剂，水煎，分两次服。(用于痔疮出血)

(2) 过塘蛇三两　田螺三个（去壳）　每日一

剂，水煎，分两次服(用于消肿)

(3) 刺黄连一两　十大功劳一两　金银花藤一两　漆大姑一两　煎水熏洗患处或湿敷脱出的痔核，帮助缩回(用于痔核嵌顿)。

脱　　肛

病因症状　直肠下端脱出肛门外叫做脱肛。多见于儿童、老年人和多次分娩的妇女。肠炎、痢疾、膀胱结石、长期咳嗽，常引起脱肛。初病时，每次脱出只有很小一段，能自行缩回；病久以后，脱出的肠段加长，并要用手托回；再严重时，每逢咳嗽、打喷嚏、搬重东西，都可以脱出。脱出的直肠粘膜由于经常受磨擦，常发生慢性炎症，局部发生溃烂或变硬，造成回缩困难。个别病人由于脱出后肛门括约肌痉挛，引起绞窄，可以发生直肠坏死，要迅速治疗。

治疗原则　补气升阳，有炎症时要清热解毒。

处方

(1) 红蓖麻叶　白背叶各适量　煎水熏洗，每天一次。

(2) 五指毛桃一两　千斤拔一两　土党参五錢　十大功劳一两　每日一剂，水煎服。

尿路感染

病因症状　本病多见于男女青年。发病原因多由于外生殖器不清洁，受了细菌的感染而引起。有的整个尿路同时发病，有的只发生在一个器官，如膀胱或尿道，但以发生在肾盂为多。急性的起病很急，畏寒，发热，腰痛，尿频、尿急，下腹部不适(膀胱炎)，尿痛(尿道炎)，但每次尿量很少，尿非常混浊。急性期治疗不彻底，可以变为慢性。

治疗原则　急性期要清利下焦湿热，慢性期还要补肾健脾加用凉血解毒药物。

处方

(1) 白花蛇舌草二两　金银花藤一两　叶下珠一两　野菊花五錢　每日一剂，水煎，分两次服。(也适用于膀胱炎)。

(2) 金錢草二两　海金沙藤一两　羊蹄草一两　车前草一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 紫茉莉一两　猫须草二两　羊蹄草一两

每日一剂，水煎，分两次服。

⑷ 金絲草一两　葫芦茶一两　白茅根一两　刺黃连一两　每日一剂，水煎，分两次服。

尿路结石

病因症状　尿路结石也叫石淋、砂淋。就是在肾脏、输尿管、膀胱等处有了尿结石，有的一块，有的几块，尿不出来。主要症状是腰部钝痛，发作时有阵发性绞痛。肾结石疼痛从腰部开始，沿输尿管向下放散；膀胱结石疼痛多在下腹部，向会阴部放散。多伴有恶心、呕吐。疼痛后则出现血尿，运动后或劳动后加重。膀胱结石，若堵塞尿道，就出现排不出尿的现象。

治疗原则　利水通淋。

处方

⑴ 车前草五錢　金錢草五錢　冬瓜皮五錢　白茅根五錢　干地龙一条　每日一剂，水煎，分两次服。

⑵ 穿破石根五錢　两面针五錢　千斤拔一两　车前草一两　每日一剂，水煎，分两次服。

⑶ 金錢草一两　海金沙藤五錢　滑石五錢

车前草三錢　白茅根五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 白花蛇舌草二两　羊蹄草二两　海金沙藤一两　车前草一两　每日一剂，水煎服。

(5) 穿破石一两　红乌桕根五錢　石韦一两　海金沙藤一两　每日一剂，水煎服。

扭　伤

病因症状　在劳动和生活中不小心，四肢的某一关节常被扭伤。最常发生的部位有踝、肘、膝、腕等关节，腰部也容易发生。较轻的扭伤，局部有些疼痛，轻微肿胀，活动不便，三、五天自愈。但是重度扭伤，局部立即肿胀，皮肤变青紫(皮下瘀血)，疼痛严重，受伤的关节不能活动，需要较长时间才能恢复正常。

治疗原则　活血去瘀，舒筋活络。

处方

(1) 大罗伞一斤　小罗伞半斤　白花丹一两　韭菜根四两　香附一两　三棱苦一两　鸡骨香三两　小驳骨四两　两面针根皮二两　三加皮叶四两　上药共捣烂，酒调外敷患处，每日一次。

(2) 大罗伞根三两　盐肤木三两　火炭母二两　酢浆草二两　晒干研末备用，同时加醋或30%酒精调匀，外敷患处，每日一次。

(3) 木棉树皮　救必应　小驳骨　九里香叶田基黄各等量　捣烂加30%酒精调匀，外敷患处，每日一次。或研粉，酒、醋调敷患处。

(4) 鹅不食草,酢浆草　韭菜根　透骨消　旱莲草　取鲜药各五錢至一两，捣烂炒热加酒敷患处，每天换药一次。

(5)丁哥王　研末，加酒适量调敷患处。

(6) 鱼藤根皮五两　潺槁树皮二两　将上药捣烂，加少许酒炒热，敷患处。

骨　折

病因症状　骨折多半是受外力的打击如车撞、重物挤压等所致；但也有因跌倒，投掷重物用力过猛造成的。骨折的症状：(1)严重损伤时有剧烈的疼痛，面色苍白，出冷汗，脉细数而弱，烦躁不安，血压下降以致休克。(2)受伤的局部肿胀，皮下出血变紫，压痛明显，肢体显著变形，触动折断部位可以听到骨的摩擦音。脊柱骨折可

以出现瘫痪。(3)开放性的骨折，局部的皮肤肌肉都破裂，伤口和外面相通，很容易感染。

治疗原则 严重的或开放性的骨折要中西医结合治疗，休克病人要及时抢救。总的要求必须很好的复位固定，避免感染，力求恢复正常功能，减少残废。用中草药，早期活血去瘀，消肿止痛；中期续筋接骨，后期舒筋活络，恢复功能。

处方

(1) 大驳骨 小驳骨 苯 泽兰 骨碎补 透骨消 取鲜药各适量，共捣烂，炒热加50%酒精，复位后敷患处，一至二天换药一次。

(2) 大驳骨 小驳骨 泽兰 千打锤 崩大碗 苦楝树叶 九节茶 以上鲜药各一至二两，捣烂炒热加酒，敷患处，每日一至二次。

(3) 梧桐树叶 木贼草 苦楝树根 红絲线 九节茶各适量 捣烂外敷患处，每日一次。

(4) 山大颜 侧柏叶 盐肤木 瀑稿皮 九节茶各等量 研为细粉，酒醋调敷患处。

(5) 红絲线一两 大驳骨一两 小驳骨一两 九节茶一两 两面针五錢 泽兰五錢 每日一剂，煎水，分两次服。

损伤性腰腿痛

病因症状 一般分急性慢性两种。急性的多因突然受到闪扭所致，如劳动时用力过猛，搬或挑东西过重，或走路跌倒等。病人感到受伤的腰腿很痛，不敢活动，重者翻身、走路都很困难。检查骨头沒有病变，主要是软组织的损伤。患部有明显的压痛点。慢性的多因长期一个姿式劳动，或多次扭伤未彻底治好而引起。病人腰腿经常隐隐作痛，久坐久立，或走远路过劳后加重。

治疗原则 急性的舒筋活络，活血去瘀，慢性的还要补肝肾、强腰膝。

处方

急性：(1) 大罗伞一两 山苍树根一两 半枫荷一两 三桠苦根一两 龙须藤五錢 杜仲藤五錢 每日一剂，水煎服。

(2) 威灵仙三錢 九层塔三錢 大叶风沙藤四錢 杜仲藤二錢 大血藤五錢 千斤拔五錢 每日一剂，水煎冲酒，分三次服。

(3) 大罗伞 桃叶 酢浆草 横经席(鮮)各适量 捣烂，加面粉少许，局部外敷。

⑷ 三棓苦一两　鹅不食草二两　生姜适量捣烂炒热，加酒适量，外敷患处，每日一至二次。

慢性：⑴ 横经席三錢　阴香三錢　山苍树根五錢　过江龙五錢　山鸡血藤一两　半枫荷一两　杜仲藤五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

⑵ 龙须藤五錢　杜仲藤五錢　五指毛桃五錢　半枫荷五錢　牛大力五錢　九层塔三錢　威灵仙三錢　每日一剂，水煎冲酒，分两次服。

⑶ 大罗伞三两　酢浆草二两　透骨消二两　豺皮樟二两　两面针一两　三棓苦根一两　共研细末，炼蜜为丸，每丸重三錢，每日服两次，每次一丸。

⑷ 半枫荷五两　小罗伞一斤　山苍树根五两　两面针五两　千斤拔二两　过江龙五两　三棓苦三两　鸡骨香二两　一朵云五两　三加皮五两　九里香三两　杜仲藤六两　小驳骨二两　细叶双眼龙三两　山鸡血藤一两　茶油、黄丹各适量　熬成膏药，贴于患部，每贴用五至七天。

烧、烫伤

病因症状　本病民间也叫“烫火伤”。除火

焰、热水、热蒸气外，生石灰，烧碱、硫酸、盐酸等强碱、强酸也可以造成烧伤。按皮肤受损害的深浅，可以把烧伤分为三度。一度，只伤到表皮浅层，皮肤发红，不起水泡，除非面积太大，一般不发生全身反应，不治疗或稍加处理，过几天就会好。二度，是伤到了表皮以下，皮肤起水泡，水泡周围有水肿，有时表皮脱落，有剧烈疼痛。由于伤的面积大小不同，全身症状有轻有重，一般都有发烧、头昏、头痛这些现象。小面积的二度伤，如果创面处理得好，一般二至三星期就可以治好，面积大时，就要同时使用有效的全身疗法。三度，皮肤受伤更深，达到了皮下组织，甚至肌肉和骨胳，伤部皮肤往往成黄灰色，或成了焦痂，创面干燥不流水，象皮革一样坚硬，没有痛觉，周围的皮肤可以有水肿，病情严重的，要很好抢救。

治疗原则　严重的烫火伤，要中西医结合治疗。局部治疗用的中草药，应选用清热、收敛、止痛、生肌的药物。

处方

(1) 栀子粉二两　　杠板归粉二两　　麻油八两

蜂腊一两　将麻油煮开后放入栀子粉、杠板归粉，药变黄后去火，放入蜂腊搅匀，放冷后装瓶。用时薄涂患处，纱布复盖。

(2) 入地龙根和叶　研成细粉，调茶油或麻油涂患处。

(3) 刺黄连　入地金牛各等量　研成细粉，作成 15% 麻油混悬液，涂患处。

毒蛇咬伤

病因症状　本病为毒蛇咬伤后引起。咬伤的部位常可看到二个、三个、四个齿痕，并有凝血点或伤口出血不止。症状分：

(1) 阴症：病人被咬后，局部发麻，或微痒，很快波及全身，头晕眼花，视物模糊，嗜睡昏迷，呼吸困难，甚至呼吸停止，常见于被银环蛇、金环蛇咬伤。

(2) 阳症：伤口周围很快肿胀发硬，灼痛，而且不断地向周围蔓延，局部出现水泡溃烂；发高烧，有的全身出血，也可出现昏迷。常见于被五步蛇、眼镜蛇、竹叶青蛇咬伤。

治疗原则　严重的要中西医结合，进行抢救。

使用中草药时，对于阴症应通窍醒神，解毒；对于阳症应清热解毒，消肿止痛。

处方

(1) 半枝莲二两　白花蛇舌草二两　一支黄花二两　独脚乌桕五錢　每日两剂，水煎服，早晚各服一剂。

(2) 两面针叶五錢　田基黄二两　黄皮叶五錢　小叶买麻藤五錢　虎杖五錢　鬼针草一两　每日一剂，水煎，分两次服，药渣可外敷伤口周围。

(3) 三角草二两　韩信草二两　水芙蓉五錢　每日一至二剂，水煎服，药渣可再煎洗患处。

(4) 七叶一枝花三錢　半枝莲一两　榄核莲一两　白花蛇舌草一两　每日一至二剂，水煎服。

(5) 两面针根五錢　七叶一枝花五錢　水芙蓉三錢　九里香五錢　单根木五錢　独脚乌桕五錢　田基黄五錢　半边莲五錢　上药切碎加白酒一斤，浸泡7～10天，每次口服一两，每日三次，也可外擦肿胀部位。

毒虫咬螫伤

病因症状　最常见的是蜈蚣咬伤，蝎子、黄

蜂螫伤。被螫处很快发生烧灼似的疼痛，并出现红肿。一般经局部处理后，症状可以迅速消退。但有少数病人，可以出现头昏、头痛、恶心、呕吐，甚至出现虚脱。

治疗原则　有全身症状特别是出现虚脱的，要迅速进行抢救。一般情况可以只做局部处理，解毒、止痛。

处方

(1) 两面针根皮　单根木根各适量　捣烂外敷。

(2) 岗松(鲜)适量　捣烂外敷。

(3) 大青叶　薄荷叶各适量　捣烂外敷。

(4) 三極苦叶适量　捣烂外敷。

癌　肿

病因症状　癌肿的原因还不明了。一般来说，40岁以上的人多见。现将几种常见癌肿的早期症状分述如下：

鼻咽癌(南方多见)多有不明原因的鼻出血和患侧断续性头痛。食道癌（北方较多）有吞咽不适。胃癌常有胃部不适，消化不良，食欲减退。

肝癌常有食欲不振，消化不良，恶心和呕吐等，以后可有右上腹胀痛和肝逐渐肿大（肝很硬，表面不平）。直肠癌常有便血，大便变形。肺癌早期可能无症状，一般有咳嗽、咯血和胸痛等。乳腺癌早期表现为无痛性孤立肿块（可以推动）。子宫颈癌常有白带增多和不规则的阴道流血。

以上这些癌肿的早期症状都不是绝对的，只是提出便于大家及时注意，争取早期发现，早期治疗。

处方

(1) 葵树子一两　每天一剂，加等量瘦肉，水煎服。（适于鼻咽癌、食道癌）

(2) 白花蛇舌草二两　半枝莲一两　每天一剂，水煎服。（适于早期肺癌、肝癌、直肠癌）

四、五官科疾病

急性结膜炎

病因症状　本病俗名“暴发火眼”。多因卫生情况不好，细菌感染所致。共用一条面巾或一个

面盆，可以互相传染。主要症状是结膜发红，水肿，眼皮浮肿。开始有刺痒感或象砂粒入眼一样的磨擦感。重时则有发热，流泪，怕光，分泌物很多，早晨醒来眼皮常被分泌物粘连一起而睁不开。翻开眼皮检查可见结膜明显充血，有很多半球形突出的泡状物(滤泡)。

治疗原则　清肝明目，凉血解毒。

处方

(1) 羊蹄草(鲜)二两　洗净捣烂榨汁过滤消毒滴眼。每日二至三次。

(2) 古山龙藤二两　山栀子一两　加水 1000 毫升，煎成 500 毫升，过滤去渣，一天三次洗眼。

(3) 羊蹄草、崩大碗、旱莲草各一錢　叶下珠二錢　上药捣烂加鸡蛋清适量，调匀，睡前敷患眼。(亦可用于角膜溃瘍、麦粒肿)。

(4) 谷精草五錢　星宿菜三錢　蒲公英五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(5) 桑叶三錢　野菊花四錢　金银花藤一两　草决明五錢　木贼一两　每日一剂，水煎，分两次服。

化脓性中耳炎

病因症状 本病有急慢性两种。多见于儿童。

急性化脓性中耳炎，常因外耳道损伤，游泳时耳内进入污水，被细菌感染所致。开始耳内疼痛，或觉耳内有阻塞、压迫感，然后出现疼痛。疼痛非常剧烈，有如胀裂锥刺一样，随脉搏而跳痛，咳嗽、喷嚏时疼痛加重，或伴有发冷发热，头痛，全身不适，不想吃饭，听力减退等症状。

慢性化脓性中耳炎，多由于急性中耳炎治疗不及时、不彻底而转为慢性。主要症状是长期耳内流脓，时好时发，听力减退，有时可出现眩晕。

治疗原则 清热，解毒，收敛。

处方

(1) 胆矾散：猪胆一个（取汁） 榄核莲叶粉一錢 黄连粉一錢 枯矾粉二錢 调匀干燥，取适量吹入患耳，每日一次。

(2) 陈皮 4 克 煅明矾 10 克 共研为细粉吹耳。

(3) 煅明矾 8 克　装入新鲜猪苦胆内风干，研为细粉吹耳。

鼻　炎

病因症状　鼻炎通常分急性、慢性、过敏性三种。急性的多见于感冒。这里着重介绍后两种。

(1) 慢性鼻炎：多因急性鼻炎反复发作所致。主要症状是间歇性鼻子不通气，晚上加重，侧臥时下部鼻腔更甚，流很多的粘稠或脓性鼻涕，常倒流入口內，病人“口痰”很多，严重时闻不出香臭，咽喉发干，头昏、头痛，病人常用口呼吸，偶而有耳聋、耳鸣等症。

(2) 过敏性鼻炎：是因为对某种物质过敏，天气变化的时候最易发生。主要症状是常年不断发作，突然鼻塞，鼻部发痒，打喷嚏，流水样鼻涕，经过一段时间，自行暂时缓解。

治疗原则　消炎通窍。

处方

(1) 苍耳子五錢　薄荷二錢　路路通五錢　每日一剂，水煎服。

(2) 鹅不食草细粉 30 克　甘油 70 克　混合均匀涂鼻腔。

(3) 鹅不食草 15 克　三棱苦 5 克　共研为细粉，加冰片 0.5 克，凡士林 80 克，混匀后涂鼻。

鼻　衄

病因症状　流鼻血是一个症状，很多疾病都可以引起，但往往找不到明显的出血原因。一般最常见的原因，有鼻部外伤，手指挖鼻损伤了鼻粘膜，鼻腔的炎症，气候过于干燥，高血压及发高烧后，都可以引起鼻出血。

鼻出血最常见的部位是在鼻中隔前下方，这个部位粘膜很薄，血管丰富，极易受到外来刺激而引起出血。主要症状是断断续续流血，或较长时间流血不止，有的因精神紧张而面色苍白。

治疗原则　凉血止血。

处方

(1) 侧柏叶四錢　白茅根一两　旱莲草五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 梔子四錢　淡竹叶三錢　侧柏叶三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

急、慢性扁桃体炎

病因症状　急性扁桃体炎也叫蛾喉，一侧的叫单蛾，两侧的叫双蛾。多因经常感冒，身体抵抗力减弱，或口腔不清洁细菌感染所致。大多起病较急，发冷发热，全身不适，特别是咽喉疼痛，吞咽时加重，口水很多。重的张口困难。检查可以看到两侧或一侧扁桃体发红肿大，表面有淡黄色或白色的脓点，有时几个脓点融合在一起，形成苔膜。颈部可以摸到肿大的淋巴结。

急性炎症沒有得到彻底治疗，反复发作，可以变成慢性扁桃体炎，经常感到咽部不适，有轻度异物感，影响吞咽，呼吸常感到不便，时好时发，发作时和急性扁桃体炎的症状一样。检查时可看到扁桃体不同程度增大，表面凹凸不平象蜂窝样。

治疗原则　清热解毒，利咽润喉。

处方

急性扁桃体炎：(1) 无患子根一两　岗梅根一两　火炭母五錢　山大颜四錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 金银花五錢　金果榄五錢　岗梅一两　崩大碗四錢　山薄荷一錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 土牛膝五錢　金银花三錢　山芝麻五錢　岗梅五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(4) 榄核莲五錢　木蝴蝶二錢　金银花三錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(5) 小罗伞根五錢　金果榄三錢　每日一剂，水煎服。

上述各方亦适用于咽喉炎。

慢性扁桃体炎：(1) 岗梅根一斤　甘草八两　研为细粉加薄荷少许、淀粉适量，共研成粉，压成0.5克片剂，每次含二片，每天四次。

(2) 扭肚藤五錢　地胆头五錢　崩大碗五錢　一支黄花五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

急、慢性咽喉炎

病因症状　急性咽喉炎多由于身体受凉感冒，口腔不清洁细菌感染，或吃带有刺激性食物而引起。起病较急，病人初感咽喉干燥，灼热，渐感疼痛，吞咽不便，声音嘶哑，甚至完全失音。

咳嗽较剧，同时伴有发热，全身不适，头痛，不想吃饭等症状。

慢性咽喉炎是因为急性咽喉炎未得彻底治疗而反复发作引起的。此外，烟酒和有害气体等长期刺激，也可引起慢性咽喉炎。病人经常感到咽喉部不适，干燥，发痒，微痛，分泌物增多而且粘稠，并常有恶心的感觉，重的可有刺激性咳嗽。天气变化或讲话过多，症状就加重。

治疗原则 急性期清热利喉；慢性期润喉止咳。

处方

急性咽喉炎：(1) 了哥王根三錢　两面针根三錢　三極苦叶五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 无患子根一两　银不换五錢　两面针根三錢　土牛膝三錢　甘草二錢　薄荷一錢　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 金果榄三錢　每日一剂，水煎内服或含漱。

（上述各方亦可用于急、慢性扁桃体炎）

慢性咽喉炎：(1) 木蝴蝶一錢　麦门冬三錢

野菊花三錢　金银花三錢　煎水 500 毫升，当茶饮。

(2) 一支黄花五錢　天门冬三錢　土牛膝五錢　卤地菊五錢　岗梅五錢　煎水当茶饮。

口腔溃瘍

病因症状　本病民间也叫“口疮”。原因尚不完全明了，多半是营养缺乏，口腔不清洁，或患重病后最易发生。有的和精神紧张有关，溃瘍可以发生在口腔粘膜上、舌体上或口唇口角上。主要症状是疼痛不适，影响吃东西。检查可见粘膜上有大小不等的溃瘍，溃瘍面有黄白色假膜，擦去此膜可见到红色溃瘍面，有时有出血。有的病人颌下淋巴结微肿大。

治疗原则　清心火，祛湿热。

处方

(1) 猪笼草三两　煎水含漱。

(2) 草龙五錢　岗梅根五錢　三棵苦五錢　煎水含漱。

(3) 羊蹄草晒干，研成细粉，撒布溃瘍处，每天一至二次。

(4) 栀子五錢　茅根一两　淡竹叶三錢　叶下珠一两　每日一剂，水煎服。

龋　　齿

病因症状　龋齿，俗称“蛀牙”。引起本病的原因多与营养（矿物盐类、维生素）缺乏，口腔不清洁，牙齿本身形态与排列异常有关。儿童期吃糖过多，口腔内细菌发酵产酸也可腐蚀牙齿。主要症状是牙痛，吃过冷过热或甜酸食物均使疼痛加重。检查可见到患牙上有个小黑洞。

治疗原则　清洁口腔，去腐止痛。

处方

(1) 两面针根四两　了哥王根一两　加入50%白酒500毫升，浸泡一周，过滤装瓶，以棉球蘸药液塞龋洞。

(2) 木棉树皮刺适量，水煎含漱，每日四次。

(3) 十八症一两　两面针根二两　加入75%酒精500毫升，浸泡一周，过滤装瓶，以棉球蘸药液塞龋洞。

骨　　鲠

病因症状　本病多因吃鱼、鸡、鸭或其他有

细骨的食物，不慎卡在咽喉或食道上所致。主要症状是被刺部位疼痛，有异物感，吞咽时疼痛加重，有时发生吞咽困难或出血。

治疗原则　酸化分离，严重者须详细检查及时处理。

处方

(1) 酢浆草一两　捣烂加适量开水取汁缓缓吞咽。

(2) 威灵仙　红蓖麻根各一两　水醋各半煎煮，缓缓吞咽。单用威灵仙亦可。

(3) 单根木叶(鲜)一两　水煎，缓缓吞咽。

五、妇产科疾病

月 经 不 调

病因症状　本病多因情绪不好，身体虚弱，内分泌紊乱或其他疾病所引起。

在此只介绍下列几种月经不调的病症。

痛经：主要症状是经前经后或月经期间，下腹部或腰部疼痛难忍。

闭经：月经本来应按期来潮，如不因妊娠或哺乳而停止来潮的叫做闭经。

崩漏：西医称功能性子宫出血。大量出血叫崩，淋漓不断出血叫漏。在发生崩漏的过程中，可见贫血现象。到更年期已经停经的老年人，若忽然又见流血，就要考虑有无其他疾病。

治疗原则 痛经、闭经，以活血通经为主；崩漏，宜舒肝健脾，固经止漏。

处方

痛经：凤尾草一两 黑老虎五錢 大叶风沙藤五錢 乌药三錢 每日一剂，水煎服。

闭经：马鞭草一两 防风草根五錢 豺皮樟五錢 香附子五錢 每日一剂，水煎服。

月经过多：(1) 益母草一两 艾叶三錢 侧柏炭三錢 旱莲草五錢 每日一剂，水煎服。

(2) 红叶铁树叶二两 地稔一两 每日一剂，水煎服。

(3) 巴戟天五錢 仙茅三錢 仙鶴草一两 艾叶三錢 姜三七二錢 每日一剂，水煎服。

白　　带

病因症状　妇女的阴道里常分泌一种粘液，量不多，沒有臭味，这是正常现象。如果有了炎症，粘液就会增多，并带有腥臭味。常因子宫颈炎、阴道炎、滴虫感染等而引起。一般分气虚症和湿热症两种。

气虚症：流出的粘液清稀，象清鼻涕。病人感到肚脐以下发冷，腰腿酸痛，四肢无力，沒有精神。

湿热症：流出的粘液很稠，黃色或粉红色，阴道发痒，小腹胀痛，并有下墜的感觉。

治疗原则　气虚症宜溫补气血，湿热症宜清热除湿。

处方

气虚症：(1) 白背叶根五錢　海螵蛸八錢　刺苋菜根一两　土党参五錢　每日一剂，水煎服。

(2) 五指毛桃一两　人苋一两　錫叶藤一两　每日一剂，水煎服。

湿热症：(1)川谷一两　凤尾草一两　算盘子根五錢　每日一剂，水煎服。

(2) 刺黃连　羊蹄草各适量　煎水洗阴部。

(3) 山梔子三錢　野菊花五錢　十大功劳五錢　每日一剂，水煎服。

子宫脫垂

病因症状　本病民间也叫“阴挺”。发生原因大多是因为生小孩时阴道损伤，产后过早地参加重体力劳动或体质虚弱而引起。主要症状是病人感到阴道內有肿块样东西掉出来，特别是用力时最易掉出来，平臥休息可以缩回。常有下腹部墜痛，腰背酸痛。重者腰不能伸直，小便困难，多尿或失禁。

治疗原则　补气升阳，强腰健肾。

处方

(1) 金樱子一两　五指毛桃一两　白背叶根一两　土党参五錢　红蓖麻根五錢　每日一剂，水煎服。

(2) 棕树茎心(靠地面部分)一两　每日一剂，水煎服。

产后腰腿痛

病因症状　妇女分娩后沒有得到很好的休

息，或过早地参加重体力劳动，常常引起腰腿痛。病人主要感到腰部隐隐作痛，沒有明显的痛点，整个腰腿都酸软无力，行动起来感到不方便。

治疗原则　补气血，舒筋络。

处方

(1) 牛枫荷一两　穿破石三錢　枫香寄生六錢　山苍树根三錢　五指毛桃一两　牛大力两半　山鸡血藤一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 地稔一两　黑皮根五錢　宽筋藤五錢　桑寄生五錢　大叶风沙藤五錢　每日一剂，水煎服。

缺　乳

病因症状　妇女产后沒有奶汁或奶汁过少，不够婴儿吃的叫作缺乳。常见的原因是产妇体质虛弱或精神过度紧张。也有的开始有奶，后来喂奶不当，乳房膨胀过甚，压迫了乳管，影响分泌功能，引起缺乳。

治疗原则　调补气血，解郁通乳。

处方

(1) 土党参一两　羊乳一两　薜荔(果)一两

木通三錢　每日一剂，水煎服。

(2) 土党参一两　麦门冬五錢　路路通五錢　薜荔(果)五錢　通草二錢　每日一剂，水煎服。

(3) 蒲公英一两　鱼腥草一两　薜荔(果)一两　每日一剂，水煎服。

六、儿科疾病

上呼吸道炎

病因症状　本病多因儿童抵抗力差受凉后病毒侵入引起的。年龄较大的儿童常见低热，流涕，鼻塞，打喷嚏，咽部疼痛，咳嗽等症状。幼儿往往病势较重，常有高热，恶心，咳嗽，呕吐，腹泻，甚至出现抽筋；同时鼻咽部伴有明显充血，有的颈部淋巴结肿大。

治疗原则　偏热的清热解表；偏寒的疏散风寒。

处方　(1) 薄荷叶二錢　冰糖草五錢　每日一剂，水煎服。(用于症状初起)

(2) 紫苏二錢　野菊花三錢　葫芦茶三錢　每

日一剂，水煎服。（用于恶寒发热）

⑶ 崩大碗五錢　丁癸草三錢　岗梅根三錢　地胆头三錢　每日一剂，水煎服。（用于高热不退）

⑷ 麦门冬三錢　金银花藤五錢　淡竹叶二錢　黄皮叶二錢　东风橘二錢　每日一剂，水煎服。（用于低热，咽痛，咳嗽）

消 化 不 良

病因症状　消化不良是由于喂养不当，消化吸收不良，或腹部受凉引起肠胃功能紊乱，或食物不洁，细菌随之侵入而引起。一般分为：

单纯性消化不良：主要是大便次数增多，一般每天五至六次或十多次。大便稀薄带水，黄绿色，有酸臭味，可混有少量粘液，或白色及黄色不消化的食物(象蛋花样)。吃奶的婴儿还常发生吐奶。一般病儿精神都比较好，无其他全身症状。

中毒性消化不良：大便次数每天在十次以上，有的达数十次。开始是水样便混有粘液，黄绿色，有酸臭味，随着病情的进展，大便臭味减

轻，颜色变浅。常伴有呕吐、低热或高热。由于身体内水分和盐分大量丢失，体重迅速下降，面色苍白，前囟及眼窝下陷，腹部凹陷，皮肤松弛。这时病儿呼吸变为深长，精神萎靡不振，严重的可以出现昏迷，必须及时抢救。

治疗原则 调理脾胃，化湿导滞，中毒性消化不良应及时抢救。

处方

单纯性消化不良：(1) 牡荆三錢 鸡矢藤五錢 串珠酒饼叶三錢 每日一剂，水煎为 150 毫升，每次服 50 毫升，每日三次。

(2) 凤尾草五錢 火炭母五錢 番石榴叶三錢 用法同前。

(3) 叶下珠四錢 车前草三錢 九层塔一錢 用法同前。（用于受凉引起的消化不良）

中毒性消化不良：土党参三錢 黄皮叶一錢 山苍树根一錢 叶下珠四錢 牛大力三錢 地稔根一錢 每日一剂，水煎为 150 毫升，每次 50 毫升，每日三次服。

夏 季 热

病因症状 本病在我国南部及中部地区每到夏季都有发生，发病原因还不大清楚。常见于六个月以上至两岁左右的小儿。主要症状是长期发热，体温经常在摄氏 38 度左右，有的也发高热。由于发热持久不退，食欲渐减，口渴，多尿，面色苍白，身体逐渐瘦弱。直至秋后气候转凉，发热等症状才消除。

治疗原则 清暑解热，滋阴润燥。

处方

(1) 金丝草一两 麦斛五钱 每日一剂，水煎，分两次服。

(2) 麦门冬三錢 石仙桃五錢 淡竹叶一錢 每日一剂，水煎，分两次服。

小 儿 疳 积

病因症状 疳积的发生，俗话说："无积不成疳"，一般把积分成食积、虫积两种。都是由长期消化不良营养障碍或寄生虫感染引起的一种综合病症。病儿有轻度发热或不发热，精神烦

躁，容易哭闹，睡眠后磨齿(咬牙)，唇红，口喝。有的病儿吃的不少，但是很瘦，经常腹胀腹痛，大便稀烂，量多，腥臭。有的出现夜盲或角膜干燥(疳积上眼)，应当抓紧治疗。有的身体逐渐消瘦，面色萎黄，头发脱落，以致影响发育。

治疗原则　健脾，消积，驱虫。

处方

(1) 苦楝子一錢　香附子二錢　独脚金五錢　葫芦茶五錢　每日一剂，水煎服。或将上药研末，每服半錢，每日三次。

(2) 鸡矢藤五錢　叶下珠五錢　炒使君子三錢　炒谷芽一两　用法同上。

(3) 叶下珠五錢　独脚金五錢　葫芦茶五錢　每日一剂，水煎，分两次服。

小儿臀红

病因症状　这种病多发生于几个月以内的婴儿。多因尿布換洗不勤，或者用塑料布、油布等不吸水的布料作尿布，使小儿下身的皮肤经常处于潮湿环境而发病。在大腿内侧、会阴部、臀部发生皮肤潮红，严重的可以发生糜烂(湿疮)。如

果有细菌感染，还可以出现脓疮及浅溃疡等。应及时治疗。

治疗原则　局部要勤换尿布，保持清洁干燥。外洗用药主要是清化湿毒。

处方

(1) 崩大碗适量　煎水洗患处，每日一至二次。

(2) 狗肝菜　野菊花适量　用法同上。

(3) 榄核莲　漆大姑适量　煎水洗患处。

七、皮肤科疾病

湿　疹

病因症状　发病原因不太清楚，中医认为是湿毒。一般分为急性、慢性两种。急性湿疹：开始皮肤发痒，潮红，随着出现小丘疹和水泡。痒得厉害，搔破后流黄水，以后结成黄色痂皮。拖延日久，反复发作，就变成慢性湿疹。此时皮肤变厚，出现沟纹，粗糙不平，有的轻度糜烂，流水，很痒。阴囊上生湿疹叫做阴囊湿疹，症状大

体和皮肤湿疹一样，时间长了，阴囊表皮增厚，痒得厉害，搔后又出现疼痛，往往影响睡眠。

此外，还有一种叫婴儿湿疹(奶癣)，就是婴儿在哺乳期面颊部、额部、头部或至颈背部出现对称性红斑、丘疹，因痒而搔破，糜烂，流脓水。颈部的淋巴结可以肿大。

治疗原则　清热解毒，燥湿止痒。

处方

急慢性湿疹：(1) 白花草　鹅不食草各适量捣烂敷患处，每日一至二次。

(2) 马缨丹枝叶　苦楝树根皮　乌桕叶各适量　煎水外洗，每天一次。

阴囊湿疹：(1) 榄核莲粉30克　甘油加至100毫升，调匀涂患处，每天二至三次。

(2) 生百部三两　古山龙一两　煎水洗患处，每日一次。

(3) 路路通适量　烧炭存性，加麻油调敷患处。

婴儿湿疹：(1) 防风草　捣烂取鲜汁外涂。

(2) 漆大姑加薄荷少许，煎水洗患处。

皮　　炎

病因症状　常见的皮炎有神经性皮炎、接触性皮炎、药物性皮炎、剥脱性皮炎及水田皮炎。有的发病原因不明，有的是因对某种物质过敏引起的。

神经性皮炎：多发生在后颈部、肘窝、腘窝、骶部、大腿、小腿、会阴和肛门等处。开始局部皮肤搔痒、潮红，逐渐出现圆形或多角形扁平丘疹，褐色或淡红色，日久患处皮肤变厚变硬，表面粗糙，奇痒，往往搔破而留血痂，不流水。

接触性皮炎：起病很急，接触某种物质（如漆树、巴豆油、毛虫、沥青等）后，所接触的皮肤过敏，出现潮红、水肿、丘疹、水疱，接着就糜烂流水，以后结痂。局部感到灼热、奇痒，有时和湿疹不易区别。严重的可以伴有全身症状。

药物性皮炎：是因病人对服用或注射某种药物过敏而引起。突然发生荨麻疹样、麻疹样等多种形状的药疹，布满全身，而且常为对称性的。病人感觉奇痒，有的感到全身灼热。药疹有时可呈局限形式，如固定性药疹（再次服药仍在同一

部位出现药疹)。

剥脱性皮炎：是一种严重的皮肤病。开始全身皮肤一片片潮红，由鲜红到棕红色，然后发生许多小水泡，大片糜烂脱皮，严重的连毛发、指甲也脱落。有的病人全身发热，搔痒，有的因继发感染而出现危重症状。

水田皮炎：是下田劳动时，由于理化（如肥料、农药等刺激）或生物（禽类血吸虫的幼虫钻进皮肤）因素引起的一种过敏症，多见于春夏农忙季节，先是接触水田的皮肤开始发痒、感到灼热，接着出现紫红色斑点或丘疹，一般两三天就自行消退，不需治疗。较重的可起水泡，红肿，糜烂，容易引起化脓感染，因此要及时治疗。

治疗原则　药物性皮炎等应首先除去原因，可给予脱敏药物。用中草药应清热燥湿，解毒止痒。

处方

(1) 土荆芥　马缨丹　三極苦　两面针　硫磺　上药各等量，研粉，加适量茶油调敷。(用于神经性皮炎)

(2) 三極苦　大风艾　黑面神　漆大姑各二两

煎水熏洗。（用于接触性皮炎）

(3) 金银花五錢　银锁匙五錢　甘草一两　每日一剂，水煎服，也可外洗。（用于药物性皮炎）

(4) 漆大姑一两　扛板归一两　金银花五錢煎水外洗，每天一至二次。（用于剝脫性皮炎、过敏性皮炎）

(5) 漆大姑半斤　煎水外洗。（用于水田皮炎、接触性皮炎）

癣

病因症状　癣是由于皮肤不清洁，被眞菌感染引起的一种皮肤病。常见的有：

发癣：儿童发病较多，头皮发生圓形或不定形状的鱗屑斑，鱗屑是灰白色的，很象糠皮，患处头发干燥，沒有光泽，容易折断，有轻微的搔痒。治愈后，头发可继续生长。

黃癣：也是儿童发生较多，头皮上出现一簇簇蜂蜜样的黃痂，中央凹陷，象个碟子，有鼠屎样的特殊臭味。黃痂脫落后，留下一个光禿禿的小疤，头发不再生长，严重的能扩延到整个头皮，头发大部脫光。

体癣：是一种圆形边缘清楚，稍微隆起的癣，形状象铜錢，所以叫“錢癣”。癣的周围起红色小丘疹或水泡，有很多象鱗样的小片，慢慢的向外扩展，中央部分的损害就漸漸消退。病人感到很痒。

股癣：发生在大腿上部內侧，成年男子较多。症状和体癣相似。由于大腿內侧常常多汗潮湿，又容易受磨擦，所以，患部常常发生糜烂，形成湿疹样变化，时间久了，皮肤变得较硬。有时可蔓延至会阴、臀部和下腹部。

手足癣：是最常见的一种皮癣，常发生在脚趾之间或脚掌面。常因搔痒而传染到手及其他皮肤上。有的起水泡，或发生溃烂，天气热的时候可以有奇痒或疼痛，有的经常脱皮。

治疗原则　清热燥湿，杀虫止痒。

处方

(1) 仙人掌三两　羊角扭(果)五两　了哥王一两半　毛麝香一两　将上药切碎，加醋三斤，浸泡二十天，去药渣，外搽外部。(用于体癣、股癣)

(2) 三極苦粉　马缨丹粉　硫黄粉　各取 10

克，用凡士林加至 100 克调匀涂患部。（用于手癣、脚癣、发癣）

(3) 了哥王根皮　捣烂外擦。（用于体癣、股癣）

(4) 雾水葛根　了哥王叶　九里明　大飞扬各一两　枯矾五錢　上药研末，加适量茶油调敷。（用于黄癣、发癣）

(5) 白鹤灵芝四两　羊蹄草一两　大飞扬一两　用 50% 白酒 1000 毫升浸泡一周，外擦患处。（用于体癣）

(6) 百部二两　古山龙二两　煎水外洗。（用于脚癣）

脓　疱　疮

病因症状　本病是一种常见的化脓性皮肤病。由于皮肤不清洁或夏天起痱子后因痒用手搔破被细菌感染所引起。本病有一定的传染性，常在夏季发生，多见于儿童。好发于头、面部。开始起几个米粒大或绿豆大的小红疹，很快在顶尖处出现白色脓疱，脓疱周围的皮肤发红，很痒，搔破后即渗出粘性黄水（所以俗称“黄水疮”），

如流到其他部位，就可发生新脓疱。黄水停流后，结成黄色蜡样痂皮。

治疗原则　清热解毒，杀虫止痒。

处方

(1) 苦楝树皮　桉树叶　过塘蛇各等量　煎水洗患部，每天一至二次。

(2) 旱莲草　榄核莲　三桠苦叶各等量　研粉撒患处，或加麻油适量调敷。

荨　麻　疹

病因症状　本病民间也叫“风疹块”，是常见的一种过敏性皮肤病。往往皮肤突然发痒，手搔之后，随即出现高出皮肤的粉红肿块，大小不一，界线清楚，灼热，剧痒。全身任何部位都可发生，但以头部、面部和四肢最多见。如果有眼皮浮肿，咽部发痒，就要注意观察是否发生呼吸困难。本病发生较快，消失也快，但也有的反复发作，经年累月不好，叫做慢性荨麻疹。

治疗原则　疏风，清热，活血，止痒。

处方

(1) 大风艾　毛麝香　漆大姑　苦楝树叶各适

量　煎水外洗，每日二至三次。

(2) 串珠酒饼叶五錢　黄皮叶五錢　茅根一两　何首乌藤一两　每日一剂，水煎，分两次服。

(3) 路路通一两　何首乌藤一两　每日一剂，水煎，分两次服。

搔　痒　症

病因症状　本病原因还不清楚。有的病人到了秋末冬初气候变冷就发病，有的是全身性的，有的是局部性的，往往夜间一阵一阵发痒。病人不时抓挠，搔过的地方就出现点状或条状的血痂或搔痕。

治疗原则　祛风止痒。

处方

(1) 白花草　马缨丹　鹅不食草各适量　煎水，睡前外洗。

(2) 青蒿五錢　马齿苋五錢　野香薷五錢　每日一剂，水煎服。

(3) 漆大姑五两　黑面神五两　樟树根二两　煎水洗患处。

正名、别名索引

一　画

一支黄花（874）
一支箭（876）
一见消（846）
一见喜（206）
一包针（186）
一朵云（296）
一枝枪（876）
一挂鱼（472）
一点红（160）
一柱香（504）

二　画

二叶红薯（314）
二宝花（174）
二珠葫芦（300）
七叶一枝花（878）
七叶烂（534）
七叶莲（534）
七指蕨（456）
十八症（298）
十月青（832）
丁贵草（48）
丁香罗勒（52）
丁癸草（48）
八月白（918）
八月瓜藤（718）
八角枫（300）
八角刺（488）
八角莲（124）
八角盘（124）
八卦拦路虎（246）
八棱麻（856）
九月泡（760）
九节（840）
九节木（840）
九节茶（828）
九节蓣（54）
九头狮子草（54）
九死还魂草（442）
九里明（136）
九里香（538）
九层塔（50）
九歪草（774）
人字草（48）

人苋（210）
入地龙（212）
入地老鼠（284）
入地金牛（560）
入地蜈蚣（456）
刀伤木（840）
刀柄（372）
丁哥王（758）

三　画

三七草（424）
三十六根（302）
三叉虎（126）
三叉草（888）
三月泡（198）
三爪龙（912）
三叶人字草（674）
三叶五加（304）
三叶木通（718）
三叶沙参（482）
三叶鬼针草（186）
三白草（710）
三加皮（304）
三百两银（588）
三角枫（432）
三角草（880）
三角藤（750）
三枝枪（126）
三苦花（870）
三荚草（64）
三椏苦（126）
三脚蛤蟆（918）
三棱艾（142）
万年松（442）
万年青（886）
万里香（296）
土丁桂（492）
土人参（614）
土三七（424）
土大黄（214）
土公英（152）
土牛膝（128）
土田七（578）
土甘草（250）
土白蔹（156）
土加藤（324）
土瓜（884）
土半夏（882）
土肉桂（334）
土忍冬（176）
土细辛（518）
土荆芥（660）
土茯苓（306）
土前胡（524）

土党参（612）
土黄连（488）
土黄檗（488）
土常山（56）
土高丽参（614）
土藿香（78）
大力薯（624）
大飞扬（774）
大车前（720）
大丹叶（840）
大风艾（310）
大艾（310）
大田基黄（86）
大叶七星剑（874）
大叶万年青（886）
大叶山桂（542）
大叶千斤拔（618）
大叶水杨梅（224）
大叶风沙藤（540）
大叶双眼龙（308）
大叶龙胆草（324）
大叶半边莲（918）
大叶有加利（776）
大叶桉（776）
大叶铁包金（486）
大叶蛇泡簕（760）
大叶蛇总管（904）
大叶紫金牛（336）
大叶紫珠（396）
大叶满天星（132）
大叶寮刁竹（922）
大头陈（58）
大兰青（544）
大兰草（722）
大百部（512）
大血藤（312）
大红花（800）
大良姜（664）
大沙叶（132）
大骏骨（832）
大骏骨丹（832）
大青（130）
大青青菜（400）
大枫艾（310）
大罗伞（830）
大金不换（544）
大金牛草（544）
大金香炉（280）
大乳汁草（774）
大泽兰（128）
大茶药（818）
大草蔻（662）
大种马鞭草（722）
大种老鼠拉冬瓜（156）

大炮叶（818）
大破布刺（760）
大鸭草（140）
大凉伞（830）
大眼兰（654）
大麻子（824）
大高良姜（664）
大蓟（400）
大酸味草（606）
大鬐婆（374）
飞刀剑（726）
飞龙掌血（834）
飞来参（614）
飞机草（780）
飞杨草（774）
马兰（118）
马老头（548）
马莲鞍（148）
马肝石（638）
马尾松（592）
马刺草（400）
马板草（404）
马齿苋（216）
马齿菜（216）
马陵儿（154）
马蒿（60）
马缨丹（782）
马鞍宫（352）
马鞍藤（314）
马蹄金（218）
马蹄草（314）
马鞭草（404）
小马蹄草（218）
小飞杨（784）
小叶万年青（470）
小叶风尾草（226）
小叶双眼龙（318）
小叶龙麟草（256）
小叶买麻藤（316）
小叶蛇针草（244）
小叶铜錢草（266）
小白皮藤（338）
小扣子兰（472）
小麦冬（476）
小花远志（546）
小远志（894）
小驳骨（838）
小驳骨丹（838）
小青草（140）
小青胆（470）
小罗伞（836）
小金不换（546）
小金牛草（546）
小金鸡尾（178）

小金錢草（218）
小乳汁草（784）
小桃花（358）
小拳头（112）
小蓟（402）
山刁竹（920）
山大刀（840）
山大颜（840）
山上老鼠拉冬瓜（156）
山马铃（386）
山天文草（498）
山丹（416）
山仆薯（848）
山牛膝（410）
山乌龟（728）
山乌桕（796）
山玉桂（334）
山白芷（494）
山芝麻（134）
山地稔（632）
山肉桂（542）
山红藤（312）
山豆了（758）
山苍树（320）
山鸡血藤（642）
山鸡米（746）
山鸡椒（320）
山青（670）
山桂楠（542）
山油柑（580）
山油麻（134）
山柳（796）
山胡椒（378）
山荔子（362）
山香（62）
山姜（664）
山莲藕（624）
山铁线莲（432）
山海螺（634）
山梔（192）
山银花（176）
山猪怕（438）
山猪药（336）
山椒（560）
山葛（478）
山葡萄（864）
山遗粮（306）
山药（322）
山蓝（852）
山稔（636）
山熊胆（184）
山橘树（580）
山薯（848）
山薄荷（60）

山薰香（430）
千日红（496）
千斤红（618）
千斤拔（616）
千斤墜（616）
千云竹（920）
千打锤（842）
千里及（136）
千里光（136）
千里香（538）
千层纸（502）
千层塔（50）
千金红（496）
千根草（784）
千锤草（58）
川弹子（628）
川筋龙（904）
广东万年青（886）
广东石榴（286）
广东刘寄奴（448）
广东狼毒（190）
广东商陆（756）
广州相思子（256）

四　画

五爪龙（458）
五叶木通（716）
五色梅（782）
五层龙（384）
五指山参（620）
五指毛桃（458）
五指柑（74）
五郎草（890）
王瓜（884）
天门冬（622）
天文草（498）
天瓜（468）
天冬（622）
天灯笼（812）
天茄子（232）
天胡荽（266）
天香炉（220）
天鹅枫（342）
元宝草（408）
无头藤（712）
无根藤（712）
无患子（500）
井边茜（228）
井栏草（226）
木瓜藤（394）
木芙蓉（786）
木防己（714）
五月艾（406）
五月花（416）

木姜子（320）
木贼（694）
木通（716）
木患子（500）
木棉（222）
木蝴蝶（502）
牙刷草（766）
牙鹰爪（198）
车前草（720）
车轮菜（720）
少花龙葵（234）
日开夜闭（730）
日日新（594）
中华青牛胆（376）
水马蹄（518）
水车藤（262）
水龙（794）
水田七（548）
水团花（138）
水竹草（274）
水灯龙（516）
水杨梅（138）
水芙蓉（888）
水鸡仔（548）
水茄（572）
水狗仔（548）
水泡木（224）
水线草（764）
水胡满（350）
水映草（182）
水剑草（558）
水翁（66）
水萝卜（548）
水黄连（696）
水蜈蚣（64）
水稔子（706）
水榕（66）
水蓼（290）
水管筒（888）
牛大力（624）
牛白藤（324）
牛皮消（550）
牛耳枫（844）
牛晌草（610）
牛蒡（444）
牛鼻拳（486）
牛膝（410）
毛大丁草（504）
毛木防己（740）
毛叶轮环藤（586）
毛叶娃儿藤（302）
毛老虎（62）
毛尾薯（306）
毛果巴豆（318）

毛果娃儿藤（302）
毛果算盘子（826）
毛姜黄（686）
毛排錢草（98）
毛稔（412）
毛辣花（492）
毛簕其藤（586）
毛漆（826）
毛麝香（890）
乌龙根（484）
乌郎藤（326）
乌药（552）
乌韭（168）
乌桕（788）
乌桕薯（906）
乌脚枪（276）
乌樟（392）
乌檀（184）
长春花（594）
长萼堇菜（204）
丹叶（202）
月橘（538）
风车草（444）
风血草（288）
风沙藤（554）
风船葛（812）
风箱树（224）
凤仙花（414）
凤尾草（226）
凤凰腸（830）
凤凰翔（830）
六月雪（240）
六月霜（128）
六耳铃（144）
六耳棱（142）
六角英（140）
六角莲（124）
六棱菊（142）
方枝苦草（430）
火布麻（668）
火泡树（296）
火索麻（556）
火殃簕（790）
火炭母（230）
火炭星（230）
双飞蝴蝶（302）
双目灵（910）
双花（174）
双钩藤（602）
双眼龙（308）
双瑚草（656）
巴仁（308）

巴豆（308）
巴戟天（626）
孔雀尾（168）

五　画

玉龙鞭（722）
玉叶金花（68）
玉树（596）
玉蜀黍（724）
玉蝴蝶（502）
正香前胡（574）
正榕（120）
古山龙（146）
古羊藤（148）
打卜草（516）
打不死（866）
打额泡（516）
石上丸（506）
石上莲（462）
石上藕（460）
石韦（726）
石仙桃（462）
石皮（726）
石发（168）
石松草（802）
石岩姜（368）
石胡荽（112）
石荠苎（808）
石南藤（322）
石蚕（460）
石荷叶（804）
石蒿蒲（558）
石黄皮（506）
石斛（464）
石棘（58）
石蜈蚣（558）
石橄榄（462）
石蟾蜍（728）
布荆（76）
布渣叶（668）
龙吐珠（912）
龙芽草（418）
龙须（294）
龙须草（704）
龙须藤（326）
龙眼（628）
龙船花（416）
龙葵（232）
东风菜（892）
东风橘（508）
艾（406）
艾角青（576）
艾纳香（310）
艾蒿（406）

节节花（806）
节节草（694）
四方草（244）
四叶参（634）
四叶草（732）
四轮藤（444）
四季菜（448）
叶下红（160）
叶下珠（730）
叶后珠（730）
田刀柄（748）
田石梅（182）
田字草（732）
田基黄（236）
田葛菜（754）
甲猛草（762）
冬青仔（584）
鸟不企（388）
鸟不宿（590）
包子树（300）
包谷（724）
包袱草（812）
皮子黄（868）
仙人冻（92）
仙人掌（792）
仙白草（892）
仙茅（630）
仙草（92）
仙鹤草（418）
白山环藤（554）
白山番薯（714）
白千层（596）
白马骨（238）
白木通（718）
白毛公（494）
白毛将（492）
白牛胆（494）
白乌桕（788）
白云草（892）
白石笋（756）
白龙须（300）
白叶仔（370）
白头公（68）
白兰香（584）
白半枫荷（331）
白花丹（846）
白花仔（806）
白花地胆头（152）
白花树（452）
白花草（150）
白花茶（252）
白花臭草（150）
白花曼陀罗（526）
白花蛇舌草（762）

白花蒿（448）
白花蛇舌草（434）
白苏（110）
白纸扇（68）
白桂木（420）
白桂目（420）
白茅（422）
白面风（494）
白面姑（710）
白面戟（242）
白背三七（426）
白背叶（242）
白背絲绸（510）
白背杨（706）
白背桐（242）
白背黄花稔（816）
白眉（504）
白桐树（340）
白胶木（842）
白桑（94）
白雪花（846）
白麻（610）
白蛇胆（504）
白斑鸠窝（674）
白锦条（300）
白辣蓼（290）
白鹤灵芝（466）
白鸽草（492）
白鹤藤（510）
白蜂肉（634）
白薯莨（848）
白粉花（304）
白蜡（192）
瓜子金（894）
瓜子菜（216）
瓜蒌（468）
奶子草（774）
奶参（612）
头花千金藤（356）
汉桃叶（534）
兰草（128）
兰香草（60）
半边莲（896）
半边桅（898）
半边旗（898）
半枝莲（766）
半枫荷（328）
矛盾草（876）
对月草（408）
对叶百部（514）
台乌（552）
絲绵吊梅（804）
母草（244）
发痧藤（70）

六　画

地丁草（204）
地耳草（236）
地松茶（58）
地侧柏（268）
地胡椒（112）
地柏杖（268）
地柏枝（168）
地胆头（152）
地胆草（152）
地桃花（246）
地菜（446）
地棕（630）
地棉根（758）
地楼（468）
地稔（630）
吉祥草（470）
老人根（642）
老虎爪（442）
老虎耳（844）
老虎泡（760）
老虎跳（798）
老鸦瓜（884）
老鸦胆（680）
老鸦眼睛草（232）
老鸦馒头藤（394）
老鼠耳（484）
老鼠拉冬瓜（154）
老鼠拉金瓜（154）
老鼠尾（882）
老鼠筋（768）
老鹰爪（602）
耳响草（610）
耳草（158）
耳挖草（916）
过山龙（70）
过山龙藤（540）
过山香（320）
过江龙（332）
过岗扁龙（332）
过路蜈蚣（266）
过塘蛇（794）
亚荔枝（628）
灰叶（670）
百日红（496）
百节芒（838）
百两金（836）
百部（512）
百解（200）
芒子（308）
毕澄茄（320）
尖叶金果榄（172）
尖叶阿婆鬘（96）

尖尾风（850）
尖尾枫（850）
光叶海桐（296）
光叶拔葜（306）
光明子（50）
光轴苧蒴（298）
早禾泡（198）
吊兰花（464）
吊钟黄（652）
吐絲草（742）
吐烟花（248）
网络鸡血藤（640）
贞蔚（450）
合掌草（236）
伞托树（88）
朱蕉（428）
朱槿（800）
朱砂根（830）
竹叶三七（578）
竹叶麦冬（746）
竹叶菜（272）
竹节菜（272）
竹节藤（316）
多花蓼（638）
多枝唐松草（696）
多须公（128）
伏牛花（436）
仰天钟（220）
伤寒草（600）
华山矾（56）
华千金藤（570）
华灰木（56）
华南十大功劳（490）
血三七（424）
血见飞（834）
血见愁（430）
血藤（312）
杀虫芥（660）
丢了棒（340）
如意花（782）
江黄仔（56）
闭鞘姜（756）
交桃（286）
决明（702）
冰片艾（310）
冰糖草（250）
羊开口（716）
羊奶草（472）
羊耳菊（494）
羊角豆（914）
羊角扭（854）
羊角拗（854）
羊角藕（854）
羊乳（634）

羊带风（366）
羊腰木（802）
羊蹄草（160）
羊蹄藤（326）
并头草（766）
米洋参（656）
米碎草（674）
米碎柴（56）
米曲（528）
灯盏花（278）
灯盏草（414）
灯笼草（516）
观音草（852）
异叶茴芹（918）
异叶翼子木（328）
异形南五味子（540）
红元宝（408）
红牛膝（410）
红毛针（438）
红乌桕（796）
红心乌桕（796）
红叶乌桕（796）
红叶铁树（428）
红半枫荷（328）
红丝线（852）
红豆（84）
红花马宁（620）
红花马鞍藤（314）
红花月味草（810）
红花艾（450）
红花酢浆草（606）
红茜（444）
红背三七（424）
红毡毯（438）
红桂木（420）
红桂目（420）
红梅消（198）
红菱（390）
红蚌兰花（522）
红棉（222）
红紫苏（108）
红筋大黄（214）
红蓝（852）
红蓖麻（824）
红樱花（416）
红藤（312）
红藤茄（386）
红爆牙狼（412）
纤弱木贼（694）

七　画

豆豉姜（320）
两面针（560）
走马风（856）

走马胎（336）
走马箭（856）
走马藤（336）
赤葛（638）
扶桑（800）
扭肚藤（252）
拟千日菊（498）
杠板归（798）
杜仲藤（338）
杜衡（518）
杧果钉（566）
麦门冬（474）
麦冬（474）
麦斛（472）
连錢草（862）
芙蓉（786）
花木通（432）
花叶鸭跖草（274）
花边灯盏（266）
苍子（72）
苍白秤钩风（900）
苍耳（72）
苍耳草（72）
肖梵天花（246）
岗芝麻（134）
岗灯笼（188）
岗松（802）
岗梅（162）
岗菊（478）
岗稔（636）
旱莲草（434）
串珠酒饼（672）
卤地菊（164）
谷精草（698）
谷精珠（698）
含羞草（598）
佛手草（442）
佛桑（800）
何首乌（638）
伸筋藤（376）
伽蓝菜（902）
牡荆（74）
卵叶娃儿藤（302）
针筒草（182）
余甘子（480）
希仙（608）
饭团簕（362）
状元红（390）
沙参（482）
宋竹（428）
怀牛膝（410）
许树（350）

忍冬（174）
鸡儿肠（118）
鸡爪三七（902）
鸡爪果（672）
鸡爪参（574）
鸡爪黄连（194）
鸡矢果（286）
鸡矢藤（676）
鸡仔树（652）
鸡肉荣（754）
鸡血藤（640）
鸡肠风（626）
鸡项草（400）
鸡冠苋（700）
鸡桐木（348）
鸡骨香（564）
鸡骨草（256）
鸡眼草（674）
鸡眼藤（626）
鸡着裤（142）
鸡蛋花（254）
鸡翼荣（446）
灵芝（644）
阴香（334）
防风草（78）
角花胡颓子（532）
纽蒴山芝麻（556）

八　画

枇杷荣（794）
青龙须（360）
青兰（472）
青松（592）
青背天葵（902）
青桐（382）
青蛇仔（82）
青麻（610）
青葙（700）
青葙子（700）
青筋藤（646）
青蒟（520）
青藤（646）
青藤仔花（252）
坡芋（882）
雨伞草（498）
刺龙苞（388）
刺苋（258）
刺苋荣（258）
刺果苏木（566）
刺桐（348）
刺倒树（590）
刺黄连（166）
软水黄连（696）
软杆子（696）

软骨牡丹（768）
斩蛇剑（206）
轮叶沙参（482）
顶棍草（64）
直立百部（514）
郁金（688）
枫树（344）
枫香树（344）
枫香寄生（346）
枫荷桂（342）
松树（592）
板蓝（848）
苹（732）
苧麻（734）
茉莉花（80）
茅瓜（156）
茅草（422）
茅根（422）
茅莓（198）
英雄树（222）
英雄草（920）
苦地胆（152）
苦灯笼（188）
苦参子（680）
苦胆草（206）
苦葛（106）
苦葵（232）
苦楝（678）
苦荬（350）
苦薏（196）
荒（686）
虎耳草（804）
虎舌红（438）
虎杖（904）
虎刺（436）
虎掌簕（760）
肾茶（744）
肾蕨（506）
昆明鸡血藤（640）
果上叶（472）
罗网藤（712）
罗晃子（692）
罗望子（692）
罗勒（50）
岭南虎皮楠（844）
乳毛紫金牛（438）
金不换（544、570）
金牛尾（616）
金牛胆（170）
金毛狗（354）
金毛狗脊（354）
金头木（678）
金古榄（170）
金石榄（740）

金龙棒（82）
金边菊（874）
金丝草（736）
金丝吊蛋（454）
金刚刺（352）
金刚藤（352）
金花草（168）
金鸡爪（574）
金果榄（170）
金钗石斛（464）
金衫扣（572）
金线风（200）
金线吊乌龟（356）
金线吊芙蓉（804）
金线吊蛤蟆（356）
金线重楼（878）
金钟草（220）
金钮头（572）
金钮扣（572）
金钩钓（602）
金盏银盘（186）
金骨风（292）
金钱艾（862）
金钱草（738）
金钱豹（612）
金钱薄荷（862）
金银花（174）
金盘托荔枝（878）
金锁匙（740）
金锦香（220）
金樱子（648）
金缕半枫荷（330）
知羞草（598）
知微木（452）
鱼腥草（180）
鱼藤（858）
鱼鳔草（794）
侧柏（440）
狗肝菜（82）
狗卵果（420）
狗果树（420）
狗贴耳（180）
狗脊（354）
狗脚迹（358）
狗橘树（508）
爬岩姜（368）
波氏谷精草（698）
沿阶草（476）
油甘子（480）
宝鼎香（686）
空桐树（348）
盲肠草（186）
疟马鞭（404）
夜兰茶（820）

夜交藤（638）
夜香牛（600）
夜牵牛（600）
单叶蔓荆（708）
卷柏（442）
单边旗（898）
单面针（562）
单根木（576）
怕丑草（598）
线纹香茶菜（288）
细叶七星剑（908）
细叶十大功劳（491）
细叶飞扬草（784）
细叶龙胆草（158）
细叶榕（120）
细米草（896）
细苋（260）
细花百部（512）
细纹勾儿茶（484）
细脉斑鸠菊（70）
细裂鬼针草（186）
屈头鸡（548）
贯叶蓼（798）
贯众（178）

九　画

鸦胆子（680）
项开口（54）
珍珠伞（836）
珍珠草（730）
毒鱼藤（858）
指甲花（414）
南五味子（554）
南沙参（482）
南苦参（148）
南岭蒌花（758）
南蛇簕（568）
胡蔓藤（818）
柘（364）
树黄连（166）
相思子（84）
相思豆（84）
相思藤（84）
柞木（872）
柿子椒（292）
柠檬香成草（574）
柠檬桉（778）
枸橼当归（574）
柳蓼（290）
皆治藤（676）
草龙（182）
草决明（702）
草豆蔻（662）
草河车（878）

草珊瑚（828）
草蔻（662）
草蒿（814）
草鞋根（152）
茜草（444）
荠菜（446）
荛蔚（450）
茵陈（264）
茵陈蒿（264）
茹拨子（690）
点秤根（162）
映山红（416）
星宿菜（86）
虾钳菜（806）
盆上芫茜（266）
咸鱼头（340）
咸虾花（150）
威灵仙（360）
钝叶樟（542）
钩虫草（660）
钩吻（818）
钩藤（602）
复三叶鬼针草（186）
剑叶凤尾蕨（228）
香白芷（574）
香花菜（114）
香花崖豆藤（642）
香附（682）
香附子（682）
香泽兰（780）
香草（50）
香信（104）
香桂樟（552）
香樟木（392）
急解索（896）
胆木（184）
胜红蓟（150）
独叶一枝花（124）
独脚乌桕（906）
独脚仙茅（630）
独脚金（684）
独脚球（60）
独脚樟（342）
狭叶百部（514）
狭叶荚蒾（810）
狭叶韩信草（766）
追风棍（340）
洋芫荽（104）
洋金花（526）
洗手果（500）
活血丹（862）
穿心草（408）
穿心莲（206）
穿破石（362）

穿墙风（900）
穿鱼柳（138）
兖州卷柏（268）
扁枝槲寄生（346）
扁担藤（366）
扁茎崖爬藤（366）
扁柏（440）
扁藤（366）
神箭根（178）
美人蕉（270）
美丽崖豆藤（624）
姜三七（578）
姜黄（686）
降龙草（236）
降眞香（580）
孩儿草（674）
挂钩簕（602）

十 画

眞金草（460）
盐白木（860）
盐肤木（860）
盐霜柏（860）
桎木柴（452）
桂木（420）
桂圆（628）
桐（382）
桃叶双眼龙（318）
桃金娘（636）
素馨花（582）
珠草（608）
破布叶（668）
破铜錢（278）
热痱草（808、810）
栽朮（770）
莲蓬草（434）
莎草（682）
蔄麻（610）
骨碎补（368）
鸭公青（832）
鸭脚木（88）
鸭脚艾（448）
鸭跖草（272）
圆叶千金藤（906）
圆羊齿（506）
圆锥须药草（206）
蚌壳刺（508）
蚌壳草（210）
蚌花（522）
逍遙竹（920）
艳山姜（662）
豹皮樟（370）
豺皮樟（370）
豺狗舌（412）

倒地棋（728）
倒地铃（812）
倒扣草（90）
倒吊笔（372）
倒刺草（90）
倒钩草（90）
徐长卿（920）
皱面草（430）
胭脂木（420）
胭脂公（420）
胭脂花（284）
钻山狗（892）
钻地风（588）
铁马鞭（404）
铁牛入石（646）
铁甲松（592）
铁甲将军（820）
铁冬青（584）
铁包金（484）
铁扫把（802）
铁灯台（878）
铁苋菜（210）
铁线树（842）
铁线草（276）
铁线蕨（276）
铁线藤（742）
铁树（428）
铁铲头（918）
铁菱角（352）
铁脚威灵仙（360）
铁贯草（720）
秤星木（162）
积雪草（278）
笔管草（694）
臭饭团（588）
臭茉莉（374）
臭草（782）
臭屎茉莉（374）
臭屎姜（770）
臭菜（180）
臭蒿（814）
臭藜藿（660）
透地连珠（588）
透骨消（862）
鬼灯笼（188）
鬼针草（186）
留兰香（114）
高良姜（666）
消山虎（600）
酒饼叶（672）
酒饼簕（508）
酒饼藤（322）
海风藤（540）
海芋（190）

海金砂（742）
海金砂藤（742）
海南狗牙花（576）
海南蒟（378）
海桐（348）
海蚌含珠（210）
涩叶藤（262）
凉草（890）
凉茶藤（68）
凉粉果（394）
凉粉草（92）
宽筋藤（376）
扇叶葵（772）
益母草（450）
益明（450）
益智（650）
益智仁（650）
粉叶轮环藤（200）
粉防己（728）
瓶尔小草（876）
通性草（894）
通骨消（862）
桑树（94）
桑寄生（380）
蚤休（878）
绣花针（436）
绣球藤（432）
陵水暗罗（658）

十一画

排钱草（96）
排风草（78）
接骨草（838）
接骨莲（828）
梧桐（382）
槎木（452）
槎花（452）
梅叶冬青（162）
梔子（192）
栲拉木（384）
梵天花（358）
球子草（112）
球头草（64）
球花毛麝香（58）
球花树（224）
救必应（584）
黄牛木（100）
黄牛茶（100）
黄牛香（564）
黄毛草（736）
黄皮（102）
黄瓜仁草（894）
黄连（194）
黄连藤（146）

黄花龙舌草（164）
黄花母（816）
黄花冬菊（164）
黄花地丁（208）
黄花参（652）
黄花草（874）
黄花倒水莲（652）
黄花猛（816）
黄花酢浆草（604）
黄花蒿（814）
黄花蟛蜞菊（164）
黄金山药（454）
黄狗头（354）
黄荆（76）
黄茶瓶（648）
黄胆草（218）
黄食草（256）
黄独（454）
黄药子（454）
黄栀子（192）
黄弹子（102）
黄鳝草（86）
菝葜（352）
菱角花（522）
菱角菜（446）
菌灵芝（644）
崩大碗（278）
崖花子（296）
野木瓜（716）
野甘草（250）
野兰（670）
野芋（190）
野苋（260）
野苋菜（258）
野花椒（560）
野芥兰（160）
野芫荽（104）
野牡丹（280）
野鸡冠（700）
野苧麻（734）
野南瓜（292）
野韭菜（474）
野香薷（908）
野扁豆（914）
野桐（242）
野梅子（362）
野黄豆（654）
野黄菊（196）
野黄散（54）
野菊花（196）
野菠萝（752）
野麻（734）
野葛（106）
野葡萄（864）

野鹤芜（258）
野藨茄（386）
雀舌草（236）
雀笼木（100）
雀脷珠（478）
曼陀罗（526）
曼陀罗花（526）
眼镜豆（332）
蛇王藤（910）
蛇舌草（762）
蛇泡筋（198）
蛇莓（912）
蛇倒退（798）
蛇脷草（896）
蛇葡萄（864）
啜脓膏（822）
假马鞭（722）
假山豆根（200）
假芝麻（134）
假杜仲（338）
假芫茜（104）
假杨梅（138）
假青梅（162）
假苦瓜（884）
假茉莉（350）
假败酱（722）
假鱼香（808）
假荔枝（536）
假素馨（252）
假桂枝（334）
假绿豆（702）
假茼（690）
假鹰爪（672）
铍头草（204）
银不换（586）
银絲草（492）
银锁匙（200）
铜錢草（738）
猪古稔（280）
猪仔笼（282）
猪仔笠（478）
猪母奶（458）
猪拔菜（690）
猪屎豆（654）
猪屎青（130）
猪笼草（282）
猪婆柴（56）
猫毛草（736）
猫须公（744）
猫须草（744）
猫眼菜（210）
秽草（78）
梨根青（82）
笠碗子树（96）

脱节藤（316）
甜茶（324）
甜根草（422）
甜酒饼叶（580）
甜菜子（448）
甜槌锤（530）
盘龙参（656）
清明菜（528）
清香剑（370）
婆婆丁（208）
淮通（432）
淡竹叶（746）
淡婆婆（130）
章表（372）
望江南（914）
望江南决明（914）
望果（480）
寄色草（600）
痕芋头（190）
鹿角草（704）
粘糊菜（608）
粗叶悬钩子（760）
粗叶榕（458）
断肠草（818）
绵茵陈（264）
绶草（656）
绿苋（260）
绿绒草（294）
绿薄荷（114）
犁头尖（882）
犁头刺（798）
犁头草（204）
犁咀菜（204）
犁壁藤（750）

十二画

斑红根（904）
斑杖（904）
斑鸠饭（230）
斑鸠花（126）
斑鸠酸（604）
粟米（724）
森树（678）
朝简（502）
韩信草（916）
散血子（202）
散血丹（424）
散草（762）
雁来红（594）
裂果薯（548）
酢浆草（604）
葫芦叶（748）
葫芦刺（872）
葫芦茶（748）

蘑芝（362）
落马衣（78）
落坎薯（658）
落地生根（866）
落地金錢（738）
落得打（278）
蓑叶（520）
菌子树（872）
紫万年青（522）
紫兰（644）
紫芝（644）
紫花万年青（522）
紫花地丁（204）
紫花前胡（524）
紫苏（108）
紫苏草（888）
紫茉莉（284）
紫背天葵（202）
紫背金牛（544）
蛤蒿（690）
蛤蟆叶（720）
黑心草（158）
黑心姜（770）
黑叶爵床（832）
黑皮根（658）
黑皮蛇（200）
黑老虎（588）
黑面神（820）
黑脚蕨（276）
跌打将军（868）
鹅不食草（112）
鹅脚板（918）
鹅脚草（660）
鹅掌柴（88）
鹅掌簕（304）
鹅掌藤（534）
糊猕饭团（554）
猴姜（368）
铺地草（784）
铺地莲（244）
铺地蜈蚣（704）
铺地稔（632）
筋骨柱子（352）
番石榴（286）
舒筋草（704）
舒筋藤（376）
粤万年青（886）
牌錢树（96）
阔叶十大功劳（488）
痧子草（236）
粪箕笃（750）
疏刺两面针（562）
缅栀子（254）

十三画

雾水葛（822）
塘边藕（710）
塘葛菜（754）
槭木（388）
榄核莲（206）
榄豉菜（304）
槭桐（390）
槭桐花（390）
碎骨莲（868）
鼓槌草（698）
雷公根（278）
蓟（400）
蒲公英（208）
蒲葵（772）
蒲颓子（530）
蓬灯果（352）
蓬莪朮（770）
蒟青（520）
蒟酱（322）
蓖麻（824）
蓝地柏（294）
蓝花草（890）
蒴藋（856）
蜂巢草（116）
蜂窝草（116）
蜈蚣草（506）
路边青（130）
路边菊（118）
路路通(果)（344）
路路通寄生（346）
锡叶藤（262）
锡绣防风（116）
腰带藤（366）
矮茶（836）
矮樟（552）
鼠尾红（140）
鼠曲草（528）
锥花土人参（614）
溪黄草（288）
溪椒（834）
滨盐肤木（860）
痴头婆（246）
辣叶青药（54）
辣米菜（754）
辣蓼（290）
裸花紫珠（398）
隔山香（574）

十四画

酸豆（692）
酸角（692）
酸味草（604）

酸浆（516）
酸藤头（212）
酸藤果（212）
豨莶草（608）
碧蝉蛇（272）
榕树（120）
榼藤子（332）
槟白树（788）
蔓性千斤拔（616）
蔓胡颓子（530）
蔓荆（706）
蔓桔梗（612）
薤菜（754）
算盘子（292）
鳙鱼胆草（158）
裹篱樵（838）
漆大伯（826）
漆大姑（826）
滚地龙（564）
满天星（238）
翠云草（294）
翠树（678）
熊胆树（184）
熊胆草（288）

十五画

震天雷（576）
醉酒芙蓉（786）
横经席（868）
樟树（392）
樟柳头（756）
槲蕨（368）
蕃荷菜（122）
藠（60）
墨柱根（372）
墨菜（434）
箭叶秋葵（620）
寮刁竹（920）
潺果（870）
潺槁（870）
潺槁木（870）
潺槁木姜（870）
懒蛇上树（656）
缬房花耳草（764）

十六画

燕卵（628）
薯瓜乳藤（454）
蕺菜（180）
薤宝叶（668）
薄叶胡桐（868）
薄荷（122）
薜荔（394）
磨盘草（610）

糖罐子（648）
壁石虎（394）

十七画

螺丕草（218）
鹳觅菜（258）
鹳柞（872）
鹳钩（834）
鹳梘（590）
臀床（140）
癞皮树（556）
翼核果（646）

十八画

檬榕（872）
檬树（342）
翻白叶树（328）
鹰不泊（590）

十九画

攀枝花（222）
藿香蓟（150）
蘸茄（386）
蟾酥蓍（728）
蟹爪寄生（346）
蘼草（466）

二十一画

霸王鞭（790）
露兜簕（752）
鳢肠（434）
麝香菜（524）

編 后 記

伟大领袖毛主席教导我们：中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。并亲手为我们制定了一整套发展祖国医药学的方针、路线和政策，指明了创造中国统一的新医学、新药学的方向。但是，长期以来，由于叛徒、内奸、工贼刘少奇疯狂推行反革命修正主义医疗卫生路线，竭力抵制毛主席的伟大指示，使祖国医药学的发展受到严重的干扰。

史无前例的无产阶级文化大革命，彻底粉碎了叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在“城市老爷卫生部”的代理人所推行的反革命修正主义医疗卫生路线，广大医务卫生人员怀着对毛主席无产阶级医疗卫生路线无限热爱、无限忠诚的深厚的无产阶级感情，遵照毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”、“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业”和“古为今用，洋为中用”的伟大教导，深入农村、工厂、

连队，拜工农兵为师，为工农兵服务，努力发掘祖国医药学宝库，广泛地开展了用中草药防病治病的群众运动，对保障部队健康，加强战备和促进农村合作医疗制度的巩固和发展起到了一定的作用。

在党的“九大”精神的巨大鼓舞下，为了认真贯彻毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针，落实毛主席光辉的“六·二六”指示，进一步发掘祖国医药学宝库，促进中西医结合，我们将部队近年来使用中草药防病治病的初步经验加以整理，编写成这本《常用中草药手册》，供医务卫生人员参考使用。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，经验缺乏，编写时间仓促，错误缺点一定很多，請批评指正。我们决心更高地举起毛泽东思想伟大红旗，虚心学习各地的先进经验，用毛主席的光辉哲学思想指导医疗实践，更好地为人民服务。

本书编写过程中，得到有关部门的大力支持和协助，特此表示感谢。

广州部队后勤部卫生部

书名页
版权页
前言页
目录页
中草药的一般知识
一、怎样认药
（一） 拜工农兵为师，在实践中学习
（二） 学习一点植物学常识
二、怎样采药
１． 掌握采集季节
２． 了解生长环境
３． 搞好加工贮藏
４． 注意保护药源
三、怎样制药
１． 蜜丸
２． 水丸
３． 散剂
４． 膏药
５． 药酒
６． 糖浆
７． 片剂
四、怎样用药
（一） 在“辨证施治”的基础上用药
１． 四诊八纲
２． 六因
（二） 用药的一般原则
１． 具体情况，具体分析
２． 了解药物性能
３． 掌握配方原则
４． 注意观察效果，不断总

结经验

常用中草药

一、解表类（适应感冒、流感、上呼吸道炎、疟疾等疾病）

丁癸草
九层塔（罗勒）
九头狮子草
土常山（华山矾）
大头陈（球花毛麝香）
山薄荷（荻）
山香
水蜈蚣
水翁
玉叶金花
过山龙（细脉斑鸠菊）
苍耳
牡荆
防风草
茉莉花
狗肝菜
相思子
星宿菜
鸭脚木
倒扣草
凉粉草
桑树
排钱草
黄牛茶（黄牛木）
黄皮
野芫荽（洋芫荽）

野葛
紫苏
鹅不食草（石胡荽）
绿薄荷
蜂窝草（锡绣防风）
路边菊（鸡儿肠）
榕树
薄荷

二、清热解毒类（适应各种炎症、中毒、菌痢、热性病、疔疮等疾病）

八角莲
三桠苦
土牛膝（兰草）
大青
大沙叶
山芝麻
千里光
水杨梅（水团花）
六角英（爵床）
六棱菊
古山龙
古羊藤（马莲鞍）
白花草（胜红蓟）
地胆头（地胆草）
老鼠拉冬瓜（马？儿　）
耳草
羊蹄草（一点红）
岗梅（梅叶冬青）
卤地菊
刺黄连

金花草（乌韭）
金果榄
金银花（忍冬）
贯众
鱼腥草（蕺菜）
草龙
胆木（乌檀）
鬼针草（三叶鬼针草）
鬼灯笼
海芋
栀子
黄连
野菊花
蛇泡簕（茅莓）
银锁匙（粉叶轮环藤）
紫背天葵
犁头草（长萼堇菜）
榄核莲（圆锥须药草）
蒲公英

三、清热利湿类（适应各种类型肝炎、胆囊炎、肠胃炎、痢疾、白带等疾病）

人苋（铁苋菜）
入地龙（酸藤果）
土大黄
马齿苋
马蹄金
天香炉（金锦香）
木棉
风箱树
凤尾草

火炭母
龙葵
田基黄（地耳草）
白马骨
白背叶
母草
地桃花（肖梵天花）
吐烟花
冰糖草（野甘草）
扭肚藤
鸡蛋花
鸡骨草（广州想思子）
刺苋菜（刺苋）
锡叶藤
茵陈蒿
盆上芫茜（天胡荽）
兖州卷柏
美人蕉
鸭跖草
铁线草
崩大碗（积雪草）
野牡丹
猪笼草
紫茉莉
番石榴
溪黄草（线纹香茶菜）
辣蓼
算盘子
翠云草

四、祛风寒湿类（适应风湿性关节炎、产后腰腿

痛、劳损、坐骨神经痛等疾病）

一朵云（光叶海桐）
十八症（光轴苧蒟）
八角枫
三十六根（卵叶娃儿藤）
三加皮（三叶五加）
土茯苓（光叶菝葜）
大叶双眼龙（巴豆）
大风艾（艾纳香）
大血藤
马鞍藤（二叶红薯）
小叶买麻藤
小叶双眼龙（毛果巴豆）
山苍树（木姜子）
山葯
牛白藤
龙须藤
半枫荷（翻白叶树）
过江龙（榼藤子）
阴香
走马胎（大叶紫金牛）
杜仲藤
丢了棒（白桐树）
枫荷桂（檫树）
枫香树
枫香寄生（扁枝槲寄生）
刺桐
苦荬（假茉莉）
金刚藤（菝葜）
金毛狗脊

金线吊乌龟（头花千金藤）
狗脚迹（梵天花）
威灵仙（铁脚威灵仙）
穿破石（蔓芝）
扁藤（扁茎崖爬藤）
骨碎补（槲蕨）
豺皮樟
倒吊笔
臭茉莉
宽筋藤（中华青牛胆）
海南蒟
桑寄生
梧桐
栲拉木
野？茄（？茄）
？木（鸟不企）
赪桐
樟树
薜荔

五、活血止血类（适应各种内外伤出血、月经不调、便血、尿血等疾病）

大叶紫珠
大蓟（蓟）
马鞭草
五月艾（艾）
元宝草
牛膝
毛稔
凤仙花
龙船花

仙鹤草
白桂目（桂木）
白茅
红背三七（土三七）
红叶铁树（铁树）
血见愁（山藿香）
花木通（山铁线莲）
旱莲草（鳢肠）
虎刺
虎舌红（乳毛紫金牛）
侧柏
卷柏
茜草
荠菜
鸭脚艾（甜菜子）
益母草
？花（？木）
黄独

六、润肺化痰类（适应肺结核、肺炎、支气管扩张、支气管炎等疾病）

七指蕨
五指毛桃（粗叶榕）
石蚕（石上藕）
石仙桃
石斛
白鹤灵芝
瓜蒌
吉祥草
麦斛
麦门冬（麦冬）

岗菊（猪仔笠）
余甘子
沙参（轮叶沙参）
铁包金（细纹勾儿茶）
阔叶十大功劳

七、止咳定喘类（适应咳嗽、哮喘、百日咳、肺气肿等疾病）

土丁桂
山白芷（白牛胆）
千日红
天文草（拟千日菊）
无患子
木蝴蝶
毛大丁草
石黄皮（肾蕨）
东风橘（酒饼簕）
白鹤藤
百部（细花百部）
灯笼草（酸浆）
杜衡
青蒟
蚌花（紫万年青）
紫花前胡
曼陀罗（白花曼陀罗）
鼠曲草
蔓胡颓子

八、止痛类（适应各种内外伤疼痛、头痛、胃痛、神经痛等疾病）

七叶莲（鹅掌藤）
九里香

大叶风沙藤（异形南五味子）
大叶山桂
大金不换（金不换）
水田七（裂果薯）
牛皮消
乌药
风沙藤（南五味子）
火索麻
石菖蒲
两面针
鸡骨香
刺果苏木
金不换（华千金藤）
金钮扣（水茄）
金鸡爪（隔山香）
单根木（海南狗牙花）
姜三七（土田七）
降真香
素馨花
救必应（铁冬青）
银不换（毛叶轮环藤）
黑老虎（臭饭团）
鹰不泊（簕？）

九、镇静催眠类（适应神经衰弱、失眠、高血压等疾病）

马尾松
长春花
白千层
含羞草
夜香牛

钩藤
酢浆草
豨莶草
磨盘草

十、补益类（适应贫血、消瘦、营养不良、阳萎、遗精等疾病）

土党参（金钱豹）
土人参（锥花土人参）
千斤拔（蔓性千斤拔）
五指山参（箭叶秋葵）
天门冬
牛大力（美丽崖豆藤）
巴戟天
龙眼
仙茅
地稔
羊乳
岗稔（桃金娘）
何首乌
鸡血藤
灵芝
青筋藤（翼核果）
金樱子
益智
黄花倒水莲
猪屎豆
盘龙参（绶草）
黑皮根（陵水暗罗）

十一、消导驱虫类（适应消化不良、小儿疳积、肠道寄生虫症等疾病）

土荆芥
大草蔻（艳山姜）
大高良姜
布渣叶（破布叶）
灰叶
串珠酒饼（假鹰爪）
鸡眼草
鸡矢藤
苦栋
鸦胆子
香附（莎草）
独脚金
姜黄
假蒟
酸豆（罗晃子）

十二、清肝明目类（适应急性结膜炎、角膜炎、视网膜炎、夜盲症等疾病）

木贼（纤弱木贼）
水黄连（多枝唐松草）
谷精草
青葙子（青葙）
草决明（决明）
铺地蜈蚣
蔓荆

十三、利水通淋类（适应各种水肿、肾炎、尿路感染、尿路结石等疾病）

三白草
无根藤
木防己
木通

车前草（大车前）
玉龙鞭（假败酱）
玉蜀黍
石韦
石蟾蜍（粉防己）
叶下珠
苹
苧麻
金丝草
金钱草
金锁匙（毛木防己）
海金沙藤（海金沙）
猫须草（肾茶）
淡竹叶
葫芦茶
粪箕笃
路兜簕
蕻菜
樟柳头（闭鞘姜）

十四、散瘀化结类（适应淋巴结核、肝脾肿大、肿瘤等疾病）

了哥王
大叶蛇泡簕（粗叶悬钩子）
白花蛇舌草
半枝莲（狭叶韩信草）
老鼠簕
莪术
蒲葵

十五、拔毒止痒类（适应疔、痈、癣、疥疮、皮炎、湿疹等疾病）

大飞扬（飞扬草）
大叶桉
飞机草
马缨丹
小飞扬（千根草）
木芙蓉
乌桕
火殃簕
仙人掌
过塘蛇（水龙）
红乌桕（山乌桕）
杠板归（贯叶蓼）
扶桑
岗松
虎耳草
虾钳菜
热痱草（石荠苧）
倒地铃
黄花蒿
黄花母（白背黄花稔）
断肠草（钩吻）
黑面神
雾水葛
蓖麻
漆大姑（毛果算盘子）

十六、外伤类（适应跌打伤、扭挫伤、创伤、骨折等疾病）

九节茶（草珊瑚）
大罗伞（朱砂根）
大驳骨（黑叶爵床）

飞龙掌血
小罗伞（百两金）
小驳骨（裹篱樵）
山大颜（九节）
千打捶
牛耳枫
白花丹
白薯莨
尖尾枫
红丝线（山蓝）
羊角扭
走马箭（蒴藋）
鱼藤
盐肤木（滨盐肤木）
透骨消（连钱草）
蛇葡萄
落地生根
横经席（薄叶胡桐）
潺槁（潺槁木姜）
簕柞（柞木）

十七、蛇虫咬伤类（适应各种毒蛇咬伤、蜈蚣咬伤、黄蜂螫伤）

一支黄花
一支箭（瓶尔小草）
七叶一枝花
三角草
土半夏（犁头尖）
土瓜（王瓜）
广东万年青（粤万年青）
水芙蓉（紫苏草）

毛麝香
东风菜
瓜子金
半边莲
半边旗
苍白秤钩风
鸡爪三七（伽蓝菜）
虎杖
独脚乌桕（圆叶千金藤）
野香薷
蛇王藤
蛇莓
望江南
韩信草
鹅脚板（异叶茴芹）
寮刁竹（徐长卿）
常见疾病的防治
一、疾病预防
普通感冒、流行性感冒
流行性脑脊髓膜炎
痢疾
疟疾
钩端螺旋体病
防暑凉茶
杀蝇灭蚊
二、内科疾病
普通感冒（伤风）
流行性感冒
流行性腮腺炎
麻疹

传染性肝炎
痢疾
疟疾
肺结核（肺痨）
急性支气管炎
慢性支气管炎
支气管哮喘
大叶性肺炎
胃、十二指肠溃疡
急性胃肠炎
慢性胃炎
便秘
蛔虫病
蛲虫病
肾炎
风湿性关节炎
贫血
神经衰弱
多汗症、盗汗
头痛
肋间神经痛
坐骨神经痛

三、外科疾病

常见的皮肤感染
下肢溃疡
急性乳腺炎（乳痈）
急性阑尾炎
痔
脱肛
尿路感染

尿路结石
扭伤
骨折
损伤性腰腿痛
烧、烫伤
毒蛇咬伤
毒虫咬螯伤
癌肿
四、五官科疾病
急性结膜炎
化脓性中耳炎
鼻炎
鼻衄
急、慢性扁桃体炎
急、慢性咽喉炎
口腔溃疡
龋齿
骨鲠
五、妇产科疾病
月经不调
白带
子宫脱垂
产后腰腿痛
缺乳
六、儿科疾病
上呼吸道炎
消化不良
夏季热
小儿疳积
小儿臀红

七、皮肤科疾病
湿疹
皮炎
癣
脓疱疮
荨麻疹
搔痒症
正名、别名索引
编后记
附录页