

邗江农业技术信息

2024 年第 3 期（总第 58 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 02 月 20 日

麦田杂草春季化除意见

我区小麦正处于返青分蘖期，也是麦田杂草防控的关键期。各镇（街道、园区）要高度重视，指导农户抢抓气温回升后晴好天气，根据田间草相，选择对路、优质、安全的除草剂品种，及时开展麦田杂草春季化除工作，有效控制麦田杂草危害，为夏粮丰产丰收打好基础。

一、杂草发生情况

近期调查，杂草的田块发生率为 95.3%，发生面积 11.96 万亩。达标率 24.78%，达标面积 3.11 万亩。杂草密度：单子叶草量 0-240 万株/亩，平均 23.4 万株/亩，双子叶草量 0-20 万株/亩，平均 1.85 万株/亩。当前田间杂草以禾本科杂草为主（看麦娘、日本看麦娘、蔺草等），阔叶杂草主要有猪殃殃、牛繁缕、巢菜、芥菜等。随着气温回升和春季出草高峰的到来，田间草量将会进一步上升。

二、防治意见

（一）防治策略：根据草相选准药剂，抓住时机合理施药。

（二）防治时间：小麦 3-5 叶期（小麦拔节期前），天气晴好且气温稳定在 5℃以上及时进行防治。

（三）防治方法：

1.以禾本科杂草为主的田块可使用甲基二磺隆、唑啉·炔草酯、氟唑·炔草酯、氟唑磺隆·甲基二磺隆、甲基二磺隆·异丙隆、氟唑·异丙隆、环吡·异丙隆等药剂。日本看麦娘发生重的田块，宜使用啶磺草胺。

2.以阔叶杂草为主的田块可使用氯氟吡氧乙酸、2甲4氯、2甲·双氟、唑草·苯磺隆、苯唑·2甲钠、双氟·唑草酮、双氟·氟氯酯、啶磺·氟氯酯、氟吡·双氟、氟吡·双唑酮等药剂。荠菜发生较重的田块可使用苯磺隆+2甲4氯钠盐于小麦拔节前施用。

3.禾本科、阔叶杂草混生的田块可使用甲基二磺隆+异丙隆+氯氟吡氧乙酸异辛酯。

以上药剂在使用时必须严格遵照药剂登记量使用，每亩用水量 15-20kg 为宜。

（四）注意事项：

1.为避免产生药害，已拔节小麦田禁用甲基二磺隆和异丙隆，大麦田禁用精噁唑禾草灵，氯氟吡氧乙酸不可与苯醚甲环唑混用，炔草酯、唑啉草酯等不可与激素类除草剂混用；为确保后茬作物安全，所有麦田禁用绿、甲磺隆复配剂。

2.建议在冷尾暖头、晴好天气中午气温较高时施药，提高防治效果。在强寒流前后、气温 5℃以下，易出现冻药害，不能开展防治工作。

3.农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 6 期（总第 61 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 03 月 19 日

小麦主要病害发生情况与防治意见

当前，全区小麦陆续进入拔节期，纹枯病、白粉病等小麦主要病害也将进入快速扩展期。据气象部门预测，下一阶段有多次雨水过程，田间郁闭程度增加，利于多种病害发生。各镇（街道、园区）要坚持“预防为主”的防治策略，主动出击，适时用药，有效控制小麦纹枯病、白粉病等的发生与危害。

一、发生情况

小麦纹枯病：3 月 18 号大面积调查，田块发病率 55%，高于去年同期的 43.5%；病株率 0-12.12%，平均 2.94%，高于去年同期的 1.34%。小麦陆续开始拔节，纹枯病将进入侵茎危害的关键时期。三月下旬气温回升，田间郁蔽程度增加，后期病情将会继续加重。

小麦白粉病：今年我区小麦主栽品种以扬麦系列（扬麦 23、扬麦 25、扬麦 28）、镇麦 18、宁麦 13 等高、中感白粉病品种为主。随着小麦进入拔节期，田间通风透气程度下降，小麦白粉病一旦发生，病情增长速度快。

二、防治意见

1、小麦纹枯病防治

防治时间：3 月中下旬。

防治药剂：可选择噻呋酰胺、戊唑醇、井冈霉素等的单剂或复配剂。

2、小麦白粉病防治

防治时间：根据田间病害发生情况，一旦田间病叶率达5%即要进行药剂防治，一般时间在3月下旬。

防治药剂：可选择氟环唑、丙硫菌唑、环丙唑醇、啞菌酯、吡唑醚菌酯等的单剂或复配制剂。严重田块隔7~10天喷1次，连续1~2次。

三、注意事项

1、用足药量和水量，喷杆喷雾机亩用水量20-30kg，机动弥雾、静电喷雾亩用水量15-20kg，高效植保无人机亩用水量不低于1.5kg，做到均匀防治。

2、防治小麦纹枯病时，慎用苯甲·丙环唑，以防其与氯氟吡氧乙酸使用间隔期过短，产生药害。若在小麦抽穗扬花期时防治赤霉病兼治白粉病，慎用吡唑醚菌酯、啞菌酯等甲氧丙烯酸酯类杀菌剂。

3、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 7 期（总第 62 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 03 月 19 日

油菜菌核病防治意见

油菜菌核病是油菜上的主要病害。该病属于典型的气候性病害，一旦油菜花期遇上连阴雨天气，将十分有利于病害的发生。当前我区油菜已陆续进入盛花期，且未来天气多阴雨，因此，各镇（街道）应高度重视，加强宣传发动和技术指导，抓住适期、主动防治，确保油菜稳产丰收。

一、发生情况

近日调查，田块发病率 66.7%，高于去年同期的 30%，叶病株率 0-13.33%，平均 4.35%，高于去年同期的 2%。油菜已大面积陆续进入盛花期，预计整个花期会持续 1 个月左右。

二、防治意见

坚持“预防为主、综合防治”的防治策略，采用农业防治与化学防治相结合的方法，重点做好适期用药。

1、农业防治。清沟理墒，做好田间沟系配套，降低地下水位，防止渍害，促进油菜健康生长，增强自身抗病能力，及时清除杂草及老、黄叶，减少菌源。

2、化学防治。加强对油菜开花盛期（主茎开花率达 80% 左右、一次分枝开花株率 50% 左右）的药剂预防。药剂可选

用氟唑菌酰胺、啉唑菌胺、咪鲜胺、异菌脲、菌核净等。如遇连阴雨、花期持续时间长等适宜病害流行天气，隔 7 天左右于油菜盛花期进行第二次药剂预防。

三、注意事项

1、油菜花期植株高大，田间郁蔽，要用足水量，确保全面喷透，药后 3 小时遇雨需做好补治工作。

2、油菜花期施药时要停用吡虫啉、噻虫嗪等新烟碱类药剂，以防影响蜜蜂采蜜安全。

3、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 9 期（总第 64 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 04 月 03 日

小麦穗期病虫害发生与防治意见

我区小麦当前正陆续进入抽穗扬花期，也是病虫害发生和防治的关键时期。据田间调查及分析预测，预计今年全区小麦赤霉病中等偏重发生、白粉病和蚜虫中等发生。针对今年小麦穗期病虫害发生特点，各镇（街道、园区）务必高度重视、加强宣传发动和服务指导，全力打好以赤霉病为重点的小麦穗期病虫害防治总体战，力争把小麦穗期病虫害危害控制在较低水平，为确保夏粮稳产奠定坚实基础。

一、发生情况

1、小麦赤霉病。预计呈中等偏重发生态势。一是田间菌源充足。3 月底调查，田间稻桩子囊壳枝带菌率 0%-8.5%，平均 3.25%（是去年 1.2%的近三倍），满足赤霉病大流行条件。二是品种抗性差。目前我区以扬麦系列（扬麦 23、扬麦 25、扬麦 28）、镇麦 18、宁麦 13 为主，抗病性均不强。三是小麦生育进程参差不齐。由于去年小麦播期长，导致田间生育进程差异较大，预计全区小麦抽穗扬花期在 4 月 10-25 日之间，其中大面积抽穗扬花集中在 4 月 15-20 日。四是气候条件。据气象部门预测，预计 4 月中下旬有 4 次降水过程，小麦抽穗扬花期遇雨概率大，利于病菌侵染与危害。

2、白粉病。预计中等发生，部分品种中等偏重发生。目前田间暂未查见。我区种植的小麦品种多为高、中感品种。部分田块用种量大，田间密度高，小麦拔节后田间郁蔽程度进一步增加，加之4月雨水多，田间湿度大，有利于病情的发生发展。

3、小麦蚜虫。预计中等发生。3月底调查，小麦蚜株率0-50%，平均16.2%，百株蚜量0-152头，平均18头/百株。蚜虫繁殖能力强、速度快，随着气温回升，蚜量将成倍增长。

二、防治意见

1、防治策略：根据今年小麦赤霉病重发态势，要坚持“预防为主，主动出击，适期用药”的策略，坚决杜绝麻痹思想和侥幸心理，切实做到“用准时期、用对药种、用足药量、防足次数”，主动打好小麦穗期病虫防治总体战。

2、防治对象：赤霉病、白粉病、蚜虫。

3、防治对象田：全区所有小麦田。

4、防治时间：第一次用药应于小麦扬花初期（见花打药），做到“扬花一块、防治一块”；若遇高温小麦边抽穗边扬花，应提前至齐穗期打药；若遇连续阴雨天气，要在雨隙或雨前施药；药后6小时内遇雨应及时补治。5-7天后必须第二次用药。

5、防治药剂：小麦赤霉病第一交使用480克/升氰烯·戊唑醇悬浮剂50ml/亩或200克/升氟唑菌酰胺悬浮剂50ml/亩；第二交使用480克/升丙硫菌唑悬浮剂20ml/亩+430克/升戊唑醇悬浮剂20ml/亩。防治穗蚜可用20%啉虫脒可溶粉剂。

三、注意事项

- 1、用足药量和水量，均匀喷雾。
- 2、无人植保飞行器防治应加大水量喷雾。
- 3、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。
- 4、结合赤霉病防治白粉病时，要慎用甲氧丙烯酸酯类杀菌剂。

邗江农业技术信息

2024 年第 11 期（总第 66 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 04 月 28 日

水稻种子处理意见

水稻种子药剂处理是“前防、中控、后保”绿色防控策略的核心内容，开展种子处理能够经济、简便、高效地控制种传病害及前期病虫害危害，尤其是部分种衣剂拌种包衣还可促进根系生长发育，利于培育壮苗。各镇（街道、园区）要高度重视水稻种子药剂处理工作，积极推广安全高效种子药剂处理技术，进一步提高种子药剂处理覆盖率，为培育壮苗、保障水稻丰产丰收打好基础。

一、处理对象：

所有水稻种子。要因地制宜选用优质抗病良种，精选无病健壮稻种。药剂处理前水稻种子需晾晒 2-3 天，并通过风选去杂去劣。

二、药剂配方及处理方法：

1、预防恶苗病

62.5 克/升精甲·咯菌腈悬浮种衣剂 300-400 毫升，用水稀释至 1-2 升，搅拌稻种 100 千克进行拌种；

11%氟环·咯·精甲种子处理悬浮剂 300-400 毫升，以药浆与种子比为 1：50-100 的比例将药剂稀释后，对 100 千克种子进行拌种；

4.23%甲霜·种菌唑微乳剂 100-150 毫升，加 1-3 倍水稀释后，搅拌稻种 100 千克进行拌种；

25%氰烯菌酯悬浮剂 2000-3000 倍液浸种。

2、预防恶苗病和干尖线虫病可选用 12%氟啶·戊·杀螟种子处理

可分散粉剂 87-130 克浸种 100 千克种子或使用 17%杀螟·乙蒜素可湿性粉剂 200-400 倍液浸种。

3、预防恶苗病和稻蓟马可选用 25%噻虫·咯·精甲悬浮剂种衣剂 600-700 克，加适量水稀释并充分搅拌均匀，搅拌稻种 100 千克进行拌种。

4、预防水稻细菌性条斑病等细菌性病害，杂交稻须使用噻唑锌或三氯异氰尿酸浸种。发生过细菌性条斑病的稻田，今年不可继续种植杂交稻，可改种粳稻，且粳稻须进行浸种处理。

三、注意事项：

1、要根据农药标签要求，用准种子处理的药剂浓度，不可盲目加大或降低浓度，以免影响稻种的发芽率及药剂处理效果。

2、拌种包衣时，配制好的药液应于 24 小时内用完，要将种子与调好的药液充分混匀，确保种子均匀着药，有条件的可用专用器械拌种（包衣），晾干后催芽播种或晾干后直接播种。

药剂浸种时间要保证在 48-60 小时，先配好药液并搅拌均匀，再投入稻种，切不可先浸种子再加药剂，并注意浸匀浸透，浸后不需淘洗。

3、旱育秧田催芽时禁用稻草垫底或覆盖，以防稻草带菌再侵染；避免高温催芽和催长芽。

4、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

5、药液浸过的种子不可食用或做饲料。

邗江农业技术信息

2024 年第 12 期（总第 67 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 05 月 16 日

水稻秧田化除意见

秧田化学除草，是控制秧田杂草、培育水稻壮秧的关键措施，也是减轻大田草害防治压力的有效途径。我区水稻秧田杂草以稗草、千金子、矮茨菇、鸭舌草、耳叶水苋等为主，各镇（街道、园区）要做好技术指导，有效控制秧田草害的发生与危害。

一、防治药剂及方法

所有秧池田（包括常规秧田、机插秧秧田、湿润育秧、肥床旱育秧田、塑盘抛秧秧田）在秧苗 2 叶 1 心期，每分秧田用 36%二氯·苄可湿性粉剂 5g+10%氰氟草酯乳油 20ml 兑水 10kg 均匀喷雾。

二、注意事项

1、施药时田间要排干水，施药 24 小时后上水并保持浅水层 3-5 天，水层不能淹没心叶，否则会产生药害；肥床育秧在施药前浇足水再喷药以确保防效。

2、不能提前用药，否则会产生药害，也不能推迟用药，否则会影响效果。

3、用药时应注意均匀喷施，避免漏喷和重喷。

4、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 15 期（总第 70 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 06 月 13 日

水稻秧苗期病虫害防治意见

水稻秧苗期主要病虫害有灰飞虱、螟虫、稻瘟病、黑条矮缩病、条纹叶枯病等，抓好秧苗期病虫害防治，可以有效压低水稻病虫害发生基数，并减轻水稻中后期防治压力。请各镇（街道、园区）高度重视，做好秧田期病虫害防控技术指导，切实有效控制水稻秧田期病虫害发生为害，在培育适龄壮秧的同时，减轻大田防控压力。

一、发生情况

（一）螟虫

1、发生期

灯下：一代二化螟灯下在 5 月 23-26 日出现发蛾高峰，卵孵高峰在 6 月 1-3 日；大螟虫量总体不高。

2、发生量

4 月下旬调查，二化螟全区越冬代残留虫量加权平均为 525.4 头/亩，高于去年的 495.2 头/亩。大螟零星查见、三化螟未查见。预计今年大螟轻发生，丘陵地区二化螟中等发生，局部田块偏重发生。

（二）灰飞虱

近期调查，秧田灰飞虱 0.2-5.2 万头/亩，平均 3.07 万头/亩。目前我区水稻主栽品种多中感条纹叶枯病、不抗黑条矮缩病，预计今年一代灰飞虱中等程度发生，水稻黑条矮缩病存在潜在流行风险。

（三）稻瘟病

田间菌源充足，水稻秧苗期如遇连续阴雨、闷热天气易导致稻瘟病发生，稻瘟病老病区要特别警惕苗叶瘟的暴发流行。

二、防治意见

（一）防治策略：坚持“切断毒链、治虫控病”和“狠治一代压低基数”的策略，将病虫防治关口前移，采取速效和长效药剂相结合的方式，秧田期实行全程药控。

（二）防治对象：山区防治一代螟虫、一代灰飞虱、稻蓟马、稻瘟病，沿江防治一代灰飞虱、稻蓟马、稻瘟病。

（三）防治时间及药剂：

1、机插秧揭膜练苗后，即可进行苗期病虫害（灰飞虱、稻蓟马、苗瘟等）的防治。

2、常规育秧和已栽插活棵的大田，以防治灰飞虱、一代螟虫、苗瘟为主，兼治稻蓟马。

3、抛秧稻田和直播稻田在两叶一心后，防治灰飞虱、稻蓟马和苗瘟。

灰飞虱可选择呋虫胺、烯啶虫胺、吡蚜酮等单剂或复配剂，螟虫可选择氯虫苯甲酰胺、甲维盐、甲氧·茚虫威等药剂，稻瘟病可选择三环唑、稻瘟酰胺、稻瘟灵等单剂或复配

剂。

防治药剂需轮换交替使用；移栽前 2-3 天用药一次，做到带药移栽。

三、注意事项

- 1、用足药量和水量，旱育秧田用药前要浇足水；
- 2、推广无纺布覆盖应用技术，阻止灰飞虱迁入和传毒为害；抓好沟、渠、路边杂草上灰飞虱的防治；
- 3、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 16 期（总第 71 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 06 月 13 日

稻田杂草综合治理技术意见

近年来，我区稻田杂草发生呈种群数量大、发生种类多、危害程度重的特点，目前稻田杂草主要有稗草、千金子、异型莎草、鸭舌草、矮茨菇、节节菜和耳叶水苋等。为切实做好 2024 年稻田杂草防除工作，有效控制稻田杂草发生危害，实现农药减量增效，特制定本技术意见。

一、技术措施

坚持“农业措施为基础、封闭处理为重点、茎叶喷雾为补充”的原则，突出优化适期栽插、翻整地、沟渠整治、田间管理、轮作休耕等农业防控措施，发挥生态控草作用；突出土壤封闭处理，减轻后期茎叶处理压力；突出减量施药技术，坚持对靶用药、适期适量施药，努力减少不当施药造成的药害事故，确保农作物生长安全，保证除草效果。

（一）生态控草措施。树立稻麦田杂草周年防控理念，抓好田间管理，发挥生态控草作用，减轻后期化学除草压力。**阻隔网捞**。有条件地区可在进水口安置尼龙纱网拦截，防止杂草种子进入农田繁殖危害；水稻移栽前，可将田间灌水建立 10~15 厘米水层，待杂草种子聚集到田间后捞取水面漂浮

的种子，减少土壤中杂草种子库基数。**农事调控。**及时清除田埂、路边等“四边”杂草，防止杂草进入农田危害。提高田面作业质量，减少田间高低落差，利于建立浅水层发挥除草剂药效。通过合理肥水营造“苗欺草”的良好农田生态，促进水稻壮苗健苗。腾茬早的田块，可在播栽前诱发杂草提早出苗后，通过机械耕翻等措施灭草。

（二）化学除草措施。推广应用“封杀结合”的化学除草模式。

1、机插秧田。在上水整地平田后进行第一次封闭，可选用丙草胺（或氟噻草胺、或苯噻酰草胺）+苄嘧磺隆，加水均匀喷施，自然落干后栽插；在栽插后 8~10 天进行第二次封闭（“封杀”处理），可选用丙草胺（或噁嗪草酮）+苄嘧磺隆（或氯吡嘧磺隆、或噁草酮）等药剂，拌细湿土或拌肥料均匀撒施，药后保水 5 天左右；水稻移栽后 20 天左右（一年生禾本科杂草 3 叶期左右），根据田间残留草相，合理选择茎叶处理除草剂进行喷施补治，防除禾本科杂草可选用噁唑酰草胺、三氟磺草酮、氯氟吡啶酯、氟氟草酯等药剂，防除阔叶类杂草及莎草科杂草可选用灭草松、2 甲 4 氯、氯氟吡啶酯等药剂。

2、水直播稻田。在催芽稻种播后 2~3 天，用丙草胺（含安全剂）+苄嘧磺隆，加水均匀喷雾进行土壤封闭；水稻播种后 20 天（一年生禾本科杂草 3 叶期左右），根据田间草相选择对路药剂，防除禾本科杂草可选用噁唑酰草胺、氯氟吡啶酯等药剂，防除阔叶类杂草及莎草科杂草可选用氯氟吡

啶酯、灭草松、2 甲 4 氯、氯吡嘧磺隆等药剂。上年草害严重的田块，可在播种后 20 天左右茎叶处理时，选择“丙草胺（含安全剂）+茎叶处理剂”封杀结合，控制杂草危害。

3、旱直播稻田。在播种并窖水落干后，可选用丁·噁或二甲戊灵+苄嘧磺隆等，加水均匀喷雾，进行土壤封闭处理；播种 20 天后，根据田间草相选择对路药剂，防除禾本科杂草可选用噁唑酰草胺、氯氟吡啶酯、氟氟草酯等药剂，防除阔叶类杂草及莎草科杂草可选用氯氟吡啶酯、灭草松、2 甲 4 氯、氯吡嘧磺隆等药剂。上年草害严重的田块，可在播种后 20 天左右茎叶处理时，选择“丙草胺（含安全剂）+茎叶处理剂”封杀结合，控制杂草危害。

4、人工移栽及抛秧田。在水稻移栽后 5~7 天，可选用苯噻酰草胺+苄嘧磺隆（或吡嘧磺隆）、噁草酮、双唑草腈等药剂，拌潮细土或拌肥料均匀撒施，药后保水 3~5 天。水稻移栽后 25 天左右，根据田间草相，选择对路药剂进行茎叶喷雾处理，防除禾本科杂草可选用噁唑酰草胺、氯氟吡啶酯、氟酮磺草胺等药剂，防除阔叶类杂草及莎草科杂草可选用灭草松、2 甲 4 氯、氯氟吡啶酯等药剂。

二、注意事项

1、要根据田间草相，选择对路除草剂品种，交替轮换用药，延缓抗药性产生。合理选择农药剂量混配使用，切不可随意增减剂量和超范围使用。

2、配药前先将液体药剂原包装摇匀，配药时采用二次法稀释。

3、选择土壤封闭处理时，移栽田应保证土地平整，在土壤封闭处理时田里须有均匀水层，药后需要保水 5~7 天、水层不能淹没水稻心叶；直播田施用封闭药剂时田间土壤应处于润湿状态，无积水。

4、选择茎叶处理时，应根据田间杂草叶龄适时用药，最佳施药时间是杂草 4 叶期前，避免杂草叶龄过大造成药效不稳、抗性加剧。尤其是氟氟草酯等药剂，应严格控制施药时间，延缓抗性的发展蔓延。用药前需先排水施药，药后 1~2 天再复水，水层不能淹没水稻心叶，且保水 5~7 天，否则会产生药害和造成药效降低；杂草密度过大时，注意用药均匀、喷透。用药细喷雾时每亩兑水 40~50kg，弥雾时兑水 20~30kg。

5、施药后一周内暂停下田作业。

6、杂草化除慎用植保无人机防治，以防药害。

7、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 19 期（总第 74 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 07 月 15 日

福寿螺防控技术意见

福寿螺是国家重点管理外来入侵物种，也是江苏省补充农业植物检疫性有害生物，具有很强的适应性、危害性和繁殖能力，福寿螺虫、卵极易随着水流进入农田，影响农业生产。各镇（街道、园区）须高度重视，因地制宜落实关键控制技术，铲除零星疫点，控制农田危害，切实保护粮食生产安全。

一、落实福寿螺防控技术

1、农业防治。采取浅水勤灌，防止大水灌溉造成福寿螺随水流传播；适时排水晒田，降低幼螺存活率；冬季整修沟渠，清理淤泥，降低冬后福寿螺基数；福寿螺发生严重的稻田，可采取水改旱 2~3 年或水旱轮作等措施灭螺；组织人工定期捡拾成螺和卵块。

2、物理防治。在灌溉水渠的入口安置网孔大小为4目的一级拦截网，在稻田进水口和出水口安置网孔大小为10~20目的二级拦截网，防止福寿螺随灌溉水传播扩散，同时定期清理拦网上的杂物。在田间插木条（竹片）引诱福寿螺产卵，每亩30~50根，木条（竹片）露出水面高度50~60厘米，靠近

田边、水沟边适当多插。组织人工定期清除田间沟边福寿螺成螺和卵块，集中销毁处理。

3、生物防治。利用茶籽饼中茶皂素对福寿螺的毒杀作用，可在农田区域每亩使用10~15公斤茶籽饼进行防除，施用时间田间水位控制在3厘米左右，撒施后水体环境要封闭2天以上。有条件的地区可采取稻鸭共作，在水稻分蘖初期至齐穗期前每亩放入日龄20~25天的雏鸭15~20只。

4、药剂防治。稻田可使用四聚乙醛颗粒剂均匀撒施，为害严重田块隔10天再施药一次。在福寿螺盛发期，可使用杀螺胺乙醇胺盐可湿性粉剂兑水喷雾防治。

农田发生区域应首选物理或生物方法进行防控，尽量减少用药。

二、加强宣传和部门协调

各镇（街道、园区）要做好宣传发动工作，多渠道多平台宣传福寿螺识别与防控技术，充分发动群众，营造群查群治的氛围；注意加强科学安全用药宣传，避免茶籽饼、四聚乙醛、杀螺胺等药物对鱼、虾等水体生物的影响。在做好农田发生区域防治指导工作的同时，要按照《植物检疫条例》及《扬州市外来物种入侵防控工作方案》（扬农〔2023〕23号）要求，将河道、沟渠、公园等区域的发生情况汇报给同级人民政府，依法采取必要的处置措施，及时将防控要求传达到水利、城市管理等部门，根据“属地管理、分级负责”的原则，加强部门协同配合，实现联防联控的目标。

三、防治中的注意事项

1、严格按照农药标签说明使用，严格执行农药使用安全间隔期，坚持轮换用药。在施药前田间保持3~4厘米水层。

2、不宜在鱼、虾套养的田块中使用药剂防治，施药7天内不可将田水排入河流、鱼塘，防止对水生动物造成药害。

邗江农业技术信息

2024 年第 20 期（总第 75 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 07 月 19 日

夏季农药科学安全使用指导意见

夏季温度升高，雨水增多，据气象部门预测，7 月下旬我区仍有过程性降水，高温高湿有利于水稻、玉米、蔬菜等秋熟作物病虫害发生，即将迎来农药使用强度高峰期。各镇（街道、园区）要积极做好夏季病虫害防控科学安全用药技术指导，确保防治效果，保障农业生产安全、施药者人身安全和生态环境安全。

一、因地制宜科学农药

各地要密切关注病虫草发生动态，指导农户因地制宜选择合适药剂、适期开展防治。一是**严格按照标签用药**。要严格按照农药标签标记用足药量，既保证防治效果，又延缓抗药性产生。严格遵守蔬菜、水果等夏季鲜食农产品农药安全使用间隔期，防止农药残留超标。一般每个农药品种（有效成分）在一个作物生长季使用次数不超过 2 次，并与其它不同作用机理的农药交替轮换使用。二是**强化适期用药**。高温季节可选择在上午 10 点前或下午 4 点后施药，避开中午高温时段；风力 3 级以上或下雨天气不宜施药。针对玉米等高秆作物，鼓励使用植保无人飞机、自走式喷杆喷雾机等高效

植保机械开展病虫害防治，避免人背施药机械进入密闭环境施药。**三是注意特殊产品用药。**加强敌百虫原药使用指导，对涉及使用敌百虫原药的新型农业生产主体和专业病虫害防治服务组织，应落实农药使用记录制度，严格遵守安全使用要求，按照农业危险化学品使用安全专项治理工作要求进行指导。

二、确保农药使用安全

各地务必要提高认识，把农药科学安全使用放在突出位置。**一是确保施药人员安全。**结合“科学用药进万家”行动，做好安全用药宣传培训，施药人员要严格遵守施药操作规程，每天施药时间一般不超过6个小时。施药时，施药人员应穿戴好防护用品，始终处于上风位置，顺风隔行施药，施药过程中不饮食、不吸烟，施药后及时清洗器械、清洁身体。施药过程中一旦出现头晕、恶心、呼吸急促、出汗流涎等症状，要立即离开作业场所，脱去受污染的衣服，并用清水洗净皮肤。若中毒状况较为严重，应持农药标签及时到医院就诊。**二是确保飞防作业安全。**要强化飞防作业培训指导，规范机手作业行为，加强不同作物相邻区域飞防作业安全提示指导，禁止在蜜源植物开花期和水产养殖场所、水源地附近开展航空施药，以防造成农作物药害和非靶标生物中毒事件。**三是执行事件报告制度。**要积极应对农药使用安全事件，落实属地责任，确保早发现、早报告和早处置。对于因农药使用导致的重大人员中暑中毒和农作物大面积药害事故，必须按照相关规定进行及时应急处置和快速上报，严禁隐瞒或虚假报

告实际情况。

三、强化使用指导服务

当前是杂草补治的关键时期，各地要指导农户根据田间草相、杂草基数，合理选择高效安全的除草剂品种。**一是科学选择药剂。**根据田间草相选择对路除草剂品种，同时注意科学合理轮换使用不同作用机理的除草剂品种，延缓抗药性产生。**二是严禁超范围用药。**加强甲氧咪草烟、咪唑乙烟酸等咪唑啉酮类除草剂的使用指导，严禁超范围推荐使用，避免因违规使用除草剂而产生药害，减少对后茬作物影响。**三是防止漂移药害。**喷施除草剂时应加装保护罩、选用对临近作物和下茬作物安全性高的除草剂品种、严格控制使用剂量、选用适宜的施药器械及适宜的施药方式。使用激素类除草剂时，禁止使用无人机飞防，防止漂移产生药害风险。如果发生除草剂药害，可在作物叶面及时喷施吲哚丁酸、芸苔素内酯、赤霉酸、磷酸二氢钾等缓解药害。同时，加强水肥管理，促根壮苗，增强抗逆性，促进农作物快速恢复生长。

邗江农业技术信息

2024 年第 22 期（总第 77 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 07 月 22 日

全面抓好水稻第一次病虫害防治工作

当前我区水稻处于分蘖期，肥水充足，利于病虫害发生。田间病虫害有纹枯病、稻飞虱等，纹枯病在部分早栽水稻上发生较重，稻飞虱（特别是白背飞虱）虫量显著高于去年同期，稻瘟病处于易发期。各镇（街道、园区）须高度重视当前水稻病虫害防治工作，病害坚持“预防为主”、虫害坚持“治前控后”防治策略，做好分类指导，适期防治，切实打好水稻第一次病虫害防治总体战。

一、病虫害发生情况

1、纹枯病

观测圃：截止到 7 月 21 日，观测圃未查见。

大田调查：今年水稻纹枯病 7 月 2 日始见，晚于去年同期（6 月 26 日）。7 月 21 日调查，大田发病率 47.4%，低于去年同期的 56.2%；病穴率 0-55%，平均 6%，低于去年同期的 11.56%；病株率 0-26.43%，平均 1.9%，低于去年同期的 3.61%。其中，早栽田块病穴率 5-55%，平均 23.8%，病株率 2.5-26.43%，平均 9%。手栽稻发生程度重于机插及其他类型田，早栽田块重于迟栽田块。近期雨水多、气温高且田间小气候条件适宜，水稻纹枯病将进入水平扩展高峰期，预计今年水稻纹枯病将中等偏重发生。

2、稻飞虱

7月21日调查，观测圃机插秧灰飞虱平均1325头/百穴，白背飞虱平均1475头/百穴，褐飞虱平均25头/百穴。大田混合虫量25-6200头/百穴，平均2000.7头/百穴，显著高于去年同期的1324.2头/百穴。其中，灰飞虱虫量11.8-2914头/百穴，平均940.3头/百穴（高于去年同期的832.9头/百穴），占比47%；白背飞虱虫量13.1-3248.8头/百穴，平均1048.4头/百穴（显著高于去年同期的491.3头/百穴），占比52.4%；褐飞虱虫量0.15-37.2头/百穴，平均12头/百穴，占比0.6%。田间飞虱各虫态中，低龄若虫占比55.8%，高龄若虫占比34.2%，成虫占比10%。结合智能测报灯监测数据，今年白背飞虱迁入量大，预计白背飞虱中等偏重发生。由于稻飞虱是成灾性极强的虫害之一，必须坚持“治前控后”的防治策略，有效压低虫源基数，减少后期暴发为害几率。

3、稻瘟病

水稻分蘖期是稻瘟病菌最易侵入的生育阶段之一，当前的高温高湿气候条件十分利于稻瘟病的发生，近日已经在个别乡镇零星见病，各地（特别是稻瘟病常发区、老病区）需主动出击，切实做好预防工作。

二、防治意见

- 1、防治对象：纹枯病、稻飞虱、稻瘟病；
- 2、防治时间：7月25日至27日（如遇台风，防治时间可顺延）；
- 3、防治对象田：全区所有水稻田；
- 4、防治药剂及方法：

防治纹枯病用24%井冈霉素水剂20ml/亩+240克/升噻呋酰胺悬浮剂20ml/亩，防治稻瘟病可选用30%三环唑悬浮剂60ml/亩，防治稻飞虱可选用60%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂10g/亩，防治时每亩兑水40kg喷雾或兑水20kg弥雾。

三、注意事项

1、防治时用足药量、水量，均匀细喷雾；无人植保飞行器防治应适当加大水量喷雾；

2、高温天气施药时间应避开高温时段，早晚防治，提高防效，确保防治效果和人身安全；

3、如防治遇雨，要抓住雨隙防治，防治后2小时内遇大雨需及时补治；

4、防治时田间要有浅水层；

5、严禁使用甲胺磷等高毒、剧毒农药；

6、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 23 期（总第 78 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 08 月 08 日

全面开展水稻第二次病虫害防治总体战

目前邗江区粳稻陆续进入拔节孕穗期，部分移栽早的中粳稻、杂交稻即将进入破口期，据气象部门预测，8 月中旬我区多降雨，高温高湿条件、田间群体增长、通风透光性差等因素有利于多种病虫害发生扩展。各镇（街道、园区）要高度重视当前病虫害发生态势，精心组织、狠抓关键、切实做好病虫害防控工作，为水稻丰产丰收打好基础。

一、病虫害发生情况

1、纹枯病

观测圃：机插秧病穴率 22.5%（高于去年同期的 10%），病株率 3.1%（高于去年同期的 1.16%）。

大田普查：大田发病率 48%，病穴率 0-55%，平均 10.2%；病株率 0-19.4%，平均 2.5%，部分移栽早的田块发病严重。

水稻纹枯病正处于水平扩展期，随着田间郁蔽程度增加和田间小气候条件适宜，若防治不到位，将难以控制纹枯病的发生及扩展速度。

2、稻飞虱

观测圃：机插秧灰飞虱平均 4165 头/百穴（高于去年同

期的 880 头/百穴)；白背飞虱平均 2010 头/百穴(高于去年同期的 990 头/百穴)；褐飞虱平均 75 头/百穴(高于去年同期的 7 头/百穴)。

大田普查：大田混合虫量 15-405 头/百穴，平均 132.2 头/百穴。其中，灰飞虱虫量 9.9-269.7 头/百穴，平均 88 头/百穴，占比 66.6%；白背飞虱虫量 48.2-130 头/百穴，平均 42.5 头/百穴，占比 32.1%；褐飞虱虫量 1.95-52.6 头/百穴，平均 1.7 头/百穴，占比 1.3%。低龄若虫占比 93.3%，高龄若虫占比 4.1%，成虫占比 2.6%。稻飞虱是成灾性极强的虫害之一，必须坚持“治上压下”的防治策略，以减轻后期防治压力。

3、五(3)代稻纵卷叶螟

田间赶蛾：五(3)代稻纵卷叶螟的蛾量 7 月 30 日开始上升，8 月 6 日达到蛾高峰，亩最高蛾量 2800 头。

灯下：在常规灯下，五(3)代稻纵卷叶螟蛾量 8 月 5 日开始上升，8 月 8 日达到高峰，最高蛾量 63 头。智能测报：公道点和汉河点监测到的五(3)代稻纵卷叶螟发生趋势相似，8 月 5 日汉河点出现蛾高峰(156 头)、8 月 7 日公道点出现蛾高峰(8 头)。

田间卵量：大田虫卵量 0-566.7 头/百穴，平均 188.9 头/百穴，与去年同期的相近。

4、二化螟

一代二化螟螟害率 0.28%，与去年持平。灯下二化螟蛾高峰不明显。

二、防治意见

1、防治对象：主治纹枯病、稻瘟病、稻飞虱、稻纵卷叶螟，兼治二化螟。

2、防治对象田：全区所有水稻田

3、防治时间：8月10-12日

4、防治药剂：防治纹枯病用40%噻菌·戊唑醇悬浮剂20ml/亩，防治稻瘟病用4%春雷霉素水剂50ml/亩，防治稻纵卷叶螟、二化螟用10%四氯虫酰胺悬浮剂20g/亩+42%甲维·抑食肼水分散粒剂25g/亩；防治稻飞虱用70%吡蚜·呋虫胺水分散粒剂8g/亩。

防治时每亩兑水40-50kg喷雾或兑水20kg弥雾。

（五）注意事项：

1、杂交稻预防水稻细菌性病害（水稻细菌性条斑病、水稻白叶枯病等）可使用噻唑锌或噻霉酮，已发病田块防治时需轮换用药（如：使用噻唑锌五天后再使用噻霉酮）。

2、防治时用足药量、水量，均匀细喷雾，田间要有浅水层；无人植保飞行器防治可加飞防助剂。

3、田间病虫防治工作应避开高温时段，确保防治效果和人身安全。

4、若防治期间遇雨，抓住雨隙突击防治，防治后2小时内遇大暴雨需补治，补治药量应控制在常规防治药量的60%左右。

5、严禁使用甲胺磷等高毒、剧毒农药。

6、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 24 期（总第 79 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 08 月 21 日

全面开展水稻穗期病虫害防治总体战

目前我区水稻陆续进入破口抽穗期，正是防控纹枯病、稻瘟病、稻曲病、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害的关键时期。各镇（街道、园区）要充分认识到水稻穗期病虫害防治的重要性，做好当前水稻病虫害防治工作，确保水稻稳产丰收。

一、病虫害发生情况

1、纹枯病

观测圃机插秧病穴率 42.5%，病株率 13.4%。大田发病率 77.8%；病穴率 0-40%，平均 11.9%；病株率 0-7.69%，平均 1.8%。少数通风透光不好的田块发生严重。

由于前期高温少雨且多数田块正在搁田，纹枯病扩展较慢，但后期随着高温高湿的气候条件和田间郁闭程度的增加，病害扩展速度将明显加快，预计病情指数会迅速上升。

2、稻瘟病、稻曲病

稻瘟病、稻曲病是典型的气候型病害，发生程度取决于水稻破口抽穗期的温湿度条件和品种的抗性等因素。目前全区水稻大面积陆续进入破口抽穗期，田间菌源充足、水稻品种抗性差。据气象部门预测，8 月下旬至 9 月初有几次过程性降雨天气，一旦破口抽穗期遇阴雨，将非常利于这两种病

害发生，需做好预防工作。

3、五（3）代稻纵卷叶螟

田间赶蛾：沿江地区田间蛾量自8月9日开始上升，11日进入发蛾高峰，13日亩最高蛾量达2045头，15日蛾量开始下降至200头左右；丘陵山区田间蛾量自8月11日开始上升，13日进入发蛾高峰，蛾量持续增高，19日亩最高蛾量达24000头。

灯下：丘陵山区自8月13日起蛾量开始增加，蛾高峰出现在16日（35头），沿江地区蛾高峰出现在8月14日（138头）。智能虫情测报灯下，公道谷营点未见明显蛾高峰（8月1-20日共监测稻纵88头），汊河点蛾高峰出现在8月5日（156头），后蛾量下降并再次上升，8月11日96头（8月1-20日共监测稻纵1098头）。

田间卵量：观测圃机插秧虫卵量183.3头/百穴。大田虫卵量33.3-133.3头/百穴，平均83.3头/百穴。由于稻纵卷叶螟迁入量大，田间蛾量持续居高不下，预计卵量将进一步上升，要抓住防治适期开展田间防治。

4、稻飞虱

观测圃机插秧灰飞虱平均360头/百穴，白背飞虱平均315头/百穴，褐飞虱平均5头/百穴。

大田混合虫量0-180头/百穴，平均59.2头/百穴。其中，灰飞虱虫量0-95.3头/百穴，平均31.3头/百穴，占比52.9%；白背飞虱虫量0-83.4头/百穴，平均27.4头/百穴，占比46.3%；褐飞虱虫量0-1.3头/百穴，平均0.4头/百穴，占比0.8%。低龄若虫占比72.4%，高龄若虫占比27.2%，成虫占比0.4%。

虽田间飞虱量总体不高，但基于“治前控后”的防治策略和警惕褐飞虱迁入风险的考量，仍需坚持开展稻飞虱的防治。

二、防治意见

1、防治对象：纹枯病、稻瘟病、稻曲病、稻纵卷叶螟、稻飞虱。

2、防治对象田：全区所有水稻田。

3、防治时间：8月下旬至9月初，随破口随用药。

4、防治药剂：

防治纹枯病、稻曲病用 75% 肟菌·戊唑醇水分散粒剂 10-15ml/亩；防治稻瘟病用 20% 稻瘟酰胺悬浮剂 100ml/亩；防治稻纵卷叶螟用 15% 多杀·茚虫威悬浮剂 16ml/亩；防治稻飞虱用 60% 烯啶·吡虫啉水分散粒剂 10g/亩。

三、注意事项

1、防治时用足药量、水量，均匀细喷雾，田间要有浅水层；无人植保飞行器防治需加飞防助剂；

2、田间病虫防治工作应避开高温时段，确保防治效果和人身安全；

3、严禁使用甲胺磷等高毒、剧毒农药；

4、若防治期间遇雨，抓住雨隙突击防治，防治后 2 小时内遇大暴雨需补治，补治药量应控制在常规防治药量的 60% 左右；

5、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 25 期（总第 80 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 08 月 27 日

扎实做好水稻穗期第二次病虫害防治工作

今年受前期温度偏高的影响，我区水稻生育进程普遍较往年加快，当前水稻大部分已破口抽穗，部分早栽田块已齐穗，一些栽插迟的水稻即将破口。综合分析当前田间病虫害、气象条件等因素，预计稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻曲病、纹枯病等穗期主要病虫害仍存在重发风险。各镇（街道、园区）要坚持底线思维、树牢风险意识，切实抓好水稻穗期第二次病虫害防治工作，确保水稻丰产丰收。

一、病虫害发生情况

1、稻瘟病、稻曲病

未来我区多阴雨天气，十分利于稻瘟病、稻曲病的发生，病害大流行出现的可能性极大。各地务必重点关注，抓住防治适期加强防治。

2、纹枯病

8 月 23 日调查：观测圃机插秧病穴率 42.5%，病株率 13.4%。

大田发病率 77.0%；病穴率 0-50%，平均 13.1%；病株率 0-15.18%，平均 1.7%。田块之间发生不平衡性大，部分偏施氮肥、种植密度大的田块以及个别防治、田管不到位的

早栽田块，田间纹枯病发生严重，若不及时防控，有“冒穿”的可能。

3、六（4）代稻纵卷叶螟

灯下：丘陵山区蛾量自8月22日起开始上升，截止到目前，灯下累计诱蛾2025头。各智能虫情测报灯下蛾量均在持续升高，8月27日，公道谷营点190头、公道河东点750头、汉河点1181头、槐泗点180头。

田间赶蛾：丘陵山区田间蛾量自8月22日起持续攀升，8月27日亩最高蛾量已达32000头；沿江地区田间蛾量自8月21日起持续上升，8月27日亩最高蛾量3667头。

田间卵量：观测圃机插秧虫卵量66.7头/百穴。大田虫卵量33.3-733.3头/百穴，平均361.9头/百穴，发生数量为防治指标的3-4倍。

由于蛾量居高不下，将在田间持续产卵为害，如不及时进行防治，水稻上部功能叶将受到严重影响，进而影响产量形成。

4、稻飞虱

观测圃机插秧灰飞虱平均160头/百穴，白背飞虱平均180头/百穴。大田混合虫量0-105头/百穴，平均24.6头/百穴。其中，灰飞虱虫量0-49.4头/百穴，平均11.6头/百穴，占比47.1%；白背飞虱虫量0-55.6头/百穴，平均13头/百穴，占比52.9%。低龄若虫占比41.2%，高龄若虫占比54.4%，成虫占比4.4%，前期漏治、防治质量差的田块重发风险高。飞虱有聚集为害的特性，若不防治后期可能出现局部“冒穿”。

二、防治意见

1、防治对象：稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻曲病、纹枯病、稻飞虱。

2、防治对象田：全区所有粳稻田及正在抽穗的杂交稻田。

3、防治时间：八月底到九月上旬（与穗期第一次病虫害防治间隔 5-7 天）。

4、防治药剂：

亩用 36%戊唑·嘧菌酯悬浮剂 25ml + 30%稻瘟·戊唑醇悬浮剂 40g+ 200 克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂 10ml + 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 20ml+20%氟啶虫酰胺悬浮剂 25ml。

三、注意事项：

1、目前还未破口的移栽迟的田块，应秉持“虫到不等田”的原则，先行开展稻纵卷叶螟和稻飞虱的防治，待破口时再重点防治稻瘟病、稻曲病等病害；

2、为提高水稻植株抗逆能力，可在病虫害防治时另加叶面肥（注意浓度，防止肥害）；

3、防治时用足药量、水量，均匀细喷雾；无人植保飞行器防治可加飞防助剂；

4、防治时田间要有浅水层；

5、严禁使用甲胺磷等高毒、剧毒农药；

6、防治后 2 小时内遇大暴雨需补治；

7、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。

邗江农业技术信息

2024 年第 28 期（总第 83 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 10 月 18 日

小麦种子药剂处理意见

小麦秋播种子药剂处理可有效预防多种小麦种（土）传病害和地下害虫，显著降低病虫发生基数，明显减轻小麦生长期病虫害防治压力，同时促进小麦冬前苗匀、苗齐、苗壮。各镇（街道、园区）要通过强化组织宣传和服务指导，切实做好今年秋播小麦种子药剂处理，提高小麦病虫害防控效果，实现农药减量控害，打好来年夏粮生产丰收基础。

一、防治对象

所有小麦种子。避免使用自留种、选择适宜本地种植的抗耐病商品良种。

二、种子处理技术措施

对小麦纹枯病，可在 45% 烯肟·苯·噻虫悬浮种衣剂（400-800 克/100 千克种子）、60 克/升戊唑醇种子处理悬浮剂（50-66.6 毫升/100 千克种子）和 30 克/升苯醚甲环唑悬浮种衣剂（200-400 毫升/100 千克种子）中任选其一；

对小麦茎基腐病，可选用 200 克/升三氟吡啶胺种子处理悬浮剂（150-300 毫升/100 千克种子）。

对小麦黑穗病，可选用 60 克/升戊唑醇种子处理悬浮剂（30-45 毫升/100 千克种子）或 30 克/升苯醚甲环唑悬浮种衣剂（200-400 毫升/100 千克种子）；

对小麦全蚀病，可选用 30 克/升苯醚甲环唑悬浮种衣剂（500-600 毫升/100 千克种子）；

对病虫混合发生田块，可在 45%烯肟·苯·噻虫悬浮种衣剂（400-800 克/100 千克种子）、27%苯醚·咯·噻虫悬浮剂种衣剂（200-600 毫升/100 千克种子）和 32%戊唑·吡虫啉种子处理悬浮剂（300-700 毫升/100 千克种子）中任选其一。

拌种时可添加芸苔素内酯、氨基寡糖素、二氢卟吩铁等免疫诱抗剂，提高小麦出苗率和抗逆性。

要根据药剂标签推荐的剂量及方法，规范开展种子药剂处理；建议使用专用器械包衣（拌种），确保种衣剂（拌种剂）均匀覆盖在种子表面，切实提高种子包衣（拌种）效果；要现包（拌）现用，当日播完。迟播麦田种子药剂处理要注意低温条件下安全用药，防止药害事件发生，确保用药安全和作物安全。

三、注意事项：

1.若去年种植的小麦有黑穗病发生，则今年不可用自留种播种。

2.经药剂处理过的种子勿作禽畜饲料或加工饲料、食品等；

3.药剂处理过的种子应及时播种并单独存放，以免污染或误食；

4.农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃；

5.禁止使用无“三证”的种子处理剂，没有作为小麦拌种剂或种衣剂登记的农药不能作为种子处理剂使用；

6.在小麦播种时注意农田灭鼠：沿田埂边（离田埂 3 米内田间错位投放均可）每 15-25 米投放一堆鼠药，每堆 10 克。

邗江农业技术信息

2024 年第 29 期（总第 84 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 10 月 18 日

麦田杂草综合防控技术意见

近年来，受轻简化栽培技术推广、收割机跨区作业、除草剂使用不科学、极端异常天气频发等多重因素影响，麦田杂草发生加重，对我区小麦稳定生产构成严重威胁。为切实做好麦田杂草防除工作，夯实来年夏粮丰产丰收基础，制定技术意见如下：

一、防控策略

坚持“前封后杀、综合治理”的原则，科学应用“土壤处理为重点，茎叶处理为补充”的化学防控技术。

二、防控技术

1. 农业措施：

使用合格的商品种子，剔除混杂的杂草种子，减少外源杂草。开展平整土地、适期播种、科学施肥、合理密植，完善田间沟系配套，保持良好土壤墒情，培育壮苗压草，减轻杂草发生危害。

2. 生态措施：

及时清除田埂、沟渠边、路边杂草，结合周期性深翻（或深旋）整地并镇压，将土壤表层的杂草种子翻埋于深层，降

低田间杂草种子萌发比例，减少杂草发生基数。

3.化除措施：

土壤封闭处理。小麦播后苗前，在土壤墒情适宜时，可选用氟噻草胺、丙草胺、乙草胺、异丙隆、吡氟酰草胺、氟吡酰草胺、丙草·异丙隆、氟噻·吡酰·呋等土壤封闭处理剂，将杂草消灭在萌芽状态；对多花黑麦草、大穗看麦娘发生严重的麦田，可选用砒吡草唑及其复配剂进行土壤封闭。喷施土壤封闭除草剂时用水量要适当加大，每亩用水量 30-40kg 为宜。

“封杀”结合处理。小麦齐苗期，在土壤墒情适宜时，可选用具有“封杀”双重作用的除草剂品种或复配剂，如吡酰·异丙隆、异隆·丙·氯吡或“异丙隆+封闭药剂”等，进行“封杀”除草，既可防除已出苗的杂草，也能控制尚未出苗的杂草，达到省工节本、减少药量的效果，每亩用水量 20-30 kg 为宜。

茎叶处理。小麦 3-5 叶期，根据田间残留杂草种类选择对路除草剂品种，以禾本科杂草为主的田块可选用啶啉·炔草酯、氟唑·炔草酯、甲基二磺隆、氟唑磺隆·甲基二磺隆、甲二·异丙隆、氟唑·异丙隆、环吡·异丙隆等药剂进行防控；以阔叶草为主的田块，可选用氯氟吡氧乙酸、2 甲 4 氯、2 甲·双氟、唑草·苯磺隆、双氟·唑草酮、双氟·氟氯酯、氟吡·双氟等药剂进行防控，每亩用水量 15-20 kg 为宜。

三、注意事项

1.要根据田间草相，合理选择对路除草剂，避免长期单一使用同一作用机理的除草剂品种，交替轮换用药，以延缓抗药性的产生和发展。

2.冬前土壤封闭田间干旱时，可趁雨后及时施药，或通过人工造墒或加大用水量提高土壤封闭效果，封闭用药后土表不能积水。如遇长时间降雨或暴雨，及时清沟理墒、排水降渍。

3.冬前茎叶处理，宜在小麦3叶1心后，杂草基本出齐时进行；冬后杂草防控，严格掌握在小麦拔节前用药。施药时间选择在上午9点至下午4点间、晴天无风且日平均气温不低于5℃时，尤其要避开秋冬季第一次强寒流；阴雨天、大风天禁止用药，以防药效降低及雾滴飘移产生药害。

4.选用性能良好的喷雾器械，使用扇形喷头，避免因喷雾器械“跑、冒、滴、漏”造成药液浪费和局部药害。根据所用喷雾器械类型合理设置兑水量，确保喷雾均匀、不重喷、不漏喷，防止药液漂移对周边其它作物造成药害。

5.异丙隆、甲基二磺隆、二磺·甲磺隆、唑草·苯磺隆等在强寒流前后用药易产生药害。炔草酯、唑啉草酯等与激素类除草剂混用易产生药害。苯醚甲环唑与氯氟吡氧乙酸混用时易产生药害。小麦田禁用甲磺隆、绿磺隆及其复配剂。

6.农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。