

邗江农业技术信息

2024 年第 17 期（总第 72 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 06 月 14 日

狠抓“一栽就管”促进早发快长

——水稻一栽就管技术意见

今年夏收夏种期间，各地紧抓晴好天气抢收小麦，顺利确保小麦颗粒归仓。当前，水稻栽插工作已有序开展，各镇街（园区）要抓住最近晴好天气，保障水稻适期播栽，坚持一种就管、一栽就管，突出分类指导，切实抓好各项管理措施的及早落实，为构建高质量群体夯实基础。

一、高质高效整田，提高田面作业质量

夏熟作物收获腾茬后，要充分利用晴好天气，及时耕翻整田。对秸秆还田田块，可采用水耕水整、旱耕水整、犁耕水整等方法，使草泥充分混合。要提高田面作业质量，大田整地做到田平、泥软、肥匀，全田高低差不超过 3 厘米，田面“整洁”无杂草杂物、无浮渣等，表土上细下粗，上烂下实。对机插田块，整平后栽插前要适度沉实，沙质土沉实 1 天左右，壤土沉实 1~2 天，粘土沉实 2~3 天，待泥浆沉淀、表土软硬适中后及时栽插。

二、适龄适期移栽，突出狠抓秧苗质量

“宁可田等秧，不可秧等田”。要加强茬口衔接，根据

适宜移栽秧龄大小，科学安排移栽期，确保做到适期移栽。毯苗机插秧一般在 3.5~3.8 叶期移栽，秧龄 16~20 天；常规手栽秧苗一般在 6 叶期左右移栽，秧龄 30~35 天；抛秧一般在 4~5 叶期抛栽，秧龄 20~25 天。对于茬口衔接紧，易出现超秧龄的秧苗要通过早育早管、适量喷施多效唑等措施延缓其生育进程，最大限度减少超秧龄移栽。

三、因种因时因苗，合理调整栽插

基本苗根据品种分蘖特性、秧苗素质、栽插时期等，合理栽足、栽够基本苗。（一）毯苗机插。常规粳稻株距调到最小，11.7~12.0cm，行距 25.0cm 或 30.0cm，一般亩插 1.8~2.0 万穴，每穴 4 苗左右，基本苗 7.0~8.0 万；杂交籼稻株距 16.0~18.0cm，行距 30.0cm，每穴 3 苗左右，基本苗 4.0 万/亩左右。（二）手栽稻。常规粳稻行距 7.5~8.0 寸，株距 4~5 寸，亩基本茎蘖苗 9.0~10.0 万/亩；手栽杂交稻行距 8.5~9.0 寸，株距 4.5~5.0 寸，基本苗 8.0 万/亩左右。（三）抛栽稻。一般亩抛 1.8~2.0 万穴，基本苗 7.0 万左右，做到浅水高抛、匀抛。适期栽插且分蘖性较强的品种基本苗可适当减少，栽插期延迟且分蘖性弱的品种基本苗要相应增加。

四、坚持一栽就管，促进植株早发快长

各镇街（园区）要根据稻作方式特点，因苗制宜，分类管理，切实抓好一栽就管工作。一是加强水浆管理。秧苗移栽后能否尽早返青活棵，关键在于水浆管理。机插稻、抛秧稻活棵立苗期间歇湿润灌溉，切忌水层过厚，及时露田通气促进扎根，立苗后薄水间隙灌溉；手栽稻从移栽到新生 1 张

叶片的返青期要灌薄水护苗，分蘖期浅水勤灌。秸秆还田田块，要适时脱水露田通气，增加土壤含氧量，促进秸秆腐熟和根系发育，防止土壤有毒物质过多造成僵苗。**二是科学施肥。**要施足基肥，活棵后早施分蘖肥。一般机插稻分蘖肥建议分两次施用，即栽后 5 天左右亩施尿素 5~6kg，栽后 10 天左右亩施尿素 10kg；抛栽稻、手栽稻分蘖肥在移栽后 5~7 天施用，亩施尿素 10kg 左右。对秸秆还田量大的田块，适当增施尿素 3~5kg；对于基肥不足的田块在施分蘖肥后 1 周酌苗情补施平衡肥，一般亩施尿素 3~5kg。**三是积极防治病虫害。**要根据我中心发布的预测预报及病虫害防治意见要求，及时做好病虫害防治；同时认真抓好大田期化除工作，不同稻作方式田块的用药时间、用药品种要严格按照《邗江农业技术信息》（第 71 期）的配方和技术要求操作。对于因推迟移栽，秧苗素质下降，出现僵苗的田块，应根据具体情况对症下药，采取相应的肥、药、水管理调控措施，尽快恢复生长。

五、高质量精细直播，促进齐苗匀苗壮苗

今年我区直播稻仍占一定比例，各镇街（园区）要千方百计压减直播稻面积，但也要立足实际，正视直播稻，狠抓直播稻生产技术指导，尤其是杂草防除等关键技术要落实到位。（一）**优选品种。**选用南粳 5718 等当地熟期适当偏早、穗型偏大、分蘖性中等、抗倒能力强、综合性状好的品种，采用机械条（穴）播、机械湿（或水）直播。（二）**高质量整地。**播种前精细整地，达到“早、平、适、畅”（早翻耕、

田面平整度高、畦面软硬适中、沟渠畅通)的标准,田面高低落差 ≤ 3 厘米,开好田间一套沟,达到内外沟系配套,能灌能排。(三)精量播种。前作让茬后,适期抢早播种,确保安全齐穗,适宜播量控制在4~5公斤/亩(常规粳稻)。(四)科学施肥管水。播后保持田间湿润,确保一播全苗、匀苗、壮苗;2叶1心建立薄水层,早施断奶肥(一般每亩施尿素5公斤),4~5叶期施好促蘖肥(一般每亩施尿素10公斤)。(五)适时化除。一是旱直播稻田。在播种并耨水落干后,可选用异隆·丙·氯吡、丁·噁或二甲戊灵+苄嘧磺隆等(露籽的田不能用二甲戊灵),加水均匀喷雾,进行土壤封闭;播种20天后,根据田间草相,选择对路药剂进行茎叶喷雾处理,防除禾本科杂草可选用五氟磺草胺、噁唑酰草胺、氟氟草酯、氯氟吡啶酯等药剂,防阔叶类杂草及莎草可选用灭草松、2甲4氯、氯吡嘧磺隆、氯氟吡啶酯等药剂。二是水直播稻田。在催芽稻种播后2~4天,用丙草胺(含安全剂)+苄嘧磺隆,加水均匀喷雾进行土壤封闭;水稻播种后20天,根据田间草相,选择对路药剂进行茎叶喷雾处理,防除禾本科杂草可选用五氟磺草胺、噁唑酰草胺、氟氟草酯、氯氟吡啶酯等药剂,防除阔叶类杂草可选用灭草松、2甲4氯、苄嘧磺隆、氯氟吡啶酯等药剂。