

邗江农业技术信息

2024 年第 26 期（总第 81 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 08 月 30 日

加强穗期管理，夺取秋粮丰收

当前我区水稻已陆续进入抽穗扬花期，生育进程略有提前，当前田间长势平衡，苗情稳健向好，后续 2 个月是产量形成的关键时期，以“保结实，争粒重”为目标，重点抓好病虫害防治、水分管理和一喷多促等措施，全力夺取秋粮丰收。

一、精准防控，防病治虫

针对当前还未破口或即将破口的田块，抓住适期打好破口药，重点预防稻瘟病、稻曲病，兼治稻纵卷叶螟、褐飞虱等。已打过破口药的，在一周后齐穗期再防治一次，在灌浆期注意监测稻飞虱，及时开展防治，防止“冒穿”。对草害、杂草稻发生较重的田块，应当及时人工拔除离田，既能减少杂草（稻）对水稻生长的竞争胁迫，又可以降低下年杂草（稻）基数。

二、干湿交替，养根保叶

近期仍有 35℃左右高温，应及时灌水调温，抽穗扬花期是水稻需水的高峰期，应浅水勤灌，田间保持浅水层，确保水稻生长所需水分。但不能长期保水，易造成田间出现回软甚至陷脚，对高产防倒伏极为不利，同时根系活力差，不利于物质运输。灌浆结实期应

采用干干湿湿间歇灌溉方式，即灌 1 次浅水，让其自然落干一段时间后，再上浅水层，如此往复，逐渐拉长干的时间，活熟到老。同时要加强内外沟渠的疏通，如遇强降雨要能及时排水。要关注天气变化，在低温来临前，迅速灌水护苗，防止青枯发生。

三、一喷多促，抗逆增重

喷施叶面肥能延长上部叶片功能期，促进物质转运，提高籽粒结实率、成熟度和饱满度，增加粒重，改善稻米品质。可在穗期防治病虫害的同时，增加磷酸二氢钾、液体硅、锌肥或营养性生化制剂等叶面肥进行叶面喷施，或依据苗情后期每隔一段时间单独喷施专用叶面肥，对于一些植株较高、群体过大的群体也可喷施穗伴侣等化控剂，增强抗倒能力。

四、防灾减灾，保障丰收

密切关注天气变化，加强与气象部门沟通，及时发布台风、暴雨、极端气温等灾害性天气信息，及早制定完善防灾减灾技术预案，切实做好灾害性天气防御工作。要加强分类指导，因田因苗落实落细防灾减灾措施，水稻抽穗扬花期或灌浆期如遇高温或低温天气，要及时灌深水调温，加喷施叶面肥，减轻对结实率的影响，防止发生青枯死苗；如遇台风、连阴雨天气，要及时排涝降渍，并喷施磷酸二氢钾等叶面肥或生长调节剂，促进恢复生长，将灾害损失降到最低。