

邗江农业技术信息

2024 年第 21 期（总第 76 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 07 月 22 日

抓好搁田，除草施肥，构建丰产架子

梅雨期已过，已经入伏，正是田管关键时期，当前我区水稻大面积处于分蘖盛至末期，机插稻叶龄 7.5 叶，亩茎蘖数 28.2 万；直播稻叶龄 6.5 叶，亩茎蘖数 36.5 万。今年水稻播栽以来，正式梅雨期间，气象条件总体表现为气温低、日照少和降雨多，不利于水稻分蘖和生长。一是苗情不平衡性大。受播栽期、品种和管理等因素当前苗情不平衡性大，长期低温阴雨水稻干物质积累不足，分蘖小，苗不壮；二是搁田措施难以落实。受持续阴雨和强降雨影响，大部分水稻搁田受阻，长时间泡水导致田间软烂，根系较差，早栽田块无效分蘖增多，迟栽田块发苗受抑制分蘖不足，僵苗不发，影响后期大穗和抗倒力形成。三是杂草危害大。因前期雨水多影响封闭效果，部分田块杂草发生种类多、密度高，尤其是旱直播田，田间草相复杂、禾本科杂草与阔叶杂草混发严重。针对以上问题，各地要因苗分类指导，围绕“稳穗数、攻大穗、防倒伏”等目标，重点抓好搁田、除草、促平衡等措施，切实加强水稻当前田间管理。

一、突击搁田强根壮蘖

当前我市水稻大部分已经够苗或即将够苗,按照“苗到不等时,时到不等苗”原则,抢抓当前雨停放晴的有利时机,立即排水搁田,疏通外沟,开好内沟,轻搁多次搁。一是苗数足、长势旺、肥力高的田要提前早搁、适度重搁;二是迟播迟栽田促分蘖。以湿润、浅水交替、间隙灌溉为原则,薄水勤灌促分蘖,干湿交替促扎根,待群体达到预期穗数 80%时断水多次轻搁,控制无效分蘖,构建适宜群体。三是僵苗迟发田保足穗。对部分因秸秆量大、除草剂药害等僵苗不发田块,要及时露田透气,促进苗情转化,争取适期够苗;四是不能及时够苗和不平衡田块,可带肥多次轻搁,促“黄塘”平衡,尽可能多争取有效分蘖保足穗。落实搁田措施时,可因地制宜选用水田开沟机械,开好丰产沟,提高搁田效果,增强抗灾能力。搁田需达到田土沉实,田中不陷脚,田表面有新白根长出,叶片挺直、叶色褪淡。

二、及早补肥转壮促平衡

根据不同播栽方式、不同苗情、群体大小,结合土壤肥力、供肥性能和气候条件,以追肥提弱促平衡为重点,科学诊断,合理追肥。一是迟播迟栽、目前群体偏小田块,在前期基肥施用基础上,可酌情补施平衡肥 10-15 斤/亩,争取适期够苗,施肥量不宜过多;二是僵苗不发田块可喷施一遍氨基酸水溶肥加锌肥加植物生长调节剂,提高水稻抗逆性,待苗情转化后再追肥促长;三是适期栽插、发苗较好但长势不均平衡性差的田块,以针对性补肥代替满田撒施,在够苗前尽早施用少量氮肥“捉黄塘”、促平衡;四是对部分旱涝急

转，受强降雨影响出现积涝或短时渍涝，肥力流失严重的低洼和排水不畅田块，可少量多次补施氮肥，直到苗情转化。

三、科学用药治病打草

防治杂草一定要在拔节前。坚持“治小、治早”原则，根据田间草相，选用对口药剂，注意轮换用药，不得随意增加或减少用量，除草剂不要与杀虫剂、杀菌剂混配使用，减少用药次数，提高防治效果，每次用药不仅除草，对水稻也是伤害。一是对播栽较迟的田块，指导种植户要抓住有利时期做好二次封闭处理；二是对杂草已经出苗田块，要根据田间杂草种群，选择对路除草剂做好“封杀结合”、“杀封结合”或茎叶处理；三是对受水淹、田间管理粗放的苗小苗弱田块，待苗情转化升级后，及时指导做好补治工作；四是对部分用药不当产生药害的田块，要指导种植户及时采取补救措施，减轻水稻受损程度。

四、加强指导防灾减灾

当前和今后一段时期是台风、暴雨和极端气温等气象灾害频发的季节，做好防灾减灾预案，增强防灾减灾工作主动性，指导抗灾应变措施落实。当前密切关注水稻纹枯病、稻瘟病、螟虫等病虫害，及时开展专业化防治。要广泛发动，组织专家、农技员深入田间地头，开展踏田诊断，因苗施策，及时落实田管措施，促进苗情转化。