

邗江农业技术信息

2024 年第 30 期（总第 85 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 11 月 20 日

2024 年邗江区晚播小麦技术指导意见

受不利天气影响，今年我区秋收秋种进度慢于上年。目前，我区小麦已错过最佳播种期。据天气预报，11 月 24 日和 25 日后仍有两次降雨过程，将极大影响土壤墒情和播种进度。目前，我区要千方百计抓好晴好天气抢抓播种进度，同时晚播小麦要更重视提高播种质量，推进以“质”补晚，全力促进苗齐、苗足、苗匀、苗壮。要突出抓好以下关键环节和技术措施：

一、及时排水降渍，努力创造适播墒情

遇阴雨天气，要及时开沟排水，防止田间积水，尽快降低土壤湿度，创造适宜机械作业的土壤墒情。我区地块大部分为土质粘重的稻茬田，阴雨天后不适宜进行大深程度（20cm-25cm）的深翻和深耕，极易将含水量高的土翻上导致烂耕烂种，推荐采用 10-15cm 的深旋，将田间秸秆旋至土壤下层，地表无草，籽粒不露于秸秆上方即可。其余砂土田块可视情况采用深翻或深旋的作业方式。

二、抢抓播种进度，浸种催芽补发育

要抓好晴好天气，抢收水稻，及时抢种小麦，抢抓播种进度，尽量避免过迟播种。可以采取浸种催芽方式进行播种，争取 35-40℃有效积温（小麦种 120℃积温出芽），缩短播种至出苗时间，促进播后提前出苗。机械播种可在播种前浸种 6-8 小时，人工播种可浸种催芽 12 小时（不超过 16 小时），脱水晾干、药剂拌种后再进行播种。邗江区目前浸种催芽技术使用者稀少，技术成熟度有所欠缺，但可以及时联系科研专家、院校教授，通过多方指导达到浸种催芽播后提前出苗的效果。

三、抓好秸秆处理，全力减少不利影响

稻秸秆要尽可能切碎匀铺，土壤墒情适宜时深耕或深旋埋草，然后再机械播种。水稻收获时要选用或加装秸秆切碎和匀撒装置，同步切碎稻秸秆至 5~8 cm 长并抛撒均匀。若稻秸秆过长或留茬高度达 20~30cm，应采用碎草机进行粉碎，并注意中速行驶、粉碎刀贴近地面，确保留茬及秸秆粉碎彻底、分布均匀。有条件的地区稻秸秆也可以采取综合利用的方式离田处理。

四、应对阴雨天气，灵活选用播种方式

五、要密切关注天气趋势，沙壤土地区阴雨天气过后，一般应当待土壤墒情基本适宜时即可机械抢播，播深控制在 2cm 左右为宜。特别注意，我区土质偏粘重，若播种过深，则会导致出芽慢、生育期迟和地中茎过长。如土壤墒情过差，

机械下田作业困难实在难以播种，则可采用套播、飞播、板茬直播等方式播种(注意出苗率和种子用量，一般出苗较差)，待土壤墒情适宜时及时开沟覆土，适当加大开沟密度，增加覆土量。

六、适当增加播量，以密补晚确保足穗

11月5日后，每晚播一天应增加0.5万/亩基本苗，最多不超过预期穗数的80%，约等于每晚播一天加一斤种子。最多不超过25万基本苗(邗江地区播种最高不超过50斤/亩)。晚播、气温较低条件下田间出苗率下降，每斤种子出苗数只有约5000-7000株，需依据推迟时间、播种方式等加大播种量，以弥补分蘖成穗率下降可能导致的穗数不足。

七、施足基肥苗肥，促进早发争取壮苗

特别强调，小麦种子的发芽速度和积温有关，前期晚播小麦在田状态瘦小偏弱是因为积温不够，和肥料无关，施再多肥料也无法促使小麦变壮，相反还会导致小麦无效分蘖增加。因为前期施肥过多，导致分蘖发生，而晚播小麦生育时间短，促发的分蘖很难成穗。所以前期施肥要少，留足肥料攻大穗，增粒数和粒重。一般变6:4(基肥:追肥)为4:6或者5:5，基肥采用80斤复合肥(15-15-15)+10斤尿素(一定要施，秸秆还田质量差和晚播过冬都需N素补偿)，后期肥料一致，必要时可施10斤尿素做苗肥，生长状况良好则不施。

八、做好科学化除，防止产生冻药害

稻茬晚播小麦，由于气温较低，需及时开展土壤封闭处理进行除草；部分未能及时开展封闭处理田块注意晚播小麦茎叶处理容易遭遇低温寒潮导致冻药害，需待首次低温“炼苗”后方能开展茎叶处理。