

邗江农业技术信息

第 31 期（总 86 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 11 月 28 日

因苗施肥清好沟 促壮控旺抓群体

——当前小麦越冬期田管技术意见

当前我区小麦已全面进入越冬期，生育进程慢于上年同期，当前各地田间长势差异较大，大部分苗情稳好，处于 4 叶期 1 个分蘖，少部分适期早播小麦 6 叶期 2 个分蘖。

当前生产形势总体较好，但也存在一些问题。一是 11 月中下旬气温下降快、降水少，播种后部分土壤干旱，适期晚播小麦出苗率低；二是受播栽进度、播栽方式等影响，秸秆还田质量差，部分苗情不平衡，适期早播田块出苗率、壮苗数和抗冻害情况好于晚播田块。三是 12 月中上旬雨雪天气频繁，气温极低，缺乏光照，部分弱苗、小苗遭受严重冻害。“瑞雪兆丰年”，冬前这场大雪，总体利大于弊，有力补充了土壤墒情，减轻了低温冻害。我区麦油进入越冬期，针对苗情特点和存在问题，抓住这有利时机，围绕“促壮、防冻”目标，加强分类指导，早施苗肥转弱促壮，清沟理墒控旺防冻。重点抓好以下几方面田管技术措施：

一是因田因墒灵活播种，抢种扫尾。当前“小雪”已过，气温逐渐降低，早种一天，早一天发芽，千方百计因田因墒，灵活应用播种方式，尽早完成播种。11月25日这场大雨加重了播种难度，可以选择无人机飞播、板茬直播、人工撒播、浸种催芽等方式抗渍抢播，晚中争早，适当提高播量（20~22.5公斤/亩），切不可烂耕烂种。当前墒情适宜出苗，飞播、撒播等可以先播种，待墒情适宜时再开沟覆土。

二是抓好一种就管，健全沟系，适时镇压。墒情不适宜时，可以先播种后开沟，冬前趁晴好天气开好墒沟，每3~4m开挖一条竖沟，距田两端横埂3~4m各挖一条横沟，较长的田块每隔50m增开一条腰沟，及时清沟理墒，确保内外三沟相通，做到雨止田干，提高麦油抗渍能力。板茬直播、飞播等田块可以适当加密沟系，提高覆土效果。今年土壤墒情不适宜，播后专门镇压面积较小，待墒情适宜，可以在日均温3℃以上，特别是对稻草还田量较大、表土层烇松的麦田要适度镇压，确保根土密接，提高保墒防冻能力。

三是查苗补缺，科学施肥，促进苗情尽快转化及时查苗补缺，对于缺苗断垄，出苗不齐的部分田块，要尽快的补苗，可通过浸种催芽的方式补撒种子。施足基肥，没有施基肥应及时补施基肥，氮磷钾三元肥缺一不可，对于白田下种或基肥用量不足的麦田，要尽早补施苗肥；早施苗肥，确保基苗肥总量每亩施足纯氮9~10公斤以上，占一生总氮量50%左

右。适期播种的可在3~5叶期根据苗情适量施用壮蘖肥，每亩尿素7.5~10公斤，促进大分蘖生长，为壮秆大穗打好基础。预计冬前茎蘖数不及预期穗数1.2倍的田块，应根据苗情尽早追肥促壮促蘖。晚播小麦由于冬前生长量较小，在施好基肥的基础上，在一叶一心期苗肥亩施尿素5~7.5公斤，促进苗情转化升级，力争壮苗越冬，重点应在春后施好拔节孕穗肥攻大穗，最大限度减轻晚播对产量的影响。对苗体较小的油菜亩追施尿素7~8公斤，对于生长较旺的油菜亩用15%多效唑或5%烯效唑30~40克喷雾化控，控上促下，增强植株耐寒性。

四是及时封闭，封杀结合除草害。坚持以“土壤封闭为核心、茎叶处理为补充”的化学防控措施，未能及时封闭化除或效果不好的田块，坚持抓好冬前封杀结合除草，在小麦齐苗期使用具有“封杀”双重作用的除草剂，既可防除未出苗的杂草，也能除掉刚出苗的杂草，达到省工节本、减少药量的效果。冬后要根据田间草相选准药剂，抢晴暖温高天气（日平均气温5℃以上），及时用药做好冬前化除，寒潮来临前3~5天、后5~7天不宜化除。