

邗江农业技术信息

2025 年第 5 期（总 92 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2025 年 3 月 19 日

重施拔节孕穗肥 促好大穗争高产

——小麦拔节期田管技术意见

一、苗情及存在问题

进入 3 月份以来，遭遇零下低气温，后气温持续升高，小麦生长加快，小麦生育进程晚于上年，分蘖数除个别品种外少于上年，但苗情恢复情况较好。但仍存在以下几个问题：一是部分田块返青肥施用量和施用时间不合理，导致当前田块苗多苗绿，无法及时施用拔节孕穗肥。二是返青以来出现低温阴雨天气较多，部分大户低温使用除草剂，田间遭受“倒春寒”出现明显冻害。三受冬前化除效果不理想和春季长期低温多雨化除进度慢的影响，部分田块草害较重，存在潜在威胁。

二、田管技术措施

1、抓紧开展春季化除。抓住当前有利时机，在拔节前尽快开展化除，因草因田科学选药，注意交替轮换用药，避免长期单一使用同一作用机理的除草剂品种。大户应用足药

量、兑足水量，喷匀喷透，防止漏喷重喷，慎用无人机化除，防止漂移造成药害。严格掌握在小麦拔节前用药，低洼积水田谨慎用药。小麦下部叶黄发枯等发生渍害的田块，可以在化除的时候加叶面肥或生长调节剂喷施，养根促叶。

2、普施重施拔节肥，攻大穗增粒重。拔节孕穗肥对产量提升有着至关重要的作用。对群体茎蘖数适宜的一二类苗麦田、一般在3月中旬，待“叶色正常褪淡、植株基部第一节间接近定长、第二节间伸长1~2cm”时适时追施拔节孕穗肥，亩施复合肥（15-15-15）15公斤、尿素8~10公斤（前期追40斤以上返青肥的，可视情况追复合肥不加尿素，将尿素后移至孕穗期剑叶露出时施用）；对于提早拔节的小麦田块，如果群体过大、叶色偏深，要严格控制拔节孕穗肥过早施用，待叶色褪淡后再施拔节孕穗肥，少施晚施；对返青时群体过小、穗数可能不足的三类苗和脱力落黄严重的田块，提早施用拔节肥，以促进弱苗转壮，争取足穗；高产田提倡施用孕穗肥，在还剩最后一张叶片（4月初）时施用，有显著的增粒增重效果，一般亩追施尿素5~8公斤。

3、重点抓好病虫害防治。**纹枯病**：坚持达标防治，对病株率达10%的达标田块，一般在3月中下旬及时选用井冈霉素、噻呋酰胺、戊唑醇等药剂开展防治。**白粉病和锈病**：在3月下旬或四月初，宁麦等感病品种可选用氟环唑、丙硫菌唑、环丙唑醇、啞菌酯、吡唑醚菌酯等杀菌剂及时喷药防

治。结合小麦赤霉病防治时，慎用吡唑醚菌酯、醚菌酯等药剂。**蚜虫**：当百株蚜虫量达 800 头以上，可选用啉虫脒、吡虫啉、抗蚜威等药剂喷雾防治。**赤霉病**：采取“适期防治、见花喷药”的防控措施，抓住小麦抽穗扬花这一关键时期，及时主动喷施氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、叶菌唑与戊唑醇的复配高效制剂，减轻病害发生程度，降低真菌毒素污染风险。遇到下雨、或对赤霉病流行风险高的田块和品种，用好二次药，要轮换使用不同药剂，停用多菌灵，确保防治效果，坚持做好“一喷三防”，在防治病虫害的同时增加叶面肥，防止早衰增加粒重。

4、继续做好清沟理墒。“麦田一套沟、从种喊到收”，目前是小麦快速生长期，一旦遭遇连阴雨天气，在排水不畅的情况下，不仅会造成小麦发根障碍，还会使根系发黄变黑，削弱吸收功能，加剧小穗、小花退化，并诱发加重病害，导致减产。因此要抓住当前有利的天气条件，细化完善清沟理墒工作，做到内外沟系畅通，确保雨止田干，预防渍害的发生。

5、科学防范“倒春寒”。3 月中下旬是小麦拔节孕穗的关键时期，对低温敏感，低温影响穗发育和分化，甚至冻死幼穗，应加强防范。目前已发现在 3 月份低温用药的田块出现“倒春寒”冻害，应该 2~3 天后及时调查幼穗受冻程度，

分类施肥补救，争取高位分蘖成穗，小蘖赶大蘖、大蘖多成穗。