

邗江农业技术信息

2024 年第 34 期（总第 89 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心 2025 年 1 月 26 日

趁雨施好肥，促蘖争足苗

——当前小麦越冬雨期田管技术意见

当前我区小麦正处于越冬阶段，晚播麦苗处于 1 叶~3 叶状态，虽然越冬后温高光足，但由于墒情不足，导致叶、蘖、根生长和苗情转化升级慢，未将“暖冬”转化为“促长”优势；又因持续无雨而失去增施苗肥（分蘖肥）时机，导致在田麦苗既缺肥又缺水，轻则表现为苗矮、叶小、蘖少，重则表现为植株枯黄、分蘖停止等。针对今年小麦叶龄偏小、茎蘖数偏少、三类苗比例偏高的特点，各地趁着下雨天气，及早搞好保苗和促长工作，并加强麦田分类管理，促进苗情转化升级，创造足苗足蘖足穗的高产稳产基础条件。

一是当前还未齐苗的田块，由于表层土干旱结块，麦苗难以伸出，在底下压制时间过久，由于死亡，造成苗数不足，在此次雨水条件下，将让结块土壤软化疏松，促进早出苗、齐苗。对于露籽、表层麦苗出现卷叶、即将干枯等缺水现状，此次雨水促进根土结合，可以提高抗寒性；基肥不足或苗肥未施田块，小麦基苗肥需纯氮 16-20 斤/亩，雨水后补施尿素 15-20 斤/亩，促进有效分蘖发生和长大，促弱转壮。

二是小麦对渍涝十分敏感。田间要求沟系配套，能够即灌即排不积水，对于烂耕烂种，造成高低不平，压痕较深的田块关注是否局部受渍。推荐通过配套沟系能做到田面无水，而不是满田浸水导致地势不平地方容易积水产生渍害。

三是注意低温雨水造成的冻害。对于旺长和正常田块各地不需要施用尿素，遵循控制田间群体适量的原则。如遇2级或以上冻害，可喷施0.2%-0.3%的磷酸二氢钾水溶液、碧护、芸薹素内酯、二氢吡吩铁等植物生长促进剂和植物免疫诱抗剂，提高植株防寒抗冻能力。