

邗江农业技术信息

2025 年第 4 期（总第 91 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2025 年 02 月 24 日

抓好春季田管 促弱转壮 清沟理墒

——2025 年麦油返青期田管意见

当前“雨水”已过，麦油生长速度逐步加快，已进入春季田管的关键阶段。各镇（街道）要加强分类指导，切实抓好春季田管各项措施落实，努力夯实夏粮丰收基础。

一、当前苗情特点

目前，由于前期长时间缺水干旱，未能将“暖冬”转化为发苗，墒情不足导致晚播麦油出苗困难，植株生长缓慢。小麦、直播油菜整体生育进程不及上年，移栽油菜生育进程与往年相当。目前我区小麦平均叶龄 3.8 叶，比上年同期少 1.0 叶，平均亩总茎蘖数 48 万/亩，比上年同期少 10.6 万/亩。

二、存在主要问题

一是土壤墒情不足麦油生长慢。自 11 月底以来，我区降水异常偏少，麦油生长慢，尤其是晚播小麦、油菜出苗困难、出苗不齐，许多大户已采取沟灌洩水、喷灌等措施改善墒情，但部分田块引水困难或无上水习惯，土壤墒情不足，导致麦苗生长慢，分蘖和生根减缓，分蘖小，白根少。二是小麦苗情总体偏小。由于播期晚和长时间干旱，当前我区小

麦生育进程缓慢，叶龄和茎蘖数均少于去年。三是病虫害潜在威胁。随着春季气温回升，田间杂草萌发及生长速度加快，我区部分麦油田块草害达标，出现红蜘蛛、蚜虫等害虫。四是气象灾害隐患。返青期我区小麦冻害面积为 0.2 万亩，均为一般冻害，仅叶片受冻，对后期产量影响不大，油菜冻害发生面积为 0.5 万亩，大多为叶片受冻。春季天气变化较为频繁，倒春寒、连阴雨、旱渍急转等现象时有发生，需要做好应对措施。

三、春季田间管理技术意见

预计未来半个月降雨仍较少，但温度逐步升高，针对当前苗情特点和存在问题，要着重抓好“肥料运筹，春季化除和清沟理墒”等田管措施，切实将关键技术措施落实到位。

（一）因苗施策促弱转壮。对于当前苗小苗弱（4 叶及以下）、茎蘖数不足（少于 40 万）的小麦田块要尽快泅水施肥，尽早改善苗情。施用以尿素为主的速效肥快速促弱转壮，每亩施用尿素 10~15 斤，可适当配施复合肥；对于大于 5 叶的麦苗，茎蘖数足够的田块，应施用复合肥为主，促进分蘖转壮，少量补施尿素促黄塘，促平衡保分蘖争足穗；对于穗数足，苗多苗壮的田块以稳为主，坚持“不落黄，不拔节”不施肥；对于少部分旺长小麦田块，可以通过化控和镇压控制生长。对于生长量偏小油菜田块，要合理追施适量苗肥，促进及早发苗。对于目前已经抽薹的油菜田，如果植株开盘度较小、群体不足，要抓紧追施薹肥，一般亩施 60 斤 45%三元复合肥或配方肥及 10 斤左右尿素，适当提高磷

钾配比，增强植株抗逆性。植株个体生长健壮、群体旺盛的油菜田，应推迟施用薹肥，减少无效生长，一般在薹高 30 厘米左右追施。

（二）抓住有利时机及时除草。春季气温回升，杂草萌发生长加快，需及早做好杂草防除工作。各镇应根据田间草相和发生数量，及时开展好春季化除，可以用封杀结合方式，除小草防出草，可以选择“异丙隆+”或“甲基二磺隆+”等复配方案，有条件的地区可以闷水后除草，提高防除效果。

（三）清沟理墒防渍抗旱。冬季土壤冻融，沟系容易塌陷阻塞影响排水，春季雨水天气易发，极易发生渍害，应定期查看田间沟系情况，及时疏通，确保内外沟系畅通，做到雨止田干，防止渍害发生。今年越冬期降水异常偏少，部分地区田块墒情不足，影响麦油正常生长，需积极采取浇水、喷灌、沟灌闷水等措施改善墒情。沟灌时注意因灌满沟水渗透至畦面（以上午灌水，入夜前渗完为宜），切莫大水漫灌，如田面不平整导致田间积水，则应速灌速排。

（四）普施重施小麦拔节孕穗肥。小麦拔节孕穗肥的功效主要是培育壮秆，减少小花退化，增加每穗粒数，增加功能叶面积并延长功能期，提高千粒重。一般掌握在叶色褪淡、基部第一节间接近定长、第二节间伸长 1~2 厘米、叶龄余数 2.5 左右时施用拔节肥，亩追施三元高效复合肥约 30 斤，另加尿素 15~20 斤。可根据苗情长势适当调整施用时间，弱苗应适当提前施，旺苗则适当推迟施或先施复合肥、后施尿素氮肥。高产小麦需肥量大，应在剑叶（旗叶）露出一半

时，增施孕穗肥，一般亩追施尿素 10~15 斤，防早衰，增粒增重。

（五）落实防灾减灾措施。一是防御“倒春寒”冻害，及时采取应对措施。小麦拔节后尤其是拔长两节后，遇气温 0℃ 以下霜冻，主茎和大分蘖幼穗可能冻死冻伤。要密切关注天气趋势，低温寒流来临前对缺墒麦田及时灌水，改善土壤墒情，调节近地层小气候，缓冲地表温度变幅，减轻冻害发生。在冻害发生后 2~3 天及时调查幼穗受冻程度，根据受冻程度迅速增施恢复肥。仅叶片冻害或主茎幼穗冻死率 10% 左右，对产量影响不大，不追肥；茎蘖幼穗冻死率 10%~30% 的麦田应迅速亩施尿素 10 斤左右，每增加 10 个百分点，亩增施 5 斤尿素；主茎幼穗冻死率 80~100% 时，最多亩增施 30 斤尿素，争取小分蘖和高节位分蘖成穗，减少产量损失。要注意增施的恢复肥跟正常施用的拔节孕穗肥互不抵消。此外，用二氢吡吩铁、芸苔素、油菜素内酯、寡糖、水溶性硅肥等兑水喷施，也能预防和修复低温冻害，帮助小麦尽可能获得高产。油菜薹期如果遇到严重“倒春寒”冻害，可酌情补施 10~15 斤尿素作恢复肥，促进生长。二是加强病虫害测报和防治。小麦拔节期加强测报和防治好茎基腐病、纹枯病、白粉病等病虫害，抽穗扬花期做好以赤霉病为主的病虫害防治和“一喷三防”工作，注意用准药剂，用足药量和水量。油菜初花期及时开展“一促四防”工作，在初花期一周内施用适宜药剂进行防治，并适当喷施速效硼肥、磷酸二氢钾、芸苔素等叶面肥（剂），促进生长结实，防治

菌核病、防花而不实（“老鼠尾巴”）、防后期早衰、防高温逼熟。积极推广无人机或大型机械喷雾，实行统防统治，提高防治效果和作业效率。