

邗江农业技术信息

2024 年第 28 期（总第 83 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 10 月 18 日

小麦种子药剂处理意见

小麦秋播种子药剂处理可有效预防多种小麦种（土）传病害和地下害虫，显著降低病虫发生基数，明显减轻小麦生长期病虫害防治压力，同时促进小麦冬前苗匀、苗齐、苗壮。各镇（街道、园区）要通过强化组织宣传和服务指导，切实做好今年秋播小麦种子药剂处理，提高小麦病虫害防控效果，实现农药减量控害，打好来年夏粮生产丰收基础。

一、防治对象

所有小麦种子。避免使用自留种、选择适宜本地种植的抗耐病商品良种。

二、种子处理技术措施

对小麦纹枯病，可在 45% 烯肟·苯·噻虫悬浮种衣剂（400-800 克/100 千克种子）、60 克/升戊唑醇种子处理悬浮剂（50-66.6 毫升/100 千克种子）和 30 克/升苯醚甲环唑悬浮种衣剂（200-400 毫升/100 千克种子）中任选其一；

对小麦茎基腐病，可选用 200 克/升三氟吡啶胺种子处理悬浮剂（150-300 毫升/100 千克种子）。

对小麦黑穗病，可选用 60 克/升戊唑醇种子处理悬浮剂（30-45 毫升/100 千克种子）或 30 克/升苯醚甲环唑悬浮种衣剂（200-400 毫升/100 千克种子）；

对小麦全蚀病，可选用 30 克/升苯醚甲环唑悬浮种衣剂（500-600 毫升/100 千克种子）；

对病虫混合发生田块，可在 45%烯肟·苯·噻虫悬浮种衣剂（400-800 克/100 千克种子）、27%苯醚·咯·噻虫悬浮剂种衣剂（200-600 毫升/100 千克种子）和 32%戊唑·吡虫啉种子处理悬浮剂（300-700 毫升/100 千克种子）中任选其一。

拌种时可添加芸苔素内酯、氨基寡糖素、二氢卟吩铁等免疫诱抗剂，提高小麦出苗率和抗逆性。

要根据药剂标签推荐的剂量及方法，规范开展种子药剂处理；建议使用专用器械包衣（拌种），确保种衣剂（拌种剂）均匀覆盖在种子表面，切实提高种子包衣（拌种）效果；要现包（拌）现用，当日播完。迟播麦田种子药剂处理要注意低温条件下安全用药，防止药害事件发生，确保用药安全和作物安全。

三、注意事项：

1.若去年种植的小麦有黑穗病发生，则今年不可用自留种播种。

2.经药剂处理过的种子勿作禽畜饲料或加工饲料、食品等；

3.药剂处理过的种子应及时播种并单独存放，以免污染或误食；

4.农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃；

5.禁止使用无“三证”的种子处理剂，没有作为小麦拌种剂或种衣剂登记的农药不能作为种子处理剂使用；

6.在小麦播种时注意农田灭鼠：沿田埂边（离田埂 3 米内田间错位投放均可）每 15-25 米投放一堆鼠药，每堆 10 克。