

邗江农业技术信息

2024 年第 29 期（总第 84 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2024 年 10 月 18 日

麦田杂草综合防控技术意见

近年来，受轻简化栽培技术推广、收割机跨区作业、除草剂使用不科学、极端异常天气频发等多重因素影响，麦田杂草发生加重，对我区小麦稳定生产构成严重威胁。为切实做好麦田杂草防除工作，夯实来年夏粮丰产丰收基础，制定技术意见如下：

一、防控策略

坚持“前封后杀、综合治理”的原则，科学应用“土壤处理为重点，茎叶处理为补充”的化学防控技术。

二、防控技术

1. 农业措施：

使用合格的商品种子，剔除混杂的杂草种子，减少外源杂草。开展平整土地、适期播种、科学施肥、合理密植，完善田间沟系配套，保持良好土壤墒情，培育壮苗压草，减轻杂草发生危害。

2. 生态措施：

及时清除田埂、沟渠边、路边杂草，结合周期性深翻（或深旋）整地并镇压，将土壤表层的杂草种子翻埋于深层，降

低田间杂草种子萌发比例，减少杂草发生基数。

3.化除措施：

土壤封闭处理。小麦播后苗前，在土壤墒情适宜时，可选用氟噻草胺、丙草胺、乙草胺、异丙隆、吡氟酰草胺、氟吡酰草胺、丙草·异丙隆、氟噻·吡酰·呋等土壤封闭处理剂，将杂草消灭在萌芽状态；对多花黑麦草、大穗看麦娘发生严重的麦田，可选用砒吡草唑及其复配剂进行土壤封闭。喷施土壤封闭除草剂时用水量要适当加大，每亩用水量 30-40kg 为宜。

“封杀”结合处理。小麦齐苗期，在土壤墒情适宜时，可选用具有“封杀”双重作用的除草剂品种或复配剂，如吡酰·异丙隆、异隆·丙·氯吡或“异丙隆+封闭药剂”等，进行“封杀”除草，既可防除已出苗的杂草，也能控制尚未出苗的杂草，达到省工节本、减少药量的效果，每亩用水量 20-30 kg 为宜。

茎叶处理。小麦 3-5 叶期，根据田间残留杂草种类选择对路除草剂品种，以禾本科杂草为主的田块可选用啶啉·炔草酯、氟唑·炔草酯、甲基二磺隆、氟唑磺隆·甲基二磺隆、甲二·异丙隆、氟唑·异丙隆、环吡·异丙隆等药剂进行防控；以阔叶草为主的田块，可选用氯氟吡氧乙酸、2 甲 4 氯、2 甲·双氟、唑草·苯磺隆、双氟·唑草酮、双氟·氟氯酯、氟吡·双氟等药剂进行防控，每亩用水量 15-20 kg 为宜。

三、注意事项

1.要根据田间草相，合理选择对路除草剂，避免长期单一使用同一作用机理的除草剂品种，交替轮换用药，以延缓抗药性的产生和发展。

2.冬前土壤封闭田间干旱时，可趁雨后及时施药，或通过人工造墒或加大用水量提高土壤封闭效果，封闭用药后土表不能积水。如遇长时间降雨或暴雨，及时清沟理墒、排水降渍。

3.冬前茎叶处理，宜在小麦3叶1心后，杂草基本出齐时进行；冬后杂草防控，严格掌握在小麦拔节前用药。施药时间选择在上午9点至下午4点间、晴天无风且日平均气温不低于5℃时，尤其要避开秋冬季第一次强寒流；阴雨天、大风天禁止用药，以防药效降低及雾滴飘移产生药害。

4.选用性能良好的喷雾器械，使用扇形喷头，避免因喷雾器械“跑、冒、滴、漏”造成药液浪费和局部药害。根据所用喷雾器械类型合理设置兑水量，确保喷雾均匀、不重喷、不漏喷，防止药液漂移对周边其它作物造成药害。

5.异丙隆、甲基二磺隆、二磺·甲磺隆、唑草·苯磺隆等在强寒流前后用药易产生药害。炔草酯、唑啉草酯等与激素类除草剂混用易产生药害。苯醚甲环唑与氯氟吡氧乙酸混用时易产生药害。小麦田禁用甲磺隆、绿磺隆及其复配剂。

6.农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。