

邗江农业技术信息

2025 年第 3 期（总第 90 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2025 年 02 月 18 日

麦田杂草春季化除意见

当前，我区小麦正处于返青分蘖的关键时期，也是麦田杂草防控的重要阶段。各镇（街道、园区）务必重视，积极引导农户抢抓气温回升后晴好天气，根据田间草相，选择对路、优质、安全的除草剂品种，及时开展麦田杂草春季化除工作，有效控制麦田杂草危害，为夏粮丰产丰收筑牢根基。

一、杂草发生情况

受前期干旱少雨气候影响，我区麦田杂草总体发生程度略轻于去年同期，但部分冬前未开展封闭处理的田块草害严重。近期调查，单子叶杂草达标率 28.6%、双子叶杂草达标率 5.7%、混生草达标率 2.9%，达标面积 3.9 万亩。杂草密度：单子叶草量 0-120 万株/亩，平均 21.3 万株/亩，双子叶草量 0-31 万株/亩，平均 1.33 万株/亩。当前田间杂草以禾本科杂草为主（看麦娘、日本看麦娘、蔺草等），阔叶杂草主要有猪殃殃、牛繁缕、巢菜、荠菜等。随着气温回升和春季出草高峰的到来，田间草量将会进一步上升，杂草防除态势严峻。

二、防治意见

（一）防治策略：

根据草相选准药剂，抓住时机合理施药。

（二）防治时间：

小麦 3-5 叶期（小麦拔节期前），抓住晴好天气及时进

行防治。

（三）防治方法：

1.以禾本科杂草为主的田块可使用甲基二磺隆、唑啉·炔草酯、氟唑·炔草酯、氟唑磺隆·甲基二磺隆、甲基二磺隆·异丙隆、氟唑·异丙隆、环吡·异丙隆等药剂。日本看麦娘发生重的田块，宜使用啶磺草胺。

2.以阔叶杂草为主的田块可使用氯氟吡氧乙酸、2甲4氯、2甲·双氟、唑草·苯磺隆、苯唑·2甲钠、双氟·唑草酮、双氟·氟氯酯、啶磺·氟氯酯、氟吡·双氟、氟吡·双唑酮等药剂。荠菜发生较重的田块可使用苯磺隆+2甲4氯钠盐于小麦拔节前施用。

3.禾本科、阔叶杂草混生的田块可使用甲基二磺隆+异丙隆+氯氟吡氧乙酸异辛酯。

以上药剂在使用时必须严格遵照药剂登记量使用，喷雾每亩用水量20-30kg为宜，使用植保机械（植物无人机、自走式喷杆喷雾机）要加大用水量。

（四）注意事项：

1.为避免产生药害，已拔节小麦田禁用甲基二磺隆和异丙隆，大麦田禁用精噁唑禾草灵，氯氟吡氧乙酸不可与苯醚甲环唑混用，炔草酯、唑啉草酯等不可与激素类除草剂混用；为确保后茬作物安全，所有麦田禁用绿、甲磺隆复配剂。

2.智能监测显示，我区目前土壤墒情较差。旱情严重的田块，杂草防治前需先窖水，待田间水排干且田面无积水后方可用药，以免造成药害。

3.去年播种时间迟、苗弱小的田块，要选准药剂，避免药害产生。

4.农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。