

邗江农业技术信息

2025 年第 6 期（总第 93 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2025 年 03 月 19 日

小麦主要病虫害发生情况与防治意见

当前，全区小麦陆续进入拔节期（结合多点苗情监测设备数据），应重点关注纹枯病、白粉病、茎基腐病、蚜虫等小麦主要病虫害。据气象部门预测，下一阶段有多次雨水过程，田间郁闭程度增加，利于多种病害发生。全区各镇（街道、园区）要加强防治指导，主动出击，适时用药，切实做好小麦主要病虫害防治工作，为夏粮丰产丰收奠定坚实基础。

一、发生情况

1、小麦纹枯病：3 月 18 号大面积调查，田块发病率 9.4%，病株率 0-3.13%，平均 0.2%。受前期播期多偏迟、降雨持续偏少的影响，纹枯病发生情况总体偏轻，但随着近期雨水增加、气温回升，小麦生育进程加快、陆续开始拔节，纹枯病将进入侵茎危害的关键时期。三月下旬气温回升，田间郁蔽程度增加，后期病情将会继续加重。

2、蚜虫：3 月 18 日调查，田块发病率 50%，蚜株率 0-80%，平均 10.6%，百株蚜量 0-640 头，平均 59 头/百株。

3、其他病害：

小麦白粉病：暂未查见。今年我区小麦主栽品种以扬麦 23、扬麦 34、扬辐麦 4 号、扬麦 25 等高、中感白粉病品种为主。随着小麦进入拔节期，田间通风透气程度下降，小麦

白粉病一旦发生，病情增长速度快。

小麦茎基腐病：暂未查见。苗期感染茎基腐病的小麦，茎基部叶鞘变褐，严重时麦苗发黄死亡。

二、防治意见

1、小麦纹枯病

防治时间：小麦拔节初期，田间病株率达 10%时（大致时间在 3 月下旬）。

防治药剂：可选择噻呋酰胺、戊唑醇、丙环唑、烯唑醇等的单剂或复配剂开展防治。

2、小麦白粉病

防治时间：根据田间病害发生情况，一旦田间病叶率达 5%即要进行药剂防治，一般时间在 3 月下旬。

防治药剂：可选择氟环唑、丙硫菌唑、环丙唑醇、啞菌酯、吡唑醚菌酯等的单剂或复配制剂。严重田块隔 7~10 天喷 1 次，连续 1~2 次。

3、小麦茎基腐病

防治时间：根据田间病害发生情况，一旦发生即可防治。

防治药剂：可选用丙硫菌唑·戊唑醇、戊唑·噻霉酮等登记药剂或叶菌唑、氰烯菌酯、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯等推荐药剂防治。

三、注意事项

1、用足药量和水量，喷杆喷雾机亩用水量 20-30kg，机动弥雾、静电喷雾亩用水量 15-20kg，高效植保无人机亩用水量不低于 1.5kg，做到均匀防治。

2、防治小麦纹枯病时，慎用苯甲·丙环唑，以防其与氯氟吡氧乙酸使用间隔期过短，产生药害。

3、在病害防控同时，可结合苗情，添加生长调节剂或免疫诱抗剂，如芸苔素内酯、赤吖乙芸苔、三十烷醇、噻苯隆、二氢卟吩铁等。

4、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。