

邗江农业技术信息

2025 年第 7 期（总第 94 期）

扬州市邗江区农作物技术推广中心

2025 年 03 月 19 日

油菜菌核病防治意见

油菜菌核病是油菜上的主要病害。该病是典型的气候性病害，一旦油菜花期遇上连阴雨天气，将十分有利于病害的发生。当前我区油菜已陆续进入盛花期，受前期少雨影响，油菜苗情偏弱、易感病期长，病菌侵染和发病几率增加，因此，各镇（街道）应高度重视，加强宣传发动和技术指导，抓住适期、主动防治，确保油菜稳产丰收。

一、发生情况

近日调查，田块发病率 33.3%，叶病株率 0-6.67%，平均 2.22%。油菜已陆续进入盛花期（花期侵染和有效防控的关键时期），预计整个花期会持续 1 个月左右。

二、防治意见

坚持“预防为主、综合防治”的防治策略，采用农业防治与化学防治相结合的方法，重点做好适期用药。

1、农业防治。清沟理墒，做好田间沟系配套，促进油菜健康生长，增强自身抗病能力，及时清除杂草及老、黄叶，减少菌源。

2、化学防治。加强对油菜开花盛期（主茎开花率达 80% 左右、一次分枝开花株率 50% 左右）的药剂预防，药剂可选

用氟唑菌酰胺、啉酰菌胺、腐霉利、咪鲜胺、异菌脲等药剂，以及盾壳霉或芽孢杆菌等生物菌剂。如遇连阴雨、花期持续时间长等适宜病害流行天气，隔7天左右进行第二次药剂预防。

三、注意事项

1、油菜花期植株高大，田间郁蔽，要用足水量，确保全面喷透，药后3小时遇雨需做好补治工作。

2、当田间蚜虫量达到500头/百株时，可使用氟啶虫酰胺复配剂、溴氰菊酯等药剂；可喷施赤·吲乙·芸苔、二氢卟吩铁、益施帮等提高油菜抗病抗逆能力。

3、油菜花期施药时要停用吡虫啉、噻虫嗪等新烟碱类药剂，以防影响蜜蜂采蜜安全。

4、农药包装废弃物必须回收，不得随意丢弃。