

阿莫西林药物说明书

一、药物概述

阿莫西林（Amoxicillin）是一种广谱半合成青霉素类 β -内酰胺抗生素，由英国比彻姆公司于1972年开发上市。

通用名：阿莫西林

英文名：Amoxicillin

化学式：C₁₆H₁₉N₃O₅S

分子量：365.4 g/mol

剂型：胶囊（250mg、500mg）、片剂、颗粒剂、干混悬剂

二、药理作用

阿莫西林通过抑制细菌细胞壁合成发挥杀菌作用。其机制为：与细菌细胞膜上的青霉素结合蛋白（PBPs）结合，抑制转肽酶的活性，阻碍细胞壁黏肽的交叉联接，使细菌细胞壁合成受阻，菌体膨胀裂解而死亡。

药代动力学特点：

- 口服吸收良好，生物利用度约75-90%，不受食物影响
- 血浆蛋白结合率约20%
- 广泛分布于体液和组织，可透过胎盘
- 半衰期约1-1.5小时
- 主要经肾脏排泄（60-70%以原形排出）

三、抗菌谱

阿莫西林对以下细菌有效：

革兰阳性菌：

- 链球菌属（包括肺炎链球菌、化脓性链球菌）
- 不产 β -内酰胺酶的葡萄球菌
- 粪肠球菌
- 李斯特菌

革兰阴性菌：

- 流感嗜血杆菌（不产 β -内酰胺酶株）
- 大肠埃希菌（部分菌株）
- 奇异变形杆菌
- 淋病奈瑟菌
- 幽门螺杆菌

天然耐药菌：

- 产 β -内酰胺酶的金黄色葡萄球菌
- 铜绿假单胞菌
- 肠杆菌属
- 不动杆菌属

四、适应证

1. 上呼吸道感染：急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、鼻窦炎
2. 下呼吸道感染：急性支气管炎、社区获得性肺炎（轻症）
3. 泌尿生殖系统感染：尿路感染、淋病（单次大剂量）
4. 皮肤软组织感染：蜂窝织炎、脓疱疮
5. 幽门螺杆菌感染：作为根除Hp三联/四联方案中的核心药物
6. 心内膜炎预防：牙科手术前预防感染性心内膜炎
7. 莱姆病：早期莱姆病的一线治疗

五、用法用量

成人常用剂量：

- 轻中度感染：250-500mg，每8小时一次
- 重度感染：500mg-1g，每8小时一次
- 幽门螺杆菌根除：1g，每日2次（联合其他药物，疗程14天）
- 心内膜炎预防：术前1小时口服2g

儿童常用剂量：

- 轻中度感染：20-40mg/kg/日，分3次
- 重度感染：40-90mg/kg/日，分2-3次
- 中耳炎（大剂量方案）：80-90mg/kg/日，分2次

肾功能不全剂量调整：

- GFR 10-30 ml/min: 每12小时给药
- GFR <10 ml/min: 每24小时给药

六、不良反应

常见（1-10%）：腹泻、恶心、皮疹

少见（0.1-1%）：呕吐、荨麻疹、腹痛

罕见（<0.1%）：过敏性休克、Stevens-Johnson综合征、伪膜性肠炎、血液系统异常（白细胞减少、血小板减少）、肝功能异常、间质性肾炎

特别警告：青霉素过敏者禁用。用药前应详细询问过敏史，必要时做皮肤过敏试验。一旦出现过敏反应立即停药并给予相应处理。

七、注意事项

1. 青霉素过敏者禁用，头孢菌素过敏者慎用（交叉过敏率约1-10%）
2. 传染性单核细胞增多症患者使用可能出现皮疹（发生率高达90%），应避免使用
3. 长期或反复使用可能导致二重感染（真菌感染或耐药菌感染）
4. 妊娠期用药分类B级，必要时可使用
5. 可分泌入乳汁，哺乳期使用需注意观察婴儿是否有腹泻或过敏
6. 与甲氨蝶呤合用可增加甲氨蝶呤毒性
7. 可能干扰口服避孕药的效果