Observed-count intervals: nominal 95%, eight catalogs per cell
Optical grz
Available multiband
Band offset
Binary brightening
Class distance correlated
Dust offset
Dwarf dominated
Evolved rich
Known model
Metal poor
Middle metallicity
Missing WISE
Narrow 4 kpc
Reference like
Same library
Weak WISE
50 88 88 88 75 100
0 62 75 100 100 100
62 75 88 62 75 62
88 100 88 100 100 100
75 88 100 100 100 100
25 88 100 75 75 88
100 100 88 100 100 100
100 62 88 75 100 100
62 75 100 100 100 100
100 88 100 100 100 100
12 0 0 100 100 100
62 75 100 100 100 100
100 100 88 100 88 88
75 88 88 100 100 100
62 88 88 88 88 100
0 50 75 100 100 100
75 75 88 75 88 62
100 100 100 100 100 100
75 88 100 100 100 100
25 75 100 88 75 88
100 100 88 100 100 88
100 75 100 75 100 100
75 88 100 100 100 100
100 88 100 100 100 100
12 0 0 100 100 100
62 75 100 100 100 100
88 88 88 100 88 88
75 100 88 100 100 100
0–2
2–5
5–10
10–20
20–50
>50
Distance bin (kpc)
Distance bin (kpc)
Empirical coverage (%)
100
80
60
40
20
0