

# STAT601 LAB5

Chengen Xie (cx22)

February 19, 2015

1

$$p(N, \beta | y) \propto p(y | N, \beta) p(N) p(\beta) = \frac{25^N \beta^y (1 - \beta)^{N-y} e^{-25}}{y! (N - y)!}$$

2

$$P(N | y, \beta) = \frac{P(N, y, \beta)}{p(y, \beta)} \propto \frac{p(y | N, \beta) p(N) p(\beta)}{p(y | \beta)} \propto p(y | N, \beta) p(N) = \binom{N}{y} p^y (1 - \beta)^{N-y} \frac{25^N}{N!} e^{-25} \propto \frac{(25(1 - \beta))^{N-y}}{(N - y)!}$$

Therefore,  $N - y \sim \text{Poisson}(25(1 - \beta))$

$$p(\beta | y, N) \propto p(y | N, \beta) p(\beta) \propto (1 - \beta)^{N-y} \beta^y$$

Therefore,  $\beta \sim \text{Beta}(y+1, N-y+1)$

3


```
Sample <- 10000

N<-rep(0,Sample)
Beta<-rep(0,Sample)
N[1] <- 50
Beta[1] <- 0.05


for (i in 2:Sample){
  N[i] <- rpois(1,25*(1-Beta[i-1])) + 20
  Beta[i] <- rbeta(1,21,N[i]-20+1)
}
```

4


```
xseq <- seq(1,10)
plot(xseq,Beta[1:10])
lines(xseq,Beta[1:10])
```



```
plot(xseq,N[1:10])  
lines(xseq,N[1:10])
```



```
#2D traceplot  
plot(N[1:10],Beta[1:10])  
lines(N[1:10],Beta[1:10])
```



5

```
#central 90% posterior credible interval for beta
quantile(Beta[-c(1:1000)],c(0.05,0.95))
```

```
##          5%          95%
## 0.5549397 0.9707958
```

6

```
#probability that exactly 20 people were polled
sum(N[-c(1:1000)]==20)/(Sample-1000)
```

```
## [1] 0.07733333
```