

大数定律与中心极限定理

随机性为什么能在大量重复中呈现确定性规律与正态渐近？

数学一 · 概率统计 Topic 06

母问题：随机性为什么能在大量重复中呈现稳定位置与可描述的剩余波动？

先固定本册最小记号：i.i.d. 表示“相互独立且同分布”； $X_n \xrightarrow{P} X$ 表示对任意 $\varepsilon > 0$ 都有 $P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ ； $X_n \xrightarrow{d} X$ 表示分布函数在极限分布的连续点处收敛。下文把大数定律简称 LLN，把中心极限定理简称 CLT。后文的直觉解释都不得替代这些定义。

在经典的 i.i.d.、 $E(X_i) = \mu$ 、 $0 < \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ 这一共同条件包下，同一组随机平均会出现两种彼此相关但互不推出的现象：1. 稳定位置： $\bar{X}_n$ 靠近确定常数 μ ；大数定律回答“最终稳定到哪里”；2. 剩余波动：把误差按 $\sqrt{n}$ 的尺度放大后出现非退化极限；经典中心极限定理回答“稳定中心附近怎样波动”。

因此正确的结构不是“先 LLN，再由 LLN 推出 CLT”，而是从同一生成条件分别进入两条结论：

$$X_1, \dots, X_n \text{ i.i.d.}, \quad E(X_i) = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2 \in (0, \infty)$$

稳定问题

波动问题

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

大数定律

中心极限定理

某些大数定律可以放宽有限方差条件，某些中心极限定理也允许非同分布；这些条件变化必须分别核对，不能把一条定理的资格借给另一条。

1 本册定位与职责划分

- **本册主干拥有 (Owns)**：依概率/依分布等收敛语言、大数定律、中心极限定理、二项正态近似以及精确-渐近边界。
- **拓展层**：几乎必然与 L^p 收敛的更完整关系、Borel–Cantelli、Lyapunov/Lindeberg/Berry–Esseen、Slutsky、Delta 与 o_P/O_P 用来解释机制和连接后续统计推断；它们不得伪装成数学一每道题都必须调用的主干清单。
- **本册使用 (Uses)**：Topic 05 的期望、方差与 Chebyshev 不等式；Topic 07 的样本统计量对象。
- **本册不拥有 (Does not own)**：小样本下精确抽样分布 (Topic 07 负责)、统计量渐近估计性质 (Topic 08 负责)。
- **输出目标 (Output)**：大样本下的概率近似计算与极限定理判断框架。

2 第一层：收敛语言与强度边界

设 X_n, X 定义在同一概率空间上。四种常用收敛回答的问题不同：

- 几乎必然收敛： $P(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$ ，记作 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ ，是样本路径层面的结论；
- 依概率收敛：对所有 $\varepsilon > 0$ ， $P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$ ，记作 $X_n \xrightarrow{P} X$ ，是偏离概率层面的结论；
- L^p 收敛： $E|X_n - X|^p \rightarrow 0$ ，记作 $X_n \xrightarrow{L^p} X$ ，其中 $p=2$ 是均方收敛；
- 依分布收敛：分布函数在极限分布的连续点收敛，记作 $X_n \xrightarrow{d} X$ ，不要求定义在同一概率空间。

基本蕴含链为

$$X_n \xrightarrow{a.s.} X \implies X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{d} X, \quad X_n \xrightarrow{L^p} X \implies X_n \xrightarrow{P} X.$$

若 $q > p > 0$ ， L^q 收敛推出 L^p 收敛；若极限为常数 c ，则 $X_n \xrightarrow{d} c$ 与 $X_n \xrightarrow{P} c$ 等价。反向一般不成立，不能把“分布越来越像”写成“同一条样本路径越来越近”。

若 g 在 X 的实际取值处几乎处处连续，连续映射定理给出

$$X_n \xrightarrow{P} X \implies g(X_n) \xrightarrow{P} g(X), \quad X_n \xrightarrow{d} X \implies g(X_n) \xrightarrow{d} g(X).$$

不连续函数必须另行检查极限落在不连续点的概率。

1. 四大收敛蕴含拓扑主干

几乎处处均方收敛 单向强弱层级：



- a.s. 强收敛与 L^2 均方互不推出；
- 二者均可单向推出依概率收敛；
- 依概率收敛单向推出依分布收敛。

常数等价特权：

若极限为确定常数 c ，则

$$X_n \xrightarrow{d} c \iff X_n \xrightarrow{P} c.$$

3. 极限代数工具：连续映射 (CMT) 与 Slutsky 定理

- 连续映射定理 (CMT)：

若 g 连续： $X_n \xrightarrow{*} X \implies g(X_n) \xrightarrow{*} g(X)$
 $(* \in \{a.s., L^r, P, d\})$ ；

- Slutsky 代数定理 (考场大杀器)：

若 $X_n \xrightarrow{d} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{P} c$ ，则：

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c, \quad X_n Y_n \xrightarrow{d} cX, \quad X_n / Y_n \xrightarrow{d} X/c.$$

2. 逆命题不成立：三大经典反例

- $P \not\Rightarrow a.s.$ 滑动阶梯区间：

移动区间指示函数 I_{A_n} ，区间宽度 $\rightarrow 0$ 使测度趋零，但点态无限振荡无法收敛；

- $a.s. \not\Rightarrow L^2$ 极端逃逸尖峰：

$P(X_n = n^2) = \frac{1}{n^2}$ ，以概率 1 收敛到 0，但二阶矩 $E[X_n^2] = n^2 \rightarrow \infty$ 发散；

- $d \not\Rightarrow P$ 对称相反同分布：

$X \sim N(0, 1)$ ，令 $X_n = -X$ ；边缘恒同分布，但差值 $|X_n - X| = 2|X| \neq 0$ 。

考研判别清单与高频避坑：

- 判别依概率收敛：

若 $E[X_n] \rightarrow c$ 且 $\text{Var}(X_n) \rightarrow 0$ ，则 $X_n \xrightarrow{P} c$ ；

- Slutsky 适用边界警示：

若 $Y_n \xrightarrow{d} Y$ (非常数)，则 $X_n + Y_n \not\Rightarrow X + Y$ ！

- Riesz 子列定理：依概率收敛必存在几乎处处收敛子列。

收敛拓扑真理：样本轨道点态约束 (a.s.) 与均方能量积分 (L^2) 汇流于依概率测度收敛 (P)，最后投影为宏观累积分布 (d)；Slutsky 运算严格要求次要项依概率收敛到常数。

3 第二层：Borel–Cantelli 与路径事件

事件“无穷多次发生”记为

$$\{A_n \text{ i.o.}\} = \limsup A_n = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n.$$

第一 Borel–Cantelli 引理：若 $\sum_n P(A_n) < \infty$ ，则 $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$ ，不要求独立。第二引理：若 A_n 相互独立且 $\sum_n P(A_n) = \infty$ ，则 $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$ 。它们把概率和转成路径层面的“只发生有限次/发生无穷次”，也是强收敛证明的重要工具。

4 第三层：大数定律的完整分层

4.1 从方差衰减到弱大数律

若 X_i 两两独立、 $\text{Var}(X_i) \leq C$ ，则

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \leq \frac{C}{n}.$$

Chebyshev 立刻给出

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0.$$

弱大数律的证明骨架

这里的关键不是“样本量大”，而是方差按 $1/n$ 衰减：先由独立性消掉和式中的协方差项，再用 Chebyshev 把方差上界转换成偏离概率上界。若只知道 $E|X_1| < \infty$ 而没有有限方差，则不能沿这条 Chebyshev 路径，而要调用 Khinchin 弱大数律，并明确它的前提更换了。

真题对象映射：2022 Q 九的样本二阶矩

若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布， $E(X_1^k) = \mu_k$ ($k = 1, 2, 3, 4$)，题目考察

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad \text{偏离} \quad \mu_2.$$

先把 $W_i = X_i^2$ 看成新的 i.i.d. 变量，则 $E(W_i) = \mu_2$ 、 $\text{Var}(W_i) = \mu_4 - \mu_2^2$ 。于是

$$\text{Var}(T_n) = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n}, \quad P(|T_n - \mu_2| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}.$$

不能看到“样本均值”就把中心写成 μ_1 ，也不能把该上界当成精确概率；核心动作是先识别极限对象是 X^2 的总体均值。

若 X_i 独立同分布且 $E|X_1| < \infty$ ，Khinchin 弱大数律给出

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} E(X_1).$$

它只需要一阶绝对矩，不需要有限方差。若再有 i.i.d. 与有限一阶绝对矩，Kolmogorov 强大数律给出

$$\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} E(X_1).$$

Bernoulli 频率定律只是强大数律的示性变量特例：独立重复事件的频率几乎必然趋于其概率。

4.2 大数律的统计推论

若 $E|X|^k < \infty$, 则样本 k 阶原点矩

$$A_{k,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{a.s.} E(X^k).$$

若 $E(X^2) < \infty$, 则

$$\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{a.s.} E(X^2), \quad \bar{X}_n^2 \xrightarrow{a.s.} [E(X)]^2,$$

所以 $B_{2,n} = n^{-1} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2 \xrightarrow{a.s.} \sigma^2$, 且 $S_n^2 = nB_{2,n}/(n-1)$ 也相合。对固定 x , 经验分布函数

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_{\{X_i \leq x\}}$$

几乎必然趋于 $F(x)$; 更强的 Glivenko–Cantelli 结论为 $\sup_x |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{a.s.} 0$ 。样本对象的 Owner 见 Topic 07, 本册只提供极限机制。

5 第四层：中心极限定理的机制与扩展


5.1 经典 i.i.d. CLT

若 X_i i.i.d., $E(X_i) = \mu$, $0 < \sigma^2 < \infty$, 则

$$\boxed{\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)}.$$

因此 $\bar{X}_n$ 的误差尺度是 $n^{-1/2}$; 这是“平方根规律”的来源。LLN 研究 $\bar{X}_n$ 是否靠近 μ , CLT 研究把剩余误差放大 $\sqrt{n}$ 后呈现何种非退化形状。

1. 大数定律 (LLN): 原尺度塌缩



物理机制 (退化塌缩):

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0;$$


宏观随机涨落完全消失, 概率质量集中塌缩于常数单点 μ 。

收敛命题:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$$

$$\bar{X}_n \xrightarrow{a.s.} \mu$$

2. 中心极限 (CLT): $\sqrt{n}$ 尺度展开



物理机制 (显微展开):

乘以 $\frac{\sqrt{n}}{\sigma}$ 放大残余波动;

微观残余涨落展开为普适对称的高斯钟形曲线。

收敛命题:

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

3. 双尺度对比辨析与考场动作清单

- **研究对象:** $\bar{X}_n$ (宏观) vs Z_n (显微);
- **极限形态:** 退化常数 μ vs 普适高斯 $N(0, 1)$;
- **核心功能:** 证明参数估计一致性与宏观稳态。

- **收敛模式:** 依概率收敛 $\xrightarrow{P}$ vs 依分布收敛 $\xrightarrow{d}$;
- **功能定位:** 参数点估计 vs 渐近置信区间估计;
- **考场避坑警示:**

求和区间概率必用 CLT 查表, 勿用 LLN!

双尺度全景哲学: 大数定律回答 “收敛到何处” (原尺度退化为确定常数 μ) ; 中心极限定理回答 “残余波动如何分布” ($\sqrt{n}$ 尺度展开为高斯分布) ; 二者互不替代。

CLT 的前提映射

题目中的样本均值必须先映射为 $S_n - n\mu$: 中心化去掉确定位置, 独立同分布与 $0 < \sigma^2 < \infty$ 提供经典 CLT 的适用条件, 除以真实尺度 $\sigma\sqrt{n}$ 才得到标准正态极限。若方差未知, 先由 Topic 05/06 证明 $S_n \xrightarrow{P} \sigma$, 再用 Slutsky; 这只产生渐近结论, 不能把一般总体的 Student 化统计量改写成有限样本 t 分布。

5.2 二项近似与连续性修正

若 $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, 则

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

若用连续正态分布近似离散二项概率, 连续性修正通常把整数边界移动 0.5, 以减少离散—连续边界误差; 例如

$$P(S_n \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

这是近似路径的精度增强, 不是 CLT 本身的额外定理条件。若题目明确要求 “利用正态近似” 或需要数值精度, 应优先修正; 若只考标准化结构、选项本身不区分 0.5 修正, 必须说明采用的考试约定。 np 与 $n(1-p)$ 不能过小; 规则阈值只是经验提示, 不是定理条件, 偏斜时应报告近似风险。

精确正态抽样与 CLT 近似不是同一条路

1998 Q 十四的总体本身为 $N(3.4, 6^2)$ ，因此无论 n 多大都有有限样本精确结论

$$\bar{X}_n \sim N\left(3.4, \frac{36}{n}\right), \quad P(1.4 < \bar{X}_n < 5.4) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1.$$

要求概率至少 0.95，用 $\Phi^{-1}(0.975) = 1.96$ 得 $\sqrt{n}/3 \geq 1.96$ ，故 $n \geq 35$ 。

2020 Q 八则是 $S \sim \text{Bin}(100, 1/2)$ 的离散计数，题目明确要求 CLT 近似：未经修正的结构标准化为 $(55 - 50)/5 = 1$ ；若追求离散到连续的数值精度，再把边界改为 55.5 得 1.1。前者是精确正态总体的有限样本分布，后者是一般离散计数的渐近近似，触发条件不能互换。

真题精度回检：2020 Q 八的三种输出不能混写

令 $S \sim \text{Bin}(100, 1/2)$ ，题目目标为 $P(S \leq 55)$ 。精确二项模型直接给

$$P(S \leq 55) = \sum_{k=0}^{55} \binom{100}{k} 2^{-100} \approx 0.8643735.$$

若按题目要求使用 CLT， $ES = 50$ 、 $\text{SD}(S) = 5$ ，不作连续性修正时

$$P(S \leq 55) \approx \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) = \Phi(1) \approx 0.8413447.$$

把离散事件 $S \leq 55$ 的格点边界移到连续区间端点 55.5，得到连续性修正

$$P(S \leq 55) \approx \Phi\left(\frac{55.5 - 50}{5}\right) = \Phi(1.1) \approx 0.8643339.$$

三者分别是精确值、渐近结构值、精度增强的渐近值；不能把其中任一个写成另外两个的等号。实际答题先服从题目指定的输出层，再用数值回检判断近似方向和精度。

Poisson 近似：稀疏计数的另一条路径

若 $S_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ ， $p_n \rightarrow 0$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$ ，固定 k 时

$$P(S_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

所以当题目给出“大次数、单次概率小、 np 适中”并明确要求 Poisson 近似时，先取 $\lambda = np$ ，再在 Poisson 模型中求和；例如 2025 Q 九中 $n = 20, p = 0.1, \lambda = 2$ ，故

$$P(S_n \leq 1) \approx e^{-2} (1 + 2) = 3e^{-2}.$$

这与 CLT 正态近似的识别对象不同：Poisson 路径保留稀疏计数的离散结构，正态路径则中心化并按 $\sqrt{np(1-p)}$ 放大。不能仅因样本量大就在二者之间任意替换；先读题目指定的近似机制，再做参数和尾事件回检。

5.3 非同分布与误差界

对独立非同分布变量，令 $s_n^2 = \sum_i \text{Var}(X_i)$ 。Lyapunov 条件

$$\frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_i E|X_i - EX_i|^{2+\delta} \rightarrow 0$$

推出标准化和依分布收敛到 $N(0, 1)$ ；Lindeberg 条件则直接排除少数极端项主导总方差。i.i.d. 且三阶绝对中心矩有限时，Berry-Esseen 给出

$$\sup_x |P((S_n - n\mu)/(\sigma\sqrt{n}) \leq x) - \Phi(x)| = O(n^{-1/2}).$$

这些是机制与误差边界，不应伪装成所有题目的必需假设。

6 第五层：Slutsky、Delta 与渐近阶

若 $X_n \xrightarrow{d} X$ 、 $Y_n \xrightarrow{P} c$ (常数)，则

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c, \quad X_n Y_n \xrightarrow{d} cX, \quad X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c \quad (c \neq 0).$$

由大数律 $S_n \xrightarrow{P} \sigma$ ，经典 CLT 与 Slutsky 联立得到一般总体的 Student 化渐近结论：

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

这不是一般总体的有限样本 t 分布；精确 t 归 Topic 07。

若 $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \tau^2)$ ，且 g 在 θ 处可微，则一阶 Delta 方法为

$$\sqrt{n}[g(T_n) - g(\theta)] \xrightarrow{d} N(0, [g'(\theta)]^2 \tau^2).$$

它来自 $g(T_n) = g(\theta) + g'(\theta)(T_n - \theta) + o_P(n^{-1/2})$ ；若 $g'(\theta) = 0$ ，必须改用二阶展开。

渐近记号

$$X_n = o_P(a_n) \iff X_n/a_n \xrightarrow{P} 0,$$

而 $X_n = O_P(a_n)$ 表示 X_n/a_n 在概率意义下有界。它们用来判断 Taylor 余项能否忽略，不能替代具体的收敛方式。

7 第六层：精确、渐近与失效边界

场景	结论
正态总体、 σ 已知	$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma$ 对任意 n 精确为 $N(0, 1)$
正态总体、 σ 未知	$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S$ 对任意 n 精确为 $t(n-1)$ ，由 Topic 07 负责抽样分布
一般总体、有限方差	标准化均值渐近为 $N(0, 1)$ ，替换 S 后仍需说明是渐近
重尾或无限方差	经典 CLT 可能失效，稳定分布或其他尺度可能出现
有依赖样本	需额外的遍历、混合、鞅或稳健条件，不能直接套 i.i.d. 定理

典型边界是 Cauchy 样本：均值不存在，样本均值对每个 n 仍为 Cauchy，不会因样本量增大而稳定到有限常数。即使 $X_n \xrightarrow{d} X$ ，也不能自动推出 $E(X_n) \rightarrow E(X)$ ，还需要一致可积性或支配条件。

8 第七层：统一选择流程

1. 先辨认目标：趋于常数是 LLN/相合性，标准化误差分布是 CLT，函数变换是连续映射或 Delta。
2. 核对结构：独立、同分布、矩存在、方差是否正、样本是否有依赖。
3. 写出中心化量和真实尺度： $S_n - n\mu$ 、 $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)$ 或 $s_n^{-1} \sum (X_i - EX_i)$ 。
4. 区分精确分布与渐近分布；“样本量大”只说明可能近似，不自动制造正态性。
5. 最后校验收敛类型、极限对象和近似误差，明确哪些结论交给 Topic 07/08。

高频边界

依概率收敛一般不能推出几乎必然收敛；依分布收敛到非退化变量一般不能推出依概率收敛；有限均值不能保证经典 CLT；用 S 替换 σ 后只有正态总体才有有限样本精确 t ；Delta 方法的一阶导数为零时必须换尺度。

9 贯穿母例：Bernoulli 频率的稳定与剩余波动

母例：成功率的两度尺度

设 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(p)$, $0 < p < 1$, 令 $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_i X_i$ 。由 $E(X_i) = p$, $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$,

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{p(1-p)}{n}, \quad \bar{X}_n \xrightarrow{P} p.$$

这回答 LLN 的问题：频率最终稳定到 p 。若把剩余误差放大，

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

这回答 CLT 的问题：稳定位置附近的波动如何分布。取 $g(x) = x(1-x)$ ，当 $p \in (0, 1)$ 时 Delta 方法还给出

$$\sqrt{n}\{g(\bar{X}_n) - g(p)\} \xrightarrow{d} N(0, (1-2p)^2 p(1-p)).$$

若 $p = 0$ 或 1 ，方差退化，不能直接套用这条标准化公式；若 $p = 1/2$ ，则 $g'(p) = 0$ ，一阶 Delta 只给退化极限，若要观察非退化波动必须改用二阶展开。这就是先检查参数边界和导数阶数的必要性。

10 一页压缩

一句话总结

大数定律保证样本均值稳定收敛到期望，中心极限定理保证标准化放大后的剩余波动服从正态。