## Eigenproblem

對 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，若存在 scalar $\lambda$ 與 nonzero vector $x$ 使

$$Ax = \lambda x,$$

則 $\lambda$ 是 eigenvalue，$x$ 是 eigenvector。

改寫：

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

因 $x \neq 0$，matrix $A - \lambda I$ 必須 singular，於是

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0.$$

幾何上，$\operatorname{span}\{x\}$ 是不變子空間：$A(\operatorname{span}\{x\}) \subseteq \operatorname{span}\{x\}$。當 $\lambda \neq 0$ 時像是整條直線；$\lambda = 0$ 時像只有零向量。負特徵值使非零向量反向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Characteristic polynomial、trace 與 determinant

對 $n \times n$ matrix：

$$p_A(\lambda) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

重複 eigenvalues 計次後：

$$\sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A, \qquad \prod_i \lambda_i = \det A.$$

例：

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Trace 是 6，det 是 8：

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2).$$

特徵值為 $4, 2$。對 $2 \times 2$ 矩陣，trace 和 determinant 決定特徵多項式；三階以上通常不足。例如兩組特徵值 $(1, 6, 6)$ 與 $(2, 2, 9)$ 的總和都是 13、乘積都是 36，卻不相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Eigenvectors 在運算中的演化

若 $Ax = \lambda x$：

$$A^k x = \lambda^k x,$$
$$A^{-1}x = \lambda^{-1}x \quad (A \text{ invertible}),$$
$$q(A)x = q(\lambda)x.$$

Shift：

$$(A + cI)x = (\lambda + c)x.$$

Eigenspace：

$$E_\lambda = N(A - \lambda I).$$

它是 subspace，dimension 是 geometric multiplicity。Triangular matrix 的 diagonal entries 就是 eigenvalues，但仍要計算 multiplicity。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Algebraic 與 geometric multiplicity

Characteristic polynomial 中 root multiplicity 是 algebraic multiplicity $a_\lambda$。

$$g_\lambda = \dim N(A - \lambda I)$$

是 geometric multiplicity。取該 eigenspace 的一組基底並擴充全空間基底，矩陣成為左上 $\lambda I_{g_\lambda}$ 的區塊上三角形；特徵多項式含 $(t - \lambda)^{g_\lambda}$，故恆有

$$1 \le g_\lambda \le a_\lambda.$$

若某個 $\lambda$ 滿足 $g_\lambda < a_\lambda$，matrix defective。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 代數與幾何重數：一個反例

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Algebraic multiplicity 是 2。解

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0$$

只得到 $x_2 = 0$，故

$$E_2 = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}, \qquad g_2 = 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 二維完整例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$\lambda = 4$：

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $x_1 = (1,1)^T$。

$\lambda = 2$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $x_2 = (1,-1)^T$。

兩 vectors orthogonal，因 A symmetric。若

$$u_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2,$$

則

$$u_k = A^k u_0 = c_1 4^k x_1 + c_2 2^k x_2.$$

若 $c_1 \neq 0$，長期 direction 由 $\lambda = 4$ mode 支配。

取 $c_1 = c_2 = 1$，則

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 二維完整例子 （續）

$$u_0 = x_1 + x_2 = (2,0)^T, \quad u_1 = (6,2)^T, \quad u_2 = (20,12)^T.$$

圖中同時畫出 $c_1 4^k x_1$、$c_2 2^k x_2$ 與兩項相加的 $u_k$。若改取 $c_1 = 0, c_2 = 1$，得到

$$u_0 = (1,-1)^T, \quad u_1 = (2,-2)^T, \quad u_2 = (4,-4)^T,$$


軌跡始終落在 $x_2$ 的特徵方向，沒有可由較大 eigenvalue 主導的分量。使用單位特徵向量時可令 $c_1, c_2$ 取實數係數；圖採用本頁的非單位 $x_1, x_2$，係數就是其線性組合係數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 特徵模態的數值演化

特徵模態：真向量分量、和向量與軌跡




**A=[[3,1],[1,3]]**

$\lambda_1=4$ · $x_1=(1,1)$

$\lambda_2=2$ · $x_2=(1,-1)$

**藍：$4^2 x_1=(16,16)$**

**紅：$2^2 x_2=(4,-4)$**


**綠：$u_2=(20,12)$**

$u_0,u_1,u_2=(2,0),(6,2),(20,12)$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 主導方向與初值的例外

$c_1=0$ 的例外軌跡：始終沿 $x_2=(1,-1)$




**$c_1=0$，$c_2=1$**

$u_k=2^k(1,-1)$

所有 $u_k$ 都沿同一個特徵方向。

**比例固定，並無 $4^k$ 主導項。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Complex eigenvalues 與 rotation

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1,$$

$$\lambda = e^{\pm i\theta}.$$

除非 $\theta \equiv 0 \pmod{\pi}$，rotation 沒有 nontrivial real eigenvector。

Real matrix 的 complex eigenvalues 成 conjugate pairs。若

$$Ax = \lambda x,$$

取 conjugate：

$$A\overline{x} = \overline{\lambda}\,\overline{x}.$$

若以非實共軛模態構造實解，須配對共軛項；實特徵向量產生的實模態則可單獨使用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Diagonalization

若 $A$ 有 $n$ 個線性獨立特徵向量 $x_i$：

$$X = [x_1 \ \cdots \ x_n].$$
$$AX = X\Lambda, \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_i),$$
$$A = X\Lambda X^{-1}, \qquad X^{-1}AX = \Lambda.$$

充要條件是所有 eigenspace dimensions 的總和為 $n$。相異特徵值的特徵向量獨立：若最短非平凡關係 $\sum c_i x_i = 0$，施加 $A - \lambda_k I$ 消去第 $k$ 項，會產生更短關係，矛盾。因此 $n$ 個相異特徵值保證可對角化。重複特徵值也可能有完整特徵空間，例如 $2I$。

反向同樣成立。若 $A = X\Lambda X^{-1}$ 且 $X$ 可逆，把 $X$ 的欄寫成 $x_1, \ldots, x_n$。由 $AX = X\Lambda$ 的第 $j$ 欄得到 $Ax_j = \lambda_j x_j$。可逆矩陣的欄線性獨立，故這些欄提供完整特徵向量基底，所有 eigenspaces 的維數和恰為 $n$。這完成兩方向的證明。



## 矩陣冪與離散時間穩定性

若 $A = X\Lambda X^{-1}$，則 $A^k = X\Lambda^k X^{-1}$。把初值寫成 $u_0 = \sum_j c_j x_j$，遞迴 $u_{k+1} = Au_k$ 的解為 $u_k = \sum_j c_j \lambda_j^k x_j$。這個特徵向量展開需要 A 可對角化。

Jordan block $J_s(\lambda) = \lambda I_s + N_s$ 是 s×s 矩陣：主對角線為 λ，緊鄰其上的對角線為 1，其餘為 0；因此 $N_s^s = 0$。一般方陣可用這些分塊判斷長期行為。對 $J = \lambda I + N$、$N^m = 0$，先假設 $\lambda \neq 0$。由二項式定理得

$$J^k = \sum_{j=0}^{\min(k,m-1)} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N^j.$$

若 $0 < |\lambda| < 1$，每個係數是至多 j 次的多項式乘指數衰減，故趨零。若 $\lambda = 0$，直接有 $J^k = 0$（$k \geq m$），不需計算負次冪。

因此 $A^k \to 0$ 當且僅當 $\rho(A) = \max_j |\lambda_j| < 1$。反向可沿特徵向量驗證：若 $|\lambda| \geq 1$，$A^k x = \lambda^k x$ 不趨零。

## 單位圓上的特徵值還要檢查什麼？

| 特徵值與 Jordan 結構 | $A^k$ 的長期行為 |
| --- | --- |
| 所有特徵值的模都小於 1 | 趨向零，含不可對角化矩陣 |
| 所有模皆不大於 1，單位圓上的 block 全為一階 | 有界；若有單位圓模態，就不趨零 |
| 有單位圓上的 block 大於一階 | 沿廣義特徵向量可多項式增長 |
| 至少一個特徵值的模大於 1 | 沿該特徵向量指數增長 |

例如 $I$ 保持初值；$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 卻滿足 $J^k e_2 = (k, 1)^T$。兩者的特徵值都只有 1，行為由 block 大小區分。旋轉矩陣的冪有界，但旋轉角不是 $2\pi$ 的有理倍數時，不具有共同的有限週期。

這些是長期結論。即使 $\rho(A) < 1$，仍可能在有限步內先放大；不能由特徵值直接推論歐氏範數逐步下降。



## Similarity invariants

若

$$C = B^{-1}AB,$$

則

$$C - \lambda I = B^{-1}(A - \lambda I)B,$$

所以 characteristic polynomial、eigenvalues、trace、determinant、rank 與 Jordan block structure 不變。

若 $Ax = \lambda x$，令 $y = B^{-1}x$：

$$Cy = \lambda y.$$

Similarity 改變 coordinates，不改變 intrinsic spectrum。

## Jordan chain：補足缺少的特徵向量

取 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I + N$。解 $(A - 2I)x = 0$ 只得到 $x_2 = 0$，故特徵空間維度是 1，A 不可對角化。令 $e_1 = (1,0)^T, e_2 = (0,1)^T$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Jordan 鏈的映射

**先分清楚：鏈上的箭頭作用的是 N，不是 A**

$e_2=(0,1)^T \xrightarrow{N} e_1=(1,0)^T \xrightarrow{N} 0$

$N^2e_2=0$；$Ne_2\neq0$，因此鏈長為 2。

**對 $e_1$ 作用**

$Ae_1 = 2e_1$

特徵向量

**對 $e_2$ 作用**

$Ae_2 = e_1 + 2e_2$

廣義特徵向量；不平行於原向量

$A=2I+N$，$N=[[0,1],[0,0]]$；$(e_1,e_2)$ 是一組基底，但只有 $e_1$ 是特徵向量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Jordan block 的冪：多項式因子從哪裡來？

因 $N^2 = 0$ 且 $2I$ 與 N 可交換，二項式展開只留下兩項。對整數 $k \geq 0$，

$$A^k = 2^k I + k 2^{k-1} N = \begin{bmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{bmatrix}.$$

初值取 $u_0 = e_2$。令 $u_k = (a_k, b_k)^T$，則 $a_{k+1} = 2a_k + b_k$、$b_{k+1} = 2b_k$。所以 $b_k = 2^k$，而

$$a_k = \sum_{j=0}^{k-1} 2^{k-1-j} b_j = \sum_{j=0}^{k-1} 2^{k-1} = k 2^{k-1} \quad (k \geq 1).$$

在 $k = 0$ 時用空和給 $a_0 = 0$。每一步都有新的 $e_1$ 分量加入；累積 k 次才出現 k 因子。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 逐次乘法與閉式解必須給同一條軌跡


沿用 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$、$u_0 = e_2$。下圖的點是向量端點；每支箭頭從原點出發，並不是時間步進的連線。

核驗 $A(4,4)^T = (12,8)^T$。若誤用對角矩陣 $2I$，會得到 $(0, 2^k)^T$，整個水平分量都會遺失。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Jordan 區塊的逐步演化

同一座標尺度下追蹤 $u_k = A^k e_2$




| k | $a_k$ | $b_k$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 12 | 8 |

$a_{k+1}=2a_k+b_k$ ; $b_{k+1}=2b_k$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study




## 由核空間維度反推出 Jordan block

設 N 為冪零矩陣（nilpotent matrix），各條鏈長為 $s_1, \dots, s_r$，令 $d_k = \dim \ker N^k$、$d_0 = 0$。每條鏈只有前 $\min(k, s_i)$ 個向量被 $N^k$ 消去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 冪零矩陣的核維度

N 將每格送往左一格；最左一格送到 0




k=2

dim ker(N²)

=2+2+2+2+2+1

=11

每條鏈前 min(k,s) 格恰在 ker(Nᵏ) 中。

藍格是 ker(N²) 的基底向量；不同列代表不同 Jordan block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 核空間每增加一維，代表哪一條鏈？

每條長度至少 k 的鏈，從 $\ker N^{k-1}$ 到 $\ker N^k$ 恰多貢獻一個基底向量。因此

$$d_k - d_{k-1} = \#\{i : s_i \geq k\}, \qquad \#\{i : s_i = k\} = 2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}.$$

取 $d_0, \ldots, d_6 = (0, 6, 11, 15, 18, 19, 20)$，且 $d_7 = 20$。一階差分是 $(6, 5, 4, 3, 1, 1, 0)$，再取相鄰差得長度 1 至 6 的 block 數 $(1, 1, 1, 2, 0, 1)$。故鏈長為 $6, 4, 4, 3, 2, 1$，總維度 $6 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 = 20$。

**兩個核對點。** $d_1 = 6$ 是 block 總數；第一次達到全維度的 $d_6 = 20$ 表示最大 block 長度為 6，即 $N^6 = 0$、$N^5 \neq 0$。一般特徵值 λ 可對其廣義特徵空間上的 $N = A - \lambda I$ 使用同一方法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 從核維度到 Jordan 鏈：五階例子

考慮以下矩陣，採 $p_A(t)=\det(tI-A)$ 慣例：


$$A=\begin{bmatrix}3&6&0&0&0\\0&3&0&0&0\\0&0&-1&0&-1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&-1\end{bmatrix},\quad p_A(t)=(t-3)^2(t+1)^3.$$

若改寫成 $\det(A-tI)$，因矩陣是五階，整體多一個負號；根與區塊大小不變。

對 $\lambda=-1$，$\dim\ker(A+I)^k$ 在 $k=1,2,3$ 分別為 $2,3,3$，對應區塊大小 2、1。對 $\lambda=3$，$\dim\ker(A-3I)^k=1,2,2$，對應一個大小 2 的區塊。



## 求出鏈向量，並核對映射




$(A+I)(-e_5)=e_3$、$(A+I)e_3=(A+I)e_4=0$；另一鏈滿足 $(A-3I)(e_2/6)=e_1$、$(A-3I)e_1=0$。因此先放特徵向量、再放廣義特徵向量，可得到上對角線為 1 的 Jordan block。

## 鏈的排序決定 Jordan 形式

令 $P = [e_3, -e_5, e_4, e_1, e_2/6]$。五欄彼此獨立，$\det P = 1/6 \neq 0$，所以它確實是一組基底。逐欄代入上述鏈關係可得

$$P^{-1} A P = \operatorname{diag}\left( \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, [-1], \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right).$$

例如 $A(-e_5) = -(-e_5) + e_3$，因此第二欄的座標是 $(1, -1, 0, 0, 0)^T$。如果每條鏈反向排列，則 1 會落在下對角；兩種形式相似，但 $P$ 的欄順序必須跟著改。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Spectral decomposition

若 $X^{-1}$ 的 rows 是 $y_j^T$：

$$A = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j y_j^T.$$

每個 $x_j y_j^T$ 的秩為一。實對稱矩陣可選實正交矩陣 $Q$：

$$A = Q \Lambda Q^T = \sum_{j} \lambda_j q_j q_j^T.$$

沿每個 orthonormal direction 獨立縮放。Non-normal matrix 的 eigenvectors 一般不 orthogonal，單看 eigenvalues 不足以刻畫 transient amplification。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Scalar 到 matrix ODE

Scalar：

$$u' = \lambda u \quad \Longrightarrow \quad u(t) = Ce^{\lambda t}.$$

System：

$$u' = Au, \qquad u(0) = u_0.$$

若 $A$ diagonalizable：

$$u(t) = \sum_j c_j e^{\lambda_j t} x_j.$$

$$c = X^{-1} u_0.$$

$\lambda = \alpha + i\beta$ 時

$$e^{\lambda t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t).$$

Real part 控制 growth/decay，imaginary part 控制 oscillation。



## Matrix exponential

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \cdots .$$

由 $\|A^k t^k / k!\| \le (\|A\||t|)^k / k!$，在任一有界的 $t$ 區間，原級數與導數級數都一致收斂，因此可逐項求導：

$$\frac{d}{dt} e^{At} = Ae^{At} = e^{At} A.$$

Diagonalizable：

$$e^{At} = X e^{\Lambda t} X^{-1} = \sum_j e^{\lambda_j t} x_j y_j^T.$$

Defective $A = 2I + N$、$N^2 = 0$：

$$e^{At} = e^{2t}(I + tN).$$

此解對所有方陣成立。若另一個函數 $u$ 滿足 $u' = Au$，則 $\frac{d}{dt}(e^{-At}u) = 0$，所以 $u(t) = e^{At}u(0)$，同時得到存在與唯一性。長期穩定性由下面的特徵值與 Jordan 結構判斷；非正規暫態放大則另需範數或 resolvent 資訊。

## Stability 與完整例子

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Use eigenbasis：

$$u(t) = c_1 e^{4t}(1,1)^T + c_2 e^{2t}(1,-1)^T.$$

兩 eigenvalues 都正，每個非零初始向量的解皆增長。

一般線性系統的零解漸近穩定，若且唯若所有特徵值的實部皆負。對大小 $m$ 的 Jordan 分塊 $J = \lambda I + N$，有 $e^{Jt} = e^{\lambda t}\sum_{\ell=0}^{m-1} t^\ell N^\ell/\ell!$。實部為負時，每個有限次多項式乘衰減指數都趨零；若有實部為正的特徵值，沿其模態便不穩定。

邊界也可精確區分：若所有實部非正，且虛軸上各特徵值的 Jordan 分塊皆為一階，則 $e^{At}$ 有界，零解 Lyapunov 穩定，但只要還有虛軸模態，就不漸近穩定。例：$A = 0$ 的解保持初值；反對稱旋轉矩陣的解保持長度。相反地，$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 給 $e^{Jt} = I + tJ$，初值 $e_2$ 產生 $(t,1)^T$，故有實部為零的重根仍可能不穩定。這是純線性系統的結論，不需引入未給定的非線性模型。



## 漸近穩定，範數仍可能先上升

取 $B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$、$u_0 = (1,1)^T/\sqrt{2}$。兩個特徵值都是 −1，但

$$u(t) = e^{-t}\frac{1}{\sqrt{2}}(1+4t,1)^T, \qquad g(t) = \|u(t)\|_2 = e^{-t}\sqrt{\frac{(1+4t)^2+1}{2}}.$$

令 $h(t) = g(t)^2$。直接微分得

$$h'(t) = e^{-2t}\{4(1+4t) - (1+4t)^2 - 1\}, \qquad h'(0) = 2 > 0.$$

所以此單位初值確實先放大。令 $z = 1+4t$，方程 $h'(t) = 0$ 給 $z^2 - 4z + 1 = 0$。在 $t \ge 0$ 只取 $z = 2+\sqrt{3}$，得 $t_* = (1+\sqrt{3})/4 \approx 0.683$、$g(t_*) \approx 1.379$。但所有分量最後仍因 $te^{-t} \to 0$ 而衰減。

## 同一組特徵值，為什麼曲線不同？

比較 B 與 $C = -I$，兩者都從同一個單位向量 $u_0 = (1,1)^T/\sqrt{2}$ 出發。C 的範數恰為 $e^{-t}$；B 的非對角項使第二個分量持續注入第一個分量。


圖上峰值屬於**指定初值**的 $\|e^{Bt}u_0\|_2$，不是對所有初值取最大值的 $\|e^{Bt}\|_2$。例如初值換成 $e_1$，B 的解也只會以 $e^{-t}$ 衰減。


Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 暫態放大與長期衰減

同樣的特徵值 −1、−1；同一單位初值，範數仍可先增大




B 的軌跡；虛線是單位圓

兩軸每單位長度相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 用對稱部分判斷所有初值是否單調收縮

對實系統 $u' = Bu$，

$$\frac{d}{dt}\|u\|_2^2 = u^T(B + B^T)u = 2u^T H u, \qquad H = (B + B^T)/2.$$

對每個初值，範數都不增加，當且僅當 $H \preceq 0$。充分性直接沿每條解使用上式；必要性在 $t = 0$ 讓初值遍取所有向量，即得二次型非正。複數版把轉置改為共軛轉置。

本例 $H = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$，特徵值是 1、−3。$u_0 = (1,1)^T/\sqrt{2}$ 對應正特徵值 1，所以初始能量導數為 2。第 8 題的三階矩陣，其 H 的最大特徵值卻是 $-1 + \sqrt{2}/2 < 0$，所有非零解都嚴格收縮。**不可對角化或非正規，都不等於一定會暫態放大。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 二階 ODE 轉一階系統

$$u'' + Bu' + Cu = 0.$$

令 $v = u'$：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -C & -B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

Characteristic polynomial：

$$\det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -C & -B - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + B\lambda + C.$$

Complex conjugate eigenvalues 給振盪；real part 決定 decay。Initial condition $(u(0), u'(0))$ 變成二維 vector initial data。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 實對稱矩陣的實特徵值

令 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$S = S^T$，並取非零特徵向量 $x \in \mathbb{C}^n$，使 $Sx = \lambda x$。實係數與對稱性共同給 $S^* = \overline{S}^T = S$。使用共軛轉置：

$$x^* S x = \lambda x^* x.$$

因為

$$\overline{x^* S x} = x^* S^* x = x^* S x,$$

左端 real。又 $x^* x > 0$，所以

$$\lambda = \frac{x^* S x}{x^* x} \in \mathbb{R}.$$


第一個等號是純量取共軛的規則，第二個等號使用 $S^* = S$，不能僅由複數矩陣的 $S^T = S$ 推出。分母 $x^* x = \sum_j |x_j|^2 > 0$，所以實性結論成立。

反例 $S = [i]$ 滿足 $S^T = S$，但 $S^* = [-i] \neq S$，唯一特徵值為 $i$。複數空間的正確前提是 Hermitian（厄米）條件 $S^* = S$；同一證明給實特徵值，且分解使用酉矩陣 $U$：$S = U\Lambda U^*$。



## 實對稱矩陣與實特徵值

正交特徵基：QᵀSQ=diag(4,2)




**S=[[3,1],[1,3]]**

**Q=(1/√2)[[1,1],[1,-1]]**

QᵀSQ=diag(4,2)

S=QΛQᵀ；兩軸互相垂直。

未正規化 (1,1),(1,-1) 只能當方向，不能直接稱 Q。

## 複對稱與 Hermitian 的區別

普通複對稱不等於 Hermitian

**S=[$i$]，$S^T$=S**

唯一 eigenvalue=i

S*=[-$i$]≠S

**缺 Hermitian 前提會失敗。**

**Hermitian：S*=S**

x*Sx=λx*x

x*x>0 ⇒ λ∈R

**S=UΛU*，U 為酉矩陣**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 不同 eigenspaces 正交

本頁先限定 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為實對稱矩陣，並選實特徵向量 $x, y$。若 $Sx = \lambda x$、$Sy = \mu y$：

$$\lambda x^T y = (Sx)^T y = x^T S^T y = \mu x^T y.$$

因此

$$(\lambda - \mu) x^T y = 0.$$

$\lambda \neq \mu$ 時 $x \perp y$。完整正交特徵基底可用歸納證明：單位球上連續的 $x^T S x$ 有最大值，其極值條件給實單位特徵向量 $q$；對 $v \perp q$，$q^T S v = (Sq)^T v = 0$，故 $q^\perp$ 在 $S$ 下不變。限制到此較低維空間仍對稱，反覆歸納得到完整正交特徵基底。重複特徵空間內可用 Gram-Schmidt。

Spectral theorem：

$$S = Q \Lambda Q^T.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因 $Q^T Q = I$，且

$$Q^T S Q = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

所以 $S = Q \Lambda Q^T$。未正規化的 $(1,1)^T, (1,-1)^T$ 只描述特徵方向；若要直接寫成 $Q$，必須先除以 $\sqrt{2}$。

## Positive definite 等價判準

Real symmetric $S$ positive definite，若下列任一成立且全部等價：

1. $x^T S x > 0$ 對所有 $x \neq 0$；
2. 所有 eigenvalues positive；
3. 所有 leading principal minors positive；
4. 不交換列的對稱消去中所有 pivots positive；
5. 存在 full column rank $A$ 使 $S = A^T A$；
6. 存在對角元素為正的可逆下三角矩陣 $R$，使 $S = RR^T$（Cholesky）。

各判準的連接：對稱消去是配方法，給 $S = LDL^T$，而 $x^T S x = (L^T x)^T D (L^T x)$，故正主元與正能量等價。前 $k$ 階主子式 $\Delta_k = d_1 \cdots d_k$，所以主子式全正等價於主元全正。取 $R = LD^{1/2}$ 得 Cholesky，亦可取 $A = R^T$；反向由平方長度證正能量。只知 $\det S > 0$ 仍不足，例如 $-I_2$ 的行列式為 1 卻負定。



## 二階矩陣的正定性檢查

$2 \times 2$：

$$S = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

positive definite，若且唯若 $a > 0, ac - b^2 > 0$。

例如 $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的主子式為 2、3，特徵值為 1、3，故正定。相對地 $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式為 $-3$，故不正定。

## Energy 證明與反例

$$x^T S x = \sum_i \lambda_i (q_i^T x)^2.$$

所有 $\lambda_i > 0$ 時，任何 $x \neq 0$ 至少有某個 $q_i^T x \neq 0$，故 energy positive。反之，若有 $\lambda_i \leq 0$，取相應的非零特徵向量，能量便為負或零，都不滿足嚴格正定。

反例：

$$S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

eigenvalues $3, -1$，not positive definite。

若 $A$ 的 columns independent：

$$x^T A^T A x = \|Ax\|^2 > 0$$

對 $x \neq 0$ 成立，故 $A^T A$ positive definite。Full row rank 不能替代 column independence。



## Positive semidefinite boundary

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$x = (1, -1)^T$ 給 $x^T S x = 0$，eigenvalues $2, 0$。所以 positive semidefinite，不是 positive definite。

若 $S = A^T A$，columns dependent 時存在 $x \neq 0$ 使 $Ax = 0$，故 $x^T S x = 0$。反之，energy zero 也給 $Ax = 0$。

Semidefinite matrix 可有 $LDL^T$，但若要做 Cholesky，需 handling zero pivots。Pseudoinverse 不能讓 semidefinite boundary system 變成 arbitrary inverse。

## Ellipse 與 conditioning

Positive definite $S$：

$$x^T S x = 1$$

是以 origin 為中心的 ellipsoid。Eigen-coordinates：

$$y = Q^T x,$$
$$\sum_i \lambda_i y_i^2 = 1.$$

第 $i$ 個半軸長度：

$$1/\sqrt{\lambda_i}.$$

Longest axis 對應 smallest eigenvalue。

$$\kappa_2(S) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}.$$

Positive definite 只保證 exact inverse；很小的 $\lambda_{\min}$ 仍造成 ill-conditioning。



## 本章重點

- 特徵值的代數重數和特徵空間維度共同決定可否對角化。
- Jordan 鏈說明廣義特徵向量與冪次中的多項式因子。
- 長期穩定不排除暫態放大；須區分單一初值和算子範數。
- 實對稱矩陣與複數 Hermitian 矩陣分別使用轉置與共軛轉置。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 6.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study