參考用書：Introduction to Linear Algebra, 5th Edition
Gilbert Strang

# 線性代數

## 完整版講義

A4 直式・上下兩張・Lin Cing

---

## 目錄

一、向量與線性方程

第 1 章　向量與線性組合 2

第 2 章　解線性方程 13

二、子空間、正交性與投影

第 3 章　向量空間與子空間 35

第 4 章　正交性與最小平方 50

三、行列式、特徵值與 SVD

第 5 章　行列式 70

第 6 章　特徵值與特徵向量 85

第 7 章：奇異值分解 107

四、線性映射與複數矩陣

第 8 章：線性轉換 130

第 9 章：複數向量與矩陣 144

五、應用、數值方法與統計

第 10 章：應用 159

第 11 章：數值線性代數 177

第 12 章：機率與統計中的線性代數 204

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 本章要解決什麼

線性代數處理兩件事：

$$\text{加法：}\ v+w, \qquad \text{純量乘法：}\ cv.$$

把兩者合併，得到 linear combination（線性組合）

$$cv+dw.$$

矩陣只是把「使用哪些係數組裝哪些 column vectors（欄向量）」整理成

$$Ax = x_1a_1 + \cdots + x_na_n.$$

本章的幾何問題是「組合能到達哪裡」，代數問題是「指定目標需要哪些係數」。

矩陣乘法沿用同一組係數與向量；它是線性組合的緊湊記法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 向量、分量與相等

實 $n$ 維向量可寫成 column vector（欄向量）

$$v = (v_1, \ldots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

上標 $T$ 把橫寫的 tuple 轉成直立欄。向量只能在維度相同時相加：

$$(v+w)_i = v_i + w_i.$$

純量乘法逐分量作用：

$$(cv)_i = cv_i.$$

向量尺寸 $n$ 描述資料維度，不代表其中有 $n$ 個「真正獨立方向」。這是後面 span 與 rank 才會回答的問題。

這裡的 $T$ 表示 transpose（轉置），不是變數。維度不同時，$v+w$ 沒有定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 零向量與係數不是同一事

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

是向量加法的單位元，而純量 $0$ 是純量加法的單位元；純量乘法的單位元是 $1$。兩種零的型別不同，只在資料上用相同符號。

向量減法也是逐分量：

$$v - w = v + (-1)w.$$

平面上常用有向線段表示 vector。若 $p, q \in \mathbb{R}^n$，從 $p$ 到 $q$ 的 displacement（位移）是 $q - p$。從原點指向 $q$ 的箭頭與 $q$ 同值；從 $p$ 出發的箭頭只是把同一向量搬移。

避免把向量的起點當成向量本身的一部分。向量值只記錄方向與大小。



## 線性組合與 span

給定 $v = (2, 1)^T$、$w = (1, 2)^T$，所有組合為

$$cv + dw = \begin{bmatrix} 2c + d \\ c + 2d \end{bmatrix}.$$

若目標 $b = (3, 3)^T$，解

$$2c + d = 3, \qquad c + 2d = 3,$$

得到 $c = d = 1$。

所有 $cv + dw$ 形成的集合稱為

$$\operatorname{span}\{v, w\}.$$

此例的係數矩陣行列式是 $2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3 \neq 0$，所以兩個方向不重合，span 是整個 $\mathbb{R}^2$。

幾何上，$v, w, v + w$ 是以原點為一頂點之平行四邊形的兩條邊與對角線。

## 線性組合與 span （續）




**v + w = (3,3)**

(2,1) + (1,2)

= (2+1, 1+2)

= (3,3)

det[v w] = 3 ≠ 0

span 問的是「容許所有實係數後能到達哪裡」，不是固定一組係數能得到什麼。



## 相依、獨立與不可達目標

若 $w = 2v$，則 $\text{span}\{v, w\} = \text{span}\{v\}$。當 $v \neq 0$ 時，在 $\mathbb{R}^2$ 中得到一條直線；若 $v = 0$，span 只有零向量。

取 $v = (1, 2)^T$、$w = (2, 4)^T$、$b = (3, 5)^T$。任何組合的兩分量必滿足 $y = 2x$，但 $b$ 的 $5 \neq 2 \cdot 3$，所以方程組

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

無解。

若純量 $c_1, \ldots, c_k$ 滿足

$$c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k = 0$$

且其中至少一個 $c_i \neq 0$，這組 vectors 稱為 linearly dependent（線性相依）。不存在這種非零組合時，稱為 linearly independent。

不可解不表示計算失敗，而是幾何上 $b$ 不在可達子空間。

## 獨立性的方程式判準

$v_1, \dots, v_k$ 獨立等價於齊次方程

$$Vc = 0, \qquad V = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$$

只有 $c = 0$。

對 $k = n$ 的方陣，若每欄都拿來做 basis（基底），則 $V$ 可逆，$Vc = 0$ 只可能有零解。若 $k > n$，$\mathbb{R}^n$ 中不可能有超過 $n$ 個獨立向量。

反例：三個 $\mathbb{R}^2$ 向量必有

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = 0$$

的非零解。能否找到非零解與「有沒有任何係數組合等於某個 $b$」是不同問題。

$Vc = 0$ 是齊次方程；$Vc = b$ 是否有解，稱為一致性（consistency）。



## dot product 與長度

對 $u, v \in \mathbb{R}^n$，inner product（內積，也稱 dot product）定義為

$$u \cdot v = u^T v = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i.$$

Euclidean norm（歐氏長度）是

$$\|v\|_2 = \sqrt{v^T v}.$$

$\|v\|_2 = 1$ 的向量是 unit vector。非零 $v$ 可正規化為

$$\frac{v}{\|v\|_2}.$$

例：$v = (3, 4)^T$ 的長度是 $5$，單位向量是 $(3/5, 4/5)^T$。

在複數空間，$u^H v$ 的 conjugate 必須放左側；第 9 章會修正此處的實數公式。

## 角度與正交

對非零實向量 $u, v$，若 $\theta$ 是夾角，則

$$\cos\theta = \frac{u^T v}{\|u\|_2 \|v\|_2}.$$

因此對非零向量，$u^T v = 0$ 等價於 $\theta = 90^\circ$，稱為 orthogonal（正交）。零向量與任何向量皆正交，因為內積為零；但零向量沒有方向，夾角公式不適用。

例：

$$u = (3, 4)^T, \quad v = (4, 3)^T, \quad \cos\theta = \frac{24}{5 \cdot 5} = \frac{24}{25}.$$

若 $w = (4, -3)^T$，則 $u^T w = 12 - 12 = 0$。

零向量的方向未定義，處理正交基底時先要求 vectors 非零。



## Cauchy–Schwarz 與三角不等式

對所有 $u, v \in \mathbb{R}^n$，

$$|u^T v| \le \|u\|_2 \|v\|_2.$$

證明：若 $v = 0$，不等式立即成立。若 $v \neq 0$，令 $t = (u^T v)/(v^T v)$，則 $0 \le \|u - tv\|^2 = u^T u - (u^T v)^2/(v^T v)$。移項即得不等式；等號恰在 $u = tv$ 時成立。平方後，等價於

$$(u^T v)^2 \le (u^T u)(v^T v).$$

等號成立若且唯若 $u, v$ 線性相依。因為 $|u^T v| \le \|u\|\|v\|$，

$$\begin{aligned} \|u + v\|_2^2 &= \|u\|_2^2 + 2u^T v + \|v\|_2^2 \\ &\le (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2. \end{aligned}$$

所以 $\|u + v\|_2 \le \|u\|_2 + \|v\|_2$。三角不等式在任一向量為零，或兩個非零向量同向時取等號；非零且反向的相依向量不符合。

平方可以消去非負長度，但等號條件要另外保留方向。

## 矩陣乘法就是欄組合

設

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

對 $x \in \mathbb{R}^n$：

$$Ax = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}.$$

輸出位於 $\mathbb{R}^m$。計算 $Ax$ 有兩個等價觀點：

- column view：$A$ 的各欄依 $x_i$ 加權後相加。
- row view：每個輸出分量是 $A$ 的一列與 $x$ 的內積。

例：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

後續章的基礎是 column view；row view 適合逐條理解 equations。



## 同一個矩陣乘法的兩種視角

設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \qquad x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$A$ 是 $2 \times 3$，所以輸入有三個分量，輸出有兩個分量。



## 欄組合與列內積：逐步核對

**Column view（欄向量觀點）**：先取 $A$ 的三個欄向量，再依 $x$ 的分量加權：

$$Ax = 1\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}3\\6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1-2+6\\4-5+12\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\11\end{bmatrix}.$$

**Row view（列向量觀點）**：第 1 列與 $x$ 的內積是 $1-2+6=5$；第 2 列與 $x$ 的內積是 $4-5+12=11$。兩種算法都由 $(Ax)_i = \sum_{j=1}^{3} a_{ij}x_j$ 得來，只是聚合運算的方式不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## $Ax = b$ 的三種問法

$$Ax = b$$

可以讀成：

1. 哪些欄向量線性組合會產生 $b$？
2. 哪些 rows（列）同時和 $x$ 做內積後得到 $b_i$？
3. 線性映射 $x \mapsto Ax$ 是否把某個輸入映射到 $b$？

對 $b = (0, 2)^T$ 和前頁矩陣，解

$$x_1 + 2x_2 = 0, \qquad 3x_1 + 4x_2 = 2.$$

第一式給 $x_1 = -2x_2$，代回得 $-2x_2 = 2$，所以 $x = (2, -1)^T$。

同一答案 $x = (2, -1)^T$ 不是碰巧，三種觀點只是不同投影角度的同一等式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 無限多解與唯一解

方陣 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 對每個 $b$ 有唯一解，等價於 $Ax=0$ 只有 $x=0$。此時 $A$ 可逆。

若存在非零 $z$ 使 $Az=0$，而 $x_p$ 是某個 $Ax=b$ 的解，則

$$A(x_p+cz)=b+cAz=b$$

對任何純量 $c$ 成立，因此解不唯一。

例：

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}x=0$$

的解為 $x_2=t,\ x_1=-2t$，形成一條線。

先把 homogeneous solution 找出來，後續第 3 章再把 complete solution 寫成特解加 nullspace。



## 2×2 逆矩陣與條件檢驗

對

$$A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix},\quad ad-bc\neq 0,$$

有

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}.$$

例：

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}.$$

直接相乘：

$$\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}=I_2.$$

使用逆矩陣前必須先檢查 det 條件。求數值解時，direct elimination 通常比形成 $A^{-1}$ 更有效率。$A^{-1}$ 是矩陣型別的物件；$1/\det A$ 只是純量。

## 本章收束與常見誤解

必須能回答：

- $cv + dw$ 與 $\text{span}\{v, w\}$ 的差別。
- $Ax = b$ 的 column view 與 row view。
- 非零齊次解、無限多解與無解之間的關係。
- dot product 為零與線性相依不是等同條件。
- 方陣「某個 $b$ 可解」未必可推出「所有 $b$ 可解」。

離開本章前的檢查題：在 $\mathbb{R}^2$ 中，若 $\text{span}\{v, w\} = \mathbb{R}^2$，$v, w$ 是否必獨立？答案為是；任一向量都能被組合，$0$ 也不例外，但非零組合不能得到 $0$，否則 span 會塌成一條線。

下一章把這些判斷變成系統化 elimination 流程。



## 延伸：多項式與矩陣空間的座標化

先備概念：向量空間、線性獨立與基底。

以下把向量與線性組合的觀念延伸到多項式空間與矩陣空間。

在 $\mathcal{P}_2$ 取單項式基底 $B = (1, t, t^2)$，定義

$$p_1 = 1 + t, \qquad p_2 = 1 - t, \qquad p_3 = 1 + t^2.$$

座標映射是線性同構，故

$$[p_1]_B = (1, 1, 0)^T, \quad [p_2]_B = (1, -1, 0)^T, \quad [p_3]_B = (1, 0, 1)^T.$$

把這些座標當 columns，得

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det D = (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) \cdot 1 = -2 \neq 0.$$

因此 $p_1, p_2, p_3$ 是 $\mathcal{P}_2$ 的基底。若 $q(t) = 3 + 2t + t^2$，解 $Dc = [q]_B = (3, 2, 1)^T$，可得 $c = (2, 0, 1)^T$，所以

$$q = 2p_1 + p_3.$$

矩陣空間也相同。對 $M_2(\mathbb{R})$ 使用 column-major 座標

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \longmapsto (a, c, b, d)^T.$$

## 延伸：多項式與矩陣空間的座標化 （續）

令 $A_1=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$、$A_2=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}$、$A_3=\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix}$。座標 columns 為

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

若 $c_1A_1+c_2A_2+c_3A_3=0$，逐元素比較先得 $c_1+c_2=0$、$c_2+c_3=0$、$c_3=0$，所以三個係數全為零；三矩陣線性獨立。基底不是「看起來像數字列」才存在；它由一個可逆的座標映射判斷。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 延伸：不對角化時的多項式譜映射

先備概念：特徵值、行列式與複數上的多項式分解。

設 $r(t)=\sum_{k=0}^{d}c_kt^k$，且 $Av=\lambda v$、$v\neq0$。由 $A^kv=\lambda^kv$，

$$r(A)v=\sum_{k=0}^{d}c_kA^kv=\sum_{k=0}^{d}c_k\lambda^kv=r(\lambda)v.$$

因此 $r(A)$ 的 eigenvalue 包含所有 $r(\lambda)$，而相同 eigenvector 仍保留；不需要假設 $A$ 可對角化。等價地，多項式恆等式

$$r(t)-r(\lambda)=(t-\lambda)s_\lambda(t)$$

代回 $A$ 得

$$r(A)-r(\lambda)I=(A-\lambda I)s_\lambda(A),$$

故 eigenvector 方向的推論與對角化無關。

若要主張「全部特徵值恰好如此」，還需證明反向。設 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，且 $r$ 非常數。若 $\mu$ 是 $r(A)$ 的特徵值，將多項式在複數體分解為

$$r(t)-\mu=c\prod_{j=1}^{d}(t-\zeta_j),\qquad c\neq0.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 延伸：不對角化時的多項式譜映射 （續）

代入矩陣並取行列式：

$$0=\det(r(A)-\mu I)=c^n\prod_{j=1}^{d}\det(A-\zeta_j I).$$

至少一個因子為零，故某個 $\zeta_j$ 是 $A$ 的特徵值，且 $r(\zeta_j)=\mu$。所以

$$\operatorname{spec}(r(A))=r(\operatorname{spec}(A)).$$

常數多項式 $r=c$ 時，$r(A)=cI$ 直接成立。實矩陣的完整譜也在 $\mathbb{C}$ 中理解；只列實特徵值可能漏掉複數共軛對。這個證明給出特徵值的集合；若要計代數重數，可用複數 Schur 上三角化：$r(T)$ 的對角線是 $r(T_{ii})$，不需 $T$ 為對角矩陣。

非對角化例子取

$$A=\begin{bmatrix}2&1\\0&2\end{bmatrix}=2I+N,\qquad N=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},$$

以及 $r(t)=t^2+t+1$。因為 $N^2=0$，

$$r(A)=r(2)I+r'(2)N=7I+5N=\begin{bmatrix}7&5\\0&7\end{bmatrix}.$$

直接計算也會得到同一矩陣，且特徵值為 $r(2)=7$。Jordan 鏈的 off-diagonal 可由導數項保留；這正是不能只寫「把特徵值代入」卻沒有說明理由的地方。



## 從向量到方程

先確認向量維度，再用線性組合判斷目標能否到達；內積描述長度與正交，而消去法會在下一章系統地找出係數。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 1.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 本章的問題

給定 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$b \in \mathbb{R}^m$，研究

$$Ax = b.$$

需要分開回答：

1. 是否存在解？
2. 解是否唯一？
3. 如何用有限步驟求出所有解？
4. 計算量與數值風險是什麼？

本章直接處理前 3 問。第 11 章會加入有限精度、穩定性與條件數。

不要把「消去後無矛盾」誤寫成「有唯一解」。存在與唯一是兩個層次。



## 本章符號、體與 row/column 用語

- $m$：輸出空間維度，等於方程數與 $A$ 的 row 數。
- $n$：輸入空間維度，等於未知數與 $A$ 的 column 數。
- $A_{ij}$：第 $i$ row、第 $j$ column 的元素。
- $e_i$：第 $i$ 個標準 basis vector。
- $P$：permutation matrix（排列矩陣）。
- $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$：本階段矩陣元素所在的 field（體）。

若 $A$ 是 $m \times n$，$x$ 必須是 $n \times 1$，$b$ 必須是 $m \times 1$。任何乘法或加法前先檢查這些形狀。

中文教材對 row 與 column 的翻譯不統一，本文固定：

- row（列）：水平方向；
- column（欄）：垂直方向。

有些書把 column 寫成「行」，因此看到中文「行」時必須從上下文確認。本文保留英文 row/column 於容易混淆處，所有矩陣運算都以這裡的定義為準。

維度不匹配是可先排除的錯誤，不需要進到數值計算才發現。

## 兩種同時成立的圖像

考慮

$$x + 3y = 7, \qquad 2x - y = 0.$$

Row picture：兩個方程分別是 $xy$ 平面的直線，交點是 $(x, y) = (1, 2)$。

Column picture：

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

係數 $(1, 2)$ 使欄向量組合成目標。這兩張圖都在描述同一組數字，但凸顯不同結構：row view 看限制，column view 看可達方向。

第三維或更多方程時，row picture 由 lines 變成 planes 或 hyperplanes，column view 仍保留「係數組合」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Row 觀點：兩條方程的交點




Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Column 觀點：組合成目標向量






## 存在性與唯一性

方程組可能有：

- 唯一解：pivot 覆蓋每個未知數且沒有矛盾列。
- 無限多解：一致，但至少一個 free variable。
- 無解：出現 $[0 \ \cdots \ 0 \mid c]$，其中 $c \neq 0$。

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$：

- $m < n$ 時，齊次方程 $Ax = 0$ 必有非零解，但 $Ax = b$ 仍可能無解。
- 每個 $b \in \mathbb{R}^m$ 都能解，等價於 column space（欄空間）是 $\mathbb{R}^m$。
- 對每個可解的 $b$ 解都唯一，等價於 nullspace（零空間）只有零向量。

rank-nullity 會在下一章正式使用；此刻可用 free variable 的數目理解。

## 例子中的完整判定

解

$$\begin{aligned} x &+ 2y &&= 4, \\ 2x &+ 4y &&= 9. \end{aligned}$$

第二列減去第一列的 2 倍，得到

$$0x + 0y = 1.$$

這是矛盾列，因此無解。Column view 中，目標 $(4, 9)^T$ 不在 $\text{span}\{(1, 2)^T, (2, 4)^T\}$，該 span 只有直線 $v_2 = 2v_1$。

若右端改為 $(4, 8)^T$，消去後得到 $0 = 0$。限制只剩一條，解是

$$x + 2y = 4 \quad \Rightarrow \quad (x, y) = (4, 0) + t(-2, 1),\ t \in \mathbb{R}.$$

free variable 不是計算殘餘，而是真正描述解集方向的parameter。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Gaussian elimination（高斯消去）

消去法用可逆 row operations（列運算）保持解集：

1. 交換兩列。
2. 將一列乘非零純量。
3. 將某列的純量倍加到另一列。

從第一欄選非零 pivot（主元），以它清除該欄下方元素。接著移到右側下一欄，直到無列可處理。

示例：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 3 & 8 & 4 & 24 \\ 0 & 4 & 3 & 17 \end{array}\right]$$

先用 row 1 清除 row 2 的第一欄，再處理第二欄。每一步都不改變 equations 的解集。

row operation 是在方程左右的同時運算；不是任意改動單一資料格。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## pivot 與 multiplier 的意義

若使用第 $k$ 個 pivot $p$ 清除位置 $(i,k)$，multiplier（乘數）是

$$\ell_{ik} = \frac{A_{ik}}{p},$$

並執行 $R_i \leftarrow R_i - \ell_{ik} R_k$。

前頁例子第一欄的 multiplier 是 $3/1 = 3$，消去後得

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 17 \end{array}\right].$$

接著第二欄 pivot 為 $2$，multiplier 為 $4/2 = 2$。

小 pivot 在精確算術中還可用；有限精度時可能放大誤差，第 11 章會用 partial pivoting 處理。



## 回代與 rank 的初步

前頁完成消去：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 17 \end{array}\right].$$

由下而上：

$$z = 17, \quad 2y + 17 = 0 \Rightarrow y = -17/2,$$
$$x + 2(-17/2) + 17 = 8 \Rightarrow x = 8.$$

有三個非零 pivots，方陣 rank 為 3，因此解唯一。若有 zero row 且右端相同為 zero，那一列不提供新限制；若有 rank-deficient 欄，會產生自由變數。

rank 等於非零 pivot 數目。一般列階梯形已可辨認 pivot column 的索引；取基底時應取原矩陣中對應的欄，而不是消去後改變的欄。

## 消去流程的完整決策順序

對 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 與 $b \in \mathbb{F}^m$，流程如下：

1. 固定體與未知數順序。精確算術可選任一非零 pivot；有限精度通常選目前欄中絕對值最大的元素作 pivot。
2. 從左到右掃描 columns。若目前 column 在 pivot row 以下全為零，跳過該 column；它對應的未知數通常成為 free variable。
3. 若找到非零元素，交換它到 pivot row，消去下方同 column 的元素，再向右移動。每一步左乘可逆初等矩陣。
4. 完成 row echelon form 後，先找 $[0\ \cdots\ 0 \mid c]$。若有 $c \neq 0$，系統無解；若所有矛盾列都不存在，系統一致。
5. 求零空間時，必須另解齊次系統：保留同一個階梯形係數矩陣，把右端全部改為 $0$。對每個 free column，設對應 free variable 為 $1$、其餘 free variables 為 $0$，再回代 pivot variables，得到 $As_j = 0$ 的 special solutions。不能沿用非齊次右端，否則得到的是原系統的解，而非零空間向量。
6. 為求一個 particular solution，令全部 free variables 為 $0$，回代 pivot variables；完整解為

$$x = x_p + \sum_{\text{free } j} t_j s_j.$$



## 消去流程的完整決策順序 （續）

這個流程也需要「在指定體上」的前提。若 pivot 在某個體中為零，不能只因它在另一個體中非零就沿用同一消去；檢查 consistency 時也必須同步套用 row operations 到 augmented column。

例如 $x_1 + 2x_2 = 4$：特解為 $x_p = (4,0)^T$；齊次式 $x_1 + 2x_2 = 0$ 在 $x_2 = 1$ 時給 $s = (-2,1)^T$，故全解 $x = (4,0)^T + t(-2,1)^T$。若錯用原右端，會得到 $(2,1)^T$，其像為 $4$，並不在零空間中。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 用矩陣乘積執行列運算

若要把第二列加上第一列的 2 倍，對單位矩陣做此運算得到：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad EI_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

左乘 $E$ 對 rows 作用，右乘 $E$ 對 columns 作用。這是一個關鍵的側別：

$$EA \text{ 改 rows}, \qquad AF \text{ 改 columns}.$$

初等矩陣 $E$ 可逆，且逆矩陣撤銷相應 row operation。例如上面 $E$ 的逆是

$$E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

題目若要求先乘哪個運算，符號順序不能對調。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 消去矩陣的乘法順序

若先施加 $E_1$，再施加 $E_2$，最後矩陣是

$$E_2(E_1A) = (E_2E_1)A.$$

Left multiplication 的順序是由右往左對應時間，但矩陣本身先合併成 $E_2E_1$。若交換 $E_1, E_2$，row operations 的結果可能不同。

若對方陣不換列、也不縮放 pivot row，只用下方列減去 pivot row 的倍數，從多步消去得到

$$E_k \cdots E_2E_1A = U.$$

因此

$$A = (E_k \cdots E_1)^{-1}U = LU.$$

這個關係將在「從消去到 $A = LU$」整理為 LU 分解。第一欄消去所得的 $\ell_{ik}$ 將直接進入 $L$。

正確公式是 $(E_k \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$；逆矩陣的乘積必須反轉順序。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 何時需要 row swap

若第一欄 pivot 位置為零，可以把下方非零元素交換上來：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix}.$$

最後一列若為

$$[0 \ \cdots \ 0 \mid c],$$

且 $c \neq 0$，方程組無解。若 row exchange 能把非零項帶入 pivot 位置，便繼續消去；若整欄下方皆零，就必須跳到下一欄。

pivot 位置並非永遠在對角線；對矩形矩陣尤其必須依欄搜尋。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 矩陣乘法與 dimension

若 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$、$B \in \mathbb{F}^{n \times p}$，則

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} B_{kj}, \qquad AB \in \mathbb{F}^{m \times p}.$$

中間維度 $n$ 必須相同；輸出維度由左矩陣 rows、右矩陣 columns 決定。

「$AB$」只有在上述形狀符合時才存在。即使 $AB$ 存在，$BA$ 也可能沒有定義。即使兩者都存在，通常

$$AB \neq BA.$$

矩陣乘法代表先施加右側轉換、再施加左側轉換；不交換正好反映作用順序。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Column 與 row 組合觀點

$$AB = A\begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ab_1 & \cdots & Ab_p \end{bmatrix}.$$

所以 $AB$ 的每一欄是 $A$ 各欄依 $B$ 對應欄係數的組合。也能按 rows 分解：

$$AB = \begin{bmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} a_1^T B \\ \vdots \\ a_m^T B \end{bmatrix}.$$

例：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix},$$

這是右乘對角符號矩陣，只將第二欄乘以 $-1$，沒有交換欄位置。

block multiplication 合法的前提是每個 block 介面維度一致。



## 不可交換與分配律

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

計算得

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

所以 $AB \neq BA$。可用的律包括

$$A(B+C) = AB + AC, \quad (A+B)C = AC + BC,$$

以及當尺寸配合時 $A(BC) = (AB)C$。若 $A$ 可逆，可左消去 $AB = AC$ 得 $B = C$；純量加法消去不可直接套用到一般矩陣乘法。

不要把實數的 commutative law 自動套到矩陣。

## 兩個尺寸不同的乘積，trace 為何相同？

若 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{R}^{n\times m}$，則 $AB$ 是 $m \times m$，$BA$ 是 $n \times n$。即使尺寸不同，兩者都是方陣，因此都可計算 trace（對角元素之和）。

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} \\ &= \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} b_{ji}a_{ij} = \operatorname{tr}(BA).\end{aligned}$$

這裡交換的是有限和的順序，以及**純量**乘積的次序；沒有假設 $AB = BA$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 用同一組數值檢查 trace

$$A = \begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}.$$

$$AB = \begin{bmatrix}4 & 1\\ 1 & -3\end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix}2 & 5 & 3\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & -1 & -3\end{bmatrix}.$$

因此 $\operatorname{tr}(AB) = 4 - 3 = 1$，而 $\operatorname{tr}(BA) = 2 + 2 - 3 = 1$。兩個矩陣的尺寸甚至不同，不能因此把它們當成同一矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 六個乘積的兩種加總

| $a_{ij}\,b_{ji}$ | j=1 | j=2 | j=3 | AB diagonal |
|---|---|---|---|---|
| i=1 | 1·2 = 2 | 2·1 = 2 | 0·0 = 0 | 4 |
| i=2 | 0·1 = 0 | 1·0 = 0 | 3·(−1) = −3 | −3 |
| **BA diagonal** | 2 | 2 | −3 | **sum = 1** |

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 循環移位不是任意重排

尺寸允許時，$\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BCA) = \operatorname{tr}(CAB)$：把 $BC$ 視為一個矩陣即可套用上一頁的等式。一般不能任意交換相鄰因子。

例如令

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

由 $PQ = R$、$QP = \operatorname{diag}(0, 1)$，得 $\operatorname{tr}(PQR) = 1$，但 $\operatorname{tr}(QPR) = 0$。循環移位保留相對順序；交換 $P, Q$ 則沒有。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## trace 與交換子：先說明使用的體

對實數或複數上的 $n \times n$ 矩陣，

$$\operatorname{tr}(AB - BA) = 0 \neq n = \operatorname{tr}(I_n),$$

因此 $AB - BA = I_n$ 不可能成立。這個結論利用 $n \neq 0$ 在所用的體中成立。

在特徵為 2 的體上，取上一頁的 $P, Q$，有 $PQ - QP = I_2$：因為減號與加號相同，且 $\operatorname{tr}(I_2) = 1 + 1 = 0$。所以「不可能」不能不加條件推廣到任意體。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 逆矩陣的定義

對 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$，若存在 $B$ 使

$$AB = BA = I_n,$$

則 $A$ 可逆，並寫 $B = A^{-1}$。方陣是為避免 left inverse 與 right inverse 混淆，但即使形狀相同，仍須兩側都檢查定義。

逆矩陣若存在則唯一。若 $AB = I$ 且 $CA = I$，則

$$B = IB = (CA)B = C(AB) = CI = C.$$

因此左右逆在方陣可逆情況下沒有不同。

第 2 章以方陣為主；長方矩陣的 one-sided inverse 需要額外假設。

若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 $m \neq n$，不能同時有 $AB = I_m$、$BA = I_n$ 這組雙邊逆。滿 column rank $n \leq m$ 時，$A^T A$ 可逆，

$$A_L = (A^T A)^{-1} A^T, \qquad A_L A = I_n,$$

稱為 left inverse，但不是 $A$ 的雙邊 inverse，且可能有其他 left inverses。滿 row rank $m \leq n$ 時，對稱地有

$$A_R = A^T (A A^T)^{-1}, \qquad A A_R = I_m.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 逆矩陣的定義 （續）

兩個公式都把 dimension 與 rank 條件放在前面；行列式只對方陣可談，不能用它把長方矩陣直接判成可逆。若 rank 不足，需要 Moore–Penrose pseudoinverse 或最小平方模型，而不是硬套上述 inverse。

消去時只對 rows 做 row operations 可直接保留同一個 $x$；若在 columns 上做運算，實際上是在重排或混合未知數，必須同步改變 variable ordering。這是解方程式時只用 row operations 的關鍵原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Gauss–Jordan 求逆

要對 $A$ 求逆，把 $A$ 與 $I$ 並排：

$$[A \mid I],$$

只做 row operations，直到左側成為 $I$：

$$[I \mid A^{-1}].$$

例：

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right].$$

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$。

這個結果可用 $AA^{-1} = I$ 驗算；初等 rows 若造成左側 zero row，則 $A$ 不可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 可逆性的等價條件

對方陣 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$，下列命題在指定體上等價：

1. $Ax = 0$ 只有 $x = 0$。
2. $A^{-1}$ 存在。
3. $A$ 的 $n$ 個 columns 線性獨立。
4. $A$ 的 columns span $\mathbb{F}^n$。
5. elimination 得到 $n$ 個非零 pivots。
6. $\det A \neq 0$。

前五項可由消去證明：零空間只有零解等價於沒有自由變數，方陣因而有 $n$ 個主元，每個右端皆可唯一回代；逐一以標準基底為右端求解，即可組成逆矩陣。反過來，左乘逆矩陣立刻給出齊次方程只有零解。第 6 項需先定義 determinant，將於第 5 章完整處理。矩形矩陣不可照搬全部條件。

命題中的「在指定體上」有實質作用。例如某些矩陣在實數體上可逆，在有限體上可能不可逆。



## 從消去到 $A = LU$

若不需 row exchange，且 Gaussian elimination 的 pivots 不為零，則

$$A = LU,$$

其中 $L$ 是 unit lower triangular，$U$ 是 upper triangular。$L_{ik}$ 記下第 $i$ 列減去第 $k$ 列的乘數。

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

第一欄 multiplier 是 $4/2 = 2$：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

檢查 $LU = A$。對同一個 $A$ 解多個右端 $b$，分解後只需重複 forward/back substitution。

$L$ 的乘數是「消去時做了什麼」，不是最後的原始資料。

## 需要交換時的 $PA = LU$

若 pivot 位置為零，消去時必須先交換 rows。把交換集中成 permutation matrix $P$，可寫成

$$PA = LU.$$

對可逆方陣，總可選出讓每一步 pivot 非零的列，再得到此分解。$P$ 左乘 $A$ 表示預先排列 $A$ 的 rows。

不要直接把 $P$ 與 $L, U$ 的順序交換。$PA = LU$ 的解讀是：先排列 $A$，再做沒有交換的 LU 消去。

有限精度演算法通常連「不為零」都不夠，而會選欄中絕對值最大者作為 pivot。

例如

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

先交換兩個 rows：$PA = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = U$，因此 $L = I$。右端也交換成 $Pb = (7, 4)^T$；回代給 $y = 2, x = 1$，原式驗算為 $(4, 7)^T$。不能只交換 $A$ 而保留原來的 $b$。多步分解在後期交換 rows 時，也須交換已存入 $L$ 的舊乘數位置；否則即使 $U$ 正確，$PA = LU$ 仍會失效。



## 換列時，已記錄的乘數也要跟著移動

令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

第一個主元為 2，乘數是 $\ell_{21} = 2$、$\ell_{31} = 3$。消去後，第二個主元位置為 0，但其下方是 1；交換 row 2 與 row 3，不能因此就判定矩陣奇異。

## 同一例子的 PA=LU 與求解

$$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix},\quad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\2&0&1\end{bmatrix},\quad U=\begin{bmatrix}2&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

直接相乘得到 $LU=PA=\begin{bmatrix}2&1&1\\6&4&5\\4&2&3\end{bmatrix}$。由 $Ly=Pb=(3,12,8)^T$ 得 $y=(3,3,2)^T$，再由 $Ux=y$ 回代得 $x=(1,-1,2)^T$。代回原式可驗得 $Ax=b$。

若只換 $U$ 的 row 卻把 $L$ 的舊乘數留在原位，乘回的矩陣就不是 $PA$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 可逆不代表可以省略換列

同一個例子有 $\det A=-2\neq 0$，但其左上 $2\times 2$ 主子矩陣行列式是 $2\cdot 2-1\cdot 4=0$。因此矩陣可逆，仍可能在不換列的消去過程遇到零主元。

這裡交換一次 row，$\det P=-1$；由 $PA=LU$、$\det L=1$、$\det U=2$，可核對 $\det A=-2$。換列改變行列式的符號，也改變方程排列，不改變原方程組的解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 成本與使用時機

對 dense $n \times n$ 方陣：

- Gaussian elimination 約需 $O(n^3)$ 次算術。
- forward/back substitution 約需 $O(n^2)$。
- 直接形成 inverse 後乘 $b$，還要額外做 matrix inverse，通常不划算。

所以常見策略是

$$A \longrightarrow PA = LU$$

一次，之後對多個 $b$ 做 substitution。若只需要檢查某個系統的 consistency，elimination 比求 inverse 更直接。

精確代數可考慮 determinants 或 symbolic inverse，但一般數值計算仍以 factorized solve 為主。

成本的來源可直接求和：第 $k$ 個 pivot 需更新約 $(n-k)^2$ 個尾端元素，每次一乘一減，共

$$2\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{3} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$$

次浮點加乘；乘數除法與右端更新只增加 $O(n^2)$。三角回代只需處理 $n(n-1)/2$ 個非對角項，故為 $O(n^2)$。此模型計算算術次數，未包括資料搬移、稀疏填入或大整數位元成本。



## 不換列 LU 的條件與唯一性

對可逆方陣 $A$，存在不換列、每一步主元非零的 $A = LU$，若且唯若每個左上角主子矩陣 $A_k$ 都可逆。若已有分解，因三角結構 $A_k = L_k U_k$，故

$$\det A_k = \prod_{j=1}^{k} u_{jj} \neq 0.$$

反向由消去歸納：第一個主元 $a_{11} = \det A_1 \neq 0$。前 $k-1$ 步已完成時，左上 $k$ 階的行列式是前面主元乘上新主元；所以

$$u_{kk} = \frac{\det A_k}{\det A_{k-1}} \neq 0, \qquad \det A_0 = 1.$$

每一步都合法。此條件比「整個 $A$ 可逆」更強；例如 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 可逆，卻需先交換 rows。

在固定的 $P$ 下，若 $PA = LU = \widetilde{L}\widetilde{U}$，且兩個下三角因子的對角線皆為 1，則 $\widetilde{L}^{-1}L = \widetilde{U}U^{-1}$ 同時為單位下三角與上三角，只能是 $I$。所以這種正規化後的 $L, U$ 唯一；不同選列規則的 $P$ 不必相同。

## Transpose 與 permutation

Transpose（轉置）定義為

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

若 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$，則 $A^T \in \mathbb{F}^{n\times m}$。

Permutation matrix $P$ 每列每欄恰有一個 1，其餘為 0。例：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$PA$ 排列 $A$ 的 rows，$AP$ 排列 columns。若 $P$ 是 permutation，則 $P^TP = I$。

$P^T$ 就是 undo 的交換；交換不改變方程組的解集，只改變列順序。



## Inner product 與 outer product

對 $x, y \in \mathbb{R}^n$：

$$x^Ty \in \mathbb{R}$$

是一個 inner product（內積），即純量。

若 $u \in \mathbb{R}^m$、$v \in \mathbb{R}^n$，則

$$uv^T \in \mathbb{R}^{m\times n},$$

稱為 outer product（外積型矩陣）。若 $u \neq 0$ 且 $v \neq 0$，它的第 $j$ 個 column 是 $v_j u$，其中至少一欄非零，且全部落在 $\mathrm{span}\{u\}$，因此 rank 為 1；若 $u = 0$ 或 $v = 0$，所有 entries 都是 0，rank 反而是 0。

例：

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix},$$

第二個 row 是第一個 row 的 2 倍，rank 為 1。

若把 $u$ 改成零向量，

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

則沒有非零 column 可張成 image，$\mathrm{rank} = 0$。同理，$v = 0$ 也得到零矩陣。因此

## Inner product 與 outer product （續）

$$\operatorname{rank}(uv^T) = \begin{cases} 1, & u \neq 0 \text{ 且 } v \neq 0, \\ 0, & u = 0 \text{ 或 } v = 0. \end{cases}$$

**u ≠ 0 ∧ v ≠ 0**

u = (1,2)ᵀ, v = (3,−1)ᵀ

uvᵀ = [[3,−1],[6,−2]]

**rank(uvᵀ) = 1**

**u = 0 ∨ v = 0**

u = (0,0)ᵀ, v = (3,−1)ᵀ

uvᵀ = [[0,0],[0,0]]

**rank(uvᵀ) = 0**

$x^T y$ 與 $xy^T$ 不只是左右順序不同，輸出型別也完全不同。



## 章末檢查

必須能：

- 以 rows 與 columns 解釋同一個 $Ax = b$。
- 從 pivot 與 free variable 判定無解、唯一解與無限多解。
- 寫出 row operation 對應的 elementary matrix。
- 說明 left multiplication 與 right multiplication 的差異。
- 判斷 inverse 的成立條件。
- 從 multipliers 重建 $L$，必要時寫 $PA = LU$。
- 分清 $x^T y$ 與 $xy^T$。

章末練習的重點是保留每一步的前提，尤其是「在哪個體上」與「是否需要 row exchange」。

下一章將以 column space、nullspace 與 basis 解釋本章的 pivot 結構。

## 延伸：積分內積的 Gram 系統

先備概念：內積、正交投影與定積分。

以下把消去法延伸到函數空間。取實連續函數空間 $C([-1,1],\mathbb{R})$，定義

$$\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1}f(t)g(t)\,dt.$$

連續性保證積分存在，且非零連續函數在某個小區間上絕對值有正下界，所以 $\int f^2>0$，這才給出內積的正定性。若容許任意逐點函數，「只在一點非零」的函數積分平方仍為零；不能直接在該集合上宣稱這是內積。使用 $L^2$ 時則須把幾乎處處相等的函數視為同一個向量。

取不完全正交的基底 $p_1=1$、$p_2=1+t$。Gram matrix 的每個 entry 是 $G_{ij}=\langle p_i,p_j\rangle$：

$$G=\begin{bmatrix}\int 1 & \int(1+t)\\ \int(1+t) & \int(1+t)^2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 2\\ 2 & 8/3\end{bmatrix}.$$

若 $f=1+3t$，right-hand side 是

$$b=\begin{bmatrix}\langle p_1,f\rangle\\ \langle p_2,f\rangle\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\ 4\end{bmatrix}.$$

要求 $f=c_1p_1+c_2p_2$，不必猜係數；正交投影與完整展開都化為 Gram system

$$G\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\end{bmatrix}=b.$$



## 延伸：積分內積的 Gram 系統 （續）

第一個方程給 $c_1+c_2=1$，第二個方程在代入後給 $c_2=3$，所以 $c_1=-2$。回代：

$$-2(1)+3(1+t)=1+3t.$$

$\det G=2(8/3)-2\cdot 2=4/3>0$，所以係數唯一。更一般地，$c^TGc=\|\sum_i c_ip_i\|^2$；函數獨立時它正定。若函數相依，$G$ 可能奇異，但由內積產生的右端 $b_i=\langle p_i,f\rangle$ 仍在 $\mathrm{Col}(G)$：對每個 $z\in\ker G$，$\sum_i z_ip_i=0$，故 $z^Tb=0$。因此投影存在；係數可不唯一，而所表示的投影函數唯一。$f$ 不在 span 時只會有非零正交殘差，不會使這個 Gram 系統無解。

在 $C([0,2\pi],\mathbb{R})$ 使用相同的積分內積。若改用正交 basis $\{1,\cos x,\sin x\}$，投影係數可用除法直接得到。以 $f(x)=1+x$、$x\in[0,2\pi]$ 為例：

$$a_0=\frac{\int_0^{2\pi}(1+x)\,dx}{2\pi}=1+\pi,$$

$$a_1=\frac{\langle\cos x,f\rangle}{\langle\cos x,\cos x\rangle}=0,\qquad b_1=\frac{\langle\sin x,f\rangle}{\langle\sin x,\sin x\rangle}=-2.$$

所以有限 Fourier 投影是 $f_1(x)=1+\pi-2\sin x$。殘差 $e=x-\pi+2\sin x$ 與 $1$、$\cos x$、$\sin x$ 都正交；這正是有限維 least-squares projection，而不是把任意係數代入就算完成。

## 延伸：帶參數 Toeplitz 矩陣

先備概念：行列式、遞迴與特徵值。

對 $a \in \mathbb{R}$、正整數 $n$，再考慮

$$T_n(a) = \begin{bmatrix} a & 1 & & 0 \\ 1 & a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & & 1 & a \end{bmatrix}.$$

令 $D_n = \det T_n(a)$，並定義 $D_0 = 1$。沿第一 row 展開：

$$D_n = aD_{n-1} - D_{n-2}.$$

第二項來自第一 row 的 $1$ 與下一 row 的 $1$，其結構正好是 $D_{n-2}$；此遞迴適用於 $n \geq 2$，配合 $D_0 = 1, D_1 = a$ 即可手算。前三項是

$$D_1 = a, \qquad D_2 = a^2 - 1, \qquad D_3 = a(a^2-1) - a = a(a^2-2).$$

也可用 eigenvectors。對 $k = 1, \dots, n$，令 $\theta_k = k\pi/(n+1)$、$(v_k)_j = \sin(j\theta_k)$，並把 boundary 值設為 $v_0 = v_{n+1} = 0$。三角恆等式給

$$(v_k)_{j-1} + (v_k)_{j+1} = 2\cos(\theta_k)(v_k)_j,$$

故 $T_n(a)v_k = (a + 2\cos\theta_k)v_k$。這些 vectors 非零且對應不同 eigenvalues，構成獨立集合；因此

$$D_n(a) = \prod_{k=1}^{n} (a + 2\cos(k\pi/(n+1))).$$



## 延伸：帶參數 Toeplitz 矩陣 （續）

$n = 3$ 時 eigenvalues 是 $a + \sqrt{2}, a, a - \sqrt{2}$，乘積回 $a(a^2-2)$。在 $\mathbb{R}$ 上 $T_3(a)$ 可逆若且唯若 $a \notin \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$。這類題必須把 parameter 代入 determinant 的一般結構，不能只選一個數值算完就宣稱參數結論。

## 從消去到解集

先檢查矛盾列與自由變數，再選擇消去、回代或因子分解；換列時同步處理右端與已保存的乘數。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 2.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 從計算走到結構

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，第 2 章的消去法回答某個 $b$ 是否有解。本章改問整組可能結果：

$$\{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

另一組要研究的向量是使結果為零的輸入：

$$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

前者是 column space（欄空間）$C(A)$，後者是 nullspace（零空間）$N(A)$。兩者都是 vector subspace（向量子空間），因此加法與純量乘法不會把它們帶出集合。

先固定體。若未特別說明，本章使用實數體 $\mathbb{R}$；換成 $\mathbb{C}$ 或有限體時，span 與 rank 的規則仍成立，但幾何與「非零純量」的細節須重新交代。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 向量空間與子空間的判準

集合 $V$ 在體 $\mathbb{F}$ 上稱為 vector space，需對純量乘法與向量加法封閉，向量加法構成交換群，並有 $1v = v$、$(ab)v = a(bv)$、$a(u+v) = au + av$、$(a+b)v = av + bv$。對子集 $S \subseteq V$，不必逐條重驗全部公理。只要

$$0 \in S, \qquad u, v \in S \Rightarrow u + v \in S, \qquad u \in S,\ c \in \mathbb{F} \Rightarrow cu \in S,$$

則 $S$ 是 $V$ 的 subspace。第三條有時與第二條合寫成 $cu + dv \in S$。

$\{0\}$ 與 $V$ 本身永遠是子空間。$\varnothing$ 不是子空間。只包含非零純量的集合不是子空間，因為它不包含 additive identity $0$。

檢查「非空且對線性組合封閉」最省步驟。也要注意：集合若根本不是 $\mathbb{R}^n$ 的線性子集，例如單位圓，即使包含一些好向量也不是子空間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## span、交集與 column space

對 $v_1, \dots, v_k$，span 定義為所有有限線性組合：

$$\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\} = \left\{ \sum_{j=1}^{k} c_j v_j : c_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

張成空間是包含這些向量的最小子空間。兩個子空間的交集 $S \cap T$ 仍是子空間；聯集 $S \cup T$ 通常不是。例如 $\mathbb{R}^2$ 的 $x$-axis 與 $y$-axis 各自是子空間，但分別取一個軸上的非零向量後，其和不在兩軸的聯集中。

設 $A = [a_1 \ \cdots \ a_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$。column view 給

$$C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\} = \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}.$$

因此 $Ax = b$ 有解，若且唯若 $b \in C(A)$。這個判準同時適用方陣與矩形矩陣。

span 會自動允許所有有限相加，所以「多取一個已經位於 span 內的向量」不會擴大該 span。



## 同一個方程組的三種結構

考慮

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

消去後得到

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

第 1、3 欄含主元，秩 $r = 2$。欄空間由兩個原始 pivot columns 生成：

$$C(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

列空間由 $R$ 的兩個非零列張成，位於 $\mathbb{R}^4$；欄空間位於 $\mathbb{R}^3$。兩者維度同為 2，卻不是同一個集合。RREF 保留列空間與零空間，通常改變欄空間；若依 RREF 的主元欄索引構造一組欄空間基底，必須回到原始 $A$ 取對應欄；其他獨立且張成的向量也可以構成基底。

## 函數與矩陣也能是向量

「向量」不限定為有限個數的一欄。次數至多 2 的實係數多項式構成

$$P_2 = \{a + bx + cx^2 : a, b, c \in \mathbb{R}\}.$$

它與 $\mathbb{R}^3$ 透過坐標 $(a, b, c)$ 同構，因為多項式加法和純量乘法逐係數作用。$2 \times 2$ 實矩陣也構成向量空間；其「向量」是矩陣，而其純量仍是實數。

區分兩種乘法：

- 矩陣空間中的 vector 可以相加，也可以乘純量。
- 矩陣與矩陣相乘是額外的 bilinear product（雙線性乘法），不是讓矩陣空間成為向量空間的必要條件。

若沒有指定定義域，函數集合不一定成空間。例如所有函數 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 在逐點加法與純量乘法下形成向量空間。連續函數與可微函數也各自形成子空間，因為兩個連續或可微函數的和仍連續或可微，乘上常數後也保有相同性質。

從有限維結構開始，能避免「座標向量才有加法」的誤解；後續線性轉換章會大量使用多項式與函數空間。



## nullspace 為何是子空間

定義

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

若 $x, y \in N(A)$、$c \in \mathbb{R}$，則

$$A(x + y) = Ax + Ay = 0, \qquad A(cx) = cAx = 0.$$

又有 $A0 = 0$，所以 $N(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空間。注意 $N(A)$ 的 vectors 與 $x$ 同維度，位於 domain $\mathbb{R}^n$，不在 output $\mathbb{R}^m$。

對本章矩陣，$N(A) \subseteq \mathbb{R}^4$。column space $C(A) \subseteq \mathbb{R}^3$。這兩個子空間的 ambient spaces（所在空間）不同，不能直接比較向量是否相等。

$N(A)$ 是「所有零解的集合」，不是「某一次求解留下的 zero row」。即使消去後出現 zero rows，nullspace 的大小由 free columns 控制。

## 從 RREF 建構特殊解

前頁矩陣的 RREF 方程式為

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 0, \qquad x_3 + x_4 = 0.$$

pivot variables 是 $x_1, x_3$，free variables 是 $x_2, x_4$。依序把一個 free variable 設為 1、其餘設為 0：

$$x_2 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow s_1 = (-2, 1, 0, 0)^T,$$
$$x_2 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow s_2 = (-1, 0, -1, 1)^T.$$

任何零解都可唯一寫成

$$x = x_2 s_1 + x_4 s_2.$$

所以 $N(A) = \operatorname{span}\{s_1, s_2\}$，且 $\dim N(A) = 2$。$n - r = 4 - 2 = 2$ 在這裡得到第一個具體檢核。

特殊解不是任意挑兩組零解。依 free-variable 標準化後，special solutions 對 free coordinates 形成 identity，因此必獨立，且所有零解都能由它們表示。



## 消去不改變 nullspace

若 $E$ 是可逆的 elementary matrix，則

$$Ax = 0 \iff EAx = 0.$$

右推左時使用 $E^{-1}$：

$$EAx = 0 \Rightarrow Ax = E^{-1}0 = 0.$$

有限次可逆 row operations 合併成可逆矩陣 $M$，因此

$$N(A) = N(MA).$$

對任何 $A$，可用交換列、將一列乘非零純量，以及加上另一列的純量倍得到 RREF $R$，故

$$N(A) = N(R).$$

這只需以可逆列運算化簡。若不允許把 pivot row 除以 pivot 的 scale operation，仍可得到 echelon form；special solutions 的公式會多一個非零係數比例。

column space 一般不保留，因為 left multiplication 會把 output vectors 一起改掉。row space 與 nullspace 保留，原因是 row operations 不改 rows 所生成的集合，也逐式保留齊次解。

## 列運算保留欄之間的線性關係

沿用本章的 $3 \times 4$ 矩陣。依序做 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$、$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$、$R_3 \leftarrow R_3 - R_2$，得到

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \longrightarrow \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

若 $R = EA$，其中 $E$ 可逆，則對**同一組係數** $c$：

$$Ac = 0 \iff EAc = Rc = 0.$$

因此欄向量間所有線性關係保留：例如 $a_2 = 2a_1$、$a_4 = a_1 + a_3$，而 $R$ 的欄也滿足相同關係。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 關係保留，欄空間本身卻可能改變

| A | | R = EA |
|---|---|---|
| $a_2 = 2a_1$ | → | $r_2 = 2r_1$ |
| $a_4 = a_1 + a_3$ | | $r_4 = r_1 + r_3$ |
| $(-1, 1, -1)^T A = 0$ | | $e_1 \in C(R), e_1 \notin C(A)$ |

取 $y = (-1, 1, -1)^T$，可直接驗算 $y^T A = 0$。因此任何 $b \in C(A)$ 都滿足 $y^T b = 0$。但 $e_1 = (1, 0, 0)^T$ 是 $R$ 的第一欄，且 $y^T e_1 = -1$，所以 $e_1 \in C(R)$ 卻不在 $C(A)$。

結論：$N(R) = N(A)$，但一般 $C(R) \neq C(A)$。要找原始欄空間的基底，先從 RREF 找出主元欄的**索引**，再回到原始 $A$ 取第 1、3 欄。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## rank 與自由度的第一個公式

設 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 的 RREF 有 $r$ 個 pivot columns。每個 pivot column 提供一個 basic variable（基本變數），其餘 $n - r$ 個 columns 是 free columns。每個 free variable 可選參數，得到一個特殊解。

特殊解的數目是 $n - r$，它們構成 nullspace 的一組 basis。於是

$$\dim N(A) = n - r.$$

若 $n > r$，必有非零零解；若 $r = n$，nullspace 只有零向量。rank 不可能超過 $\min(m, n)$，因為 pivot 最多一列一個、一欄一個。

例如一個 $2 \times 4$ 矩陣最多 rank 2，必有至少兩個自由參數。即便每列都非零，也不能由列數直接推論 nullspace 只有 $\{0\}$。

不要用「非零 rows 數」目測初學時期的原矩陣；先化到 row echelon form，數實際非零 pivots。



## 非齊次系統的完整解

設 $x_p$ 是 $Ax = b$ 的一個 particular solution（特解），$x_n \in N(A)$。那麼

$$A(x_p + x_n) = b + 0 = b.$$

反過來，若 $x$ 與 $x_p$ 都是解，則

$$A(x - x_p) = Ax - Ax_p = b - b = 0.$$

因此完整解集是 affine set（仿射集合）

$$\{x_p + x_n : x_n \in N(A)\} = x_p + N(A).$$

它不是子空間，除非 $0 \in x_p + N(A)$，也就是 $b = 0$。若 nullspace 非零，解集是一條線、平面或其高維平移。

兩個特解之差一定落在 nullspace；但兩個特解相加通常不再解原方程，因為右端會成為 $2b$。

## 本章例子的 complete solution

取 $b = (2, 5, 3)^T$。augmented matrix 經 row operations 得

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

沒有 $0 = c$ 的矛盾列，所以系統一致。令所有 free variables 為 0，可得

$$x_p = (2, 0, 1, 0)^T.$$

代入前節的 nullspace basis，

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

檢查：$Ax_p = (2, 5, 3)^T$，兩個特殊解經 $A$ 作用後都是 0。

特解不唯一。例如令 $x_2 = 3$ 會得到另一個特解；只要仍落在同一個 affine set，都是合法選擇。



## 四種 rank 情形

設 $A$ 是 $m \times n$、rank $r$，則最多有以下四種結構：

| 條件 | 結構 | $Ax = b$ 的結論 |
|---|---|---|
| $r = m = n$ | 方陣且滿秩 | 每個 $b$ 恰有一解 |
| $r = m < n$ | 列滿秩 | 每個 $b$ 至少一解，有 $n - m$ 個自由度 |
| $r = n < m$ | 欄滿秩 | 最多一解；部分 $b$ 無解 |
| $r < m,\ r < n$ | 列與欄皆未滿秩 | 某些 $b$ 無解；可解時有 $n - r$ 個自由度 |

第二列中「每個 $b$」成立是因為 $C(A) = \mathbb{R}^m$。第三列中 nullspace 是 $\{0\}$，所以可解時解唯一，但 $C(A)$ 只是 $\mathbb{R}^m$ 的真子空間。

列滿秩與欄滿秩是相對於列數和欄數的；若 $m \neq n$，兩者不可能同時成立。

## 線性相依與獨立

向量 $v_1, \ldots, v_k$ 稱為線性獨立（linearly independent），若

$$c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k = 0$$

只在所有 $c_i = 0$ 時成立。若存在至少一個非零係數使上式成立，就稱為 dependent。

等價地，以這些向量作欄的 $V$，其零空間只有零向量。對 $V \in \mathbb{F}^{m \times k}$：

$$V \text{ 的 columns 獨立} \iff N(V) = \{0\}.$$

$\mathbb{F}^m$ 中最多有 $m$ 個獨立向量；若 $k > m$，必線性相依。零向量只要出現在集合中，整組就線性相依，因為取該零向量的係數為 1、其餘為 0，得到非平凡線性關係。

沒有零向量並不足以保證線性獨立；任意兩個同向非零向量也線性相依。獨立性要求零向量只能有一種表示，即所有係數均為零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 線性獨立的邊界：空集與零向量

一組向量線性獨立，意指只有全零係數能形成零向量。空集合依此定義是線性獨立的：它沒有可構成反例的向量；空集合的 span 按慣例是 $\{0\}$，因此它是零向量空間的基底。

若一組向量包含零向量，給零向量係數 1、其他係數 0，即得非平凡零組合，所以必相依。非零單一向量 $\{v\}$ 則獨立，因 $cv = 0$ 只能有 $c = 0$。

獨立集合的任一子集仍獨立；相依集合的任何超集仍相依。反向不成立：$\{(1,0)^T\}$ 獨立，加入 $(2,0)^T$ 後就相依。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## span、basis 與 dimension

vectors $v_1, \dots, v_k$ 構成 subspace $S$ 的 basis，若它們

1. 都在 $S$ 中；
2. span $S$；
3. 線性獨立。

生成性保證空間中每個 vector 至少有一種係數表示；獨立性保證表示唯一。若

$$w = \sum c_i v_i = \sum d_i v_i,$$

則 $\sum (c_i - d_i) v_i = 0$，獨立性迫使 $c_i = d_i$。

一個空間的所有 bases 含相同數目，這個不變量稱為 dimension。零空間 $\dim\{0\} = 0$，其空集選為 basis。$\mathbb{R}^n$ 的標準 basis 有 $n$ 個 vectors。

basis 不是唯一，所有 basis 的大小才是不變的。多放一個向量常破壞獨立；少放一個常失去生成。



## dimension 的證明與函數例子

設 $S$ 有含 $d$ 個向量的基底。座標映射

$$\varphi_S(c_1, \dots, c_d) = \sum_{i=1}^{d} c_i u_i$$

是 $\mathbb{F}^d \to S$ 的雙射：生成性給存在性，獨立性給唯一性。若 $S$ 中某組 $d$ 個向量 $w_1, \dots, w_d$ 線性獨立，將它們用原基底表示：

$$w_j = \sum_{i=1}^{d} b_{ij} u_i.$$

令 $B = (b_{ij})$。由基底表示的唯一性，

$$\sum_{j=1}^{d} c_j w_j = 0 \iff Bc = 0.$$

因此 $w_j$ 線性獨立等價於 $N(B) = \{0\}$。方陣 $B$ 沒有自由變數，故可逆；對任一 $v \in S$，其原座標 $y$ 滿足 $Bc = y$，所以 $v$ 能由 $w_j$ 表示。這證明線性獨立的 $d$ 個向量也生成 $S$。若 $k$ 個向量線性獨立而 $d$ 個向量生成，係數矩陣是 $d \times k$；零空間只有零要求 $k \le d$。兩組基底互相比較即得大小相等。

函數集合

$$\{1, \cos(2x), \sin^2 x\}$$

## dimension 的證明與函數例子 （續）

是 dependent，因為

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x).$$

但 $\{1, \cos x, \sin x\}$ 在某些函數空間中可獨立。要證明函數獨立，通常需使用任意的 $x$、係數比較、微分或其他結構。

同一組公式在不同定義域或不同函數空間中，span 與獨立條件要重新檢查；不要把「函數形式看起來不同」直接當作獨立證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 基底擴充：要選 span 以外的向量

在有限維空間中，可把子空間 $W$ 的基底擴充為整個空間 $V$ 的基底：若目前的獨立集合尚未張成 $V$，選 $u \notin \operatorname{span}(S)$ 加入，直到張成為止。僅要求 $u \notin S$ 不夠；例如 $S = \{(1,0)^T\}$，加入 $(2,0)^T$ 便相依。

反過來，一組既定的 $V$ 基底未必能直接刪減成 $W$ 的基底。例如 $W = \operatorname{span}\{(1,1)^T\} \subset \mathbb{R}^2$，標準基底兩向量都不在 $W$；但 $(1,1)^T$ 可與 $(1,0)^T$ 組成 $\mathbb{R}^2$ 的基底，因行列式為 $-1 \neq 0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 四個基本子空間

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，定義

| 子空間 | 定義 | 所在空間 |
|---|---|---|
| column space | $C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\}$ | $\mathbb{R}^m$ |
| row space | $C(A^T) = \{A^T y : y \in \mathbb{R}^m\}$ | $\mathbb{R}^n$ |
| nullspace | $N(A) = \{x : Ax = 0\}$ | $\mathbb{R}^n$ |
| left nullspace | $N(A^T) = \{y : A^T y = 0\}$ | $\mathbb{R}^m$ |

「左零空間」（left nullspace）的名稱來自把 $A^T y = 0$ 轉置成 $y^T A = 0$。

RREF 的非零列生成列空間；原始 $A$ 的 pivot 欄生成欄空間。零空間與左零空間由各自的特殊解生成。

列運算保留列空間與 $N(A)$，但會改寫欄空間的表示法。四個子空間要一起追蹤；相同 rank 不代表位於相同 ambient space。



## rank-nullity 與左零空間

對 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，設 RREF 為 $R$、pivot 數為 $r$。有限次可逆列運算可合併成可逆矩陣 $M$，使 $R = MA$。先證 column rank：$C(R) = MC(A)$ 是線性同構的像，維度不變。RREF 的每個 pivot 欄都是某個標準座標向量，pivot 欄線性獨立；其他欄可由 pivot 欄表示，所以 $\dim C(R) = r$，再得 $\dim C(A) = r$。

列運算也保留 row space：$R = MA$ 的每個 row 都是 $A$ 的 rows 的線性組合，故 $C(R^T) \subseteq C(A^T)$；再由 $A = M^{-1}R$ 得反向包含，兩個 row spaces 相等。各列的特定相依係數不必保持不變。另一方面 $Ax = 0 \iff MAx = 0$，所以 $N(A) = N(R)$。RREF 的 $r$ 個非零列線性獨立並生成原矩陣的 row space，故 $\dim C(A^T) = r$。這證明 column rank 與 row rank 相等。

對 $R$ 讀方程時有 $r$ 個 pivot variables 與 $n - r$ 個 free variables。每個 free variable 設為 1、其餘設為 0，所得特殊解的 free coordinates 形成 $I_{n-r}$，所以線性獨立；任一解又由自由參數唯一決定，故它們生成 $N(A)$。基本維度關係為

$$\dim C(A) = \dim C(A^T) = r,$$
$$\dim N(A) = n - r, \qquad \dim N(A^T) = m - r.$$

對 $A^T$ 套用同一證明，右側所在空間是 $\mathbb{R}^m$，故左零度為 $m - r$。每一組維度相加：

$$r + (n - r) = n, \qquad r + (m - r) = m.$$

對本章 $3 \times 4$ 範例，$r = 2$，所以 $\dim C(A) = 2$、$\dim N(A) = 2$、$\dim N(A^T) = 1$。令 $y = (a, b, c)^T$，直接解 $A^T y = 0$：

## rank-nullity 與左零空間 （續）

$$a+2b+c=0,\quad 2a+4b+2c=0,\quad b+c=0,\quad a+3b+2c=0.$$

第二式是第一式的兩倍，第四式是第一式加第三式，故只需第一與第三式。先得 $c=-b$，再得 $a=-b$；所有解為 $b(-1,1,-1)^T$，所以 left-null basis 是

$$\{(-1,1,-1)^T\}.$$

這些是維度關係，不是把四個子空間全部放進同一個直接和。每個公式只配同一 ambient space 的一對子空間。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 兩對正交補為何成立

令 $A$ 為實矩陣。若 $x\in N(A)$，對任意 $A^Ty\in C(A^T)$，

$$(A^Ty)^Tx=y^TAx=0.$$

因此 $N(A)\subseteq C(A^T)^\perp$。兩者維度皆為 $n-r$，故相等。同理，若 $z\in N(A^T)$，任意 $Ax\in C(A)$ 都滿足

$$z^T(Ax)=(A^Tz)^Tx=0.$$

維度同為 $m-r$，故 $N(A^T)=C(A)^\perp$。這同時說明 $Ax=b$ 可解時，所有左零空間向量都與 $b$ 正交。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Fundamental Theorem 的內容

四基本子空間的維度定理常寫成

$$\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A), \qquad \mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^T).$$

$\oplus$ 表示 direct sum。第二章的 row space 與 nullspace 位於 domain，dimensions $r$ 與 $n-r$；column space 與 left nullspace 位於 codomain，dimensions $r$ 與 $m-r$。兩個配對都是 orthogonal complements（正交補空間），下文將證明。

例如 $x \in \mathbb{R}^n$ 可拆成 row-space component 加 nullspace component。這裡的重要前提是 inner product 與補空間的定義已固定；對一般抽象向量空間，需要內積或 dual pairing 才能談正交。

只有維度相加等於 $n$ 尚不足以推出 direct sum，還須排除非零交集。若 $z \in C(A^T) \cap N(A)$，可寫 $z = A^T y$，且 $Az = 0$，因此

$$z^T z = (A^T y)^T z = y^T A z = 0.$$

在實數空間中 $z^T z = \sum_i z_i^2 = 0$ 強迫 $z = 0$。兩個子空間的基底合起來因而線性獨立：若兩側組合相加為零，它們各自是交集中的同一向量，故兩者皆零。合併基底共有 $r + (n-r) = n$ 個獨立向量，必生成 $\mathbb{R}^n$，得到第一個 direct sum。對 $A^T$ 重複此證明即得第二個。下文再證明正交補空間；投影公式將於後續章節推導。

這一步使用實數內積的正定性。複數版須用 $A^*$ 和 $z^* z$；不能把普通轉置版本直接搬到任意體。例如在 $\mathbb{F}_2$ 上 $A = [1\ 1]$，$C(A^T) = N(A) = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}$，雖然兩維度和為2，交集仍非零。rank-nullity 在該體上依然成立，失效的是這個普通轉置的 direct-sum 結論。



## Fundamental Theorem 的內容 （續）

本章實矩陣的限制映射 $A : C(A^T) \to C(A)$ 是同構。其核是前述零交集，所以單射；任取 $b = Ax \in C(A)$，把 $x$ 分解為 $x_{\text{row}} + x_{\text{null}}$，便有 $b = Ax_{\text{row}}$，所以滿射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 四個基本子空間的對應

同一個 A：3×4、rank 2；方框表示集合，不是實際平面




Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Direct sum 的數值重建

沿用本章的 $A$，四個基本子空間的一組基底是

$$u_1 = (1,2,0,1)^T, \quad u_2 = (0,0,1,1)^T,$$
$$s_1 = (-2,1,0,0)^T, \quad s_2 = (-1,0,-1,1)^T.$$

前兩個張成 $C(A^T)$，後兩個張成 $N(A)$。若 $\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma s_1 + \delta s_2 = 0$，逐座標得到

$$\gamma = -2\alpha, \quad \delta = \beta, \quad 5\alpha - \beta = 0, \quad \alpha + 2\beta = 0.$$

因此 $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0$。四個向量在 $\mathbb{R}^4$ 中線性獨立，構成 $\mathbb{R}^4$ 的基底。

取

$$x = (-2,3,0,3)^T = u_1 + u_2 + s_1 + s_2,$$

則

$$x_{\text{row}} = (1,2,1,2)^T, \qquad x_{\text{null}} = (-3,1,-1,1)^T.$$

兩式相加回到 $x$。因為四個基底向量線性獨立，這個分解唯一。此處不用內積也可建立 direct sum；兩分量也互相正交。

數值上 $Ax_{\text{row}} = (7,17,10)^T = 7(1,2,1)^T + 3(0,1,1)^T \in C(A)$，而 $Ax_{\text{null}} = 0$。又 $x_{\text{row}}^T x_{\text{null}} = -3 + 2 - 1 + 2 = 0$，所以兩分量在實內積下確實正交，$\|x\|^2 = 22 = 10 + 12$。

此圖的兩軸不是原始四個座標軸，而是 $u = x_{\text{row}}/\sqrt{10}$、$v = x_{\text{null}}/\sqrt{12}$。它只畫出這兩向量張成的二維平面，不把整個 $\mathbb{R}^4$ 誤當平面。

## 直和分量的幾何關係

四維向量的兩個分量：在其張成的二維平面中作圖




$x_{row} = (1,2,1,2)^T$

$x_{null} = (-3,1,-1,1)^T$

$x = (-2,3,0,3)^T = x_{row} + x_{null}$

$u=x_{row}/\sqrt{10}$ · $v=x_{null}/\sqrt{12}$

$u^Tv=0$；$\|x\|^2=10+12=22$

$Ax=Ax_{row}=(7,17,10)^T$；$Ax_{null}=0$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 本章重點

- 從 RREF 找主元欄索引，回原矩陣取欄，得到一組欄空間基底。
- 自由變數產生零空間基底；非齊次解集為特解加零空間。
- 行空間與零空間、欄空間與左零空間各構成一對正交補。
- 秩的數值相同不表示不同環境空間中的子空間相同。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 3.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 為何四個子空間要配對

令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$r = \text{rank}(A)$。四個基本子空間分成兩組；同一組位於同一個空間：

$$C(A^T), N(A) \subseteq \mathbb{R}^n,$$
$$C(A), N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^m.$$

兩組的維度和分別是 $n$ 與 $m$：

$$\dim C(A^T) + \dim N(A) = r + (n - r) = n,$$
$$\dim C(A) + \dim N(A^T) = r + (m - r) = m.$$

本章會證明這兩組都是正交互補。因此每個輸入向量 $x$ 都能唯一拆成 row space 與零空間的成分；每個輸出向量 $b$ 則拆成 column space 與左零空間的成分。

先分清向量住在哪個空間。若 $b \in \mathbb{R}^m$，它不可能直接和 $x \in \mathbb{R}^n$ 比較內積，除非 $m = n$ 且已在同一座標空間。



## row space 與 nullspace 為何正交

若 $x \in N(A)$，則 $Ax = 0$。展開成 rows 的內積：

$$\begin{bmatrix} r_1^T \\ \vdots \\ r_m^T \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} r_1^T x \\ \vdots \\ r_m^T x \end{bmatrix} = 0.$$

所以 $x$ 與 $A$ 的每一個 row 都正交。row space 中的任一向量 是 rows 的線性組合；內積對線性組合線性，因此它也與 $x$ 正交：

$$x^T(c_1 r_1 + \cdots + c_m r_m) = 0.$$

反之，若 $x$ 與所有 rows 正交，則 $Ax = 0$，故 $x \in N(A)$。這先證明 $N(A) = C(A^T)^\perp$。row space 與 nullspace 正交且維度和為 $n$，故互為正交補空間，因而

$$C(A^T) = N(A)^\perp.$$

同樣把 $A$ 換成 $A^T$，可得 $C(A) = N(A^T)^\perp$。

這裡證明的是正交補空間，而不只是維度相加。$U^\perp$ 由所有與 $U$ 中每個向量都正交的向量組成。

## 正交與互補有什麼不同？

若兩個 subspaces $U, W$ 的每一對 $u \in U, w \in W$ 都滿足 $u^T w = 0$，寫成 $U \perp W$。若 $z \in U \cap W$，則 $z^T z = 0$，必有 $z = 0$，所以 $U \cap W = \{0\}$。反之，「交集只有 0」本身不足以推出正交。

在有限維 inner-product space 中，若

$$U \cap W = \{0\}, \qquad \dim U + \dim W = \dim V,$$

則 $V = U \oplus W$ 是 direct sum，但 $U, W$ 仍可能斜交。若再證明 $U \perp W$，才是 orthogonal direct sum。

例：在 $\mathbb{R}^2$ 中，$U = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}$ 與 $W = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}$ 交集只有 0，dimensions 相加為 2；但它們不垂直。將 $W$ 改成 $\operatorname{span}\{(0,1)^T\}$ 才成為 orthogonal complement。

正交補空間取決於採用的內積。本章先使用實數空間的標準內積；標準複內積則以共軛轉置（conjugate transpose）取代轉置。



## 分解的維度與例子

因為 $C(A^T) \oplus N(A) = \mathbb{R}^n$，每個 $x \in \mathbb{R}^n$ 可唯一寫成

$$x = x_{\text{row}} + x_{\text{null}}, \qquad x_{\text{row}}^T x_{\text{null}} = 0.$$

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

rank 為 2。兩 rows 本身獨立，構成 row space 的 basis；nullspace 由

$$(-2, 1, -1)^T$$

生成。直接檢查

$$(1,2,0)(-2,1,-1)^T = 0, \qquad (0,1,1)(-2,1,-1)^T = 0.$$

所以 $\mathbb{R}^3 = C(A^T) \oplus N(A)$。另一方面 $A$ 是 full row rank，$N(A^T) = \{0\}$，因此 $C(A) = \mathbb{R}^2$ 也是整個 output space。

一個子空間為整個空間時，它的 orthogonal complement 自然是零空間。這與「不能分解」不同；零成分的分解仍唯一。

## 投影到一條直線

給非零 $a \in \mathbb{R}^n$，要從 $b$ 去掉垂直於 line $L = \operatorname{span}\{a\}$ 的部分。投影

$$p = \lambda a$$

須使 residual $e = b - p$ 垂直於整條 line：

$$a^T e = a^T (b - \lambda a) = 0.$$

因 $a^T a > 0$，解得

$$\lambda = \frac{a^T b}{a^T a}, \qquad p = a \frac{a^T b}{a^T a}.$$

投影矩陣是

$$P = \frac{a a^T}{a^T a}, \qquad p = P b.$$

例如 $a = (1,1,1)^T$、$b = (2,1,4)^T$，則 $a^T b = 7$、$a^T a = 3$，

$$p = \frac{7}{3}(1,1,1)^T, \quad e = b - p = \frac{1}{3}(-1,-4,5)^T.$$

直接代回可得

$$p + e = (2,1,4)^T = b, \qquad a^T e = \frac{1(-1) + 1(-4) + 1(5)}{3} = 0.$$

因此 $p^T e = 0$，且



## 投影到一條直線 （續）

$$\|e\|_2 = \frac{\sqrt{(-1)^2 + (-4)^2 + 5^2}}{3} = \frac{\sqrt{42}}{3}.$$

同一組數值滿足 normal equation

$$a^T a \, \lambda = a^T b, \qquad 3 \cdot \frac{7}{3} = 7.$$

圖採用平面 $\operatorname{span}\{a, e\}$ 中的正交單位基底 $f_1 = a/\sqrt{3}$、$f_2 = e/(\sqrt{42}/3)$。因此圖上的兩維座標是

$$[a] = (\sqrt{3}, 0), \quad [p] = (7/\sqrt{3}, 0), \quad [e] = (0, \sqrt{42}/3), \quad [b] = (7/\sqrt{3}, \sqrt{42}/3).$$

這是該平面到 $\mathbb{R}^2$ 的等距座標表示，兩軸使用相同尺度；直角是原內積的真正正交關係。黑色短向量 $a$ 與藍色較長向量 $p = (7/3)a$ 的端點不同；綠色殘差畫成從 $p$ 到 $b$ 的平移向量。

## 直線投影：同一個數例

精確投影：在 span{a,e} 的正交座標中畫 b=p+e




**正交單位基底；兩軸同尺度**

f₁=a/√3 · f₂=e/(√42/3)

a=(√3,0) · p=(7/√3,0)

e=(0,√42/3) · b=p+e

原座標 a=(1,1,1) · b=(2,1,4)

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 投影到子空間

設 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的 columns 線性獨立，令

$$S = C(A).$$

將 $b$ 正交投影到 $S$，等價於要求殘差 $e = b - Ax$ 與 $S$ 的每個基底向量正交：

$$A^T(b - Ax) = 0.$$

因此得到正規方程（normal equations）

$$A^TAx = A^Tb.$$

當 columns 線性獨立時 $A^TA$ 可逆，所以

$$p = A(A^TA)^{-1}A^Tb.$$

投影矩陣為

$$P = A(A^TA)^{-1}A^T.$$

注意 $P$ 不是 $A^{-1}$；$A$ 通常不是方陣。也不能把 $(A^TA)^{-1}$ 改寫成 $A^{-1}(A^T)^{-1}$，除非 $A$ 本身是可逆方陣。

直線公式是 $n = 1$ 的特例。若 columns 獨立，$A^TA$ 的正定性和可逆性可由 $z^TA^TAz = \|Az\|^2$ 證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 為何 $A^TA$ 的可逆性需要獨立

對任意 $z \in \mathbb{R}^n$，

$$z^TA^TAz = (Az)^T(Az) = \|Az\|^2 \geq 0.$$

若 $A$ 的 columns 獨立，$Az = 0$ 只在 $z = 0$ 時成立，因此對 $z \neq 0$，$\|Az\|^2 > 0$。這表示 $A^TA$ 是 positive definite（正定），也必可逆。

反過來，若 columns dependent，存在 $z \neq 0$ 使 $Az = 0$，故

$$A^TAz = A^T0 = 0,$$

所以 $A^TA$ 不可逆。此推論使用實數體與 Euclidean inner product；在複數空間要把轉置改為 conjugate transpose。

對 rank-deficient $A$，projection onto $C(A)$ 仍唯一，但 axes 或 columns 有冗餘；最小平方參數有 non-unique minimizers。作業中會看到同一個 $p$ 可由多個 $x$ 求得。

`A has independent columns` 是公式中 $A^TA$ inverse 的充分且必要條件。`A` full row rank 也不能使 $A^TA$ 在 $m < n$ 時可逆。



## 投影矩陣的三個代數性質

對 columns 線性獨立的 $A$，令

$$P = A(A^TA)^{-1}A^T.$$

則 $P$ 是 symmetric（對稱）且 idempotent（冪等）：

$$P^T = A((A^TA)^{-1})^TA^T = A(A^TA)^{-1}A^T = P,$$
$$P^2 = A(A^TA)^{-1}(A^TA)(A^TA)^{-1}A^T = P.$$

$P^2 = P$ 表示第二次投影不會再改變向量；$P^T = P$ 表示是 orthogonal projection，而不是任意 oblique projection。其 complementary projector

$$I - P$$

投影到 $C(A)^\perp = N(A^T)$，且 $P(I - P) = 0$。

$P^2 = P$ 只保證冪等性；正交投影還需要 $P^T = P$ 的對稱條件。

## 最近點與誤差界線

若 $p = Pb$、$e = (I - P)b$，則

$$b = p + e, \qquad p^T e = 0.$$

對 $p + e$ 應用 Pythagorean theorem：

$$\|b\|^2 = \|p\|^2 + \|e\|^2.$$

對任意 $q \in C(A)$，$p - q \in C(A)$，而 $e \perp C(A)$。由平方展開，

$$\|b - q\|^2 = \|e + (p - q)\|^2 = \|e\|^2 + \|p - q\|^2.$$

右側在 $q = p$ 時最小。這是投影「最近點」的完整幾何理由，不需要先假設微積分。

本節採標準實內積，交叉項 $e^T(p - q) = 0$。標準複內積改用 $e^H(p - q) = 0$，範數平方為 $e^H e$。若採其他內積，正交條件與範數也必須依該內積定義。



## 最小平方法的目標

當 $Ax = b$ 無解，仍可選擇

$$x^\star \in \arg\min_x \|b - Ax\|_2^2.$$

令 $p = Ax^\star$。這是 $b$ 在 $C(A)$ 上的投影。欄滿秩時，$p$ 與 $x^\star$ 都唯一；秩不足時，投影 $p$ 仍唯一，但極小參數 $x^\star$ 可能有無窮多個。

最小化平方範數與最小化範數得到同一極小點，因為平方函數在 $[0, \infty)$ 上嚴格遞增。使用平方可避免平方根，並使殘差的導數成為線性式。

以殘差範數 $\|b - Ax\|_2$ 衡量擬合誤差。若 $b \notin C(A)$，最小殘差仍非零，投影點 $p$ 也就不會等於 $b$。

「最小平方」指各座標誤差平方和最小。最佳擬合的殘差與可達子空間正交，並不要求殘差為零。

## 正規方程（normal equations）的推導

定義

$$E(x) = (b - Ax)^T (b - Ax).$$

取任意位移 $h$。直接展開平方得

$$\begin{aligned} E(x+h) - E(x) = & -2h^T A^T (b - Ax) \\ & + h^T A^T A h. \end{aligned}$$

因此梯度為

$$\nabla_x E = -2A^T (b - Ax).$$

若 $x^\star$ 是無限制極小點，沿任意 $h$ 的一階變化都必須為零，所以

$$A^T (b - Ax) = 0 \Longleftrightarrow A^T A x = A^T b.$$

在欄滿秩時 $h^T A^T A h = \|Ah\|^2 > 0$ 對所有 $h \neq 0$ 成立，故二次項嚴格為正，$x^\star$ 是唯一全域極小點。normal equations 的左端與右端維度都是 $n \times 1$。

若欄線性相依，normal equations 可有多個解。若 $x, z$ 都滿足 normal equations，令 $q = x - z$。兩式相減得 $A^T A q = 0$，左乘 $q^T$ 得

$$0 = q^T A^T A q = \|Aq\|^2.$$

所以 $Ax = Az$；參數可重複，但投影點仍相同。

$A^T$ 並不是投影矩陣。$A^T e = 0$ 是同時檢查殘差與每個欄向量正交，等價於 $e \in N(A^T)$。



## 三點擬合：先算出截距與斜率

用 $y = c + mt$ 擬合 $(0,1), (1,2), (2,2)$，固定三個時間，只調整截距 $c$ 與斜率 $m$。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

兩欄獨立，因此正規方程有唯一解：

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} 3c + 3m = 5, \\ 3c + 5m = 6. \end{cases}$$

第二式減第一式得 $2m = 1$，再代回得 $c = (5 - 3/2)/3 = 7/6$。最佳直線為 $y = 7/6 + t/2$。

## 三個殘差，必須同時通過兩項正交檢查

將同一個 $c = 7/6, m = 1/2$ 逐筆代回，定義 $e_i = b_i - p_i$：

| 時間 t | 觀測值 | 預測值 | 殘差 | 殘差平方 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | $7/6$ | $-1/6$ | $1/36$ |
| 1 | 2 | $5/3$ | $1/3$ | $1/9$ |
| 2 | 2 | $13/6$ | $-1/6$ | $1/36$ |

$$A^T e = \begin{bmatrix} e_1 + e_2 + e_3 \\ 0e_1 + 1e_2 + 2e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/6 + 1/3 - 1/6 \\ 1/3 - 2/6 \end{bmatrix} = 0, \qquad \|e\|^2 = \frac{1}{6}.$$

**殘差總和為零只檢查了常數欄。** 候選水平線 $y = 5/3$ 的殘差是 $\tilde{e} = (-2, 1, 1)^T/3$，總和也為零，但 $(0, 1, 2)\tilde{e} = 1 \neq 0$，且 $\|\tilde{e}\|^2 = 2/3 > 1/6$。



## 資料平面的綠線段是垂直殘差

最小化的是 $E(c, m) = \sum_i [b_i - (c + mt_i)]^2$：每筆資料的 $t_i$ 固定。中間點的垂直線段通向 $(1, 5/3)$，長 $1/3$；最短線段卻通向 $(17/15, 26/15)$，長 $2/(3\sqrt{5})$。它們不是同一個量。

## 資料平面的垂直殘差

固定 t，只量測 y 的差：三條垂直殘差




實心點：觀測值 $b_i$

空心點：預測值 $p_i$

藍線：$y = 7/6 + t/2$

綠線：$e_i = b_i - p_i$

$e = (-1/6, 1/3, -1/6)^T$

$\Sigma e_i^2 = 1/6$

棕色虛線：中間點的最短距離

這不是本題最小化的量。

t、y 兩軸同尺度；棕色線段的垂足是 (17/15, 26/15)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 正交發生在三維的資料向量空間

現在把三個觀測值合成一個向量 $b = (1, 2, 2)^T$，而不是把每個 $(t_i, b_i)$ 當成同一空間中的向量。預測 $p = (7, 10, 13)^T/6$ 位於二維平面 $C(A)$，殘差 $e = (-1, 2, -1)^T/6$ 垂直於整個 $C(A)$。

圖只取包含 $p, e, b$ 的截面。任意 $\alpha u + \beta v$ 要落在 $C(A)$，其垂直成分必須為零，所以交線恰為 $\text{span}\{p\}$。資料平面的垂直線段可不垂直擬合線；這與 $e \perp C(A)$ 並不矛盾。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 資料向量空間中的正交分解

資料向量空間：在 span{p,e} 的等距截面看投影




u = p/||p|| · v = e/||e||；兩軸為正交單位基底，使用相同尺度。

水平線是 C(A) ∩ span{p,e} = span{p}，不是整個二維 C(A)。

||p||² = 53/6 · ||e||² = 1/6 · ||b||² = 9 = 53/6 + 1/6。



# 不只找駐點：直接證明這條線唯一最佳

改用參數 $c' = 7/6 + \Delta c$、$m' = 1/2 + \Delta m$。預測的變化是

$$Ah = (\Delta c, \Delta c + \Delta m, \Delta c + 2\Delta m)^T, \qquad h = (\Delta c, \Delta m)^T.$$

因 $e \perp C(A)$，交叉項消失：

$$\begin{aligned} E(c', m') &= \|e - Ah\|^2 = \frac{1}{6} + \|Ah\|^2 \\ &= \frac{1}{6} + 3(\Delta c + \Delta m)^2 + 2(\Delta m)^2. \end{aligned}$$

兩個平方同時為零，先要求 $\Delta m = 0$，再要求 $\Delta c = 0$。所以這是唯一全域極小點。若只把截距增加 $1/6$，殘差平方和變為 $1/6 + 3/36 = 1/4$，可逐筆代回核對。

## 把時間置中，同一個例子也能用 QR 解

令 $s = t - 1$，則 $c + mt = a + ms$，其中 $a = c + m$。新設計矩陣的兩欄 $(1,1,1)^T$、$(-1,0,1)^T$ 正交，故

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow a = 5/3,\ m = 1/2,\ c = a - m = 7/6.$$

正規化這兩欄得 $q_1 = (1,1,1)^T/\sqrt{3}$、$q_2 = (-1,0,1)^T/\sqrt{2}$。原矩陣的薄型 QR 為

$$A = QR, \quad Q = [q_1\ q_2], \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad Q^T b = \begin{bmatrix} 5/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

解 $Rx = Q^T b$ 仍得 $m = 1/2, c = 7/6$。補上 $q_3 = (1,-2,1)^T/\sqrt{6}$，未被擬合的座標為 $q_3^T b = -1/\sqrt{6}$，其平方正好是 $1/6$。改變欄基底不改變 $C(A)$、投影或最小殘差；第 11 章再討論有限精度下的求解穩定性。



## 秩不足時的最小平方解

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$A$ 的兩欄相同，rank 為 1。投影到 column line：

$$p = \frac{a^T b}{a^T a} a = \frac{7}{5} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/5 \\ 14/5 \end{bmatrix}.$$

normal equations 是

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix},$$

因此只有

$$x_1 + x_2 = \frac{7}{5}.$$

所有滿足此式的 $x$ 都給相同 $Ax = p$，也都是 minimizers。residual

$$e = \left( -\frac{2}{5}, \frac{1}{5} \right)^T$$

與 column $(1,2)^T$ 正交。此例清楚分開「projection 唯一」與「參數唯一」。

## 秩不足時的最小平方解 （續）

秩不足時，可從獨立欄構造投影，或解正規方程得到全部最小平方解。若額外要求最小範數，可用 pseudoinverse；正則化通常改變原目標函數，應另行說明。此時不能對奇異的 $A^TA$ 求逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 同一個矩陣的四個子空間

取 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\2&2&0\end{bmatrix}$，秩為 1。輸入在 $\mathbb{R}^3$，輸出在 $\mathbb{R}^2$；兩邊的正交分解不能混在同一個空間裡。

$A$ 在 row space 上一對一地映到 column space，並把整個 nullspace 送到零；left nullspace 則描述輸出中與 column space 正交的方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 秩一矩陣的四個子空間




矩形記子空間與維度；圖上的位置不是向量座標。



## 唯一的投影，不等於唯一的參數

沿用同一個 $A$，取 $b=(3,1)^T$。因 $C(A)=\mathrm{span}\{c\}$、$c=(1,2)^T$，

$$p=\frac{c^Tb}{c^Tc}c=c=(1,2)^T,\qquad e=b-p=(2,-1)^T.$$

$c^Te=0$。任取參數 $x$，$p-Ax$ 都在 column space，因此

$$\|b-Ax\|^2=\|e\|^2+\|p-Ax\|^2=5+\|p-Ax\|^2.$$

最小殘差範數為 $\sqrt{5}$，且等號恰在 $Ax=p$ 時成立。這個條件只要求 $x_1+x_2=1$，不限制 $x_3$，所以全部最小平方解是

$$x=\begin{pmatrix}1/2+t\\1/2-t\\s\end{pmatrix},\qquad t,s\in\mathbb{R}.$$

## 參數有無窮多組，最小範數解仍只有一組

$\hat{x} = (1/2, 1/2, 0)^T$ 在 row space，而 $z = (t, -t, s)^T$ 在 nullspace。兩者正交，所以

$$x = \hat{x} + z, \qquad \|x\|^2 = \tfrac{1}{2} + 2t^2 + s^2.$$

圖的正交單位基底為 $u = (1, 2)^T/\sqrt{5}$、$v = (2, -1)^T/\sqrt{5}$。最小範數恰在 $t = s = 0$ 取到；第 7 章的 pseudoinverse 會選出這個 $\hat{x}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 投影與最小範數解

**輸出空間：正交單位座標**




[p]=(√5,0), [e]=(0,√5), [b]=(√5,√5)

**全部最小平方解**

x = (1/2+t, 1/2−t, s)

Ax = p = (1,2)

||x||² = 1/2 + 2t² + s²

t=s=0: x̂ = (1/2,1/2,0)

投影 p 唯一；參數 x 不一定唯一。

其中最小範數參數 x̂ 仍唯一。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 正交歸一基底與 $Q$

一組向量 $q_1, \dots, q_k$ 若

$$q_i^T q_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

稱為標準正交（orthonormal）。以它們作欄的 $Q \in \mathbb{R}^{m \times k}$ 滿足

$$Q^T Q = I_k.$$

若 $Q$ 是方陣，則各欄構成 $\mathbb{R}^n$ 的標準正交基底。$Q^T Q = I_n$ 的 $n$ 個欄線性獨立，因此 $Q$ 可逆，且 $Q^{-1} = Q^T$。這時才稱 $Q$ 為正交矩陣。

若 $Q$ 是長方矩陣，$Q^T Q = I_k$ 只能推出 full column rank，不能推出 $QQ^T = I_m$。兩個 dimensions 不同，不能當成同一個 identity。

正交矩陣的各欄其實是標準正交。名稱沿用已久；不要將長方矩陣誤稱可逆方陣。



## Gram–Schmidt 正交化的幾何步驟

給獨立 $a_1, \dots, a_n$。先正規化

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

對 $a_j$，先減去既有方向上的投影：

$$z_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} (q_i^T a_j) q_i,$$

再正規化

$$q_j = \frac{z_j}{\|z_j\|}.$$

線性獨立保證 $z_j \neq 0$：若 $z_j = 0$，則 $a_j$ 已在前 $j-1$ 個向量的 span 中，與整組線性獨立矛盾。對 $i < j$，將 $q_i^T z_j$ 展開可得

$$q_i^T z_j = q_i^T a_j - \sum_{\ell=1}^{j-1} (q_\ell^T a_j)(q_i^T q_\ell) = q_i^T a_j - q_i^T a_j = 0.$$

歸納假設前 $j-1$ 個 $q$ 已標準正交且張成 $\operatorname{span}\{a_1, \dots, a_{j-1}\}$。因 $a_j$ 等於 $z_j$ 加上前 $j-1$ 個方向的線性組合，而 $q_j = z_j / \|z_j\|$，加入 $q_j$ 後張成的空間不變。故每一步都有

$$\operatorname{span}\{q_1, \dots, q_j\} = \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_j\}.$$

## Gram–Schmidt 正交化的幾何步驟 （續）

以 $a_1 = (1,1,0)^T, a_2 = (1,0,1)^T$：

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,$$

$$z_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T,$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

判斷方向接近相依時，要把 $\|z_j\|$ 與 $\|a_j\|$ 比較；單看絕對長度會混淆尺度與方向。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Gram–Schmidt：減去投影




a₂ = (1, 0, 1)ᵀ

projection = ½(1, 1, 0)ᵀ

z₂ = ½(1, −1, 2)ᵀ

q₁ᵀz₂ = 0

a₂ = projection + z₂

圖在 $a_1, a_2$ 張成的平面中，以 $q_1, q_2$ 為等距座標；直角代表殘差與第一個方向正交。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 距離要先考慮尺度

Gram–Schmidt 的 $z_j$ 是 $a_j$ 去掉既有張成空間投影後的分量；對非零 $a_j$，$\|z_j\|/\|a_j\|$ 小，才表示它相對於自身尺度接近先前的 span。

例如 $a_1 = (1, 0)^T$、$a_2 = (0, 10^{-12})^T$ 完全正交，雖然 $\|z_2\| = 10^{-12}$，比值卻是 1，不能說方向接近相依。相反，$a_2 = (1, 10^{-12})^T$ 的比值約為 $10^{-12}$，才接近 $a_1$ 的 span。

這是相對幾何判斷；有限精度下還要考慮輸入誤差與演算法本身的穩定性，不能只靠一個閾值宣稱矩陣精確相依。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 利用 $A = QR$ 解最小平方法

把 Gram-Schmidt 的表示式整理成

$$A = QR,$$

其中 $Q$ 的各欄標準正交，$R$ 是上三角矩陣。由 Gram-Schmidt 係數 $R_{ij} = q_i^T a_j$（$i < j$）且 $R_{jj} = \|z_j\|$，兩邊逐欄乘開即可得到 $A = QR$。前頁例中

$$R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

當 columns 線性獨立時，least-squares equation 變成

$$R^T Q^T Q R x = R^T Q^T b \Longrightarrow Rx = Q^T b.$$

$R$ 可逆，再解上三角系統；對長方 $A$，薄型 $Q$ 是 $m \times n$。實作時 Householder QR 避免形成 $A^T A$，通常較穩定；古典 Gram–Schmidt 在近相依時可能失去正交性。

不要把 $Q^T$ 隨便消去；只有 $R^T$ 可逆或方陣 full rank 時，才可由左側出現的 matrix 相乘消去。若 $A$ 是 full column rank，$R$ 正是可逆。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## QR 最小平方數例

沿用前頁

$$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{bmatrix}.$$

取 $b = (1, 2, 0)^T$。先算

$$Q^T b = \left( \frac{3}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right)^T.$$

解 $Rx = Q^T b$。第二式給

$$\sqrt{\frac{3}{2}}\, x_2 = -\frac{1}{\sqrt{6}} \quad \Longrightarrow \quad x_2 = -\frac{1}{3}.$$

第一式為

$$\sqrt{2}\, x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \left( -\frac{1}{3} \right) = \frac{3}{\sqrt{2}},$$

故 $x_1 = 5/3$。投影為

$$p = Ax = \left( \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{1}{3} \right)^T,$$

residual 為



## QR 最小平方數例 （續）

$$e = b - p = \frac{1}{3}(-1, 1, 1)^T.$$

直接檢查

$$a_1^T e = 0, \qquad a_2^T e = 0,$$

所以 $A^T e = 0$，最小平方誤差為 $\|e\|^2 = 1/3$。這個例保留非零 residual，能實際檢查 normal equations 的正交條件，而不只是算出精確解。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 延伸：用直線逼近函數

先備知識：定積分與函數內積。令 $V = C[0,1]$，取實內積

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx, \qquad W = \operatorname{span}\{1, x\}.$$

尋找 $p(x) = c + mx \in W$，使 $\int_0^1 (e^x - p(x))^2\,dx$ 最小。這是**積分平方誤差**，不是每一點都最接近，也不是最大誤差最小。

先將 $1, x$ 正交化為 $u_1 = 1$、$u_2 = x - \frac{1}{2}$。由 $\langle u_1, u_2\rangle = 0$、$\langle u_2, u_2\rangle = \frac{1}{12}$，投影係數可分別求出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 逐項積分，算出函數投影

$$\langle e^x, 1\rangle = e - 1, \quad \langle e^x, x - \tfrac{1}{2}\rangle = \tfrac{3 - e}{2}.$$

因此

$$p(x) = (e-1) + 6(3-e)\left(x - \tfrac{1}{2}\right) = (4e - 10) + (18 - 6e)x.$$

因殘差與 $u_1, u_2$ 正交，也與它們張成的 $1, x$ 正交；對任意 $q \in W$，畢氏定理給 $\|e^x - q\|^2 = \|e^x - p\|^2 + \|p - q\|^2$，故此解唯一。

由 $\|e^x\|^2 = (e^2 - 1)/2$ 減去兩個正交分量的平方範數，得到最小誤差

$$20e - \frac{7e^2 + 57}{2} \approx 0.00394022.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 本章重點

- 投影殘差與整個子空間正交，因而得到最近點。
- 正規方程判斷最小平方；投影唯一不代表參數唯一。
- $P = P^T = P^2$；薄型 $Q$ 的 $Q^TQ = I$ 不代表 $QQ^T = I$。
- Gram–Schmidt 與 QR 保留欄空間；數值穩定性須區分實作方法。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 行列式回答什麼問題

對 square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$，determinant $\det A$ 是可定向的體積倍率，也是 invertibility indicator：

$$A \text{ invertible} \iff \det A \neq 0.$$

$2 \times 2$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

的 signed area 是 $ad - bc$。Columns 獨立時，方向決定正負；columns 共線時 area 為零。

$n$ 維時，$\det A$ 是有向體積。絕對值給 physical volume ratio，符號記錄 orientation 是否翻轉。這個數同時出現在 inverse、pivot、cofactor 與 coordinate volume formula。

Zero determinant 是 exact singularity criterion，不能直接當有限精度的 conditioning measure。第 11 章會處理 scale 與 numerical rank。



## 三個基本公理

把 determinant 視為 column-vector function

$$D(a_1, \dots, a_n).$$

它滿足：

1. Normalization：

$$D(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

2. Alternation：交換兩 columns 變號：

$$D(\dots, a_j, \dots, a_k, \dots) = -D(\dots, a_k, \dots, a_j, \dots).$$

3. Multilinearity：對每個 column separately linear：

$$D(\dots, \alpha a_j + \beta b_j, \dots) = \alpha D(\dots, a_j, \dots) + \beta D(\dots, b_j, \dots).$$

這三條公理唯一決定 determinant。將每個欄向量展成標準基底並逐欄使用多線性，重複基底的項因交錯性為零；剩下恰是標準基底的排列，值由排列符號決定，得到「Permutation formula」的排列公式。該公式也直接滿足三公理，故存在且唯一。本章固定在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；特徵 2 的體需以重複欄值為零定義交錯性，不能只靠交換變號。

## 由公理推出的 row effects

若兩個 columns 相同，交換前後是同一 matrix：

$$D = -D,$$

所以 $D = 0$。在 characteristic $\neq 2$ 的 field 中得到 repeated-column determinant 為零。

把一個 column 加上另一個 column 的倍數：

$$D(\dots, a_j + ca_k, \dots) = D(\dots, a_j, \dots) + cD(\dots, a_k, \dots).$$

第二項有兩個相同的 columns，故為 zero。因此 column addition 不改變 determinant。Row addition 的版本可由 $\det A = \det A^T$ 得到。

這也表示線性相依的欄向量必使 $\det A = 0$。任一欄可寫成其他欄的線性組合，逐次使用多線性後，每一項都含兩個相同的欄。



## Scaling、exchange 與 triangular matrices

對一個 column 乘 $\lambda$：

$$\det(\dots, \lambda a_j, \dots) = \lambda \det(\dots, a_j, \dots).$$

所以

$$\det(cA) = c^n \det A.$$

這與 n-dimensional volume 每條 edge 乘 $c$ 得 $c^n$ 倍一致。

Row exchange 乘 $-1$。Upper triangular matrix：

$$\det U = u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}.$$

上三角矩陣若有零對角項，行列式即為零；消去時的零候選主元則可能經換列解決，不代表原矩陣必然奇異。這是 elimination 與 determinant 的第一個連接。

實作列縮放與列交換時必須記錄運算，否則分解後的行列式正負號會錯。

## $\det A = \det A^T$

Permutation formula：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Transpose 後，令 $\tau = \sigma^{-1}$：

$$a_{\sigma(i),i}$$

成為 $a_{j,\tau(j)}$，且

$$\operatorname{sgn}(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

所以

$$\det A^T = \det A.$$

列運算與欄運算遵守相同的行列式規則。以下非負性要求 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$：

$$\det(A^T A) = (\det A)^2 \geq 0.$$

對任意實矩陣 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$A^T A$ 是半正定；它正定若且唯若 $\operatorname{rank} A = n$。方陣可逆時兩個條件同時成立。對複數矩陣，轉置不取共軛，平方也不再有非負次序。例如 $A = [i]$ 給 $A^T A = [-1]$，且對 $z = 1$ 有 $z^T A^T A z = -1$。

複數情形改用共軛轉置 $A^* = \overline{A}^T$：

$$\det(A^* A) = \overline{\det A} \det A = |\det A|^2 \geq 0, \qquad z^* A^* A z = \|Az\|_2^2 \geq 0.$$



## $\det A = \det A^T$ （續）

此時 $A^* A$ 是 Hermitian 半正定矩陣，且恰在 $A$ 欄滿秩時正定。長方形 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 仍有後一能量恆等式，但沒有 $\det A$ 可用，不能套用方陣的行列式乘積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 實矩陣的 Gram 矩陣

實矩陣 Gram：$A^TA$ 對稱半正定

**$A \in R^{m\times n}$，$z^TA^TAz=\|Az\|_2^2\geq 0$**

$A^TA$ 恆為對稱半正定

rank(A)=n ⇔ $A^TA$ 正定

**實方陣均滿足 $\det(A^TA)=\det(A)^2$；不需可逆。**

**A=[[1,1],[1,2]]**

det A=1

$\det(A^TA)=1^2=1$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 複數 Gram 矩陣的共軛

複數 Gram：轉置不共軛；A* = 共軛轉置

**A=[$i$]**

$A^TA=[-1]$，det=-1

z=1：$z^TA^TAz=-1$

**轉置 Gram 可能不是 PSD**

**A*=[$-i$]，A*A=[1]**

$\det(A^*A)=|\det A|^2=1$

$z^*A^*Az=\|Az\|_2^2\geq 0$

**A*A 是 Hermitian 半正定**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Product rule 與 inverse

固定 $B$，函數

$$F(A) = \det(AB)$$

對 $A$ 的 rows multilinear、alternating，且

$$F(I) = \det B.$$

任何交錯多線性函數都等於其在單位矩陣的值乘上行列式，即使該值為零也成立。因此

$$\det(AB) = \det A \det B.$$

若 $A$ invertible：

$$1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A,$$

所以

$$\det(A^{-1}) = 1/\det A.$$

若其中一個 matrix singular，乘積 rank 不足，兩側 determinant 都為 zero。

常見錯誤：$\det(A+B)$ 一般不等於 $\det A + \det B$。Determinant 是 multilinear in rows 或 columns，不是 matrix-space additive。

具體反例取 $A = I_2$、$B = \operatorname{diag}(2,3)$。則 $\det A = 1$、$\det B = 6$，但

$$\det(A+B) = \det \operatorname{diag}(3,4) = 12 \neq 1 + 6.$$



## Product rule 與 inverse (續)

多線性只允許固定其他行或列，對單一行或列拆成線性組合；它不允許把整個矩陣拆成兩矩陣之和。

## Elimination 與 pivots

若僅用列加上另一列倍數消成上三角 $U$，不做列交換或列縮放：

$$\det A = \det U = u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}.$$

做過 $q$ 次 row exchanges 時：

$$\det(PA) = (-1)^q \det A,$$

所以先算 $PA$ 的 pivot product，再乘 $(-1)^q$。

例：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Swap rows：

$$PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \det(PA) = 6.$$

故 $\det A = -6$，與 $ad - bc = 0 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -6$ 相符。

判斷 invertibility 時 rank 通常比 determinant 更直接；需要 signed volume 時才一定要保留 exchange sign。



## Elimination 與 pivots （續）

完整推論如下。若方陣 $A$ 的欄向量線性相依，至少一欄是其他欄的線性組合；逐次使用欄多線性時會出現重複欄的行列式為零，所以 $\det A = 0$。反過來，若 $\det A \neq 0$，欄向量不可能線性相依，因而構成 $\mathbb{F}^n$ 的基底（$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$），映射可逆。若 $A$ 可逆，則

$$\det A \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = 1.$$

## 消去法：兩個容易漏掉的條件

**列縮放要記帳。** 對 $A = \operatorname{diag}(2, 3)$，$\det A = 6$。若將第一列除以 2，得到 $U = \operatorname{diag}(1, 3)$，則 $\det U = 3$，必須乘回 2 才得原值。

**零候選主元不一定代表奇異。** 對 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，第一個候選主元是 0；換列後得到 $I$，一次換列給 $\det B = -1$。沒有可用的非零主元、因而秩不足時，方能判定奇異。

一般 $PA = LU$ 滿足 $\det A = \det(P)^{-1} \det L \det U$。只有 $L$ 為單位下三角矩陣時，才能省略 $\det L$；每次交換列使 $\det P$ 改變一次符號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Permutation formula

Permutation $\sigma$ 的逆序數 $N(\sigma)$ 是使 $i < j$ 但 $\sigma(i) > \sigma(j)$ 的 pairs 數：

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}.$$

Big formula：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

每一項從每條 row 與每條 column 各取一個 entry。$3 \times 3$ 展開：

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

前三個 permutations even，後三個 odd。只有 $n = 3$ 時的 Sarrus pattern 特別簡單；$n > 3$ 不能照抄。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Cofactor expansion

刪除第 $i$ row 與第 $j$ column 得 minor matrix $M_{ij}$。Cofactor：

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}.$$

沿第 $i$ row：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

沿任一 column 亦成立。

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

第一 row：

$$\det A = 2(12 - 2) - 1(-4) + 0 = 24.$$

第二 row：

$$(-1)(-4) + 3(8) + 1(-4) = 24.$$

不同 row 得到相同結果，是 cofactor formula 的結構性質。



## Cofactor formula 的推導

把第 $i$ row 展開為

$$r_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} e_j^T.$$

由 row multilinearity：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} D(A_{i \leftarrow e_j}).$$

在 $A_{i \leftarrow e_j}$ 中，第 $i$ row 只有第 $j$ column 是 1。將第 $i$ 列以 $i-1$ 次相鄰交換移到最上，再將第 $j$ 欄以 $j-1$ 次相鄰交換移到最左。第 $(1,1)$ 項為 1，第一列其餘為零；列相加消去第一欄其餘元素後，右下區塊就是 $M_{ij}$。

因此

$$D(A_{i \leftarrow e_j}) = (-1)^{i+j} \det M_{ij} = C_{ij}.$$

逐項加總就是 cofactor expansion。Checkerboard signs 來自 corridor exchanges 的 parity。

## Pivot formula 與 tridiagonal recurrence

若 pivoted elimination 得到 $PA = LU$，且 $L$ 是對角線全為 1 的下三角矩陣：

$$\det(PA) = \prod_i u_{ii},$$

$$\det A = (-1)^q \prod_i u_{ii}.$$

Leading principal minor 為零不必然 singular；可能只需 row exchange。

三對角：

$$T_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \ddots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}.$$

沿第一 row：

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \qquad n \geq 2.$$

初值 $D_0 = 1, D_1 = 2$，其中 $D_0 = 1$ 是空矩陣行列式的慣例。歸納代入 $D_{n-1} = n$、$D_{n-2} = n-1$，得到 $D_n = 2n - (n-1) = n+1$，即

$$D_n = n + 1.$$

這也證明 $T_n$ positive definite，因所有 leading minors positive。



## 區塊消去：Schur complement

令 $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$，其中 $A$ 是可逆方陣，$D$ 也是方陣，且各區塊尺寸相容。以區塊下三角矩陣消去：

$$L = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}, \qquad LM = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}.$$

$\det L = 1$，而區塊上三角矩陣的行列式是對角區塊行列式之積，因此

$$\det M = \det A \, \det(D - CA^{-1}B).$$

$D - CA^{-1}B$ 稱為對 $A$ 的 Schur complement。計算時乘法順序不可任意交換；$A$ 奇異時，此公式中的 $A^{-1}$ 未定義。

## 區塊消去的對照圖




左下角由 $-CA^{-1}A + C = 0$ 消去；右下角同時改為 $D - CA^{-1}B$。兩個對角的 identity 使 $\det L = 1$。



## 為何不能照搬純量的 $AD - BC$？

取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$、$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$、$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$、$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。

這裡 $A^{-1} = A$、$\det A = -1$，而

$$D - CA^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det M = (-1)(-2) = 2.$$

但 $AD - BC = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，其行列式為 $1$。兩個結果不同：未經證明的區塊交換會改變答案。

## Adjugate matrix

Cofactor matrix $C = [C_{ij}]$，adjugate：

$$\operatorname{adj} A = C^T.$$

Cofactor identities：

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{kj} = \begin{cases} \det A, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

當 $i \neq k$，右側是把第 $k$ row 換成第 $i$ row 的 determinant；two rows identical，故 zero。

所以

$$A(\operatorname{adj} A) = (\det A) I.$$

$\det A \neq 0$ 時：

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

$2 \times 2$：

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

大矩陣需計算 $n^2$ 個 minors，因此 adjugate 主要用於公式與小矩陣。



## Cramer's rule

若 $A$ invertible，$Ax = b$。以 $x$ 取代 $I$ 的第 $j$ column，由該欄線性與重複欄為零得：

$$x_j = \det(e_1, \ldots, e_{j-1}, x, e_{j+1}, \ldots, e_n).$$

由 $x = A^{-1}b$ 與 determinant product rule：

$$(\det A) x_j = \det(a_1, \ldots, a_{j-1}, b, a_{j+1}, \ldots, a_n).$$

所以

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A},$$

其中 $A_j$ 是把 $A$ 的第 $j$ column 換成 $b$。

例：

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

$\det A = -2$、$\det A_1 = -4$、$\det A_2 = 2$，得

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = -1.$$

## Cramer's rule 的邊界

Cramer's rule 顯示 $x_j$ 對 $b$ 是 linear 的，因 $\det A_j(b)$ 對 $b$ 的各 component linear。

但它不適合大量 numerical solve：$n$ 個 determinants 的成本遠高於一次 pivoted $LU$。$\det A$ 很小時，也不能只因 denominator 非零就宣稱結果可靠。

$\det A = 0$ 時 Cramer's rule invalid。Singular system 仍需第 2 章的 rank 與 augmented matrix 判斷：

- no solution；
- infinitely many solutions。

Determinant zero 只表示 square coefficient matrix singular，不表示 right-hand side 不相容。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Determinant 作為有向面積

令

$$u = (a, c)^T, \qquad v = (b, d)^T,$$
$$P = [u\ v] = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Parallelogram area：

$$|\det P| = |ad - bc|.$$

不取 absolute value 時，sign 由 $u \to v$ 的 orientation 決定。

若

$$u = (2, 1)^T, \qquad v = (1, 3)^T,$$

則

$$\det P = 6 - 1 = 5,$$

signed area 與 area 都是 5。

對 linear map $x \mapsto Px$：

$$\text{area}(P(S)) = |\det P| \, \text{area}(S).$$

$\det P = 0$ 時 image 最多一維，面積為 zero。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Determinant 作為有向面積 （續）

下圖把單位正方形的兩條邊 $(1,0)^T, (0,1)^T$ 送到 $u=(2,1)^T$、$v=(1,3)^T$。兩個平行四邊形面積依序為

$$|\det I| = 1, \qquad |\det P| = |2\cdot 3 - 1\cdot 1| = 5.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 有向面積與線性映射

有向面積：det([[2,1],[1,3]])=5




Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## n 維體積與 orientation

若 $a_1, \dots, a_n$ 是 box edges，以它們為 columns：

$$\text{volume} = |\det A|.$$

在 standard axes 的 unit scale 下成立；不同 units 必須先換算。

交換兩條 edges 只翻轉 orientation，signed volume 變號，physical volume 不變。把一條 edge 加上另一條的倍數是 shear，兩者都不改變。

Gaussian elimination 的 row scalings 與 exchanges 可逐步追蹤 volume；Pivot product 提供另一條計算路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Cross product 與 determinant

$\mathbb{R}^3$ 中

$$w = u \times v$$

同時垂直於 $u, v$，長度是 parallelogram area：

$$w_1 = u_2v_3 - u_3v_2,$$
$$w_2 = u_3v_1 - u_1v_3,$$
$$w_3 = u_1v_2 - u_2v_1.$$

因此

$$w^T u = 0, \qquad w^T v = 0.$$

Cross product 的 antisymmetry：

$$v \times u = -u \times v$$

正是 determinant row exchange 的 effect。

正式行列式寫法需要把 $i, j, k$ 看成 cofactor directions，不能把 symbolic basis vectors 和 scalar determinant 混為同一 field。最安全的定義是先寫三條 component formulas。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 完整 numerical example

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

第一 row cofactor expansion：

$$\det A = 1(1-3) - 2(0-6) = -2 + 12 = 10.$$

第二 column 加第一 column 的兩倍得到 $B$，determinant 仍為 10，因 column addition 是 shear。

Three columns 的 parallelepiped signed volume 是 10。交換 columns 會變號；columns dependent 時體積為 zero。

Adjugate 與 Cramer path 可交叉檢查 inverse，但 numerical implementation 不應對 large matrix 計算 $n^2$ minors。



## 本章重點

- 行列式的多線性、交錯性與單位矩陣歸一化決定其公式。
- 消去法需記錄換列與縮放；$PA = LU$ 的主元乘積須確認 $L$ 的對角線。
- 實數 Gram 矩陣用轉置，複數情況須用共軛轉置。
- 行列式非零等價於可逆；大小不能單獨當成條件數。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 5.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Eigenproblem

對 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，若存在 scalar $\lambda$ 與 nonzero vector $x$ 使

$$Ax = \lambda x,$$

則 $\lambda$ 是 eigenvalue，$x$ 是 eigenvector。

改寫：

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

因 $x \neq 0$，matrix $A - \lambda I$ 必須 singular，於是

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0.$$

幾何上，$\operatorname{span}\{x\}$ 是不變子空間：$A(\operatorname{span}\{x\}) \subseteq \operatorname{span}\{x\}$。當 $\lambda \neq 0$ 時像是整條直線；$\lambda = 0$ 時像只有零向量。負特徵值使非零向量反向。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Characteristic polynomial、trace 與 determinant

對 $n \times n$ matrix：

$$p_A(\lambda) = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

重複 eigenvalues 計次後：

$$\sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A, \qquad \prod_i \lambda_i = \det A.$$

例：

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Trace 是 6，det 是 8：

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2).$$

特徵值為 $4, 2$。對 $2 \times 2$ 矩陣，trace 和 determinant 決定特徵多項式；三階以上通常不足。例如兩組特徵值 $(1, 6, 6)$ 與 $(2, 2, 9)$ 的總和都是 13、乘積都是 36，卻不相同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Eigenvectors 在運算中的演化

若 $Ax = \lambda x$：

$$A^k x = \lambda^k x,$$
$$A^{-1}x = \lambda^{-1}x \quad (A \text{ invertible}),$$
$$q(A)x = q(\lambda)x.$$

Shift：

$$(A + cI)x = (\lambda + c)x.$$

Eigenspace：

$$E_\lambda = N(A - \lambda I).$$

它是 subspace，dimension 是 geometric multiplicity。Triangular matrix 的 diagonal entries 就是 eigenvalues，但仍要計算 multiplicity。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Algebraic 與 geometric multiplicity

Characteristic polynomial 中 root multiplicity 是 algebraic multiplicity $a_\lambda$。

$$g_\lambda = \dim N(A - \lambda I)$$

是 geometric multiplicity。取該 eigenspace 的一組基底並擴充全空間基底，矩陣成為左上 $\lambda I_{g_\lambda}$ 的區塊上三角形；特徵多項式含 $(t - \lambda)^{g_\lambda}$，故恆有

$$1 \le g_\lambda \le a_\lambda.$$

若某個 $\lambda$ 滿足 $g_\lambda < a_\lambda$，matrix defective。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 代數與幾何重數：一個反例

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Algebraic multiplicity 是 2。解

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0$$

只得到 $x_2 = 0$，故

$$E_2 = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}, \qquad g_2 = 1.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 二維完整例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$\lambda = 4$：

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $x_1 = (1,1)^T$。

$\lambda = 2$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $x_2 = (1,-1)^T$。

兩 vectors orthogonal，因 A symmetric。若

$$u_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2,$$

則

$$u_k = A^k u_0 = c_1 4^k x_1 + c_2 2^k x_2.$$

若 $c_1 \neq 0$，長期 direction 由 $\lambda = 4$ mode 支配。

取 $c_1 = c_2 = 1$，則

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 二維完整例子 （續）

$$u_0 = x_1 + x_2 = (2,0)^T, \quad u_1 = (6,2)^T, \quad u_2 = (20,12)^T.$$

圖中同時畫出 $c_1 4^k x_1$、$c_2 2^k x_2$ 與兩項相加的 $u_k$。若改取 $c_1 = 0, c_2 = 1$，得到

$$u_0 = (1,-1)^T, \quad u_1 = (2,-2)^T, \quad u_2 = (4,-4)^T,$$

軌跡始終落在 $x_2$ 的特徵方向，沒有可由較大 eigenvalue 主導的分量。使用單位特徵向量時可令 $c_1, c_2$ 取實數係數；圖採用本頁的非單位 $x_1, x_2$，係數就是其線性組合係數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 特徵模態的數值演化

特徵模態：真向量分量、和向量與軌跡




**A=[[3,1],[1,3]]**

λ₁=4 · x₁=(1,1)

λ₂=2 · x₂=(1,-1)

**藍：4²x₁=(16,16)**

**紅：2²x₂=(4,-4)**

**綠：u₂=(20,12)**

u₀,u₁,u₂=(2,0),(6,2),(20,12)

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 主導方向與初值的例外

$c_1=0$ 的例外軌跡：始終沿 $x_2=(1,-1)$




**$c_1=0$，$c_2=1$**

$u_k=2^k(1,-1)$

所有 $u_k$ 都沿同一個特徵方向。

**比例固定，並無 $4^k$ 主導項。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Complex eigenvalues 與 rotation

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1,$$

$$\lambda = e^{\pm i\theta}.$$

除非 $\theta \equiv 0 \pmod{\pi}$，rotation 沒有 nontrivial real eigenvector。

Real matrix 的 complex eigenvalues 成 conjugate pairs。若

$$Ax = \lambda x,$$

取 conjugate：

$$A\overline{x} = \overline{\lambda}\,\overline{x}.$$

若以非實共軛模態構造實解，須配對共軛項；實特徵向量產生的實模態則可單獨使用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Diagonalization

若 $A$ 有 $n$ 個線性獨立特徵向量 $x_i$：

$$X = [x_1 \ \cdots \ x_n].$$
$$AX = X\Lambda, \qquad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_i),$$
$$A = X\Lambda X^{-1}, \qquad X^{-1}AX = \Lambda.$$

充要條件是所有 eigenspace dimensions 的總和為 $n$。相異特徵值的特徵向量獨立：若最短非平凡關係 $\sum c_i x_i = 0$，施加 $A - \lambda_k I$ 消去第 $k$ 項，會產生更短關係，矛盾。因此 $n$ 個相異特徵值保證可對角化。重複特徵值也可能有完整特徵空間，例如 $2I$。

反向同樣成立。若 $A = X\Lambda X^{-1}$ 且 $X$ 可逆，把 $X$ 的欄寫成 $x_1, \dots, x_n$。由 $AX = X\Lambda$ 的第 $j$ 欄得到 $Ax_j = \lambda_j x_j$。可逆矩陣的欄線性獨立，故這些欄提供完整特徵向量基底，所有 eigenspaces 的維數和恰為 $n$。這完成兩方向的證明。



## 矩陣冪與離散時間穩定性

若 $A = X\Lambda X^{-1}$，則 $A^k = X\Lambda^k X^{-1}$。把初值寫成 $u_0 = \sum_j c_j x_j$，遞迴 $u_{k+1} = Au_k$ 的解為 $u_k = \sum_j c_j \lambda_j^k x_j$。這個特徵向量展開需要 A 可對角化。

Jordan block $J_s(\lambda) = \lambda I_s + N_s$ 是 s×s 矩陣：主對角線為 λ，緊鄰其上的對角線為 1，其餘為 0；因此 $N_s^s = 0$。一般方陣可用這些分塊判斷長期行為。對 $J = \lambda I + N$、$N^m = 0$，先假設 $\lambda \neq 0$。由二項式定理得

$$J^k = \sum_{j=0}^{\min(k,m-1)} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N^j.$$

若 $0 < |\lambda| < 1$，每個係數是至多 j 次的多項式乘指數衰減，故趨零。若 $\lambda = 0$，直接有 $J^k = 0$（$k \geq m$），不需計算負次冪。

因此 $A^k \to 0$ 當且僅當 $\rho(A) = \max_j |\lambda_j| < 1$。反向可沿特徵向量驗證：若 $|\lambda| \geq 1$，$A^k x = \lambda^k x$ 不趨零。

## 單位圓上的特徵值還要檢查什麼？

| 特徵值與 Jordan 結構 | $A^k$ 的長期行為 |
|---|---|
| 所有特徵值的模都小於 1 | 趨向零，含不可對角化矩陣 |
| 所有模皆不大於 1，單位圓上的 block 全為一階 | 有界；若有單位圓模態，就不趨零 |
| 有單位圓上的 block 大於一階 | 沿廣義特徵向量可多項式增長 |
| 至少一個特徵值的模大於 1 | 沿該特徵向量指數增長 |

例如 $I$ 保持初值；$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 卻滿足 $J^k e_2 = (k, 1)^T$。兩者的特徵值都只有 1，行為由 block 大小區分。旋轉矩陣的冪有界，但旋轉角不是 $2\pi$ 的有理倍數時，不具有共同的有限週期。

這些是長期結論。即使 $\rho(A) < 1$，仍可能在有限步內先放大；不能由特徵值直接推論歐氏範數逐步下降。



## Similarity invariants

若

$$C = B^{-1}AB,$$

則

$$C - \lambda I = B^{-1}(A - \lambda I)B,$$

所以 characteristic polynomial、eigenvalues、trace、determinant、rank 與 Jordan block structure 不變。

若 $Ax = \lambda x$，令 $y = B^{-1}x$：

$$Cy = \lambda y.$$

Similarity 改變 coordinates，不改變 intrinsic spectrum。

## Jordan chain：補足缺少的特徵向量

取 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 2I + N$。解 $(A - 2I)x = 0$ 只得到 $x_2 = 0$，故特徵空間維度是 1，A 不可對角化。令 $e_1 = (1,0)^T, e_2 = (0,1)^T$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Jordan 鏈的映射

**先分清楚：鏈上的箭頭作用的是 N，不是 A**

$$e_2=(0,1)^T \xrightarrow{N} e_1=(1,0)^T \xrightarrow{N} 0$$

$N^2e_2=0$；$Ne_2\neq 0$，因此鏈長為 2。

**對 $e_1$ 作用**

$Ae_1 = 2e_1$

特徵向量

**對 $e_2$ 作用**

$Ae_2 = e_1 + 2e_2$

廣義特徵向量；不平行於原向量

$A=2I+N$，$N=[[0,1],[0,0]]$；$(e_1,e_2)$ 是一組基底，但只有 $e_1$ 是特徵向量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Jordan block 的冪：多項式因子從哪裡來？

因 $N^2 = 0$ 且 $2I$ 與 N 可交換，二項式展開只留下兩項。對整數 $k \geq 0$，

$$A^k = 2^k I + k 2^{k-1} N = \begin{bmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{bmatrix}.$$

初值取 $u_0 = e_2$。令 $u_k = (a_k, b_k)^T$，則 $a_{k+1} = 2a_k + b_k$、$b_{k+1} = 2b_k$。所以 $b_k = 2^k$，而

$$a_k = \sum_{j=0}^{k-1} 2^{k-1-j} b_j = \sum_{j=0}^{k-1} 2^{k-1} = k 2^{k-1} \quad (k \geq 1).$$

在 $k = 0$ 時用空和給 $a_0 = 0$。每一步都有新的 $e_1$ 分量加入；累積 k 次才出現 k 因子。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 逐次乘法與閉式解必須給同一條軌跡

沿用 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$、$u_0 = e_2$。下圖的點是向量端點；每支箭頭從原點出發，並不是時間步進的連線。

核驗 $A(4,4)^T = (12,8)^T$。若誤用對角矩陣 $2I$，會得到 $(0, 2^k)^T$，整個水平分量都會遺失。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Jordan 區塊的逐步演化

同一座標尺度下追蹤 $u_k = A^k e_2$




| k | $a_k$ | $b_k$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 12 | 8 |

$a_{k+1} = 2a_k + b_k$ ； $b_{k+1} = 2b_k$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



# 由核空間維度反推出 Jordan block

設 N 為冪零矩陣（nilpotent matrix），各條鏈長為 $s_1, \dots, s_r$，令 $d_k = \dim \ker N^k$、$d_0 = 0$。每條鏈只有前 $\min(k, s_i)$ 個向量被 $N^k$ 消去。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 冪零矩陣的核維度

N 將每格送往左一格；最左一格送到 0




k=2

dim ker(N²)

=2+2+2+2+2+1

=11

每條鏈前 min(k,s) 格恰在 ker(Nᵏ) 中。

藍格是 ker(N²) 的基底向量；不同列代表不同 Jordan block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



# 核空間每增加一維，代表哪一條鏈？

每條長度至少 k 的鏈，從 $\ker N^{k-1}$ 到 $\ker N^k$ 恰多貢獻一個基底向量。因此

$$d_k - d_{k-1} = \#\{i : s_i \geq k\}, \qquad \#\{i : s_i = k\} = 2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}.$$

取 $d_0, \dots, d_6 = (0, 6, 11, 15, 18, 19, 20)$，且 $d_7 = 20$。一階差分是 $(6, 5, 4, 3, 1, 1, 0)$，再取相鄰差得長度 1 至 6 的 block 數 $(1, 1, 1, 2, 0, 1)$。故鏈長為 $6, 4, 4, 3, 2, 1$，總維度 $6 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1 = 20$。

**兩個核對點。** $d_1 = 6$ 是 block 總數；第一次達到全維度的 $d_6 = 20$ 表示最大 block 長度為 6，即 $N^6 = 0$、$N^5 \neq 0$。一般特徵值 λ 可對其廣義特徵空間上的 $N = A - \lambda I$ 使用同一方法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 從核維度到 Jordan 鏈：五階例子

考慮以下矩陣，採 $p_A(t)=\det(tI-A)$ 慣例：

$$A=\begin{bmatrix}3&6&0&0&0\\0&3&0&0&0\\0&0&-1&0&-1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&-1\end{bmatrix},\quad p_A(t)=(t-3)^2(t+1)^3.$$

若改寫成 $\det(A-tI)$，因矩陣是五階，整體多一個負號；根與區塊大小不變。

對 $\lambda=-1$，$\dim\ker(A+I)^k$ 在 $k=1,2,3$ 分別為 $2,3,3$，對應區塊大小 $2$、$1$。對 $\lambda=3$，$\dim\ker(A-3I)^k=1,2,2$，對應一個大小 $2$ 的區塊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 求出鏈向量，並核對映射




$(A+I)(-e_5)=e_3$、$(A+I)e_3=(A+I)e_4=0$；另一鏈滿足 $(A-3I)(e_2/6)=e_1$、$(A-3I)e_1=0$。因此先放特徵向量、再放廣義特徵向量，可得到上對角線為 $1$ 的 Jordan block。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 鏈的排序決定 Jordan 形式

令 $P = [e_3, -e_5, e_4, e_1, e_2/6]$。五欄彼此獨立，$\det P = 1/6 \neq 0$，所以它確實是一組基底。逐欄代入上述鏈關係可得

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}\left( \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, [-1], \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \right).$$

例如 $A(-e_5) = -(-e_5) + e_3$，因此第二欄的座標是 $(1, -1, 0, 0, 0)^T$。如果每條鏈反向排列，則 1 會落在下對角；兩種形式相似，但 $P$ 的欄順序必須跟著改。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Spectral decomposition

若 $X^{-1}$ 的 rows 是 $y_j^T$：

$$A = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j y_j^T.$$

每個 $x_j y_j^T$ 的秩為一。實對稱矩陣可選實正交矩陣 $Q$：

$$A = Q \Lambda Q^T = \sum_{j} \lambda_j q_j q_j^T.$$

沿每個 orthonormal direction 獨立縮放。Non-normal matrix 的 eigenvectors 一般不 orthogonal，單看 eigenvalues 不足以刻畫 transient amplification。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Scalar 到 matrix ODE

Scalar：

$$u' = \lambda u \quad \Longrightarrow \quad u(t) = Ce^{\lambda t}.$$

System：

$$u' = Au, \qquad u(0) = u_0.$$

若 $A$ diagonalizable：

$$u(t) = \sum_j c_j e^{\lambda_j t} x_j.$$

$$c = X^{-1} u_0.$$

$\lambda = \alpha + i\beta$ 時

$$e^{\lambda t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t).$$

Real part 控制 growth/decay，imaginary part 控制 oscillation。



## Matrix exponential

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \cdots.$$

由 $\|A^k t^k / k!\| \le (\|A\||t|)^k / k!$，在任一有界的 $t$ 區間，原級數與導數級數都一致收斂，因此可逐項求導：

$$\frac{d}{dt} e^{At} = Ae^{At} = e^{At} A.$$

Diagonalizable：

$$e^{At} = X e^{\Lambda t} X^{-1} = \sum_j e^{\lambda_j t} x_j y_j^T.$$

Defective $A = 2I + N$、$N^2 = 0$：

$$e^{At} = e^{2t}(I + tN).$$

此解對所有方陣成立。若另一個函數 $u$ 滿足 $u' = Au$，則 $\frac{d}{dt}(e^{-At}u) = 0$，所以 $u(t) = e^{At}u(0)$，同時得到存在與唯一性。長期穩定性由下面的特徵值與 Jordan 結構判斷；非正規暫態放大則另需範數或 resolvent 資訊。

## Stability 與完整例子

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Use eigenbasis：

$$u(t) = c_1 e^{4t}(1,1)^T + c_2 e^{2t}(1,-1)^T.$$

兩 eigenvalues 都正，每個非零初始向量的解皆增長。

一般線性系統的零解漸近穩定，若且唯若所有特徵值的實部皆負。對大小 $m$ 的 Jordan 分塊 $J = \lambda I + N$，有 $e^{Jt} = e^{\lambda t}\sum_{\ell=0}^{m-1} t^\ell N^\ell/\ell!$。實部為負時，每個有限次多項式乘衰減指數都趨零；若有實部為正的特徵值，沿其模態便不穩定。

邊界也可精確區分：若所有實部非正，且虛軸上各特徵值的 Jordan 分塊皆為一階，則 $e^{At}$ 有界，零解 Lyapunov 穩定，但只要還有虛軸模態，就不漸近穩定。例：$A = 0$ 的解保持初值；反對稱旋轉矩陣的解保持長度。相反地，$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 給 $e^{Jt} = I + tJ$，初值 $e_2$ 產生 $(t,1)^T$，故有實部為零的重根仍可能不穩定。這是純線性系統的結論，不需引入未給定的非線性模型。



## 漸近穩定，範數仍可能先上升

取 $B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$、$u_0 = (1,1)^T/\sqrt{2}$。兩個特徵值都是 −1，但

$$u(t) = e^{-t}\frac{1}{\sqrt{2}}(1+4t,1)^T, \qquad g(t) = \|u(t)\|_2 = e^{-t}\sqrt{\frac{(1+4t)^2+1}{2}}.$$

令 $h(t) = g(t)^2$。直接微分得

$$h'(t) = e^{-2t}\{4(1+4t) - (1+4t)^2 - 1\}, \qquad h'(0) = 2 > 0.$$

所以此單位初值確實先放大。令 $z = 1+4t$，方程 $h'(t) = 0$ 給 $z^2 - 4z + 1 = 0$。在 $t \ge 0$ 只取 $z = 2+\sqrt{3}$，得 $t_* = (1+\sqrt{3})/4 \approx 0.683$、$g(t_*) \approx 1.379$。但所有分量最後仍因 $te^{-t} \to 0$ 而衰減。

## 同一組特徵值，為什麼曲線不同？

比較 B 與 $C = -I$，兩者都從同一個單位向量 $u_0 = (1,1)^T/\sqrt{2}$ 出發。C 的範數恰為 $e^{-t}$；B 的非對角項使第二個分量持續注入第一個分量。

圖上峰值屬於**指定初值**的 $\|e^{Bt}u_0\|_2$，不是對所有初值取最大值的 $\|e^{Bt}\|_2$。例如初值換成 $e_1$，B 的解也只會以 $e^{-t}$ 衰減。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 暫態放大與長期衰減

同樣的特徵值 −1、−1；同一單位初值，範數仍可先增大







B 的軌跡；虛線是單位圓

兩軸每單位長度相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 用對稱部分判斷所有初值是否單調收縮

對實系統 $u' = Bu$，

$$\frac{d}{dt}\|u\|_2^2 = u^T(B + B^T)u = 2u^T H u, \qquad H = (B + B^T)/2.$$

對每個初值，範數都不增加，當且僅當 $H \preceq 0$。充分性直接沿每條解使用上式；必要性在 $t = 0$ 讓初值遍取所有向量，即得二次型非正。複數版把轉置改為共軛轉置。

本例 $H = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$，特徵值是 1、−3。$u_0 = (1,1)^T/\sqrt{2}$ 對應正特徵值 1，所以初始能量導數為 2。第 8 題的三階矩陣，其 H 的最大特徵值卻是 $-1 + \sqrt{2}/2 < 0$，所有非零解都嚴格收縮。**不可對角化或非正規，都不等於一定會暫態放大。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 二階 ODE 轉一階系統

$$u'' + Bu' + Cu = 0.$$

令 $v = u'$：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -C & -B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

Characteristic polynomial：

$$\det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -C & -B - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + B\lambda + C.$$

Complex conjugate eigenvalues 給振盪；real part 決定 decay。Initial condition $(u(0), u'(0))$ 變成二維 vector initial data。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 實對稱矩陣的實特徵值

令 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$S = S^T$，並取非零特徵向量 $x \in \mathbb{C}^n$，使 $Sx = \lambda x$。實係數與對稱性共同給 $S^* = \overline{S}^T = S$。使用共軛轉置：

$$x^* S x = \lambda x^* x.$$

因為

$$\overline{x^* S x} = x^* S^* x = x^* S x,$$

左端 real。又 $x^* x > 0$，所以

$$\lambda = \frac{x^* S x}{x^* x} \in \mathbb{R}.$$

第一個等號是純量取共軛的規則，第二個等號使用 $S^* = S$，不能僅由複數矩陣的 $S^T = S$ 推出。分母 $x^* x = \sum_j |x_j|^2 > 0$，所以實性結論成立。

反例 $S = [i]$ 滿足 $S^T = S$，但 $S^* = [-i] \neq S$，唯一特徵值為 $i$。複數空間的正確前提是 Hermitian（厄米）條件 $S^* = S$；同一證明給實特徵值，且分解使用酉矩陣 $U$：$S = U\Lambda U^*$。



## 實對稱矩陣與實特徵值

正交特徵基：$Q^TSQ=\mathrm{diag}(4,2)$




**S=[[3,1],[1,3]]**

**Q=(1/√2)[[1,1],[1,-1]]**

$Q^TSQ=\mathrm{diag}(4,2)$

$S=Q\Lambda Q^T$；兩軸互相垂直。

未正規化 (1,1),(1,-1) 只能當方向，不能直接稱 Q。

## 複對稱與 Hermitian 的區別

普通複對稱不等於 Hermitian

**S=[$i$]，$S^T$=S**

唯一 eigenvalue=i

S*=[-$i$]≠S

**缺 Hermitian 前提會失敗。**

**Hermitian：S*=S**

x*Sx=λx*x

x*x>0 ⇒ λ∈R

**S=UΛU*，U 為酉矩陣**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 不同 eigenspaces 正交

本頁先限定 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為實對稱矩陣，並選實特徵向量 $x, y$。若 $Sx = \lambda x$、$Sy = \mu y$：

$$\lambda x^T y = (Sx)^T y = x^T S^T y = \mu x^T y.$$

因此

$$(\lambda - \mu) x^T y = 0.$$

$\lambda \neq \mu$ 時 $x \perp y$。完整正交特徵基底可用歸納證明：單位球上連續的 $x^T S x$ 有最大值，其極值條件給實單位特徵向量 $q$；對 $v \perp q$，$q^T S v = (Sq)^T v = 0$，故 $q^\perp$ 在 $S$ 下不變。限制到此較低維空間仍對稱，反覆歸納得到完整正交特徵基底。重複特徵空間內可用 Gram-Schmidt。

Spectral theorem：

$$S = Q \Lambda Q^T.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

例：

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因 $Q^T Q = I$，且

$$Q^T S Q = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

所以 $S = Q \Lambda Q^T$。未正規化的 $(1,1)^T, (1,-1)^T$ 只描述特徵方向；若要直接寫成 $Q$，必須先除以 $\sqrt{2}$。

## Positive definite 等價判準

Real symmetric $S$ positive definite，若下列任一成立且全部等價：

1. $x^T S x > 0$ 對所有 $x \neq 0$；
2. 所有 eigenvalues positive；
3. 所有 leading principal minors positive；
4. 不交換列的對稱消去中所有 pivots positive；
5. 存在 full column rank $A$ 使 $S = A^T A$；
6. 存在對角元素為正的可逆下三角矩陣 $R$，使 $S = RR^T$（Cholesky）。

各判準的連接：對稱消去是配方法，給 $S = LDL^T$，而 $x^T S x = (L^T x)^T D (L^T x)$，故正主元與正能量等價。前 $k$ 階主子式 $\Delta_k = d_1 \cdots d_k$，所以主子式全正等價於主元全正。取 $R = LD^{1/2}$ 得 Cholesky，亦可取 $A = R^T$；反向由平方長度證正能量。只知 $\det S > 0$ 仍不足，例如 $-I_2$ 的行列式為 1 卻負定。



## 二階矩陣的正定性檢查

$2 \times 2$：

$$S = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

positive definite，若且唯若 $a > 0, ac - b^2 > 0$。

例如 $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的主子式為 2、3，特徵值為 1、3，故正定。相對地 $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的行列式為 $-3$，故不正定。

## Energy 證明與反例

$$x^T S x = \sum_i \lambda_i (q_i^T x)^2.$$

所有 $\lambda_i > 0$ 時，任何 $x \neq 0$ 至少有某個 $q_i^T x \neq 0$，故 energy positive。反之，若有 $\lambda_i \leq 0$，取相應的非零特徵向量，能量便為負或零，都不滿足嚴格正定。

反例：

$$S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

eigenvalues $3, -1$，not positive definite。

若 $A$ 的 columns independent：

$$x^T A^T A x = \|Ax\|^2 > 0$$

對 $x \neq 0$ 成立，故 $A^T A$ positive definite。Full row rank 不能替代 column independence。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Positive semidefinite boundary

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$x = (1, -1)^T$ 給 $x^T S x = 0$，eigenvalues $2, 0$。所以 positive semidefinite，不是 positive definite。

若 $S = A^T A$，columns dependent 時存在 $x \neq 0$ 使 $Ax = 0$，故 $x^T S x = 0$。反之，energy zero 也給 $Ax = 0$。

Semidefinite matrix 可有 $LDL^T$，但若要做 Cholesky，需 handling zero pivots。Pseudoinverse 不能讓 semidefinite boundary system 變成 arbitrary inverse。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Ellipse 與 conditioning

Positive definite $S$：

$$x^T S x = 1$$

是以 origin 為中心的 ellipsoid。Eigen-coordinates：

$$y = Q^T x,$$
$$\sum_i \lambda_i y_i^2 = 1.$$

第 $i$ 個半軸長度：

$$1/\sqrt{\lambda_i}.$$

Longest axis 對應 smallest eigenvalue。

$$\kappa_2(S) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}.$$

Positive definite 只保證 exact inverse；很小的 $\lambda_{\min}$ 仍造成 ill-conditioning。



## 本章重點

- 特徵值的代數重數和特徵空間維度共同決定可否對角化。
- Jordan 鏈說明廣義特徵向量與冪次中的多項式因子。
- 長期穩定不排除暫態放大；須區分單一初值和算子範數。
- 實對稱矩陣與複數 Hermitian 矩陣分別使用轉置與共軛轉置。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 6.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# SVD：替輸入與輸出各選一組好座標

矩陣不必是方陣，也不必可逆。奇異值分解（singular value decomposition, SVD）把線性映射拆成**換輸入座標、沿軸伸縮、換輸出座標**三步。

| 要回答的問題 | 本章使用的量 | 必須分清的對象 |
|---|---|---|
| 哪個單位方向放大最多？ | 最大奇異值 | 輸入方向與輸出方向 |
| 只保留 k 個方向會錯多少？ | 截斷 SVD 與兩種誤差範數 | 最壞方向與誤差平方和 |
| 資料最分散在哪裡？ | 中心化資料的 PCA | 主方向、分數與變異數 |
| 方程無解或多解時選哪個？ | 偽逆與最小範數解 | 最小殘差與最小解長度 |

先備知識：正交投影、實對稱矩陣的譜定理、秩與零度。除另有註明，本章推導使用實數。複數版除將轉置改為共軛轉置，係數平方也要改成模平方，內積須採 Hermitian 內積。



# 外積：把一個輸入方向送到一個輸出方向

令非零向量 $u \in \mathbb{R}^m, v \in \mathbb{R}^n$。外積 $uv^T$ 的第 i 個 row、第 j 個 column 元素是 $u_i v_j$，而對任意輸入 x，

$$(uv^T)x = u(v^T x).$$

先以內積 $v^T x$ 取得一個係數，再把它乘上 u。**所有輸出都落在同一條直線**，所以秩為 1；若 u 或 v 為零，秩則是 0。

例如 $u = (1,2)^T, v = (1,1)^T$，則 $uv^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$，輸入 $x = (3,-1)^T$ 得 $(2,4)^T$。輸入 $(1,-1)^T$ 的內積為零，會被送到原點。

灰階影像也可視為矩陣，元素代表像素強度。SVD 將矩陣寫成多個外積的加權和；保留少數項能否壓縮，取決於資料與容許誤差。

## 完整與精簡 SVD：先核對每個因子的尺寸

對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，令 $r = \operatorname{rank} A$、$q = \min(m,n)$。完整分解為 $A = U\Sigma V^T$，其中 U、V 為正交方陣。

| 形式 | U 或 $U_r$ | Σ 或 $\Sigma_r$ | $V^T$ 或 $V_r^T$ |
|---|---|---|---|
| 完整 full | m×m | m×n | n×n |
| 本章精簡 reduced | m×r | r×r | r×n |

Σ 僅對角線可能非零；q 個奇異值依 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ 排列，其餘為零。精簡式只保留正奇異值，滿足 $U_r^T U_r = V_r^T V_r = I_r$。

**不要把精簡因子當成正交方陣**：$U_r U_r^T$ 通常是投影矩陣，不是 $I_m$。有些介面以 thin 表示保留 q 個方向，包括零奇異值；應直接核對尺寸。r=0 時 A=0，精簡式視為空和。



## 先找右奇異向量：對稱矩陣提供正交基底

$A^T A$ 是 n×n 的實對稱半正定矩陣，因為 $x^T A^T A x = \|Ax\|^2 \geq 0$。譜定理給一組完整標準正交特徵基底 $v_1, \ldots, v_n$：

$$A^T A v_i = \lambda_i v_i, \qquad \sigma_i = \sqrt{\lambda_i}.$$

對正特徵值，$\|Av_i\|^2 = \lambda_i = \sigma_i^2$，所以 $Av_i \neq 0$。對零特徵值，這個平方長度為零，故 $Av_i = 0$。這也證明 $N(A^T A) = N(A)$，所以正特徵值恰有 r 個。前 r 個 $v_i$ 張成 row space $C(A^T)$，其餘張成零空間。**奇異值是 $\lambda_i$ 的平方根，不是 $\lambda_i$ 本身。**

## 再找左奇異向量：輸出除以伸縮倍率

對 $1 \le i \le r$，定義 $u_i = Av_i/\sigma_i$。它的長度是 1；任意 i、j 滿足

$$u_i^T u_j = \frac{v_i^T A^T A v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \frac{\sigma_j^2 v_i^T v_j}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij}.$$

因此 $u_1, \dots, u_r$ 標準正交，並且 $Av_i = \sigma_i u_i$。它們都在 $C(A)$ 中，數量又等於秩，所以構成 column space 的基底。

將它們補成 $\mathbb{R}^m$ 的標準正交基底 U。補上的向量垂直於 $C(A)$，恰屬於左零空間 $N(A^T)$。

$\sigma_i = 0$ 時不能使用除法公式。**右側的零方向用 $Av_i = 0$ 處理；左側缺少的方向則用正交補齊。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 為何這些向量真的給出 A？

把任意輸入展開成 $x = \sum_{j=1}^{n} c_j v_j$。正奇異值方向照比例送到 $u_j$，零空間方向消失：

$$Ax = \sum_{j=1}^{r} c_j \sigma_j u_j = U\Sigma V^T x.$$

等式對所有 x 成立，因此 $A = U\Sigma V^T$。它不需要 A 可逆，也不需要 m=n。

兩個 Gram 矩陣由此得到 $A^T A = V\Sigma^T \Sigma V^T$、$AA^T = U\Sigma\Sigma^T U^T$。正特徵值都是 $\sigma_i^2$，零特徵值重數分別為 n−r 與 m−r。

數值計算通常直接使用穩定的 SVD 程序。明算 $A^T A$ 會使滿 column rank 問題的二範數條件數平方，也可能造成上溢；上面的構造是存在性證明，並非建議的浮點計算法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 外積展開：誤差平方為何可以逐項相加？

精簡 SVD 等價於 $A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T$。Frobenius 內積與範數定義為

$$\langle B, C \rangle_F = \operatorname{tr}(B^T C) = \sum_{ij} B_{ij} C_{ij}, \qquad \|B\|_F^2 = \sum_{ij} B_{ij}^2.$$

由 $\langle u_i v_i^T, u_j v_j^T \rangle_F = (u_i^T u_j)(v_i^T v_j) = \delta_{ij}$，各外積是標準正交的「矩陣方向」，所以

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2.$$

A≠0 時，前 k 項保留的平方和比例是 $\sum_{i \le k} \sigma_i^2 / \sum_{i \le r} \sigma_i^2$。這個能量比例不是影像觀感或任務準確率。核範數 $\|A\|_* = \sum_i \sigma_i$ 使用另一種加總，不能與 Frobenius 範數混用。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 截斷 SVD：保留哪些方向，捨棄哪些誤差？

設實矩陣 A 的秩為 r，奇異值依大小排列。限制近似矩陣的秩至多 k，先考慮 $1 \le k < r$。截斷 SVD 保留前 k 個項：

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^T, \qquad E = A - A_k = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i u_i v_i^T.$$

每個被保留的方向滿足 $A_k v_i = A v_i$；被刪方向則有 $A_k v_i = 0$，故誤差沿該方向為 $E v_i = \sigma_i u_i$。這給出一個候選答案，還沒有證明任意其他秩 k 矩陣都不能更好。

以下固定 $A = \operatorname{diag}(9, 4, 1)$、k=1，則 $A_1 = \operatorname{diag}(9, 0, 0)$、$E = \operatorname{diag}(0, 4, 1)$。先弄清兩種誤差怎麼量，再分別證明它們的下界。此處 $u_i = v_i = e_i$，一般矩陣的左右方向則可能不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 同一個誤差矩陣，兩種範數各在量什麼？

對 $E = \mathrm{diag}(0, 4, 1)$，三個標準單位方向的誤差如下：

| 單位輸入 | 誤差輸出 | 長度平方 |
|---|---|---|
| $e_1$ | 0 | 0 |
| $e_2$ | $4e_2$ | 16 |
| $e_3$ | $e_3$ | 1 |

Spectral norm（矩陣二範數）問：**所有單位輸入中，最大的誤差有多長**？若 $\|x\| = 1$，

$$\|Ex\|^2 = 16x_2^2 + x_3^2 \le 16(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = 16.$$

取 $x = e_2$ 達等號，所以 $\|E\|_2 = 4$。Frobenius norm 則將各欄誤差平方相加：$\|E\|_F^2 = 0 + 16 + 1 = 17$，故 $\|E\|_F = \sqrt{17}$。它不是另一個「最大單位輸出長度」。



## 誤差橢圓：$\sqrt{17}$ 為什麼不是最長半軸？




因 $Ev_1 = 0$，三維單位球先在 v₂、v₃ 平面投成單位圓盤，經 E 後成為圖中的橢圓盤。最長輸出半軸是 4。紅點的輸入是 $v_2 + v_3$，長度為 $\sqrt{2}$，輸出長度雖為 $\sqrt{17}$，卻不符合二範數「輸入長度為 1」的條件。正規化後的輸出長度為 $\sqrt{17/2} < 4$。

## 二範數下界：k 個方向，無法保住 k+1 維

讓 B 是任意秩至多 k 的近似，不要求與 A 共享奇異向量。取 $S = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$。B 限制在 S 上的秩至多 k，由秩與零度定理，存在單位向量 $z \in S$ 使 $Bz = 0$。

寫 $z = \sum_{i=1}^{k+1} c_i v_i$，其中 $\sum_i c_i^2 = 1$。左奇異向量正交，故

$$\|(A - B)z\|^2 = \|Az\|^2 = \sum_{i=1}^{k+1} \sigma_i^2 c_i^2 \geq \sigma_{k+1}^2.$$

因此 $\|A - B\|_2 \geq \sigma_{k+1}$。本例即使取非對角的 $B = \begin{bmatrix} 9 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，仍可用 $z = (1, -1, 0)^T/\sqrt{2}$：$Bz = 0$，而 $\|Az\|^2 = (81 + 16)/2 = 97/2 \geq 16$。下界不是只檢查對角候選矩陣所得。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Frobenius 下界：先把每一欄誤差拆成直角

令 P 為投影到 $C(B)$ 的正交投影。對每一欄 $a_j, b_j$，有 $Pb_j = b_j$，所以

$$a_j - b_j = (I - P)a_j + (Pa_j - b_j).$$

第一項垂直於 $C(B)$，第二項在 $C(B)$ 內。逐欄用畢氏定理，再相加：

$$\|A - B\|_F^2 = \|(I - P)A\|_F^2 + \|PA - B\|_F^2 \geq \|(I - P)A\|_F^2.$$

這與向量投影的道理相同：先找到最近的投影點；若還選子空間裡別的點，就會多一段平方誤差。又因 P 與 I−P 正交互補，

$$\|(I - P)A\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \|PA\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 - \operatorname{tr}(PAA^T).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 同一欄的投影圖：45 = 81/2 + 9/2




藍色：子空間外的誤差；綠色：子空間內的誤差

同一欄，畫在前兩個座標的平面

a₁=(9,0,0), b₁=(6,6,0)

p₁=Pa₁=(9/2,9/2,0)

a₁−b₁ = (a₁−p₁) + (p₁−b₁)

a₁−p₁ ⊥ p₁−b₁

45 = 81/2 + 9/2

本圖取 $C(B)=\operatorname{span}\{(1,1,0)^T\}$，$a_1=(9,0,0)^T$、$b_1=(6,6,0)^T$，投影 $p_1=Pa_1=(9/2,9/2,0)^T$。所以 $a_1-b_1=(3,-6,0)^T$，拆成 $(9/2,-9/2,0)^T+(-3/2,-3/2,0)^T$。兩項內積為零，平方長度恰為 $45=81/2+9/2$。這只是一欄的分解；Frobenius 誤差還要對全部欄相加。



# 投影最多能留下多少平方和？

將左奇異向量補成 $\mathbb{R}^m$ 的正交單位基底，對 i>r 設 $\sigma_i=0$。令 $\alpha_i=u_i^TPu_i=\|Pu_i\|^2$，則

$$0\le\alpha_i\le1,\qquad\sum_{i=1}^{m}\alpha_i=\operatorname{tr}P=\operatorname{rank}P\le k.$$

可把 $\alpha_i$ 想成分給方向 i 的投影額度：每方向至多 1，總額至多 k。較大的 $\sigma_i^2$ 每單位額度貢獻較多。本例取 k=1，沿用前頁的投影：

| 方向 | $\sigma_i^2$ | 額度 $\alpha_i$ | 留下的平方和 |
|---|---|---|---|
| $u_1=e_1$ | 81 | 1/2 | 81/2 |
| $u_2=e_2$ | 16 | 1/2 | 8 |
| $u_3=e_3$ | 1 | 0 | 0 |

總額度為 1，卻只留下 $97/2$，小於全部分給第一方向的 81。投影到任意其他一維子空間也不能超過 81；下一頁證明一般 k 的上界。

## 將「保留最大的 k 項」寫成完整不等式

沿用 $0 \le \alpha_i \le 1$、$\sum_i \alpha_i \le k$。前 k 項的奇異值至少為 $\sigma_k$，其餘至多為 $\sigma_k$，因此：

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(PAA^T) &= \sum_{i=1}^{m} \sigma_i^2 \alpha_i \\ &\le \sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2 \alpha_i + \sigma_k^2 \sum_{i=k+1}^{m} \alpha_i \\ &\le \sum_{i=1}^{k} \left[\sigma_i^2 \alpha_i + \sigma_k^2 (1-\alpha_i)\right] \le \sum_{i=1}^{k} \sigma_i^2.\end{aligned}$$

依序使用：尾端奇異值不大於 $\sigma_k$、總額度不超過 k、以及 $\sigma_i^2 \ge \sigma_k^2$ 與 $0 \le \alpha_i \le 1$。代回逐欄畢氏下界，得到 $\|A-B\|_F^2 \ge \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2$。



## Eckart–Young：截斷同時達到兩種下界

對所有秩至多 k 的 B，前兩個證明已給下界；截斷 SVD 的誤差 E 恰有被刪的奇異值，因此同時達等號：

$$\min_{\operatorname{rank} B \le k} \|A-B\|_2 = \sigma_{k+1}, \qquad \min_{\operatorname{rank} B \le k} \|A-B\|_F^2 = \sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2.$$

| 本例 $A = \operatorname{diag}(9,4,1)$ | 二範數最小誤差 | Frobenius 最小誤差 |
|---|---|---|
| k=0，只能取 B=0 | 9 | $\sqrt{98}$ |
| k=1 | 4 | $\sqrt{17}$ |
| k=2 | 1 | 1 |
| k≥3，可取 B=A | 0 | 0 |

證明主體使用 $1 \le k < r$。k=0 時不用 $\sigma_k$；直接取唯一的秩零矩陣。k≥r 時誤差為零。多補一個零奇異值也不改變結果，所以原先 9、4、1、0 的例子仍有相同的 k=1、2、3 誤差。

## 最優矩陣是否唯一，要先說使用哪種範數

仍取 A=diag(9,4,1)，考慮 $B_c = \mathrm{diag}(c, 0, 0)$。只要 $5 \le c \le 13$，它的秩為 1，而且

$$\|A - B_c\|_2 = \max\{|9 - c|, 4, 1\} = 4.$$

這整族都達到全域二範數下界。雖然 $9 > 4$ 有嚴格間隔，最佳矩陣仍不唯一。另一方面，

$$\|A - B_c\|_F^2 = (9 - c)^2 + 17$$

在這族中只於 c=9 最小。一般而言，$1 \le k < r$ 且 $\sigma_k > \sigma_{k+1}$ 時，Frobenius 最佳矩陣確實唯一：跡上界取等迫使前 k 個 $\alpha_i = 1$、其餘為 0；而畢氏等式也迫使 B=PA，故 B=$A_k$。若截斷切過正奇異值的相等區段，可在該完整奇異子空間內選不同保留方向；完整子空間固定，選入的部分可以不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 同一族候選矩陣，兩種目標畫成曲線




兩圖使用同一組 $B_c$，只改變評分方式。左圖一整段水平，是因為被捨棄的第二方向已造成誤差 4；第一方向只要不超過它，就不再改變最大值。右圖仍計入第一方向的平方誤差，所以只有 c=9 最佳。圖只展示這一族，沒有宣稱列盡所有二範數最優矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 低秩儲存：先算清楚是否真的比較省

保留 k 個奇異值及左右向量，直接儲存需要 $mk + nk + k = k(m + n + 1)$ 個數；原矩陣需要 mn 個數。這是因子表示的儲存量，不是秩 k 矩陣的獨立自由度。

| 1000×1000 矩陣 | 數值個數 | 占原矩陣比例 |
|---|---|---|
| 原始元素 | 1,000,000 | 100% |
| k=10 因子 | 20,010 | 2.001% |
| k=500 因子 | 1,000,500 | 100.05% |

因此只有 $k(m + n + 1) < mn$ 時，這種表示的數值個數才減少。實際檔案還有精度、標頭與索引成本；誤差則要由被捨棄的奇異值另外核對。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## PCA：先固定資料方向，再減掉平均

本章固定 $A_0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$：**每個 row 是一項變數，每個 column 是一筆樣本**。第 j 個變數的平均為 $\mu_j = n^{-1} \sum_{s=1}^{n} (A_0)_{js}$，中心化資料為 $A = A_0 - \mu \mathbf{1}^T$。

每個 row 的和變成零，即 $A\mathbf{1} = 0$。若 n≥1，這也給 $\operatorname{rank} A \leq \min(m, n - 1)$。

對單位方向 u，所有樣本的投影座標為 $u^T A$，平方和是 $u^T A A^T u$。寫成左奇異向量基底後，

$$u^T A A^T u = \sum_i \sigma_i^2 c_i^2 \leq \sigma_1^2 \sum_i c_i^2 = \sigma_1^2.$$

第一主方向可取 $u_1$。它使中心化資料的投影平方和最大；主方向的正負可以相反，所代表的直線相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 同一組資料：主方向、分數與變異數

取三筆已中心化的樣本 $(-1,-1),(0,1),(1,0)$。令

$$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix},\qquad AA^T=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}.$$

特徵方程是 $(2-\lambda)^2-1=0$，得 3、1。對應的單位方向為 $u_1=(1,1)^T/\sqrt{2}$、$u_2=(1,-1)^T/\sqrt{2}$，奇異值為 $\sqrt{3}$、1。

| 樣本 $a_s$ | 分數 $u_1^Ta_s$ | 分數 $u_2^Ta_s$ |
|---|---|---|
| (−1,−1) | $-\sqrt{2}$ | 0 |
| (0,1) | $1/\sqrt{2}$ | $-1/\sqrt{2}$ |
| (1,0) | $1/\sqrt{2}$ | $1/\sqrt{2}$ |

兩個分數 row 都和為零，平方和分別為 3 與 1。以 n−1=2 為分母，主成分樣本變異數是 3/2、1/2；第一方向解釋比例為 3/4。



## PCA 圖解：投影點與捨棄的垂直誤差







第一主軸為 y=x。三個投影依序是 $(-1,-1),(1/2,1/2),(1/2,1/2)$；後兩筆投影重合，但殘差分別是 $(-1/2,1/2)$、$(1/2,-1/2)$。殘差平方和為 0+1/2+1/2=1。

右圖使用分數 $s_1=u_1^Ta, s_2=u_2^Ta$ 當座標，第一主軸成為水平軸。**這是整組正交換座標，不是改變點之間的距離。**

## 最大投影變異，等價於最小垂直誤差

任取單位方向 u。每個樣本都有正交分解 $a_s = uu^T a_s + (I - uu^T)a_s$，逐筆用畢氏定理後相加：

$$\sum_s \|(I - uu^T)a_s\|^2 = \|A\|_F^2 - \|u^T A\|^2.$$

左側是點到過原點直線 span(u) 的**垂直距離平方和**。右側第一項固定，因此最大化投影平方和就最小化殘差；本例為 4−3=1。原始資料未中心化時，最佳仿射直線可取 $\mu + \text{span}(u_1)$。

這與固定橫座標、只最小化垂直於 x 軸方向誤差的直線迴歸不同。一般而言，改用後者就改了最佳化問題，不能直接使用同一張殘差圖。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 分母與單位：哪些改變方向，哪些只改變倍率？

| 運算 | 共變異數 | 主方向的影響 |
|---|---|---|
| 樣本分母 n−1，n≥2 | $AA^T/(n-1)$ | 特徵值為 $\sigma_i^2/(n-1)$ |
| 描述資料的分母 n | $AA^T/n$ | 方向相同，特徵值整體縮放 |
| 各變數除以自己的標準差 | $DAA^T D/(n-1)$ | 通常改變主方向與幾何 |

若第二個變數改用小 100 倍的單位，其數值放大 100 倍，共變異數的第二對角元素放大 10,000 倍、交叉項放大 100 倍。PCA 會因此偏重第二座標。

標準化可消除單位尺度造成的差異，卻也會改變原本的距離與誤差目標。零變異數的變數不能直接除以零；n=1 時樣本共變異數亦無定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 分數的符號與相等奇異值

完整分數矩陣為 $S = U^T A = \Sigma V^T$，尺寸 m×n。精簡分數則是 $S_r = U_r^T A = \Sigma_r V_r^T$，尺寸 r×n。第 i 個分數 row 的平方和**恰等於** $\sigma_i^2$。

同時將 $u_i, v_i$ 改號，外積 $\sigma_i u_i v_i^T$ 不變；分數 row 改號，重建乘回去仍相同。只改其中一個向量則會改變 A。

若某區段的奇異值相同，可在該完整奇異子空間內一起旋轉左右基底，A 仍不變。可辨識的是子空間；其中的個別軸不一定唯一。截斷切過相等區段時，選入的較小子空間也可能不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 奇異向量如何決定橢圓的軸

取 $V = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$、$U = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$、$\Sigma = \mathrm{diag}(3, 2)$。兩個正交因子給

$$A = U\Sigma V^T = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 12 & -1 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}.$$

先以 $V^T$ 將 $v_i$ 送到 $e_i$，再伸縮，最後以 U 改變輸出方向。圓集合旋轉後外觀相同，但標記的向量方向會變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 同尺度對照：半軸向量是 $\sigma_i u_i$

SVD：輸入方向 → 標準座標 → 伸縮 → 輸出方向




$Av_1 = (9/5, 12/5)^T = 3u_1$，$Av_2 = (-8/5, 6/5)^T = 2u_2$。圖中半軸長為 3、2；單位向量 $u_i$ 只決定方向。本例滿秩，單位圓的像是橢圓邊界，單位圓盤的像則填滿橢圓。



## 追蹤一個不沿奇異方向的單位向量

沿用前例的 $U, V, \Sigma$，取 $x = (1, 0)^T$。這個 x 不是 $v_1$ 或 $v_2$。綠色箭頭追蹤同一點，背景曲線是單位圓在各步的像。




四面板同尺度；綠色向量追蹤同一個輸入的逐步變化。

## 算值與長度變化要分開核對

| 步驟 | 代入後的座標 | 範數平方 |
|---|---|---|
| 輸入 x | (1,0) | 1 |
| $V^Tx$ | (4/5,−3/5) | 1 |
| $\Sigma V^Tx$ | (12/5,−6/5) | 36/5 |
| $U\Sigma V^Tx=Ax$ | (12/5,6/5) | 36/5 |

$V^T$、$U$ 只改變方向；伸縮由 $\Sigma$ 產生。本例 $\|Ax\| = 6/\sqrt{5}$，不是任何一個奇異值。

對任意單位輸入，令 $w = V^Tx$，則 $w_1^2 + w_2^2 = 1$，且

$$\|Ax\|^2 = 9w_1^2 + 4w_2^2 = 4 + 5w_1^2 \in [4, 9].$$

所以 $2 \le \|Ax\| \le 3$；上界在 $x = \pm v_1$ 取到，下界在 $x = \pm v_2$ 取到。這是對所有單位輸入的證明，不是由單一數例推論。



## 直角旋轉：把數值接回幾何

令 V=I、Σ=diag(3,2)、$U = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，所以 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$。

| 階段 | 座標作用 | 幾何結果 |
|---|---|---|
| $V^T$ | $(x_1,x_2)$ 不變 | 輸入方向與標準軸重疊 |
| $\Sigma$ | $(3x_1,2x_2)$ | 半軸長 3、2 |
| $U$ | $(-2x_2,3x_1)$ | 將橢圓旋轉 90° |

此時 $v_1=e_1$、$v_2=e_2$，$Av_1 = (0,3)^T = 3u_1$、$Av_2 = (-2,0)^T = 2u_2$。對單位圓盤 $\|x\| \le 1$，其像填滿這個橢圓；若輸入只取單位圓周，才得到邊界。

一般秩不足時，單位球面也可能映到填滿的低維橢球，不能一律稱其像為橢球面。

## 直角旋轉：三步幾何對照




Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 零奇異值：圓盤會塌縮成線段

秩不足示例取

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = U\,\mathrm{diag}(3,0)V^T.$$

此時 $Bv_1 = (0,3)^T$，而 $Bv_2 = 0$。單位圓盤的像不是橢圓盤；$v_2$ 方向塌縮成原點後，其餘點落在從 $(0,-3)^T$ 到 $(0,3)^T$ 的完整線段。

秩不足 SVD：B=[[0,0],[3,0]]，σ2=0 塌縮




**rank(B)=1；整個像為直線，單位圓的像才是線段**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 二範數與條件數：最強與最弱的伸縮

對非零矩陣，二範數為 $\|A\|_2 = \max_{x\neq 0} \|Ax\|/\|x\|$。寫 $x = \sum_{i=1}^{n} c_i v_i$，得

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 c_i^2 \le \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{n} c_i^2 = \sigma_1^2 \|x\|^2.$$

取 x=v₁ 達等號，故 ‖A‖₂=σ₁；零矩陣的二範數為零。對可逆方陣，$\|A^{-1}\|_2 = 1/\sigma_n$，所以 $\kappa_2(A) = \sigma_1/\sigma_n \ge 1$。正交矩陣的所有奇異值為 1，條件數也為 1。

滿 column rank 的長方矩陣若採 $\|A\|_2\|A^{+}\|_2$ 定義，也得到最大與最小奇異值比。秩不足時，略去零值後的有限比只描述限制在 row space 的映射，不能當成原全空間問題的可逆條件數。一般最小平方解的敏感度還受殘差與投影角度影響。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 到奇異矩陣的距離與數值秩

本頁先限定可逆方陣 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。把 最小奇異值 對應的 $\sigma_n u_n v_n^T$ 刪掉：

$$\|A - A_0\|_2 = \sigma_n.$$

因此 $\sigma_n$ 是 二範數下到奇異矩陣的距離。秩至多 $k$ 的最近矩陣 是 $A_k$，距離 $\sigma_{k+1}$。

數值秩使用相對容許值 $\tau$：

$$\sigma_i > \tau \|A\|.$$

容許值要反映雜訊、矩陣尺寸與解的敏感度。奇異值穩定不代表個別奇異向量穩定；相近奇異值對應的方向尤其容易受擾動改變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 擾動半徑如何限制數值秩

對相同尺寸矩陣 $A, B$，令 $q = \min(m, n)$、$1 \le i \le q$，並把不足的奇異值補零；令 $\delta = \|A - B\|_2$。由前面的 Eckart–Young 定理，$\sigma_i(A) = \min_{\operatorname{rank} C < i} \|A - C\|_2$。取 $B$ 的最佳低秩近似，三角不等式給

$$\sigma_i(A) \le \|A - B\|_2 + \sigma_i(B).$$

交換 $A, B$ 即得 Weyl 界 $|\sigma_i(A) - \sigma_i(B)| \le \delta$。它是奇異值的絕對擾動界；極小奇異值的相對誤差仍可很大。

設資料 $A$ 與未知真矩陣 $B$ 的距離至多 $\delta$，令 $r_\delta = \#\{i : \sigma_i(A) > \delta\}$。任何這樣的 $B$ 都必有 $\operatorname{rank} B \ge r_\delta$，因前 $r_\delta$ 個奇異值仍嚴格為正；同時截斷 $A_{r_\delta}$ 的誤差 $\sigma_{r_\delta+1} \le \delta$，所以至少存在一個秩 $r_\delta$ 的相容模型。若 $r_\delta = q$，便用 $A_q = A$。

因此 $r_\delta$ 是擾動球中可保證的最小秩，不表示所有相容模型的真秩都等於它。例如 $A = \operatorname{diag}(1, 10^{-8}, 10^{-12})$、$\delta = 10^{-10}$，秩 2 的截斷模型相容，原來秩 3 的 $A$ 也相容，資料精度不足以分辨第三個方向是否真的為零。

若應用另固定絕對門檻 $t$，只有 $\sigma_i(A) > t + \delta$ 或 $\sigma_i(A) < t - \delta$ 的分類才對此擾動穩健；靠近門檻的方向應列為不確定。相對門檻 $t = \tau\|A\|_2$ 還要記錄尺度與雜訊假設。



## QR 的主元不是奇異值

精確算術下，$A = Q_1 R$、$Q_1^T Q_1 = I$ 給 $A^T A = R^T R$，故 $A$ 與 $R$ 的奇異值相同。但 $R$ 的對角元素不是奇異值。取

$$R = \begin{bmatrix} 1 & K \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad K \ge 1.$$

兩個對角元素都是 1，卻有 $\|Re_2\|_2 = \sqrt{K^2 + 1}$，所以 $\sigma_{\max} \ge K$。又 $\sigma_{\max}\sigma_{\min} = |\det R| = 1$，故 $\sigma_{\min} \le 1/K$、$\kappa_2(R) \ge K^2$。大非對角元素會讓普通 QR 的對角線無法單獨反映接近相依的程度。

列出 $R_{ii}$ 的大小可作啟發式檢查，不能當成奇異值擾動定理。選 column pivot 的 QR 常用來估計數值秩，但若要保證精度，仍需其明確的秩揭露界或以 SVD 核對。也不能因某個浮點主元非零，就宣稱它代表可信的資料方向。

## 極分解：先對稱伸縮，再正交變換

本節限定方陣 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。由完整 SVD 可寫

$$A = (UV^T)(V\Sigma V^T) = QS.$$

$Q^TQ = I$，而 $S^T = S$ 且 $x^TSx = \sum_i \sigma_i (v_i^T x)^2 \geq 0$。因此 Q 是正交因子，S 是對稱半正定因子，並滿足 $S^2 = A^TA$。

若 A 可逆，所有奇異值正，S 正定，Q=AS$^{-1}$ 唯一。若 A 秩不足，S 仍唯一，但把 Q 延伸到零空間的方式可不同。

正交變換可能包含反射。可逆時 det S>0，所以 det A 與 det Q 同號；不能把 Q 一律稱作旋轉矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 偽逆：只對真正有作用的方向取倒數

由精簡式 $A = U_r\Sigma_r V_r^T$，定義 Moore–Penrose 偽逆

$$A^+ = V_r\Sigma_r^{-1}U_r^T \in \mathbb{R}^{n\times m}.$$

正奇異值才取倒數，零方向保持為零。若 A=0，定義 A⁺=0。兩個乘積為

$$AA^+ = U_rU_r^T = P_{C(A)}, \qquad A^+A = V_rV_r^T = P_{C(A^T)}.$$

兩者都對稱且冪等，也滿足 AA⁺A=A、A⁺AA⁺=A⁺。四個等式刻畫 Moore–Penrose 偽逆；完整行為可由正交基底逐方向核對。

A 滿 column rank 時可化為 $(A^TA)^{-1}A^T$；滿 row rank 時可化為 $A^T(AA^T)^{-1}$。這些是代數等式，數值解題不必真的形成逆矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 長方矩陣的轉置：左右奇異方向交換

取 $B=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，令 $A=B^T$。

$$B^TB=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix},\qquad \sigma_1=\sqrt{3},\quad \sigma_2=1.$$

可取 $v_1=(1,-1)^T/\sqrt{2}$、$v_2=(1,1)^T/\sqrt{2}$，再用 $u_i=Bv_i/\sigma_i$ 得

$$u_1=(-1,2,-1)^T/\sqrt{6},\quad u_2=(-1,0,1)^T/\sqrt{2}.$$

補上 $u_3=(1,1,1)^T/\sqrt{3}\in N(B^T)$。若 $B=U\Sigma V^T$，則 $A=V\Sigma^TU^T$：左右因子與維度一起交換，零方向也要跟著核對。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 轉置前後，最小平方的問題不同

對 $Bx=b$、$b=(1,0,0)^T$，因 B 欄滿秩，正規方程給唯一最小平方解 $\hat{x}=(-2/3,-1/3)^T$。其投影與殘差為

$$B\hat{x}=(2/3,-1/3,-1/3)^T,\quad e=b-B\hat{x}=(1,1,1)^T/3.$$

驗算 $B^Te=0$，且 $\|e\|=1/\sqrt{3}$，故此方程沒有精確解。

反過來令 $A=B^T$、$c=(1,0)^T$。這次 $Ax=c$ 有解；其唯一最小範數解為 $x^+=(-2/3,1/3,1/3)^T$，全部解為 $x^++t(1,1,1)^T$。因 $x^+$ 垂直零空間，任加非零零空間成分都增加長度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 偽逆的乘積不能隨意反轉

**AB = [1]**

A = [1 0] · B = [1; 1]

A: 1×2 B: 2×1

**B⁺A⁺ = [½]**

B⁺ = [½ ½] · A⁺ = [1; 0]

B⁺: 1×2 A⁺: 2×1

**(AB)⁺ = 1 ≠ ½ = B⁺A⁺**

此例的 $A = [1\ 0]$ 欄數多於列數且滿 row rank；$B = [1\ 1]^T$ 滿 column rank。雖然兩個因子都達各自的最大秩，$(AB)^+ = 1$ 仍不等於 $B^+A^+ = 1/2$。方陣可逆時可直接用通常的反序逆矩陣公式；矩形偽逆需另驗證所需條件。



## 秩不足的最小平方：殘差最小仍可能有很多解

把 b、x 分別展開成左右奇異基底。令 $\beta_i = u_i^T b$、$c_i = v_i^T x$，則

$$\|b - Ax\|^2 = \sum_{i=1}^{r} (\beta_i - \sigma_i c_i)^2 + \sum_{i=r+1}^{m} \beta_i^2.$$

後一項是 b 在左零空間的成分，任何 Ax 都無法改變它。前 r 項各令 $c_i = \beta_i/\sigma_i$，即可達到最小殘差；其餘 n−r 個係數任意。

因此所有最小平方解為 $x = A^+b + z$，其中 $z \in N(A)$。由 $A^+b \in C(A^T) = N(A)^\perp$，

$$\|A^+b + z\|^2 = \|A^+b\|^2 + \|z\|^2.$$

**$A^+b$ 是唯一的最小範數最小平方解**。先最小化殘差，再於這些解之中最小化解的長度，兩個目標不能混為一談。

## 數例：同一個投影，對應一整條解直線

取 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 2\end{bmatrix}$、$b=(1,3)^T$。外積正規化給 $u_1=(1,2)^T/\sqrt{5}$、$v_1=(1,1)^T/\sqrt{2}$、$\sigma_1=\sqrt{10}$。

$$A^+=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{bmatrix},\qquad x^+=A^+b=(7/10,7/10)^T.$$

輸出投影 $p=Ax^+=(7/5,14/5)^T$，殘差 $e=b-p=(-2/5,1/5)^T$。驗算 $e^T(1,2)=0$，殘差平方為 1/5。

令 $t\in\mathbb{R}$，所有解為 $x=x^++t(-1,1)^T$，都滿足 $x_1+x_2=7/5$，故輸出皆為 p。它們的長度平方是 $49/50+2t^2$，只有 t=0 最小。

正規方程同樣給 $\begin{bmatrix}5 & 5\\ 5 & 5\end{bmatrix}x=(7,7)^T$，但係數矩陣不可逆；不能使用滿秩時的逆矩陣公式。



## 實作時的核對順序

| 階段 | 核對內容 | 對結果的影響 |
|---|---|---|
| 整理資料 | m×n 尺寸、遺漏值、單位 | 決定映射與誤差的意義 |
| PCA 前處理 | 減平均；是否標準化另行決定 | 改變原點，或進一步改變尺度 |
| 分解 | 使用穩定 SVD，檢查重建殘差 | 避免把存在性構造當數值流程 |
| 截斷 | 奇異值、雜訊半徑、誤差預算 | 決定保留的方向是否可信 |
| 解釋 | 基底符號、相等值區段、實際任務 | 避免把任意軸號當固定意義 |

對本章 PCA 例，k=1 的平方重建誤差為 1，保留平方和比例為 3/4。這兩個量可直接核對；對新資料的效果則需另外驗證，不能由訓練資料的重建誤差直接保證。

## 四個基本子空間：輸入側與輸出側分開看

| 空間 | 所在空間 | 標準正交基底 | 維度 |
|---|---|---|---|
| row space $C(A^T)$ | $\mathbb{R}^n$ | $v_1, \dots, v_r$ | r |
| 零空間 $N(A)$ | $\mathbb{R}^n$ | $v_{r+1}, \dots, v_n$ | n−r |
| column space $C(A)$ | $\mathbb{R}^m$ | $u_1, \dots, u_r$ | r |
| 左零空間 $N(A^T)$ | $\mathbb{R}^m$ | $u_{r+1}, \dots, u_m$ | m−r |

輸入側兩空間正交互補；輸出側也一樣。SVD 用 $Av_i = \sigma_i u_i$ 配對有效方向，並將輸入零空間送到零。$u_i$ 與 $v_i$ 一般不在相同維度，不能直接比較內積。

零維子空間的基底是空集；不是把零向量放進基底。



## 本章重點

- SVD 配對左右奇異方向；零方向不能除以零。
- 截斷 SVD 的最佳誤差與唯一性取決於所用範數。
- PCA 應先說明資料方向、中心化和共變異數分母。
- 偽逆先最小化殘差，再從所有解中選最小範數。

### 參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 7.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 抽象映射與座標表示

線性轉換（linear transformation）是向量空間之間的映射

$$T\colon V \to W,$$

本章的維度公式先限定有限維空間；線性映射的定義本身不需此限制。它保持向量加法與純量乘法。$T$ 本身不依賴基底；選定輸入與輸出基底後，才得到矩陣。

旋轉矩陣

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

是某組標準座標下的表示。換基底會改變矩陣元素，但不會改變旋轉本身。

核（kernel）、像（image）、秩、單射與滿射是映射本身的不變性質；矩陣元素與行列式的解讀則取決於輸入、輸出座標之間的換算。



## 線性性

$T\colon V \to W$ 是線性映射，若

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

對所有 $u, v$ 與純量成立。等價地，

$$T(u+v) = T(u) + T(v), \qquad T(cu) = cT(u).$$

取 $c = 0$：

$$T(0) = 0.$$

所以把原點移走的平移

$$T(x) = Ax + b, \qquad b \neq 0$$

是仿射映射（affine map），不是向量空間意義下的線性映射。它在電腦圖學中使用，但須改用齊次座標，才能寫成擴維後的線性矩陣。

## 線性性 （續）

線性性保持所有線性組合：

$$T\left(\sum_i c_i v_i\right) = \sum_i c_i T(v_i).$$

因此只要知道基底向量的像，就知道整個映射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 核、像與秩—零度定理

核與像定義為

$$N(T) = \{v \in V : T(v) = 0\},$$
$$C(T) = \{T(v) : v \in V\}.$$

它們分別是 $V$ 與 $W$ 的子空間。秩—零度定理為

$$\dim V = \dim N(T) + \dim C(T).$$

證明：取 $N(T)$ 的一組基底

$$v_1, \dots, v_k,$$

擴充成 $V$ 的一組基底

$$v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_r.$$

$T(u_1), \dots, T(u_r)$ 張成像；其線性獨立性來自：若 $\sum c_i T(u_i) = 0$，則 $\sum c_i u_i \in N(T)$，在完整基底中所有 $c_i$ 必為零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 單射、滿射與維度

線性映射 $T$ 是單射，若且唯若

$$N(T) = \{0\}.$$

先證充分性：假設 $N(T) = \{0\}$。若 $T(u) = T(v)$，線性性給 $T(u - v) = 0$，故 $u - v \in N(T)$，由零核假設得 $u = v$，所以 $T$ 單射。再證必要性：若 $T$ 單射且 $v \in N(T)$，則 $T(v) = 0 = T(0)$，單射性推出 $v = 0$；又線性性給 $0 \in N(T)$，故核恰為 $\{0\}$。

滿射表示

$$C(T) = W.$$

對同一有限維空間上的線性映射 $T \colon V \to V$，可逆、$N(T) = \{0\}$、$\operatorname{rank} T = \dim V$ 與座標矩陣可逆四個條件等價。

定義域與對應域維度不同時，單射與滿射不必同時成立。$\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 可以是單射，但像最多只有二維，不可能滿射。



## 線性映射的例子

旋轉：

$$T(x, y) = (-y, x)$$

核只有零向量，像則是整個平面。

投影：

$$P(x, y) = (x, 0)$$

核是 $y$ 軸，像是 $x$ 軸。

多項式微分：

$$D(p) = p'$$

在 $\mathcal{P}_k$ 上，核是常數多項式，像是次數至多 $k - 1$ 的多項式。

積分：

$$I(p)(t) = \int_0^t p(s)\, ds$$

## 線性映射的例子 （續）

核只有零多項式，像是常數項為零且次數至多 $k+1$ 的多項式。

伸縮映射 $S(x)=cx$ 在 $c\neq 0$ 時可逆；$c=0$ 會把整個空間映到零。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 線性映射與仿射映射

仿射映射：

$$T(x)=Ax+b.$$

它保持仿射組合 $T((1-t)x+ty)=(1-t)T(x)+tT(y)$。若直線方向被 $A$ 消去，整條線可塌成一點；否則沿線比例保持。當 $b\neq 0$ 時

$$T(0)=b\neq 0,$$

所以它在向量空間意義下不是線性的。

即使圖形是一條直線，映射也不一定線性。例如

$$f(x)=2x+1$$

不滿足 $f(0)=0$，也不滿足 $f(cx)=cf(x)$。

二次映射 $T(x)=x^2$ 也不是線性映射；它不保持向量加法或純量乘法。判定線性性時，先檢查 $T(0)=0$，再檢查線性組合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 由基底向量的像建立矩陣

輸入基底：

$$B_{\text{in}} = \{v_1, \dots, v_n\},$$

輸出基底：

$$B_{\text{out}} = \{w_1, \dots, w_m\}.$$

將 $T(v_j)$ 用輸出基底展開：

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} M_{ij} w_i.$$

矩陣的各個 columns（欄）就是這些座標向量：

$$M = \begin{bmatrix} [T(v_1)]_{B_{\text{out}}} & \cdots & [T(v_n)]_{B_{\text{out}}} \end{bmatrix}.$$

若

$$x = \sum_j c_j v_j,$$



## 由基底向量的像建立矩陣 （續）

則

$$[T(x)]_{B_{\text{out}}} = M[x]_{B_{\text{in}}}.$$

column 數等於輸入維度，row 數等於輸出維度；輸入與輸出的座標排序必須前後一致。

## 標準矩陣的完整例子

令

$$T(x,y)=(x+y,\,x-y,\,2x).$$

標準基底的像：

$$T(e_1)=(1,1,2)^{T},\qquad T(e_2)=(1,-1,0)^{T}.$$

故

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix}.$$

這是 $3\times 2$ 矩陣。核為

$$x+y=0,\quad x-y=0,\quad 2x=0$$

只得到 $x=y=0$，所以 $T$ 是單射。像是 $\mathbb{R}^3$ 中秩為 2 的平面，而不是整個 $\mathbb{R}^3$。

再取 $S\colon \mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$，



## 標準矩陣的完整例子 (續)

$$S(x,y,z)=(x+z,\,y-2z),\qquad N=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -2\end{bmatrix}.$$

組合映射定義為 $(S\circ T)(v)=S(T(v))$。當 $T$ 的輸出基底與 $S$ 的輸入基底一致，

$$[S\circ T]_{\text{std}}=NA=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 1\\ -3 & -1\end{bmatrix}.$$

對 $v=(1,2)^{T}$，$T(v)=(3,-1,2)^{T}$，因此

$$S(T(v))=(5,-5)^{T}=(NA)v.$$

先作用最右邊的 $A$，再作用 $N$；若基底不同，必須先插入座標換算。

## 換基底公式

若 $A$ 是標準基底下的矩陣，而新的輸入、輸出基底分別為 $B_{\text{in}}, B_{\text{out}}$：

$$[x]_{\text{std}} = B_{\text{in}}[x]_{B_{\text{in}}},$$
$$[y]_{B_{\text{out}}} = B_{\text{out}}^{-1} y_{\text{std}}.$$

依序：

1. 用 $B_{\text{in}}$ 把輸入座標轉成標準座標；
2. 套用 $A$；
3. 用 $B_{\text{out}}^{-1}$ 把輸出的標準座標轉成輸出基底座標。

因此

$$[T(x)]_{B_{\text{out}}} = B_{\text{out}}^{-1} A B_{\text{in}} [x]_{B_{\text{in}}},$$
$$M = B_{\text{out}}^{-1} A B_{\text{in}}.$$

$B_{\text{in}}$ 是定義域基底，$B_{\text{out}}$ 是對應域基底，兩者維度可以不同。



## 換基底公式 （續）

換基底方向：Bin 輸入，Bout⁻¹ 輸出




**A=[[2,1],[1,2]]**

Bin=[[1,1],[1,-1]]

Bout=Bin

**M=[[3,0],[0,1]]**

M=Bout⁻¹ A Bin




同一個二維例子取

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B_{\text{in}} = B_{\text{out}} = B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因 $Ab_1 = (3,3)^T = 3b_1$、$Ab_2 = (1,-1)^T = b_2$，

## 換基底公式 （續）

$$M = B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

取 $x = (2,0)^T$，輸入座標是 $B^{-1}x = (1,1)^T$。先在基底座標下套用 $M$，得到 $(3,1)^T$，再用 $B$ 轉回標準座標：

$$B(3,1)^T = (4,2)^T = A(2,0)^T.$$

輸入端先用 $B_{\text{in}}$ 把基底座標轉成標準座標；輸出端再用 $B_{\text{out}}^{-1}$ 把標準座標轉成輸出基底座標。這兩個方向不能顛倒。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 同一空間上的相似變換

當 $V = W$，且輸入、輸出使用同一個基底 $B$：

$$[T]_B = B^{-1}AB.$$

若 $Av = \lambda v$，且 $y = B^{-1}v$：

$$B^{-1}AB\,y = B^{-1}Av = \lambda y.$$

所以 $A$ 與 $B^{-1}AB$ 有相同的特徵多項式與特徵值；跡與行列式也不變：

$$\operatorname{tr}(B^{-1}AB) = \operatorname{tr} A,$$
$$\det(B^{-1}AB) = \det A.$$

但輸入基底與輸出基底不同時，矩陣可為長方形，不能直接稱為相似矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 特徵基底例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

特徵基底：

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

同一個映射在特徵基底下只在各方向獨立伸縮。若 $B$ 的條件數很大，座標誤差也可能被放大；理論上可對角化，不代表數值上的基底好用。



## 微分映射的兩組基底

$D\colon \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_1$，輸入使用單項式基底

$$(1, t, t^2),$$

輸出基底為 $(1, t)$。

$$D(1) = 0, \qquad D(t) = 1, \qquad D(t^2) = 2t.$$

所以

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

若輸入基底改成 $1, s, s^2$、$s = t - 1$，則

$$D(s^2) = 2s = -2 + 2t,$$

新矩陣為

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

換基底只改變表示，不改變微分映射本身。

## 不變子空間

子空間 $U \subseteq V$ 稱為不變子空間，若

$$T(U) \subseteq U.$$

每條特徵向量所張成的一維空間，都是最小的非零不變子空間。若

$$V = U \oplus W$$

且 $U, W$ 都不變，則選用適當基底後，矩陣呈分塊對角。

只有 $U$ 不變時，取 $U$ 的基底後，可得到上三角分塊：

$$\begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}.$$

不變子空間把大型映射拆成較小的分塊；這個想法是 Schur 形式與 Jordan 形式共同的結構來源。



## 特徵基底與對角化

若 $b_1, \dots, b_n$ 構成一組特徵向量基底：

$$B = [b_1 \ \cdots \ b_n],$$

則

$$B^{-1} A B = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

特徵基底把互相耦合的系統拆成獨立模式，因此矩陣冪、指數與差分方程都能逐個模式計算。

實對稱矩陣可選用正交歸一的特徵基底 $Q$，使

$$Q^{-1} = Q^{T}.$$

此時基底矩陣的逆等於轉置，條件數為 $1$。非對稱矩陣的特徵基底可能接近線性相依，因此不能只檢查特徵值的個數。

## Jordan 形式與廣義特徵向量

每個複方陣 $A$ 都有 Jordan 形式：

$$J = B^{-1}AB.$$

其中一個分塊為

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & & 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

對角線放特徵值，上方的 $1$ 表示廣義特徵向量鏈。非零向量 $w$ 若滿足

$$(A - \lambda I)^m w = 0$$

對某個 $m \geq 1$ 成立，就是廣義特徵向量。Jordan 鏈滿足 $(A-\lambda I)w_1 = 0$、$(A-\lambda I)w_{j+1} = w_j$，因此其基底表示的超對角線是 $1$。Jordan 定理的完整一般證明不在本章範圍；本章只在練習中用二階冪零分塊實算。



## Jordan 形式與廣義特徵向量 （續）

Jordan 定理給出理論上的標準形式；實務演算法通常不直接計算容易不穩定的 Jordan 分解，而更常使用 Schur 形式、SVD 或具結構的方法。

## 循環矩陣與 Fourier 基底

$n = 4$ 時，左移一個位置的循環排列矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

把 $(x_0, x_1, x_2, x_3)^T$ 映到 $(x_1, x_2, x_3, x_0)^T$。

取四次單位根

$$\lambda \in \{1, i, -1, -i\},$$
$$v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3)^T.$$

最後一個座標繞回第一列時使用 $\lambda^4 = 1$，所以

$$Pv_\lambda = \lambda v_\lambda.$$

四個單位根給出四個線性獨立的特徵向量。Fourier 矩陣不僅對角化 $P$，也對角化所有循環矩陣

$$C = c_0 I + c_1 P + c_2 P^2 + c_3 P^3.$$



## 函數空間中的良好基底

函數空間常用的基底包括：

- 單項式 $1, x, x^2, \ldots$：適合符號式的多項式運算；
- 三角函數：適合表示週期訊號；
- Fourier 複指數：適合處理平移與卷積；
- Legendre 多項式：適合在區間 $[-1, 1]$ 做正交逼近；
- Chebyshev 多項式：適合數值插值與逼近。

良好基底取決於任務：若要對角化微分算子，可選特徵函數；若要穩定做數值逼近，可選條件良好的正交基底；若要壓縮光滑函數，可選係數快速衰減的基底。

同一個張成空間只表示描述的是同一個函數空間；不同基底會改變稀疏性、條件數與係數解讀。

## 基底的條件數

若

$$X = [x_1 \ \cdots \ x_n]$$

且

$$x = Xc,$$

座標映射的擾動可被

$$\|X^{-1}\|_2$$

放大。當 $\kappa_2(X)$ 很大時，幾何向量的小變化可能造成很大的座標變化。

這不代表 $X$ 在精確算術下奇異；它可能只是數值性質很差的基底。正交歸一基底滿足

$$\kappa_2(X) = 1.$$

大區間上的高次單項式可能極不穩定，因此常使用尺度化、正交化或 Chebyshev 基底。任何換基底都應明確記錄正規化與條件數。



## 整合例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$B^{-1}AB = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

對

$$x = (2, 0)^T,$$

eigenbasis coordinates：

$$c = B^{-1}x = (1, 1)^T.$$

$$[T^5 x]_B = \begin{bmatrix} 4^5 & 0 \\ 0 & 2^5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1024 \\ 32 \end{bmatrix}.$$

回到標準座標：

$$T^5 x = B \begin{bmatrix} 1024 \\ 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1056 \\ 992 \end{bmatrix}.$$

特徵基底把兩個模式分開。若 $B$ 的條件數很差，還必須另外分析座標誤差。

## 章末檢查

讀者應能：

- 用 $T(0)=0$ 與線性公理判斷映射；
- 證明核與像是子空間，並運用秩—零度定理；
- 由基底向量的像建立矩陣的 columns；
- 正確使用 $M=B_{\text{out}}^{-1}AB_{\text{in}}$；
- 區分同一空間的相似變換與不同輸入、輸出基底下的座標矩陣；
- 以不變子空間、特徵基底、Jordan 形式與 Fourier 基底簡化映射；
- 區分理論上的基底存在性與數值條件數。

下一章加入複純量、Hermitian 內積、unitary 矩陣與 FFT。



## 參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 為什麼需要複數

實旋轉矩陣

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

當 $\theta \not\equiv 0 \pmod{\pi}$ 時，它沒有實特徵向量。特徵值為

$$\lambda = e^{\pm i\theta}.$$

複特徵向量讓振盪動態、單位根與週期訊號有自然表示。實矩陣的複特徵值成共軛對；實解由共軛特徵向量組合而成。

本章使用 $i^2 = -1$。電機工程常以 $j$ 表示虛數單位，這只是記號慣例。



## 複數體的運算

$z = a + bi$，其中 $a, b \in \mathbb{R}$。加減法逐分量進行：

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i.$$

乘法：

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

$\mathbb{C}$ 是一個體（field）。非零複數的乘法反元素為

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

複數乘法可交換，且非負的模使每個非零複數都有乘法反元素。$\mathbb{C}^n$ 可以直接使用標準基底，但係數是複數。

## 共軛、模與實維度

共軛為

$$\overline{a+bi} = a - bi.$$

模為

$$|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2+b^2}.$$

共軛運算保持加法與乘法：

$$\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}.$$

$|zw| = |z||w|$，且三角不等式成立。

$\mathbb{C}^n$ 作為複向量空間的維度是 $n$；作為實向量空間的維度是 $2n$，因為每個座標都有實部與虛部。討論秩以前，必須先指明所用的體。



## 極式與 Euler 公式

非零

$$z = a + bi$$

有

$$r = |z|, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(b, a),$$
$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

Euler 公式為

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

複數相乘時，模相乘而幅角相加：

$$(re^{i\theta})(se^{i\phi}) = rse^{i(\theta+\phi)}.$$

整數次冪為

$$(re^{i\theta})^k = r^k e^{ik\theta}.$$

## 極式與 Euler 公式 （續）

例：

$$1+i=\sqrt{2}e^{i\pi/4},$$
$$(1+i)^8=16e^{2\pi i}=16.$$

幅角加上 $2\pi$ 仍表示同一個複數；分支的選擇會影響對數等多值函數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 單位根

解

$$z^n=1.$$

令

$$\omega=e^{2\pi i/n}.$$

所有單位根為

$$1,\omega,\omega^2,\dots,\omega^{n-1}.$$

它們等距落在單位圓上，形成正 $n$ 邊形。

若 $z=re^{i\theta}$ 且 $z^n=1$，則

$$r=1,\qquad n\theta=2\pi k.$$

$n=4$ 時，單位根是 $1,i,-1,-i$。這些根構成 Fourier 基底與循環排列特徵向量的核心。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 單位根 (續)

八次單位根：$z^8=1$ 等距落在單位圓




**ω=e^(2πi/8)**

roots：1,ω,…,ω⁷

**$F_8F_8^H=8I$**

columns 正交；Fourier basis

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 複數內積

本章固定

$$\langle u,v\rangle = u^H v = \sum_j \overline{u_j} v_j,$$

其中

$$u^H = \overline{u^T}.$$

若 $u=(1,i)^T$：

$$\|u\|^2 = u^H u = |1|^2 + |i|^2 = 2,$$

不是 $1^2+i^2=0$。

內積具有以下性質：

$$\langle u,v\rangle = \overline{\langle v,u\rangle},$$
$$\langle u,v+w\rangle = \langle u,v\rangle + \langle u,w\rangle,$$
$$\langle u,\alpha v\rangle = \alpha\langle u,v\rangle,$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 複數內積 （續）

$$\langle \alpha u, v \rangle = \overline{\alpha}\, \langle u, v \rangle.$$

本章把共軛固定在第一個引數。若改用其他慣例，所有公式必須同步調整。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 正交性與四個基本子空間

$u \perp v$ 表示

$$u^H v = 0.$$

例：

$$u = (1, i)^T, \qquad v = (1, -i)^T,$$
$$u^H v = (1, -i)(1, -i)^T = 1 + (-i)(-i) = 1 - 1 = 0.$$

複數空間的四個基本子空間改用共軛轉置描述：

$$C(A) \perp N(A^H), \qquad C(A^H) \perp N(A).$$

一般轉置 $A^T$ 不適用，因為它不保證給出複內積下的正交補空間。

維度關係為

$$\dim C(A) = \dim C(A^H) = r,$$
$$\dim N(A) = n - r, \qquad \dim N(A^H) = m - r.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Hermitian 矩陣

方陣 $S$ 是 Hermitian，若

$$S^H = S.$$

逐元素條件為

$$s_{ji} = \overline{s_{ij}}.$$

對角元素必須是實數。對任何 $z$，

$$(z^H S z)^H = z^H S^H z = z^H S z.$$

$1 \times 1$ 純量等於自己的共軛，故

$$z^H S z \in \mathbb{R}.$$

例：

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 3 \end{bmatrix}$$

是 Hermitian。



## Hermitian 矩陣的實特徵值與正交特徵向量

若

$$Sz = \lambda z,$$

左乘 $z^H$：

$$z^H S z = \lambda z^H z.$$

左端是實數，且 $z^H z > 0$，所以 $\lambda$ 是實數。

若

$$Su = \lambda u, \qquad Sv = \mu v,$$

則

$$\lambda u^H v = (Su)^H v = u^H S v = \mu u^H v.$$

當 $\lambda \neq \mu$，

$$(\lambda - \mu) u^H v = 0,$$

所以 $u \perp v$。

## Hermitian 矩陣的實特徵值與正交特徵向量 （續）

完整正交特徵基底的證明與實對稱情形相同：在複單位球上最大化實值 $z^H S z$，由實部、虛部方向的極值條件得到 $Sq = \lambda q$。$q^\perp$ 因 $q^H S v = (Sq)^H v = 0$ 而不變；限制到 $q^\perp$ 的映射仍為 Hermitian，歸納可得完整基底。各重複特徵空間內部再用 Gram-Schmidt，即得譜定理：

$$S = Q \Lambda Q^H,$$

其中 $Q^H Q = I$，且 $\Lambda$ 為實對角矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Unitary 矩陣

方陣 $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 稱為 unitary，若

$$Q^H Q = I.$$

方陣亦滿足 $QQ^H = I$，所以

$$Q^{-1} = Q^H.$$

它保持內積：

$$\langle Qu, Qv \rangle = (Qu)^H (Qv) = u^H v.$$

因此 $\|Qu\| = \|u\|$。

若 $Qu = \lambda u$：

$$\|u\| = \|Qu\| = |\lambda| \|u\|,$$

所以

$$|\lambda| = 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Unitary 矩陣 （續）

行列式也直接反映長度保持：

$$1 = \det(Q^H Q) = (\det Q)^H \det Q = |\det Q|^2,$$

故 $|\det Q| = 1$。實正交矩陣是 unitary 矩陣的實數特例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 正規矩陣

方陣 $A$ 稱為正規矩陣（normal matrix），若

$$AA^H = A^H A.$$

複方陣可用 unitary 矩陣對角化，若且唯若它是正規矩陣。充分性可用 Schur 形式歸納證明：先取單位特徵向量並擴充為正交歸一基底，矩陣變成 $\begin{bmatrix} \lambda & b^H \\ 0 & C \end{bmatrix}$。正規條件比較 $(1,1)$ 元素，給出 $|\lambda|^2 + \|b\|^2 = |\lambda|^2$，故 $b = 0$；$C$ 仍為正規矩陣，歸納即得 unitary 對角化。必要性可直接由 $A = Q\Lambda Q^H$ 左右相乘驗證。三個常見類別為

- Hermitian：特徵值為實數；
- 反 Hermitian 矩陣 $K^H = -K$：特徵值為純虛數；
- unitary：特徵值的模為 $1$。

一般可對角化只要求特徵向量基底；unitary 可對角化則要求正交歸一特徵基底。後者是譜幾何中更強的條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Hermitian 對角化例子

$$S = \begin{bmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix} = S^H.$$

特徵多項式為

$$\det(S - \lambda I) = (2-\lambda)^2 - |i|^2 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

特徵值為 $1, 3$。

對 $\lambda = 3$：

$$\begin{bmatrix} -1 & i \\ -i & -1 \end{bmatrix} z = 0$$

給 $z_1 = iz_2$，取

$$q_1 = (i, 1)^T / \sqrt{2}.$$

對 $\lambda = 1$，取

$$q_2 = (-i, 1)^T / \sqrt{2}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Hermitian 對角化例子 （續）

兩個向量都是單位向量，且 $q_1^H q_2 = 0$。因此

$$S = Q \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} Q^H,$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Fourier 矩陣

令

$$\omega = e^{2\pi i/n}.$$

正向 Fourier 矩陣為

$$(F_n)_{jk} = \omega^{jk}, \qquad 0 \le j, k < n.$$

正向轉換為

$$y = F_n c.$$

$F_n$ 是對稱矩陣；當 $n > 2$ 時一般不為 Hermitian，只有 $n = 1, 2$ 時是實對稱矩陣。各 columns 彼此正交：

$$\sum_{j=0}^{n-1} (\omega^{jk})^H \omega^{j\ell} = \sum_{j} \omega^{j(\ell-k)} = n\delta_{k\ell}.$$

所以

$$F_n F_n^H = nI, \qquad F_n^{-1} = F_n^H / n.$$



## 反 DFT 與 Parseval 恆等式

反轉換為

$$c_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-jk} y_k.$$

若軟體定義

$$\omega = e^{-2\pi i/n},$$

這只表示軟體交換了正向與反向轉換的符號慣例。

Parseval：

$$\|y\|^2 = (F_n c)^H (F_n c) = n\|c\|^2.$$

正規化的 unitary Fourier 矩陣為

$$Q = F_n / \sqrt{n}$$

它滿足 $Q^H Q = I$，故 $\|Qc\| = \|c\|$。正規化不改變轉換所承載的資訊，但會改變 Parseval 公式中的常數。

## DFT 與循環卷積

定義循環卷積 $h_j = \sum_{k=0}^{n-1} a_k b_{(j-k) \bmod n}$。它在 Fourier 域中變成逐點相乘：

$$F_n h = (F_n a) \odot (F_n b)$$

證明：將 $h_j$ 代入 $\sum_j \omega^{\ell j} h_j$，令 $s = (j-k) \bmod n$，雙重和分離成 $(\sum_k a_k \omega^{\ell k})(\sum_s b_s \omega^{\ell s})$。此公式使用未正規化 forward DFT；若 forward 除以 $\sqrt{n}$，右端需再乘 $\sqrt{n}$。

FFT、逐點相乘與逆 FFT 合計需 $O(n \log n)$，低於直接計算一般卷積的 $O(n^2)$。若兩序列長度分別為 $p, q$，線性卷積共有 $p+q-1$ 項，必須補零到至少這個長度，才不會發生循環繞回。

若公式中的係數順序或符號與卷積定義不一致，結果會悄然改變，因此實作時應寫清楚 NTT／FFT 的慣例。



## Radix-2 FFT 的奇偶分解

設 $n = 2m$、$0 \le j < m$。把序列分成

$$c' = (c_0, c_2, \dots, c_{2m-2}),$$
$$c'' = (c_1, c_3, \dots, c_{2m-1}).$$

將 $y_j = \sum_{k=0}^{n-1} c_k \omega_n^{jk}$ 分成偶數 $k = 2s$ 與奇數 $k = 2s+1$ 的兩個和。因 $\omega_n^2 = \omega_m$ 且 $\omega_n^m = -1$，

$$y_j = y'_j + \omega_n^j y''_j,$$
$$y_{j+m} = y'_j - \omega_n^j y''_j.$$

其中 $y'$、$y''$ 是兩個大小為 $m = n/2$ 的 DFT。

這就是蝶形（butterfly）運算：把大小為 $n$ 的問題拆成兩個半尺寸子問題，再加上 $m$ 次 twiddle 乘法。遞迴到大小為 $1$ 即完成 FFT。

以 $n = 4$、$c = (1, 2, 0, -1)^T$ 逐步計算。位元反轉先得到

$$(c_0, c_2, c_1, c_3) = (1, 0, 2, -1).$$

## Radix-2 FFT 的奇偶分解 （續）

第一層執行兩次兩點蝶形：

$$(1,0) \mapsto (1,1), \qquad (2,-1) \mapsto (1,3).$$

第二層的 twiddle 因數是 $\omega_4^0 = 1, \omega_4^1 = i$：

$$(1,1) \mapsto (2,0), \qquad (1,3) \mapsto (1+3i, 1-3i).$$

因此

$$y = F_4 c = (2, 1+3i, 0, 1-3i)^T.$$

直接代公式亦得 $y_1 = 1 + 2i + (-1)(-i) = 1 + 3i$、$y_3 = 1 - 2i + (-1)i = 1 - 3i$。蝶形的加、減兩支共用同一個乘以 twiddle 的中間值。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Radix-2 FFT 的奇偶分解 （續）

四點 FFT 第一層：分別計算偶序與奇序的兩點 DFT




**偶序 $(c_0, c_2) = (1, 0)$**

$E_0 = c_0 + c_2$，$E_1 = c_0 - c_2$

**奇序 $(c_1, c_3) = (2, -1)$**

$O_0 = c_1 + c_3$，$O_1 = c_1 - c_3$

各蝶形的上支相加、下支以藍色值減去綠色值；下一圖再組合同索引 $E_j$、$O_j$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 四點 FFT 的重組：哪兩個中間值相配

第一層的陣列位置依序為 $(E_0, E_1, O_0, O_1) = (1, 1, 1, 3)$。第二層必須配對位置 $(0, 2)$ 與 $(1, 3)$：同索引的 $E_j$、$O_j$ 才能組成 $y_j$ 與 $y_{j+2}$。圖將兩個重組蝶形分開，以免交叉連線遮住配對關係。

四點 FFT 第二層：同索引的 Eⱼ、Oⱼ 分組重建 y




藍支 u=Eⱼ，綠支 ωv=ω₄ʲOⱼ：上支 u+ωv，下支 u−ωv；最後依 y₀,y₁,y₂,y₃ 排列。

原例前三個中間值恰巧相等，會掩蓋錯接線。改用 $c = (2, 5, 7, -1)$，第一層為 $(9, -5, 4, 6)$，正確輸出為 $(13, -5 + 6i, 5, -5 - 6i)$。如果錯把 $E_0, E_1$ 配在一起，第一個輸出會變成 $9 + (-5) = 4$，而不是 $13$。配對索引是演算法的一部分，不能只看一組巧合數值驗證。



## 遞迴與成本

$n = 2^\ell$：

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n).$$

共有 $\ell = \log_2 n$ 層，每層做線性工作量，因此

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

直接以 Fourier 矩陣相乘需要

$$n^2$$

次乘法。

$n = 1024 = 2^{10}$ 時，

$$n^2 = 1,048,576,$$
$$\frac{n}{2} \log_2 n = 5,120.$$

在此乘法成本模型下，兩者比值約為 $205$。實際執行時間仍受加法、快取、記憶體頻寬、平行化與 twiddle 因數生成影響。

## 迭代式 FFT 與位元反轉

遞迴 FFT 可改寫為由下而上的階段。$n = 8$ 時，radix-2 輸入通常先排成位元反轉順序：

$$0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7.$$

再依序執行長度 $2, 4, 8$ 的蝶形：

$$(a, b) \mapsto (a + \omega b, a - \omega b).$$

反轉換可用共軛技巧：先對輸入取共軛、執行正向 FFT、對輸出取共軛，最後除以 $n$。

當 $n$ 不是 $2$ 的冪時，可使用混合基底（mixed radix）；結構不適合時可用 Bluestein 演算法。實輸入可使用實數 FFT 節省部分工作，但不能假設一般複數 API 會自動完成這些最佳化。



## 數值注意事項

DFT 的實務問題包括：

- 使用穩定的 twiddle 遞推或預先計算單位根；
- 不要累積大量相位誤差；
- 明確標示使用 $F$、$F/\sqrt{n}$ 以及反向轉換的符號；
- 補零會改變頻率格點與插值，不會創造新資訊；
- 窗函數能降低 leakage，但也會改變訊號；
- 頻率格點由 $k/(n\Delta t)$ 決定，取決於取樣間隔。

浮點頻譜峰值可能同時包含真實訊號、leakage 與雜訊。不能把一個非零頻格直接當成精確的物理頻率。

## 章末檢查

讀者應能：

- 計算複數乘積、模、極式冪與單位根；
- 固定 $u^H v$ 的共軛位置慣例，推導正交性；
- 證明 Hermitian 矩陣的特徵值為實數，且不同特徵空間互相正交；
- 建構 $S = Q\Lambda Q^H$；
- 驗證 unitary 矩陣保持長度，且特徵值的模為 $1$；
- 建 $F_n$，推導 $F_n F_n^H = nI$；
- 實作 radix-2 蝶形，計算 $\Theta(n \log n)$；
- 解讀符號、正規化、補零與數值極限。

下一章把這些結構應用到網路、工程、Markov 動態、最佳化、Fourier 級數、電腦圖學與密碼學。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 共同結構

本章七個主題反覆使用差分、能量或通量、非負演化、正交投影與座標轉換。下列投影式要求 $v_i$ 是目標子空間的非零正交基底：

$$\text{difference } A, \qquad \text{energy } A^T C A, \qquad u_{k+1} = A u_k,$$

$$\operatorname{proj}_U b = \sum_i \frac{\langle v_i, b \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i.$$

應用題要交代三件事：每個矩陣元素的單位與正負號；哪些等式依賴連通性、正性或邊界條件；以及代數上的可逆性是否足以保證物理存在性與數值可靠性。建立模型時，至少要有守恆律、材料或元件本構關係、適當邊界條件與能量核驗，不能先套矩陣再替係數任意命名。



## 有向圖與關聯矩陣

圖的節點為 $v_1, \dots, v_n$，邊為 $e_1, \dots, e_m$。本節先排除 self-loop（自迴圈），平行邊則可各自記錄為一個 row。先替每條邊選定方向。關聯矩陣（incidence matrix）$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 定義為

$$a_{ij} = \begin{cases} -1, & e_i \text{ leaves } v_j, \\ +1, & e_i \text{ enters } v_j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

每條 edge row 的和為零。對 node potential $x$，

$$(Ax)_i = x_{\text{head}} - x_{\text{tail}}.$$

因此 $A$ 是離散差分算子。反轉一條邊的方向只把該 row 乘上 $-1$，會改變差分的符號，但平方和與能量不變。

## 連通圖的 kernel 與 rank

此處的連通指忽略任選方向後的底層無向圖連通，不要求強連通。此時所有邊差分為零，若且唯若全部節點電位相等：

$$N(A) = \operatorname{span}\{\mathbf{1}\}, \qquad \dim N(A) = 1.$$

每條邊所對應的列元素和為零，即 $A\mathbf{1} = 0$，故秩小於 $n$；這不表示所有列相加的係數都相同。沿連通路徑逐邊使用相等電位，可證核恰為常數向量；再由秩—零度定理得秩 $n-1$。也可用生成樹的 $n-1$ 條獨立邊 rows 證明。因此

$$\operatorname{rank} A = n-1, \qquad \dim N(A^T) = m-n+1.$$

欄空間（column space）$C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$ 描述可實現的邊電位差；列空間（row space）$C(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n$ 位於節點空間，等於常數向量的正交補空間。左零空間 $N(A^T) \subseteq \mathbb{R}^m$ 對應循環流。每條 edge 是矩陣的一個 row，每個 node 是一個 column；這些空間的維度反映圖的拓撲。



## 循環、流量與 Kirchhoff 定律

$Ax = b$ 有解，若且唯若 $b \in C(A)$。等價條件是：每個循環流 $j \in N(A^T)$ 都滿足

$$j^T b = 0.$$

所以沿封閉迴路的帶號電位差必相加為零；這是 Kirchhoff 電壓定律的線性代數版本。

左零空間包含滿足

$$A^T j = 0.$$

這是邊流量形式。在每個節點，流入減去流出的淨量必須平衡，也就是 Kirchhoff 電流定律。固定一棵生成樹。每條非樹邊與樹上唯一連接路徑形成一個基本循環，依邊方向給予分量 +1、−1 或 0，得到 $A^T j = 0$。每個基本循環只含自己的那一條非樹邊，因此比較非樹邊座標即可證明這些向量獨立。它們共有 $m-n+1$ 個，等於左零度，故構成循環空間基底。不能任取幾個看來較小的循環就假定獨立或生成全部空間。

對電阻網路，以下固定 $e = Ax$ 為頭端減尾端的電位差，$y = Ce$ 為加權電位差。若 $j$ 表示沿所選邊箭頭的實際電流，Ohm 定律給 $j = -y$；節點的外部注入 $f$ 以正值表示加入，守恆式為 $-A^T j = f$，所以仍有 $A^T y = f$。不能一面使用頭端減尾端，一面把正的 $y$ 說成沿箭頭由低電位流往高電位的電流。

## Laplacian 與網路方程

把 conductance $c_e > 0$ 放入 diagonal $C$，定義 graph Laplacian

$$L = A^T C A.$$

對 potentials $x$，

$$x^T L x = (Ax)^T C (Ax) = \sum_e c_e (\Delta x_e)^2 \geq 0.$$

因此 $L$ 是對稱半正定矩陣。圖連通且所有 $c_e > 0$ 時，$N(L)$ 只含常數電位。沒有參考電位時，解可加任意常數；電位沒有絕對零點。

選一個節點接地，例如 $x_n = 0$，刪除該 row 與 column，得到 $L_{\text{red}}$。連通性使降階後的矩陣正定。

網路的基本關係為

$$e = Ax, \qquad y = Ce, \quad j = -y, \qquad f = -A^T j = A^T y,$$

合併得

$$A^T C A x = f.$$



## Laplacian 與網路方程 （續）

邊的方向選擇不影響 $L$。若把每條邊相對原方向乘以 $s_e \in \{-1, 1\}$，令

$$D = \operatorname{diag}(s_1, \ldots, s_m), \qquad A' = DA.$$

因為 $D^T = D$、$D^2 = I$，且 $C$ 是對角矩陣，

$$(A')^T C A' = A^T D\, C\, D A = A^T C A.$$

同一條邊的新差分與流量也同步變號 $e' = De$、$y' = Dy$，因此

$$(A')^T y' = A^T D^2 y = A^T y = f.$$

所以方向只改變該邊差分與有號電流的表示正負，不改變 Laplacian、能量、物理通量或節點平衡。

此外，

$$\mathbf{1}^T f = \mathbf{1}^T A^T C A x = (A\mathbf{1})^T C A x = 0,$$

因此沒有外部跨網源時，注入向量 $f$ 的元素總和必須為零。總和不為零屬於模型或資料不一致，不是更換求解器就能修正。

## Laplacian 與網路方程 （續）

下圖以三角形 $1 \to 2, 2 \to 3, 1 \to 3$ 固定方向，並把每一列寫成「頭端電位減尾端電位」：

三角形網路的 incidence、定向與電位差




**A 的列**

[-1, 1, 0]

[ 0,-1, 1]

[-1, 0, 1]

**x=(1,4,7)ᵀ**

e₁=4-1=3

e₂=7-4=3

e₃=7-1=6

**e=Ax=(3,3,6)ᵀ**



## 加權三角形 network

三節點三角形的邊固定為 $1 \to 2, 2 \to 3, 1 \to 3$，電導依序為 $2, 3, 1$。關聯矩陣的每一列是一條定向邊：

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

定向約定是 $e_i = (Ax)_i = x_{\text{head}} - x_{\text{tail}}$。取 potentials $x = (1, 4, 7)^T$，逐列得到

$$Ax = \begin{bmatrix} 4 - 1 \\ 7 - 4 \\ 7 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = e.$$

以 $C = \operatorname{diag}(2, 3, 1)$ 乘上 edge differences：

$$y = Ce = (6, 9, 6)^T.$$

沿既定箭頭的實際電流為 $j = (-6, -9, -6)^T$，即分別反向流動。再乘 $A^T$ 求外部注入，三列分別累加到 node $1, 2, 3$：

## 加權三角形 network （續）

$$f = A^T y = \begin{bmatrix} -6-6 \\ 6-9 \\ 9+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ -3 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

分量和為 $-12-3+15=0$，這是沒有外部跨網流時的必要守恒。加權 Laplacian 則是

$$L = A^T C A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -3 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad Lx = f, \quad L\mathbf{1} = 0.$$

$A$ 的 rank 為 2，kernel 是常數向量。若接地令 node 1 的 potential 為 0，刪除第一列與第一欄後，解 $x_2 = 3, x_3 = 6$；把常數 1 平移回去就得到原例 $x = (1,4,7)^T$。本例接地只是選定電位零點；整體平移不改變電位差與電流。另指定端點電壓差則是新的物理邊界條件。



## 實際電流、有號係數與耗散功率

將原電位整體減 1 V，接地後 x=(0,3,6)ᵀ V；電流不變。電導 c=(2,3,1) 的單位取 S。

**node 1 接地後的實際電流**




綠箭頭：實際電流；橘箭頭：外部注入 / 取出。

**符號、單位與功率**

x = (0,3,6) V

e = Ax = (3,3,6) V

y = Ce = (6,9,6) A

j = −y = (−6,−9,−6) A

f = −Aᵀj = (−12,−3,15) A

P = xᵀLx = 18+27+36

= 81 W

xᵀLx 的單位是 V・A=W，代表耗散功率。乘上 1/2 可作為最佳化的二次型，不能把它稱為理想電阻的儲存能量。

## 接地後，把縮減方程解完

node 1 的接地條件是 $x_1 = 0$。其餘兩個節點的方程為

$$\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

行列式為 11，因此

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 33 \\ 66 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

還要核對被刪除的第一列：$-2x_2 - x_3 = -6 - 6 = -12 = f_1$。三列方程都成立，才完成原網路的守恆檢查。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 接地不能代替守恆

若把資料誤記為 $\tilde{f} = (-11, -3, 15)^T$ A，縮減後右端仍是 $(-3, 15)^T$，所以求解器仍回傳 $x = (0, 3, 6)^T$ V。但完整殘差是

$$Lx - \tilde{f} = (-1, 0, 0)^T \text{ A}, \qquad \mathbf{1}^T \tilde{f} = 1 \text{ A} \neq 0.$$

完整系統無解，因為 $\mathbf{1}^T L = 0$。若接地只用來選零電位，不能把這 1 A 不平衡藏在已刪方程中。若接地端另接理想電壓源，該端電流就屬待求反應量，必須加入模型，不能仍宣稱給定的三個注入值全部成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 彈簧與 $A^TCA$

令位移為 $u$，彈簧伸長量為 $e = Au$，本構關係為

$$y = Ce, \qquad C = \mathrm{diag}(c_i).$$

平衡或節點力平衡為

$$A^T y = f.$$

合併得

$$A^T C A u = f.$$

勁度矩陣 $K = A^TCA$ 對稱半正定。在所有彈簧剛度皆正時，$K$ 正定若且唯若邊界處理後 $N(A) = \{0\}$。對一維連通彈簧鏈，固定足夠參考位移可排除其平移零模態；一般多維結構可能另有轉動或機構零模態，不能只排除平移就宣稱正定。應變能為

$$\frac{1}{2} u^T K u = \frac{1}{2} \sum_i c_i e_i^2.$$

自由平移會使所有 $e_i = 0$，因此常數位移落在 $N(K)$。這正是必須加入邊界條件或參考位移的原因。



## 彈簧與 $A^TCA$ （續）

有限元素組裝也使用同一模式，把元素矩陣 $A_e^T C_e A_e$ 累加到全域 $K$。

## 二階差分與邊界條件

一維桿件有 $N$ 個內部節點、網格寬 $h$，兩端固定。差分矩陣 $A$ 是 $(N+1)\times N$，作用為 $(u_1, u_2-u_1, \dots, u_N-u_{N-1}, -u_N)^T$，給出

$$K = A^TA = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \ddots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots \end{bmatrix}.$$

忽略 $1/h^2$ 因數，

$$(Ku)_i = 2u_i - u_{i-1} - u_{i+1} \approx -h^2 u''(x_i).$$

固定邊界的已知值移到右端。左固定、右自由時，最後一個對角元素會改變，因為缺少最末端的彈簧。邊界條件屬於矩陣結構，不是排完版後才附加的說明。

兩端自由時，常數位移落在 $K$ 的零空間，因此 $K$ 奇異。外力必須與剛體模式相容，或加入參考位移與反作用力才可解。



## 工程建模檢查表

建立 $Ku=f$ 前，依序確認：

1. 自由度與單位；
2. 位移、力與伸長量的正負號；
3. 差分矩陣 $A$；
4. 本構關係的對角矩陣 $C$；
5. 邊界條件與接地模式；
6. 對稱性與正定性；
7. 能量非負與剛體模式；
8. 隨網格細化變化的條件數。

缺少邊界條件常表現成零特徵值與平移模式。細長元素或係數差異過大，也可能讓本來正定的矩陣有極大條件數。

## Markov matrices

欄隨機矩陣（column-stochastic matrix）$P$ 滿足

$$P_{ij} \geq 0, \qquad \sum_i P_{ij} = 1.$$

若 $u_k$ 是機率向量，

$$u_{k+1} = P u_k,$$

則

$$\mathbf{1}^T u_{k+1} = \mathbf{1}^T u_k.$$

Total probability 保持 1。又

$$\mathbf{1}^T P = \mathbf{1}^T,$$

所以 $1$ 是左特徵值，亦在 $P$ 與 $P^T$ 共有的 spectrum 中；一般不代表 $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$。Stationary distribution 是右特徵向量，滿足

$$P u_\infty = u_\infty.$$



## 收斂與 spectral radius

若 $P$ 每個元素嚴格為正，令 $\alpha = n \min_{ij} P_{ij} > 0$。當 $\alpha < 1$，寫 $P = \alpha \mathbf{1}\mathbf{1}^T/n + (1-\alpha)R$，$R$ 仍為 column-stochastic，故對機率向量 $u, v$，$\|Pu - Pv\|_1 \leq (1-\alpha)\|u - v\|_1$。機率單純形在 $\ell_1$ 下完備，壓縮映射定理給出唯一 stationary vector 與幾何收斂；$\alpha = 1$ 時一步映成均勻分布。固定點每個分量亦嚴格為正。

允許零元素時，Perron-Frobenius 定理的收斂版本要求轉移圖不可約且非週期。兩條件成立時，仍有唯一的正 stationary distribution，且任意初始機率向量都收斂到它。若週期，例如 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，則 $P^2 = I$，只有週期二的循環而不收斂；若可約，例如 $P = I$，每個標準基向量都是 stationary vector，極限依初值而異。

若可 diagonalize，eigenvalues 排序為

$$1 = \lambda_1 > |\lambda_2| \geq \cdots,$$

則

$$u_k = P^k u_0 = \sum_i c_i \lambda_i^k v_i.$$

## 收斂與 spectral radius （續）

第二特徵值控制混合速度：

$$\|u_k - u_\infty\| \le C|\lambda_2|^k.$$

例：

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

特徵值為 $1, 0.5$。Stationary 向量 $u_\infty = (0.6, 0.4)^T$，非平穩模態每步減半。若矩陣不能對角化，Jordan 分塊會多出 $k^{m-1}$ 因子；此時仍以 spectral radius 判斂，但最簡單的 $C|\lambda_2|^k$ 形式需改寫。



## Leslie population 與 consumption economy

Leslie 矩陣把人口分齡：

$$n_{k+1} = L n_k.$$

第一列是生育率，次對角線是存活率。若 Leslie 矩陣的非負有向圖不可約且非週期，Perron-Frobenius 定理保證存在唯一的正 dominant eigenvalue $\lambda > 0$，其特徵向量可正規化成 stable age distribution。長期成長倍率是 $\lambda$；若缺少不可約或非週期條件，可能出現週期、多個極限或不同出生群組彼此隔離，不能直接宣稱單一長期分布。

消耗矩陣 $A_{ij}$ 表示部門 $j$ 生產每單位產出所需部門 $i$ 的投入。總產出 $p$ 扣除被消耗的 $Ap$ 後留下

$$(I - A)p = y.$$

若 $\rho(A) < 1$，Neumann 級數收斂：

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \cdots.$$

證明可直接看有限和

$$(I - A)(I + A + \cdots + A^N) = I - A^{N+1}.$$

## Leslie population 與 consumption economy （續）

$\rho(A) < 1$ 等價於 $A^N \to 0$，故有限和趨近 $(I - A)^{-1}$。當 $A \geq 0$ 時每一項都非負，所以逆矩陣也非負；任何非負需求 $y$ 都可由

$$p = (I - A)^{-1} y$$

解釋成直接與間接投入所累積的產量。反之，若某個 $|\lambda| \geq 1$，級數不收斂；$I - A$ 在數值上仍可能可逆，但不能保證非負供給與長期可持續性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 線性規劃的幾何

標準形式為

$$\begin{aligned} &\min\ c^T x, \\ &\text{s.t. } Ax = b, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

例：

$$\min\ 5x_1 + 3x_2 + 8x_3$$

subject to

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4, \qquad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

等式在三維空間中是一個平面，非負限制切出三角形，目標函數的水平集是平行平面。可行集非空且目標在可行集上有有限最小值時，至少有一個頂點達到最小值；若可行方向使目標任意下降，則問題 unbounded，不能只檢查頂點就宣稱完成。

在 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 已去除冗餘等式、rank 為 $m$ 時，basic feasible solution 選 $m$ 個獨立 columns 作方陣 $B$，把其餘非基變數設為零，解 $Bx_B = b$，並要求 $x_B \geq 0$。

Lin Cing
computer-science-self-study

## 單體法、對偶與數值注意事項

在基底 $B$ 下，目標值是

$$c_B^T B^{-1} b.$$

非基 column $a_j$ 的 reduced cost 為

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1} a_j.$$

若所有 $\bar{c}_j \geq 0$，因可行方向使 $x_B$ 的變化量為 $-B^{-1}a_j t$，目標變化為 $\bar{c}_j t \geq 0$，故目前基本可行解最優。若有 $\bar{c}_j < 0$，令變數 $x_j$ 進入基底，並以 ratio test

$$t = \min_{i:\,(B^{-1}a_j)_i > 0} \frac{x_{Bi}}{(B^{-1}a_j)_i}$$

在所有會限制增加的正分母中，取最小非負比值，選第一個降到零的基本變數離開，才能保持非負；基本值為零也必須參與，結果可以是零步長。若所有分母皆非正，沿此方向可無限增加且目標持續下降，得到無界證書。單體法改變基本可行表示；非退化步驟移到相鄰頂點，退化步驟的點可不動。對具有嚴格可行原問題與對偶的模型，內點法可沿中央路徑逼近最優解；缺乏嚴格可行點時還需前處理或其他可行性處理，不能直接套用下列正的中央路徑。



## 單體法、對偶與數值注意事項 （續）

Primal 與 dual：

$$\min c^T x \quad \text{s.t. } Ax = b,\ x \geq 0,$$

$$\max b^T y \quad \text{s.t. } A^T y \leq c.$$

可行 primal/dual 配對滿足 weak duality，因

$$c^T x - b^T y = x^T(c - A^T y) \geq 0.$$

只要 primal 與 dual 都可行，雙方可達值相等就是最優證書。有限維 LP 若至少一方可行且最優值有限，strong duality 保證另一方也可達同一值；本章例子更直接，已找到同值的可行 primal 與 dual，所以不必依賴未展示的演算法收斂。最佳 primal 與 dual 還滿足 complementary slackness：

$$x_j(c_j - A_j^T y) = 0.$$

也就是變數為正時其 reduced cost 為零。對偶變數可讀成需求變動的邊際價格，但只在目前最優基底仍有效的局部範圍內。

退化（degeneracy）是某個基本變數為零，可使多個基底對應同一頂點；極小 pivot 是數值風險，不等同於退化。內點法常用

## 單體法、對偶與數值注意事項 (續)

$$Ax = b, \qquad A^T y + s = c, \qquad x_j s_j = \mu > 0$$

描述中央路徑，再以 Newton 法解線性化修正並讓 $\mu \downarrow 0$。輸出時須同時報告 solver 狀態、原問題／對偶 residual、duality gap 與 conditioning，不能只貼一個最優向量。



## 一次完整換基與對偶證書

沿用 $\min 5x_1 + 3x_2 + 8x_3$，限制為 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$、$x \geq 0$。初始基底選 $x_3$，有 $B = [2]$、$c_B = 8$，因此

$$x_3 = 2 - \tfrac{1}{2}x_1 - \tfrac{1}{2}x_2, \qquad z = 16 + x_1 - x_2.$$

$x_2$ 的 reduced cost 為 $-1$，讓它進入。方向分母為 $B^{-1}a_2 = 1/2 > 0$，比值 $2/(1/2) = 4$，所以 $x_2$ 增加到 $4$，$x_3$ 恰降為零。換基後：

$$x_2 = 4 - x_1 - 2x_3, \qquad z = 12 + 2x_1 + 2x_3.$$

所有非基變數的係數皆非負，所以 $x = (0, 4, 0)^T$、$z = 12$ 最優。一般的證明也是將 $x_B = B^{-1}b - \sum_{j \notin B} B^{-1}a_j x_j$ 代回目標，得到 $z = c_B^T B^{-1} b + \sum_{j \notin B} \bar{c}_j x_j$；當 $x_j \geq 0, \bar{c}_j \geq 0$，整個可行域都不會有更小值。

對偶選 $y = 3$，則 $A^T y = (3, 3, 6)^T \leq (5, 3, 8)^T$，對偶值 $4y = 12$。原問題與對偶皆可行且同值，提供獨立的最優證書。正的 $x_2$ 對應緊束的第二個對偶限制；其餘兩項鬆弛量皆為 $2$。

## 零比值是合法的退化換基

考慮 $\min -x_1$，限制 $x_1 + s_1 = 0$、$x_1 + s_2 = 1$，所有變數非負。以 $(s_1, s_2)$ 為初始基底時，$(x_1, s_1, s_2) = (0, 0, 1)$。讓 $x_1$ 增加 $t$：

| 限制 | 基本變數隨 t 的變化 | 正分母 | 非負比值 |
|---|---|---|---|
| 1 | $s_1 = 0 - t$ | 1 | 0 |
| 2 | $s_2 = 1 - t$ | 1 | 1 |

最小比值是 0，所以 $s_1$ 離開、$x_1$ 進入，但點仍停在同一個可行頂點。若排除零比值而取 $t = 1$，便使 $s_1 = -1$，立即違反可行性。

換基後 $x_1 = -s_1$、$s_2 = 1 + s_1$、目標為 $s_1 \geq 0$，所以原點的目標 0 最優。退化換基可能不改善目標；多次退化甚至可能循環。精確單體法可採 Bland 規則：在所有可改善的非基變數中選索引最小者進入；最小比值平手時選基本變數索引最小者離開。這個規則用於避免循環，不能以忽略零比值取代。



## 函數作為向量

在 $L^2([0, 2\pi])$ 定義

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) g(x)\, dx.$$

複函數要把第一個引數取共軛。$L^2$ 的元素嚴格說是「幾乎處處相等」的函數等價類；若不取等價類，只在單一點非零的函數也會有零範數，違反正定性。可積條件為

$$\|f\|^2 = \int_0^{2\pi} |f(x)|^2\, dx < \infty.$$

$1, \cos nx, \sin nx$ 在此內積下互相正交。例如

$$\int_0^{2\pi} \sin x \cos x\, dx = 0.$$

無限三角系統還要討論完備性（closure）與收斂，才成為 Hilbert 空間的基底。逐點收斂需要額外條件；$L^2$ 收斂是本節使用的自然框架。

## Fourier 係數是投影

先看有限截斷：

$$f_N(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

與每個基底函數取內積；正交性會消去其他項：

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\, dx,$$
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx\, dx,$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx\, dx.$$

這些公式就是投影到所選三角子空間的最小平方係數。以 $2\pi$-週期延拓理解，奇函數的 cosine 係數為零；偶函數的 sine 係數為零。這裡的奇偶性相對於原點，不能只看函數在 $[0, 2\pi]$ 上的局部外形。

令 $e_N = f - f_N$。由於 $e_N$ 與每個已投影的基底函數正交，



## Fourier 係數是投影 （續）

$$\|f\|^2 = \|f_N\|^2 + \|e_N\|^2.$$

因此加入下一個獨立正交模態只會把該模態的能量從誤差移到截斷；係數為零的模態不會改變結果。這個 Bessel／Parseval 關係不保證逐點或均勻收斂。收斂速度取決於平滑性、跳躍與邊界條件；有跳躍時，有限截斷會在跳躍附近產生 Gibbs 振盪。

## 齊次座標

$\mathbb{R}^3$ 的仿射轉換

$$y = Rx + t$$

可在齊次座標中寫成線性矩陣：

$$\begin{bmatrix} y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}.$$

平移矩陣為

$$T(t) = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

縮放矩陣為

$$S(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} \operatorname{diag}(s_x, s_y, s_z) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

齊次座標把

$$(x_0, x_1, x_2, w) \sim (\lambda x_0, \lambda x_1, \lambda x_2, \lambda w)$$



## 齊次座標 （續）

在 $\lambda \neq 0$ 且齊次向量不是全零時，視為同一個射影點。有限點可正規化為 $w = 1$；方向向量使用 $w = 0$，所以平移不改變方向。

## 組合圖學轉換

繞點 $p$ 旋轉的步驟是：先把 $p$ 平移到原點，旋轉，再平移回去。以 column vector（欄向量）書寫：

$$T(p)R_\theta T(-p)x.$$

矩陣乘法的順序很重要，最右邊的轉換先作用。

通過原點、單位法向量 $n$ 的平面投影與反射為

$$P = I - nn^T, \qquad M = I - 2nn^T.$$

平面有位移量時，使用齊次平移把它移到原點，投影或反射後再移回。透視投影會先保留非零的齊次分量，再做除法；例如眼睛位於原點、影像平面為 $z = d > 0$ 時，可寫成

$$P_{\text{persp}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix}.$$

對點 $[x, y, z, 1]^T$，得到 $[x, y, z, z/d]^T$，再除以 $z/d$ 就是以眼睛為透視中心的二維影像座標。這是射影轉換，除非齊次座標的除法恰好為常數，否則不保持仿射幾何。裁剪與深度慣例依圖學 API。



## 有限體與 Hill cipher

質數 $p$ 對應的有限體為

$$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\},$$

加、乘都以 $p$ 取模。每個非零元素都有乘法反元素。矩陣 $K \in \mathbb{F}_p^{n \times n}$ 可逆，若且唯若

$$\det K \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

編碼為

$$y = Kx \pmod{p}.$$

解碼為

$$x = K^{-1}y \pmod{p}.$$

這就是 Hill cipher。例如取 $p = 29$、

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix},$$

則 $\det K = -1 \equiv 28 \pmod{29}$，所以可逆。仿射版本再加上 $b$，等於在訊息空間中作平移。

## 安全性與章末檢查

Hill cipher 是線性密碼。已知明文可建立 $K$ 的線性方程；key 很小時也可暴力搜尋。它只適合示範有限體上的線性代數，沒有現代密碼安全性。

本章應能：

- 由連通性決定關聯矩陣的秩與零空間；
- 用接地消除 Laplacian 的 constant nullspace；
- 從 $A^TCA$ 建立 network 或 stiffness equation；
- 計算 Markov steady state 與 second eigenvalue 的收斂速度；
- 以 spectral radius 判斷 productive economy；
- 把 LP 的 constraints、vertices、simplex 與 duality 連起來；
- 以 orthogonal projection 求 Fourier coefficients；
- 維持 homogeneous point 與 direction 的 $w$ convention；
- 在有限體先檢查 modular determinant 再解碼。

下一章把上述 identities 變成可執行 algorithms，並量化它們的 numerical error。



## 參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 三個不能混淆的目標

數值線性代數同時追求：

1. **速度**：flops、記憶體、communication 與 parallelism。
2. **準確度**：計算結果離精確解多遠。
3. **穩定性**：演算法的捨入誤差是否可解釋為輸入的小擾動；這要與問題本身對擾動的敏感性分開。

精確公式不等於穩定演算法；$\det A = 1$ 也不保證逆映射對擾動不敏感。數學上非奇異的矩陣仍可能有很差的數值條件。

誤差必須指定度量：

$$\text{absolute error } \|x - \widehat{x}\|, \qquad \text{relative error } \frac{\|x - \widehat{x}\|}{\|x\|},$$
$$\text{residual } \|b - A\widehat{x}\|.$$

沒有範數、尺度與容差的「誤差很小」無法驗證。



## 浮點運算與後向誤差

浮點運算的基本模型是

$$\mathrm{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta), \qquad |\delta| \le u,$$

其中 $u$ 是單位捨入誤差，假設輸入為已表示的數值、採正常捨入，且未溢位或進入需另處理的下溢範圍。相消不必破壞單次操作的相對模型，但會暴露輸入先前的誤差。累積誤差也受成長因子與條件數影響。

接近相等的數相減會失去有效位數：

$$1.0000001 - 1.0000000 = 1 \cdot 10^{-7}.$$

後向誤差問計算值 $\widehat{x}$ 是否精確解出附近問題：

$$(A + \Delta A)\widehat{x} = b + \Delta b.$$

後向穩定只保證 $\Delta A, \Delta b$ 小；前向誤差仍可能被條件數放大。

## Gaussian elimination 與 multipliers

對 pivot $d$ 與下方元素 $a_{ik}$，乘數為

$$\ell_{ik} = \frac{a_{ik}}{d}.$$

小 pivot 可能產生大乘數，放大既有的捨入誤差。部分選主元在目前 column 選絕對值最大的元素：

$$|d| = \max_{i \geq k} |a_{ik}|.$$

因此 $|\ell_{ik}| \leq 1$，可控制一個常見的成長來源。部分選主元不保證所有矩陣的 growth 最小；特殊結構可能需要完整選主元或 rook pivoting。

消去結果寫成

$$PA = LU.$$

置換矩陣 $P$ 必須與乘數一起處理。實作時只交換 $U$ 的 rows，卻沒有同步交換下三角部分儲存的乘數，是常見錯誤。



## Factorization 與 solve workflow

稠密矩陣 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的主要成本為

- 帶選主元的 $LU$：$\frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$ flops；
- 前代 $Ly = Pb$：$O(n^2)$；
- 回代 $Ux = y$：$O(n^2)$。

分解建好後，多個右端向量可重複使用，比每次重做三次方的消去便宜。

安全的求解流程：

1. 帶選主元做分解；
2. 估計範數與條件數；
3. 求解；
4. 計算真實殘差；
5. 需要時做迭代改進；
6. 記錄誤差界與尺度假設。

## Factorization 與 solve workflow （續）

不要只看 $\det A$ 或 pivot 是否等於零。行列式可能溢位／下溢，且其大小本身不是尺度不變的條件數指標。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 稀疏矩陣與填入

大型工程矩陣通常稀疏。直接儲存 $n^2$ 個零元素會浪費記憶體，乘法也浪費工作量。

消去是否能保持零元素，取決於排序。星形圖若先消除中央變數，會把所有葉節點連成稠密團；先消除 leaves 可大幅降低填入。

稀疏圖的判讀方式是

- 變數是節點；
- 非零的非對角元素是邊；
- 消除一個節點時，尚未消除的鄰居之間會產生填入邊。

最小度排序、巢狀剖分與反向 Cuthill-McKee 等方法可降低填入或頻寬。平行系統還要考慮通訊與負載平衡，填入數量不是唯一成本。

以下固定同一個小型消去例，

$$A = \begin{bmatrix} 0.001 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

不交換列時，第一個 multiplier 是 $1/0.001 = 1000$，消去後得到

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 稀疏矩陣與填入 （續）

$$U = \begin{bmatrix} 0.001 & 1 \\ 0 & -999 \end{bmatrix}.$$

交換兩列後，multiplier 只有 $0.001$，且

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0.999 \end{bmatrix}.$$

兩條路徑在精確算術都給同一解

$$x = \left( \frac{1000}{999}, \frac{998}{999} \right)^T, \qquad Ax - b = 0.$$

圖下半部另以 star graph 顯示 ordering 的稀疏效果。中心先消去時，三個 leaves 兩兩形成三條 fill edges；葉節點先消去時新增 fill edges 為零。數值 growth 與 sparse fill 是兩種不同成本，不能只看同一個 multiplier 或同一個 edge count。

若矩陣的上下頻寬分別為 $p, q$，只保存 band 內元素可用 $O(n(p+q))$ 記憶體；無 pivot 的 band elimination 約需 $O(npq)$ 工作量，三角求解約 $O(n(p+q))$。三對角矩陣是 $p = q = 1$，因此 LU 與求解都只需 $O(n)$。這些成本結果要求 pivot 不破壞頻寬；需要選主元時，必須把置換與更新後的頻寬一併分析。



## 稀疏矩陣與填入 （續）

Pivoting：multiplier 大小與同一解

**不交換列**

A=[[0.001,1],[1,1]]

$\ell_{21}$=1000

U=[[0.001,1],[0,-999]]

**x=(1000/999,998/999)，Ax-b=0**

**部分選主元**

先交換兩列

$\ell_{21}$=0.001

U=[[1,1],[0,0.999]]

## 稀疏矩陣與填入 （續）

消去排序：星形稀疏圖的 fill edges









## 正定消去與 Cholesky

若 $A = A^T$ 正定，對稱消去可寫成

$$A = LDL^T,$$

其中 $L$ 是單位下三角矩陣，$D$ 是正對角矩陣。取

$$R = LD^{1/2}, \qquad A = RR^T$$

得到 Cholesky 分解。它只儲存一個三角部分，約需 $n(n+1)/2$ 個數值元素，領先項成本 $n^3/3$，是一般 LU 的一半。存在性也可由歸納證明：正定矩陣的第一主元 $a_{11} > 0$，消去後

$$S = A_{22} - \frac{1}{a_{11}} a_{21} a_{21}^T$$

仍是正定 Schur 補矩陣，因為對任意 $y \neq 0$，把 $[-(a_{21}^T y)/a_{11};\ y]$ 代入 $x^T A x > 0$ 即得 $y^T S y > 0$。歸納後所有對角 pivots 都正。

正 pivots 同時提供正定性檢查。為 least squares 先形成 $A^T A$ 會使 $\kappa_2(A^T A) = \kappa_2(A)^2$，並可能造成溢位；較佳做法是直接對 $A$ 做穩定 QR。

## 穩定 QR 與 Householder 反射

Householder 反射矩陣為

$$H = I - 2\frac{vv^T}{v^Tv}.$$

當 $v \neq 0$，它是對稱正交矩陣，故 $H^TH = I$。對非零 $x$，取 $\alpha = -\operatorname{sign}(x_1)\|x\|$（$x_1 = 0$ 時取 sign 為 1），$v = x - \alpha e_1$。由 $v^Tx = \|x\|^2 - \alpha x_1$、$v^Tv = 2(\|x\|^2 - \alpha x_1)$，得 $Hx = \alpha e_1$。此符號選擇避免 $v_1$ 相減消去有效位數。連續反射 matrices 給

$$R = H_k \cdots H_1 A, \qquad Q = H_1 \cdots H_k,$$

所以 $A = QR$。

Householder QR 通常比古典 Gram-Schmidt 更能保持 $Q$ 的正交性，是稠密最小平方的標準方法。

對滿 column rank 的超定系統 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$m \geq n$，rank $n$，使用完整正交矩陣 $Q \in \mathbb{R}^{m\times m}$：

$$Q^TA = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad Q^Tb = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$



## 穩定 QR 與 Householder 反射 （續）

其中 $R$ 是 $n \times n$ 可逆上三角矩陣。最小平方解解前 $n$ 列：

$$Rx = c_1.$$

若改用薄型分解 $A = Q_1R$，則 $Q_1 \in \mathbb{R}^{m\times n}$，此時才寫 $Rx = Q_1^Tb$。完整 $Q^Tb$ 有 $m$ 個分量，不能直接放在 $n$ 個方程的右端。

最小殘差平方是 $\|c_2\|_2^2$。不要形成 $A^TA$ 或顯式 $R^{-1}$。稠密 Householder QR 的領先成本約 $2mn^2 - \frac{2}{3}n^3$ flops；形成 $Q$ 會再增加儲存與成本，若只求解則可只套用 reflectors。

Givens 旋轉 $G_{ij}$ 除了第 $i, j$ 列與行交叉的 $2 \times 2$ 區塊外都與單位矩陣相同；一次可將選定的一個元素消成零：

$$G_{ij} = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}, \qquad c^2 + s^2 = 1.$$

它精確保持正交且容易局部平行化，適合 sparse 或帶狀結構；稠密矩陣通常用 Householder，因為每個反射能一次清除整段 column，成本較低。

## 特徵值的冪法與 QR 迭代

稠密非對稱特徵值問題通常採 QR 迭代，不以高次特徵多項式求根。先在可得的主導特徵值上比較冪法：若

$$A = X\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)X^{-1}, \qquad |\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \cdots,$$

且初始向量在 $\lambda_1$ 的特徵向量方向有非零分量，則 $A^k v_0$ 的方向趨近 $\lambda_1$ 的特徵向量，速度由 $|\lambda_2/\lambda_1|^k$ 控制。每一步應正規化，避免溢位或下溢。若最大模 eigenvalue 有相同大小，例如旋轉矩陣，方向不會唯一收斂。

反冪法解

$$(A-\mu I)w_{k+1} = w_k$$

再正規化，會放大最接近位移 $\mu$ 的特徵向量。Rayleigh quotient

$$\mu_k = \frac{w_k^T A w_k}{w_k^T w_k}$$

常作下一次位移；若 $A-\mu I$ 幾乎奇異，需檢查 solver 狀態，不能把 breakdown 誤當精確收斂。



## 特徵值的冪法與 QR 迭代 （續）

反冪法的方向收斂敘述承接可對角化假設，還要求 $\mu$ 不是特徵值、唯一的 $\lambda_j$ 與 $\mu$ 距離最小，且初始向量在該特徵方向的係數非零。因 $(A-\mu I)^{-1}$ 的特徵值是 $(\lambda_i-\mu)^{-1}$，條件正好化為冪法的唯一最大模條件；兩個特徵值等距時不保證收斂到唯一方向。實對稱矩陣的 Rayleigh 商可用實向量；複數問題應使用 $w^H A w/(w^H w)$。

QR 方法的 unshifted step 為

$$A_k = Q_k R_k, \qquad A_{k+1} = R_k Q_k.$$

因

$$A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k,$$

所以每一步都是 similarity transform，eigenvalues 不變。適當 shift 與 deflation 可收斂到 Schur form。複數算術下是上三角；實算術下可能是含 $2\times 2$ 共軛特徵值區塊的準上三角，不能只讀每個對角項。未位移 QR 不保證任意矩陣收斂到三角形，例如平面旋轉。

Shifted QR：

$$A_k - \mu_k I = Q_k R_k, \qquad A_{k+1} = R_k Q_k + \mu_k I$$

## 特徵值的冪法與 QR 迭代 （續）

可加速收斂。實作常先化為 Hessenberg，再做 implicit QR；對稱矩陣則先做三對角縮減。Hessenberg 結構把每一步 QR 的領先工作從 $O(n^3)$ 降到 $O(n^2)$；對稱三對角版本更便宜。大型稀疏矩陣可能需要 Lanczos（Hermitian）或 Arnoldi（general），只保留低維投影再解小特徵值問題；若目標是少數極端特徵值，通常比形成完整分解划算。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 依矩陣結構選擇演算法

演算法選擇取決於結構、條件數與所需輸出：

- 一般稠密 $Ax = b$：帶選主元的 $LU$；
- 對稱正定：Cholesky；
- overdetermined least squares：Householder QR；
- 大 sparse SPD：preconditioned CG；
- 大 nonsymmetric sparse：GMRES 或 BiCGStab 類方法；
- 長方形矩陣的低秩分析：SVD；
- 稠密非對稱特徵值問題：Hessenberg QR 迭代；
- 對稱特徵值問題：三對角縮減與對稱 QR；
- 奇異值：雙對角 SVD 演算法。

沒有普遍最佳的演算法。分塊與硬體會改變常數，但數學結構先決定方法。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 向量與矩陣範數

常用向量範數為

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \left( \sum_i |x_i|^2 \right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

誘導矩陣範數定義為

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

二範數下，由 SVD $A = U\Sigma V^T$ 可知

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A).$$

其他常用形式為

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Frobenius 範數為



## 向量與矩陣範數 （續）

$$\|A\|_F = \left( \sum_{ij} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

它把矩陣視為長向量計量，通常不是誘導算子範數。所有誘導範數都滿足次乘法性 $\|AB\| \le \|A\|\|B\|$：對每個 $x$，先用 $\|ABx\| \le \|A\|\|Bx\| \le \|A\|\|B\|\|x\|$，再對所有單位向量取最大值。Frobenius 範數也滿足此不等式，但一般不是這個誘導最大成長率。

## 條件數

可逆矩陣 $A$ 的條件數為

$$\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|.$$

右端擾動的相對誤差界為

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \le \kappa(A)\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}.$$

矩陣擾動的一階近似（精確界見下文）為

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \lesssim \kappa(A)\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}.$$

二範數下，

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 條件數 （續）

右端界由 $\Delta x = A^{-1}\Delta b$ 與 $\|b\| \le \|A\|\|x\|$ 相乘得到，要求 $b \neq 0$。若只擾動矩陣，令 $\epsilon_A = \|\Delta A\|/\|A\|$，並要求 $\kappa(A)\epsilon_A < 1$，則 $(I + A^{-1}\Delta A)\Delta x = -A^{-1}\Delta A x$，Neumann 級數給精確界 $\|\Delta x\|/\|x\| \le \kappa(A)\epsilon_A/[1 - \kappa(A)\epsilon_A]$。大 condition number 表示問題本身敏感，不代表演算法一定寫錯。縮放會改變所用的擾動度量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 逆矩陣本身的條件數與精確擾動界

設 $A$ 可逆，$B = A + E$，使用相容的誘導範數。若 $\nu = \|A^{-1}E\| < 1$，Neumann 級數給 $(I + A^{-1}E)^{-1}$，因此 $B$ 仍可逆，且

$$B^{-1} = (I + A^{-1}E)^{-1}A^{-1}, \qquad B^{-1} - A^{-1} = -B^{-1}EA^{-1}.$$

由 $\|B^{-1}\| \le \|A^{-1}\|/(1-\nu)$，令 $\varepsilon = \|E\|/\|A\|$，在 $\kappa(A)\varepsilon < 1$ 時得到

$$\frac{\|B^{-1} - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \le \frac{\kappa(A)\varepsilon}{1 - \kappa(A)\varepsilon}.$$

逆矩陣映射的一階變化是 $D\,\mathrm{inv}_A[E] = -A^{-1}EA^{-1}$，而不是逐元素取倒數。二範數下，這個相對條件數恰為 $\kappa_2(A)$，不只是上界：寫 $A = U\Sigma V^T$，沿最小奇異值方向取 $E = -\delta u_n v_n^T$，其中 $0 < \delta < \sigma_n$。其餘奇異方向不變，最小方向由 $\sigma_n$ 減為 $\sigma_n - \delta$，所以

$$\frac{\|(A+E)^{-1} - A^{-1}\|_2}{\|A^{-1}\|_2} = \frac{\delta}{\sigma_n - \delta} = \frac{\kappa_2(A)(\delta/\sigma_1)}{1 - \kappa_2(A)(\delta/\sigma_1)}.$$

這個擾動使上界取等號；$\delta \uparrow \sigma_n$ 時接近奇異邊界。固定 $b$ 的解向量敏感度、逆矩陣整體敏感度與演算法後向穩定性，是三個不同的敘述。



## 殘差、誤差與可驗證檢查

令真解為 $x$、計算解為 $\widehat{x}$：

$$e = x - \widehat{x}, \qquad r = b - A\widehat{x} = Ae.$$

所以

$$e = A^{-1}r, \qquad \|e\| \le \|A^{-1}\|\|r\|.$$

小殘差只有在 $\|A^{-1}\|$ 可控時，才保證小的前向誤差。

例：$A = 10^{-12}$、真解 $x = 1$、計算解 $\widehat{x} = 1 + \delta$，則

$$r = -10^{-12}\delta$$

可以極小，relative error 卻仍是 $\delta$。

這個一維例子的相對條件數其實是 1；它展示絕對殘差受尺度影響，不是展示相對病態。相對殘差 $|r|/|b| = |\delta|$ 與相對解誤差仍相同。

正規化後向誤差為

## 殘差、誤差與可驗證檢查 （續）

$$\eta = \frac{\|r\|}{\|A\|\|\widehat{x}\| + \|b\|}.$$

$\eta$ 小表示此計算結果具有小的 normwise 後向誤差，不能單憑一次結果宣稱整個演算法對所有輸入都後向穩定。此處分母使用已算出的 $\widehat{x}$，不是未知真解。前向誤差仍由條件數控制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 特徵值與奇異向量的條件

若矩陣可對角化：

$$A = X\Lambda X^{-1},$$

特徵值擾動可能被 $\kappa(X) = \|X\|\|X^{-1}\|$ 放大。正規矩陣有正交歸一特徵基底，特徵值的條件通常較好。

非正規矩陣可能特徵值聚在一起，卻有敏感的特徵向量與很大的暫態放大。

奇異值的擾動較穩定。Weyl 不等式為

$$|\sigma_i(A + E) - \sigma_i(A)| \le \|E\|_2.$$

但奇異值彼此很接近時，奇異向量仍可能敏感。Numerical rank 需要容差與應用背景。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 數值秩與偽逆門檻

若

$$\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r \gg \sigma_{r+1} \geq \cdots,$$

常用門檻

$$\sigma_i > \tau \sigma_1$$

來判斷數值秩。$\tau$ 需考慮機器精度、維度與資料雜訊。

截斷偽逆為

$$A_\tau^+ = V_r \operatorname{diag}(\sigma_1^{-1}, \ldots, \sigma_r^{-1}) U_r^T.$$

它精確解出截斷模型，不是原完整矩陣的精確逆。報告時要附 $\tau$、rank、residual 與誤差度量。



## 定常迭代的分割

選定分割

$$A = S - T,$$

其中求解 $S$ 較便宜。原方程等價於

$$Sx = Tx + b.$$

迭代為

$$Sx_{k+1} = Tx_k + b.$$

令

$$G = S^{-1}T, \qquad c = S^{-1}b,$$

則

$$x_{k+1} = Gx_k + c.$$

與精確解相減，得

$$x - x_{k+1} = G^{k+1}(x - x_0).$$

## 定常迭代的分割 （續）

對可逆 $S$ 且 $Ax=b$ 有唯一解時，所有初始猜測都收斂，若且唯若

$$\rho(G)<1.$$

證明：若所有初始誤差皆衰減，取複特徵向量可知每個特徵值模必小於 $1$。反之，Jordan 分塊的 $G^k$ 項是有限次多項式乘 $\lambda^k$，$|\lambda|<1$ 使其趨零。因此 $G^k\to 0$。這是 spectral-radius 條件，不是逐元素比較 $S$ 與 $T$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## Jacobi、Gauss-Seidel 與 SOR

固定 $A=D+L+U$，其中 $L,U$ 是原矩陣的嚴格下、上三角部分，且假設所有 $a_{ii}\neq 0$。Jacobi 方法取

$$S=D,\qquad T=-(L+U),$$

$$x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j\neq i}a_{ij}x_j^{(k)}\right).$$

所有更新使用舊值，容易平行化。

Gauss-Seidel 方法取

$$S=D+L,\qquad T=-U,$$

新算出的下三角數值立即使用：

$$x_i^{(k+1)}=\frac{1}{a_{ii}}\left(b_i-\sum_{j<i}a_{ij}x_j^{(k+1)}-\sum_{j>i}a_{ij}x_j^{(k)}\right).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Jacobi、Gauss-Seidel 與 SOR （續）

嚴格列對角優勢使 Jacobi 的 $\|G_J\|_\infty < 1$，亦可保證 Gauss-Seidel 收斂。SPD 保證 Gauss-Seidel 收斂，但不保證 Jacobi；例如對角為 $1$、其餘項為 $0.9$ 的 $3 \times 3$ SPD 矩陣，其 Jacobi 迭代矩陣有特徵值 $-1.8$，故發散。

SOR 逐分量 relaxation，必須使用本輪已更新的 relaxed lower components：

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^{(k)}\right).$$

對 SPD，$0 < \omega < 2$ 保證 SOR 收斂，$\omega = 1$ 即 Gauss-Seidel。不可先完成一整輪未鬆弛的 GS 再將整個向量平均，因為那是不同的迭代矩陣。收斂可由每次座標能量改變 $\phi(x_{\text{new}}) - \phi(x_{\text{old}}) = -\omega(2-\omega)r_i^2/(2a_{ii}) \le 0$ 證明；若一輪仍有非零殘差則嚴格下降，SPD 使能量有下界，故各座標的能量下降量趨零，進而每次更新量 $\omega r_i/a_{ii}$ 趨零。固定有限個座標下，同一輪各中間點的差也趨零，故各座標更新前的殘差趨零推出輪首整個殘差向量趨零。由 $x_* - x = A^{-1}r$，迭代收斂到唯一解。



## 收斂與失敗例子

對

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix},$$

Jacobi 矩陣

$$G_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 \\ -1/3 & 0 \end{bmatrix}.$$

因

$$G_J^2 = \begin{bmatrix} 1/12 & 0 \\ 0 & 1/12 \end{bmatrix},$$

故

$$\rho(G_J) = 1/\sqrt{12} < 1,$$

Jacobi 收斂。

對角為零的矩陣

## 收斂與失敗例子 （續）

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

無法直接套 Jacobi，因為會除以零。置換變數有時可修正，但非零對角線本身不保證收斂。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 對稱正定系統的共軛梯度法

實對稱正定 $A$ 的 $A$-內積為

$$\langle u, v \rangle_A = u^T A v.$$

二次能量為

$$\phi(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x.$$

其唯一最小值點就是 $Ax = b$ 的解。CG 在 Krylov 子空間中選擇 $A$-正交搜尋方向；精確算術下最多 $n$ 步到達精確解。

共軛梯度法（CG）要求實對稱正定 $A$，並指定初值 $x_0$（未指定時取零向量）、非負容許值 $\mathrm{atol}, \mathrm{rtol}$ 與迭代上限。令 $\tau = \max(\mathrm{atol}, \mathrm{rtol}\|b\|_2)$，先算 $r_0 = b - Ax_0$。若 $\|r_0\|_2 \le \tau$，立即回傳 $x_0$，不計算任何步長；否則令 $p_0 = r_0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 對稱正定系統的共軛梯度法 （續）

第 $k$ 輪計算 $q_k = Ap_k$、$\alpha_k = (r_k^T r_k)/(p_k^T q_k)$，再更新 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$、$r_{k+1} = r_k - \alpha_k q_k$。新殘差達門檻時，用原方程重算 $b - Ax_{k+1}$ 確認後回傳。否則算 $\beta_k = (r_{k+1}^T r_{k+1})/(r_k^T r_k)$，令 $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$。精確算術的非零搜尋方向滿足 $p_k^T A p_k > 0$；浮點計算若分母非正或非有限數，應回報數值失敗，不能當成收斂。若遞迴殘差已過門檻、真實殘差卻未過，則以真實殘差取代遞迴殘差，重新令 $p = r$ 開始新一輪方向建構，不能沿用幾乎為零的舊殘差。達迭代上限但真實殘差仍超標，回報未收斂。

CG 初始化：先算 $r_0$，再決定是否進入迭代

**若未達門檻，才建立 $p_0=r_0$ 並進入迭代。**



## 對稱正定系統的共軛梯度法 （續）

CG 迭代：分母檢查、更新與真實殘差

真實殘差達標：收斂；未達且已到上限：iteration_limit

遞迴殘差達標、真實未達：$r \leftarrow b-Ax$，$p \leftarrow r$（重啟）

其餘未達標情形：計算 $\beta$、更新 $p$，再回到 $q=Ap$

基例 $A = [1], b = [0], x_0 = [0]$ 的初始殘差為零，零輪返回；直接算步長會得到 $0/0$。非零例取 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, b = (1,2)^T, x_0 = 0$。第零輪 $r_0 = p_0 = (1,2)^T$、$Ap_0 = (6,7)^T$，故 $\alpha_0 = 5/20 = 1/4$，$x_1 = (1/4, 1/2)^T$、$r_1 = (-1/2, 1/4)^T$。再得 $\beta_0 = 1/16$、$p_1 = (-7/16, 3/8)^T$、$\alpha_1 = 4/11$，所以 $x_2 = (1/11, 7/11)^T$，直接代回得 $Ax_2 = b$。

## 對稱正定系統的共軛梯度法 （續）

精確線搜尋與上述 $\beta_k$ 使殘差兩兩正交、搜尋方向兩兩 $A$-共軛。非零共軛方向線性獨立，至多 $n$ 個，故精確算術在至多 $n$ 個非平凡步驟終止。浮點算術可能失去正交性，因此有限終止定理不能取代殘差準則。每輪一次矩陣向量乘法與常數次向量內積，時間為 $O(\mathrm{nnz}(A)+n)$，記憶體只保留固定數量的長度 $n$ 向量，不形成逆矩陣。

在標準誤差能量範數下，有

$$\|x-x_k\|_A \le 2\left(\frac{\sqrt{\kappa_2(A)}-1}{\sqrt{\kappa_2(A)}+1}\right)^k \|x-x_0\|_A.$$

這個界顯示 ill-conditioned 系統可能很慢，但 eigenvalue 聚集成少數群時，通常比只依 $\kappa_2$ 的估計更快。CG 的標準形式要求 $A$ 和 preconditioner 都維持 SPD。



## 同一個 CG 數例的兩種幾何

沿用 $A=\begin{bmatrix}4&1\\1&3\end{bmatrix}$、$b=(1,2)^T$、$x_0=0$。左圖在參數空間畫搜尋路徑；右圖在殘差空間畫 $r_k=b-Ax_k$。




每個面板內，水平與垂直方向使用相同尺度。

## A-共軛不等於歐氏正交

令 $F(x)=\frac{1}{2}x^TAx-b^Tx$，$x_*=(1/11,7/11)^T$。本例的實際狀態是

| k | $x_k$ | $r_k$ | $F(x_k)-F(x^*)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | (0,0) | (1,2) | 15/22 |
| 1 | (1/4,1/2) | (−1/2,1/4) | 5/88 |
| 2 | (1/11,7/11) | (0,0) | 0 |

$p_0=(1,2)^T$、$p_1=(-7/16,3/8)^T$，所以

$$p_0^TAp_1=0,\qquad p_0^Tp_1=5/16\neq 0.$$

右圖卻有 $r_0^Tr_1=0$。殘差的直角不能移到左圖兩段搜尋路徑上。CG 極小化能量誤差 $F(x_k)-F(x_*)=\frac{1}{2}\|x_k-x_*\|_A^2$。



## 殘差二範數不一定每步下降

另取 $A=\mathrm{diag}(1,100)$、$b=(1,1/10)^T$、$x_0=0$。第一步

$$\alpha_0=\frac{101/100}{2}=\frac{101}{200},\quad x_1=(101/200,101/2000)^T,\quad r_1=(99/200,-99/20)^T.$$

真解為 $x_*=(1,1/1000)^T$。

| k | $\|r_k\|_2^2$ | $F(x_k)-F(x^*)$ |
|---|---|---|
| 0 | 101/100 = 1.01 | 10001/20000 = 0.50005 |
| 1 | 989901/40000 = 24.747525 | 9801/40000 = 0.245025 |

能量誤差下降，殘差二範數卻上升。這不違反精確算術的 CG 定理；殘差停止準則仍有用，但不能假設它逐步單調。

## CG 的正確性：Krylov 空間與能量極小性

以下完全使用精確算術。令真解為 $x_*$，定義 $\mathcal{K}_0 = \{0\}$ 與

$$\mathcal{K}_k = \operatorname{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}.$$

第 $k$ 輪開始時，歸納維持：舊方向 $p_0, \dots, p_{k-1}$ 張成 $\mathcal{K}_k$ 且兩兩 $A$-共軛；$x_k \in x_0 + \mathcal{K}_k$；$r_k = b - Ax_k \perp \mathcal{K}_k$。這也證明 $x_k$ 是該仿射空間的唯一能量極小點，因為對 $z \in \mathcal{K}_k$，

$$\phi(x_k + z) - \phi(x_k) = -z^T r_k + \tfrac{1}{2} z^T A z = \tfrac{1}{2} z^T A z,$$

非零 $z$ 時嚴格為正。$k = 0$ 時不變量直接成立。又 $r_k = r_0 - A(x_k - x_0) \in \mathcal{K}_{k+1}$；若 $r_k \neq 0$，它與 $\mathcal{K}_k$ 正交，必增加一個獨立方向。

$k = 0$ 取 $p_0 = r_0$；$k \geq 1$ 時令 $p_k = r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}$。對 $i \leq k - 2$，$Ap_i \in \mathcal{K}_{i+2} \subseteq \mathcal{K}_k$，故 $p_i^T A r_k = (Ap_i)^T r_k = 0$；配合舊方向的共軛性，只需消去與上一個方向的 $A$-內積：

$$\beta_{k-1} = -\frac{p_{k-1}^T A r_k}{p_{k-1}^T A p_{k-1}}.$$

因 $r_k = r_{k-1} - \alpha_{k-1} A p_{k-1}$，而 $r_{k-1} \in \mathcal{K}_k$，得



## CG 的正確性：Krylov 空間與能量極小性 （續）

$$\|r_k\|^2 = -\alpha_{k-1} r_k^T A p_{k-1}.$$

代入 $\alpha_{k-1} = \|r_{k-1}\|^2 / (p_{k-1}^T A p_{k-1})$，正好得到 $\beta_{k-1} = \|r_k\|^2 / \|r_{k-1}\|^2$。因此這個短遞推確實使新方向與所有舊方向共軛。新方向與非零殘差只差舊方向的倍數，故加入它後恰張成 $\mathcal{K}_{k+1}$。

沿新方向最小化能量，導數為 $-p_k^T r_k + \alpha p_k^T A p_k$。由 $p_k^T r_k = \|r_k\|^2$ 得到演算法的 $\alpha_k$。更新後 $p_k^T r_{k+1} = 0$；對 $i < k$，

$$p_i^T r_{k+1} = p_i^T r_k - \alpha_k p_i^T A p_k = 0.$$

故 $r_{k+1} \perp \mathcal{K}_{k+1}$，不變量延續。每個舊殘差 $r_i \in \mathcal{K}_{i+1}$，所以殘差兩兩正交。若 $\sum c_i p_i = 0$，左乘 $p_j^T A$ 得 $c_j p_j^T A p_j = 0$，故非零共軛方向必獨立，至多 $n$ 個。若未提早終止，第 $n$ 步殘差與整個 $\mathbb{R}^n$ 正交，只能為零。這完成有限終止的證明。

## CG 的條件數誤差界從哪裡來

令 $e_k = x_* - x_k$。由能量極小性，CG 在 $x_0 + \mathcal{K}_k$ 中使 $\|e_k\|_A$ 最小。因 $r_0 = Ae_0$，這裡的每個誤差可寫為 $p(A)e_0$，其中 $\deg p \le k, p(0) = 1$。在 $A = Q\Lambda Q^T$ 的特徵座標展開，得到

$$\|e_k\|_A \le \min_{\deg p \le k,\, p(0)=1} \max_{i} |p(\lambda_i)| \, \|e_0\|_A.$$

設 $a = \lambda_{\min} > 0$、$b = \lambda_{\max} > a$。Chebyshev 多項式滿足 $T_k(\cos\theta) = \cos(k\theta)$，故在 $[-1, 1]$ 上絕對值至多 $1$。選

$$p(t) = \frac{T_k\big((b + a - 2t)/(b - a)\big)}{T_k\big((b + a)/(b - a)\big)}.$$

它有 $p(0) = 1$，且把 $[a, b]$ 送入分子的 $[-1, 1]$。由餘弦加法公式得到遞推 $T_{k+1}(z) = 2zT_k(z) - T_{k-1}(z)$，配合 $T_0 = 1, T_1 = z$，可驗證下式。對 $z > 1$，$T_k(z) = (\rho^k + \rho^{-k})/2$，其中 $\rho = z + \sqrt{z^2 - 1}$。令 $\kappa = b/a$，代入 $z = (b + a)/(b - a)$ 得 $\rho = (\sqrt{\kappa} + 1)/(\sqrt{\kappa} - 1)$，所以

$$\|e_k\|_A \le 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|e_0\|_A.$$



## CG 的條件數誤差界從哪裡來 （續）

$a = b$ 時 $A = aI$，非零殘差一次步長 $1/a$ 即解出，需另外處理而非除以 $b - a = 0$。利用特徵值群集可選更好的多項式；此區間界不一定緊。證明依賴精確正交性，浮點實作仍以真實殘差驗收。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 延伸補充：複 Hermitian 正定系統的 CG

本頁是原書 11.3 節之外的嚴謹延伸；原書 CG 段落要求實對稱正定矩陣，不能把同一套 $r^T r$ 公式直接套到複矩陣。若

$$A^H = A, \qquad z^H A z > 0 \quad (z \neq 0),$$

則 $A$ 是 Hermitian 正定矩陣。複內積固定為 $u^H v$，所以例行的實數公式改成

$$r_k = b - A x_k, \qquad \alpha_k = \frac{r_k^H r_k}{p_k^H A p_k},$$

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k, \qquad r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k,$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^H r_{k+1}}{r_k^H r_k}, \qquad p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k.$$

因為 $A$ 是 Hermitian，$p_k^H A p_k$ 是實數；正定性使非零方向的分子、分母都為正。容差仍使用 $\|r_k\|_2 = \sqrt{r_k^H r_k}$，而且必須先計算 $r_0$。若 $r_0 = 0$，立即回傳 $x_0$，不得計算 $0/0$。若使用預條件子，$M$ 也必須是 Hermitian 正定，並採保持對稱性的等價變數變換。實數證明改以共軛內積後仍成立，所有能量與步長為實正數。檢查 $A^T = A$ 不能代替 $A^H = A$；複對稱的 $[i]$ 就沒有實正能量。



## 延伸補充：複 Hermitian 正定系統的 CG （續）

實對稱正定矩陣是上述公式的特例，此時 conjugate 不改變實數。這一區分正是避免把實 SPD 與複 Hermitian PD 混用的必要條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 非對稱系統的 GMRES

本節先令 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。複數版本的 Arnoldi 內積須改用共軛轉置。GMRES 在 Krylov 子空間

$$\mathcal{K}_k(A, r_0) = \operatorname{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{k-1}r_0\}$$

上最小化 residual：

$$\min_{x \in x_0 + \mathcal{K}_k} \|b - Ax\|_2.$$

Arnoldi 從 $v_1 = r_0/\|r_0\|$ 開始，對 $w = Av_j$ 逐一減去 $h_{ij}v_i$，其中 $h_{ij} = v_i^T w$，最後以 $h_{j+1,j} = \|w\|$ 正規化，得到 $AV_k = V_{k+1}\overline{H}_k$。寫 $x = x_0 + V_k y$，則 residual norm 等於 $\|\|r_0\|e_1 - \overline{H}_k y\|_2$，解此小型 least-squares 即得到 GMRES iterate。若 $r_0 = 0$ 直接完成；Arnoldi 零剩餘方向需判斷收斂或 breakdown。Restart 限制 storage，但丟棄舊方向而可能停滯。

非正規矩陣的特徵值大小不足以單獨預測 GMRES 暫態；field of values、pseudospectra 與實際殘差歷程更有資訊。應監控真實殘差，不只遞迴殘差。未重啟的 GMRES 每個 Arnoldi 步驟多做一次矩陣向量乘法與對所有既有方向的正交化工作。$k \le n$ 步後，不含儲存原矩陣的額外空間為 $O(kn)$，時間為 $O(k\,\mathrm{nnz}(A) + k^2 n)$；稠密矩陣的矩陣向量乘法部分是 $O(kn^2)$，不能省略；以 GMRES($m$) 重啟會把空間固定在 $O(mn)$，但可能失去收斂性而停滯。



## GMRES 第一輪：Arnoldi 與殘差最小化

取非對稱可逆矩陣與初值

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_0 = 0.$$

初始殘差為 $r_0 = b$，$\beta = \|r_0\|_2 = 1$，故 $v_1 = e_2 = (0,1)^T$。第一輪 Arnoldi 逐步得到

$$w = Av_1 = (1,1)^T, \quad h_{11} = v_1^T w = 1,$$

$$w \leftarrow w - h_{11}v_1 = (1,0)^T, \quad h_{21} = 1, \quad v_2 = e_1.$$

因此 $\overline{H}_1 = (1,1)^T$。小型最小平方只有一個未知數：

$$\min_{y} \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} y \right\|_2^2 = \min_{y} \big( (1-y)^2 + y^2 \big).$$

由 $4y - 2 = 0$ 得 $y = 1/2$。重建 $x_1 = V_1 y = (0, 1/2)^T$，真實殘差為 $r_1 = b - Ax_1 = (-1/2, 1/2)^T$，所以 $\|r_1\|_2 = 1/\sqrt{2}$。實際檢查 $(Av_1)^T r_1 = 0$；殘差垂直於 **輸出方向** $A\mathcal{K}_1$，不是要求垂直於輸入方向 $\mathcal{K}_1$。

## GMRES 的輸入搜尋與輸出投影

本例輸入空間與輸出空間雖都為 $\mathbb{R}^2$，角色不同。左圖追蹤未知數 $x$；右圖把 $b$ 投影到 $A\mathcal{K}_1 = \text{span}\{(1,1)^T\}$。兩圖座標各自同尺度，右圖的直角對應 $(Av_1)^T r_1 = 0$。




r₁ ⊥ A K₁；不必垂直於輸入空間 K₁



## GMRES 第二輪：零 Arnoldi 餘項與精確終止

已有 $V_2 = [v_1, v_2] = [e_2, e_1]$。第二輪從 $w = Av_2 = e_1$ 開始：

| 運算 | 數值結果 |
|---|---|
| $h_{12} = v_1^T w$ | $0$；$w$ 不變 |
| $h_{22} = v_2^T w = 1$ | 減去 $h_{22}v_2$ 後，$w = (0,0)^T$ |
| $h_{32} = \|w\|_2$ | $0$；不可再除以此值建立 $v_3$ |

此時 Krylov 空間已是整個 $\mathbb{R}^2$，且 $AV_2 = V_2 H_2$，其中

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad H_2 y = \beta e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

第一列得 $y_1 = 1$，第二列得 $y_1 + y_2 = 0$，故 $y = (1,-1)^T$，重建

$$x_2 = V_2 y = e_2 - e_1 = (-1,1)^T, \qquad Ax_2 = (0,1)^T = b.$$

真實殘差為零，故為 happy breakdown（找到精確解的正常終止）。一般零餘項只表示搜尋空間不再擴張，仍須以原方程的殘差判定收斂。

## 預條件子

預條件子 $M \approx A$ 要便宜、可平行，而且讓 $M^{-1}A$ 較容易迭代。左預條件為

$$M^{-1}Ax = M^{-1}b.$$

右預條件先令

$$AM^{-1}y = b, \qquad x = M^{-1}y$$

它改變變數，但保留原殘差的解釋。

常見選擇：

- diagonal/Jacobi；
- block Jacobi；
- incomplete LU 或 incomplete Cholesky；
- algebraic multigrid；
- domain decomposition；
- physics-informed approximation。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 預條件子 （續）

預條件子的價值需比較設定、每輪與通訊總成本，不能只看迭代數。左預處理殘差是 $M^{-1}(b - Ax)$，應另算原問題的真實殘差；用 CG 時應採保持 SPD 的等價對稱變數變換，而非把任意非對稱 $M^{-1}A$ 當成 SPD 矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 停止準則與重現性

每次求解至少記錄：

1. 初始殘差；
2. 相對殘差下降量；
3. 所用的範數與尺度；
4. 最大迭代次數與 timeout；
5. 函式庫回報的收斂／breakdown 狀態；
6. 最終真實殘差；
7. 條件數或誤差估計；
8. 可重現的 seed 與第二次執行核對。

後向誤差應相對 $\|A\|\|x\| + \|b\|$ 評估。迭代遞迴殘差可能因捨入變得很小，真實殘差卻沒有同步變小。



## 章末檢查

讀者應能：

- 解釋部分選主元，並區分乘數成長與條件數；
- 估算 LU、QR、Cholesky 的成本，利用 ordering 降低 fill；
- 推導條件數誤差界，並區分 residual 與前向誤差；
- 計算向量／矩陣範數，使用 SVD 分析二範數 conditioning；
- 以 $\rho(S^{-1}T)$ 判斷定常迭代；
- 寫出 Jacobi、Gauss-Seidel、SOR，並說明適用條件；
- 解釋 CG、複 Hermitian 延伸、GMRES、Krylov 子空間、restart 與預條件；
- 報告 rank tolerance、residual、收斂狀態與數值假設。

最後一章把 covariance、Gaussian model 與 weighted least squares 接到機率統計。

## 參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 樣本與期望值

在離散或具有密度的情形，令樣本空間為 $\Omega$，可測事件 $E \subseteq \Omega$ 的機率 $P(E)$ 滿足 $P(E) \geq 0$、$P(\Omega) = 1$，且對可數個互斥事件滿足機率可數可加性。隨機變數 $X \colon \Omega \to \mathbb{R}$ 把樣本結果映成數字；$P(X \leq x)$ 就是事件 $\{\omega : X(\omega) \leq x\}$ 的機率。本章只使用離散機率質量函數與一般機率密度函數兩種表示，不引入進階測度理論。期望值是依分布加權的平均；若一階絕對矩不有限，這個期望可能不存在。

樣本觀測值 $x_1, \ldots, x_N$ 是已觀察到的數值，$N \geq 1$。涉及期望值時假設一階絕對矩有限；變異數、共變異數與本章的線性變換公式假設所有分量二階矩有限。樣本平均數：

$$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i.$$

隨機變數 $X$ 的理論平均數：

$$\mu = \mathbb{E}[X].$$



## 樣本與期望值 （續）

離散結果 $a_i$ 與機率 $p_i$：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{k} p_i a_i.$$

連續型密度 $f_X$：

$$\mathbb{E}[X] = \int x f_X(x)\, dx.$$

蒐集後的樣本平均數是數值摘要，蒐集前則是隨機統計量；期望值是機率模型的性質。兩者公式相似，解釋不同。

## 變異數與 $N-1$

固定的樣本觀測值：

$$\overline{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i.$$

常用的不偏樣本變異數：

$$s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2.$$

母體變異數：

$$\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.$$

$N \geq 2$ 才能使用 $N-1$ 分母。對 i.i.d. 有限變異數樣本，用恆等式 $\sum_i (X_i - \overline{X})^2 = \sum_i (X_i-\mu)^2 - N(\overline{X}-\mu)^2$，兩邊取期望得到 $N\sigma^2 - N(\sigma^2/N) = (N-1)\sigma^2$。因此

$$\mathbb{E}[s^2] = \sigma^2.$$



## 變異數與 $N-1$ (續)

若只想描述完整有限母體的平均離差平方，除以 $N$ 可能才符合目的。報告時要標明是描述統計量或估計量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 線性轉換後的平均與變異數

對常數 $a, b$：

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b,$$
$$\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var}(X).$$

平移改變中心，不改變分散程度；負的 $a$ 仍使變異數乘上 $a^2$，但反轉方向。

獨立 $X, Y$：

$$\operatorname{Var}(X + Y) = \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} Y.$$

不獨立時：

$$\operatorname{Var}(X + Y) = \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} Y + 2\operatorname{Cov}(X, Y).$$

這是共變異矩陣的純量形式。獨立性在有限變異數下推出零共變異數；零共變異數一般不推出獨立性。



## 機率密度、累積分布與均勻分布例子

累積分布函數（cumulative distribution function, CDF）定義為 $F_X(x) = P(X \le x)$。對具有密度的絕對連續隨機變數，CDF 的導數幾乎處處存在且為密度；僅 CDF 連續不充分。此時

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x), \qquad f_X(x) = F_X'(x).$$

區間機率：

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x)\,dx.$$

對 $X \sim U(0, L)$ 且 $L > 0$，密度在 $[0, L]$ 是 $1/L$，平均數

$$\mathbb{E}[X] = \frac{L}{2}.$$

變異數：

$$\operatorname{Var}(X) = \int_0^L \left(x - \frac{L}{2}\right)^2 \frac{1}{L}\,dx = \frac{L^2}{12}.$$

$L = 3$ 時平均數是 $1.5$，變異數是 $9/12 = 3/4$。均勻分布平移 $a$ 後平均數加 $a$，變異數不變。

## 常態分布、標準化與中央極限定理

標準常態：

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

常態分布（Gaussian distribution）$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 $\sigma > 0$：

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

標準化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

使平均數變 0、變異數變 1。

獨立同分布（IID）且 $0 < \sigma^2 < \infty$ 時，中央極限定理（CLT）給出

$$\frac{\sqrt{N}(\overline{X} - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 常態分布、標準化與中央極限定理 （續）

它描述標準化樣本平均的分布近似，不代表原始資料會變成 Gaussian。時間序列相依、異分布或重尾都可能違反顯示的前提。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## CLT 的證明：獨立乘積與二階展開

以下援引 Lévy 連續性定理完成分布收斂步驟；其一般機率論證明超出本章範圍。先中心化並除以標準差，令 $U_i = (X_i - \mu)/\sigma$，則 $\mathbb{E}[U_i] = 0$、$\operatorname{Var}(U_i) = 1$，且

$$Z_N = \frac{\sqrt{N}(\overline{X} - \mu)}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^{N} U_i .$$

令 $\varphi_N(t) = \mathbb{E}[e^{itZ_N}]$。獨立性使特徵函數相乘；同分布使每個因子的函數相同：

$$\varphi_N(t) = \left[ \varphi_U\!\left( \frac{t}{\sqrt{N}} \right) \right]^N .$$

有限二階矩保證 $\varphi_U$ 在 $0$ 附近可微兩次，且

$$\varphi_U(s) = 1 - \frac{1}{2}s^2 + o(s^2).$$

這裡不需要第三階矩。理由是 $e^{iy} = 1 + iy - y^2/2 + R(y)$，其中 $R(y)/y^2 \to 0$，且可取固定常數 $C$ 使 $|R(y)| \le C y^2$。所以 $R(sU)/s^2 \to 0$ 幾乎必然，並由可積的 $CU^2$ 控制；支配收斂定理給 $\mathbb{E}[R(sU)] = o(s^2)$。期望值的線性性再用 $\mathbb{E}[U] = 0, \mathbb{E}[U^2] = 1$ 得到展開。



## CLT 的證明：獨立乘積與二階展開 （續）

因此

$$N \log \varphi_U(t/\sqrt{N}) = N \log\left( 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N) \right) \longrightarrow -\frac{t^2}{2}.$$

所以 $\varphi_N(t) \to e^{-t^2/2}$，也就是 $N(0,1)$ 的特徵函數。由 Lévy 連續性定理：特徵函數逐點收斂到一個在零點連續的特徵函數時，對應分布依分布收斂；因此 $Z_N$ 收斂到標準常態。僅有特徵函數的唯一性，不能單獨推出這個收斂結論。這不是「大樣本一定是常態」；它只說明平均量的極限。

上式對固定 $t$ 且充分大的 $N$，在 $1$ 附近取同一個複數對數分支，再將極限取指數；不能對一般複數乘積任意套用主值對數加法律。有限變異數 CLT 沒有提供對所有分布一致的有限樣本誤差界。

## 二項分布的標準化與圖形比較

令 $B_i$ 為獨立公平的 0/1 觀測值，$S_N = \sum_i B_i$。則

$$P(S_N = k) = \binom{N}{k} 2^{-N}, \quad \mathbb{E}[S_N] = N/2, \quad \mathrm{Var}(S_N) = N/4.$$

標準化變數 $Z_N = (S_N - N/2)/(\sqrt{N}/2)$ 的相鄰取值距離是 $\Delta z = 2/\sqrt{N}$。$N = 4$ 時，取值為 $-2, -1, 0, 1, 2$，機率依序是 $(1, 4, 6, 4, 1)/16$；$\mathbb{E}[Z_4] = 0$、$\mathrm{Var}(Z_4) = 1$，但它仍是離散分布。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 二項分布的標準化與圖形比較 （續）

標準化二項分布：長條面積是機率，紅線為 N(0,1) 密度




每根長條的寬為 $\Delta z$、高度為 $P(S_N = k)/\Delta z$，所以面積才是機率，所有長條總面積為 1；紅線是標準常態密度。不能把點機率直接當成密度與紅線比高度。這個圖只比較有限的兩個例子，一般收斂由前面的定理保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Monte Carlo 平均的誤差從哪裡來

若獨立同分布的模擬輸出 $Y_1, \dots, Y_N$ 有均值 $\mu$ 與有限變異數 $\tau^2$，則估計量 $\widehat{\mu} = N^{-1} \sum_i Y_i$ 滿足

$$\mathbb{E}[\widehat{\mu}] = \mu, \qquad \operatorname{Var}(\widehat{\mu}) = \frac{\tau^2}{N}, \qquad P(|\widehat{\mu} - \mu| \ge \varepsilon) \le \frac{\tau^2}{N \varepsilon^2}.$$

最後一步是 Chebyshev 不等式，因此標準誤按 $N^{-1/2}$ 縮小。它是抽樣誤差的機率敘述，不是每次模擬都遵守的決定性誤差。

例如 $X \sim U(-1, 1)$、$Y = X^2$，積分給 $\mathbb{E}[Y] = 1/3$、$\mathbb{E}[Y^2] = 1/5$，所以 $\tau^2 = 4/45$。$N = 1000$ 時，標準誤為 $\sqrt{4/45000} \approx 0.00943$，且 $P(|\widehat{\mu} - 1/3| \ge 0.1) \le 4/450 \approx 0.00889$。模擬若有相關性，變異數還要加上所有交叉共變異數；不能繼續套用 $\tau^2/N$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 聯合機率表

離散變數的聯合機率質量函數：

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j),$$
$$P_{ij} \ge 0, \qquad \sum_{i,j} P_{ij} = 1.$$

邊際機率：

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_j P_{ij}, \qquad \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i P_{ij}.$$

獨立性要求每一對都滿足

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i)\mathbb{P}(Y = y_j).$$

只知道兩組邊際機率，通常不足以重建聯合分布。只比較平均數或單一共變異數也不能判定獨立性。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 聯合機率表 （續）

Joint table：marginals 與 covariance

| X \ Y | Y=0 | Y=1 |
|---|---|---|
| X=0 | 0.2 | 0.1 |
| X=1 | 0.3 | 0.4 |

PX=(0.3,0.7)　PY=(0.5,0.5)

總機率=0.2+0.1+0.3+0.4=1

E(X)=0.7 · E(Y)=0.5

E(XY)=0.4

**Cov=0.4-0.7×0.5=0.05**

VarX=0.21 · VarY=0.25

**ρ=0.05/√0.0525=1/√21**

圖下核對：$P_X = (0.3, 0.7)$、$P_Y = (0.5, 0.5)$、$\mathbb{E}(XY) = 0.4$，因此 $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.05$、$\rho_{XY} = 1/\sqrt{21}$。表格四格總和為 1。



## 條件機率、Bayes 與零相關的界線

若 $P(X = x_i) = p_i > 0$，條件機率是

$$P(Y = y_j \mid X = x_i) = \frac{P_{ij}}{p_i}.$$

以同一張表 $P = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$，rows 為 $X = 0, 1$，columns 為 $Y = 0, 1$，則

$$P(Y = 1 \mid X = 0) = \frac{1}{3}, \quad P(Y = 1 \mid X = 1) = \frac{4}{7}.$$

全機率公式 $P(Y = 1) = \sum_i P(Y = 1 \mid X = i) P(X = i)$ 給 $(1/3)(0.3) + (4/7)(0.7) = 0.5$。Bayes 公式交換已知與未知的角色：

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{P(Y = 1 \mid X = 1) P(X = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{(4/7)(0.7)}{0.5} = 0.8.$$

零共變異數仍可能依賴。取 $X$ 在 $-1, 0, 1$ 等機率、$Y = X^2$。則 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[XY] = 0$，故 $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$；但 $P(Y = 0 \mid X = 0) = 1 \neq P(Y = 0) = 1/3$。聯合常態才有「零共變異數推出獨立」這個額外結論。

## 共變異數與相關係數

相關係數只摘要線性共同變動。先從完整聯合分布定義條件機率，才能分辨「相關」與「獨立」。

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)].$$

離散聯合分布的寫法：

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = \sum_{i,j} P_{ij}(x_i-\mu_X)(y_j-\mu_Y).$$

共變異數的大小依單位，相關係數去除尺度：

$$\rho_{XY} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

兩變異數為正時，

$$-1 \le \rho_{XY} \le 1.$$

證明：

$$\operatorname{Var}\left(\frac{X}{\sigma_X} - \frac{Y}{\sigma_Y}\right) = 2(1-\rho_{XY}) \ge 0,$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 共變異數與相關係數 （續）

改用加號則得 $1+\rho_{XY} \ge 0$。零相關只表示線性共變異為零，不一般等於獨立性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 共變異矩陣與半正定性

隨機欄向量：

$$\mu = \mathbb{E}[X], \qquad V = \mathbb{E}[(X-\mu)(X-\mu)^T].$$

$V_{ij} = \sigma_{ij}$，對角線是變異數，且 $V = V^T$。

任一係數向量 $c$：

$$c^T V c = \mathrm{Var}(c^T X) = \mathbb{E}[(c^T(X-\mu))^2] \geq 0.$$

所以 $V$ 半正定。離散聯合分布也有構造性證明：

$$V = \sum_{i,j} P_{ij} u_{ij} u_{ij}^T, \qquad u_{ij} = \begin{bmatrix} x_i \\ y_j \end{bmatrix} - \mu.$$

正定表示沒有任何非零線性組合 $c^T X$ 是幾乎必然為常數。秩不足表示某些變數的線性方向完全決定其他方向。



## 共變異矩陣與半正定性 (續)

共變異幾何：V=diag(4,1)，等密度線 $x^TV^{-1}x=1$

**$\lambda_1=4$，$\lambda_2=1$；半軸 2、1**




(2,0) 與 (0,1) 的加權平方長均為 1

**$J=e^TV^{-1}e$**

白化 $z=(x_1/2, x_2)$

**$J=\|z\|^2$**




同尺度：半軸 (2,1) → 半徑 (1,1)

圖中考慮聯合常態，採 $V = \mathrm{diag}(4,1)$、$\mu = 0$，所以等密度線 $x^TV^{-1}x = 1$ 為 $x_1^2/4 + x_2^2 = 1$，半軸恰為 2 與 1。它描述共變異尺度；一般分布的等密度線不必是橢圓。聯合常態的情形才由此二次型完整決定密度。

## 隨機向量的線性轉換

令

$$Y = AX + b.$$

平均數：

$$\mu_Y = A\mu_X + b.$$

共變異數：

$$V_Y = \mathbb{E}[(AX + b - \mu_Y)(\cdots)^T] = AV_XA^T.$$

平移 $b$ 在中心化時消去。$V_Y$ 是否奇異取決於 $\operatorname{rank}(AV_X^{1/2})$。若 $V_X \succ 0$ 且 $A$ 滿 row rank，即使輸出維度降低，$AV_XA^T$ 仍正定；重複的 rows 則造成秩不足。

純量線性組合 $a^TX$ 的變異數是 $a^TVa$；兩個線性組合的共變異數是 $a^TVb$。共變異矩陣因此表示一個對稱雙線性形式。



## 樣本共變異矩陣

把樣本放在 columns：

$$X_{\text{data}} \in \mathbb{R}^{M\times n}.$$

各 row 的平均數：

$$\widehat{\mu}_j = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_{\text{data}})_{jk}.$$

逐 row 中心化得 $X_c$。不偏樣本共變異矩陣：

$$\widehat{V}_{n-1} = \frac{1}{n-1}X_cX_c^T.$$

母體／描述統計版本：

$$\widehat{V}_n = \frac{1}{n}X_cX_c^T.$$

兩者特徵向量相同，特徵值只差 $n/(n-1)$。PCA 的文獻可能用其中任一分母，必須說明。

## 樣本共變異矩陣 （續）

$n \geq 2$、樣本 i.i.d. 且二階矩有限時，上式才具有不偏意義。中心化使 $X_c\mathbf{1} = 0$，故 rank 至多 $\min(M, n-1)$。非零奇異值平方成共變異數的非零特徵值，非零譜的條件數平方；秩不足時一般反問題的條件數已無限。大型資料通常直接用 SVD。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 噪聲白化

若誤差 $E$ 的共變異矩陣 $V$ 對稱正定（SPD），$V^{-1}$ 會依變異數反向加權。白化：

$$W = V^{-1/2}E.$$

則

$$\mathrm{Cov}(W) = V^{-1/2}VV^{-1/2} = I.$$

Mahalanobis 長度：

$$\|e\|_{V^{-1}}^2 = e^T V^{-1} e.$$

$V$ 是對角矩陣時，就是每個殘差除以對應的標準差。$V$ 由樣本估計且維度高於樣本數時，估計共變異數可能奇異，必須收縮估計、降維或結構模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 多變量 Gaussian 分布

SPD $V$ 的多變量常態密度：

$$p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{M/2}\det(V)^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu)^T V^{-1}(x-\mu)\right].$$

指數的等位集合：

$$(x-\mu)^T V^{-1}(x-\mu) = r^2$$

是橢球面。譜分解：

$$V = Q\Lambda Q^T, \qquad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_i).$$

令

$$Y = Q^T(X-\mu).$$

則 $Y$ 的共變異矩陣是對角矩陣 $\Lambda$。聯合常態下互不相關的分量也獨立，這是譜定理的統計解釋。



## 多變量 Gaussian 正規化

由

$$V = Q\Lambda Q^T$$

與 $Q^TQ = I$：

$$(x-\mu)^T V^{-1}(x-\mu) = \sum_i \frac{y_i^2}{\lambda_i}, \qquad y = Q^T(x-\mu).$$

正交變換的體積倍率是 $1$，所以 $dx = dy$。積分分解成一維常態積分的乘積：

$$\int_{\mathbb{R}^M} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_i \frac{y_i^2}{\lambda_i}\right) dy = (2\pi)^{M/2}\prod_i \lambda_i^{1/2}.$$

而

$$\prod_i \lambda_i^{1/2} = \det(V)^{1/2},$$

## 多變量 Gaussian 正規化 （續）

一維 Gaussian 積分可由平方轉為二維極座標證明：$I = \int e^{-t^2/2} dt > 0$，則 $I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r \, dr \, d\theta = 2\pi$，故 $I = \sqrt{2\pi}$。縮放每個座標得到上式，正規化正確。$V$ 奇異時，Gaussian 位於較低維的仿射子空間，在 $\mathbb{R}^M$ 中不存在相對於全空間體積的普通密度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 加權最小平方

令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$、$b, e \in \mathbb{R}^m$、$x \in \mathbb{R}^n$，模型為：

$$b = Ax + e, \qquad \mathbb{E}[e] = 0, \qquad \mathrm{Cov}(e) = V \succ 0.$$

普通最小平方法（OLS） 最小化

$$\|b - Ax\|_2^2,$$

對固定設計矩陣、零均值誤差，OLS 仍可無偏；要它成為最佳線性不偏估計量（BLUE），等變異且不相關的共變異數 $\sigma^2 I$ 已充分，不要求獨立性。一般已知 SPD 共變異數使用 Mahalanobis 加權殘差：

$$J(x) = (b - Ax)^T V^{-1} (b - Ax).$$

梯度：

$$\nabla J = -2A^T V^{-1} (b - Ax).$$

設為零，得加權正規方程：

$$A^T V^{-1} A x = A^T V^{-1} b.$$

滿 column rank 時，

## 加權最小平方 （續）

$$\widehat{x} = (A^T V^{-1} A)^{-1} A^T V^{-1} b.$$

這個駐點是全局最小值。令 $h \neq 0$，展開：

$$J(x+h) - J(x) = -2h^T A^T V^{-1}(b - Ax) + h^T A^T V^{-1} A h.$$

在加權正規方程的解 $\widehat{x}$，第一項為零；滿 column rank 給出 $Ah \neq 0$，而 $V \succ 0$ 給出 $h^T A^T V^{-1} A h > 0$。因此每個非零位移都增加目標函數，唯一最小值就是 $\widehat{x}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 完整數例：三筆異變異測量

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$、$b = (2, 5, 4)^T$，誤差共變異矩陣為 $V = \mathrm{diag}(1, 4, 9)$。白化後三式依序為

$$x_1 \approx 2, \quad \tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{1}{2}x_2 \approx \tfrac{5}{2}, \quad \tfrac{1}{3}x_2 \approx \tfrac{4}{3}.$$

因此

$$A^T V^{-1} A = \begin{bmatrix} 5/4 & 1/4 \\ 1/4 & 13/36 \end{bmatrix}, \quad A^T V^{-1} b = \begin{bmatrix} 13/4 \\ 61/36 \end{bmatrix}.$$

第一列乘 $4$ 得 $5x_1 + x_2 = 13$，第二列乘 $36$ 得 $9x_1 + 13x_2 = 61$。代入 $x_2 = 13 - 5x_1$ 得 $-56x_1 = -108$，所以

$$\widehat{x} = (27/14, 47/14)^T, \qquad A\widehat{x} = (27/14, 37/7, 47/14)^T.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 完整數例：三筆異變異測量 （續）

| 測量 | 殘差 $e_i = b_i - (A\widehat{x})_i$ | 加權平方 $e_i^2/\sigma_i^2$ |
|---|---|---|
| 1 | $1/14$ | $1/196$ |
| 2 | $-2/7$ | $4/196$ |
| 3 | $9/14$ | $9/196$ |

合計 $J = 14/196 = 1/14$。驗證 $V^{-1}e = (1/14, -1/14, 1/14)^T$，故 $A^TV^{-1}e = 0$。普通歐氏殘差不必滿足 $A^Te = 0$；正交的是白化後的殘差與白化設計矩陣。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 獨立異變異誤差

若誤差有有限正變異數且互不相關（獨立性亦充分）：

$$V = \operatorname{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_m^2),$$

則最小化

$$J(x) = \sum_{i=1}^{m} \frac{(b_i - a_i^T x)^2}{\sigma_i^2}.$$

高變異數測量的權重小，低變異數測量的權重大。

重複量同一個純量 $x$：

$$A = (1, 1)^T, \qquad b = (b_1, b_2)^T.$$

正規方程：

$$\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right) x = \frac{b_1}{\sigma_1^2} + \frac{b_2}{\sigma_2^2}.$$

所以

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 獨立異變異誤差 （續）

$$\widehat{x} = \frac{b_1/\sigma_1^2 + b_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2},$$

它是精度加權平均數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 估計量的共變異數

估計量是線性：

$$\widehat{x} = Gb, \qquad G = (A^T V^{-1} A)^{-1} A^T V^{-1}.$$

若 $b$ 的共變異數是 $V$：

$$\mathrm{Cov}(\widehat{x}) = G V G^T.$$

代入 G：

$$\mathrm{Cov}(\widehat{x}) = (A^T V^{-1} A)^{-1}.$$

對角線元素是各參數估計量的變異數，非對角元素是估計量間的共變異數；須再除以相應標準差乘積才是相關係數。此公式假設固定滿 column rank $A$、固定已知 SPD $V$；若 $V$ 以同一批資料估計，$G$ 也是隨機，不能直接把代入估計後的逆矩陣當成 精確抽樣共變異矩陣。

BLUE 的證明：$GA = I$，所以 $\mathbb{E}[Gb] = x$。任何另一個對所有參數都無偏的線性估量可寫 $Hb = (G + D)b$，且 $DA = 0$。因 $GV = (A^T V^{-1} A)^{-1} A^T$，有 $GVD^T = 0$，所以 $HVH^T - GVG^T = DVD^T \succeq 0$。此處共變異數最小是 PSD 次序，不是逐元素比較。常態性不必要；精確信賴區間與檢定另需分布假設。

## 加權最小平方的條件數

不要顯式求逆 $V$。若誤差互相獨立，先逐式白化：

$$\tilde{A} = V^{-1/2}A, \qquad \tilde{b} = V^{-1/2}b.$$

再對 $\tilde{A}, \tilde{b}$ 做普通最小平方法（OLS）。

形成白化後的正規矩陣 $\tilde{A}^T\tilde{A}$ 會將 $\tilde{A}$ 的二範數條件數平方；不是求逆運算本身才造成平方。穩定流程以 SPD $V = LL^T$ 的三角求解求 $\tilde{A} = L^{-1}A, \tilde{b} = L^{-1}b$，再做 QR 或 SVD。大型稀疏問題可用不顯式形成矩陣的方法。

樣本共變異矩陣估計不確定或奇異時，可使用收縮估計、正則化或降維，但要報告這些方法如何改變統計模型。



## 新觀測到來：遞迴最小平方

設舊資料的加權最小平方估計為 $\hat{x}_0$，其誤差共變異矩陣為 $W_0 \succ 0$。新的測量為 $b_1 = Hx + \eta$，其中 $\mathbb{E}[\eta] = 0$、$\mathrm{Cov}(\eta) = R \succ 0$，且新誤差與舊資料誤差互不相關。將兩批加權正規方程相加：

$$W_1^{-1} = W_0^{-1} + H^T R^{-1} H,$$
$$W_1^{-1}\hat{x}_1 = W_0^{-1}\hat{x}_0 + H^T R^{-1} b_1.$$

第二式減去第一式乘 $\hat{x}_0$，得更新式

$$\hat{x}_1 = \hat{x}_0 + K(b_1 - H\hat{x}_0), \quad K = W_1 H^T R^{-1}.$$

$b_1 - H\hat{x}_0$ 是 innovation（新觀測與舊預測的差）。為避免反覆求逆，可改算

$$S = R + HW_0H^T, \quad K = W_0H^TS^{-1}, \quad W_1 = W_0 - W_0H^TS^{-1}HW_0.$$

驗證兩種增益相同：$(W_0^{-1} + H^TR^{-1}H)W_0H^TS^{-1} = H^TR^{-1}(R + HW_0H^T)S^{-1} = H^TR^{-1}$。再乘 $W_1$ 即得 $K = W_1H^TR^{-1}$。同理左乘 $W_1^{-1}$ 可驗證最後一個共變異數公式。減去的矩陣半正定，所以 $W_1 \preceq W_0$，新資料不增加此模型下線性估計的不確定性。

## 新觀測到來：遞迴最小平方 （續）

這是固定狀態的遞迴最小平方，也是原書簡化 Kalman 更新的內容；完整動態濾波還需要狀態轉移、過程誤差與預測步驟，不能直接用此式替代。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study



## 遞迴更新的數值核對

估計同一常數 $x$，舊觀測為 $b_0 = 10$、變異數 $1$，所以 $\widehat{x}_0 = 10, W_0 = 1$。取 $H = 1$，依序加入兩個不相關的新觀測：

| 步驟 | 新觀測及變異數 | $S = R + W$ | $K = W/S$ | 新估計值 | 新變異數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $b_1 = 13, R_1 = 9$ | $10$ | $1/10$ | $10 + (1/10)(3) = 103/10$ | $9/10$ |
| 2 | $b_2 = 9, R_2 = 1$ | $19/10$ | $9/19$ | $103/10 + (9/19)(9 - 103/10) = 184/19$ | $9/19$ |

一次解全部資料的精度加權平均為

$$\widehat{x} = \frac{10 + 13/9 + 9}{1 + 1/9 + 1} = \frac{184}{19}, \quad \operatorname{Var}(\widehat{x}) = \frac{1}{1 + 1/9 + 1} = \frac{9}{19}.$$

兩種算法精確相同。若新觀測只是舊觀測的複製，它與舊誤差相關；再當成獨立資料加一次權重，便會低估不確定性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 穩健性與模型假設

WLS 不是普遍適用的誤差模型。關鍵假設：

- 誤差平均數已知或為零；
- 共變異數 $V$ 已知或有可信估計；
- 條件平均的線性模型 $Ax$ 正確；
- 聯合共變異矩陣確實捕捉相依性；
- 滿 column rank，參數唯一可識別。

無有限二階矩的重尾使共變異數模型失效；離群值或遺漏非線性也可能使 WLS 與需求不合。相關誤差若已正確納入 $V$，並不違反廣義最小平方法。$L_1$ 損失函數對大殘差的懲罰為線性，對垂直離群值較不敏感，但不自動抵抗高槓桿的設計點；線性模型的 最小絕對離差可改寫為 LP，無需聲稱必須非線性最佳化。

時間序列的誤差共變異數常有非對角結構；直接令 $V = I$ 會同時改變加權方式與不確定性。相關係數也不等於因果效果。



## 章末檢查

讀者應能：

- 區分樣本統計量、模型期望值與連續型密度；
- 推導變異數恆等式，說明 $N - 1$；
- 從聯合機率表算邊際機率、共變異數與相關係數；
- 以 $c^T V c = \mathrm{Var}(c^T X)$ 證明共變異矩陣 PSD；
- 推導 $V_{AX+b} = A V_X A^T$；
- 使用譜定理與行列式正規化 Gaussian；
- 從 Mahalanobis 損失函數推導加權正規方程；
- 推導 $\mathrm{Cov}(\hat{x})$，辨明 BLUE 與常態性；
- 使用穩定白化、QR 或 SVD，並報告條件數與誤差敏感度。

至此 12 章的概念路徑由向量空間、投影、矩陣分解、應用連到數值可靠性與 統計推論。

## 參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study