

异维 A 酸+阿达帕林凝胶 治疗青春期后中重度痤疮

阿达帕林凝胶在痤疮的治疗中广泛应用,但对中重度患者单一用药效果并不理想。临床治疗结果显示,异维 A 酸联合阿达帕林凝胶治疗青春期后中重度痤疮的临床效果肯定,可有效改善患者炎症因子水平,降低皮脂分泌率,且不会增加不良反应发生风险。

用药方法 先将痤疮皮损处清洗、消毒,将 0.1% 阿达帕林凝胶适量均匀涂抹于皮损处,按揉 2~3 分钟,每天 1 次。异维 A 酸软胶囊 10 毫克口服,每天 1 次。治疗 4 周。

异维 A 酸+阿达帕林凝胶+ 阿奇霉素治疗囊肿型痤疮

阿奇霉素口服给药后组织与皮脂腺分泌物内的药物浓度较高,对痤疮丙酸杆菌等厌氧细菌有良好抑制作用。临床资料显示,口服异维 A 酸胶囊联合阿奇霉素口服,配合阿达帕林局部涂抹治疗,对改善囊肿型痤疮患者的血清性激素水平大有帮助,且能抑制炎症反应。虽然不良反应发生率稍高,但总体疗效明显提升,显著优于单用阿达帕林凝胶治疗组。

用药方法 睡前清洗痤疮患处,待干燥后在患处局部涂抹阿达帕林凝胶薄层,每天 1 次;异维 A 酸胶囊口服 5 毫克,每天 2 次;阿奇霉素口服 0.5 克,每天 1 次。用药 3 天,停药 4 天,再继续治疗。4 周为 1 个疗程。治疗 3 个月评估疗效。

异维 A 酸联合用药 治疗痤疮

□ 副主任医师 常怡勇 (河南开封 475000)

最新专家共识认为,口服异维 A 酸是目前临床治疗痤疮最有效的药物,明确给出了口服异维 A 酸治疗痤疮的适应证、剂量和疗程;因有明确的致畸作用,禁用于妊娠或即将妊娠的女性,同时不推荐用于 12 岁以下患者。临床实践证明,口服异维 A 酸与相关药物联合应用可以取得更好疗效且不增加不良反应。

异维 A 酸+克拉霉素治疗中重度痤疮

克拉霉素属大环内酯类抗生素,对痤疮丙酸杆菌有一定杀灭作用,但单独应用对中重度痤疮患者疗效不佳。临床治疗结果显示,异维 A 酸软胶囊联合克拉霉素治疗中重度痤疮的疗效确切,可有效改善患者的临床症状,调节体内性激素水平,

降低复发风险,且不良反应少,显著优于单用克拉霉素组。

用药方法 克拉霉素口服 0.5 克,每天 2 次。异维 A 酸软胶囊口服 20 毫克,每天 2 次,与食物同服;1 个月后减至 10 毫克,每天 2 次。疗程 2 个月。服药期间严禁辛辣、油腻饮食与烟酒。

异维 A 酸+罗红霉素治疗寻常性痤疮

罗红霉素对丙酸痤疮杆菌酯酶有抑制作用,还能够阻断中性粒细胞趋化因子形成。临床资料显示,罗红霉素联合异维 A 酸胶丸治疗寻常性痤疮效果显著,能改善患者的炎症因子水平,有效减少患者皮

损个数,且不良反应风险低,显著优于单用米诺环素治疗组。

用药方法 罗红霉素口服 15 毫克,每天 2 次;异维 A 酸胶丸每天 10 毫克,分 2 次口服。持续治疗 8 周。

异维 A 酸+臭氧水疗治疗寻常型痤疮

臭氧是广谱天然抗生素,且不会产生耐药。临床治疗结果显示,寻常型痤疮患者采用臭氧水疗联合异维 A 酸口服,可以促进皮肤黑头、白头、丘疹、脓疱的消退,减少皮脂溢出,缩短痤疮治疗时间,安全性高,且避免了大量使用抗

生素出现耐药、伪膜性肠炎等风险。

用药方法 患者在常规治疗基础上,口服异维 A 酸胶囊 10 毫克,每天 2 次;臭氧水温度 20~25℃,持续喷面部,每次 15~20 分钟,每周 1 次或每 2 周 1 次。治疗 12 周。

洗脸

是居家美容的基础

□ 主任医师 张泽峰 (河北黄骅 061108)

刺激性小。虽然去污力不是很强,但干性皮肤本来也没有多少油脂需要清洗。不论你是什么皮肤,在使用洁面产品时都不要过量,否则很容易伤害到脸部肌肤。

接着是洗脸的次数。一天之内,以早、中、晚各洗一次为宜。每次洗脸后,皮肤外层的皮脂膜在 2~3 小时才能再度形成。皮脂膜对皮肤起到保护作用,可以使皮肤表面滋润、有光泽和柔软,阻止或减缓外界不良刺激对脸部皮肤的伤害。皮脂膜还含有脂肪酸,有抑制细菌的功能。因此洗脸不要太勤,以免皮肤膜还没有形成就遭到破坏。

最后是洗脸的时间。洗脸的时间过长,容易把刚刚揉出来的油脂污垢又重新揉进皮肤内。越洗越不干净;而且长时间清洗脸部的油脂还会造成过度清洁,使肌肤的水油不平衡,皮肤会变得干燥。建议用洗面奶在脸上轻轻打圈按摩一分钟左右,把污垢洗出,用清水把污垢和多余的洗面奶成分洗干净就可以了。洗脸水尽量要用流动的,洗脸的毛巾也要经常更换。

我们每个人每天都要洗脸,其实,洗脸是居家美容的基础。下面就如何洗脸谈几点意见。

首先是洗脸的水温。经常用热水洗脸会使面部皮肤松弛;而常用冷水洗脸又会刺激皮肤毛细血管,使之收缩,脸部的污垢就不易洗净。因此,适当的洗脸水温应是 36 摄氏度左右,接近人体的体温,对皮肤的刺激性较小。此外,用温水洗脸后再用冷水毛巾轻擦脸部皮肤,可以使脸部毛细血管收缩;或用干毛巾轻轻把脸擦干,使毛细血管自然晾干后收缩。也可以采用温水和冷水交替的方法,先用温水清洗面部,顺着面部肌肉的纹理走向涂抹清洁剂,时间以 3~4 分钟为宜;用温水将清洁剂洗去后,用冷水冲洗面部。如此可使皮肤浅表血管扩张和收缩,促进面部的血液循环,达到美容效果。

其次是洗脸的正确方法。洗脸时应该做到从下向上、由内向外轻轻地擦洗,起到按摩脸部皮肤、促进脸部血液循环的作用。当然,洗脸后擦抹护肤面霜一类的化妆品时,也应该像洗脸那样,自下而上、由内向外轻轻地擦拭。

再次是对香皂或洗面奶的选择。脸部皮肤表面比较细嫩,应避免过度刺激。因此,洗脸时最好不用含碱性的香皂,否则会使脸部皮肤干燥,并有刺痒的疼痛等不适感。弱碱性的香皂虽去污力弱,但对皮肤的刺激较小。油性皮肤常用含碱性的香皂,也会使皮肤失去较多的水分和养分,变得干燥而松弛。中性皮肤的人应该选择含碱量小于 0.2% 的软皂或者无脂洁肤液。干性皮肤和敏感皮肤要选用含脂量高的洗面奶,这样的洗面奶通常是低泡甚至无泡的,温和而

异维 A 酸+螺内酯 治疗中重度痤疮

螺内酯能直接作用于患者的毛囊皮脂腺,使睾酮及二氢睾酮对皮肤的刺激作用得到有效缓解。但单用这种治疗方法仅对部分患者有效且部分患者出现复发。临床资料显示,对中重度痤疮患者采用异维 A 酸软胶囊联合螺内酯治疗,不仅能够提高疗效,且能有效降低不良反应发生率,显著优于单用螺内酯治疗组。

用药方法 螺内酯口服 20 毫克,每天 2 次,早晚服用。异维 A 酸软胶囊口服 10 毫克,每天 1 次;连续用药 5 天未发生严重用药反应,则可改为 10 毫克,每天 2 次。连续用药 2 个月。

异维 A 酸+枸地氯雷他定 治疗中重度痤疮

枸地氯雷他定属于抗组胺药,无中枢镇静及心脏毒性等不良反应,对肾功能不全者安全性好。临床治疗结果显示,小剂量异维 A 酸软胶囊联合枸地氯雷他定片治疗中重度痤疮,可以显著减轻皮损炎症,提高临床治疗效果,能有效降低血清炎症因子,显著优于单用异维 A 酸治疗的对照组。

用药方法 口服异维 A 酸软胶囊 10 毫克,每天 2 次;6 周后减量至 10 毫克,每天 1 次。口服枸地氯雷他定片 8.8 毫克,每晚 1 次。疗程均为 12 周。

此外,临床上还用异维 A 酸+5-氨基酮戊酸光动力疗法治疗重度痤疮,异维 A 酸+多西环素联合+光动力疗法治疗重度痤疮,异维 A 酸+30% 超分子水杨酸凝胶治疗中重度痤疮等。限于篇幅不再一一介绍,有需要者可咨询医生。