

差出人：[荻根 孝範](#)
宛先：[ウェルシーファーム竹内博夫社長](#)
Cc：[荻根 孝範](#)
件名：ソイパス資料ご案内
日付：2026年1月23日 7:23:42
添付ファイル：[ソイパスパンフレット（乳牛用）.pdf](#)
[ソイパスプレゼン（肉牛）.pptx](#)
[ソイパス育成+肥育前期給与試験.pdf](#)
[島根県畜産技術センターバイパス蛋白肥育前期.pdf](#)

ウェルシーファーム
竹内社長

お世話になっております。
昨日は長時間にわたりお時間いただきありがとうございました。

昨日は資料持ち合わせておらず申し訳ございませんでした。
関連資料がございますのでご案内いたします。

【資料1】ソイパス（乳牛用）

（内容）＊輸入メーカーの資料です。
一般的なソイパスの商品説明資料です。今では数多くある「バイパス蛋白」ですが、その先駆的商品はソイパスです。
加熱するとたんぱく質が変性してルーメンをバイパスしますが、このとき重要なのが加熱の「加減」です。過加熱となると重要なアミノ酸であるリジンが壊れます。一方加熱「不足」だとたんぱく質が変性しきれないのでバイパスしません。ソイパスは「加糖」することでこの難しい問題を解決しました。

【資料2】ソイパス（肉牛用）

（内容）＊小職が作成したものです。
他家畜（＝養豚）で赤肉生産が最も盛んな時期「哺乳期後期」と泌乳量が重要になる「授乳期」の栄養要求量が似ている、ことに着眼し、搾乳牛で泌乳量を高めることができるバイパス蛋白（リジン源）は仔牛の赤肉生産にも有効であることを示しています。
実際、仔牛の赤肉生産が最大になるのは4～15ヶ月齢なのでこの時期にリジンを強化すると体躯が大きくなります。
今では、バイパス蛋白を仔牛に給与することが定着してますが、「バイパス蛋白」が重要ではなく、アミノ酸の一種である「リジン」が重要です。

【資料3】ソイパス育成+肥育前期給与試験

（内容）＊小職が現職にて九州担当者と実施したものです。

ソイパスの有用性を確認するために他社品と一般農場で給与比較試験をしました。九州の5,000頭肥育農場において、7～11ヶ月齢時の各10頭にソイパスと他社品を毎日200g/日給与し、毎月体重測定をしました。その結果、4ヶ月後の体重で他社品給与区に対して+20kgの増体、DGも優れていることが確認できました。

（考察）多くのバイパス蛋白がありますが、単に加熱するだけではリジンが壊れてアミノ酸バランス（リジン/メチオニン）が崩れていると想定されます。その結果、他社品においては期待通りの結果が得られなかったと考察します。

【資料4】島根県畜産技術センター

（内容）早期出荷に関する内容です。

早期出荷に関する内容ですが、重要なのは赤肉生産が最大となる時期にアミノ酸バランスが整っているソイパス＝バイパス

蛋白を給与すると「期待通りに体躯が大きくなる」ということです。

通常出荷では枝肉重量増が期待できます。

【その他】

弊社のお客様では乳牛乾乳期および黒毛繁殖乾乳期にバイパス蛋白を使用します。

乳牛では2～3kg/日給与する例もあります。急激に大きくなる妊娠末期にはたんぱく質が重要ですが大豆粕のように

溶解性が高いとルーメンで溶けてしまい（微生物のエサになり）、牛自身が利用できないことが欠点です。ソイパス＝

バイパス蛋白は牛自身が利用できるもので仔牛の発達に有効です。

黒毛繁殖のお客様においては「死産」が減っているとおっしゃってます。北大か酪農学園の先生が「妊娠末期に繁殖牛

にバイパス蛋白を給与すると出生仔牛の胸筋が発達して“生まれてすぐの自己呼吸がよくなる”と発表しています。

昨日お話ししました農場様ですが、ソイパスを使用して死産減少していると担当者はおっしゃっています。

日本（海外も含めて）でバイパス蛋白に精通しているのは小職だと自負しています。理由は単胃動物（豚）で栄養学を

実施していたこと、鶏も豚も栄養設計は「アミノ酸」で実施します。粗たんぱく質（CP）といういわゆるあいまいな

ものでは設計できません。また、以前の職場（ウイルバー・エリス株式会社＝ソイパスの輸入商社）ではソイパス国産化

も実施したので「バイパス蛋白製造のノウハウ、栄養素のカギとなる成分」を熟知しています。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

カスケディア・トレーディング
荻根