

# 理科数学


## 一、选择题

1.  $i$  是虚数单位,  $\frac{2i^3}{1-i} =$  ( )  
(A)  $1+i$  (B)  $-1+i$  (C)  $1-i$  (D)  $-1-i$
2. 设变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x-y \geq -1 \\ x+y \geq 1 \\ 3x-y \leq 3 \end{cases}$ , 则目标函数  $z = 4x + y$  的最大值为 ( )  
(A) 4 (B) 11 (C) 12 (D) 14
3. “ $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ”是“ $\tan \theta = 2 \cos \left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ ”的 ( )  
(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件  
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件
4. 设双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的离心率为  $\sqrt{3}$ , 且它的一条准线与抛物线  $y^2 = 4x$  的准线重合, 则此双曲线的方程为 ( )  
(A)  $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1$  (B)  $\frac{x^2}{48} - \frac{y^2}{96} = 1$  (C)  $\frac{x^2}{3} - \frac{2y^2}{3} = 1$  (D)  $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$
5. 函数  $y = \log_2(\sqrt{x+4} + 2)$  ( $x > 0$ ) 的反函数是 ( )  
(A)  $y = 4^x - 2^{x+1}$  ( $x > 2$ ) (B)  $y = 4^x - 2^{x+1}$  ( $x > 1$ )  
(C)  $y = 4^x - 2^{x+2}$  ( $x > 2$ ) (D)  $y = 4^x - 2^{x+2}$  ( $x > 1$ )
6. 设  $a, b$  为两条直线,  $\alpha, \beta$  为两个平面. 下列四个命题中, 正确的命题是 ( )  
(A) 若  $a, b$  与  $\alpha$  所成的角相等, 则  $a \parallel b$   
(B) 若  $a \parallel \alpha, b \parallel \beta, \alpha \parallel \beta$ , 则  $a \parallel b$   
(C) 若  $a \subset \alpha, b \subset \beta, a \parallel b$ , 则  $\alpha \parallel \beta$   
(D) 若  $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \perp \beta$ , 则  $a \perp b$
7. 在  $\mathbf{R}$  上定义的函数  $f(x)$  是偶函数, 且  $f(x) = f(2-x)$ . 若  $f(x)$  在区间  $[1, 2]$  上是减函数, 则  $f(x)$  ( )  
(A) 在区间  $[-2, -1]$  上是增函数, 在区间  $[3, 4]$  上是增函数  
(B) 在区间  $[-2, -1]$  上是增函数, 在区间  $[3, 4]$  上是减函数  
(C) 在区间  $[-2, -1]$  上是减函数, 在区间  $[3, 4]$  上是增函数  
(D) 在区间  $[-2, -1]$  上是减函数, 在区间  $[3, 4]$  上是减函数
8. 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差  $d$  不为 0,  $a_1 = 9d$ . 若  $a_k$  是  $a_1$  与  $a_{2k}$  的等比中项, 则  $k =$  ( )  
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
9. 设  $a, b, c$  均为正数, 且  $2^a = \log_{\frac{1}{2}} a, \left(\frac{1}{2}\right)^b = \log_{\frac{1}{2}} b, \left(\frac{1}{2}\right)^c = \log_2 c$ . 则 ( )  
(A)  $a < b < c$  (B)  $c < b < a$  (C)  $c < a < b$  (D)  $b < a < c$


10. 设两个向量  $\mathbf{a} = (\lambda + 2, \lambda^2 - \cos^2 \alpha)$  和  $\mathbf{b} = \left(m, \frac{m}{2} + \sin \alpha\right)$ , 其中  $\lambda, m, \alpha$  为实数. 若  $\mathbf{a} = 2\mathbf{b}$ , 则  $\frac{\lambda}{m}$  的取值范围是 ( )  
(A)  $[-6, 1]$  (B)  $[4, 8]$  (C)  $(-\infty, 1]$  (D)  $[-1, 6]$

## 二、填空题

11. 若  $\left(x^2 + \frac{1}{ax}\right)^6$  的二项展开式中  $x^3$  的系数为  $\frac{5}{2}$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_. (用数字作答)
12. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上, 且一个顶点上的三条棱的长分别为 1, 2, 3, 则此球的表面积为\_\_\_\_\_.
13. 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差  $d$  是 2, 前  $n$  项的和为  $S_n$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - n^2}{S_n} =$ \_\_\_\_\_.
14. 已知两圆  $x^2 + y^2 = 10$  和  $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 20$  相交于  $A, B$  两点, 则直线  $AB$  的方程是\_\_\_\_\_.
15. 如图, 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle BAC = 120^\circ, AB = 2AC = 1, D$  是边  $BC$  上一点,  $DC = 2BD$ , 则  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} =$ \_\_\_\_\_.



16. 如图, 用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色, 每个格子涂一种颜色. 要求最多使用 3 种颜色且相邻的两个格子颜色不同, 则不同的涂色方法共有\_\_\_\_\_种. (用数字作答)




## 三、解答题

17. 已知函数  $f(x) = 2 \cos x (\sin x - \cos x) + 1, x \in \mathbf{R}$ .  
(1) 求函数  $f(x)$  的最小正周期;  
(2) 求函数  $f(x)$  在区间  $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$  上的最小值和最大值.

18. 已知甲盒内有大小相同的 1 个红球和 3 个黑球, 乙盒内有大小相同的 2 个红球和 4 个黑球. 现从甲、乙两个盒内各任取 2 个球.  
(1) 求取出的 4 个球均为黑球的概率;  
(2) 求取出的 4 个球中恰有 1 个红球的概率;

- (3) 设  $\xi$  为取出的 4 个球中红球的个数, 求  $\xi$  的分布列和数学期望.

19. 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中,  $PA \perp$  底面  $ABCD, AB \perp AD, AC \perp CD, \angle ABC = 60^\circ, PA = AB = BC, E$  是  $PC$  的中点.  
(1) 证明  $CD \perp AE$ ;  
(2) 证明  $PD \perp$  平面  $ABE$ ;  
(3) 求二面角  $A-PD-C$  的大小.



20. 已知函数  $f(x) = \frac{2ax - a^2 + 1}{x^2 + 1}$  ( $x \in \mathbf{R}$ ), 其中  $a \in \mathbf{R}$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处的切线方程;

(2) 当  $a \neq 0$  时, 求函数  $f(x)$  的单调区间与极值.

21. 在数列  $\{a_n\}$  中,  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = \lambda a_n + \lambda^{n+1} + (2 - \lambda)2^n$  ( $n \in \mathbf{N}^*$ ), 其中  $\lambda > 0$ .

(1) 求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

(2) 求数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和  $S_n$ ;

(3) 证明存在  $k \in \mathbf{N}^*$ , 使得  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{a_{k+1}}{a_k}$  对任意  $n \in \mathbf{N}^*$  均成立.

22. 设椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ ,  $A$  是椭圆上的一点,  $AF_2 \perp F_1F_2$ , 原点  $O$  到直线  $AF_1$  的距离为  $\frac{1}{3}|OF_1|$ .

(1) 证明  $a = \sqrt{2}b$ ;

(2) 设  $Q_1, Q_2$  为椭圆上的两个动点,  $OQ_1 \perp OQ_2$ , 过原点  $O$  作直线  $Q_1Q_2$  的垂线  $OD$ , 垂足为  $D$ , 求点  $D$  的轨迹方程.