


2005 年普通高等学校招生考试（辽宁卷）

数学试卷

一、选择题


- 复数 $z = \frac{-1+i}{1+i} - 1$ 在复平面内, z 所对应的点在 ()
(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限
- 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在是函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续的 ()
(A) 充分而不必要的条件 (B) 必要而不充分的条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要的条件
- 设袋中有 80 个红球, 20 个白球, 若从袋中任取 10 个球, 则其中恰有 6 个红球的概率为 ()
(A) $\frac{C_{80}^4 \cdot C_{10}^6}{C_{100}^{10}}$ (B) $\frac{C_{80}^6 \cdot C_{10}^4}{C_{100}^{10}}$ (C) $\frac{C_{80}^4 \cdot C_{20}^6}{C_{100}^{10}}$ (D) $\frac{C_{80}^6 \cdot C_{20}^4}{C_{100}^{10}}$
- 已知 m 、 n 是两条不重合的直线, α 、 β 、 γ 是三个两两不重合的平面, 给出下列四个命题:
① 若 $m \perp \alpha$, $m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
② 若 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \alpha$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
③ 若 $m \subset \alpha$, $n \subset \beta$, $m \parallel n$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
④ 若 m 、 n 是异面直线, $m \subset \alpha$, $m \parallel \beta$, $n \subset \beta$, $n \parallel \alpha$, 则 $\alpha \parallel \beta$.
其中真命题是 ()
(A) ①和② (B) ①和③ (C) ③和④ (D) ①和④
- 函数 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的反函数是 ()
(A) $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (B) $y = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
(C) $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (D) $y = -\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- 若 $\log_{2a} \frac{1+a^2}{1+a} < 0$, 则 a 的取值范围是 ()
(A) $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ (B) $(1, +\infty)$ (C) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ (D) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$
- 在 \mathbf{R} 上定义运算 $\otimes: x \otimes y = x(1-y)$. 若不等式 $(x-a) \otimes (x+a) < 1$ 对任意实数 x 成立, 则 ()
(A) $-1 < a < 1$ (B) $0 < a < 2$ (C) $-\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$ (D) $-\frac{3}{2} < a < \frac{1}{2}$
- 若钝角三角形三内角的度数成等差数列, 且最大边长与最小边长的比值为 m , 则 m 的范围是 ()
(A) $(1, 2)$ (B) $(2, +\infty)$ (C) $[3, +\infty)$ (D) $(3, +\infty)$
- 若直线 $2x - y + c = 0$ 按向量 $\vec{a} = (1, -1)$ 平移后与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相切, 则 c 的值为 ()
(A) 8 或 -2 (B) 6 或 -4 (C) 4 或 -6 (D) 2 或 -8

- 已知 $y = f(x)$ 是定义在 \mathbf{R} 上的单调函数, 实数 $x_1 \neq x_2$, $\lambda \neq -1$, $\alpha = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}$, $\beta = \frac{x_2 + \lambda x_1}{1 + \lambda}$, 若 $|f(x_1) - f(x_2)| < |f(\alpha) - f(\beta)|$, 则 ()
(A) $\lambda < 0$ (B) $\lambda = 0$ (C) $0 < \lambda < 1$ (D) $\lambda \geq 1$
- 已知双曲线的中心在原点, 离心率为 $\sqrt{3}$. 若它的一条准线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线重合, 则该双曲线与抛物线 $y^2 = 4x$ 的交点到原点的距离是 ()
(A) $2\sqrt{3} + \sqrt{6}$ (B) $\sqrt{21}$ (C) $18 + 12\sqrt{2}$ (D) 21
- 一给定函数 $y = f(x)$ 的图象在下列图中, 并且对任意 $a_1 \in (0, 1)$, 由关系式 $a_{n+1} = f(a_n)$ 得到的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} > a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则该函数的图象是 ()




二、填空题

- $\left(x^{\frac{1}{2}} - 2x^{-\frac{1}{2}}\right)^n$ 的展开式中常数项是_____.
- 如图, 正方体的棱长为 1, C 、 D 分别是两条棱的中点, A 、 B 、 M 是顶点, 那么点 M 到截面 $ABCD$ 的距离是_____.
- 用 1、2、3、4、5、6、7、8 组成没有重复数字的八位数, 要求 1 和 2 相邻, 3 与 4 相邻, 5 与 6 相邻, 而 7 与 8 不相邻, 这样的八位数共有_____个. (用数字作答)
- ω 是正实数, 设 $S_\omega = \{\theta | f(x) = \cos[\omega(x + \theta)] \text{ 是奇函数}\}$, 若对每个实数 a , $S_\omega \cap (a, a+1)$ 的元素不超过 2 个, 且有 a 使 $S_\omega \cap (a, a+1)$ 含 2 个元素, 则 ω 的取值范围是_____.




三、解答题

- 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, E 、 F 分别是 AC 、 AB 的中点, $\triangle ABC$, $\triangle PEF$ 都是正三角形, $PF \perp AB$.
(1) 证明: $PC \perp$ 平面 PAB ;
(2) 求二面角 $P-AB-C$ 的平面角的余弦值;
(3) 若点 P 、 A 、 B 、 C 在一个表面积为 12π 的球面上, 求 $\triangle ABC$ 的边长.



- 如图, 在直径为 1 的圆 O 中, 作一关于圆心对称、邻边互相垂直的十字形, 其中 $y > x > 0$.
(1) 将十字形的面积表示为 θ 的函数;
(2) θ 为何值时, 十字形的面积最大? 最大面积是多少?



19. 已知函数 $f(x) = \frac{x+3}{x+1}$ ($x \neq -1$). 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = f(a_n)$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n = |a_n - \sqrt{3}|, S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$).
- (1) 用数学归纳法证明: $b_n \leq \frac{(\sqrt{3}-1)^n}{2^{n-1}}$;
- (2) 证明: $S_n < \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

20. 某工厂生产甲、乙两种产品, 每种产品都是经过第一和第二工序加工而成, 两道工序的加工结果相互独立, 每道工序的加工结果均有 A 、 B 两个等级. 对每种产品, 两道工序的加工结果都为 A 级时, 产品为一等品, 其余均为二等品.
- (1) 已知甲、乙两种产品每一道工序的加工结果为 A 级的概率如表一所示, 分别求生产出的甲、乙产品为一等品的概率 $P_{\text{甲}}$ 、 $P_{\text{乙}}$;

概率 \ 工序 产品	第一工序	第二工序
甲	0.8	0.85
乙	0.75	0.8

表一

- (2) 已知一件产品的利润如表二所示, 用 ξ 、 η 分别表示一件甲、乙产品的利润, 在 (1) 的条件下, 求 ξ 、 η 的分布列及 $E\xi$ 、 $E\eta$;

利润 \ 等级 产品	一等	二等
甲	5 (万元)	2.5 (万元)
乙	2.5 (万元)	1.5 (万元)

表二

- (3) 已知生产一件产品需用的工人数和资金额如表三所示. 该工厂有工人 40 名, 可用资金 60 万元. 设 x 、 y 分别表示生产甲、乙产品的数量, 在 (2) 的条件下, x 、 y 为何值时, $z = xE\xi + yE\eta$ 最大? 最大值是多少?

用量 \ 项目 产品	工人 (名)	资金 (万元)
甲	8	8
乙	2	10

表三

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别是 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$, Q 是椭圆外的动点, 满足 $|\overrightarrow{F_1Q}| = 2a$. 点 P 是线段 F_1Q 与该椭圆的交点, 点 T 在线段 F_2Q 上, 并且满足 $\overrightarrow{PT} \cdot \overrightarrow{TF_2} = 0, |\overrightarrow{TF_2}| \neq 0$.
- (1) 设 x 为点 P 的横坐标, 证明: $|\overrightarrow{F_1P}| = a + \frac{c}{a}x$;
- (2) 求点 T 的轨迹 C 的方程;
- (3) 试问: 在点 T 的轨迹 C 上, 是否存在点 M , 使 $\triangle F_1MF_2$ 的面积 $S = b^2$. 若存在, 求 $\angle F_1MF_2$ 的正切值; 若不存在, 请说明理由.

22. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内可导, 导函数 $f'(x)$ 是减函数, 且 $f'(x) > 0$. 设 $x_0 \in (0, +\infty)$, $y = kx + m$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程, 并设函数 $g(x) = kx + m$.
- (1) 用 x_0 、 $f(x_0)$ 、 $f'(x_0)$ 表示 m ;
- (2) 证明: 当 $x_0 \in (0, +\infty)$, $g(x) \geq f(x)$;
- (3) 若关于 x 的不等式 $x^2 + 1 \geq ax + b \geq \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 其中 a 、 b 为实数, 求 b 的取值范围及 a 与 b 所满足的关系.