


# 理科数学

## 一、选择题

1.  $i$  为虚数单位,  $i^{607}$  的共轭复数为 ( )  
(A)  $i$  (B)  $-i$  (C)  $1$  (D)  $-1$
2. 我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题: 粮仓开仓收粮, 有人送来米 1534 石, 验得米内夹谷, 抽样取米一把, 数得 254 粒内夹谷 28 粒, 则这批米内夹谷约为 ( )  
(A) 134 石 (B) 169 石 (C) 338 石 (D) 1365 石
3. 已知  $(1+x)^n$  的展开式中第 4 项与第 8 项的二项式系数相等, 则奇数项的二项式系数和为 ( )  
(A)  $2^{12}$  (B)  $2^{11}$  (C)  $2^{10}$  (D)  $2^9$
4. 设  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 这两个正态分布密度曲线如图所示, 下列结论中正确的是 ( )




- (A)  $P(Y \geq \mu_2) \geq P(Y \geq \mu_1)$   
(B)  $P(X \leq \sigma_2) \leq P(X \leq \sigma_1)$   
(C) 对任意正数  $t$ ,  $P(X \leq t) \geq P(Y \leq t)$   
(D) 对任意正数  $t$ ,  $P(X \geq t) \geq P(Y \geq t)$
5. 设  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbf{R}$ ,  $n \geq 3$ . 若  $p$ :  $a_1, a_2, \dots, a_n$  成等比数列;  $q$ :  $(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{n-1}^2)(a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2) = (a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n)^2$ , 则 ( )  
(A)  $p$  是  $q$  的充分条件, 但不是  $q$  的必要条件  
(B)  $p$  是  $q$  的必要条件, 但不是  $q$  的充分条件  
(C)  $p$  是  $q$  的充分必要条件  
(D)  $p$  既不是  $q$  的充分条件, 也不是  $q$  的必要条件
6. 已知符号函数  $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ,  $f(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的增函数,  $g(x) = f(x) - f(ax)$  ( $a > 1$ ), 则 ( )  
(A)  $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn} x$  (B)  $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn} x$   
(C)  $\operatorname{sgn}[g(x)] = \operatorname{sgn}[f(x)]$  (D)  $\operatorname{sgn}[g(x)] = -\operatorname{sgn}[f(x)]$


7. 在区间  $[0, 1]$  上随机取两个数  $x, y$ , 记  $p_1$  为事件“ $x + y \geq \frac{1}{2}$ ”的概率,  $p_2$  为事件“ $|x - y| \leq \frac{1}{2}$ ”的概率,  $p_3$  为事件“ $xy \leq \frac{1}{2}$ ”的概率, 则 ( )  
(A)  $p_1 < p_2 < p_3$  (B)  $p_2 < p_3 < p_1$  (C)  $p_3 < p_1 < p_2$  (D)  $p_3 < p_2 < p_1$
8. 将离心率为  $e_1$  的双曲线  $C_1$  的实半轴长  $a$  和虚半轴长  $b$  ( $a \neq b$ ) 同时增加  $m$  ( $m > 0$ ) 个单位长度, 得到离心率为  $e_2$  的双曲线  $C_2$ , 则 ( )  
(A) 对任意的  $a, b, e_1 > e_2$   
(B) 当  $a > b$  时,  $e_1 > e_2$ ; 当  $a < b$  时,  $e_1 < e_2$   
(C) 对任意的  $a, b, e_1 < e_2$   
(D) 当  $a > b$  时,  $e_1 < e_2$ ; 当  $a < b$  时,  $e_1 > e_2$
9. 已知集合  $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x, y \in \mathbf{Z}\}$ ,  $B = \{(x, y) | |x| \leq 2, |y| \leq 2, x, y \in \mathbf{Z}\}$ , 定义集合  $A \oplus B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) | (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\}$ , 则  $A \oplus B$  中元素的个数为 ( )  
(A) 77 (B) 49 (C) 45 (D) 30
10. 设  $x \in \mathbf{R}$ ,  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数, 若存在实数  $t$ , 使得  $[t] = 1$ ,  $[t^2] = 2, \dots, [t^n] = n$  同时成立, 则正整数  $n$  的最大值是 ( )  
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

## 二、填空题

11. 已知向量  $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{AB}$ ,  $|\overrightarrow{OA}| = 3$ , 则  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} =$ \_\_\_\_\_.
12. 函数  $f(x) = 4\cos^2 \frac{x}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2\sin x - |\ln(x+1)|$  的零点个数为\_\_\_\_\_.
13. 如图, 一辆汽车在一条水平的公路上向正西行驶, 到  $A$  处时测得公路北侧一山顶  $D$  在西偏北  $30^\circ$  的方向上, 行驶 600 m 后到达  $B$  处, 测得此山顶在西偏北  $75^\circ$  的方向上, 仰角为  $30^\circ$ , 则此山的高度  $CD =$ \_\_\_\_\_m.




14. 如图, 圆  $C$  与  $x$  轴相切于点  $T(1, 0)$ , 与  $y$  轴正半轴交于两点  $A, B$  ( $B$  在  $A$  的上方), 且  $|AB| = 2$ .



- (1) 圆  $C$  的标准方程为\_\_\_\_\_;
- (2) 过点  $A$  任作一条直线与圆  $O: x^2 + y^2 = 1$  相交于  $M, N$  两点, 下列三个结论:  
①  $\frac{|NA|}{|NB|} = \frac{|MA|}{|MB|}$ ; ②  $\frac{|NB|}{|NA|} - \frac{|MA|}{|MB|} = 2$ ; ③  $\frac{|NB|}{|NA|} + \frac{|MA|}{|MB|} = 2\sqrt{2}$ .  
其中正确结论的序号是\_\_\_\_\_. (写出所有正确结论的序号)

15. 如图,  $PA$  是圆的切线,  $A$  为切点,  $PBC$  是圆的割线, 且  $BC = 3PB$ , 则  $\frac{AB}{AC} =$ \_\_\_\_\_.



16. 在直角坐标系  $xOy$  中, 以  $O$  为极点,  $x$  轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线  $l$  的极坐标方程为  $\rho(\sin \theta - 3 \cos \theta) = 0$ , 曲线  $C$  的参数方程为  $\begin{cases} x = t - \frac{1}{t} \\ y = t + \frac{1}{t} \end{cases}$  ( $t$  为参数),  $l$  与  $C$  相交于  $A, B$  两点, 则  $|AB| =$ \_\_\_\_\_.

## 三、解答题


17. 某同学用“五点法”画函数  $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$ ) 在某一个周期内的图象时, 列表并填入了部分数据, 如下表:

$\omega x + \varphi$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$	$\frac{3\pi}{2}$	$2\pi$
$x$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$	
$A \sin(\omega x + \varphi)$	0	5		-5	0

- (1) 请将上表数据补充完整, 填写在答题卡上相应位置, 并直接写出函数  $f(x)$  的解析式;
- (2) 将  $y = f(x)$  图象上所有点向左平行移动  $\theta$  ( $\theta > 0$ ) 个单位长度, 得到  $y = g(x)$  的图象. 若  $y = g(x)$  图象的一个对称中心为  $(\frac{5\pi}{12}, 0)$ , 求  $\theta$  的最小值.

18. 设等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 等比数列  $\{b_n\}$  的公比为  $q$ . 已知  $b_1 = a_1, b_2 = 2, q = d, S_{10} = 100$ .
- (1) 求数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  的通项公式;
- (2) 当  $d > 1$  时, 记  $c_n = \frac{a_n}{b_n}$ , 求数列  $\{c_n\}$  的前  $n$  项和为  $T_n$ .

19. 《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑.
- 如图, 在阳马  $P-ABCD$  中, 侧棱  $PD \perp$  底面  $ABCD$ , 且  $PD = CD$ , 过棱  $PC$  的中点  $E$ , 作  $EF \perp PB$  交  $PB$  于点  $F$ , 连接  $DE, DF, BD, BE$ .
- (1) 证明:  $PB \perp$  平面  $DEF$ . 试判断四面体  $DBEF$  是否为鳖臑, 若是, 写出其每个面的直角 (只需写出结论); 若不是, 说明理由.
- (2) 若面  $DEF$  与面  $ABCD$  所成二面角的大小为  $\frac{\pi}{3}$ , 求  $\frac{DC}{BC}$  的值.



20. 某厂用鲜牛奶在某台设备上生产  $A, B$  两种奶制品. 生产 1 吨  $A$  产品需鲜牛奶 2 吨, 使用设备 1 小时, 获利 1000 元; 生产 1 吨  $B$  产品需鲜牛奶 1.5 吨, 使用设备 1.5 小时, 获利 1200 元. 要求每天  $B$  产品的产量不超过  $A$  产品产量的 2 倍, 设备每天生产  $A, B$  两种产品时间之和不超过 12 小时. 假定每天可获取的鲜牛奶数量  $W$  (单位: 吨) 是一个随机变量, 其分布列为


$W$	12	15	18
$P$	0.3	0.5	0.2

该厂每天根据获取的鲜牛奶数量安排生产, 使其获利最大, 因此每天的最大获利  $Z$  (单位: 元) 是一个随机变量.

(1) 求  $Z$  的分布列和均值;

(2) 若每天可获取的鲜牛奶数量相互独立, 求 3 天中至少有 1 天的最大获利超过 10000 元的概率.

21. 一种作图工具如图①所示.  $O$  是滑槽  $AB$  的中点, 短杆  $ON$  可绕  $O$  转动, 长杆  $MN$  通过  $N$  处铰链与  $ON$  连接,  $MN$  上的栓子  $D$  可沿滑槽  $AB$  滑动, 且  $DN = ON = 1, MN = 3$ . 当栓子  $D$  在滑槽  $AB$  内作往复运动时, 带动  $N$  绕  $O$  转动一周 ( $D$  不动时,  $N$  也不动),  $M$  处的笔尖画出的曲线记为  $C$ . 以  $O$  为原点,  $AB$  所在的直线为  $x$  轴建立如图②所示的平面直角坐标系.
- (1) 求曲线  $C$  的方程;
- (2) 设动直线  $l$  与两定直线  $l_1: x - 2y = 0$  和  $l_2: x + 2y = 0$  分别交于  $P, Q$  两点. 若直线  $l$  总与曲线  $C$  有且只有一个公共点, 试探究:  $\triangle OPQ$  的面积是否存在最小值? 若存在, 求出该最小值; 若不存在, 说明理由.



22. 已知数列  $\{a_n\}$  的各项均为正数,  $b_n = n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n a_n$  ( $n \in \mathbf{N}_+$ ),  $e$  为自然对数的底数.
- (1) 求函数  $f(x) = 1 + x - e^x$  的单调区间, 并比较  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  与  $e$  的大小;
- (2) 计算  $\frac{b_1}{a_1}, \frac{b_1 b_2}{a_1 a_2}, \frac{b_1 b_2 b_3}{a_1 a_2 a_3}$ , 由此推测计算  $\frac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n}$  的公式, 并给出证明;
- (3) 令  $c_n = (a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}}$ , 数列  $\{a_n\}, \{c_n\}$  的前  $n$  项和分别记为  $S_n, T_n$ , 证明:  $T_n < e S_n$ .