

Hypothèse

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$. On note $I = \int_a^b f(x)dx$.

5.1 Principe des méthodes des rectangles	1
5.2 Interprétation graphique	1
5.3 Principe des méthodes des trapèzes	1
5.4 Implémentation des algorithmes d'intégration	2

5.1 Principe des méthodes des rectangles

Définition –


Dans cette méthode, la fonction à intégrer est interpolée par un polynôme de degré 0, à savoir une fonction constante. Géométriquement, l'aire sous la courbe est alors approximée par un rectangle. Plusieurs choix sont possibles.

Rectangles à gauche $I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b - a) f(a)$


Point milieu $I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b - a) f\left(\frac{a + b}{2}\right)$

Rectangles à droite $I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b - a) f(b)$


5.2 Interprétation graphique




Calcul intégral



Rectangles à gauche



Point milieu




Rectangles à droite

5.3 Principe des méthodes des trapèzes

Définition –

Dans cette méthode, la fonction à intégrer est interpolée par un polynôme de degré 1, à savoir une fonction affine. Géométriquement, l'aire sous la courbe est alors



approximée par un trapèze : $I = \int_a^b f(x)dx \simeq (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$

5.3.1 Notion d'erreur d'intégration

Résultat –

Dans chaque cas, on intègre f sur n subdivisions régulières de I .

Erreur sur la méthode des rectangles à gauche et à droite

Soit f fonction dérivable sur $I = [a, b]$ et dont f' est continue sur I . Soit M_1 un majorant de f' sur I . L'erreur ε commise lors de l'intégration par la méthode des rectangles à droite ou à gauche est telle que $\varepsilon \leq \frac{M_1}{2n}$.

Erreur sur la méthode des rectangles – point milieu

Si de plus f est deux fois dérivable sur $I = [a, b]$ et f'' est continue sur I , on note M_2 un majorant de f'' sur I . L'erreur ε commise lors de l'intégration par la méthode des rectangles – point milieu est telle que $\varepsilon \leq \frac{M_2}{12n^2}$.

Erreur sur la méthode des trapèzes

L'erreur commise ε est telle qu'il existe un entier M tel que $\varepsilon \leq \frac{M}{12n^2}$.

5.3.2 Bibliothèque Python

Il est possible d'intégrer une fonction en utilisant les modules de la bibliothèque `scipy` :

```
1 from scipy.integrate import quad
2 from math import sin
3 # Définition des bornes de gauche et de droite
4 g,d = -1,1
5 def f(x):
6     return sin(x)
7
8 I,erreur = quad(f,g,d)
9 print(I,erreur)
```

5.4 Implémentation des algorithmes d'intégration

5.4.1 Méthode des rectangles à gauche

```
1 def integrale_rectangles_gauche(f,a,b,nb):
2     """
3     Calcul de la valeur approchée de l'intégrale de f(x) entre a et b par la
4     méthode des rectangles à gauche.
5     Keywords arguments :
6     f -- fonction à valeur dans IR
7     a -- flt, borne inférieure de l'intervalle d'intégration
8     b -- flt, borne supérieure de l'intervalle d'intégration
9     nb -- int, nombre d'échantillons pour le calcul
10    """
11    res = 0
12    pas = (b-a)/nb
```

```

13 x = a
14 while x<b:
15     res = res + f(x)
16     x = x + pas
17 return res*pas

```

5.4.2 Méthode des rectangles à droite

```

1 def integrale_rectangles_droite(f,a,b,nb):
2     """
3     Calcul de la valeur approchée de l'intégrale de f(x) entre a et b par la
4     méthode des rectangles à droite.
5     Keywords arguments :
6     f -- fonction à valeur dans IR
7     a -- flt, borne inférieure de l'intervalle d'intégration
8     b -- flt, borne supérieure de l'intervalle d'intégration
9     nb -- int, nombre d'échantillons pour le calcul
10    """
11    res = 0
12    pas = (b-a)/nb
13    x = a+pas
14    while x<=b:
15        res = res + f(x)
16        x = x + pas
17    return res*pas

```

5.4.3 Méthode des rectangles – Point milieu

```

1 def integrale_rectangles_milieu(f,a,b,nb):
2     """
3     Calcul de la valeur approchée de l'intégrale de f(x) entre a et b par la m
4     éthode du point milieu.
5     Keywords arguments :
6     f -- fonction à valeur dans IR
7     a -- flt, borne inférieure de l'intervalle d'intégration
8     b -- flt, borne supérieure de l'intervalle d'intégration
9     nb -- int, nombre d'échantillons pour le calcul
10    """
11    res = 0
12    pas = (b-a)/nb
13    x = a+pas/2
14    while x<b:
15        res = res + f(x)
16        x = x + pas
17    return res*pas

```

5.4.4 Méthode des trapèzes pour le calcul approché d'une intégrale sur un segment

```

1 def integrale_trapeze(f,a,b,nb):
2     """
3     Calcul de la valeur approchée de l'intégrale de f(x) entre a et b par la m
4     éthode des trapèzes.
5     Keywords arguments :

```

```
5  f -- fonction à valeur dans IR
6  a -- flt, borne inférieure de l'intervalle d'intégration
7  b -- flt, borne supérieure de l'intervalle d'intégration
8  nb -- int, nombre d'échantillons pour le calcul
9  """
10 res = 0
11 pas = (b-a)/nb
12 x = a+pas
13 while x<b:
14     res = res + f(x)
15     x = x + pas
16 res = pas*(res+(f(a)+f(b))/2)
17 return res
```