

## Principe de la méthode de dichotomie

**Théorème** Théorème des valeurs intermédiaires


Soit  $f$  une fonction définie et continue sur l'intervalle  $[a, b]$  à valeur dans  $\mathbb{R}$ . Pour tout  $u \in [f(a), f(b)]$ , il existe au moins un réel  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = u$ .

En particulier (Théorème de Bolzano), si  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes différents, il existe au moins un réel  $c$  tel que  $f(c) = 0$ .

Ainsi, pour une fonction donnée définie sur un intervalle donné, le but de l'algorithme de dichotomie va être de découper en 2 l'intervalle  $[a, b]$  en deux, afin d'y trouver la solution. Par divisions successives de l'intervalle, on convergera vers la solution.

**R** Tester le signe de  $f(a)$  et  $f(b)$ .

Il existe plusieurs méthodes pour tester si  $f(a)$  et  $f(b)$  sont de signes différents. Si on ne se préoccupe pas de savoir la relation d'ordre entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , un test efficace consiste en un test du signe de  $f(a) \cdot f(b)$ .



## Principe de la méthode de Newton

**Théorème** Développement de Taylor à l'ordre 1


Soit  $f$  une fonction  $C^1$  sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ . Le développement de Taylor à l'ordre 1 de  $f$  est donné par

$$f(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x - a) + o(x - a)$$

Géométriquement, lorsqu'on néglige le reste, le développement de Taylor donne l'équation de la tangente en  $a$ . Notons  $\Delta(x)$  cette équation.

L'abscisse  $c$  de l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses est donnée par la résolution de

$$\Delta(c) = 0 \iff f(a) + f'(a) \cdot (c - a) = 0 \iff c = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$



## Évaluation de la dérivée numérique

**Résultat** En première approximation, il est possible d'approximer la dérivée en approxinant la tangente à la courbe par une droite passant par deux points successifs. Dans ces conditions, pour une valeur de  $h$  suffisamment faible, on a :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

## Méthodes à un pas

### Résultat Différence avant – Schéma d'Euler explicite


Dans ce cas, l'estimation de la dérivée au point  $P_i$  s'appuie sur le point  $P_{i+1}$  :

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

### Résultat Différence arrière – Schéma d'Euler implicite

Dans ce cas, l'estimation de la dérivée au point  $P_i$  s'appuie sur le point  $P_{i-1}$  :

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$



## Méthode à deux pas

**Résultat** On peut aussi utiliser les points  $P_{i-1}$  et  $P_{i+1}$  pour estimer la dérivée en  $P_i$  :

$$f'(x_i) \simeq \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{x_{i+1} - x_{i-1}}$$

R

- Lorsqu'il s'agit de dériver une fonction temporelle « en temps réel », le point suivant n'est pas encore connu donc seule la différence arrière peut être calculée.
- Le calcul de la dérivée conduit à un tableau de valeurs de dimension  $n - 1$ .

