

一、最佳选择题

1.给患者调整抗抑郁药时必须谨慎,以单胺氧化酶抑制剂替换选择性 5-羟色胺再摄入抑制剂时,应当间隔一定的时间。至少应间隔 (E)

A.1 天

B.5 天

C.7 天

D.10 天

E.14 天

2.西肽普兰抗抑郁的药理作用机制是 (A)

A.抑制 5-羟色胺再摄取

B.抑制神经末梢突触前膜的 α_2 受体

C.抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素在摄取

D.抑制单胺氧化酶

E.阻断 5-羟色胺受体及抑制 5-羟色胺再摄取

3.为避免引起大面积中毒性表皮坏死松懈症,服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因(HLA-B*1502)检测的抗癫痫药是 (A)

A.卡马西平

B.丙戊酸钠

C.氟硝西泮

D.托吡酯

E.加巴喷丁

4.在痛风急性期禁用的药物是 (B)

A.秋水仙碱

B.别嘌醇

C.布洛芬

D.舒林酸

E.泼尼松

5.具有类似磺胺结构,对磺胺类药物有过敏史的患者需慎用的非甾体抗炎药是 (E)

A.阿司匹林

B.吲哚美辛

C.双氯芬酸钠

D.美托洛尔

E.塞来昔布

6.可抑制尿酸生成的药物是 (E)

A.秋水仙碱

B.苯普生

C.苯溴马隆

D.氢氯噻嗪

E.别嘌醇

7.对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是 (A)

A.吸入性糖皮质激素+长效 β_2 受体激动剂

B.吸入性糖皮质激素+短效 β_2 受体激动剂

C.长效 β_2 受体激动剂+长效 M 胆碱受体

阻断剂

D.长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

E.长效 β_2 受体激动剂+白三烯受体阻断剂

8.关于镇咳药作用强度的比较,正确的是

(D)

A.喷托维林>苯丙哌林>可待因

B.可待因>苯丙哌林>喷托维林

C.苯丙哌林>喷托维林>可待因

D.苯丙哌林>可待因>喷托维林

E.喷托维林>可待因>苯丙哌林

9.服用后可能导致口中有氨味、舌苔、大便呈灰黑色的药物是 (C)

A.奥美拉唑

B.硫糖铝

C.枸橼酸铋钾

D.西咪替丁

E.半托拉唑

10.西咪替丁的禁忌症是 (A)

A.急性胰腺炎

B.胃食管反流症

C.卓-艾综合征

D.应激性溃疡

E.上消化道出血

11. 具有阿片样作用,长期大剂量服用产生欣快感的止泻药是 (E)
- A. 双八面体蒙脱石散
B. 洛哌丁胺
C. 地衣芽孢或杆菌胶囊
D. 阿托品
E. 地芬诺酯
12. 患者,男,57 岁,肾功能正常,既往有动脉粥样硬化,高血压 30 合并 2 型糖尿病,服用下列药物后出现踝关节肿胀,到药房问询,药师提示有可能引起不良反应的药物是 (D)
- A. 赖诺普利片
B. 格列吡嗪肠溶片
C. 阿司匹林肠溶片
D. 硝苯地平缓释片
E. 阿托伐他汀钙片
13. 长期应用 β 受体阻断剂的患者,如需停药,应逐步撤药,整个过程至少需要 (E)
- A. 1 天
B. 3 天
C. 5 天
D. 7 天
E. 14 天
14. 使用后可以产生抗体,一年内不宜再次使用的药物是 (B)
- A. 尿激酶
B. 链激酶
C. 瑞替普酶
D. 阿替普酶
E. 血凝酶
15. 急性缺血性脑卒中发作,应用溶栓药治疗时间窗是在发病后 (A)
- A. 3 小时内
B. 8 小时内
C. 12 小时内
D. 24 小时内
- E. 48 小时内
16. 属于直接凝血酶抑制剂的抗凝血药是 (E)
- A. 依诺肝素
B. 肝素
C. 华法林
D. 利伐沙班
E. 达比加群酯
17. 应用维生素 B12 治疗巨幼红细胞性贫血 48 小时内,应监测的电解质是 (B)
- A. 钠
B. 钾
C. 锂
D. 钙
E. 锌
18. 在常规剂量下,5 α 还原酶抑制剂可使(血清前列腺特异抗原) PSA 水平下降幅度是 (E)
- A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
E. 50%
19. 属于抗孕激素类药,用于终止早孕的药物是 (A)
- A. 米非司酮
B. 甲地孕酮
C. 左炔诺孕酮
D. 黄体酮
E. 地屈孕酮
20. 不属于糖皮质激素的适应症是 (A)
- A. 活动性肺结核
B. 系统性红斑狼疮
C. 再障
D. 风湿
E. 过敏性休克
21. 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 (B)

- A.血栓性静脉炎 B.高钙血症 27.阿昔洛韦片治疗带状疱疹的用法用量是
C.高胆红素血症 D.颅内压升高 (E)
E.乳腺肿大 A.一次 200mg, 一日 3 次
- 22.用于治疗妊娠妇女子痫和先兆子痫的首选药物是 (C) B.一次 400mg, 一日 3 次
C.一次 800mg, 一日 2 次
D.一次 800mg, 一日 3 次
E.一次 800mg, 一日 5 次
- A.依那普利 B.普萘洛尔 28.影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是
C.硫酸镁 D.丙戊酸钠
E.枸橼酸钾
- 23.可导致新生儿药物性黄疸的是 (D) (C)
A.头孢他啶 B.阿莫西林 A.奎宁 B.青蒿素
C.林可霉素 D.磺胺嘧啶 C.乙胺嘧啶 D.伯氨喹
E.氯喹
- 24.长期大剂量使用广谱抗生素导致艰难梭状芽孢杆菌感染性腹泻,首选的治疗药物是
29.奎宁或氯喹日剂量超过 1g 或持续长时间应用,可见耳鸣、头疼、视力与听力减退等,停药后即可恢复,临床成为 (C)
A.环丙沙星 B.阿奇霉素 A.双硫仑样反应 B.赫氏反应
C.阿米卡星 D.头孢哌酮 C.金鸡纳反应 D.神经毒性反应
E.万古霉素 E.锥体外系反应
- 25.导致视神经炎的抗结核药时候 (C) 30.解救有蒽醌类抗肿瘤药导致的心肌炎,应当选用的药物是 (C)
A.利福平 B.利福喷丁
C.乙胺丁醇 D.吡嗪酰胺
E.对氨基水杨酸钠
- 26.奥司他韦治疗流行性感冒,首次用药的时间是 (A)
A.出现流感症状后 48 小时内
B.出现流感症状后 72 小时内
C.出现流感症状后 96 小时内
D.出现流感症状后 100 小时内
E.出现流感症状后 120 小时内
- 31.用药时需关注肺毒性的药物是 (D)
A.柔红霉素 B.长春新碱
C.紫杉醇 D.博来霉素
E.氟他胺
- 32.易发生超敏反应,用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁肿瘤病是 (C)
A.注射用柔红霉素

B.注射用硫酸长春新碱

C.紫衫醇注射液

D.注射用盐酸博来霉素

E.注射用环磷酰胺

33.治疗顺铂化疗所引起的重度恶心呕吐,首选的联合用药方案是 (E)

A.甲氧氯普胺联合维生素 B6

B.西咪替丁联合维生素 B6

C.多潘立酮联合地塞米松

D.多潘立酮联合甲氧氯普胺

E.阿瑞吡坦联合地塞米松

34.5 岁以下儿童首选的散瞳剂是 (B)

A.10%去氧肾上腺素滴眼剂

B.1%硫酸阿托品眼膏剂

C.2%后马托品眼膏剂

D.四环素可的松眼膏剂

E.3%氧氟沙星眼膏剂

35.羟甲唑啉滴鼻剂使用期间,可能法还是能出现的不良反应是 (C)

A.流泪

B.鼻衄

C.心率加快

D.血压下降

E.鼻粘膜肿胀

36.减鼻充血药通常用于缓解鼻塞症状,其所激动的受体是 (D)

A.M 受体

B.N 受体

C.H1 受体

D. α 受体

E. β 受体

37.可杀灭疥虫的药物是 (A)

A.林旦

B.甲苯达唑

C.维 A 酸

D.阿苯达唑

E.咪康唑

38.维 A 酸染膏治疗痤疮时,合理的用法是 (A)

A.一日一次,睡前使用

B.一日一次,晨起使用

C.一日一次,固定时间使用

D.一日二次,早晚使用

E.一日三次,早、中、晚使用

39.关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法,错误的是 (A)

A.面部、阴部和皱褶部位的湿疹,需长期使用强效制剂

B.可用于过敏性皮炎的治疗

C.为控制的细菌或真菌感染不宜使用

D.若继发细菌或真菌感染,可与抗菌药或抗真菌药联合使用

E.若未使用中出现过敏症状应立即停药

40.可用于治疗重度痤疮,但妊娠期妇女避免使用的药物是 (C)

A.克拉霉素

B.特比萘芬

C.异维 A 酸

D.克罗米通

E.环吡酮胺

二、配伍选择题

【41~43】

A.卡马西平

B.苯妥英钠

C.丙戊酸钠

D.苯巴比妥

E.氯硝西洋

41.主要阻滞电压依赖性的钠通道,属于二苯

并氮卓类抗癫痫药的是 (A)

42.减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定,属于乙内酰脲类抗癫痫药的是 (B)

43.可激动 γ -氨基丁酸(GABA)受体和钠通道,属于苯二氮卓类抗癫痫药的是 (E)

【44~45】

A.阿普唑仑

B.异戊巴比妥

C.地西泮

D.佐匹克隆

E.苯巴比妥

44.脂溶性较高,起效快,属于巴比妥类的镇静催眠药是 (B)

45.没有镇静和“宿醉”现象,不属于巴比妥类和苯二氮卓类的镇静催眠药是 (B)

【46~47】

A.沙美特罗

B.沙丁胺醇

C.多索茶碱

D.布地奈德

E.塞托溴铵

46.属于长效 B_2 受体激动剂的平喘 (A)

47.属于长效M胆碱受体阻断剂的平喘药是 (E)

【48~49】

A.右美沙芬

B.氯化铵

C.可待因

D.苯丙哌林

E.羧甲司坦

48.具有成瘾性的中枢性镇咳药是 (C)

49.没有成瘾性,兼有中枢和外周镇咳作用的药品是 (D)

【50~52】

A.雷尼替丁

B.乳酸菌素

C.前列地尔

D.泽托拉唑

E.铝碳酸镁

50.适宜餐前嚼服的助消化药是 (B)

51.适宜睡前服用,用于一直“酸突破现象”的抑酸剂是 (A)

52.适宜餐前正片(粒)吞服,不可咀嚼或压碎的抑酸剂是 (D)

【53~55】

A.甘油

B.聚乙二醇 4000

C.乳果糖

D.比沙可啶

E.硫酸镁

53.属于容积性泻药的是 (E)

54.属于渗透性泻药的是 (C)

55.属于刺激性泻药的是 (D)

【56~58】

A.利多卡因

B.索他洛尔

C.美托洛尔

D.硝酸甘油

E.维拉帕米

56.属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

(A)

57.属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是

(E)

58.属于延长动作电位时程的抗心律失常药

是 (B)

【59~60】

A.依那普利

B.替米沙坦

C.哌唑嗪

D.坦洛新 (坦索罗辛)

E.阿利克仑 (阿利吉仑)

59.属于肾素抑制剂的药品是 (E)

60.属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

(B)

【61~63】

A.阿托伐他汀

B.非诺贝特

C.阿昔莫司

D.依折麦布

E.烟酸

61.属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是 (A)

62.属于胆固醇吸收抑制剂的是 (D)

63.属于贝丁酸类调节血脂药的是 (B)

【64~65】

A.维生素 B1

B.维生素 B2

C.维生素 B12

D.依诺肝素

E.酚磺乙胺

64.服用叶酸治疗巨幼红细胞贫血,需同时联合使用的药品是 (C)

65.华法林起效缓慢,深静脉栓塞治疗的初期,需同时联合使用的是 (D)

【66~67】

A.硫酸亚铁

B.重组人促红素

C.维生素 B12

D.人血白蛋白

E.非格司亭

66.可升高红细胞,用于肾性或非肾性贫血的药品是 (B)

67.可升高粒细胞,用于化疗所致的中性粒细胞减少症的药品是 (E)

【68~69】

A.硝酸甘油

B.甲睾酮

C.非那雄胺

D.丙酸睾酮

E.克拉霉素

68.与西地那非合用,可导致严重低血压的药品是 (A)

69.可抑制 CYP3A4,影响西地那非代谢的药品是 (E)

【70~71】

A.酚妥拉明

B.度他醇胺

C.普适泰

D.特拉唑嗪

E.肾上腺素

70.属于 α_1 受体阻断剂的抗良性前列腺增生症的药品是 (D)

71.属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是 (B)

【72~73】

A.地特胰岛素

B.预混胰岛素

C.普通胰岛素

D.精蛋白锌胰岛素

E.低精蛋白锌胰岛素

72.按作用时间分类,属于超长效的胰岛素/胰岛素类似物的是 (A)

73.可供静脉注射的胰岛素/胰岛素类似物的是 (C)

【74~76】

A.阿卡波糖

B.二甲双胍

C.那格列奈

D.艾塞那肽

E.吡格列酮

74.那于 GLP-1 受体激动剂的是 (D)

75.属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是 (A)

76.属于促胰岛素分泌剂的是 (C)

【77~79】

A.戊酸雌二醇

B.他莫昔芬

C.地屈孕酮

D.依普黄酮

E.司坦唑醇

77.可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素的是 (E)

78.可用于习惯性流产的药品是 (C)

79.可用于缓解绝经后更年期症状的药品是 (A)

【80~81】

A.氯化钾

B.乳酸钠

C.谷氨酸

D.硫酸镁

E.氯化铵

80.可以碱化尿液,用于代谢性酸中毒的药品是 (B)

81.可以酸化尿液,用于代谢性碱中毒的药品是 (E)

【82~83】

A.碳酸钙

B.三磷酸腺苷

C.二磷酸果糖

D.葡萄糖

E.螺内酯

82.用于治疗低磷血症的药物是 (C)

83.与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是 (D)

【84~85】

A.头孢吡肟

B.头孢美唑

C.亚胺培南

D.氨曲南

E.拉氧头孢

84.对杆菌属类厌氧菌敏感,属于头霉素
(B)

85.属于碳青霉烯类 (C)

【86~88】

A.磷霉素

B.替考拉宁

C.利福平

D.舒巴坦

E.左氧氟沙星

86.可抑制细菌 B-内酰胺酶的是 (D)

87.可抑制细菌 DNA 旋转酶的是 (E)

88.可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶
的是 (C)

【89~91】

A.头孢氨苄

B.头孢哌酮

C.头孢吡肟

D.头孢拉定

E.头孢呋辛

89.属于第二代头孢菌素的药物是 (E)

90.属于第三代头孢菌素的药物是 (B)

91.属于第四代头孢菌素的药物是 (C)

【92~94】

A.利奈唑胺

B.头孢他啶

C.头孢曲松

D.罗红霉素

E.头孢噻肟

92.铜绿假单胞菌感染首选的抗菌药物是
(B)

93.耐甲氧西林金黄色葡萄菌感染宜首选的
抗菌药物是 (A)

94.军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌
药物是 (D)

【95~97】

A.甲氧氯普胺

B.维生素 B6

C.托烷司琼

D.阿瑞吡坦

E.西咪替丁

95.属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是
(D)

96.属于多巴胺受体阻断剂的止吐药是 (A)

97.属于 5-HT₅ 受体阻断剂的止吐药是 (C)

【98~100】

A.毛果芸香碱

B.甘露醇

C.乙酰唑胺

D.噻吗洛尔

E.地匹福林

98.属于 M 胆碱受体激动剂的降低眼压药是
(A)

99.属于 B 受体阻断剂的降低眼压药是 (D)

100.属于肾上腺素受体激动剂的降低眼压药
是 (E)

三、综合分析选择题

(一)

患者,男,56 岁。有高血压病史 4 年。体检:
血压 156/96mmHg,无主动脉狭窄。医师处
方依那普利片控制血压。

101.该患者若长期服用依那普利片,除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是 (A)

- A.血钾 B.血钠
C.血钙 D.血氯
E.血镁

102.该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是 (C)

- A.低血糖 B.光过敏
C.干咳 D.水肿
E.口干

103.服用2个月后,血压控制未达标,经进一步检查,该患者伴有同型半胱氨酸水平升高,宜联合应用的药品是 (E)

- A.维生素A B.维生素B6
C.维生素C D.烟酸
E.叶酸

(二)

患者,男,66岁。体检时发现血糖高前来就诊,有磺胺药过敏史,体型肥胖。医师处方二甲双胍片(0.5g, tid)控制血糖。

104.二甲双胍片的适宜服用时间是 (B)

- A.餐前半小时 B.随餐服用
C.餐后半小时 D.餐后2小时
E.空腹服用

105.该患者复诊发现糖耐量异常及餐后血糖升高,单药控制未达标,建议联合应用的降糖药是 (D)

- A.格列喹酮 B.格列苯脲
C.胰岛素 D.阿卡波糖

E.罗格列酮

106.联合用药应注意监测的主要不良反应 (B)

- A.光敏反应 B.低血糖反应
C.糖尿病酮症酸中毒 D.急性胰腺炎
E.尿路感染

(三)

患者,女,70岁,拟行膝关节置换术,无磺胺类药过敏史,皮试结果呈阴性。体征和实验室检查:低热,无感染,空腹血糖

4.6mmol/L。手术医师处方抗菌药物预防感染。

107.首选的抗菌药物是 (B)

- A.阿奇霉素 B.头孢唑林
C.万古霉素 D.克林霉素
E.磺胺嘧啶

108.围术期预防性用药宜采用的给药途径是 (C)

- A.口服 B.肌肉注射
C.静脉滴注 D.皮下注射
E.动脉注射

109.围术期预防性用药的起始给药时机是

(B)

- A.术前24小时
B.术前0.5~2小时
C.术中
D.术后0.5~2小时
E.术后24小时

110. I类清洁手术切口预防性应用抗菌药物的比例不得超出手术病例总数的 (E)

- A.70% B.60% C.腺嘌呤 D.甲氮嘌呤
C.50% D.40% E.丙硫氧嘧啶
E.30% 115.属于雌激素受体调节剂的药物有 (AE)

四、多项选择题

- 111.关于抗痛风药秋水仙碱的说法,正确的有 (ADE)
- A.初始剂量 1mg 维持剂量 0.5mg.tid
B.可用于痛风的长期预防
C.可用于痛风的缓解期
D.老年人、肝肾功能不全者应减量
E.长期服务可导致可逆性维生素 B12 吸收不良
- 112.患者来药店购买双歧杆菌三联活菌制剂,药师应该交待的使用注意事项包括 (ABCDE)
- A.置于冰箱中冷藏保存
B.与抗酸剂分开服用
C.宜用温水送服
D.不宜与抗菌药物同时服用
E.可混于温牛奶中服用
- 113.血管紧张素 II 受体阻断剂主要药理作用有 (ACDE)
- A.抗高血压作用
B.肝脏保护作用
C.肾脏保护作用
D.脑血管保护作用
E.减轻左室心肌肥厚作用
- 114.可引起白细胞计数减少的药物有 (ABDE)
- A.甲氧苄啶 B.丝裂霉素 C.腺嘌呤 D.甲氮嘌呤
E.丙硫氧嘧啶 115.属于雌激素受体调节剂的药物有 (AE)
A.雷洛昔芬 B.依降钙素
C.甲羟孕酮 D.雌三醇
E.依普黄酮
- 116.关于溶栓药的作用及临床应用的说法,正确的有 (ABCE)
- A.尿激酶直接激活纤溶酶原为纤溶酶,分解纤维蛋白或纤维蛋白原
B.溶栓药应尽早使用,以减少缺血组织的损伤
C.阿替普酶选择性激活血栓部位的纤溶酶原,出血并发症少
D.溶栓后需要肝素维持抗凝治疗
E.有出血性脑卒中史、可疑主动脉夹层、颅内肿瘤等患禁用
- 117.阿仑磷酸钠适宜的给药方法包括 (ABC)
- A.早餐前空腹服药
B.用大量温开水送服
C.服药后 30 分钟内保持立位
D.早餐后 30 分钟服
E.宜与碳酸钙同时服用
- 118.可能引起体位性低血压的药物有 (ABE)
- A.甲基多巴 B.硝普钠
C.麻黄碱 D.布洛芬
E.哌唑嗪

119.服药期可饮酒（包括中药药酒），可能导

致双硫仑样反应的头孢菌素有（ DE ）

A.头孢拉定 B.头孢他啶

C.头孢呋辛 D.头孢哌酮

E.头孢曲松

120.莫西沙星可能导致的典型不良反应有

（ ACDE ）

A.跟腱炎、跟腱断裂

B.视网膜脱落

C.尖端扭转性室性心律失常

D.幻觉、失眠

E.光敏性皮炎

