

一、最佳选择题

1. 某女, 35 岁, 因家庭纠纷, 情志不畅导致肝气郁结, 影响脾胃运化功能, 其疾病传变是 ()

- A. 相克
- B. 子病及母
- C. 相乘
- D. 母病及子
- E. 相侮

答案: C

2. 脏腑经络功能减退, 血液生成不及, 运行迟缓, 水液在体内潴留等病变, 与气机功能失常密切相关的是 ()

- A. 温煦作用
- B. 推动作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

答案: B

3. 某女, 35 岁。出现表情淡漠, 寡言少语, 闷闷不乐, 哭笑无常等症状, 其临床意义是 ()

- A. 失神
- B. 少神
- C. 假神
- D. 神乱
- E. 无神

答案: D

4. 八纲辨证中, 寒热症候主要辨析的是 ()

- A. 疾病部位
- B. 疾病原因
- C. 疾病性质
- D. 病势趋向
- E. 疾病传变

答案：C

5. 表热证用辛凉解表方药，里热证用清热泻火方药治疗，体现的治法是()

- A. 寒者热之
- B. 热者寒之
- C. 用热远热
- D. 寒因寒用
- E. 热因热用

答案：B

6. 某男，32岁。近3天所在单位多人发热，患者1天前突然发热，高热不退，寒战，周身酸痛，无汗，口干，咽喉疼痛，舌质红，苔黄，脉浮数，应选用的中医治法是()

- A. 辛凉解表
- B. 辛温解表
- C. 益气解表
- D. 解表除湿
- E. 清热解毒

答案：E

7. 某女，25岁，胃痛吐酸，喜温恶寒，舌淡，苔薄白，脉弦紧，医生诊断后开具处方：高良姜、香附、延胡索、吴茱萸、木香，以温中散寒，和胃止痛治疗。该患者适宜的服药时间是()

- A. 饭前
- B. 饭后
- C. 睡前
- D. 空腹
- E. 频服

答案：B

8. 某女，25岁。不寐，心烦，口渴，咽燥，口舌生疮，小便短赤，舌尖红，苔薄，脉数，应选用的中成药是()

- A. 人参归脾丸
- B. 天王补心丸

- C. 朱砂安神丸
- D. 养血安神丸
- E. 解郁安神颗粒

答案：C

9. 湿度是影响药物质量的一个重要因素，不仅可引起药物的物理和化学变化，如含水量，外观形态、化学成分发生改变等，而且能影响微生物的繁殖及害虫的生长。一般中药炮制品的质量控制和贮藏要求应是（ ）

- A. 绝对含水量应控制在 7%~13%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
- B. 绝对含水量应控制在 9%~13%，贮存环境的相对湿度应控制在 30%~70%
- C. 绝对含水量应控制在 7%~15%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~75%
- D. 绝对含水量应控制在 9%~15%，贮存环境的相对湿度应控制在 35%~70%
- E. 绝对含水量应控制在 8%~15%，贮存环境的相对湿度应控制在 40%~70%

答案：A

10. 小青龙汤治疗痰多咳喘处方为：麻黄、白芍，细辛、干姜、甘草、桂枝、半夏五味子，方中半夏应选用的炮制品是（ ）

- A. 生半夏
- B. 清半夏
- C. 姜半夏
- D. 法半夏
- E. 半夏曲

答案：D

11. 某女，36 岁，带下色白，量多稀薄，头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软，小便频数，大便溏薄，舌质淡润，苔薄白，脉沉迟，其证候是（ ）

- A. 湿热
- B. 痰湿
- C. 肾虚
- D. 肝郁
- E. 脾虚

答案：C

12. 关于中成药之间配伍应用主要形式的说法错误的是（ ）

- A. 功效不同的中成药配伍应用，辅药能够提高主药的功效
- B. 含有毒成分的中成药配伍应用，可起到以毒攻毒的作用
- C. 功效相似的中成药合理配伍应用，可起到协同增效作用
- D. 两药同用，一种中成药能够抑制另一种中成药的副作用
- E. 中成药配伍应用可采用内服与外用相结合的治法

答案：B

13. 医生在中药处方中应用不同的术语，对饮片炮制、产地、质地、采时、新陈、颜色、气味等有特殊要求加以注明。下列与药名有关的术语中，属于对质地有特殊要求的是（ ）

- A. 田三七
- B. 江枳壳
- C. 陈香橼
- D. 明天麻
- E. 紫丹参

答案：D

14. 某男，19岁。面部粟疹累累，疼痛，色红，部分有脓疱，口渴，大便秘结，小便短赤，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。应选用的中成药是（ ）

- A. 黄连上清丸
- B. 牛黄解毒丸
- C. 当归苦参丸
- D. 牛黄清心丸
- E. 防风通圣丸

答案：A

15. 某女，55岁。患2型糖尿病7年，头晕目眩，口干喜饮，神疲健忘，倦怠乏力，遇劳则发，腰膝酸软，手足心热，舌淡红有齿痕，脉沉弱。执业药师建议配伍使用的中成药应是（ ）

- A. 生脉胶囊与济生肾气丸
- B. 大补阴丸与六味地黄丸
- C. 补中益气丸与六味地黄丸

D. 香砂六君丸与金匱肾气丸

E. 脑立清胶囊与六味地黄丸

答案：C

16. 处方直接写药名，需调配麸炒品的品种是（ ）

A. 白芥子

B. 骨碎补

C. 补骨脂

D. 白僵蚕

E. 莱菔子

答案：D

17. 某男，32岁。大便带血，滴血，有时呈喷射状出血，血色鲜红，肛门瘙痒；舌质红，苔薄白，脉数。应选用的方剂是（ ）

A. 凉血地黄汤加减

B. 黄土汤加减

C. 脏连丸加减

D. 归脾丸加减

E. 补中益气丸加减

答案：A

18. 患儿，6个月，近日脘腹胀满，嗳腐酸馊，时呕吐，哭闹，大便酸臭，手足心热，舌苔白厚腻，指纹紫滞。应选用的方剂是（ ）

A. 健胃丸加减

B. 二陈汤加减

C. 消乳丸加减

D. 温胆汤加减

E. 理中汤加减

答案：C

19. 萜类在自然界分布广泛，种类繁多，不少萜类化合物对肝脏有明显毒副作用，可引起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高，黄疸、肝肿大。其中含萜类并具有肝脏毒性的中药是（ ）

A. 苍耳子

B. 黄药子

- C. 蓖麻子 D. 相思子
- E. 望江南子

答案：B

20. 某男，43 岁。咳嗽气粗，痰多黄稠，严重时痰中夹血或咳鲜血，伴胸闷烦热，汗出，口渴喜冷饮；舌质红，苔黄腻，脉滑数，该患者禁用的中药应是（ ）

- A. 猪牙皂 B. 黄芩
- C. 桑白皮 D. 橘红
- E. 法半夏

答案：A

21. 某男，66 岁。长期吸烟，喘促气短 20 年，加重 10 天。症见喘促气短，动则尤甚，呼多吸少，气不得续，形寒肢冷，面唇青紫；舌质淡，苔薄，脉沉弱。其中医证候是（ ）

- A. 风寒困脾
- B. 风热犯肺
- C. 肺脾气虚
- D. 肾不纳气
- E. 肝气郁结

答案：D

22. 某女，27 岁。妊娠 5 个月，因上火导致咽喉肿痛，口苦，小便黄赤，便秘；舌红，苔薄黄，脉弦数。该患者应慎用的中成药是（ ）

- A. 咽喉消炎丸
- B. 牛黄上清丸
- C. 牛黄消炎片
- D. 芩翘口服液
- E. 蒲地蓝消炎口服液

答案：B

23. 某女，29岁。因全身浮肿就诊，经系统检查诊为肾病综合征，中医诊断为肾阳亏虚证水肿，采用中西药综合治疗。结合病情，既符合中医辨证、又能增加西药利尿效果的方剂是（ ）

- A. 六味地黄汤
- B. 五苓散
- C. 真武汤
- D. 参苓白术散
- E. 越婢加半夏汤

答案：C

24. 某女，55岁，大便艰涩，排出困难，腹冷腹痛，小便清长，畏寒喜暖，面色无华，舌质淡，苔薄白，脉沉迟，应选用的方剂是（ ）

- A. 六腑汤加减
- B. 麻子仁丸加减
- C. 润肠丸加减
- D. 半硫丸加减
- E. 大承气汤加减

答案：D

25. 某患者因治疗需要使用柴胡注射液后出现过敏性休克，立即停药并及时抢救后痊愈，后该患者因使用其他药物导致原有疾病加重、出现并发症后死亡。现填写该患者只用柴胡注射液的不良反应报告，对“不良反应/事件的结果”应填写（ ）

- A. 死亡
- B. 痊愈
- C. 有后遗症
- D. 未好转
- E. 不详

答案：B

26. 某男，35岁，因患肺结核服用抗结核药治疗现肝功能损害。医生建议加用中药，能够减轻抗结核药肝损伤的方剂是（ ）

- A. 玉屏风散
- B. 逍遥散
- C. 六君子汤
- D. 理中汤

E. 四逆汤

答案：B

27. 根据血清脂质检查指标，判断出现血脂异常的是（ ）

A. 总胆固醇（TC）4.21mmol/L、低密度脂蛋白脂（LDL）1.37mmol/L、高密度脂蛋白（HDL）3.04mmol/L

B. 总胆固醇（TC）4.21mmol/L、低密度脂蛋白脂（LDL）2.37mmol/L、高密度脂蛋白（HDL）4.55mmol/L

C. 总胆固醇（TC）5.61mmol/L、低密度脂蛋白脂（LDL）4.37mmol/L、高密度脂蛋白（HDL）0.75mmol/L

D. 总胆固醇（TC）3.21mmol/L、低密度脂蛋白脂（LDL）2.00mmol/L、高密度脂蛋白（HDL）3.05mmol/L

E. 总胆固醇（TC）3.21mmol/L、低密度脂蛋白脂（LDL）3.00mmol/L、高密度脂蛋白（HDL）2.05mmol/L

答案：C

28. 预防药物性肾损伤，需要严格掌握各种药物的适应症，避免滥用。关于用药注意事项的说法错误的是（ ）

A. 含重金属成分的中药可小剂量长期服用

B. 对某些有肾损害高危因素者，药物应慎用或减量

C. 数种药物并用时，注意药物间的相互作用

D. 因慢性病需长期服用可能蓄积的药物，应采用少量、间断服药方法

E. 一旦发现有肾损害，应立即停药，并给予相应处理

答案：A

29. 骨骼疾病，如骨损伤、变形性骨炎。骨折恢复期、佝偻病、骨软化症等，出现酶活性升高的是（ ）

A. ALP

B. ALT

C. AST

D. AMS

E. γ -GT

答案：A

30. 某男，69岁。有冠心病史。症见胸痛隐隐，遇劳易发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗，口唇紫暗；舌质淡紫，舌体胖大，边有齿痕，苔薄白，脉结，应选用的中医治法是（ ）

- A. 行气活血
- B. 益气活血
- C. 豁痰活血
- D. 温阳活血
- E. 养阴活血

答案：B

31. 某小儿因误服大量苦杏仁出现严重中毒反应，其临床表现主要是（ ）

- A. 腹痛腹泻，恶心呕吐
- B. 呼吸麻痹，瞳孔散大
- C. 牙关紧闭，四肢抽搐
- D. 面色苍白，瞳孔缩小
- E. 胸闷气短，心率减慢

答案：B

32. 根据《中国药典》“凡例”，下列对中药【贮藏】项下的各名词术语解释，正确的是（ ）

- A. 阴凉处，系指不超过 18℃ 的环境
- B. 凉暗处，系指避光并不超过 18℃ 的环境
- C. 常温，系指 10~30℃ 的环境
- D. 冷处，系指 5~10℃ 的环境
- E. 室温，系指 20~30℃ 的环境

答案：C

33. 某女，36岁。咽部干痒灼热，微痛，有异物感，咳嗽少痰，颧红，潮热；舌质红，苔少，脉细数。应选用的中成药是（ ）

- A. 清咽利膈丸
- B. 玄麦甘桔颗粒

- C. 板蓝根颗粒
- D. 复方鱼腥草片
- E. 利咽解毒颗粒

答案：B

34. 患儿 5 岁，形体偏瘦，不思饮食，食而不化，面色萎黄，神倦多汗，大便偏稀夹有不消化食物，舌质淡，苔薄白，脉弱。应选用的方剂是（ ）

- A. 异功散加减
- B. 养胃增液汤加减
- C. 不换金正气散加减
- D. 保和丸加减
- E. 枳术丸加减

答案：A

35. 桑杏汤是治疗咳嗽的常用方剂，其针对的证候是（ ）

- A. 风寒犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 痰热壅肺
- D. 燥邪伤肺
- E. 肺肾阴虚

答案：D

36. 某女。28 岁、妊娠 7 个月，因饮食不当致胃痛胀满，噎腐恶食，吐食，大便不爽，舌苔厚腻，该患者应忌用的中成药是（ ）

- A. 保和丸
- B. 越鞠保和丸
- C. 六味安消散
- D. 胃脘舒颗粒
- E. 胃乃安胶囊

答案：C

37. 藏药七味红花殊胜丸的功能是（ ）

- A. 清热消炎，保肝退黄
- B. 清热解毒，疏肝利胆
- C. 清热解毒，益肝养胃
- D. 清热解毒，调和滋补
- E. 清热消炎，通经活络

答案：A

38. 中国古代收方最多，为研究复方用药提供珍贵资料的方书典籍是（ ）

- A. 千金翼方
- B. 普济方
- C. 外台秘要
- D. 太平圣惠方
- E. 太平惠民和剂局方

答案：B

39. 某女，48岁，平素易外感，昨日受凉后发热恶寒明显，头痛，鼻塞，身痛，体倦，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮无力。应选用的方剂是（ ）

- A. 银翘散加减
- B. 参苏饮加减
- C. 桑菊饮加减
- D. 麻黄汤加减
- E. 桂枝汤加减

答案：B

40. 为使药物中的药效成分充分煎出，又不会造成药效成分流失，需要后下的中药是（ ）

- A. 三七
- B. 香薷
- C. 砂仁
- D. 佩兰
- E. 藿香

答案：C

二、配伍选择题

【41~42】

- A. 板蓝根与大青叶
- B. 阿魏与鸡矢藤
- C. 陈皮与青皮
- D. 山药与天花粉
- E. 麻黄与麻黄根

41. 按照斗谱编排基本原则，因植物来源相同但入药部位和功效不同，不能排列在一起的饮片是（ ）

42. 按照斗谱编排基本原则，因外观形状相似但功效不同，不能排列在一起的饮片是（ ）

答案：E、D

【43~45】

- A. 灯心草煎汤送服
- B. 淡盐水送服
- C. 黄酒送服
- D. 生姜煎汤送服
- E. 蜂蜜冲水送服

43. 九味羌活丸可用的药引和服用方法是（ ）

44. 附子理中丸可用的药引和服用方法是（ ）

45. 腰痛宁胶囊可用的药引和服用方法是（ ）

答案：D、 D、 C

【46~48】

- A. 四物颗粒
- B. 四神丸
- C. 四君子丸

D. 龟鹿二仙膏

E. 六味地黄丸

46. 某女，31岁。头晕眼花，面色萎黄，口唇色淡，月经量少；舌质淡，脉细。医生辨证为虚劳血虚证。应选用的中成药是（ ）

47. 某女，45岁。不耐寒热，头晕，乏力，神疲，自汗盗汗；舌淡少津，苔薄白，脉沉细。医生辨证为虚劳阴阳两虚证。应选用的中成药是（ ）

48. 某男，57岁。神疲乏力，少气懒言，自汗，舌质淡，苔薄白，脉虚。医生辨证为虚劳气虚证应选用的中成药是（ ）

答案：A、D、C

【49~50】

A. 影响吸收

B. 影响代谢

C. 增加排泄

D. 影响分布

E. 减少排泄

49. 中西药联用时，麻仁丸与红霉素合用，可发生的药动学相互作用是（ ）

50. 中西药联用时，女金丹与诺氟沙星合用，可发生的药动学相互作用是（ ）

答案：A、C

【51~52】

A. 醋炙品

B. 清炒品

C. 生品

D. 盐炙品

E. 蜜炙品

某女，28岁。皮肤出现红色风团，灼热剧痒，遇热加剧，得冷则减，伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌红，苔薄白，脉浮数。中医诊断为瘾疹，证属风热犯表，治以消风散加减，开具的处方为：荆芥 9g，防风 9g，当归 6g，地黄 12g，苦参 6g，蝉蜕 6g，牛蒡子 9g，知母 10g，石膏（捣碎、先煎）30g

51. 该处方中的牛蒡子，调配时应付（ ）

52. 该处方中的知母，调配时应付（ ）

答案：B、D

【53~54】

A. 升麻

B. 麦芽

C. 桃仁

D. 麻黄

E. 黄芪

有无证候禁忌是处方审核的一项重要内容。医生为患有高血压、不寐、多汗的病人开具了包含上述中药的处方，执业药师在审核时应告知医生。

53. 体虚多汗者忌用（ ）

54. 高血压及失眠患者慎用（ ）

答案：D、D

【55~57】

A. 胖嫩舌

B. 齿痕舌

C. 瘦薄舌

D. 裂纹舌

E. 芒刺舌

55. 阴精亏损，不能荣润，常见的舌形是（ ）

56. 脾肾阳虚，水饮内停，常见的舌形是（ ）

57. 脏腑火盛，热邪亢盛，常见的舌形是（ ）

答案：D、A、E

【58~60】

A. 导致精子产生和成熟发生障碍，抑制女性患者巢功能

- B. 恶心呕吐，腹痛腹泻，重者可见黄疸、肝肿大、消化道出血
- C. 直接作用于中枢神经系统，甚或因呼吸中枢完全麻痹而致死
- D. 血小板、白细胞、血红蛋白减少，并可发生急性粒细胞减少
- E. 心律失常，如心率减慢、早搏、房室传导阻滞

58. 苍耳子的主要不良反应是（ ）

59. 香加皮的主要不良反应是（ ）

60. 细辛的主要不良反应是（ ）

答案：B、E、C

【61~63】

- A. 培元通脑胶囊
- B. 消栓胶囊
- C. 逐瘀通脉胶囊
- D. 银杏叶片
- E. 麝香保心丸

由于老年人的器官或细胞的敏感性增强，尤其是对中枢神经抑制药物、降血糖药物、心血管系统药物反应特别敏感，在正常剂量下的不良反应增加，甚至出现药源性疾病，因此在联合用药中应高度重视。

61. 老年人使用法莫替丁时，应避免联用（ ）

62. 老年人在服用地高辛时，应避免联用（ ）

63. 患有心脑血管疾病的老年糖尿病患者使二甲双胍降糖时，应避免联用（ ）

答案：D、E、A

【64~65】

- A. 固冲汤加减
- B. 逍遥散加减
- C. 调肝汤加减
- D. 内补丸加减

E. 固阴煎加减

64. 某女，40岁。月经非时而下，量多如崩，色淡质稀，神疲体倦，面色萎黄；舌质淡，舌体胖，苔薄白，脉弱。应选用的方剂是（ ）

65. 某女，21岁。月经先期，量少，色淡质稀腰膝酸软，头晕耳鸣，小便频数；舌质暗淡，苔薄白，脉沉细。应选用的方剂是（ ）

答案：A、E

【66~67】

A. 凝结阻滞

B. 黏腻停滞

C. 沉重秽浊

D. 阻遏气机

E. 收缩牵引

66. 某女，55岁。全身关节肌肉疼痛较剧烈，阴雨天加重，属于寒邪所致。其病因性质是（ ）

67. 某男，36岁。胸闷脘痞，小便短涩，大便不爽，属于湿邪所致。其病因的性质是（ ）

答案：A、D

【68~69】

A. 土鳖虫

B. 蛤蚧

C. 人参

D. 泽泻

E. 草澄茄

68. 按照对抗贮存法，宜与牡丹皮同贮的是（ ）

69. 按照对抗贮存法，宜与吴茱萸同贮的是（ ）

答案：D、B

【70~72】

A. 对服

- B. 后下
- C. 先煎
- D. 包煎
- E. 另煎

某男，60岁。半身不遂，患侧僵硬拘挛，头晕头痛，面赤耳鸣。舌红，苔薄黄，脉弦。中医辨证为肝阳上亢，治以天麻钩藤饮加减，药用天麻、钩藤、石决明、牛膝、桑寄生、栀子、黄芩、益母草、茯神、竹沥。执业药师发药时，需向患者交待正确的煎药和服用方法

70. 处方中石决明应采用的是（ ）

71. 处方中钩藤应采用的是（ ）

72. 处方中竹沥应采用的是（ ）

答案：C、B、A

【73~74】

- A. 涂膜剂
- B. 气雾剂
- C. 贴膏剂
- D. 凝胶剂
- E. 流浸膏剂

中成药因剂型不同，采用的贮存养护方法也不同

73. 除另有规定外，应置遮光容器内密封和阴凉处贮存的中成药剂型是（ ）

74. 除另有规定外，应避光，密闭存，并应防冻的中成药剂型是（ ）

答案：E、D

【75~76】

- A. 肝主藏血
- B. 肝主疏泄
- C. 脾主统血
- D. 心主血脉

E. 肺朝百脉

75. 具有推动血液运行，主宰精神活动等生理功能的是（ ）

76. 具有促进血液运行，调畅情志活动等生理功能的是（ ）

答案：D、B

【77~79】

A. 腹泻肠鸣，粪便臭如败卵，夹有不消化食物

B. 黎明之前，肠鸣腹痛，泻后则安，腰膝酸软

C. 泄泻腹痛，粪色黄褐，肛门灼热，烦热口渴

D. 大便溏泻，水谷不化，面色萎黄，食少倦怠

E. 紧张之时，腹痛欲便，便后痛减，时时叹息

77. 脾胃虚弱泄泻的临床特点是（ ）

78. 脾肾阳虚泄泻的临床特点是（ ）

79. 食滞胃肠泄泻的临床特点是（ ）

答案：D、B、A

【80~82】

A. 蟾酥

B. 白降丹

C. 生千金子

D. 雄黄

E. 生马钱子

毒性中药系指毒性剧烈，治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的中药。因此执业药师在审核或调剂含有特殊管理毒性中药的处方时，掌握其用法用量非常重要。

80. 内服，用量 0.05~0.1g，入丸散用的毒性中药是（ ）

81. 内服，用量 0.3~0.6g，炮制后入丸散用的毒性中药是（ ）

82. 仅供外用的毒性中药是（ ）

答案：D、E、B

【83~85】

- A. 柴胡疏肝散加减
- B. 黄芪建中汤加减
- C. 良附丸加减
- D. 左金丸加减
- E. 保和丸加减

83. 某男，21岁。胃痛胀满，噎腐恶食，大便不爽；舌质红，苔厚腻，脉滑，应选用的方剂是（ ）

84. 某男，33岁。胃痛暴作，喜温恶寒，得温痛减，口和不渴；舌质淡，苔薄白，脉弦紧。应选用的方剂是（ ）

85. 某女，36岁。胃脘胀痛，连及胁肋，善太息，生气后症状加重，食欲不振；舌质红，苔薄白，脉弦。应选用的方剂是（ ）

答案：E、C、A

【86~87】

- A. 气血两虚证
- B. 气随血脱证
- C. 气滞血瘀证
- D. 气虚血瘀证
- E. 气不摄血证

86. 某男，47岁。急性胃出血，面白，四肢厥少气懒言，大汗淋漓，舌淡，脉微细。中医辨证是（ ）

87. 患儿，8岁。倦怠乏力，食少纳呆，气短懒言，面色苍白，皮下出血色淡，舌淡，脉软弱细微。中医辨证是（ ）

答案：B、E

【88~90】

- A. 纳食减少，食后作胀，肢体浮肿，大便溏泻
- B. 纳食减少，脘腹胀满，头重身倦，便溏稀薄
- C. 纳食减少，食后作胀，少腹下坠，内脏下垂

D. 纳食减少，腹中冷痛，口泛清水，四肢不温

E. 纳食减少，脘腹胀满，黄疸鲜明，发热口苦

88. 脾失健运证，常见的临床表现是（ ）

89. 脾阳虚证，常见的临床表现是（ ）

90. 寒湿困脾证，常见的临床表现是（ ）

答案：A、D、B

三、综合分析选择题

（一）某女，49岁，经血非时而下，出血量多，淋漓不尽，色淡质稀，两目干涩，腰膝酸软，面色晦暗舌淡暗，脉沉弱

91. 根据临床表现，该患者的中医辨证是（ ）

A. 气血两虚

B. 肝肾不足

C. 脾不统血

D. 瘀血阻络

E. 阴虚火旺

答案：B

92. 根据辨证结果，应选用的治法是（ ）

A. 补益肝肾，固冲止血

B. 益气补血，化瘀止血

C. 健脾益气，固冲止血

D. 活血化瘀，温经止血

E. 滋肾降火，育阴止血

答案：A

93. 根据治法，宜选用的方剂是（ ）

A. 健固汤加减

B. 调肝汤加减

C. 丹栀逍遥散加减

D. 归脾汤加减

E. 逐瘀止崩汤加减

答案：B

94. 患者服用一段时间后，症状好转，血量减少，要求改服中成药，应选用的中成药是（ ）

A. 定坤丹

B. 乌鸡白凤丸

C. 女金丸

D. 安坤赞育丸

E. 坤宁丸

答案：D

98. 根据临床表现，该患者的主要病位是（ ）

A. 脑

B. 肾

C. 心

D. 肝

E. 脾

答案：B

99. 根据辨证要点分析，该患者的证候是（ ）

A. 肾精不足

B. 脑髓亏虚

C. 心肝两虚

D. 心肝血虚

E. 脾气不足

答案：A

100. 根据临床表现，该患者的中医辨证是（ ）

A. 胃火炽盛

B. 肾阴亏虚

C. 阴阳两盛

D. 脾胃气虚

E. 肝火上扰

答案：D

101. 根据辨证结果，应采用的治法是（ ）

A. 清胃泻火

B. 滋养肾阴

C. 健脾益气

D. 清肝泻火

E. 阴阳双补

答案：C

102. 根据治法，应用的方剂是（ ）

A. 参苓白术丸加减

B. 金匱肾气丸加减

C. 白虎汤加减

D. 杞菊地黄丸加减

E. 龙胆泻肝丸加减

答案：A

103. 执业药师审核处方时，应指出玉女煎加味处方存在的问题是（ ）

A. 熟地黄应是生地黄

B. 麦冬应是天冬

C. 煅石膏应是生石膏

D. 怀牛膝应是川牛膝

E. 知母应是浙贝母

答案：C

104. 执业药师对该患者进行用药指导时，用药建议错误的是（ ）

A. 中药汤剂与西药隔开 30 分钟以上服用

- B. 盐酸二甲双胍片与清胃黄连丸同时服用
- C. 应戒酒，以免影响盐酸二甲双胍的疗效
- D. 清胃黄连丸为蜜丸，改用清胃黄连片
- E. 清胃黄连丸苦寒伤胃，不可过量或久服

答案：B

105. 患者服中药汤剂 14 剂后出现恶心，纳差，乏力，肝功能检查显示：ALT105U/L，AST85U/L， γ -GT85U/L，ALP85U/L。执业药师结合中药处方，分析导致此问题的可疑中药是（ ）

- A. 生龙骨
- B. 制首乌
- C. 茯苓
- D. 地龙
- E. 石菖蒲

答案：B

106. 患者停药汤药后开始服脑立清，3 天后出现肢体震加重，肌张力增高，分析该患者用药存在的问题是（ ）

- A. 脑立清中含有冰片、薄荷脑可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
- B. 脑立清中含有珍珠母、赭石可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
- C. 脑立清中含有薄荷脑、猪胆汁可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
- D. 脑立清中含有熟酒曲、酒曲可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应
- E. 脑立清中含有清半夏、牛膝可能减弱左旋多巴/苄丝肼的效应

答案：B

107. 执业药师在审核该患者的中药饮片处方时应指出处方存在的问题是（ ）

- A. 党参与赤芍属配伍禁忌
- B. 生地黄的每日剂量超
- C. 川楝子的每日剂量超量
- D. 延胡索粉的药注错误
- E. 炙乳没应是炙乳香

答案：C

108. 对上述处方用药的合理性分析, 正确的是 ()

- A. 汤剂与复方丹参滴丸同时服用, 属于重复用药
- B. 汤剂与血府逐瘀口服液同时服用, 属于重复用药
- C. 汤剂与速效救心丸同时服用, 属于重复用药
- D. 汤剂与茵栀黄口服液同时服用, 属于重复用药
- E. 复方丹参滴丸与茵栀黄口服液同时服用, 属于重复用药

答案: B

109. 执业药师给该患者发放药品的用药交待, 正确的 是 ()

- A. 中药汤剂每日 1 剂, 每剂煎煮 2 次, 每次服用 400 毫升
- B. 所服汤剂及成药中含赤芍、生地黄、冰片等寒凉之品, 服药期间应忌食生冷
- C. 中药汤剂对胃肠有轻微刺激, 应在早、晚餐前服用
- D. 复方丹参滴丸必须舌下含服, 每次 10 丸, 每日 3 次, 长期服用
- E. 速效救心丸应舌下含服, 每次 10 丸, 每日 3 次

答案: B

110. 该患者在服用中药治疗的第 2 天, 胃脘部不适加重, 并伴恶心呕吐症状, 执业药师对此种现象的分析, 最恰当的是 ()

- A. 所服中药汤剂中含有红花, 可能存在消化道刺激
- B. 所服中成药中含有丹参, 可能存在消化道刺激
- C. 所服血府逐瘀口服液中含有酒精, 可能存在消化道刺激
- D. 所服中药剂中含有乳没, 可能存在消化道刺激
- E. 所服中药延胡索应该煮后再入药, 可避免消化道刺激

答案: D

四、多项选择题

111. 某男, 63 岁, 痹证日久不愈, 肢体, 关节疼痛, 屈伸不利, 关节肿大僵硬, 变形, 肌肉萎缩, 筋脉拘急, 肘膝不伸, 以尻代踵, 以背代头, 腰膝酸软, 骨蒸潮热: 舌红, 脉细数。应选用的中成药有 ()

- A. 痹痛宁胶囊

- B. 湿热痹颗粒
- C. 尪痹颗粒
- D. 风湿骨痛丸
- E. 益肾蠲痹丸

答案：C、E

112. 针对虚寒证，可以采取的治法有（ ）

- A. 阳病治阴
- B. 阴病治阳
- C. 阳中求阴
- D. 阴中求阳
- E. 阴阳双补

答案：B、D

113. 中医强调所证论治，不同疾病出现相同的证候可以采用相同的治疗方法。适合应用归脾丸治疗的疾病有（ ）

- A. 郁证
- B. 眩晕
- C. 不寐
- D. 泄泻
- E. 崩漏

答案：A、B、C、E

114. 具有协同增效作用的中西药联用药组有（ ）

- A. 甘草与呋喃唑酮联用治疗肾盂肾炎
- B. 黄连、黄柏与磺胺甲基异恶唑联用治疗痢疾
- C. 甘草与氢化可的松联用于抗炎
- D. 丹参注射液与间羟胺联用于升压
- E. 柴胡桂枝汤与苯妥英钠联用治疗癫痫

答案：B、C、D

115. 小儿机体正处于生长发育阶段，不论在肌肤脏腑、筋骨、津液等方面均柔弱不足，新陈代谢旺盛，吸收、排泄都较快，对药物敏感性强，关于小儿用药原则的说法，正确的有（ ）

- A. 小儿得病急，变化快，因此要及时用药
- B. 小儿外有表邪，内有火热之发热，宜用苦寒退热之品
- C. 小儿脏气清灵，若为风热表证，当以辛凉解散表邪
- D. 小儿脾气不足，治疗宜佐以健脾和胃、消食导滞之品
- E. 小儿出现壮热、烦躁、惊风等症，宜佐以平肝息风之品

答案：A、C、D、E

116. 属于气机失常的病机变化有（ ）

- A. 气滞
- B. 气逆
- C. 气陷
- D. 气脱
- E. 气虚

答案：A、B、C、D

117. 不得与含麻黄的中成药联用的成药有（ ）

- A. 速效救心丸
- B. 活心丹
- C. 山海丹胶囊
- D. 益心丸
- E. 滋心阴口服液

答案：A、B、C、D、E

118. 中药毒性反应引起生理生化功能异常和病理变化，可在各系统内发生，造成多系统多脏器的损害。关于中药发生毒性反应的机制和表现的说法，正确的有（ ）

A. 山药丸含马钱子，马钱子主要有毒成分为番木鳖碱，可首先兴奋神经系统，引起脊髓强直性痉挛，继而兴奋呼吸中枢及血管运动中枢可因呼吸痉挛窒息或心力衰竭而死亡

B. 舒筋丸含乌头，乌头的主要成分为乌头碱，其毒性主要用于神经系统，尤其是迷走神经，并可直接作用于心脏，可致心律失常，甚至引起室颤和死亡

C. 牛黄至宝丸含朱砂，朱砂的主要成分为汞，机体吸收和迅速弥散到各个器官和组织，并可通过血脑屏障进入脑组织，产生各种中毒症状

D. 人参再造丸含雄黄，雄黄的主要成分为砷盐，砷盐毒性较大，进入人体后蓄积和分布于体内各组织，主要分布在肝肾脾等内脏及指甲，毛发等部位，产生一系列中毒症状

E. 梅花点舌丸含蟾酥，蟾酥的三要素有毒成分为蟾酥的毒素，具有洋地黄样作用。小剂量能使心肌收缩力增强，大剂量则使心脏停止收缩

答案：A、E

119. 医生处方时会几种疗效基础相似或协同作用的饮片缩写在一起并开，炒四仙应付的饮片有（ ）

- A. 炒山楂
- B. 炒槟榔
- C. 炒谷芽
- D. 炒神曲
- E. 炒麦芽

答案：A、B、D、E

120. 药学咨询服务是执业药师参与全程化药物治疗的需要，对指导患者安全、有效、合理用药具有重大意义。执业药师应向患者提供咨询服务活动中，需要特别关注的问题包括（ ）

- A. 患者疾病状况，比如肝、肾功能指标，既往病史等
- B. 尊重患者意愿，保护患者隐私，不得将咨询信息用于商业目的
- C. 对老年人提供咨询服务时应适当的多使用文字、图片的形式
- D. 咨询要以容易理解的语言来解释，尽量使用带数字的术语
- E. 不能当场解答的问题，应进一步咨询相关资料后予以答复

答案：A、B、C、D、E