

一、最佳选择题

1. 药师在审核处方时,无要求确认或重新开处方的情形是(B)

- A. 诊断为麻疹,使用阿莫西林抗感染治疗
B. 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
C. 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
D. 给糖尿病患者同时开具消渴和格列本脲
E. 低分子肝素的给药方法为静脉滴注

2. 患者到药店购买鱼肝油,药师应给予(D)

- A. 鱼油
B. 维生素 A
C. 维生素 D
D. 维生素 AD
E. 维生素 E

3. 双歧三联活菌制剂说明书标明“冷处”贮存,其贮存条件是指(E)

- A. 温度不超过 20℃
B. 温度 10~30℃
C. 温度不超过 20℃ 且遮光
D. 温度不超过 -5℃ 且避光
E. 温度在 2~10℃ 之间

4. 因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为米在剂管理的药物是(D)

- A. 甲睾酮
B. 可卡因
C. 哌替啶
D. 人促红素
E. 麻黄碱

5. 万古霉素 0.5g 加入 5% 葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求注时间不得少于 2 小时,每分钟最多可滴注的滴数约是(C)

- A. 7 滴
B. 15 滴
C. 25 滴
D. 50 滴
E. 60 滴

6. 急性胰腺炎伴脂质代谢紊乱的患者不宜静脉滴的药物是(E)

- A. 胰岛素注射液
B. 生长抑素注射液
C. 葡萄糖注射液
D. 乌司他丁注射液
E. 脂肪乳注射液

7. 下列药物中适宜在睡前服用的是(D)

- A. 泼尼松
B. 美洛昔康

- C. 多潘立酮
D. 辛伐他汀
E. 奥利司他

8. 癫痫持续状态首选的治疗方案是(B)

- A. 口服丙戊酸钠 200mg
B. 静脉注射地西泮 10mg
C. 静脉注射丙戊酸钠 200mg
D. 口服地西泮 10mg
E. 肌肉注射地西泮 10mg

9. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是(C)

- A. 老年人和酗酒者为高危人群
B. 恶性贫血者需要终生维持治疗
C. 可静脉滴注维生素 B₁₂ 100~500ml
D. 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
E. 在不能确定只是单纯叶酸缺乏引起的贫血时,叶酸应联合维生素 B₁₂ 治疗

10. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应,用药期间不宜饮酒的药物是(D)

- A. 对乙酰氨基酚
B. 阿奇霉素
C. 阿司匹林
D. 甲硝唑
E. 伊曲康唑

11. 患毒,27 岁,妊娠 20 周,出现发热体温最高达 38.5℃,体格检查:肾区叩痛,经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎,宜选用的药物是(B)

- A. 甲硝唑
B. 头孢噻肟
C. 阿米星
D. 阿奇霉素
E. 诺氟沙星

12. 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是(C)

- A. 分子量大、弱碱性
B. 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长
C. 脂溶、分子量小
D. 蛋白结合率高,具有手性、分布容积大
E. 蛋白结合率高、分子量大

13. 下列关于癌痛患者的镇痛药使用原哪误的是(E)

- A. 按患者疼痛程度分阶梯给药
B. 按时给药而不是按需给药
C. 提倡无创的给药方式
D. 用药须个体化
E. 疼痛时用药,不疼痛时不用药

14. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药理学监护的说法,错误的是(A)

- A.抗抑郁药起效较快,使用1周后可判疗效
B.应尽可能单一用药,足量、足疗程治疗
C.剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小
D.当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
E.SSRIS类抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂联合使用

15.根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是(B)

- A. $BMI \leq 18.5$
B. $BMI \geq 28.0$
C. $BMI < 21.5$
D. $BMI \geq 24.0$
E. $BMI \geq 25.0$

16.患者男,57岁,因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊行病学调查及相关实验至检查诊断为博江甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是(C)

- A.金刚烷胺 B.金刚乙胺
C.奥司他韦 D.利巴韦林
E.阿昔洛韦

17.下列烧伤救治措施的说法正确的是(B)

- A.创面及时外涂甲紫溶液预防感染
B.一度烧伤可冷敷后外涂烧伤膏
C.可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染
D.烧伤患者的镇痉镇静药物首选氯丙嗪
E.失水较多的患者应多饮白开水或无盐饮料

18.患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治家患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是(D)

- A.甘草合剂 B.氨溴索
C.对乙酰氨基酚 D.左氧氟沙星
E.维生素C

19.药师在指导痰南理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是(B)

- A.左甲状腺素与钙剂同服

- B.硫酸亚与维生素C同服
C.华佗写人参同服时与牛奶同服
D.异烟肼与牛奶同服
E.利福平与脂肪餐同服

20.下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是(C)

- A.禁食富含碘的食物
B.避免使用含碘药物
C.妊娠伴甲状腺功能亢进症患者首选甲硫咪唑
D.避免饮用咖啡等兴奋性饮料
E.给予充足的热量、蛋白质和维生素

21.患者,女,24岁,一周前曾有同事患有沙眼衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不遭洙药店购药,药师可推荐的药物是(C)

- A.色甘酸钠滴眼液
B.玻璃酸钠滴眼液
C.酞丁安滴眼液
D.毛果芸香碱滴眼液
E.吡诺克辛滴眼液

22.良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断剂治疗时可能导致的不良反应是(A)

- A.体位性低血压 B.尿潴留
C.干咳 D.乳腺增生
E.前列腺特异性抗原(PSA)水平升高

23.可使高血压患者血压升高的药物是(C)

- A.速感宁胶囊 B.银翘解毒片
C.复方酚咖伪麻胶囊 D.抗感宁胶囊
E.复方田七胃痛胶囊

24.治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘,宜选择的药物是(B)

- A.比沙可啶 B.乳果糖
C.硫酸镁 D.东莨菪碱
E.阿托品

25.下列药物使用方式,正确的是(D)

- A.酵母片在餐后整片用水送服
B.硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰送服
C.氧氟沙星滴眼液打开使用后,继续使用3个月
D.乙酰半胱氨酸泡腾片用100ml温开水浸泡溶解后服用

E.红霉素软膏涂敷于眼睑内,每晚睡前一次

26.痛风缓解期宜选用的治疗药物是

(A)

A.苯溴马隆

B.阿司匹林

C.秋水仙碱

D.泼尼松

E.双氯芬酸钠

27.短效刊】避孕药的主要细成分是(E)

A.孕激素+雄激素

B.雌激素

C.雌激素+雄激素

D.孕激素

E.雌激素+孕激素

28.患者男 59 岁哮喘病史 8 年近日因急性脑梗死就诊住院海疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的 2 级预防,宜选用的抗血小板药物是(B)

A.氯吡格雷

B.阿司匹林

C.对乙酰氨基酚

D.华法林

E.依诺肝素

29.便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是(D)

A.硫酸镁

B.聚乙二醇 4000

C.乳果糖

D.番泻叶

E.沙可呢西药

30.患者男,70 岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是(B)

A.普拉克索

B.苯海索

C.卡比多田

D.甲基雾

E.金刚烷胺

31.药师在工作中防用药错误可以采取的行为不包括(D)

A.严格审核处方

B.仔细核对药品

C.进行用药指导

D.自行修改错误处方

E.规范操作流程

32.下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是(D)

A.口服后 30 分钟内应保持立位或坐便

B.应避免同时使用两种双膦酸盐

C.随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

D.食管炎为典型不良反应

E.已批准用于提早绝经女性骨质疏松的防治

33.患者女 45 岁,既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊,诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是(A)

A.莫西沙星

B.头孢呋辛酯

C.氨溴索

D.阿莫西林

E.对乙酰氨基酚

34.下列于服用阿昔洛韦治疗带状疱疹的说法,错误的是(E)

A.应尽早使用阿昔洛韦

B.除口服外,可局部使用阿昔洛韦软膏

C.口服给药,每日给药 5 次

D.治疗疗程般 7~10 天

E.阿昔洛韦主要经肝脏代谢,肾功能不全患者不需减量使用

35.患者,77 岁,因感冒入熟咳嗽,自服酚麻美敏片、维 C 银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是(D)

A.对乙酰氨基酚

B.维生素 Ce

C.银翘 6

D.氯苯那敏

E.右美沙芬

36.目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是(A)

A.绝经后 10 年之内或 60 岁以前

B.大于 60 岁

C.绝经后 5 年之内

D.绝经后 5 年之内或大于 60 家

E.绝经后 20 年之内

37.细菌性尿路感染最常见的致病菌是(D)

A.肠球菌

B.铜绿假单胞菌

C.克雷伯杆菌

D.大肠埃希菌

E.葡萄球菌

38.下列关于失眠药物治疗策略的说法,正确的是(B)

A.原发性失眠在非药物治无效时首选苯一氮草类抗失眠药

B.失眠继发于或伴发于其他疾病时,应同时治疗原发或伴发疾病

C.药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

D.焦虑症患者存在失眠时协失眠药物为主

E.对于长期应用镇静催眠药物的慢性失眠患者,提倡药物连续治疗

39.说明书中没每船童用药剂量时,可以根据儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法/错误的是(A)

A.小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/小儿体表面积(m²)

B. Fried 公式,婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150

C.儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m²)/1.73(m²)

D.儿童剂量=成人剂量×小儿体重(kg)/70

E. Young 公式,小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/(年龄+12)

40.患者男,65岁,身高170cm,体重60Kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率45ml/min),诊断为2型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是(C)

A.格列本脲

B.格列齐特

C.格列喹

D.格列糖

E.格列美脲

二、配伍选择题

【41~43】

医师书写处方时经常使用外文缩写,医师在指导用药时需要准确掌握和解释

A.右眼

B.左眼

C.适量

D.立即

E.双眼

41.OD.是(A)

42.OS.是(B)

43.OU.是(E)

【44~46】

A.叶酸

B.苯丝肼

C.克拉维酸钾

D.奥美拉唑

E.维生素C

44.与硫酸亚铁合用,可减少铁吸收的是(D)

45.与左旋多巴合用,可提高疗效的是(B)

46.与阿莫西林配伍,可提高治疗的是(C)

【47~48】

患者手术后,给予肠外营养液10%GS 500ml,50%GS 250ml,20%脂肪乳250ml,8.5%复方氨基酸750ml,水溶性维生素10ml,脂溶性维生素10ml,微量元素10ml,10%氯化钠注

射液40ml,10%氯化钾注射液30ml。

A.200kcal

B.450kcal

C.700kcal

D.1150kcal

E.1550kcal

47.营养液中葡萄糖提供的能量是(C)

48.营养液中脂肪如提供的能量是(B)

【49~50】

A.头孢唑林钠与0.9%氯化钠注射液

B.头孢曲松与复方氯化钠注射液

C.胰岛素与0.9%氯化钠注射液

D.青霉素与5%葡萄糖注射液

E.维生素C与氯化钠注射液

49.两种药物配伍容易形成白色沉淀的是(B)

50.两种药物配伍之后效价降低的是(D)

【51~52】

A.辛伐他汀

B.双磷酸盐

C.苯妥英钠

D.硫酸亚铁

E.硫酸铝

51.在指导合理用药时,应交代宜在睡前服用的药物是(A)

52.在指导合理用药时,应交代服药后限制饮水的药物是(E)

【53~55】

A.粒细胞减少症

B.消化性溃疡

C.慢性肾衰竭

D.溶血性贫血

E.呼吸抑制

53.含有马兜铃酸的中药,可引起的典型药源性疾病是(C)

54.甲状腺功能亢进患者服用丙硫胺嘧啶,可引起的典型药源性疾病是(A)

55.快速静脉注射克林霉素,可引起的典型药源性疾病是(E)

【56~58】

A.维生素B₆

B.铝碳酸镁

C.伏立康唑

D.阿司匹林

E.利福平

56.与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是(D)

57.与地西泮合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是(C)

58.与米诺环素合用会影响其吸收导致抗菌作用减弱的药物是(B)

【59~61】

药品不良反应(ADR)的机制和影响因素错综复杂,遇到 ADR 时,需要进行因果关系评价。

A.肯定

B.很可能

C.可能

D.可能无关

E.无法评价

59.患者,男,32岁,因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊,出现全身瘙痒。立即停药,无特殊治疗,患者症状逐渐好转,未再给阿莫西林胶囊治疗,该 ADR 的因果关系评价结果是(B)

60.患者,男,45岁,因男性乙型肝炎给予干扰素治疗,治疗1个月后,患者出现脱发,停用干扰素后,脱发症状好转,再次给予干扰素治疗,患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是(A)

61.患者,男,45岁,因社区获得性肺炎入院,入院是9月8日查血常规提示:血小板(PLT)88×10⁹/L,9月9日开始给予左氧氟沙星抗感染治疗一周后肺炎治愈,9月11查血小板(PLT)90×10⁹/L,9月20日查血常规提示:血小板(PLT)92×10⁹/L,患者既往血常规情况不详。该患者血小板减少与氧氟沙星的因果关系评价结果是(E)

【62~64】

美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害,将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A.A 级

B.B 级

C.C 级

D.D 级

E.X 级

62.卡托普利属于(D)

63.利巴韦林属于(E)

64.头孢曲松属于(B)

【65~67】

A.成本-效益分析

B.成本-效果分析

C.最小成本分析

D.成本-效用分析

E.荟萃分析

65.将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字,进行药物经济学评价。这一评价方法属于(A)

66.以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于(B)

67.以质量调整为生命年或者质量调整为预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于(D)

【68~70】

A.血红蛋白减少

B.中性粒细胞增多

C.嗜酸性粒细胞增多

D.血小板计数增多

E.淋巴细胞增多

68.贫血患者常出现(A)

69.水痘患者常出现(E)

70.荨麻疹患者常出现(C)

【71~72】

A.对乙酰氨基酚

B.氯苯那敏

C.伪麻黄碱

D.布洛芬

E.氯溴索

71.从事驾车、高空作业的患者不宜服用的药物是(B)

72.服药期间饮酒,最容易出现肝损伤的药物是(A)

【73~75】

A.冰硼咽喉散

B.甲硝唑口腔粘贴片

C.地塞米松粘贴片

D.西地碘含片

E.达克罗宁液

73.治疗口腔溃疡时,贴敷于溃疡处,每处1片,一日不得超过3片的药物是(C)

74.治疗口腔溃疡时,涂于溃疡面上,连续两次,用于进食前暂时止痛的药物是(E)

75.治疗口腔溃疡时,取少量吹敷于患处,一日用2~3次的药物是(A)

【76~78】

- A.甲硝唑
- B.咪康唑
- C.头孢曲松钠
- D.青霉素钠
- E.克拉霉素

76.患者,女,28岁,近一个月出现阴道分泌物增多,痛痒明显,阴道检查时发现粘稠的奶酪样分泌物,经验治疗首选的药物是(B)

76.患者,女,28岁,近一个月出现阴道分泌物增多,阴道检查时发现大量泡沫样分泌物,经验治疗首选的药物是(A)

76.患者,女,28岁,近一个月出现阴道分泌物增多,阴道分泌物培养为衣原体,首选的药物是(E)

【79~80】

- A.酞丁安滴眼液
- B.色甘酸钠滴眼液
- C.氧氟沙星滴眼液
- D.羧甲基纤维素钠滴眼液
- E.毛果芸香碱滴眼液

79.治疗过敏性结膜炎可选用的药物是(B)

80.缓解视疲劳可选用的药物是(D)

【81~82】

- A.多索茶碱注射液
- B.布地奈德混悬液
- C.孟鲁斯特纳咀嚼片
- D.沙丁胺醇气雾剂
- E.异丙托溴铵气雾剂

81.患者,男,48岁,患有青光眼3年。今日因支气管哮喘急性发作,给予舒张支气管、抗炎等治疗,该患者应慎用的药物是(E)

82.患者,男,48岁,患有青光眼3年。今日因支气管哮喘急性发作,给予舒张支气管、抗炎等治疗,应告知该患者用药后需漱口的药物是(B)

【83~84】

- A.异烟肼
- B.利福平
- C.乙胺丁醇
- D.吡嗪酰胺
- E.对氨基水杨酸

83.患者,男,40岁,因肺结核使用抗结核药后,四肢出现针刺感,导致这种症状的药

物是(A)

84.患者平日佩戴隐形眼镜,使用抗结核药后,导致患者隐形眼镜染色的药物是(B)

【85~86】

- A.硝苯地平
- B.卡托普利
- C.氢氯噻嗪
- D.普萘洛尔
- E.特拉唑嗪

85.高血压伴前列腺增生患者适宜选用的药物是(E)

86.高血压伴痛风的患者慎用的药物是(C)

【87~88】

- A.双侧肾动脉狭窄
- B.心力衰竭
- C.痛风
- D.冠心病
- E.哮喘

87.患者,男,46岁,因心绞痛伴房颤,给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是(B)

88.患者,男,60岁,因心绞痛给予普萘洛尔治疗。普萘洛尔的禁忌症是(E)

【89~90】

- A.氟马西尼
- B.青霉胺
- C.乙氟胺
- D.纳洛酮
- E.亚硝酸钠

89.用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是(B)

90.用于治疗二巯卓类药物中毒的特殊解毒剂是(A)

三、综合分析选择题

(一)

患者,女,5岁,体重25kg。两天前受凉后发热,最高体温38.9℃,并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

91.关于本病例患者用药教育的方法,错误的是(B)

- A.酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚,应避免重复用药
- B.酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分,应避免重复用药

C.酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药
D.酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药
E.小儿氨酚黄那敏颗粒与对乙酰氨基酚混悬滴剂含有相同成分，应避免重复用药
92.药师应向家属做用药交代，儿童应用对乙酰氨基酚混悬滴剂的注意事项是(C)
A.每天用药最多不应超过6次，用药不超过3天

(二)

患者，女，50岁，体重60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC $12.4 \times 10^9/L$ ，胸片X线检查提示：斑片状浸润性阴影。给予左氧氟沙星片(规格：0.5g/片)经验性治疗。
左氧氟沙星片说明书内容显示(注：摘录)：常用剂量为250mg或500mg或750mg，每

93.若该患者的肾功能正常，左氧氟沙星的给药剂量应为(B)

- A.1.5片 qd
B.1片 qd
C.1/2片 qd
D.1片 bid
E.1/2片 bid

94.成年男性的肌酐清除率计算公式： $C_{cr} = (140 - \text{年龄}) \times \text{体重} / (0.814 \times Cr)$ ，成年女性的肌酐清除率为男性的0.85。若该患者入院后查肾功能提示：血肌酐(Cr) $120 \mu\text{mol/L}$ ，该患者的肌酐清除率约为(D)

- A.70ml/min
B.65ml/min
C.55ml/min
D.47ml/min
E.45ml/min

95.根据该患者计算所得的肌酐清除率，左氧氟沙星的剂量应调整为(D)

- A.1片半 qd
B.1片 qd
C.半片 qd
D.首剂1片，此后每24小时半片
E.首剂1片半，此后每48小时1片

B.每天用药最多不应超过5次，用药不超过3天

C.每天用药最多不应超过4次，用药不超过3天

D.每天用药最多不应超过3次，用药不超过3天

E.每天用药最多不应超过2次，用药不超过7天

24小时口服一次。肌酐清除率 $\geq 50\text{ml/min}$ 时不需要调整剂量，根据感染情况按照表1所示服用：肌酐清除率 $< 50\text{ml/min}$ 时，需要调整用量，详见表2。

(三)

患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规 $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能：FEV1/FVC=60%，FEV1=55%。

治疗方案如下：

氨溴索注射液 30mg tid ivgtt
莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt
异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入
布地奈德混悬液 1ml bid 雾化吸入

96.以上用药中，给药频次错误的是(E)

- A.硝苯地平控释片
B.氨溴索注射液
C.异丙托溴铵溶液
D.布地奈德混悬液
E.莫西沙星氯化钠注射液

97.查体发现，该患者有踝部水肿，引起不良反应的药物可能是(A)

表1 肾功能正常患者的剂量

感染类型	每24小时剂量	疗程(天)
医院获得性肺炎	750mg	7~14
社区获得性肺炎	500mg	7~14
急性细菌性鼻窦炎	500mg	10~14
非复杂性尿路感染	250mg	3

表2 肾功能不全患者的剂量调整

肾功能正常患者 每24小时的剂量	肌酐清除率 $\geq 50\text{ml/min}$	肌酐清除率 $20 \sim 49\text{ml/min}$	肌酐清除率 $10 \sim 19\text{ml/min}$
750mg	不需调整	每48小时750mg	首剂750mg，此后每48小时500mg
500mg	不需调整	首剂500mg，此后每24小时250mg	首剂500mg，此后每48小时250mg
250mg	不需调整	不需调整	48小时250mg

- A.硝苯地平控释片
- B.氨溴索注射液
- C.异丙托溴铵溶液
- D.布地奈德混悬液
- E.莫西沙星氯化钠注射液

98.要保持患者大便通畅,给予乳果糖口服治疗,用法用量应为(D)

- A.每次 10ml, 每日三次, 餐前给药
- B.每次 10ml, 每日三次, 餐后给药
- C.30ml, 早餐时一次服用
- D.30ml, 晚餐时一次服用
- E.30ml, 睡前一次服用

99.该患者经以上药物治疗后,症状好转,但出现尿潴留,应考虑调整的药物是(C)

- A.硝苯地平控释片
- B.氨溴索注射液
- C.异丙托溴铵溶液
- D.布地奈德混悬液
- E.莫西沙星氯化钠注射液

(四)

患者,男,50岁,诊断为高血压、冠心病。医师处方,氨氯地平片 10mg po qd;美托洛尔缓释片 47.5mg po qd;贝那普利片 20mg po qd;阿司匹林肠溶片 100mg po qd;辛伐他汀片 40mg po qd。

100.药师对该患者的用药指导,错误的是(C)

- A.氨氯地平片可用于早上服用
- B.阿司匹林肠溶片必须晚上,餐后服用
- C.若需减量,美托洛尔缓释片可掰开服用
- D.阿司匹林肠溶片应整片服用,不能嚼碎
- E.长期使用美托洛尔缓释片不能自行突然停药,须在医师、药师的指导下逐渐减少剂量

101.该患者对阿司匹林不耐受,可选用的替代药物是(C)

- A.华法林片
- B.双嘧达莫片
- C.氯吡格雷片
- D.对乙酰氨基酚片
- E.布洛芬胶囊

102.该患者治疗后出现肌肉酸痛,实验室检查提示:肌酸激酶(CK)2000U/L,应考虑停用的药物是(E)

- A.氨氯地平片

- B.美托洛尔缓释片
- C.贝那普利片
- D.阿司匹林肠溶片
- E.辛伐他汀片

103.该患者化验结果同时显示血钾 6.1mmol/L, 需要调整的药物是(C)

- A.氨氯地平片
- B.美托洛尔缓释片
- C.贝那普利片
- D.阿司匹林肠溶片
- E.辛伐他汀片

(五)

患者,女,28岁,妊娠27周,头晕3天。入院查体:血压 160/100mmHg,诊断为:妊娠高血压。

104.该患者降压治疗应首选的药物是(D)

- A.福辛普利
- B.卡托普利
- C.缬沙坦
- D.拉贝洛尔
- E.特拉唑嗪

105.患者出现先兆子痫,急救时首选的药物是(A)

- A.硫酸镁注射液
- B.甲氧氯普胺注射液
- C.葡萄糖酸钙注射液
- D.尼莫地平注射液
- E.乌拉地尔注射液

(六)

患者,女,55岁,因“反复发作胸骨后疼痛2年,伴反酸,胃灼热,间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg,结合胃镜检查结果,临床诊断为胃食管反流病,医师处方:奥美拉唑肠溶片 20mg bid 强化抑酸治疗。

106.关于奥美拉唑肠溶片用药教育的说法,错误的是(C)

- A.适宜餐前30分钟服用
- B.应正片吞服
- C.用药后可能出现口干,便秘等不良反应
- D.长期用药后可能会出现维生素K缺乏
- E.长期用药后可能会出现骨质疏松

107.胃食管反流病的治疗应注意调整生活方式。对于本病例患者调整生活方式的说法,错误的是(B)

- A.戒烟酒
- B.餐中多饮水
- C.控制体重
- D.避免高脂饮食
- E.抬高床头

(七)

患者,女,64岁,患2型糖尿病,高脂血症,给予二甲双胍肠溶片 0.5g tid po,瑞格列奈片 1mg tid po,阿托伐他汀钙片 20mg qd po 等药物治疗。

108.药师对该患者的用药指导,错误的是 (A)

- A.二甲双胍肠溶片应于餐后服用
- B.瑞格列奈片应于餐前服用
- C.阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药
- D.一旦出现低血糖症状,应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等
- E.用药期间应注意监测肝肾功能

109.该患者用药一段时间后再次就诊,复查肾功能提示:肌酐清除率 29ml/min,需要调整治疗方案。合理的治疗药物调整方案是 (C)

- A.停用二甲双胍肠溶片
- B.停用瑞格列奈片
- C.停用阿托伐他汀钙片
- D.停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- E.停用二甲双胍肠溶片和瑞格列奈片

110.如果该患者需要给予低精蛋白锌胰岛素治疗。下列关于其用药教育说法,错误的是 (D)

- A.根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- B.每 3-5 天调整 1 次
- C.每次调整 1-4 单位
- D.开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- E.冰冻后的低精蛋白锌胰岛素不可再用

四、多项选择题

111.药量进行药学服务应具备的**专业技能**包括 (BDE)

- A.患者教育技能
- B.沟通技能
- C.疾病诊断技能
- D.药历书技能

E.药物警戒技能

112.处方审核结果分类合理用药和不合理用药,下列情形应判定为不合理用药的是 (ABCE)

- A.无适应证用药
- B.无正当理由开具高价药
- C.无正常理由超说明书药
- D.使用药品通用名开具处方
- E.无正当理由为同一患者同时开具两种以上药理作用机制想用药物

113.医疗机构调剂部门应实行专用处方,专用账册,专册登记,转亏枷锁,专人负责管理的药品是 (AB)

- A.麻醉药品
- B.第一类精神药品
- C.第二类精神药品
- D.贵重药品
- E.高危药品

114.重复无用阿司匹林可能导致的后果有 (ABCE)

- A.出血
- B.胃溃疡
- C.胃痛
- D.体温降低
- E.血尿酸升高

115.开展药品不良反应报告与检测的目的意义有 (ABCE)

- A.减少 ADR 的危害
- B.促进新药的研制开发
- C.促进临床合理用药
- D.为医疗事故鉴定和诉讼提供证据
- E.弥补上市前要就的不足

116.属于药品质量缺陷的情况有 (ABC)

- A.注射用永安甬字迹不清
- B.腺苷钴胺糖衣色泽不均
- C.精蛋白锌胰岛素注射液外观可见沉淀物
- D.对乙酰氨基酚片为白色
- E.维生素 C 注射液外观澄色黄色

117.12 岁以下儿童,如患有感冒发热,可选用的药物有 (AB)

- A.对乙酰氨基酚
- B.布洛芬
- C.尼美舒利
- D.塞来西布
- E.氯丙嗪

118.临床上选用的抗乙型病毒性肝炎药物有

(ABCE)

- A.拉米夫定
- B.α-干扰素
- C.阿德福韦酯
- D.阿昔洛韦
- E.恩替卡韦

119.救治乙醇中毒的措施,正确的有

(ABDE)

- A.单纯急性轻度乙醇中毒不需治疗,居家观察,嘱其保暖,防治呕吐物误吸
- B.催吐,洗胃和活性炭不适用于单纯性乙醇中毒
- C.急性乙醇中毒者,肌肉或静脉注射阿扑吗啡
- D.急性乙醇中毒者,肌肉或静脉注射纳洛酮
- E.严重乙醇中毒者,静脉注射50%葡萄糖注射液,胰岛素,同时肌肉注射维生素B₁,维生素B₆

120.用于有机磷中毒戒酒药物的有(AB)

- A.阿托品
- B.林解磷定
- C.氟马西尼
- D.亚甲蓝
- E.硫代硫酸钠