

一、最佳选择题

1.根据中医理论，“病”“证”“症”的概念不同，下列表述中属于“病”的是（A）

- A.厌食
- B.吸气
- C.腕痞
- D.腹胀
- E.便溏

2.治疗阳虚证，使用补阳药时常佐用少量补阴药的治法，称为（E）

- A.阴阳互制
- B.阳中求阴
- C.阴病治阳
- D.阳病治阴
- E.阴中求阳

3.人体生命活动的原动力是（D）

- A.营气
- B.宗气
- C.卫气
- D.元气
- E.真气

4.称为“阳脉之海”的经脉是（D）

- A.带脉
- B.冲脉
- C.任脉
- D.督脉
- E.阴维脉

5.体质偏阴者，受邪发病后，多表现为（A）

- A.寒证、虚证
- B.热证、虚证
- C.里证、虚证
- D.里证、实证
- E.里证、寒证

6.根据七情内伤致病理论，思虑太过可导致（B）

- A.气上
- B.气结
- C.气消
- D.气下
- E.气乱

7.中医诊断用以分辨病位与病势深浅的纲领是（A）

- A.表里
- B.寒热
- C.虚实
- D.气血
- E.阴阳

8.某男，25岁，感受外邪后出现发热，微恶风，头胀痛，咳嗽少痰，咽痛渴，舌尖红苔薄黄，脉浮数。应选用的中医治法是（B）

- A.宣肺祛邪解表
- B.清热宣肺解表
- C.益气宣肺解表药
- D.清热解毒化痰
- E.养阴清肺解表

9.某男，65岁，因心悸自汗，神疲乏力，伴有胸痛就诊。医师检查见舌淡薄白脉弱而涩，

诊断为胸痹，辨证为气虚血，其主要症状特点是 (C)

- A.胸痛胸闷，胸胁胀满
- B.胸闷如室，痛有定处
- C.胸痛隐隐，遇劳则发
- D.胸痛彻背，感寒痛甚
- E.胸痛彻背，腰酸肢肿

10.某女，48岁，平素喜食辛辣，烦躁易怒，近来脘腹灼痛，泛酸嘈杂，口干口苦，舌红苔薄黄，脉弦数。治宜选用的中成药是 (A)

- A.加味左金丸
- B.沉香舒气丸
- C.附子理中丸
- D.枳实导滞丸
- E.香砂养胃丸

11.某男，53岁。患头痛多年，3天前因受情志刺激而加重。现头痛目弦，口干口苦，心烦易怒，夜寐不宁。舌红苔薄黄，脉弦有力。治宜选用的方剂是 (D)

- A.芎菊上清丸
- B.川芎茶调散
- C.通窍活血汤
- D.羚羊钩藤汤
- E.杞菊地黄丸

12.某男，50岁。形体肥胖，经常眩晕，头重加裹，胸闷恶心，食少多寐。舌苔白腻，脉濡滑。治宜选用的中成药是 (E)

- A.当归龙荟丸
- B.正天丸
- C.济生肾气丸
- D.归脾丸

E.半夏天麻丸

13.某女，46岁。因小便频数短赤、灼热疼痛就诊，中医诊断为淋证、可参考淋证辨治的西医疾病是 (A)

- A.泌尿系感染
- B.性功能障碍
- C.肾功能衰竭
- D.肾病综合征
- E.肾小球肾炎

14.某男，23岁。颜面、胸背痤疮，多时发于全身，有时簇集于一处，此愈彼起十分苦，常伴有皮肤油腻，口渴，尿黄，便秘。舌红苔黄腻，脉滑数，治宜选用的中成药是 (E)

- A.清肺抑火丸
- B.银翘解毒片
- C.连翘败毒丸
- D.湿毒清胶囊
- E.防风通圣丸

15.患儿，5岁，今日不思饮食，暖腐酸馊，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭，夜寐不安，手足心热。苔白厚腻，脉弦滑。治宜选用的方剂是 (D)

- A.消乳丸
- B.健脾丸
- C.积术丸
- D.保和丸
- E.二陈汤

16.某男，28岁。鼻塞流脓涕，量多，呈黄绿色，有臭味，嗅觉差，头痛，目弦，耳鸣，口苦，心烦易怒，小便黄赤。舌红苔黄，脉弦数。治宜选用的中成药是 (B)

- A.鼻炎片

B.藿胆片

C.辛夷鼻炎丸

D.珠黄散

E.鼻窦炎口服液

17.具有和胃健脾、导滞消积功能的藏药是 (B)

A.五味渣驯丸

B.六味安消散

C.七味红花殊胜丸

D.八明味沉香散

E.十味黑冰片丸

18.蒙医中的“三秽”指的是 (C)

A.涕、唾、津三种分泌物

B.血、脂、白精三种物质

C.稠、稀、汗三种排泄物

D.汗、尿、大便三种排泄物

E.赫依、希日、巴达干三物质

19.导致血清碱性磷酸酶 (ALP) 升高的疾病是 (D)

A.心肌梗死

B.溶血性疾病

C.胸腔积液

D.骨骼疾病

E.前列腺肿瘤

20.诊断乙型肝炎的直接证据是 (C)

A.HBsAg

B.HBcAg

C.HBV-DNA

D.HBeAg

E.抗-HBs

21.系统论述医德规范，著有“大医精诚”专论的方书典籍是 (C)

A.《普济方》

B.《千金翼方》

C.《备急千金药方》

D.《太平圣惠方》

E.《太平惠民和剂局方》

22.药师调剂处方时必须做到“四查十对”，“十对”中有一项内容是 (C)

A.对处方

B.对药品

C.对药名

D.对配伍

E.对用药合理性

23.某女，42岁。今日失眠健忘，心悸怔忡，虚烦不安，盗汗。舌淡苔薄，脉细数。医师诊断为不寐，证属阴血亏虚，给了天王补心丹加减。方中酸枣仁调配应付的品种是 (D)

A.生品

B.麸炒品

C.醋炒品

D.清炒品

E.盐炙品

24.中药番红花的正名是 (C)

A.红花

B.藏红花

C.西红花

D.草红花

E.红蓝花

25.中药七叶一枝花的正名是 (D)

A.蚤休

B.紫参

C.玉果

D.重楼

E.草河车

26.某女,28岁,已妊娠2月,因关节痛就诊,医师处方时应禁用的中药是 (C)

A.川芎

B.丹参

C.莪术

D.当归

E.苍术

27.某男,25岁。每日大便3~4次,便质稀溏,稍食生冷油腻之品则腹泻症状加重,该患者应忌用的中药是 (E)

A.利湿药

B.健脾药

C.固涩药

D.补气药

E.苦寒药

28.安排斗谱时,因外观形状相似易混淆,但功效不同,而不宜装于同一药斗中的饮片是 (B)

A.枳壳、枳实

B.山药、天花粉

C.当归、川芎

D.党参、生黄芪

E.砂仁、豆蔻

29.妊娠忌用的中成药是 (A)

A.十滴水

B.板蓝根颗粒

C.复方丹参片

D.血脂康胶囊

E.藿香正气软胶囊

30.一般中药炮制品贮存环境的相对湿度应控制在 (D)

A.30%-65%

B.30%-75%

C.35%-65%

D.35%-75%

E.40%-70%

31.因贮存不当,可使饮片的颜色、气味、形态、内部组织等出现变异,其中易虫蛀与霉变的饮片是 (D)

A.当归

B.贝母

C.山药

D.牛膝

E.黄芪

32.执业药师应对处方进行用药适宜性审核,如发现有不合理联用的药组,应建议纠正的是 (B)

A.人参养荣丸与归脾丸

B.复方丹参滴丸与速效救心丸

C.四神丸与附子理中丸

D.脑立清胶囊与六味地黄丸

E.二陈丸与平胃散

33.知道临床合理用药是执业药师的职责之一，执业药师在指导患者用药时，首先应考虑的问题是 (E)

A.药物能否发挥疗效

B.患者能否按医嘱用药

C.患者能否正确使用

D.使用的药物是否经济

E.药物是否会产生不良反应

34.某男，65岁，因肾成作喘，服用金匱肾气丸后症状稍有缓解，但出现爆咽干等症状，为进步改善症状，执业药师建议加服的中成药是 (B)

A.蛇胆川贝液

B.生脉饮

C.清气化痰丸

D.参苏丸

E.桂龙咳喘宁胶囊

35.某男，28岁，出租车司机。感冒2日，发热头痛，拟服药治疗。执业药师建议，该患者不宜选用含马来酸氯苯那敏的中成药是 (D)

A.感冒软胶囊

B.抗感灵片

C.强力感冒片

D.速感康胶囊

E.新复方大青叶片

36.中西药联用得当，相互为用，可取长补短，使疗效增强，病程缩短，药物的毒副作用减

少。如与西药解痉药联用，既能提高疗效，又能消除西药腹胀、便秘等不良反应的方剂是 (C)

A.补中益气汤

B.越婢加术汤

C.芍药甘草汤

D.补阳还五汤

E.苓桂术甘汤

37.某些中药可引用肝损害。其中可导致肝肿大、黄疸的中药是 (D)

A.半夏

B.苦杏仁

C.罂粟壳

D.苍耳子

E.香加皮

38.因含有朱砂，加过量服用，可致急性肾功能衰竭的中成药是 (B)

A.牛黄上清丸

B.天王补心丸

C.牛黄降压丸

D.冠心苏合丸

E.牛黄解毒丸

39.因过量服用，可导致心律失常的药物是 (B)

A.雄黄

B.川乌

C.蜂毒

D.肉桂

E.斑蝥

40.近年来,涉及中药注射剂不良反应的报道较多,执业药师应高度关注。中药注射剂临床使用中最常见的不良反应是 (C)

- A.生殖毒性
- B.致癌作用
- C.过敏反应
- D.消化道反应
- E.血液系统损害

二、配伍选择题

【41~42】

- A.平肝明目
- B.息风止痉
- C.凉血止血
- D.祛风止痛
- E.疏肝,透疹

41.薄荷除宣散风热外,又能 (E)

42.菊花除疏散风热外,又能 (A)

【43~45】

- A.疏散风热
- B.散结消肿
- C.润肠通便
- D.利尿通淋
- E.消肿排脓

43.夏枯草除清肝明目外,又能 (B)

44.决明子除清肝明目外,又能 (C)

45.谷精草除明目退翳外,又能 (A)

【46~48】

- A.疏风平肝

B.通利关节

C.燥湿止带

D.解暑,截疟

E.明目,止痉

46.野菊花除清热解毒外,又能 (A)

47.熊胆除清热解毒外,又能 (E)

48.秦皮除清热解毒外,又能 (C)

【49~51】

- A.萆薢
- B.桑枝
- C.防己
- D.徐长卿
- E.海金沙

49.某女,35岁,久居湿热环境,患风湿热痹与脚气浮肿,宜选用的药是 (C)

50.某男,40岁,患风湿痹痛5年,近日又被毒蛇咬伤,宜选用的药是 (D)

51.某男,55岁,患风湿痹痛10年,近日又患膏淋,尿如米泔,宜选用的药是 (A)

【52~53】

- A.梅花
- B.甘松
- C.玫瑰花
- D.木香
- E.化橘红

52.某男,47岁,患脾胃气滞之脘腹胀痛,兼食少便溏,治当行气止痛、健脾消食,宜选用的药是 (D)

53.某女，45岁，因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食、治当行气止痛、开郁醒脾，宜选用的药是（B）

【54~55】

- A.龙胆
- B.苦参
- C.竹叶
- D.苈麻根
- E.桑寄生

54.某女，38岁，素体虚弱，妊娠后突发胎漏，胎动不安，腰膝酸软。证属肝肾亏虚、冲任不固，宜选用的药是（E）

55.某女，32岁，素体强壮，喜食辛辣，妊娠后突发胎动不安，胎漏下血。证属怀胎蕴热、邪热扰胎动血，宜选用的药是（D）

【56~58】

- A.破血逐瘀，续筋接骨
- B.破血通经，消食化积
- C.活血定痛，敛疮生肌
- D.活血祛瘀，解郁安神
- E.活血通经，清热利湿

56.西红花的功效是（D）

57.刘寄奴的功效是（B）

58.北刘寄奴的功效是（E）

【59~60】

- A.白前
- B.百部
- C.前胡
- D.芥子
- E.洋金花

59.性微温，专于降气祛痰止咳的药是（A）

60.性微寒，及降气祛痰，又宣散风热的药是（C）

【61~63】

- A.下乳
- B.补虚
- C.清肺化痰
- D.凉血止血
- E.燥湿化痰

61.火麻仁除润肠通便外，又能（B）

62.冬葵子除润肠通便外，又能（A）

63.瓜蒌除润肠通便外，又能（C）

【64~66】

- A.绞股蓝
- B.刺五加
- C.白扁豆
- D.红景天
- E.西洋参

64.某男，60岁，患热病气阴两伤，治当补气养阴，清火生津，宜选用的药是（E）

65.某女，76岁，换脾虚乏力与肾虚腰酸膝软，治当补气健脾，益肾强腰，宜选用的药是（B）

66.某男，50岁，素体气虚乏力，近日又患热毒疮痈。治当选用性寒，既健脾益气又清热解毒之品。符合这一条件的药是（A）

【67~68】

- A.退热除蒸
- B.凉血止血
- C.软坚散结

D.明目，润肠

E.祛痰，益气

67.南沙参除清肺养阴外，又能 (E)

68.墨旱莲除滋阴益肾外，又能 (B)

【69~70】

A.骨蒸劳热

B.血虚眩晕

C.带下不止

D.小便不禁

E.咽痛，失音

69.阿胶除治阴虚燥咳外，又治 (B)

70.诃子除治肺虚久咳外，又治 (E)

【71~73】

A.风寒感冒证

B.风热感冒证

C.暑湿感冒证

D.外感风寒夹湿证

E.外感风寒、内伤食积证

71.感冒清热颗粒的主治是 (A)

72.荆防颗粒的主治是 (D)

73.保济丸的主治是 (C)

【74~75】

A.芩连片

B.黛蛤散

C.西黄丸

D.一清颗粒

E.牛黄至宝丸

74.某男，50岁，近因肝火犯肺而致头晕耳鸣，咳嗽吐衄，痰多黄稠，咽膈不利，口渴心烦。治当清肝利肺、降逆除烦，宜选用的成药是 (B)

75.某女，35岁，近因火毒血热而致身热烦躁，目赤口疮，咽喉及牙龈肿痛，大便秘结，咯血，衄血，治当清热泻火解毒、化瘀凉血止血，宜选用的成药是 (D)

【76~78】

A.发热烦渴，汗多脉洪

B.午后热甚，身热不扬

C.午后发热，五心烦热

D.长期低热，劳倦则甚

E.日晡热甚，腹痛便结

76.气虚发热的症状特点是 (D)

77.湿热潮热的症状特点是 (B)

78.阴虚内热的症状特点是 (C)

【79-80】

A.祛痰止咳颗粒与镇咳宁胶囊

B.补中益气丸与桂附地黄丸

C.血府逐瘀丸与妇科千金片

D.附子理中丸与四神丸

E.天王补心丹与朱砂安神丸

79.因含有配伍禁忌中药而不宜合用的药组是 (A)

80.因含有相同有毒中药而不宜合用的药组是 (E)

【81~83】

A.影响药物吸收

B.影响药物代谢

C.增加药物排泄

D.减少药物排泄

E.影响药物分布

中西药联用时会引起药动学上的相互作用，
下列药组中

81.煅龙骨与呋喃妥因联用能 (C)

82.陈皮与利福平联用能 (E)

83.藿香正气水与二甲双胍联用能 (B)

【84~85】

A.肺

B.心

C.脾

D.肝

E.肾

根据中医藏象理论

84.称为“贮痰之器”的脏是 (A)

85.称为“生痰之源”的脏是 (C)

【86~88】

A.阿司匹林

B.阿卡波糖

C.复方维生素 B

D.地高辛

E.法莫替丁

老年人用药时

86.不宜与麝香保心丸同时服用的药物是 (D)

87.不宜与银杏叶片同时服用的药物是 (E)

88.不宜与参茸鹿茸丸同时服用的药物是 (B)

【89~91】

A.金芪降糖片

B.参苓白术散

C.人参健脾片

D.补肾强身片

E.杞菊地黄丸

89.属肾阴亏虚者，宜选用的中成药是 (E)

90.属脾胃气虚者，宜选用的中成药是 (B)

91.属阴虚燥热者，宜选用的中成药是 (A)

【92~93】

A.固冲汤

B.圣愈汤

C.固阴煎

D.调肝汤

E.四物汤

治疗崩漏时

92.属气血两虚者，宜选用的方剂是 (B)

93.属脾不统血者，宜选用的方剂是 (A)

【94~96】

A.驱虫

B.清燥润肺

C.清热肃肺

D.清热凉肝

E.泻火通便

94.肥儿丸除健胃消积外，又能 (A)

95.小儿化食丸除消食化积外，又能 (E)

96.小儿消积止咳口服液除消积止咳，又能
(C)

【97~98】

A.滋阴补肾，清肝明目

B.补益肝肾，活血明目

C.活血化瘀，养肝明目

D.清热散风，明目退翳

E.泻火明目，利尿通便

97.明目蒺藜丸的功能是 (D)

98.石斛夜光丸的功能是 (A)

【99~100】

A.藿胆片

B.鼻炎康片

C.辛芩颗粒

D.千柏鼻炎片

E.鼻渊舒口服液

99.某女，30岁，患鼻窦炎数日，症见鼻塞，流黄涕，头痛，尿黄。证属肺经风热及胆腑郁热，治当疏风清热，祛湿通窍，宜选用的成药是 (E)

100.某男，25岁，患过敏性鼻炎数年，时易感冒，近日因气温突降，症见鼻痒，喷嚏，流清涕。证属肺气不足，风邪外袭，治当益气固表，祛风通窍，宜选用的成药是 (C)

三、综合分析选择题

(一)

某男，72岁，口渴多饮，消瘦2年，曾住院治疗，诊断为2型糖尿病，长期服用西药降糖药。因症状控制不良，请中医诊治。现患者烦渴引饮，消谷善饥小便频数而多，尿浊而黄。舌红苔薄黄少津，脉数。

101.根据辨证结果，应采用的治法是 (A)

A.养阴润肺

B.健脾益气

C.滋阴降火

D.温阳自身

E.益气养阴

102.至宜选用的方剂是 (B)

A.参苓白术散

B.玉女煎

C.杞菊地黄丸

D.八珍汤

E.金贵肾气丸

103.患者因求救心切，有考虑到中成药比中药汤剂服用方便，在继续服用西药降糖药的同时，自行服用中成药消糖灵胶囊，结果出现头绿，心悸、汗出等症状，急到医院就诊，诊断为低血糖反应，出现低血糖最有可能的原因是 (E)

A.所服用的消糖灵胶囊含有二甲双胍

B.所服用的消糖灵胶囊含有格列吡嗪

C.所服用的消糖灵胶囊含有阿卡波糖

D.所服用的消糖灵胶囊含有格列奇特

E.所服用的消糖灵胶囊含有格列本脲

(二)

某女，72岁，患有高血压。冠心病，今日喘咳气涌，痰黏色黄，伴胸中烦闷，身热有汗。舌红苔黄腻，脉滑数，中医辨证为痰热郁肺。

104.治法为清热化痰、宣肺止咳治宜选用的方剂是 (E)

A.华盖散

B.苦苏散

C.参苏饮

D.百合固金汤

E.桑白皮汤

105.不宜选用的中成药是 (B)

A.橘红丸

B.止嗽定喘口服液

C.清肺抑火丸

D.蛇胆川贝液

E.清气化痰丸

106.上述不宜选用的中成药中含有能使血压升高的中药是 (C)

A.苦杏仁

B.半夏

C.麻黄

D.陈皮

E.桔梗

(三)

某患儿，七岁，发育迟缓。冬季来临，家长希望服用膏方调理，带患儿到医院就诊。初诊时见患儿面黄肌瘦，食欲不振，大便溏薄，医师认为暂先不宜服用膏方，拟用汤药调理。

107.根据初诊情况，宜选用的中药是 (D)

A.陈皮、半夏

B.党参、桂枝

C.当归、牛膝

D.白术、稻芽

E.白芍、砂仁

108.经一段时间调理，患儿症状有所改善，医师根据其发育迟缓情况，综合分析辨证为肾虚，给予膏方调补，宜选用的中药是 (A)

A.菟丝子、补骨脂、肉苁蓉、熟地黄

B.太子参、淫羊藿、牡丹皮、冬瓜皮

C.人参、鹿茸、菟丝子、补骨脂

D.龟甲、鳖甲、生地黄、山茱萸

E.人参、党参、丹参、玄参

(四)

某女，65岁，患有冠心病，伴慢性心功能不全，表现为心慌气短、动则加剧下肢浮肿、倦怠乏力等症状，医师开具益气温阳、活血通络、利水消肿中药汤剂（黄芪、人参、黑顺片、丹参、葶苈子、水蛭、泽泻、桂枝、红花、香加皮）患者服用3剂后出现恶心、呕吐、腹泻、心率减慢、早搏等临床症状。

109.该题者服用的汤药中，与出现的不良反应症状相关的中药是 (C)

A.黄芪

B.水蛭

C.香加皮

D.桂枝

E.葶苈子

110.上述与不良反应有关的中药，《中国药典》规定其内服剂量是 (D)

A.9g-15g

B.5g-10g

C.3g-9g

D.3g-6g

E.1g-3g

四、多项选择题

111.属于运用五行相克关系阐释疾病传变的有 (BDE)

A.肝病及肾

B.心病及肾

C.肺病及肾

D.脾病及肾

E.肝病及脾

112.未病先防的原则和方法有 (ABDE)

A.重视精神调养

B.加强身体锻炼

C.控制疾病传变

D.注意生活起居

E.避免病邪侵害

113.在疾病发展过程中，病变有本质和征象一致者，病变有本质和征象不一致者。因此临床治疗有正治有反治的不同。下列属于正治的有（ACE）

A.寒者热治

B.寒因寒用

C.热者寒之

D.热因热用

E.虚则补之

114.某男，72岁腹泻肠鸣，脐腹作痛，泻后则安，畏寒喜暖，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉细，治宜选用的中成药有（AB）

A.四神丸

B.固本益肠片

C.香连丸

D.参苓白术散

E.涩肠止泻散

115.肝功能不全患者因肝功能衰退，药物代谢受到严重影响，在肝脏作用时间延长，故此类型患者应在医师指导下慎重选药，用药时执业药师可给予合理用药指导有（ACDE）

A.服药初始宜用小剂量开始

B.不能使用有毒中药

C.服药期间定期检查肝功能

D.选择肝毒性小的药物

E.注意观察用药后的反应

116.中药饮片调配后，必须经过药师复核无误后可发出，调配复核的内容有（ABCDE）

A.核对处方的药味及剂数是否相符

B.符合有无错味，漏味、错味

C.审核药品质量有误差虫蛀，霉变

D.审核调配处方有无乱带乱用现象

E.对于需特殊煎煮的药味是否单包并说明

117.氢氯噻嗪常见的不良反应为低钾血症、低钠血症、高糖血症、高尿酸血症等，故使用时应注意氢氯噻嗪的不良反应，同时也要避免重复用药，含有氢氯噻嗪的中成药有（AD）

A.珍珠降压片

B.脂降宁片

C.新癪片

D.脉君安片

E.冠通片

118.与磺胺类药物合用，会使其在体内溶解性降低而引起结晶尿，导致肾毒性增加的中药有（BCDE）

A.地榆

B.乌梅

C.陈皮

D.木瓜

E.女贞子

119.肾脏是药物代谢和排泄的重要器官，肾功能不全时药物代谢和排泄均会受到影响，导致药物蓄积而加重肾脏损害，故肾功能不全者用药时注意事项有（ABCD）

A.忌用毒性的药物

B.注意药物相互作用

C.坚持少而精的用药原则

D.定期检查及时调整治疗方案

E.坚持以疾病是否治愈作为判断终点

120.导致发生中药不良反应的药物因素和使用因素有 (ABCDE)

A.用错品种

B.炮制不当

C.剂量过大

D.配伍失度

E.辨证错误