

# 关于本笔记 (About This Notebook)

## 1. 缘起与致谢 (Origin & Acknowledgments)

本笔记的内容核心整理自 王崧 (Song Wang) 老师讲授的《代数》课程。王崧老师的课程以其深刻的洞察力和严谨的结构著称，本笔记旨在记录并消化这些宝贵的教学内容。

## 2. 整理理念 (Philosophy)

这并非一份逐字逐句的课堂速记，而是一次对代数知识体系的**重构 (Reconstruction)**。在整理过程中，我们遵循以下核心原则：

- **重构逻辑顺序**：打破线性的记录方式，将相关联的知识点（如群、环、域的构造逻辑）进行串联与对比，突显代数结构的内在联系。
- **强化直观理解**：代数往往被认为是抽象的，因此本笔记特别引入了更多的几何直观、物理比喻以及具体算例，试图在形式化的定义背后建立起感性的认知图景。
- **突出思想方法**：不只关注定理的证明细节，更关注证明背后的策略（如商集构造法、归纳法、反证法等）及其普适性。

## 3. 免责声明 (Disclaimer)

本笔记的整理与润色工作由 AI 助手 **Gemini 3.0 Pro** 辅助完成。虽然我们尽力确保内容的准确性与逻辑的通顺，但 AI 生成内容可能在数学严谨性、术语规范或特殊符号处理上存在疏漏或偏差。请读者在使用时保持批判性思维，一切定义与定理以标准教材或原始课程内容为准。

# Chapter 0: 引言与基础 (Introduction & Preliminaries)

## 阅读说明 (Reading Guide)

### 意图与目标

本章并非对中学数学的简单回顾，而是用代数 (Algebra) 的眼光重新审视我们熟悉的“数”。在代数学中，我们关注的不再是具体的计算（如  $1 + 2 = 3$ ），而是对象背后的结构 (Structure) 与公理 (Axioms)。

### 章节结构逻辑

本章遵循“数系扩张”的历史与逻辑脉络：

1. 起点 ( $\mathbb{N}$ )：通过皮亚诺公理确立“计数”的结构。
2. 扩张 ( $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ )：为了解决减法与除法的封闭性，引入环与域的概念，通过构造商集来扩张数系。
3. 终点 ( $\mathbb{R}$ )：为了解决度量的完备性（填补数轴空隙），引入实数公理体系。

### 使用建议

- 关注“直观理解”板块，尝试建立几何或物理图像。
- 注意  $\mathbb{N}_0$  与  $\mathbb{N}_1$  的区别，这对后续群论中单位元的讨论至关重要。
- 重点理解商集构造法，这是代数中构造新对象的通用手段。

## Lecture 1: 数系的构建与层级

# 1 数学的图谱与数系阶梯 (The Map & Hierarchy)

代数并非孤立存在。从宏观图谱来看，数学源于人类对数 (Numbers) 与形 (Geometry) 的原始直觉。随着抽象程度的加深，算术 (Arithmetics) 演化为研究结构的代数 (Algebra)，而对形与度量的研究在引入极限后演化为分析 (Analysis)。

我们在代数课程中主要处理以下数系对象。理解它们的包含关系与结构差异是后续学习的基础：

符号	名称	集合定义	代数特征简述
$\mathbb{N}_1$	正整数	$\{1, 2, 3, \dots\}$	封闭于加法、乘法，无单位元 (加法)
$\mathbb{N}_0$	自然数	$\{0, 1, 2, \dots\}$	引入单位元 0，形成么半群
$\mathbb{Z}$	整数	$\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$	<b>环 (Ring):</b> 加法可逆
$\mathbb{Q}$	有理数	$\{p/q \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$	<b>域 (Field):</b> 乘法可逆 (非零)
$\mathbb{R}$	实数	对应连续数轴	<b>完备域:</b> 填补了所有缝隙
$\mathbb{C}$	复数	$\{a + bi\}$	代数闭域

## 2 起点：自然数的结构 ( $\mathbb{N}$ )

自然数是整个数学大厦的地基。在现代数学中，我们不通过“数苹果”来定义它，而是使用皮亚诺公理 (**Peano Axioms**) 从结构上刻画它。

### 2.1 结构的公理化

一个集合要被称为自然数集  $\mathbb{N}_1$ ，必须拥有一个起始点 1 和一个后继映射 (**Successor Map**)  $a \mapsto a^+$ 。这个结构必须满足三个核心公理：

1. **起始性:** 1 不是任何数的后继 (链条有起点)。
2. **单射性:**  $a^+ = b^+ \implies a = b$  (链条不汇合)。
3. **归纳性:** 这是自然数的灵魂。若一个性质对 1 成立，且由  $n$  成立可推得  $n^+$  成立，则该性质对所有自然数成立。这保证了链条没有断裂，也没有“飞地”。

### 2.2 运算的递归定义与性质

在公理基础上，加法与乘法不再是理所当然的，而是通过**递归 (Recursion)** 定义的：

- **加法:** 定义  $a + 1 = a^+$ ，并规定  $a + (b^+) = (a + b)^+$ 。
- **乘法:** 定义  $a \cdot 1 = a$ ，并规定  $a \cdot (b^+) = a \cdot b + a$ 。

基于这些定义，我们可以证明加法与乘法满足**交换律**、**结合律**以及**分配律**。同时，我们定义了严格序关系  $a < b \iff \exists k, b = a + k$ 。

### 直观理解：最小数原理

$\mathbb{N}$  的序结构有一个极强的性质：**最小数原理 (Well-Ordering Principle)**——自然数的任意非空子集必有最小元。这等价于数学归纳法。想象一下，如果在自然数里往回走  $(5, 4, 3, \dots)$ ，你必然会在有限步内停下来，不可能无限倒退。

## 3 扩张：从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ (Construction of Rings & Fields)

自然数虽然美好，但它在运算上是“残缺”的。代数的发展史，就是一部为了让运算封闭而不断扩张数系的历史。

### 3.1 整数环 $\mathbb{Z}$ ：修补减法

在  $\mathbb{N}$  中，方程  $x + 5 = 3$  无解。为了修补这个缺陷（引入加法逆元），我们构造了整数。

- **构造方法**：在  $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$  上定义等价关系  $(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$ 。每一类  $[(a, b)]$  代表一个整数  $a - b$ 。
- **代数结构**： $\mathbb{Z}$  构成了一个**整环 (Integral Domain)**。
  - 它有加法单位元  $0$  和逆元  $-a$ 。
  - 它满足**消去律**： $ab = ac, a \neq 0 \implies b = c$ （即无零因子）。
  - **核心性质**：虽然  $\mathbb{Z}$  没有除法，但它有**带余除法**和**算术基本定理**（唯一分解定理），这是初等数论的基石。

### 3.2 有理数域 $\mathbb{Q}$ ：修补除法

在  $\mathbb{Z}$  中，方程  $2x = 3$  无解。为了修补这个缺陷（引入乘法逆元），我们构造了有理数。

- **构造方法**：在  $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  上定义等价关系，本质上是分数的相等定义。
- **代数结构**： $\mathbb{Q}$  构成了一个**域 (Field)**。
  - 域是代数运算极其完美的结构，非零元素均可逆。
  - $\mathbb{Q}$  也是**有序域**，保持了大小关系的相容性。

### NOTE: 通用构造法 (Quotient Construction)

这种“缺什么补什么”并在集合对上定义等价关系的方法，是代数中构造商群、商环、分式域的原型。

## 4 终章：实数与完备性 ( $\mathbb{R}$ )

尽管  $\mathbb{Q}$  在代数运算上已经很完美，但它在几何度量上有一个致命的漏洞：**不连续**。第一次数学危机 ( $\sqrt{2}$  的发现) 揭示了数轴上布满了有理数无法覆盖的“孔隙”。为了填补这些孔隙，我们需要引入实数。

### 4.1 卓里奇四条 (Zorich's 4 Conditions)

王崧老师引用俄罗斯教材体系 (V.A. Zorich)，给出了实数  $\mathbb{R}$  的公理化定义。一个集合若满足以下四组公理，即为实数集：

1. **域公理 (Field Axioms)**: 保证四则运算的封闭性 (继承自  $\mathbb{Q}$ )。
2. **序公理 (Order Axioms)**: 保证全序关系 (继承自  $\mathbb{Q}$ )。
3. **阿基米德公理 (Archimedean Property)**:

$$\forall x > 0, y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, nx > y$$

这排除了“无穷小量”的存在，连接了有限与无限。

4. **完备性公理 (Completeness)**: 这是  $\mathbb{R}$  区别于  $\mathbb{Q}$  的核心。它有多种等价表述，如柯西收敛准则 (柯西列必收敛) 或确界原理 (有上界必有上确界)。

### 4.2 为什么需要完备性？

完备性是分析学 (微积分) 赖以生存的基础。

- 在  $\mathbb{Q}$  中，你可以构造一个数列  $1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots$ ，它的项都在  $\mathbb{Q}$  中，且越来越“挤” (柯西列)，但它最终指向的目标  $\sqrt{2}$  却掉进了“虚空”。
- 完备性保证了所有这样的数列最终都能在  $\mathbb{R}$  中找到落脚点。

## 术语百科 (Terminology)

### 卓四条 (Zhuō Sì Tiáo)

Source: V.A. Zorich, "Mathematical Analysis"

这是课程中对实数公理化体系的课堂简称。这一称呼强调了从公理化 (Axiomatic) 角度而非构造性 (Constructive, 如戴德金分割) 角度来理解实数。它由域、序、阿基米德性、完备性四个维度组成, 是现代分析学的标准起点。

## Lecture 2: 复数、群论初步与环域分类

### 5 最终的扩张: 复数域 ( $\mathbb{C}$ )

数系的最后一次飞跃, 是为了解决代数方程的求根问题。虽然实数  $\mathbb{R}$  填满了数轴, 但像  $x^2 + 1 = 0$  这样的简单方程在  $\mathbb{R}$  中依然无解。

#### 5.1 定义与运算 (Definition & Operations)

我们将复数定义为实数的扩充, 引入虚数单位  $i$  (满足  $i^2 = -1$ )。

- 集合定义:  $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
- 域扩张符号:  $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$  (意为在  $\mathbb{R}$  中添加元素  $i$  生成的扩域)。

在  $\mathbb{C}$  中, 运算规则如下:

1. 加法:  $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$
2. 乘法:  $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$
3. 嵌入:  $a \mapsto a + 0i$  (实数是复数的子集,  $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ )。

#### 直观理解: 关键技巧: 除法与共轭

为了证明  $\mathbb{C}$  是一个域, 我们需要找到非零元素的逆元。利用恒等式  $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$  (实数), 我们可以将分母实数化:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

这保证了除法的封闭性。

## 5.2 代数基本定理 (Fundamental Theorem of Algebra)

这是数系扩张的终点，也是代数学的里程碑。

### NOTE: 定理内容

任何复系数多项式方程必有根。

**推论：**任何  $n$  次多项式方程在复数域中恰有  $n$  个根（计入重数）。

**直观意义 (Intuition):** 这被称为代数闭域 (Algebraically Closed Field)。这意味着我们不需要再为了解方程而去发明“超复数”了。数系的扩张到此为止， $\mathbb{C}$  已经足够包容所有的代数运算。

**习题 (Exercise)** 整理代数基本定理的证明思路（通常利用复分析中的刘维尔定理或拓扑学方法证明）。

## 6 代数结构的抽象：从数系到群 (Abstraction: From Numbers to Groups)

**核心线索：**回顾我们将  $\mathbb{N}$  扩充到  $\mathbb{Z}$  的过程，本质上是为了让“减法”（即加法的逆运算）可行。当我们把这种“可逆的运算结构”提取出来，不关心它具体是整数还是矩阵，我们就得到了群 (Group)。

### 6.1 群的定义 (Definition of Groups)

根据板书 P9，群不仅仅是一个集合，它是一个结构 (Structure)，记作  $(G, *, e)$ 。它包含三个要素：

1. **集合  $G$ ：**一堆对象。
2. **二元运算  $*$ ：** $G \times G \rightarrow G$ ：一种将两个对象变成一个对象的方法。
3. **特殊元  $e$ ：**一个“基准点”或“单位”。

要成为一个群，必须满足三条公理 (Axioms)：

- 结合律 (Associative Law):

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

\*(直观理解：运算的次序不重要，括号可以随意拆。)\*

- 单位元律 (Identity Law):

$$e * a = a * e = a$$

\*(直观理解： $e$  是“什么都不做”的操作，比如加法里的 0。)\*

- 逆元律 (Inverse Law):

$$\forall a \in G, \exists a^{-1}, \text{使得 } a^{-1} * a = a * a^{-1} = e$$

\*(直观理解：任何操作都可以被“撤销”或“复原”。)\*

## 6.2 例子与反例 (Examples & Counter-examples)

板书 P10 通过我们刚刚构建的数系，清晰地划分了群与非群的界限。

**是群 (Groups)** 以下数系在加法运算下都构成群（且是交换群）：

- $(\mathbb{Z}, 0, +)$ ：整数加法群。
- $(\mathbb{Q}, 0, +)$ ：有理数加法群。
- $(\mathbb{R}, 0, +)$ ：实数加法群。
- $(\mathbb{C}, 0, +)$ ：复数加法群。

**不是群 (Not Groups)**

- $(\mathbb{N}_1, +)$ ：不是群。因为没有 0（缺单位元），也没有负数（缺逆元）。
- $(\mathbb{N}_0, 0, +)$ ：不是群。虽然有了单位元 0，但依然没有负数，无法满足逆元律。

## 6.3 结构的阶梯：半群与么半群 (Semigroups & Monoids)

如果一个结构不满足群的所有条件，它叫什么？板书 P10 给出了精确的分类：

1. 半群 (Semigroup):  $(\mathbb{N}_1, +)$



- 只满足：封闭性 + 结合律。
- 缺陷：没有单位元，无法“不动”；没有逆元，无法“回头”。

## 2. 幺半群 (Monoid): $(\mathbb{N}_0, 0, +)$

- 满足：封闭性 + 结合律 + 单位元。
- 缺陷：依然没有逆元。

## 3. 群 (Group): $(\mathbb{Z}, 0, +)$

- 满足：封闭性 + 结合律 + 单位元 + 逆元。
- 完美状态：运算完全可逆。

直观理解：术语：阿贝尔群 (Abelian Group)

板书最后指出，上述  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$  不仅是群，还是交换群 (Commutative Group)，又称阿贝尔群。这意味着运算满足交换律： $a * b = b * a$ 。注意：交换律并非群定义的必要条件（如矩阵乘法不交换），但它是数系运算的普遍特征。

# 7 环与域：以 $\mathbb{Z}_n$ 为例 (Rings, Fields & Integers Modulo $n$ )

**核心线索：**群  $(G, *)$  只有一种运算。但我们熟悉的整数  $\mathbb{Z}$  既能加也能乘。当我们把“加法群”和“乘法半群”通过分配律粘合在一起，就诞生了环 (Ring)。

## 7.1 环的定义与分类 (Ring Structure)

根据板书 P11，一个集合  $R$  如果配备了两种运算  $(+, \cdot)$  以及两个特殊元  $0, 1$ ，满足以下条件，则称为交换幺元环 (Commutative Unital Ring)：

1. **加法结构：** $(R, 0, +)$  是交换群（阿贝尔群）。
2. **乘法结构：**满足结合律、交换律、单位元  $1 \cdot a = a$ 。
3. **粘合剂：**分配律  $a(b + c) = ab + ac$ 。

推论：

- 0 是强吸附剂:  $0 \cdot a = 0$ 。
- 符号规则:  $(-1) \cdot a = -a$ 。

## 7.2 关键分野: 整环 vs 域 (Integral Domain vs Field)

板书 P12 展示了两个看似相似但有本质区别的概念。这是代数学中关于“除法”的灵魂拷问:

概念	定义核心	直观理解
整环 (Integral Domain)	无零因子: $ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$	不能随便除, 但可以消去。 若 $c \neq 0, ac = bc \implies a = b$ 。 例: $\mathbb{Z}$
域 (Field)	可逆: $\forall a \neq 0, \exists a^{-1}$	可以除。每个非零元素都有倒数。 例: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

### NOTE: 包含关系

所有的域都是整环 (可逆必然蕴含无零因子), 但反之不成立 (整数环  $\mathbb{Z}$  是整环但不是域)。

## 7.3 具体的例子: $\mathbb{Z}_n$ (Integers Modulo n)

板书 P13 引入了同余类的概念, 这是构造有限环的标准方法。

- 定义: 在  $\mathbb{Z}$  上定义同余关系  $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$ 。
- 集合:  $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 。
- 运算:

$$- [a] + [b] = [a + b]$$

$$- [a] \cdot [b] = [ab]$$

性质:  $\mathbb{Z}_n$  是一个交换幺元环。其加法群  $(\mathbb{Z}_n, +)$  是  $n$  阶循环群 (Cyclic Group)。

## 7.4 $\mathbb{Z}_n$ 何时是域? (When is $\mathbb{Z}_n$ a Field?)

板书 P14 给出了一个极其漂亮的数论结论，连接了代数结构与素数分布。

### NOTE: 定理 (The Classification of $\mathbb{Z}_n$ )

对于  $n > 1$ ，以下命题等价：

1.  $\mathbb{Z}_n$  是域。
2.  $\mathbb{Z}_n$  是整环。
3.  $n$  是素数 (Prime)。

证明直观 (Intuition):

- 情形 1:  $n$  是合数 ( $n = ab$ )
  - 在  $\mathbb{Z}_n$  中,  $[a] \neq [0], [b] \neq [0]$ , 但  $[a] \cdot [b] = [n] = [0]$ 。
  - 结论: 存在零因子, 所以不是整环, 更不是域。
  - 例子: 在  $\mathbb{Z}_6$  中,  $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$ 。你不能消去 2, 也不能除以 2。
- 情形 2:  $n$  是素数 ( $n = p$ )
  - 无零因子:  $p$  是素数, 所以  $p \mid ab \implies p \mid a$  或  $p \mid b$ 。这意味着在  $\mathbb{Z}_p$  中没有零因子。
  - 可逆性: 对于任意  $[a] \neq [0]$  (即  $p \nmid a$ ), 由贝祖定理 (Bezout's Identity), 存在  $u, v \in \mathbb{Z}$  使得  $ua + vp = 1$ 。
$$\implies ua \equiv 1 \pmod{p} \implies [u] = [a]^{-1}$$
  - 结论:  $\mathbb{Z}_p$  是域, 通常记作  $\mathbb{F}_p$ 。

## 7.5 模 $n$ 的乘法群 ( $\mathbb{Z}_n^\times$ )

即使  $\mathbb{Z}_n$  不是域, 其中的可逆元 (Units) 也能组成一个群。

- 定义:  $\mathbb{Z}_n^\times = \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$ 。
- 阶:  $|\mathbb{Z}_n^\times| = \phi(n)$  (欧拉  $\phi$  函数)。
- 这个群在数论 (如 RSA 加密) 中至关重要。

## 8 进阶例子与同态初探 (Further Examples & Introduction to Homomorphisms)

### NOTE: Note

在进入正式的代数章节前，我们需要看几个稍复杂的例子。它们打破了之前数系的某些“完美规律”（如交换律），并向我们展示了如何用函数的语言去比较两个代数结构。

### 8.1 环中的群：可逆元群 (The Group of Units)

我们在第 7 节提到环  $R$  有加法和乘法。虽然  $(R, +)$  永远是群，但  $(R, \cdot)$  往往因为  $0$  的存在而不是群。然而，如果我们只看那些“好元素”，它们能构成一个乘法群。

- **定义：** 设  $R$  为幺元环。若  $a \in R$  存在乘法逆元（即  $ab = ba = 1$ ），则称  $a$  为 **可逆元 (Unit)**。
- **记号：**  $R^\times$  或  $U(R)$  表示  $R$  中所有可逆元构成的集合。
- **结构：**  $(R^\times, \cdot)$  是一个群。

典型例子：

1. **整数环：**  $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$  （只有这两个整数有整数倒数）。
2. **域：**  $k^\times = k \setminus \{0\}$  （域中所有非零元都可逆）。
3. **模  $n$  环：**  $\mathbb{Z}_n^\times = \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(a, n) = 1\}$ 。\*(注：这个群的阶数正是数论中的欧拉函数  $\phi(n)$ 。)\*

### 8.2 非交换环：矩阵环 (Matrix Rings)

之前我们遇到的  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_n$  都是 **交换环** ( $ab = ba$ )。矩阵环是打破这一直觉的重要反例。

- **定义：** 设  $k$  是一个域， $M_n(k)$  表示  $k$  上所有  $n \times n$  矩阵的集合。
- **运算：** 标准的矩阵加法与矩阵乘法。
- **单位元：**  $n$  阶单位矩阵  $I_n$ 。
- **性质：** 当  $n \geq 2$  时， $M_n(k)$  是 **非交换环 (Non-commutative Ring)**。

$$(M_n(k))^\times = GL_n(k) \quad (\text{一般线性群})$$

### 8.3 结构间的桥梁：同态 (Homomorphisms)

如何判断两个代数结构是“相似”的？我们需要一种保持结构的映射，称为 **同态**。以环为例：

**定义：** 设  $R, S$  是环，映射  $\phi: R \rightarrow S$  称为 **环同态**，如果它“尊重”环的所有运算：

1. **保加法：**  $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$
2. **保乘法：**  $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
3. **保单位元：**  $\phi(1_R) = 1_S$

经典例子 vs 反例：

- **同态：**  $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ ，定义为  $a \mapsto [a]$ （自然投影）。它完美地保持了加法和乘法结构。
- **不是同态：**  $\psi: \mathbb{R} \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ ，定义为  $a \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。虽然它保持了加法和乘法，但它将实数中的 1 映到了  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，而不是矩阵环的单位元  $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。因此它不是环同态。

#### 直观理解：直观理解

同态就像是代数结构之间的“照相机”。它拍出来的照片（像）可能比原物小（信息有压缩，如  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ ），但物体的结构特征（运算规则）被保留了下来。

## 9 四元数的矩阵表示与结合律 (Matrix Representation & Associativity)

验证四元数乘法的结合律  $(xy)z = x(yz)$  如果直接代入  $x = a + bi + cj + dk$  展开，计算量巨大。一种更优雅的方法是利用**矩阵同构**。

我们发现，四元数与  $2 \times 2$  复矩阵之间存在一一对应关系。

### 9.1 矩阵的构造 (The Construction)

我们可以将四元数的基底  $1, i, j, k$  映射到  $2 \times 2$  复矩阵（这组矩阵与物理中的泡利矩阵密切相关）：

- $1 \mapsto I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- $i \mapsto \mathbf{i} = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$
- $j \mapsto \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
- $k \mapsto \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

### 9.2 一般形式 (General Form)

对于任意四元数  $q = a + bi + cj + dk$ ，其对应的矩阵表示为：

$$M(q) = aI + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

如果我们令复数  $z = a + bi, w = c + di$ ，则矩阵可以写得更紧凑：

$$M(q) = \begin{pmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix}$$

### 9.3 验证结合律 (Verification of Associativity)

为什么要大费周章写成矩阵？因为矩阵乘法的性质我们最熟悉。

- **前提 1:** 矩阵乘法天然满足**结合律**。对于任意  $n$  阶方阵  $A, B, C$ ，线性代数告诉我们  $(AB)C = A(BC)$  恒成立。
- **前提 2:** 上述映射  $q \mapsto M(q)$  是一个**环同态**（甚至是一个单射同态）。这意味着四元数的乘法完全对应于矩阵的乘法： $M(q_1 q_2) = M(q_1)M(q_2)$ 。\*(这一点可以通过验证基底  $i, j, k$  的乘法表来保证，例如验证  $M(i)M(j) = M(k)$ )\*

**证明逻辑:** 设  $x, y, z \in \mathbb{H}$  是三个四元数，

$$\begin{aligned}
 M((xy)z) &= M(xy)M(z) \\
 &= (M(x)M(y))M(z) \quad (\text{同态性质}) \\
 &= M(x)(M(y)M(z)) \quad (\text{矩阵乘法结合律}) \\
 &= M(x)M(yz) \\
 &= M(x(yz))
 \end{aligned}$$

由于该映射  $M$  是单射（即只有 0 映射到零矩阵），这意味着：

$$(xy)z = x(yz)$$

**结论:** 通过将四元数“嵌入”到矩阵环  $M_2(\mathbb{C})$  中，我们“免费”获得了结合律。这是代数学中表示论 (Representation Theory) 威力的第一个展示。