

Лекция 3

Повторные независимые испытания

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий

- Если вероятность наступления события A в каждом испытании не меняется в зависимости от исходов других, то такие испытания называются независимыми относительно события A .
- Если независимые повторные испытания проводятся при одном и том же комплексе условий, то вероятность наступления события A в каждом испытании одна и та же. Описанная последовательность независимых испытаний получила название **схемы Бернулли**.
- **Априорная вероятность** – это вероятность, присвоенная событию при отсутствии знания, поддерживающего его наступление.
- **Апостериорная вероятность** – это условная вероятность события при некотором условии, рассматриваемая в противоположность его априорной вероятности.

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Формула Бернулли

- **Теорема.** Если вероятность p наступления события A в каждом испытании постоянна, то вероятность $P_{m,n}$ того, что событие A наступит m раз в n независимых испытаниях, равна

$$P_{m,n} = P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}$$

Формула Бернулли

(3.1)

где $q = 1 - p$.

Доказательство. Пусть A_i и \bar{A}_i - соответственно появление и не появление события A в i -м испытании ($i = 1, 2, \dots, n$), а B_m - событие, состоящее в том, что в n независимых испытаниях событие A появилось m раз.

Представим событие B_m через элементарные события A_i .

Например, при $n = 3$, $m = 2$ событие $B_2 = A_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3$, т.е. событие A произойдет два раза в трех испытаниях, если оно произойдет в 1-м и 2-м испытаниях (и не произойдет в 3-м); в 1-м и 3-м (и не произойдет во 2-м), или произойдет во 2-м и в 3-м (и не произойдет в 1-м).

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Формула Бернулли

В общем виде

$$B_m = \underline{A_1 A_2 \dots A_m} \bar{A}_{m+1} \dots \bar{A}_n + A_1 \bar{A}_2 A_3 \dots \bar{A}_{n-1} A_n + \dots + A_1 A_2 \dots A_{n-m} A_{n-m+1} \dots A_n, \quad (3.2)$$

т.е. каждый вариант появления события B_m состоит из m появлений события A и $n - m$ неоявлений, т.е. из m событий A и из $n - m$ событий не A с различными индексами.

Число всех комбинаций (слагаемых суммы (3.2)) равно числу способов выбора из n испытаний m , в которых событие A произошло, т.е. числу сочетаний C_n^m .

- Вероятность каждой такой комбинации (каждого варианта появления события B_m) по теореме умножения для независимых событий равна $p^m q^{n-m}$, так как

$$p(A_i) = p, \quad p(\bar{A}_i) = q, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

В связи с тем, что комбинации между собой несовместны, по теореме сложения вероятностей получим

$$P_{m,n} = P(B_m) = \underbrace{p^m q^{n-m} + \dots + p^m q^{n-m}}_{C_n^m \text{ раз}} = C_n^m p^m q^{n-m}$$

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Формула Бернулли

Пример. Вероятность изготовления на автоматическом станке стандартной детали равна 0,8. Найти вероятности возможного числа появления бракованных деталей среди 5 отобранных.

Решение. Вероятность изготовления бракованной детали $P = 1 - 0,8 = 0,2$. Искомые вероятности находим по формуле Бернулли (4.1):


$$P_{0,5} = C_5^0 \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^5 = 0,32768; \quad P_{1,5} = C_5^1 \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^4 = 0,4096;$$

$$P_{2,5} = C_5^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^3 = 0,2048; \quad P_{3,5} = C_5^3 \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^2 = 0,0512;$$

$$P_{4,5} = C_5^4 \cdot 0,2^4 \cdot 0,8^1 = 0,0064; \quad P_{5,5} = C_5^5 \cdot 0,2^5 \cdot 0,8^0 = 0,00032.$$

Полученные вероятности изобразим графически точками с координатами $(m, P_{m,n})$.

Соединяя эти точки, получим многоугольник, или полигон, распределения вероятностей



1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Формула Бернулли

- Число m_0 наступления события А в n независимых испытаниях называется наивероятнейшим, если вероятность осуществления этого события $P_{m_0,n}$ по крайней мере не меньше вероятностей других событий $P_{m,n}$ при любом m .
- Для нахождения m_0 запишем систему неравенств:

$$\begin{cases} P_{m_0,n} \geq P_{m_0+1,n}, \\ P_{m_0,n} \geq P_{m_0-1,n}. \end{cases} \quad (3.3)$$

- Решим первое неравенство системы (3.3).
- Используя формулы Бернулли и числа сочетаний, запишем

$$\frac{n!}{m_0!(n-m_0)!} p^{m_0} q^{n-m_0} \geq \frac{n!}{(m_0+1)!(n-m_0-1)!} p^{m_0+1} q^{n-m_0-1}.$$

- Так как $(m_0+1)! = m_0!(m_0+1)$, $(n-m_0)! = (n-m_0-1)!(n-m_0)$, то получим после упрощений неравенство

$$\frac{1}{n-m_0} q \geq \frac{1}{m_0+1} p, \text{ откуда } (m_0+1) q \geq (n-m_0) p.$$

$$\text{Теперь } m_0(p+q) \geq np - q \text{ или } m_0 \geq np - q$$

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Формула Бернулли

Решая второе неравенство системы (3.3), получим аналогично: $m_0 \leq np + p$.

Объединяя полученные решения двух неравенств, приходим к двойному неравенству:

$$np - q \leq m_0 \leq np + p \quad (3.4)$$

Так как $np + p - (np - q) = p + q = 1$, то всегда существует целое число m_0 , удовлетворяющее неравенству (3.4).

При этом, если $np + p$ – целое число, то наивероятнейших чисел два:

$$m_0 = np + p \quad \text{и} \quad m'_0 = np - q.$$

- **Пример.** Сколько раз необходимо подбросить игральную кость, чтобы наивероятнейшее выпадение тройки было равно 10?

Решение. В данном случае $p = 1/6$. Согласно неравенству (3.4) $n \cdot \frac{1}{6} - \frac{5}{6} \leq 10 \leq n \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$

$$n - 5 \leq 60 \leq n + 1 \Rightarrow 59 \leq n \leq 65, \text{ т.е. необходимо подбросить кость от 59 до 65 раз (включительно).}$$

1. Переменные условия опыта. Производящая функция

- Пусть производится n независимых испытаний, причём в первом испытании вероятность появления события A равна p_1 , во втором – p_2 , ..., в n -м испытании – p_n ; вероятности не появления события A соответственно равны q_1, q_2, \dots, q_n ; $P_n(k)$ – вероятность появления события A в n испытаниях ровно k раз.
- *Производящей функцией* вероятностей $P_n(k)$ называют функцию, определяемую равенством

$$\varphi_n(z) = (p_1 + q_1)(p_2z + q_2) \dots (p_nz + q_n).$$

- Вероятность $P_n(k)$ того, что в n независимых испытаниях, в первом из которых вероятность появления события A равна p_1 , во втором – p_2 , ..., в n -м испытании – p_n ; $P_n(k)$ – вероятность появления события A в n испытаниях ровно k раз, равна коэффициенту z^k в разложении производящей функции по степеням z .

$$\varphi_2(z) = (p_1 + q_1)(p_2z + q_2) = \overbrace{p_1 p_2}^{P_2(2)} z^2 + \underbrace{(p_1 q_2 + p_2 q_1)}_{P_2(1)} z + \underbrace{q_1 q_2}_{P_2(0)}$$

1. Переменные условия опыта. Производящая функция

- Пример.** Устройство состоит из трех независимо работающих элементов (за время t) соответственно равны $p_1=0,7$; $p_2=0,8$; $p_3=0,9$. Найти вероятности того, что за время t будут работать безотказно: а) все элементы, б) два элемента, в) один элемент, д) ни один из элементов.*

Решение. Так как вероятности безотказной работы элементов соответственно равны $p_1=0,7$; $p_2=0,8$; $p_3=0,9$., то вероятности того, что элементы откажут, равны $q_1=0,3$; $q_2=0,2$; $q_3=0,1$.

Составим производящую функцию

$$\varphi_3(z) = (p_1 + q_1)(p_2z + q_2)(p_3z + q_3) = 0,504z^3 + 0,398z^2 + 0,092z + 0,006.$$

Вероятность того, что три элемента будут работать безотказно, равна коэффициенту при z^3

Вероятность того, что два элемента будут работать безотказно, равна коэффициенту при z^2

Вероятность того, что один элемент будет работать безотказно, равна коэффициенту при z^1

Вероятность того, что ни один элемент не будет работать безотказно, равна коэффициенту при z^0

$$\text{Контроль: } 0,504 + 0,398 + 0,092 + 0,006 = 1.$$

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Алгоритм решения задач

1. Проверить, выполняются ли условия схемы повторных независимых испытаний.
2. Если опыт, описываемый в задаче, приводит к схеме повторных независимых испытаний, то из условий определить: $P(A) = p$ - вероятность успеха, и $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ - вероятность неудачи в каждом опыте.
3. При заданных числе опытов, количестве успехов (и (или) неудач) воспользоваться формулами (3.1)-(3.4)

Часто применяемые формулы в схеме Бернулли

Вероятность наступления события A :

а) менее k раз: $P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(k-1)$

б) более k раз: $P_n(k+1) + P_n(k+2) + \dots + P_n(n)$

в) не менее k раз: $P_n(k) + P_n(k+1) + \dots + P_n(n)$

г) не более k раз: $P_n(0) + P_n(1) + \dots + P_n(k)$

д) хотя бы один раз:
 $1 - P_n(0)$

1. Вероятность возникновения независимых повторных событий. Алгоритм решения задач

- **Пример.** В среднем 20% пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене: 1) не будут проданы 5 пакетов; 2) будет продано: а) менее 2 пакетов; б) не более 2; в) хотя бы 2 пакета; г) наивероятнейшее число пакетов.

Решение. 1) Вероятность того, что пакет акций не будет продан по первоначально заявленной цене, $p = 1 - 0,2 = 0,8$.

По формуле Бернулли $P_{5,9} = C_9^5 \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^4 = 0,066$.

2.а) По условию $p = 0,2$.

$$P_9(m < 2) = P_{0,9} + P_{1,9} = C_9^0 \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^9 + C_9^1 \cdot 0,2 \cdot 0,8^8 = 0,436.$$

$$\begin{aligned} 2.б) \quad P_9(m \leq 2) &= P_{0,9} + P_{1,9} + P_{2,9} = C_9^0 \cdot 0,2^0 \cdot 0,8^9 + C_9^1 \cdot 0,2 \cdot 0,8^8 + \\ &+ C_9^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^7 = 0,738. \end{aligned}$$

$$2.в) \quad P_9(m \geq 2) = P_{2,9} + P_{3,9} + \dots + P_{9,9}.$$

2.в) Проще, если перейти к противоположному событию, т.е.

$$P_9(m \geq 2) = 1 - P_9(m < 2) = 1 - (P_{0,9} + P_{1,9}) = 1 - 0,436 = 0,564$$

Пример. В среднем 20% пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене: 1) не будут проданы 5 пакетов; 2) будет продано: а) менее 2 пакетов; б) не более 2; в) хотя бы 2 пакета; г) наивероятнейшее число пакетов.

- 2.г) Наивероятнейшее число проданных акций по первоначально заявленной цене определится из условия (4.4), т.е.

$$9 \cdot 0,2 - 0,8 \leq m_0 \leq 9 \cdot 0,2 + 0,2 \quad \text{или} \quad 1 \leq m_0 \leq 2,$$

т.е. наивероятнейших чисел два: $m_0=1$ и $m'_0=2$.

Поэтому вероятность

$$P_{\text{наивер}} = P_{1,9} + P_{2,9} = C_9^1 \cdot 0,2 \cdot 0,8^8 + C_9^2 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^7 = 0,604.$$

2. Упрощения формулы Бернулли. Формула Пуассона

- **Задача:** вычислить вероятность $P_{m,n}$ появления события A при большом числе испытаний n , например, $P_{300,500}$.
 - По формуле Бернулли
$$P_{300,500} = C_{500}^{300} p^{300} q^{200} = \frac{500!}{300! 200!} p^{300} q^{200}$$
- Непосредственное вычисление технически сложно (p и q - числа дробные)!
- Существуют более простые приближенные формулы для вычисления $P_{m,n}$ при больших n – так называемые асимптотические формулы, – определяются *теоремой Пуассона, локальной и интегральной теоремами Муавра-Лапласа*.

Теорема Пуассона

Теорема. Если вероятность p наступления события A в каждом испытании стремится к нулю ($p \rightarrow 0$) при неограниченном увеличении числа n испытаний ($n \rightarrow \infty$), причем произведение np стремится к постоянному числу λ ($np \rightarrow \lambda$), то вероятность $P_{m,n}$ того, что событие A появится m раз в n независимых испытаниях, удовлетворяет предельному равенству

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{m,n} = P_m(\lambda) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}. \quad (3.5)$$

2. Упрощения формулы Бернулли. Формула Пуассона

Теорема Пуассона

Доказательство: По формуле Бернулли

$$P_{m,n} = C_n^m p^m q^{n-m} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1)}{m!} p^m (1-p)^n (1-p)^{-m}$$

или, учитывая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} np = \lambda$ (при достаточно больших n):

$$p \approx \frac{\lambda}{n} \text{ и } P_{m,n} \approx \frac{\lambda^m}{m!} \left(1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) \right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-m}.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right) = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{m-1}{n}\right) = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\frac{-n}{\lambda}} \right)^{-\lambda} = e^{-\lambda} \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-m} = 1,$$

то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{m,n} = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}.$$

2. Упрощения формулы Бернулли. Формула Пуассона

Замечание

- Строго говоря, условие теоремы Пуассона $p \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, так что $np \rightarrow \lambda$, противоречит исходной предпосылке схемы испытаний Бернулли, согласно которой вероятность наступления события в каждом испытании $p = \text{const}$.
- Однако, если вероятность p – постоянна и мала, число испытаний n – велико и число $\lambda = np$ – незначительно (будем полагать, что $\lambda = np < 10$), то из предельного равенства (3.5) вытекает приближенная формула Пуассона:

$$P_{m,n} \approx \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!} = P_m(\lambda). \quad (3.6)$$

Формула Пуассона

Значения функции Пуассона $P_m(\lambda)$ табулированы.

2. Упрощения формулы Бернулли. Формула Пуассона

- *Пример 1.* На факультете насчитывается 1825 студентов. Какова вероятность того, что 1 сентября является днем рождения одновременно четырех студентов факультета?
- *Решение.* Вероятность того, что день рождения студента 1 сентября, равна $p = 1/365$. Так как $p = 1/365$ – мала, $n = 1825$ – велико и $\lambda = np = 1825(1/365) = 5 < 10$, то применяем формулу Пуассона

$$P_{4,1825} = P_4(5) = 0,1755$$

2. Упрощения формулы Бернулли. Локальная теорема Муавра – Лапласа.

- **Теорема.** Если вероятность p наступления события A в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность $P_{m,n}$ того, что событие A произойдет m раз в n независимых испытаниях при достаточно большом числе n , приближенно равна

$$P_{m,n} \approx \frac{f(x)}{\sqrt{npq}}, \quad (3.7) \quad \leftarrow \text{локальная формула Муавра – Лапласа}$$

$$\text{где } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \quad (3.8) \quad \leftarrow \text{функция Гаусса}$$

$$\text{и } x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}. \quad (3.9)$$

Приближенные значения вероятности $P_{m,n}$, даваемые локальной формулой *Муавра – Лапласа* на практике используются как точные при npq порядка двух и более десятков, т.е. при условии $npq > 20$.

Для упрощения расчетов, связанных с применением формулы (3.7), составлена таблица значений функции $f(x)$

2. Упрощения формулы Бернулли. Локальная теорема Муавра – Лапласа.

Свойства функции Гаусса $f(x)$ (3.8)

1. Функция $f(x)$ является четной, т.е. $f(-x) = f(x)$.
 2. Функция $f(x)$ – монотонно убывающая при положительных значениях x , причем при $x \rightarrow \infty f(x) \rightarrow 0$.
(Практически можно считать, что уже при $x > 4$ $f(x) \approx 0$.)
-

Пример. В некоторой местности из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того, что из 400 семей 300 имеют холодильники.

Решение. Вероятность того, что семья имеет холодильник, равна $p = 80/100 = 0,8$. Так как $n = 100$ достаточно велико (условие $npq = 100 \cdot 0,8(1 - 0,8) = 64 \geq 20$ выполнено), то применяем локальную формулу Муавра – Лапласа.

Вначале определим по (3.9) $x = \frac{300 - 400 \cdot 0,8}{\sqrt{400 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = -2,50$.

Тогда по формуле (3.7) $P_{300,400} \approx \frac{f(-2,50)}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{f(2,50)}{\sqrt{64}} = \frac{0,0175}{8} \approx 0,0022$