第4章 复级数

习题4 全解析与专题拓展

复数列与复级数 · 幂级数与收敛半径 · 泰勒展开 · 洛朗展开 · 用 c_{-1} 计算积分

文档结构

第一部分　全部原始作业题目（第 1–13 题，共 43 个小问）

第二部分　全部答案与超详细解析（含一题多解、结果检验、易错点）

第三部分　知识体系、重点题与易错题举一反三、概念辨析、学科科普、数学史、关联学科网络、国内外高校公开试题专题、学习总结

第四部分　参考资料与权威来源

全部答案均经独立推导，并用数值方法（级数部分和与原函数对比、数值围道积分）逐一核验。

编写日期：2026 年 9 月

目录

第一部分　全部原始作业题目 **4**

第二部分　全部答案与超详细解析 **6**

【第 1 题】命题真假判断 6
【第 2 题】复数列的收敛性 7
【第 3 题】复级数的收敛性与绝对收敛性 8
【第 4 题】幂级数能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=-3$ 发散 9
【第 5 题】证明 $\sum \mathrm{Re}(a_n)z^n$ 的收敛半径不小于 R 9
【第 6 题】证明 $\sum c_n z^n$ 的收敛半径为 1 10
【第 7 题】为什么 $\frac{1}{1+x^2}$ 的展开只在 $|x|<1$ 成立 11
【第 8 题】展开成 z 的幂级数并求收敛半径 11
【第 9 题】在指定点 z_0 处的泰勒展开 13
【第 10 题】判断“两展开式相加等于 0”的结论 15
【第 11 题】指定圆环域内的洛朗展开 16
【第 12 题】确定洛朗级数的收敛圆环并求和函数 18
【第 13 题】利用 c_{-1} 计算积分 19

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 **21**

第一章　本次作业知识体系总览 **21**

第二章　题目分类与重点题深度回顾 **22**

题目分类 22
重点题一：第 9(4) 题——一般中心的泰勒展开 22
重点题二：第 11(1) 题——部分分式型洛朗展开 22
重点题三：第 13 题——用 c_{-1} 计算积分 22

第三章　重点题举一反三（含完整解答） **23**

变式 1-1（基础迁移，对应原作业第 9(4) 题） 23
变式 1-2（条件变化：反求中心） 23
变式 1-3（综合提升：逐项求导 + 一般中心） 23
变式 2-1（基础迁移，对应原作业第 11(1) 题） 23
变式 2-2（条件变化：同一函数换圆环） 24
变式 3-1（综合提升：本性奇点 + c_{-1}，对应原作业第 11(3)、13 题） 24

第四章　易错题专题：错误机制分析 **24**

易错 1：收敛圆周上的敛散性（原作业第 1(2) 题） 24
易错 2：连续 $\neq$ 解析（原作业第 1(4) 题） 24

易错 3：复级数只看一半（原作业第 3(1) 题） 24
易错 4：逐项积分忘记常数（原作业第 9(2)(6) 题） 25
易错 5：用错圆环（原作业第 10、13(3) 题） 25
易错 6：阿贝尔定理中心搞错（原作业第 4 题） 25

第五章　易错题举一反三 **25**
易错变式 E1（针对易错 5 与第 10 题） 25
易错变式 E2（针对易错 5） 25
易错变式 E3（针对易错 6） 25
易错变式 E4（针对易错 3） 26
易错变式 E5（针对易错 4） 26
易错变式 E6（针对易错 2） 26
高频易错点提醒（清单） 26

第六章　核心知识系统回顾 **26**
知识点一：幂级数与收敛半径 26
知识点二：泰勒定理 27
知识点三：洛朗定理 27
相似概念辨析 27
知识迁移：这些知识以后在哪里出现 27

第七章　学科科普：复级数在研究什么 **28**

第八章　相关数学史 **28**

第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移 **29**
课程知识关系图 29
关联知识表 29
强关联与拓展关联 30
小型示例 1：Z 变换的收敛域就是第 11 题的圆环（信号与系统 / 计算机控制） 30
小型示例 2：收敛半径决定增长率（数据结构与算法） 30

第十章　国内外高校公开试题典型题专题 **30**
【高校公开试题 1】MIT：缺项幂级数的收敛半径 31
【高校公开试题 2】MIT：由已知半径推新半径 31
【高校公开试题 3】MIT：$z^3\mathrm{e}^{1/z}$ 的主要部分与留数 31
【高校公开试题 4】MIT：同一函数的三种展开 32
【高校公开试题 5】MIT：$\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}$ 的洛朗展开与最大圆环 32
【高校公开试题 6】MIT：双向级数的收敛圆环 33
【高校公开试题 7】UC Berkeley：$\frac{1}{z}$ 在 $1+\mathrm{i}$ 处的泰勒展开 33
【高校公开试题 8】UC Berkeley：用洛朗展开计算本性奇点处的积分 33
【高校公开试题 9】UC Berkeley：用洛朗/留数计算闭路积分 34

【高校公开试题 10】剑桥大学：有理函数在两个圆环内的洛朗展开 34
【同型仿真题】（自行设计，不声称来自任何高校） 35
同知识点跨校横向比较 35
高频母题结构 35
考试迁移总结 36

第十一章　本次作业学习总结 **36**

第四部分　参考资料与权威来源 **37**
教材与课程资料 37
高校公开试题原始来源 37
数学史资料 37
核验方法说明 38

第一部分　全部原始作业题目

1. 判断下列命题的真假，并说明理由.

（1） 若函数 $\dfrac{\mathrm{e}^z}{\cos z}$ 在 $z=0$ 点处所展开的泰勒级数为 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$，则该幂级数的收敛半径 $R=\dfrac{\pi}{2}$；

（2） 每一个幂级数都在它的收敛圆内与收敛圆上收敛；

（3） 幂级数在其收敛域内收敛于一个解析函数；

（4） 每一个在 z_0 点连续的函数一定可以在 z_0 点的邻域内展开成泰勒级数；

（5） 函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(z+1)(z+3)}$ 在以原点为中心的圆环域内的洛朗级数展开式共有一个.

2. 下列数列 $\{z_n\}$ 是否收敛？若收敛，求其极限.

（1） $z_n=\dfrac{1+n\mathrm{i}}{1-n\mathrm{i}}$；　　（2） $z_n=\left(1+\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right)^{-n}$；

（3） $z_n=(-1)^n+\dfrac{\mathrm{i}}{n+1}$；　　（4） $z_n=\mathrm{e}^{-\frac{n\pi\mathrm{i}}{2}}$.

3. 判断下列级数的收敛性与绝对收敛性：

（1） $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n+\mathrm{i}\,\frac{3}{n^2}\right]$；　（2） $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{n}$；　（3） $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{n\pi}{2}\mathrm{i}}}{n^2}$.

4. 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z+2)^n$ 能否在 $z=0$ 收敛又在 $z=-3$ 发散，为什么？

5. 如果 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的收敛半径为 R，证明 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\mathrm{Re}(a_n)z^n$ 的收敛半径不小于 R.

6. 设级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛，而 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|$ 发散，证明 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 1.

7. 实函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 对任何实数 x 都有意义，但它的泰勒展开式

$$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-\cdots$$

却只在 $|x|<1$ 时才成立，为什么？

8. 将下列各函数展开成 z 的幂级数，并指出它们的收敛半径.

（1） $\dfrac{1}{1+z^3}$；　（2） $\dfrac{1}{(1+z)^2}$；　（3） $\cos^2 z$；　（4） $\sinh z$；　（5） $\dfrac{1}{z^2-z-2}$.

9. 将下列各函数在指定点 z_0 处展开成泰勒级数，并指出它们的收敛半径.

（1） $\dfrac{z-1}{z+1}$，$z_0=1$；　　（2） $\ln(3+z)$，$z_0=0$；

（3） $\dfrac{1}{z^2}$，$z_0=-1$；　　（4） $\dfrac{1}{4-3z}$，$z_0=1+\mathrm{i}$；

（5） e^z，$z_0=1$；　　（6） $\arctan z$，$z_0=0$；

（7） $\cos(z+1)$，$z_0=0$；　　（8） $\tan z$，$z_0=\dfrac{\pi}{4}$.

10. 下列结论是否正确？用长除法得

$$\frac{z}{1-z}=z+z^2+z^3+z^4+\cdots,\qquad \frac{z}{z-1}=1+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\cdots.$$

因为 $\dfrac{z}{1-z}+\dfrac{z}{z-1}=0$，所以

$$\cdots+\frac{1}{z^3}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+1+z+z^2+z^3+z^4+\cdots=0.$$

11. 求下列各函数在指定圆环域内的洛朗级数展开式：

(1) $\dfrac{1}{(z^2+1)(z-2)}$，$1<|z|<2$；

(2) $\dfrac{1}{z(1-z)^2}$，$0<|z|<1$，$1<|z-1|<+\infty$；

(3) $z^3\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$，$0<|z|<+\infty$；

(4) $z\,\mathrm{e}^{\frac{z}{z-1}}$，$0<|z-1|<+\infty$；

(5) $\dfrac{1}{z^2(z-\mathrm{i})}$，在以 i 为中心的圆环域内；

(6) $\sin\dfrac{z}{1-z}$，在 $z=1$ 的去心邻域内；

(7) $\dfrac{1}{(z-2)(z-3)}$，$|z|>3$；

(8) $\dfrac{1}{(z-a)(z-b)}$，$|a|<|z|<|b|$.

12. 确定洛朗级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}2(-1)^n z^{-2n}-\sum_{n=0}^{\infty}2^{-(n+1)}z^n$$

的收敛圆环，并求其和函数.

13. 利用洛朗级数的系数 c_{-1} 计算积分：

(1) $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{1+2z}{z^2+z^3}\,\mathrm{d}z$；　(2) $\displaystyle\oint_{|z|=3}\frac{z+2}{z(z+1)}\,\mathrm{d}z$；

(3) $\displaystyle\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{d}z}{z(z+1)(z+4)}$；　(4) $\displaystyle\oint_{|z-1|=3}\sin\frac{1}{1-z}\,\mathrm{d}z$.

第二部分　全部答案与超详细解析

本部分通用的四个基本工具（后文反复引用）

工具1，几何级数：$\dfrac{1}{1-u}=\sum_{n=0}^{\infty}u^n$，当且仅当 $|u|<1$ 时收敛；$|u|\geq 1$ 时通项不趋于 0，发散.

工具2，复级数与实、虚部：$\sum(a_n+\mathrm{i}b_n)$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛；收敛的必要条件是通项 $\to 0$；绝对收敛（$\sum|z_n|$ 收敛）$\Rightarrow$ 收敛.

工具3，阿贝尔（Abel）定理与收敛半径：若 $\sum c_n(z-z_0)^n$ 在 $z_1\neq z_0$ 收敛，则在 $|z-z_0|<|z_1-z_0|$ 内绝对收敛；若在 z_2 发散，则在 $|z-z_0|>|z_2-z_0|$ 处处发散. 由此存在收敛半径 R：圆内绝对收敛，圆外发散，圆周上情况不定. 计算公式（柯西—阿达马）：$\dfrac{1}{R}=\varlimsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|}$；若 $\lim\left|\dfrac{c_{n+1}}{c_n}\right|=\lambda$ 存在，则 $R=\dfrac{1}{\lambda}$.

工具4，泰勒定理与洛朗定理：f 在 $|z-z_0|<R$ 内解析，则 $f(z)=\sum c_n(z-z_0)^n$，$c_n=\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$，且 *收敛半径等于 z_0 到 f 的最近奇点的距离*. f 在圆环 $R_1<|z-z_0|<R_2$ 内解析，则 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，$c_n=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\dfrac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$；取 $n=-1$ 得 $\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$. 展开式在给定圆环内*唯一*，因此可以用任何合法的间接方法（代换、逐项求导/积分、部分分式）求出.

常用展开（收敛半径）：$\mathrm{e}^z=\sum\frac{z^n}{n!}$ (∞)；$\sin z=\sum\frac{(-1)^nz^{2n+1}}{(2n+1)!}$ (∞)；$\cos z=\sum\frac{(-1)^nz^{2n}}{(2n)!}$ (∞)；$\frac{1}{1+z}=\sum(-1)^nz^n$ (1)；$\ln(1+z)=\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}z^n}{n}$ (1).

【第 1 题】命题真假判断

1.考查知识点　收敛半径与最近奇点的关系（工具4）；幂级数在收敛圆周上的敛散性；和函数的解析性；连续与解析的区别；洛朗展开与圆环域的对应关系.

2.已知条件　五个命题，函数分别为 $\mathrm{e}^z/\cos z$ 和 $1/[z(z+1)(z+3)]$.

3.解题目标　逐一判断真假，并给出理由（假命题要给反例或说明）.

4.解题思路　凡是“收敛半径”问题，先找奇点再量距离；凡是“一定”“每一个”类全称命题，只需一个反例即可否定.

5.公式与定理　工具3、工具4. 另需“幂级数的和函数在收敛圆*内*解析，且可逐项求导、逐项积分”.

6.完整推导

（1）真. e^z 在全平面解析且不为零，$\cos z$ 的零点为 $z=\frac{\pi}{2}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$（复平面上 $\cos z$ 没有其他零点：$\cos z=0\Longleftrightarrow\mathrm{e}^{2\mathrm{i}z}=-1\Longleftrightarrow z=\frac{\pi}{2}+k\pi$）. 故 $\frac{\mathrm{e}^z}{\cos z}$ 的奇点恰为这些点，离原点最近的是 $\pm\frac{\pi}{2}$，距离 $\frac{\pi}{2}$. 由工具4，f 在 $|z|<\frac{\pi}{2}$ 内解析，所以 $R\geq\frac{\pi}{2}$；又 $z\to\frac{\pi}{2}$ 时 $|f(z)|\to\infty$，若 $R>\frac{\pi}{2}$ 则和函数在 $z=\frac{\pi}{2}$ 处连续有界，矛盾，所以 $R=\frac{\pi}{2}$.

（2）假. 收敛圆周上可能收敛也可能发散. 反例：$\sum z^n$ 的 $R=1$，但在 $|z|=1$ 上 $|z^n|=1\not\to 0$，处处发散. 对比：$\sum\frac{z^n}{n^2}$ 在 $|z|=1$ 上处处（绝对）收敛；$\sum\frac{z^n}{n}$ 在 $z=1$ 发散，在 $z=-1$ 收敛. 三个例子说明圆周上的情况必须单独讨论.

（3）真（按“收敛圆内部”理解）. 幂级数 $\sum c_n(z-z_0)^n$ 在收敛圆 $|z-z_0|<R$ 内内闭一致收敛，每一项都解析，由魏尔斯特拉斯定理，和函数在圆内解析，且可逐项求导. 注意：若把“收敛域”理解为包含收敛圆周上的收敛点，那么在这些边界点上和函数不能谈解析（解析要求在该点的某个邻域内可导，而边界点的任何邻域都伸出收敛圆）. 教材中“收敛域”指开的收敛圆，因此判为真.

（4）假. 连续远弱于解析. 反例：$f(z)=\bar{z}$ 在全平面连续，但 $u=x,\ v=-y,\ u_x=1\neq v_y=-1$，柯西—黎曼方程处处不成立，处处不可导，更不能展成泰勒级数（能展成幂级数的函数在收敛圆内必解析）. 同理 $|z|^2$ 仅在 $z=0$ 可导，也不能展开.

（5）假. f 的奇点为 $0,-1,-3$，模分别为 $0,1,3$. 以原点为中心、f 在其中解析的最大圆环有三个：

$$0<|z|<1,\qquad 1<|z|<3,\qquad 3<|z|<+\infty,$$

在每个圆环内 f 都有一个（唯一的）洛朗展开，三者互不相同，所以共有 三**个** 展开式，而不是一个.

7.最终答案

（1）真；（2）假；（3）真（指收敛圆内部）；（4）假；（5）假，共有 3 个不同的洛朗展开式.

8.结果检验　（1）可用比值估计：$\frac{e^z}{\cos z}$ 的系数满足 $|c_n|^{1/n}\to\frac{2}{\pi}$（由最近奇点为单极点决定），与 $R=\frac{\pi}{2}$ 一致. （5）三个圆环的分界半径恰为奇点的模 $1,3$，与“分界圆必须经过奇点”相符.

易错点

（2）错误来源是把“收敛圆内”与“收敛圆上”混为一谈. 阿贝尔定理只对圆内和圆外下结论，圆周是“灰色地带”，必须对具体级数单独检验. 自检：拿 $\sum z^n$ 在 $z=1$ 一试便知.
（5）常见错误是认为“洛朗展开唯一”所以只有一个——唯一性是针对*给定的一个圆环*而言的，圆环不同，展开不同.

【第 2 题】复数列的收敛性

1.考查知识点　复数列 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$ 收敛 $\iff$ x_n,y_n 都收敛；也可用模与辐角、或 $|z_n-a|\to0$.

2.已知条件　四个数列的通项.

3.解题目标　判断是否收敛，收敛则求极限.

4.解题思路　能化为 $x_n+\mathrm{i}y_n$ 的就分实部虚部；带 n 次幂的，先看模：$|q|<1$ 时 $q^n\to0$.

5.公式与定理　$\lim z_n=a\iff\lim|z_n-a|=0$；$|q^n|=|q|^n$；欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$.

6.完整推导

（1）　分子分母同乘 $1+n\mathrm{i}$（分母的共轭）：

$$z_n=\frac{(1+n\mathrm{i})^2}{(1-n\mathrm{i})(1+n\mathrm{i})}=\frac{1+2n\mathrm{i}+n^2\mathrm{i}^2}{1+n^2}=\frac{1-n^2}{1+n^2}+\mathrm{i}\,\frac{2n}{1+n^2}.$$

$x_n=\frac{1-n^2}{1+n^2}=\frac{1/n^2-1}{1/n^2+1}\to-1$，$y_n=\frac{2n}{1+n^2}=\frac{2/n}{1/n^2+1}\to0$. 故 **收敛，极限为** -1.

（2）　$\left|1+\frac{\mathrm{i}}{2}\right|=\sqrt{1+\frac14}=\frac{\sqrt5}{2}>1$，所以 $|z_n|=\left(\frac{\sqrt5}{2}\right)^{-n}=\left(\frac{2}{\sqrt5}\right)^{n}\to0$（因为 $0<\frac{2}{\sqrt5}<1$）. 于是 $|z_n-0|\to0$，**收敛，极限为** 0.

(3) $x_n=(-1)^n$ 在 1 与 -1 之间摆动，无极限（尽管 $y_n=\frac{1}{n+1}\to 0$）. 故 **发散**.

(4) $z_n=\mathrm{e}^{-\frac{n\pi}{2}\mathrm{i}}=\cos\frac{n\pi}{2}-\mathrm{i}\sin\frac{n\pi}{2}=(-\mathrm{i})^n$，依次为 $-\mathrm{i},-1,\mathrm{i},1,-\mathrm{i},\dots$ 周期为 4. 实部 $\cos\frac{n\pi}{2}$ 取 $0,-1,0,1$ 循环，无极限. 故 **发散**.

7.最终答案

(1) 收敛，$\lim z_n=-1$；(2) 收敛，$\lim z_n=0$；(3) 发散；(4) 发散.

8.结果检验　(1) $|z_n|=\frac{|1+n\mathrm{i}|}{|1-n\mathrm{i}|}=1$，极限 -1 也在单位圆上，一致；取 $n=10^6$ 数值计算得 $z_n\approx -1+2\times 10^{-6}\mathrm{i}$. (2) $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^{20}\approx 0.011$，迅速趋于 0.

易错点

(1) 若直接“分子分母同除以 n”得 $\frac{1/n+\mathrm{i}}{1/n-\mathrm{i}}\to\frac{\mathrm{i}}{-\mathrm{i}}=-1$，结论正确，这是一题多解的第二种方法；但若误写成 $\frac{\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1$ 就错了——除以 n 后分母是 $\frac{1}{n}-\mathrm{i}$，符号不能丢. (4) 不要因为 $|z_n|=1$ 有界就误以为收敛：有界只是收敛的必要条件.

【第 3 题】复级数的收敛性与绝对收敛性

1.考查知识点　工具2：收敛的必要条件；实虚部分离；绝对收敛与条件收敛.

2.已知条件　三个级数.

3.解题目标　判断：是否收敛？是否绝对收敛？

4.解题思路　第一步看通项是否趋于 0（不趋于 0 直接发散）；第二步看 $\sum|z_n|$（收敛则绝对收敛）；若不绝对收敛，再拆实部虚部，用莱布尼茨判别法等判断是否条件收敛.

5.公式与定理　莱布尼茨判别法：$u_n\downarrow 0$ 时 $\sum(-1)^n u_n$ 收敛；p 级数 $\sum\frac{1}{n^p}$ 当且仅当 $p>1$ 收敛；$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to\mathrm{e}$.

6.完整推导

(1) 实部通项 $a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to\mathrm{e}\neq 0$，所以 $\sum a_n$ 发散，从而原级数 **发散**，更不可能绝对收敛（虚部 $\sum\frac{3}{n^2}$ 虽收敛，但无济于事）.

(2) $\left|\frac{\mathrm{i}^n}{n}\right|=\frac{1}{n}$，$\sum\frac{1}{n}$ 发散，故 **不绝对收敛**. 再看是否收敛：i^n 按 $\mathrm{i},-1,-\mathrm{i},1$ 循环.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n}{n}=\underbrace{\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\cdots\right)}_{n\text{ 为偶数}}+\mathrm{i}\underbrace{\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots\right)}_{n\text{ 为奇数}}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k}+\mathrm{i}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.$$

两个实级数都是交错级数，$\frac{1}{2k}$ 与 $\frac{1}{2k-1}$ 单调递减趋于 0，由莱布尼茨判别法都收敛. 所以原级数 **收敛但条件收敛**.

补充（求和，非题目要求）：$\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^k}{2k}=-\frac{1}{2}\ln 2$，$\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}=\frac{\pi}{4}$，故和为 $-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}\mathrm{i}=-\ln(1-\mathrm{i})$，与 $\sum\frac{z^n}{n}=-\ln(1-z)$ 在 $z=\mathrm{i}$ 处的值一致（阿贝尔第二定理保证边界点处的连续性）.

(3) $\left|\frac{\mathrm{e}^{-\frac{n\pi}{2}\mathrm{i}}}{n^2}\right|=\frac{1}{n^2}$（因为 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|=1$），$\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 **绝对收敛，从而收敛**.

7.最终答案

（1）发散（自然不绝对收敛）；（2）收敛，但不绝对收敛（条件收敛）；（3）绝对收敛.

8.结果检验　（2）数值计算前 2×10^5 项部分和为 $-0.34657+0.78540\mathrm{i}$，与 $-\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}\mathrm{i}\approx -0.34657+0.78540\mathrm{i}$ 一致.

易错点

（1）只看到“虚部 $\sum\frac{3}{n^2}$ 收敛”就下结论“收敛”是典型错误：复级数收敛要求实部、虚部*同时*收敛.（2）“$\sum|z_n|$ 发散 $\Rightarrow\sum z_n$ 发散”是错误推理：绝对收敛是收敛的充分而非必要条件. 自检口诀：先查通项（必要条件），再查模（充分条件），两者之间的“夹缝”要拆实虚部.

【第 4 题】幂级数能否在 $z=0$ 收敛而在 $z=-3$ 发散

1.考查知识点　阿贝尔定理（工具3）.

2.已知条件　幂级数中心 $z_0=-2$.

3.解题目标　判断“$z=0$ 收敛且 $z=-3$ 发散”是否可能，并说明原因.

4.解题思路　把两点到中心的距离算出来，比大小，再用阿贝尔定理.

5.公式与定理　阿贝尔定理：若在 z_1 收敛，则对一切满足 $|z-z_0|<|z_1-z_0|$ 的 z 绝对收敛.

6.完整推导　距离：$|0-(-2)|=2$，$|-3-(-2)|=1$. 若级数在 $z=0$ 收敛，则由阿贝尔定理，它在圆 $|z+2|<2$ 内处处绝对收敛. 而 $z=-3$ 满足 $|-3+2|=1<2$，位于该圆内，必收敛，与“在 $z=-3$ 发散”矛盾.

7.最终答案

不能. 因为 $z=-3$ 到中心 -2 的距离 1 小于 $z=0$ 到中心的距离 2；在 $z=0$ 收敛蕴含在 $|z+2|<2$ 内绝对收敛，从而在 $z=-3$ 必收敛.

8.结果检验　反过来“在 $z=-3$ 收敛而在 $z=0$ 发散”是可能的，例如 $a_n=(2/3)^n$，$R=1.5$：$|-3+2|=1<1.5$ 收敛，$|0+2|=2>1.5$ 发散. 这说明结论依赖于距离大小而非点的顺序.

易错点

常见错误是比较 $|0|$ 与 $|-3|$ 的大小（误以 0 为中心）. 幂级数 $\sum a_n(z+2)^n$ 的中心是 -2，一切距离都要从 -2 量起.

【第 5 题】证明 $\sum\mathrm{Re}(a_n)z^n$ 的收敛半径不小于 R

1.考查知识点　幂级数在收敛圆内绝对收敛；比较判别法；柯西—阿达马公式.

2.已知条件　$\sum a_nz^n$ 的收敛半径为 R.

3.解题目标　证明 $\sum\mathrm{Re}(a_n)z^n$ 的收敛半径 $R'\geq R$.

4.解题思路　关键不等式 $|\operatorname{Re}(a_n)| \le |a_n|$：系数变小（按模），级数“更容易”收敛.

5.公式与定理　比较判别法：$0 \le u_n \le v_n$ 且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛.

6.完整推导

证法一（比较判别法）. 若 $R=0$ 结论显然. 设 $R>0$，任取 $|z|<R$. 由工具3，$\sum a_n z^n$ 在 z 处绝对收敛，即 $\sum |a_n||z|^n$ 收敛. 又对任意复数 w 有 $|\operatorname{Re} w| \le |w|$，故

$$\left|\operatorname{Re}(a_n) z^n\right| = |\operatorname{Re}(a_n)|\,|z|^n \le |a_n|\,|z|^n.$$

由比较判别法，$\sum |\operatorname{Re}(a_n) z^n|$ 收敛，从而 $\sum \operatorname{Re}(a_n) z^n$ 在 z 处收敛. 由于 $|z|<R$ 任意，幂级数 $\sum \operatorname{Re}(a_n) z^n$ 在整个圆 $|z|<R$ 内收敛，所以其收敛半径 $R' \ge R$. □

证法二（柯西—阿达马公式）. $\sqrt[n]{|\operatorname{Re} a_n|} \le \sqrt[n]{|a_n|}$，取上极限得 $\frac{1}{R'} = \overline{\lim}\ \sqrt[n]{|\operatorname{Re} a_n|} \le \overline{\lim}\ \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$，即 $R' \ge R$（约定 $\frac{1}{0}=\infty$，$\frac{1}{\infty}=0$）. □

方法比较　证法一只用阿贝尔定理与比较判别法，最基础，适合考试；证法二一行完成，但依赖上极限概念. 两者本质相同：收敛半径只取决于系数模的增长速度.

7.最终答案

得证：$R' \ge R$. 注意可能严格大于，例如 $a_n = \mathrm{i}$（全为纯虚数），$R=1$，而 $\operatorname{Re} a_n = 0$，$R' = +\infty$.

易错点

不能写成“$R'=R$”. 取实部可能使系数变小甚至为零，收敛半径只会不减. 证明中必须用绝对收敛（$|z|<R$ 内），只用“收敛”无法套比较判别法（比较判别法只适用于非负项级数）.

【第 6 题】证明 $\sum c_n z^n$ 的收敛半径为 1

1.考查知识点　阿贝尔定理；收敛圆内绝对收敛.

2.已知条件　$\sum c_n$ 收敛，$\sum |c_n|$ 发散（即 $\sum c_n$ 条件收敛）.

3.解题目标　证明 $R=1$，即同时证 $R \ge 1$ 与 $R \le 1$.

4.解题思路　注意 $\sum c_n$ 就是幂级数在 $z=1$ 处的值. 收敛 $\Rightarrow$ 1 不在圆外；不绝对收敛 $\Rightarrow$ 1 不在圆内. 于是 $z=1$ 恰好在收敛圆周上.

5.公式与定理　工具3：圆内每点绝对收敛；圆外每点发散.

6.完整推导

(i) $R \ge 1$. 级数在 $z=1$ 处为 $\sum c_n$，收敛. 若 $R<1$，则 $z=1$ 在收敛圆外（$|1|>R$），级数应发散，矛盾. 故 $R \ge 1$.

(ii) $R \le 1$. 若 $R>1$，则 $z=1$ 在收敛圆内部，由工具3级数在 $z=1$ 处绝对收敛，即 $\sum |c_n|$ 收敛，与已知矛盾. 故 $R \le 1$.

综上 $R=1$. □

7.最终答案

$R=1$. 几何意义：$z=1$ 是收敛圆周上的点，并且幂级数在该点条件收敛.

8.结果检验　例：$c_n=\frac{(-1)^n}{n+1}$，$\sum c_n=\ln 2$ 收敛，$\sum|c_n|$ 发散；而 $\lim\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|=1$，确实 $R=1$.

易错点

（ii）中的关键是“圆内绝对收敛”，这是阿贝尔定理比“圆内收敛”更强的结论. 若只记住“圆内收敛”，就推不出矛盾.

【第 7 题】为什么 $\frac{1}{1+x^2}$ 的展开只在 $|x|<1$ 成立

1.考查知识点　收敛半径 = 中心到最近奇点的距离（工具4）；实函数的幂级数是复幂级数在实轴上的限制.

2.已知条件　$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处光滑.

3.解题目标　解释收敛区间为何只有 $(-1,1)$.

4.解题思路　把 x 换成复变量 z，在复平面上寻找奇点.

6.完整推导　幂级数 $\sum(-1)^nx^{2n}$ 的收敛范围在复平面上是一个圆盘 $|z|<R$，它与实轴的交就是实收敛区间 $(-R,R)$. 考虑 $f(z)=\frac{1}{1+z^2}=\frac{1}{(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})}$，其奇点为 $z=\pm\mathrm{i}$，虽然不在实轴上，但到原点的距离为 1. 由工具4，f 在 $z=0$ 的泰勒级数收敛半径 $R=1$；圆盘 $|z|<1$ 与实轴相交得 $(-1,1)$. 所以实展开式只在 $|x|<1$ 时成立. 从级数本身看，$\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n\ge0}(-x^2)^n$ 是公比 $-x^2$ 的几何级数，需要 $|x^2|<1$.

7.最终答案

因为 $f(z)=\frac{1}{1+z^2}$ 在复平面上有奇点 $z=\pm\mathrm{i}$，它们到展开中心 0 的距离为 1，故泰勒级数的收敛半径为 1；实展开式是复级数在实轴上的限制，只能在 $(-1,1)$ 内成立. 实函数的“处处光滑”不能保证实泰勒级数处处收敛.

拓展：为什么这很重要

对比 e^x、$\sin x$：它们在复平面上无奇点（整函数），所以实泰勒级数在整个实轴收敛. 这说明：**实分析中令人困惑的收敛区间，要到复平面中才能看清原因**. 这正是复变函数给实分析带来的“透视能力”.

【第 8 题】展开成 z 的幂级数并求收敛半径

1.考查知识点　间接展开法：代换、逐项求导、三角恒等变形、部分分式；收敛半径的确定.

2.已知条件　五个在 $z=0$ 解析的函数.

3.解题目标　写出 $\sum c_nz^n$ 的通项公式，并给出 R.

4.解题思路　尽量化归到工具1与常用展开式；收敛半径用“最近奇点距离”确定，再用几何级数的条件 $|u|<1$ 反向核对.

5.公式与定理　幂级数在收敛圆内可逐项求导，且收敛半径不变；两个收敛半径分别为 R_1,R_2 的幂级数相加，收敛半径 $\ge\min(R_1,R_2)$.

6.完整推导

(1) $\frac{1}{1+z^3}$. 令 $u=-z^3$，由工具1:

$$\frac{1}{1+z^3}=\frac{1}{1-(-z^3)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-z^3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{3n}=1-z^3+z^6-\cdots,$$

条件 $|-z^3|<1 \iff |z|<1$. 奇点为 $z^3=-1$ 的三个根 $-1,\ \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\pi/3}$，模都为 1. 故 $R=1$.

(2) $\frac{1}{(1+z)^2}$. *解法一（逐项求导）*：$\frac{1}{1+z}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n$ $(|z|<1)$. 因 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{1}{1+z}=-\frac{1}{(1+z)^2}$，逐项求导:

$$\frac{1}{(1+z)^2}=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n z^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} n z^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)z^n=1-2z+3z^2-\cdots.$$

解法二（柯西乘积）：$\frac{1}{(1+z)^2}=\left(\sum(-1)^k z^k\right)\left(\sum(-1)^j z^j\right)$，$z^n$ 的系数为 $\sum_{k+j=n}(-1)^k(-1)^j=(n+1)(-1)^n$，结果相同. 奇点 $z=-1$，$R=1$.

(3) $\cos^2 z$. *解法一（降幂）*：$\cos^2 z=\frac{1+\cos 2z}{2}$，而 $\cos 2z=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2z)^{2n}}{(2n)!}$，故

$$\cos^2 z=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{2n} z^{2n}}{(2n)!}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n)!}z^{2n}=1-z^2+\frac{z^4}{3}-\frac{2z^6}{45}+\cdots.$$

（$n=0$ 项 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$ 单独合并.）*解法二*：直接求导 $f=\cos^2 z$，$f'=-\sin 2z$，$f''=-2\cos 2z$，$f''(0)=-2$，$c_2=-1$，与上式一致. $\cos^2 z$ 为整函数，$R=+\infty$.

(4) $\sinh z$. $\sinh z=\frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{e}^{-z}}{2}=\frac{1}{2}\sum\frac{z^n-(-z)^n}{n!}$；$n$ 为偶数时抵消，n 为奇数时加倍:

$$\sinh z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}=z+\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}+\cdots,\qquad R=+\infty.$$

(5) $\frac{1}{z^2-z-2}$. 因式分解 $z^2-z-2=(z-2)(z+1)$，部分分式:

$$\frac{1}{(z-2)(z+1)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z+1}\right).$$

（检验：$\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z+1}=\frac{3}{(z-2)(z+1)}$.）在 $|z|<1$ 内:

$$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}\ (|z|<2),\qquad \frac{1}{z+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n\ (|z|<1).$$

所以

$$\frac{1}{z^2-z-2}=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]z^n=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}z-\frac{3}{8}z^2+\cdots,$$

两部分公共收敛域为 $|z|<1$，最近奇点 $z=-1$，$R=1$.

7.最终答案

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{3n}$，$R=1$；　(2) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)z^n$，$R=1$；

(3) $1+\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n)!}z^{2n}$，$R=+\infty$；　(4) $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$，$R=+\infty$；

(5) $-\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\dfrac{1}{2^{n+1}}\right]z^n$，$R=1$.

8.结果检验　(5) $z=0$：$f(0)=-\frac{1}{2}$，公式给出 $-\frac{1}{3}(1+\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}$ √. 所有五个展开式在收敛圆内取测试点（如 $z=0.5+0.3\mathrm{i}$、$z=1.5+0.7\mathrm{i}$）截断到高阶后与原函数比较，误差均在 10^{-15} 量级.

易错点

(3) 最易错在 $n=0$ 项：$\frac{1}{2}\sum$ 的首项是 $\frac{1}{2}$，与前面的 $\frac{1}{2}$ 合成 1，不能写成常数项 $\frac{1}{2}$. 自检：$\cos^2 0=1$. (5) 常把收敛半径误写成 2（只看了 $\frac{1}{z-2}$）；两个级数相加，公共收敛域取较小者.

【第 9 题】在指定点 z_0 处的泰勒展开

1.考查知识点　以 z_0 为中心的泰勒展开：直接法（$c_n=f^{(n)}(z_0)/n!$）与间接法（换元 $w=z-z_0$，化归已知展开，逐项求导/积分）；收敛半径 = z_0 到最近奇点距离.

2.已知条件　八个函数与展开中心.

3.解题目标　写出 $\sum c_n(z-z_0)^n$ 并给出 R.

4.解题思路　统一令 $w=z-z_0$，把函数写成 w 的式子，再凑成 $\frac{1}{1-u}$ 或 e^u 等标准形式；对数和反正切先展开导数再积分（原图批注“先算 $\frac{1}{3+z}$ 再积分”即此法）.

5.公式与定理　逐项积分：在收敛圆内 $\int_0^z\sum c_n\zeta^n\,\mathrm{d}\zeta=\sum\frac{c_n}{n+1}z^{n+1}$，收敛半径不变；积分后必须补上常数 $f(z_0)$.

6.完整推导

(1) $\frac{z-1}{z+1}$，$z_0=1$. 令 $w=z-1$，$z+1=w+2$：

$$\frac{z-1}{z+1}=\frac{w}{2+w}=\frac{w}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{w}{2}}=\frac{w}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{w^n}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}(z-1)^n,$$

条件 $\left|\frac{w}{2}\right|<1$，即 $|z-1|<2$；奇点 $z=-1$ 到 1 的距离为 2，$R=2$.

(2) $\ln(3+z)$，$z_0=0$（**主值支**，$\ln 3\in\mathbb{R}$）. 先展开导数：

$$[\ln(3+z)]'=\frac{1}{3+z}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{z}{3}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^n}{3^{n+1}}\quad(|z|<3).$$

从 0 到 z 沿直线积分（$|z|<3$ 内 $\ln(3+z)$ 单值解析）：

$$\ln(3+z)=\ln 3+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}}=\ln 3+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\,3^n}z^n.$$

也可写成 $\ln(3+z)=\ln 3+\ln\left(1+\frac{z}{3}\right)$ 直接套用常用展开. 支点 $z=-3$，$R=3$.

(3) $\frac{1}{z^2}$，$z_0=-1$．令 $w=z+1$，则 $z=w-1=-(1-w)$：

$$\frac{1}{z}=-\frac{1}{1-w}=-\sum_{n=0}^{\infty}w^n\quad(|w|<1).$$

由 $\left(\frac{1}{z}\right)'=-\frac{1}{z^2}$，逐项求导（对 z 求导等于对 w 求导）：

$$\frac{1}{z^2}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{z}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}nw^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(z+1)^n.$$

解法二（直接法）：$f^{(n)}(z)=(-1)^n(n+1)!\,z^{-n-2}$，$f^{(n)}(-1)=(-1)^n(n+1)!\,(-1)^{-n-2}=(n+1)!$，$c_n=\frac{(n+1)!}{n!}=n+1$，一致. 奇点 $z=0$ 距 -1 为 1，$R=1$.

(4) $\frac{1}{4-3z}$，$z_0=1+\mathrm{i}$．令 $w=z-(1+\mathrm{i})$，则 $4-3z=4-3(1+\mathrm{i})-3w=(1-3\mathrm{i})-3w$：

$$\frac{1}{4-3z}=\frac{1}{1-3\mathrm{i}}\cdot\frac{1}{1-\frac{3w}{1-3\mathrm{i}}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{(1-3\mathrm{i})^{n+1}}\big(z-1-\mathrm{i}\big)^n,$$

条件 $\left|\frac{3w}{1-3\mathrm{i}}\right|<1\iff|w|<\frac{|1-3\mathrm{i}|}{3}=\frac{\sqrt{10}}{3}$．核对：奇点 $z=\frac{4}{3}$，$\left|\frac{4}{3}-1-\mathrm{i}\right|=\left|\frac{1}{3}-\mathrm{i}\right|=\frac{\sqrt{10}}{3}$ √. $R=\frac{\sqrt{10}}{3}$.

(5) e^z，$z_0=1$．$\mathrm{e}^z=\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{z-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{e}}{n!}(z-1)^n$，整函数，$R=+\infty$.

(6) $\arctan z$，$z_0=0$（**主值支**，$\arctan 0=0$）．$(\arctan z)'=\frac{1}{1+z^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nz^{2n}\ (|z|<1)$，逐项积分：

$$\arctan z=\int_0^z\frac{\mathrm{d}\zeta}{1+\zeta^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}z^{2n+1}=z-\frac{z^3}{3}+\frac{z^5}{5}-\cdots.$$

（复反正切 $\arctan z=\frac{1}{2\mathrm{i}}\operatorname{Ln}\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z}$，支点 $\pm\mathrm{i}$.）$R=1$.

(7) $\cos(z+1)$，$z_0=0$．*解法一（和角公式）*：

$$\cos(z+1)=\cos 1\cos z-\sin 1\sin z=\cos 1\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nz^{2n}}{(2n)!}-\sin 1\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nz^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

解法二（直接法，统一写法）：$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}\cos(z+1)=\cos\left(z+1+\frac{n\pi}{2}\right)$，故

$$\cos(z+1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos\left(1+\frac{n\pi}{2}\right)}{n!}z^n.$$

两式一致（n 偶数时 $\cos(1+\frac{n\pi}{2})=(-1)^{n/2}\cos 1$，奇数时 $=-(-1)^{(n-1)/2}\sin 1$）．$R=+\infty$.

(8) $\tan z$，$z_0=\frac{\pi}{4}$．$\tan z$ 的系数没有简单通项，求前几项即可. *解法一（直接法）*：记 $y=\tan z$，$y'=1+y^2$. 逐次求导：

$$y''=2yy'=2y+2y^3,\quad y'''=(2+6y^2)y'=(2+6y^2)(1+y^2),\quad y^{(4)}=y'\big[12y(1+y^2)+2y(2+6y^2)\big].$$

在 $z=\frac{\pi}{4}$ 处 $y=1$：$y'=2$，$y''=4$，$y'''=8\cdot 2=16$，$y^{(4)}=2(24+16)=80$. 于是 $c_0=1$，$c_1=2$，$c_2=\frac{4}{2}=2$，$c_3=\frac{16}{6}=\frac{8}{3}$，$c_4=\frac{80}{24}=\frac{10}{3}$.

解法二（换元 + 除法）：令 $w=z-\frac{\pi}{4}$，$\tan\left(w+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1+\tan w}{1-\tan w}$. 记 $t=\tan w=w+\frac{w^3}{3}+O(w^5)$，则 $\frac{1+t}{1-t}=1+2t+2t^2+2t^3+2t^4+\cdots$，代入 $t^2=w^2+\frac{2}{3}w^4+\cdots$，$t^3=w^3+\cdots$，$t^4=w^4+\cdots$：

$$\begin{aligned}\tan z&=1+2w+2w^2+\left(2+\tfrac{2}{3}\right)w^3+\left(2+\tfrac{4}{3}\right)w^4+\cdots\\&=1+2\left(z-\tfrac{\pi}{4}\right)+2\left(z-\tfrac{\pi}{4}\right)^2+\tfrac{8}{3}\left(z-\tfrac{\pi}{4}\right)^3+\tfrac{10}{3}\left(z-\tfrac{\pi}{4}\right)^4+\cdots.\end{aligned}$$

$\tan z=\frac{\sin z}{\cos z}$ 的奇点为 $\frac{\pi}{2}+k\pi$，离 $\frac{\pi}{4}$ 最近的是 $\frac{\pi}{2}$ 与 $-\frac{\pi}{2}$（后者距离 $\frac{3\pi}{4}$），故 $R=\frac{\pi}{4}$.

方法比较　直接法（求高阶导数）思路最朴素、适用于任何解析函数，但高阶导数越来越繁；间接法（换元、逐项求导/积分、恒等变形）计算短、能写出通项，是考试首选. 两法结果必须一致，可互为检验. 对（2）（6）这类“导数简单、原函数复杂”的函数，“先展开导数再积分”是标准套路.

7.最终答案

(1)	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}(z-1)^n$	$R=2$
(2)	$\ln 3+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\,3^n}z^n$	$R=3$
(3)	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(z+1)^n$	$R=1$
(4)	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{(1-3\mathrm{i})^{n+1}}(z-1-\mathrm{i})^n$	$R=\frac{\sqrt{10}}{3}$
(5)	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{e}}{n!}(z-1)^n$	$R=+\infty$
(6)	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}z^{2n+1}$	$R=1$
(7)	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(1+\frac{n\pi}{2})}{n!}z^n$	$R=+\infty$
(8)	$1+2(z-\frac{\pi}{4})+2(z-\frac{\pi}{4})^2$ $+\frac{8}{3}(z-\frac{\pi}{4})^3+\frac{10}{3}(z-\frac{\pi}{4})^4+\cdots$	$R=\frac{\pi}{4}$

8.结果检验　对（1）—（7）在收敛圆内取点，截断 200–400 项与原函数比较，误差均 $<10^{-15}$；（8）取 $w=0.2+0.1\mathrm{i}$，四阶截断值 $1.4630+0.3173\mathrm{i}$ 与 $\tan(\frac{\pi}{4}+w)=1.4605+0.3193\mathrm{i}$ 相差约 3×10^{-3}，与 $|w|^5$ 量级的截断误差相符.

易错点

（2）（6）逐项积分后**忘加常数** $f(z_0)$：$\ln(3+z)$ 的常数项是 $\ln 3$ 而不是 0. 自检：令 $z=z_0$，级数应等于 $f(z_0)$. （4）收敛半径误写为 $|1-3\mathrm{i}|=\sqrt{10}$，漏除系数 3；最稳妥的自检是“算奇点 $\frac{4}{3}$ 到 z_0 的距离”. （8）容易误以为最近奇点只有 $\frac{\pi}{2}$ 而忽略比较，也有人误把 R 写成 $\frac{\pi}{2}$（那是以 0 为中心时的答案）.

【第 10 题】判断“两展开式相加等于 0”的结论

1.考查知识点　级数等式只在其收敛域内成立；两个级数相加必须在公共收敛域上进行；洛朗级数的收敛域是圆环.

2.已知条件　$\frac{z}{1-z}=\sum_{n\ge1}z^n$；$\frac{z}{z-1}=\sum_{n\ge0}z^{-n}$；两函数之和恒为 0.

3.解题目标　判断结论“$\sum_{n=-\infty}^{\infty}z^n=0$”（即题中双向级数为 0）是否正确.

4.解题思路　分别求出两个展开式成立的范围，看它们是否有公共部分.

6.完整推导　$\frac{z}{1-z}=z\cdot\frac{1}{1-z}=\sum_{n=1}^{\infty}z^n$ 当且仅当 $|z|<1$ 成立（工具1，$u=z$）. $\frac{z}{z-1}=\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n}$ 当且仅当 $\left|\frac{1}{z}\right|<1$，即 $|z|>1$ 成立. 两个区域 $\{|z|<1\}$ 与 $\{|z|>1\}$ 没有公共点. 因此不存在任何 z 使两个等式同时成立，不能把它们相加；事实上双向级数 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}z^n$ 要求正幂部分收敛（$|z|<1$）且负幂部分收敛（$|z|>1$），它在任何点都发散.

7.最终答案

结论错误. 第一个展开只在 $|z|<1$ 内成立，第二个只在 $|z|>1$ 内成立，两者无公共收敛域，不能相加；左边的双向级数处处发散，谈不上等于 0.

易错点

“长除法”只是形式运算，给不出收敛域；每写一个展开式都要随手标注成立范围（这是本章最重要的书写习惯）. 同理，第 11 题每个洛朗展开都依附于特定圆环.

【第 11 题】指定圆环域内的洛朗展开

1.考查知识点　洛朗定理（工具4）；间接法：部分分式 + 几何级数（按 $|u|<1$ 选择展开方向）、代入 $\mathrm{e}^u,\sin u$ 等整函数展开、逐项求导.

2.已知条件　八个函数及其圆环.

3.解题目标　在给定圆环内写出 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$.

4.解题思路（核心判别法）　对每个形如 $\frac{1}{z-a}$ 的因子，比较 $|z-z_0|$ 与 $|a-z_0|$：

在圆环内	写法	结果
$\lvert z-z_0\rvert<\lvert a-z_0\rvert$（奇点在外）	$\dfrac{1}{z-a}=\dfrac{-1}{(a-z_0)\left(1-\frac{z-z_0}{a-z_0}\right)}$	只含正幂
$\lvert z-z_0\rvert>\lvert a-z_0\rvert$（奇点在内）	$\dfrac{1}{z-a}=\dfrac{1}{(z-z_0)\left(1-\frac{a-z_0}{z-z_0}\right)}$	只含负幂

这个“内奇点出负幂、外奇点出正幂”的规则是本题所有小问的主线.

6.完整推导

(1) $\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}$，$1<|z|<2$. 部分分式：设 $\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}=\frac{A}{z-2}+\frac{Bz+C}{z^2+1}$. 令 $z=2$ 得 $A=\frac{1}{5}$. 比较 $1=A(z^2+1)+(Bz+C)(z-2)$ 的系数：z^2：$A+B=0\Rightarrow B=-\frac{1}{5}$；常数：$A-2C=1\Rightarrow C=-\frac{2}{5}$. 故

$$f(z)=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{z-2}-\frac{z+2}{z^2+1}\right].$$

在 $1<|z|<2$ 中：奇点 2 在外（$|z|<2$），$\pm\mathrm{i}$ 在内（$|z|>1$）.

$$\frac{1}{z-2}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}},\qquad \frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^{2n+2}}.$$

于是 $\frac{z+2}{z^2+1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{z^{2n+1}}+\frac{2}{z^{2n+2}}\right)$，得

$$\boxed{\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}=-\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}-\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{z^{2n+1}}+\frac{2}{z^{2n+2}}\right),\quad 1<|z|<2.}$$

前几项：$\cdots-\frac{2}{5z^2}-\frac{1}{5z}-\frac{1}{10}-\frac{z}{20}-\frac{z^2}{40}-\cdots$.

(2) $\frac{1}{z(1-z)^2}$. *(a)* $0<|z|<1$：由第 8(2) 题同法 $\frac{1}{(1-z)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n$ $(|z|<1)$，

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^{n-1}=\sum_{n=-1}^{\infty}(n+2)z^n=\frac{1}{z}+2+3z+4z^2+\cdots.$$

(b) $1<|z-1|<+\infty$：令 $w=z-1$，$(1-z)^2=w^2$，$z=1+w$，且 $|w|>1$ 故 $\left|\frac{1}{w}\right|<1$：

$$\frac{1}{z(1-z)^2}=\frac{1}{w^2(1+w)}=\frac{1}{w^3}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{w}}=\frac{1}{w^3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{w^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+3}}.$$

(3) $z^3\mathrm{e}^{1/z}$，$0<|z|<+\infty$. 在 $\mathrm{e}^u=\sum\frac{u^n}{n!}$ 中令 $u=\frac{1}{z}$（对一切 $z\neq0$ 成立）：

$$z^3\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=z^3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!\,z^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{3-n}}{n!}=z^3+z^2+\frac{z}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{24z}+\frac{1}{120z^2}+\cdots.$$

（这正是 MIT 18.04 2018 春季 Problem Set 6 第 6(a) 题所用的函数，见第三部分.）

(4) $z\,\mathrm{e}^{\frac{z}{z-1}}$，$0<|z-1|<+\infty$. 令 $w=z-1$. 则 $\frac{z}{z-1}=\frac{1+w}{w}=1+\frac{1}{w}$，于是 $\mathrm{e}^{\frac{z}{z-1}}=\mathrm{e}\cdot\mathrm{e}^{1/w}=\mathrm{e}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!\,w^n}$，

$$z\,\mathrm{e}^{\frac{z}{z-1}}=\mathrm{e}(1+w)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{w^{-n}}{n!}=\mathrm{e}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{w^{-n}}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{w^{1-n}}{n!}\right].$$

第二个和中 $n=0$ 项为 w；$n=k+1$ $(k\geq0)$ 项为 $\frac{w^{-k}}{(k+1)!}$. 合并同次幂 w^{-k}：系数 $\frac{1}{k!}+\frac{1}{(k+1)!}=\frac{k+2}{(k+1)!}$. 故

$$z\,\mathrm{e}^{\frac{z}{z-1}}=\mathrm{e}(z-1)+\mathrm{e}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k+2}{(k+1)!}\,\frac{1}{(z-1)^k}=\mathrm{e}\left[(z-1)+2+\frac{3}{2(z-1)}+\frac{2}{3(z-1)^2}+\cdots\right].$$

(5) $\frac{1}{z^2(z-\mathrm{i})}$，**以 i 为中心.** 奇点 i（中心）与 0，$|0-\mathrm{i}|=1$，故有两个圆环：$0<|z-\mathrm{i}|<1$ 与 $1<|z-\mathrm{i}|<+\infty$. 令 $w=z-\mathrm{i}$，$z=w+\mathrm{i}$.

(a) $0<|z-\mathrm{i}|<1$（奇点 0 在外）：$\frac{1}{\mathrm{i}+w}=\frac{1}{\mathrm{i}}\cdot\frac{1}{1+\frac{w}{\mathrm{i}}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nw^n}{\mathrm{i}^{n+1}}$. 由 $\frac{1}{(\mathrm{i}+w)^2}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}\frac{1}{\mathrm{i}+w}$：

$$\frac{1}{z^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n\,w^{n-1}}{\mathrm{i}^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1)w^n}{\mathrm{i}^{n+2}}.$$

利用 $\frac{(-1)^n}{\mathrm{i}^{n+2}}=\frac{(-1)^n}{\mathrm{i}^n\cdot(-1)}=-\left(\frac{-1}{\mathrm{i}}\right)^n=-\mathrm{i}^n$（因 $\frac{-1}{\mathrm{i}}=\mathrm{i}$），得 $\frac{1}{z^2}=-\sum(n+1)\mathrm{i}^nw^n$，从而

$$\frac{1}{z^2(z-\mathrm{i})}=-\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)\mathrm{i}^n(z-\mathrm{i})^{n-1}=-\frac{1}{z-\mathrm{i}}-2\mathrm{i}+3(z-\mathrm{i})+\cdots.$$

(b) $1<|z-\mathrm{i}|<+\infty$（奇点 0 在内）：$\frac{1}{w+\mathrm{i}}=\frac{1}{w}\cdot\frac{1}{1+\frac{\mathrm{i}}{w}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\mathrm{i})^n}{w^{n+1}}$，求导得 $\frac{1}{(w+\mathrm{i})^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(-\mathrm{i})^n}{w^{n+2}}$，所以

$$\frac{1}{z^2(z-\mathrm{i})}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(-\mathrm{i})^n}{(z-\mathrm{i})^{n+3}}.$$

(6) $\sin\frac{z}{1-z}$，$0<|z-1|<+\infty$. 恒等变形：$\frac{z}{1-z}=\frac{(z-1)+1}{1-z}=-1-\frac{1}{z-1}$. 于是

$$\sin\frac{z}{1-z}=-\sin\left(1+\frac{1}{z-1}\right)=-\sin 1\cos\frac{1}{z-1}-\cos 1\sin\frac{1}{z-1},$$

代入 $\cos u,\sin u$ 的展开（$u=\frac{1}{z-1}$，对一切 $z\neq 1$ 成立）：

$$\sin\frac{z}{1-z}=-\sin 1\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!\,(z-1)^{2n}}-\cos 1\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!\,(z-1)^{2n+1}}.$$

(7) $\frac{1}{(z-2)(z-3)}$，$|z|>3$. $\frac{1}{(z-2)(z-3)}=\frac{1}{z-3}-\frac{1}{z-2}$. 在 $|z|>3$ 中两奇点都在内：$\frac{1}{z-3}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{3}{z}}=\sum\frac{3^n}{z^{n+1}}$，$\frac{1}{z-2}=\sum\frac{2^n}{z^{n+1}}$，故

$$\frac{1}{(z-2)(z-3)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n-2^n}{z^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n-2^n}{z^{n+1}}=\frac{1}{z^2}+\frac{5}{z^3}+\frac{19}{z^4}+\cdots.$$

(8) $\frac{1}{(z-a)(z-b)}$，$|a|<|z|<|b|$（**此时** $|a|<|b|$，$a\neq b$）. $\frac{1}{(z-a)(z-b)}=\frac{1}{a-b}\left(\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right)$. a 在内、b 在外：$\frac{1}{z-a}=\sum\frac{a^n}{z^{n+1}}$，$\frac{1}{z-b}=-\frac{1}{b}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{b}}=-\sum\frac{z^n}{b^{n+1}}$. 故

$$\frac{1}{(z-a)(z-b)}=\frac{1}{a-b}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a^n}{z^{n+1}}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{b^{n+1}}\right].$$

（$a=0$ 时约定 $a^0=1$，结果为 $\frac{1}{-b}\left[\frac{1}{z}+\sum\frac{z^n}{b^{n+1}}\right]$，仍正确.）

▌7.最终答案　见上面各小问的最终表达式（（1）已加框；（2）(a)(b)、（3）—（8）为各段末尾的展开式）.

▌8.结果检验　**数值核验**：对每一小问在其圆环内任取一点（如（1）取 $z=1.5\mathrm{e}^{0.7\mathrm{i}}$，（5b）取 $z=\mathrm{i}+2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}}$），将级数截断到数百项与原函数比较，误差均 $\le 10^{-15}$. **留数核验**：（1）中 $c_{-1}=-\frac{1}{5}$，应等于圆环内奇点 $\pm\mathrm{i}$ 处留数之和：$\frac{1}{2\mathrm{i}(\mathrm{i}-2)}+\frac{1}{-2\mathrm{i}(-\mathrm{i}-2)}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\cdot\frac{2\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2-4}=-\frac{1}{5}$ ✓；（5a）中 $c_{-1}=-1=\frac{1}{z^2}\big|_{z=\mathrm{i}}$ ✓.

易错点

（1）把 $\frac{1}{z^2+1}$ 按正幂展开（$\sum(-1)^n z^{2n}$）是最常见错误——它只在 $|z|<1$ 成立，而圆环要求 $|z|>1$. 自检：*每一个几何级数的公比的模必须在整个圆环内小于 1*. （5）i 的幂次最容易算错，务必用 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$、$\mathrm{i}^2=-1$ 逐步化简，最后用 c_{-1} = 留数检查. （4）（6）先把指数/正弦的自变量拆成“常数 + $\frac{1}{z-z_0}$”，不能对 $\frac{z}{z-1}$ 整体直接代入（那样得到的不是 $z-1$ 的幂级数）.

【第 12 题】确定洛朗级数的收敛圆环并求和函数

▌1.考查知识点　洛朗级数 = 正幂部分（解析部分）+ 负幂部分（主要部分）；收敛域为两部分收敛域的交；几何级数求和.

▌2.已知条件　$S(z)=\sum_{n\ge 1}2(-1)^n z^{-2n}-\sum_{n\ge 0}2^{-(n+1)}z^n$.

▌3.解题目标　求收敛圆环与和函数.

▌4.解题思路　分别把两部分看成几何级数，求各自收敛条件与和，再取交集、相加. 本题正是第 11(1) 题的“逆问题”.

6.完整推导　负幂部分：$\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(-\frac{1}{z^2}\right)^n$，公比 $u=-\frac{1}{z^2}$，收敛 $\Longleftrightarrow$ $|z|>1$，和为

$$2\cdot\frac{u}{1-u}=2\cdot\frac{-1/z^2}{1+1/z^2}=-\frac{2}{z^2+1}.$$

正幂部分：$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{z}{2}\right)^n$，公比 $\frac{z}{2}$，收敛 $\Longleftrightarrow$ $|z|<2$，和为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{z}{2}}=\frac{1}{2-z}$. 两部分同时收敛 $\Longleftrightarrow$ $1<|z|<2$；在该圆环内

$$S(z)=-\frac{2}{z^2+1}-\frac{1}{2-z}=\frac{1}{z-2}-\frac{2}{z^2+1}=\frac{z^2-2z+5}{(z^2+1)(z-2)}.$$

（通分：$(z^2+1)-2(z-2)=z^2-2z+5$.）

7.最终答案

> 收敛圆环 $1<|z|<2$；和函数 $S(z)=\dfrac{1}{z-2}-\dfrac{2}{z^2+1}=\dfrac{z^2-2z+5}{(z^2+1)(z-2)}$.

8.结果检验　圆环的内外半径分别等于和函数奇点 $\pm\mathrm{i}$ 与 2 的模，符合洛朗定理；在 $z=1.5\mathrm{e}^{\mathrm{i}}$ 处数值比较，误差 10^{-16} 量级.

易错点

负幂部分从 $n=1$ 开始，求和公式是 $\frac{u}{1-u}$ 而不是 $\frac{1}{1-u}$. 自检：$z\to\infty$ 时负幂部分应 $\to 0$，而 $-\frac{2}{z^2+1}\to 0$ √.

【第 13 题】利用 c_{-1} 计算积分

1.考查知识点　$\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$，其中 c_{-1} *必须取自包含积分路径 C 的那个圆环*内的洛朗展开（工具4）.

2.已知条件　四个闭路积分.

3.解题目标　求积分值.

4.解题思路　第一步：找奇点，确定积分圆周落在哪个“以圆心为中心、函数在其中解析”的圆环里；第二步：只需求该圆环内展开式中 $\frac{1}{z-z_0}$ 的系数，不必写出全部展开；第三步：乘 $2\pi\mathrm{i}$.

5.公式与定理　由洛朗系数公式 $c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$ 取 $n=-1$ 得. 条件：C 是该圆环内绕中心一周的正向简单闭曲线.

6.完整推导

(1)　$f=\frac{1+2z}{z^2(1+z)}$，奇点 $0,-1$，均在 $|z|<2$ 内；圆周 $|z|=2$ 位于圆环 $1<|z|<+\infty$ 中. 在此圆环内 $\left|\frac{1}{z}\right|<1$:

$$f(z)=\frac{1+2z}{z^3}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z}}=\left(\frac{1}{z^3}+\frac{2}{z^2}\right)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{z^n}=\frac{2}{z^2}-\frac{1}{z^3}+\cdots,$$

最高次幂为 z^{-2}，故 $c_{-1}=0$，$\oint_{|z|=2} f\,\mathrm{d}z=0$.

(2) $f=\frac{z+2}{z(z+1)}$，奇点 $0,-1$；$|z|=3$ 在 $1<|z|<+\infty$ 内：

$$f(z)=\frac{z+2}{z^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{z}}=\left(\frac{1}{z}+\frac{2}{z^2}\right)\left(1-\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}-\cdots\right)=\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}-\cdots,$$

$c_{-1}=1$，积分 $=2\pi\mathrm{i}$.

(3) $f=\frac{1}{z(z+1)(z+4)}$，奇点 $0,-1,-4$；$|z|=3$ 位于 $1<|z|<4$ 内. 部分分式（覆盖法）：

$$f=\frac{1/4}{z}+\frac{-1/3}{z+1}+\frac{1/12}{z+4}.$$

在 $1<|z|<4$ 中：$\frac{1}{z+1}=\frac{1}{z}\sum\frac{(-1)^n}{z^n}$ 贡献 $\frac{1}{z}$ 的系数 1；$\frac{1}{z+4}=\frac{1}{4}\sum\left(-\frac{z}{4}\right)^n$ 只有正幂，贡献 0. 所以 $c_{-1}=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{12}$，积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{1}{12}\right)=-\frac{\pi\mathrm{i}}{6}$.

(4) $f=\sin\frac{1}{1-z}$，唯一奇点 $z=1$（本性奇点），$|z-1|=3$ 位于 $0<|z-1|<+\infty$ 内：

$$\sin\frac{1}{1-z}=-\sin\frac{1}{z-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!\,(z-1)^{2n+1}}=-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{6(z-1)^3}-\cdots,$$

$c_{-1}=-1$，积分 $=-2\pi\mathrm{i}$.

7.最终答案

（1）0；　（2）$2\pi\mathrm{i}$；　（3）$-\dfrac{\pi\mathrm{i}}{6}$；　（4）$-2\pi\mathrm{i}$.

8.结果检验（一题多解：留数定理）

（1）$\mathrm{Res}_{z=0}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{1+2z}{1+z}\right|_0=\left.\frac{1}{(1+z)^2}\right|_0=1$，$\mathrm{Res}_{z=-1}=\left.\frac{1+2z}{z^2}\right|_{-1}=-1$，和为 0 √.　（2）$\mathrm{Res}_0=2$，$\mathrm{Res}_{-1}=-1$，和为 1 √.　（3）$\mathrm{Res}_0=\frac{1}{4}$，$\mathrm{Res}_{-1}=-\frac{1}{3}$，和 $-\frac{1}{12}$ √.　（4）即 c_{-1} 本身. 另用数值积分（圆周 6000 等分梯形公式）得到 0、$6.28319\mathrm{i}$、$-0.52360\mathrm{i}$、$-6.28319\mathrm{i}$，全部一致.

方法比较

“在大圆环内展开取 c_{-1}”一次性处理了圆内所有奇点，对奇点多或有本性奇点（第（4）题）时尤其方便；留数定理逐点计算，思路局部化. 二者本质相同：大圆环内的 c_{-1} = 圆内全部留数之和. 对（1）而言，大圆环法还揭示了一个一般规律：若 $f=\frac{P}{Q}$ 且 $\deg Q\geq\deg P+2$，则大圆环展开从 z^{-2} 开始，积分必为 0.


易错点

最常见的错误是**用错圆环**：例如（3）若在 $0<|z|<1$ 内展开，得到的 $c_{-1}=\frac{1}{4}$ 只是 $z=0$ 处的留数，漏掉了圆内的奇点 -1，结果变成 $\frac{\pi\mathrm{i}}{2}$. 判断规则：*积分路径在哪个圆环里，就用哪个圆环的展开*. 自检：用留数定理快速重算.

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

第一章　本次作业知识体系总览

这 13 道题放在一起，本质上训练的是一件事：**用“奇点的位置”控制“级数在哪里成立”**. 数列与级数的收敛（第 2、3 题）是地基；阿贝尔定理与收敛半径（第 1、4、5、6、7 题）给出幂级数收敛域的几何形状——圆；泰勒定理（第 8、9 题）把解析函数写成圆内的幂级数；洛朗定理（第 1(5)、10、11、12 题）把圆推广为圆环；最后，第 13 题把洛朗系数 c_{-1} 变成计算积分的工具，直接通向下一章的留数定理.



知识点	核心概念	典型公式 / 定理	对应题号	常见用途
复数列与复级数	实虚部分离；必要条件；绝对收敛	$z_n \to a \iff x_n \to \mathrm{Re}\,a,\ y_n \to \mathrm{Im}\,a$	2、3	判敛、求极限
阿贝尔定理	圆内绝对收敛，圆外发散	$\frac{1}{R} = \overline{\lim}\ \sqrt[n]{\lvert c_n\rvert}$	4、5、6	确定收敛域
泰勒展开	解析 $\iff$ 可展成幂级数	$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$，$R = d(z_0, \text{奇点})$	1、7、8、9	近似、求导数、求极限
洛朗展开	圆环内唯一展开	$c_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint \frac{f}{(\zeta - z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta$	1(5)、10、11、12	奇点分类、留数
c_{-1} 求积分	路径所在圆环	$\oint_C f\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$	13	闭路积分

第二章　题目分类与重点题深度回顾

题目分类

类别	题号	入选理由
A 类：重点核心题	9(4)、11(1)、13	分别代表“一般中心的泰勒展开 + 半径”“部分分式型洛朗展开”“c_{-1} 求积分”三大母题
B 类：典型基础题	2、 8、 9(1) (3) (5) (7)、11(3)(7)	巩固标准展开式与代换技巧
C 类：易错题	1(2) (4) (5)、 3(1) (2)、 4、 9(2) (6)、10、11(5)、13(3)	计算不难，但概念、边界、常数、圆环选择极易出错
D 类：综合题	5、 6、 7、 12、 9(8)、11(4)(6)	需要联合使用阿贝尔定理、奇点分析、恒等变形或多种方法

重点题一：第 9(4) 题——一般中心的泰勒展开

为什么重要. 教材多数例题以 0 为中心，而控制、信号中的展开点往往不是 0；本题训练“换元—凑几何级数—读出半径”的完整流程，是后续一切洛朗展开的原子操作. **训练的能力.** 代数变形能力（把 $4-3z$ 改写为 $(1-3\mathrm{i})-3w$）；条件识别能力（由 $|u|<1$ 反推圆盘）；自检能力（半径与奇点距离互验）. **母题结构.** 求 $\dfrac{1}{\alpha-\beta z}$ 在 z_0 处的展开（$\beta\neq 0$，$\alpha\neq\beta z_0$）：

$$\frac{1}{\alpha-\beta z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\beta^n}{(\alpha-\beta z_0)^{n+1}}(z-z_0)^n,\qquad R=\frac{|\alpha-\beta z_0|}{|\beta|}=\left|\frac{\alpha}{\beta}-z_0\right|.$$

换数字、换中心，都只是这个公式的实例. **识别信号.** 分母是一次式（或能部分分式化为一次式之和），且题目给出非零展开中心.

重点题二：第 11(1) 题——部分分式型洛朗展开

为什么重要. 有理函数的洛朗展开是期中、期末最稳定的考点之一（第三部分第十章所列剑桥 2019 年真题与本题几乎同构），也是 Z 变换反变换的数学原型. **训练的能力.** 部分分式分解；对每个因子判断奇点在圆环“内”或“外”；把二次因子 $\frac{1}{z^2+1}$ 当作 $u=-\frac{1}{z^2}$ 的几何级数. **母题结构.** $f=\sum_k \frac{A_k}{z-a_k}$（或含不可约二次因子），圆环 $r<|z|<\rho$ 将奇点分为内外两组：内组展负幂，外组展正幂. **识别信号.** 有理函数 + 给定圆环（或“以某点为中心的圆环域内”）.

重点题三：第 13 题——用 c_{-1} 计算积分

为什么重要. 这是从“级数”走向“积分计算”的桥梁，下一章留数定理只是把它局部化. **训练的能力.** 判断积分路径所在圆环；只提取需要的一个系数（不必写出全部展开）；用留数或数值积分交叉验证. **母题结构.** $\oint_{|z-z_0|=r} f\,\mathrm{d}z$，$f$ 在 r 所在的圆环 $R_1<|z-z_0|<R_2$ 中解析 $\Rightarrow$ 答案 $=2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$. **识别信号.** “利用洛朗系数”“闭路积分且圆内有多个奇点或本性奇点”.

第三章　重点题举一反三（含完整解答）

变式 1-1（基础迁移，对应原作业第 9(4) 题）

题目. 将 $\dfrac{1}{3-2z}$ 在 $z_0=\mathrm{i}$ 处展开成泰勒级数，并求收敛半径. **改变了什么.** 系数与中心改变，结构不变，检验母题公式能否直接迁移. **解.** 令 $w=z-\mathrm{i}$，$3-2z=(3-2\mathrm{i})-2w$，

$$\frac{1}{3-2z}=\frac{1}{3-2\mathrm{i}}\cdot\frac{1}{1-\frac{2w}{3-2\mathrm{i}}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{(3-2\mathrm{i})^{n+1}}(z-\mathrm{i})^n,\qquad |z-\mathrm{i}|<\frac{|3-2\mathrm{i}|}{2}=\frac{\sqrt{13}}{2}.$$

检验. 奇点 $\frac{3}{2}$ 到 i 的距离 $\sqrt{\frac{9}{4}+1}=\frac{\sqrt{13}}{2}$ ✓；数值核验误差 3×10^{-17}.

变式 1-2（条件变化：反求中心）

题目. 已知 $\dfrac{1}{1-z}$ 在实轴上某点 $z_0=x_0$ 处的泰勒展开收敛半径为 2，求 x_0；若 z_0 可以是任意复数，z_0 的轨迹是什么？ **改变了什么.** 正问题（给中心求半径）变为反问题（给半径求中心），检验是否真正理解“R = 到奇点距离”. **解.** 唯一奇点是 $z=1$，$R=|z_0-1|$. 由 $|x_0-1|=2$ 得 $x_0=3$ 或 $x_0=-1$. 一般地，z_0 的轨迹是圆周 $|z_0-1|=2$. **为什么原方法仍可用.** 半径只依赖于中心与奇点的距离，与函数的具体形式无关，故可逆向使用.

变式 1-3（综合提升：逐项求导 + 一般中心）

题目. 将 $\dfrac{1}{z^2}$ 在 $z_0=1+\mathrm{i}$ 处展开成泰勒级数，并求收敛半径. **改变了什么.** 把第 9(3) 题（逐项求导）与第 9(4) 题（一般中心）结合. **解.** 先展开 $\frac{1}{z}=\frac{1}{z_0+(z-z_0)}=\frac{1}{z_0}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-z_0}{z_0}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-z_0)^n}{z_0^{n+1}}$（$|z-z_0|<|z_0|=\sqrt{2}$）. 由 $\frac{1}{z^2}=-\left(\frac{1}{z}\right)'$，逐项求导：

$$\frac{1}{z^2}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n(z-z_0)^{n-1}}{z_0^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n+1)}{(1+\mathrm{i})^{n+2}}(z-1-\mathrm{i})^n,\qquad R=\sqrt{2}.$$

检验. $n=0$ 项 $\frac{1}{(1+\mathrm{i})^2}=\frac{1}{2\mathrm{i}}=\frac{1}{z_0^2}$ ✓；数值核验误差 3×10^{-17}.

变式 2-1（基础迁移，对应原作业第 11(1) 题）

题目. 求 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+4)(z-1)}$ 在 $1<|z|<2$ 内的洛朗展开. **改变了什么.** 内外奇点互换：原题二次因子的奇点 $\pm\mathrm{i}$ 在内、一次因子的奇点在外；本题 1 在内、$\pm2\mathrm{i}$ 在外. **解.** 部分分式：$A=\frac{1}{1+4}=\frac{1}{5}$；由 $1=\frac{1}{5}(z^2+4)+(Bz+C)(z-1)$ 比较 z^2 与常数项：$B=-\frac{1}{5}$，$\frac{4}{5}-C=1\Rightarrow C=-\frac{1}{5}$. 故 $f=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{z-1}-\frac{z+1}{z^2+4}\right]$. 1 在内：$\frac{1}{z-1}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-1}$；$\pm2\mathrm{i}$ 在外：$\frac{1}{z^2+4}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\frac{z^2}{4}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{4^{n+1}}$. 所以

$$f(z)=\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}}-\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\left(z^{2n+1}+z^{2n}\right)}{4^{n+1}},\qquad 1<|z|<2.$$

检验. 数值核验误差 10^{-16}；$c_{-1}=\frac{1}{5}=\operatorname{Res}_{z=1}f$ ✓（圆环内只有奇点 1）.

变式 2-2（条件变化：同一函数换圆环）

题目. 求原作业第 11(1) 题的函数 $\dfrac{1}{(z^2+1)(z-2)}$ 在 $2<|z|<+\infty$ 内的洛朗展开，并据此求 $\displaystyle\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z-2)}$. **解.** 三个奇点都在内，全部展负幂：$\frac{1}{z-2}=\sum\frac{2^n}{z^{n+1}}$，$\frac{z+2}{z^2+1}$ 同原题. 故

$$f(z)=\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}}-\frac{1}{5}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{z^{2n+1}}+\frac{2}{z^{2n+2}}\right),\qquad |z|>2.$$

$c_{-1}=\frac{1}{5}\cdot 1-\frac{1}{5}\cdot 1=0$，所以积分 $=0$. **为什么必须换方法.** 原题中 $\frac{1}{z-2}$ 展正幂，这里 $|z|>2$，公比 $\frac{z}{2}$ 的模大于 1，必须改为公比 $\frac{2}{z}$. 这正说明“展开依附于圆环”. **检验.** $\deg Q-\deg P=3\geq 2$，与第 13(1) 题总结的规律一致.

变式 3-1（综合提升：本性奇点 + c_{-1}，对应原作业第 11(3)、13 题）

题目. 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2}z^2\mathrm{e}^{1/z}\,\mathrm{d}z$. **解.** 唯一奇点 $z=0$ 为本性奇点，圆周在 $0<|z|<+\infty$ 内. $z^2\mathrm{e}^{1/z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{2-n}}{n!}$，$z^{-1}$ 对应 $n=3$，$c_{-1}=\frac{1}{3!}=\frac{1}{6}$. 积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{6}=\frac{\pi\mathrm{i}}{3}$. **检验.** 数值积分得 $1.047198\mathrm{i}=\frac{\pi}{3}\mathrm{i}$ √. 对比第 11(3) 题 $z^3\mathrm{e}^{1/z}$ 的 $c_{-1}=\frac{1}{4!}$：幂次降一，n 降一，规律一目了然.

第四章　易错题专题：错误机制分析

易错 1：收敛圆周上的敛散性（原作业第 1(2) 题）

错误来源. 思维定势：把“收敛半径为 R”误解为“$|z|\leq R$ 收敛”.

错误示范

“$\sum z^n$ 收敛半径为 1，所以在 $|z|\leq 1$ 上收敛，特别地 $1+1+1+\cdots$ 收敛.”

为什么错. 阿贝尔定理只保证开圆内绝对收敛、圆外发散；圆周上既可能全收敛、也可能全发散、也可能部分收敛. **正确方法.** 圆周上的点单独检验：先看通项是否 $\to 0$，再用比较、莱布尼茨、狄利克雷等判别法. **快速自检.** 在圆周上取一两个特殊点（$z=\pm R$）代入试算.

易错 2：连续 $\neq$ 解析（原作业第 1(4) 题）

错误来源. 把实分析中“光滑”的直觉搬到复变函数，甚至混淆“连续”与“可导”. **为什么错.** 能展成幂级数 $\Rightarrow$ 在圆内无穷次可导 $\Rightarrow$ 解析. 连续函数（如 $\bar{z}$）连一阶复导数都没有. **快速自检.** 验证柯西—黎曼方程；含 $\bar{z}$、$|z|$、$\mathrm{Re}\,z$ 的函数通常不解析.

易错 3：复级数只看一半（原作业第 3(1) 题）

错误示范

“虚部 $\sum\frac{3}{n^2}$ 收敛，所以级数收敛.”

为什么错. 复级数收敛要求实部、虚部*同时*收敛；实部通项 $\to \mathrm{e}\neq 0$ 已经决定发散. **快速自检.** 先算通项极限；$\lim z_n\neq 0$ 立即判发散.

易错 4：逐项积分忘记常数（原作业第 9(2)(6) 题）

错误示范

“$\ln(3+z)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n3^n}z^n$.”

为什么错. $\int_0^z f'(\zeta)\mathrm{d}\zeta=f(z)-f(0)$，所以必须加回 $f(0)=\ln 3$. **快速自检.** 令 $z=z_0$ 代入，两边应相等.

易错 5：用错圆环（原作业第 10、13(3) 题）

错误示范

第 13(3) 题：“在 $0<|z|<1$ 内展开，$c_{-1}=\frac{1}{4}$，积分 $=\frac{\pi\mathrm{i}}{2}$.”

为什么错. 积分圆周 $|z|=3$ 不在 $0<|z|<1$ 中；该圆环的 c_{-1} 只是 $z=0$ 处留数，漏掉 $z=-1$. **正确方法.** 先画出奇点，确定路径所在圆环，再展开. **快速自检.** 大圆环的 c_{-1} 应等于路径内所有留数之和.

易错 6：阿贝尔定理中心搞错（原作业第 4 题）

错误来源. 用 $|z|$ 而非 $|z-z_0|$ 比较距离. **自检.** 先把中心写出来：$\sum a_n(z+2)^n$ 的中心是 -2.

第五章　易错题举一反三

易错变式 E1（针对易错 5 与第 10 题）

题目. 判断：$\sum_{n=-\infty}^{\infty} z^n$ 在何处收敛？ **最易出现的错误.** 用“$\frac{1}{1-z}$ 展开 + $\frac{1/z}{1-1/z}$ 展开”相加，得出“和为 0”或“和为 $\frac{1}{1-z}+\frac{1}{z-1}$”. **正确解法.** 正幂部分 $\sum_{n\ge 0}z^n$ 需 $|z|<1$；负幂部分 $\sum_{n\ge 1}z^{-n}$ 需 $|z|>1$；二者交集为空. **答案.** 处处发散. **判断原则：** 双向级数的收敛域是“正幂圆盘”与“负幂圆外”之交，可能为空.

易错变式 E2（针对易错 5）

题目. 计算 $\oint_{|z|=\frac{1}{2}}\dfrac{1+2z}{z^2+z^3}\mathrm{d}z$，并与原作业第 13(1) 题比较. **最易出现的错误.** 照搬第 13(1) 题的大圆环展开，得 0. **正确解法.** 路径 $|z|=\frac{1}{2}$ 在 $0<|z|<1$ 中：$f=\frac{1+2z}{z^2}\sum(-1)^n z^n=\left(\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z}\right)(1-z+z^2-\cdots)$，$z^{-1}$ 的系数为 $-1+2=1$. **答案.** $2\pi\mathrm{i}$（数值积分验证 √）. **判断原则：** 路径变了，圆环就变了，c_{-1} 也跟着变.

易错变式 E3（针对易错 6）

题目. 幂级数 $\sum a_n(z-1)^n$ 能否（a）在 $z=1+2\mathrm{i}$ 收敛而在 $z=2$ 发散？（b）在 $z=2$ 收敛而在 $z=1+2\mathrm{i}$ 发散？ **最易出现的错误.** 比较 $|1+2\mathrm{i}|=\sqrt{5}$ 与 $|2|=2$. **正确解法.** 到中心 1 的距离：$|2\mathrm{i}|=2$，$|1|=1$.（a）在距离 2 处收敛 $\Rightarrow$ 距离 1 处必收敛，故**不能**；（b）**可以**，例如 $a_n=(2/3)^n$，$R=\frac{3}{2}$. **判断原则：** 阿贝尔定理比较的是到中心的距离.

易错变式 E4（针对易错 3）

题目. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{\mathrm{i}}{n}\right)^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{(-1)^n}{n}+\dfrac{\mathrm{i}}{n^2}\right]$ 的收敛性与绝对收敛性. **最易出现的错误.** 第一个：因 $\frac{\mathrm{i}}{n}\to 0$ 而以为通项趋于 0；第二个：因 $|z_n|\sim\frac{1}{n}$ 发散就判为发散. **正确解法.** 第一个：$\left(1+\frac{\mathrm{i}}{n}\right)^n\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}}$，$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}}|=1\neq 0$，**发散**. 第二个：实部 $\sum\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛（莱布尼茨），虚部 $\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，故收敛；$|z_n|=\sqrt{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n^4}}\geq\frac{1}{n}$，$\sum|z_n|$ 发散，故**条件收敛**. **判断原则：** 先查通项极限（必要条件），再查模（充分条件），最后拆实虚部.

易错变式 E5（针对易错 4）

题目. 将 $\ln(2-z)$（主值）在 $z_0=0$ 展开并求 R. **最易出现的错误.** 漏掉常数 $\ln 2$，或符号错为 $+\sum$. **正确解法.** $[\ln(2-z)]'=-\frac{1}{2-z}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}$，积分并加 $\ln 2$：$\ln(2-z)=\ln 2-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n\,2^n}$，$R=2$. **判断原则：** 积分后令 $z=z_0$ 自检常数项；导数的负号要保留.

易错变式 E6（针对易错 2）

题目. $f(z)=|z|^2$ 在 $z=0$ 处可导吗？能在 $z=0$ 的某邻域内展成泰勒级数吗？ **正确解法.** $u=x^2+y^2$，$v=0$，柯西—黎曼方程 $2x=0$，$2y=0$ 只在原点成立，故 f 仅在 $z=0$ 可导，但在 0 的任何邻域内都不解析，**不能**展开. **判断原则：** “在一点可导”≠“在该点解析”；能展开需要在一个邻域内处处可导.

高频易错点提醒（清单）

1. 每写一个展开式，立即标注成立范围（圆盘或圆环）.
2. 几何级数的公比模在整个区域内必须小于 1——这是选择“正幂”还是“负幂”的唯一依据.
3. 收敛半径 = 中心到*最近*奇点（含支点）的距离；中心不一定是原点.
4. 逐项积分补常数，逐项求导注意起始下标从 $n=0$ 变为 $n=1$.
5. i 的幂次：$\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^{4k}=1$，写完用 $n=0,1$ 两项代值核对.
6. c_{-1} 必须来自包含积分路径的圆环；可用留数定理复核.

第六章　核心知识系统回顾

知识点一：幂级数与收敛半径

是什么. 形如 $\sum c_n(z-z_0)^n$ 的级数. 其收敛点集总是“一个开圆盘 + 圆周上的部分点”. **解决什么.** 用最简单的运算（加法、乘法）表示和逼近复杂函数，并确定表示在哪里有效. **核心公式.** $\frac{1}{R}=\overline{\lim}\sqrt[n]{|c_n|}$（柯西—阿达马）；比值形式 $R=\lim\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|$（极限存在时）. **为什么成立.** 与几何级数比较：若 $|z-z_0|<R$，取 q 使 $\overline{\lim}\sqrt[n]{|c_n|}\,|z-z_0|<q<1$，则 n 充分大时 $|c_n(z-z_0)^n|<q^n$，由比较判别法绝对收敛；若 $|z-z_0|>R$，则有无穷多项 $|c_n(z-z_0)^n|>1$，通项不趋于 0，发散. **使用条件.** 比值公式要求比值极限存在；缺项级数（如 $\sum z^{3n}$）不能直接对“c_{n+1}/c_n”用比值公式，应把 z^3 看作整体或用根值公式. **联系.** 阿贝尔定理是它的几何表述；实数项级数的比值、根值判别法是其来源. **常见题型.** 求 R；判断圆周上敛散；由系数关系比较半径（第 5 题）. **易混淆.** “收敛半径”与“收敛域”；“圆内收敛”与“圆内绝对收敛”（后者更强，第 6 题靠它）.

知识点二：泰勒定理

是什么. f 在 $|z-z_0|<R$ 内解析，则 $f(z)=\sum \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n$ 在整个圆内成立. **为什么成立.** 柯西积分公式 $f(z)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$ 中，把 $\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{(\zeta-z_0)\left(1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}\right)}$ 展成几何级数并逐项积分即得. 所以泰勒定理本质上是“柯西积分公式 + 几何级数”. **使用条件.** 需要解析（不是连续，也不只是可导于一点）. **与实分析的区别.** 实函数无穷次可导也未必能展成收敛于自身的泰勒级数（经典例子 e^{-1/x^2}）；复函数“一次可导于区域”就能展开——这是复分析最深刻的特征之一. **易混淆.** “收敛半径 = 最近奇点距离”中的奇点包括复平面上不在实轴的奇点（第 7 题）和对数、反正切的支点（第 9(2)(6) 题）.

知识点三：洛朗定理

是什么. f 在圆环 $R_1<|z-z_0|<R_2$ 内解析，则 $f=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$，唯一. **为什么成立.** 对圆环用双边柯西积分公式：外圆上的积分按正幂展开（同泰勒），内圆上的积分把 $\frac{1}{\zeta-z}=-\frac{1}{(z-z_0)\left(1-\frac{\zeta-z_0}{z-z_0}\right)}$ 按负幂展开. **使用条件.** 只在给定圆环内成立；圆环的边界圆必经过奇点（或为 0、∞）. **联系.** 泰勒展开是 $R_1=0$ 且无负幂的特例；c_{-1} 即留数；负幂部分的项数决定孤立奇点类型（可去、极点、本性）——下一章内容. **易混淆.** 洛朗展开“唯一”指同一圆环；同一函数不同圆环有不同展开（第 1(5)、11(2)(5) 题）.

相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
收敛 vs 绝对收敛	绝对收敛要求 $\sum\|z_n\|$ 收敛，更强	由 $\sum\|z_n\|$ 发散推出 $\sum z_n$ 发散	模发散时拆实虚部再判（第 3(2) 题）
收敛圆内 vs 收敛圆上	圆内必绝对收敛；圆上不定	以为 $\|z\|\le R$ 都收敛	圆周点单独检验
连续 vs 可导 vs 解析	解析 = 在邻域内处处可导	连续即可展开；一点可导即解析	C-R 方程 + 邻域
泰勒 vs 洛朗展开	圆盘 vs 圆环；洛朗含负幂	在含奇点的区域用泰勒	看区域是否包含奇点
c_{-1} vs 留数	留数是去心邻域内的 c_{-1}；大圆环的 c_{-1} = 圆内留数和	混用不同圆环的 c_{-1}	路径所在圆环

知识迁移：这些知识以后在哪里出现

- **本课程下一章**：孤立奇点分类与留数定理（第 13 题即其雏形）；利用留数计算实积分.
- **积分变换**（本教材第二部分）：拉普拉斯变换 $F(s)$ 的反变换可用留数计算；收敛域为半平面.
- **信号与系统、数字信号处理、计算机控制**：Z 变换 $X(z)=\sum x[n]z^{-n}$ 就是洛朗级数，其收敛域（ROC）是圆环（见第九章示例）.
- **自动控制原理**：传递函数在 $s=0$ 附近的泰勒展开给出稳态误差系数；零极点位置决定展开的收敛范围.
- **数值分析**：函数在复平面上的奇点位置决定多项式逼近、泰勒近似的收敛速度.

第七章　学科科普：复级数在研究什么


1. 这个领域研究什么? 复变函数论研究复变量的可导函数（解析函数）. 这类函数有惊人的“刚性”：只要在一个小圆盘上知道它，就能通过幂级数在更大区域内确定它（解析延拓）. 复级数正是描述这种刚性的语言.

2. 它解决什么问题? （i）*表示*：把 e^z, $\tan z$ 等函数写成多项式的极限；（ii）*计算*：用 c_{-1} 计算闭路积分，进而计算许多实积分；（iii）*解释*：说明实函数展开式为何在某处突然失效（第 7 题）.

3. 为什么本科要学? 它是“柯西积分公式”与“留数定理”之间的必经之路，也是电类、控制类后续课程（信号与系统、自动控制原理、数字信号处理）中 Z 变换、拉普拉斯变换的数学根基.

4. 理论与现实的关系. 数字滤波器的设计与分析依赖 Z 变换的收敛域；电路与控制中的频率响应是把传递函数限制在虚轴（或单位圆）上；算法分析中，生成函数的收敛半径直接给出计数序列的指数增长率.

5. 本次作业的位置.



6. 进一步会学到什么? 解析延拓与黎曼 ζ 函数、渐近展开、特殊函数的级数表示；在工程方向则是 Z 变换、系统稳定性判据与滤波器设计.

第八章　相关数学史

从泰勒到洛朗：级数思想的形成（均为有文献支持的事实）


- **1715 年，泰勒（Brook Taylor）**在《Methodus Incrementorum Directa et Inversa》中给出了今天以他命名的展开定理；其重要性直到 1772 年才被拉格朗日强调，称之为“微分学的主要基础”.
- **1821 年，柯西（A.-L. Cauchy）**在《分析教程》（*Cours d'analyse*）中给出了收敛半径的公式，但此结果长期不为人知.
- **1826 年，阿贝尔（N. H. Abel）**在《克雷勒杂志》（J. Reine Angew. Math.）第 1 卷发表关于二项式级数的研究，其中包含今天所称的阿贝尔定理，推动了级数收敛性的严格化.
- **1825–1826 年，柯西**给出完整形式的复积分定理（1825），并在 1826 年正式定义“留数”.
- **1843 年，洛朗（P. A. Laurent）**公开发表圆环域内双向级数展开定理. **魏尔斯特拉斯（K. Weierstrass）**早在 1841 年的一篇论文中已描述过同一结果，但该文直到 1894 年才发表. 因此“谁先发现”与“谁先发表”应区分表述.
- **1856 年，黎曼**在哥廷根的讲课中已讲授并证明了收敛半径公式（Laugwitz 与 Neuenschwander 1994 年据讲义与学生笔记考证）；**1888 年，阿达马（J. Hadamard）**独立重新发现并发表，1892 年写入其博士论文. 今天称之为“柯西—阿达马公式”.

这段历史与本次作业的关系. 18 世纪的数学家大量使用级数，但常常不问“在哪里成立”，于是出现了第 10 题那种“$\cdots+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z}+1+z+z^2+\cdots=0$”式的悖论. 19 世纪柯西、阿贝尔等人的工作核心，正是给每一个展开式配上“收敛域”. 洛朗的圆环展开则回答了“在奇点附近函

数长什么样”——第 11 题的每个结论都是这一问题的答案，而第 13 题的 c_{-1} 就是柯西 1826 年定义的留数. 我们今天几行的计算，浓缩了从“形式运算”到“严格分析”近一个半世纪的演变.

第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移

课程知识关系图



关联知识表

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题	学习层级
几何级数与收敛域	高等数学	实幂级数收敛区间	前置	复幂级数的实轴限制即实幂级数	7、8	必须掌握
洛朗展开与圆环	信号与系统	Z 变换及其 ROC	应用	$X(z)=\sum x[n]z^{-n}$ 是洛朗级数，ROC 是圆环	11(7)(8)	后续系统学习
部分分式展开	自动控制原理	拉氏/Z 反变换	并行	反变换的标准步骤与第 11 题完全相同	11(1)	建议复习
收敛半径 = 最近奇点	数据结构与算法	生成函数渐近	应用	序列增长率 $=\frac{1}{R}$	1(1)、8	拓展了解
c_{-1} 与闭路积分	复变函数下一章	留数定理	后续	大圆环 c_{-1} = 圆内留数之和	13	必须掌握
阿贝尔定理	数学分析	一致收敛、阿贝尔求和	拓展	边界点处和函数的连续性	3(2)、6	拓展了解

强关联与拓展关联

强关联（不理解就会直接影响本章或后续学习）：高等数学中的几何级数与泰勒公式；本课程的柯西积分公式；下一章留数定理. **拓展关联**（有助于理解工程背景，不属于本章考试范围）：Z 变换、生成函数、数值逼近.

小型示例 1：Z 变换的收敛域就是第 11 题的圆环（信号与系统 / 计算机控制）

背景. 离散序列 $x[n]$ 的 Z 变换定义为 $X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}$，它正是以 0 为中心的洛朗级数，$x[n]$ 就是 z^{-n} 的系数. **所用当前知识.** 第 11(7) 题：$\frac{1}{(z-2)(z-3)}=\sum_{n\geq 1}\frac{3^n-2^n}{z^{n+1}}$（$|z|>3$）. **连接与计算.** 读出 z^{-m} 的系数：$x[m]=3^{m-1}-2^{m-1}$ $(m\geq 1)$，$x[m]=0$ $(m\leq 0)$——这是一个*因果*序列. 若把收敛域换成 $2<|z|<3$，同一个 $X(z)$ 的洛朗展开为

$$X(z)=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{3^{n+1}}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^{n+1}},$$

对应 $x[m]=-2^{m-1}$ $(m\geq 1)$，$x[m]=-3^{m-1}$ $(m\leq 0)$，是一个*双边*序列（数值核验误差 6×10^{-16}）. **结论.** 同一个 $X(z)$，不同 ROC 对应不同序列——这就是第 1(5) 题“不同圆环有不同展开”的工程意义. 系统稳定要求 ROC 包含单位圆 $|z|=1$，上面两种 ROC 都不含单位圆，故对应系统不稳定.

小型示例 2：收敛半径决定增长率（数据结构与算法）

背景. 斐波那契数 $F_0=0,F_1=1,F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ 的生成函数 $G(z)=\sum F_nz^n=\dfrac{z}{1-z-z^2}$. **连接.** 分母零点 $z=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$，离原点最近的是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\frac{1}{\varphi}\approx 0.618$（$\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$）. 由第 1(1) 题的原理，$R=\frac{1}{\varphi}$；再由柯西–阿达马公式 $\overline{\lim}\sqrt[n]{F_n}=\frac{1}{R}=\varphi$. **结论.** F_n 按 $\varphi^n\approx 1.618^n$ 增长——这就是递归实现斐波那契算法时间复杂度为指数级的原因. 只看奇点位置，不用解递推，就能得到增长率.

第十章　国内外高校公开试题典型题专题

来源说明（请先阅读）

本章只收录**能在官方页面直接核验**的公开题目：MIT OpenCourseWare 18.04（2018 春）的习题集与练习题、UC Berkeley Math 185（2015 秋，教师课程主页）期中考试、剑桥大学 Mathematical Tripos Part IB 2019 年试卷. 访问日期均为 2026 年 9 月 24–25 日. 题目按原意**忠实重述**（未整段复制原文），解答均为独立撰写.

关于中国高校：本次检索中找到了北京航空航天大学《复变函数与积分变换》（课程编号 B1A092060）的官方教学大纲，可用于对照国内课程要求；但*未找到可在高校官方渠道核验的中文期中、期末试卷原文*（检索到的多为第三方文库或无法打开的页面）. 依据“宁缺毋滥”原则，本章不把任何题目标注为某中国高校真题；国内考法以官方大纲的要求为依据归纳，另附明确标注的“同型仿真题”. 剑桥 2016 年试题汇总页因服务器限流未能读取，2021 年对应页面不存在，因此剑桥部分只有 2019 年一份.

【高校公开试题 1】MIT：缺项幂级数的收敛半径

- **学校 / 课程：**MIT，18.04 Complex Variables with Applications；**学期：**Spring 2018；**类型：**Problem Set 6，第 2(a) 题
- **来源：**MIT OCW 官方 PDF `mit18_04_s18_pset06.pdf`（官方直接来源）；**对应：**原作业第 8(1) 题；**难度：**基础

题意（重述）. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{3n}}{2^n}$ 的收敛半径. **为什么选.** 与第 8(1) 题同为“缺项”级数，是比值公式最常见的误用场景. **解.** 令 $u=z^3$，级数为 $\sum\left(\frac{u}{2}\right)^n$，收敛 $\iff |u|<2 \iff |z|^3<2 \iff |z|<2^{1/3}$. 故 $R=\sqrt[3]{2}$. **检验.** 用根值公式：非零系数 $c_{3n}=2^{-n}$，$\sqrt[3n]{2^{-n}}=2^{-1/3}$，其他系数为 0，上极限 $=2^{-1/3}$，$R=2^{1/3}$ √（与官方解答一致）.

易错点

若机械地套 $R=\lim|c_n/c_{n+1}|$，会遇到 $c_{n+1}=0$ 而无法计算. 与第 8(1) 题同一机制：缺项时把 z^3 看成整体.

【高校公开试题 2】MIT：由已知半径推新半径

- **来源：**MIT 18.04 Spring 2018，Problem Set 6，第 3 题（官方直接来源）；**对应：**原作业第 5 题；**难度：**中等

题意（重述）. 设 $\sum a_nz^n$ 的收敛半径为 R（$0<R<\infty$）. 求（a）$\sum a_nz^{2n}$，（b）$\sum n^{-n}a_nz^n$ 的收敛半径. **为什么选.** 与第 5 题同属“系数变换后半径如何变”，但要求给出精确值. **解.** （a）$\sum a_n(z^2)^n$ 收敛 $\iff |z^2|<R$（圆内）且发散 $\iff |z^2|>R$，故 $R_a=\sqrt{R}$. （b）$\sqrt[n]{|n^{-n}a_n|}=\frac{\sqrt[n]{|a_n|}}{n}$. 由于 $\overline{\lim}\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{R}$ 有限，除以 $n\to\infty$ 后上极限为 0，故 $R_b=+\infty$. **与本次作业的联系.** 第 5 题只需不等式 $R'\geq R$；本题用同样的柯西—阿达马公式得到精确值. （b）也说明系数乘上一个“迅速衰减的因子”会把半径推向无穷.

易错点

（a）不能答成 R^2：代换 $u=z^2$ 后条件是 $|u|<R$，所以 $|z|<\sqrt{R}$. 自检：取 $a_n=1$（$R=1$），$\sum z^{2n}$ 的半径确实是 $1=\sqrt{1}$；再取 $a_n=4^{-n}$（$R=4$），$\sum(z^2/4)^n$ 的半径为 $2=\sqrt{4}$ √.

【高校公开试题 3】MIT：$z^3e^{1/z}$ 的主要部分与留数

- **来源：**MIT 18.04 Spring 2018，Problem Set 6，第 6(a) 题（官方直接来源）；**对应：**原作业第 11(3) 题（**函数完全相同**）、第 13 题；**难度：**基础

题意（重述）. 写出 $z^3e^{1/z}$ 在其孤立奇点处的主要部分（principal part，即洛朗展开的负幂部分）. **解.** 由第 11(3) 题，$z^3e^{1/z}=\sum_{n\geq 0}\frac{z^{3-n}}{n!}$. 负幂项对应 $n\geq 4$：

$$\text{主要部分}=\sum_{n=4}^{\infty}\frac{z^{3-n}}{n!}=\frac{1}{4!\,z}+\frac{1}{5!\,z^2}+\cdots,\qquad \operatorname*{Res}_{z=0}=\frac{1}{24}.$$

新增角度. 英文课程直接用“principal part”术语，并把它与奇点类型联系：主要部分有无穷多项 $\Rightarrow z=0$ 是本性奇点. **术语对照：**principal part = 主要部分；residue = 留数；essential singularity = 本性奇点.

易错点

把 $z^3+z^2+\frac{z}{2}+\frac{1}{6}$ 也算进主要部分是常见误解——主要部分只包括负幂项. （MIT 官方解答把前几项一并写出以展示完整展开，阅读时应注意区分.）

【高校公开试题 4】MIT：同一函数的三种展开

- **来源：**MIT 18.04 Spring 2018，Problem Set 6，第 8 题（官方直接来源）；**对应：**原作业第 1(5)、11(2)(5) 题；**难度：**中等

题意（重述）. 求 $f(z)=\dfrac{1}{4-z^2}$ 关于 $z_0=1$ 的三种级数展开：在 $|z-1|<1$ 内的泰勒级数，在 $1<|z-1|<3$ 内的洛朗级数，以及在 $|z-1|>3$ 内的洛朗级数. **题型识别.** “关于某点、多个区域”⇒ 先求奇点到中心的距离（±2 到 1 的距离为 1 和 3），再部分分式. **解.** $\frac{1}{4-z^2}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2-z}+\frac{1}{2+z}\right)$. 令 $w=z-1$：$2-z=1-w$，$2+z=3+w$.

- $|w|<1$：$\dfrac{1}{1-w}=\sum w^n$，$\dfrac{1}{3+w}=\sum\dfrac{(-1)^n w^n}{3^{n+1}}$，得 $f=\dfrac{1}{4}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left[1+\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}\right](z-1)^n$.
- $1<|w|<3$：$\dfrac{1}{1-w}=-\sum\dfrac{1}{w^{n+1}}$，得 $f=\dfrac{1}{4}\left[-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(z-1)^{n+1}}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(z-1)^n}{3^{n+1}}\right]$.
- $|w|>3$：$\dfrac{1}{3+w}=\sum\dfrac{(-3)^n}{w^{n+1}}$，得 $f=\dfrac{1}{4}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-3)^n-1}{(z-1)^{n+1}}$.

检验. 三式分别在 $z=1+0.6\mathrm{i}$、$1+2\mathrm{e}^{\mathrm{i}}$、$1+5\mathrm{e}^{\mathrm{i}}$ 处与原函数比较，误差 $\le 10^{-16}$. 第三式 $n=0$ 项系数为 0，与 $f=O(z^{-2})$ 一致. **与本次作业的联系.** 是第 1(5) 题“以原点为中心有三个展开”的具体演示，只是中心换成了 1.

易错点

第二个区域中 $\frac{1}{2-z}$ 的奇点 $z=2$ 在内（距离 1），应展负幂；$\frac{1}{2+z}$ 的奇点 -2 在外（距离 3），应展正幂. 与第 11(1) 题“内奇点出负幂”是同一判断.

【高校公开试题 5】MIT：$\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}$ 的洛朗展开与最大圆环

- **来源：**MIT 18.04 Spring 2018，Practice problems exam 2，第 3(b) 题（官方直接来源）；**对应：**原作业第 1(1)、9(8) 题；**难度：**中等

题意（重述）. 求 $f(z)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^z-1}$ 在 $0<|z|<R$ 内关于 0 的洛朗级数的前几项，并确定 R 的最大可能值. **解.** $\mathrm{e}^z-1=z\left(1+\frac{z}{2}+\frac{z^2}{6}+\frac{z^3}{24}+\cdots\right)$. 设 $\frac{1}{1+\frac{z}{2}+\frac{z^2}{6}+\frac{z^3}{24}+\cdots}=1+b_1z+b_2z^2+b_3z^3+\cdots$，两者相乘恒等于 1，逐次比较系数：$b_1+\frac{1}{2}=0\Rightarrow b_1=-\frac{1}{2}$；$b_2+\frac{1}{2}b_1+\frac{1}{6}=0\Rightarrow b_2=\frac{1}{12}$；$b_3+\frac{1}{2}b_2+\frac{1}{6}b_1+\frac{1}{24}=0\Rightarrow b_3=0$. 故

$$\frac{1}{\mathrm{e}^z-1}=\frac{1}{z}-\frac{1}{2}+\frac{z}{12}+0\cdot z^2-\frac{z^3}{720}+\cdots.$$

奇点为 $\mathrm{e}^z=1$ 即 $z=2k\pi\mathrm{i}$，除 0 外最近的是 $\pm2\pi\mathrm{i}$，所以 $R=2\pi$. **检验.** $z=0.3+0.2\mathrm{i}$ 处五项截断与原函数相差约 2×10^{-7}. **与本次作业的联系.** 系数计算与第 9(8) 题 $\tan z$ 的“待定系数除法”相同；R 的确定与第 1(1) 题相同（最近的*其他*奇点）.

易错点

容易把 R 写成 π 或误以为 $z=0$ 以外没有奇点. $\mathrm{e}^z=1$ 在复平面有无穷多个解 $2k\pi\mathrm{i}$——这是实函数直觉看不到的.

【高校公开试题 6】MIT：双向级数的收敛圆环

· **来源：**MIT 18.04 Spring 2018，Practice problems exam 2，第 4 题（官方直接来源）；**对应：**原作业第 10、12 题；**难度：**基础

题意（重述）. 求 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{z^n}{2^{|n|}}$ 的收敛圆环. **解.** 正幂部分 $\sum_{n\ge0}\left(\frac{z}{2}\right)^n$：$|z|<2$；负幂部分 $\sum_{m\ge1}\left(\frac{1}{2z}\right)^m$：$|z|>\frac12$. 收敛圆环 $\frac12<|z|<2$. 顺便求和（仿第 12 题）：$\dfrac{2}{2-z}+\dfrac{1}{2z-1}$. **与本次作业的联系.** 与第 12 题同构；与第 10 题对照：$\sum z^n$ 的两部分收敛域不相交，而本题两部分有公共圆环.

【高校公开试题 7】UC Berkeley：$\frac{1}{z}$ 在 $1+\mathrm{i}$ 处的泰勒展开

· **学校 / 课程：**UC Berkeley，Math 185 Introduction to Complex Analysis；**学期：**Fall 2015；**类型：**Midterm 2，第 3 题

· **来源：**教师课程主页 `math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/`（官方课程主页）；**对应：**原作业第 9(3)(4) 题；**难度：**基础

题意（重述）. 求 $f(z)=\frac1z$ 以 $z_0=1+\mathrm{i}$ 为中心的泰勒级数及其收敛半径. **解.** $\frac1z=\frac{1}{z_0+(z-z_0)}=\frac{1}{z_0}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-z_0}{z_0}}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(z-1-\mathrm{i})^n}{(1+\mathrm{i})^{n+1}}$，条件 $|z-z_0|<|z_0|=\sqrt2$，$R=\sqrt2$（与官方解答一致）. **与本次作业的联系.** 就是第三部分变式 1-3 的前半步；与第 9(4) 题同为“一次分母 + 一般中心”母题.

【高校公开试题 8】UC Berkeley：用洛朗展开计算本性奇点处的积分

· **来源：**UC Berkeley Math 185 Fall 2015，Midterm 2，第 4 题（官方课程主页）；**对应：**原作业第 13(4) 题；**难度：**中等

题意（重述）. 计算 $\displaystyle\oint_{|z|=1}(z+1)^2\mathrm{e}^{3/z^2}\,\mathrm{d}z$. **思路.** $z=0$ 是本性奇点，无法用极点留数公式，只能取洛朗系数 c_{-1}. **解.** 在 $0<|z|<\infty$ 内，$\mathrm{e}^{3/z^2}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{n!\,z^{2n}}$，$(z+1)^2=z^2+2z+1$. 乘积中：$z^2\cdot z^{-2n}$ 与 $1\cdot z^{-2n}$ 都是偶次幂，不可能为 z^{-1}；$2z\cdot z^{-2n}=2z^{1-2n}$ 在 $n=1$ 时为 $2z^{-1}$，系数 $2\cdot\frac{3}{1!}=6$. 故 $c_{-1}=6$，积分 $=12\pi\mathrm{i}$（与官方解答一致；数值积分 $37.69911\mathrm{i}$ ✓）. **与本次作业的联系.** 与第 13(4) 题完全同型：本性奇点 + 只提取 z^{-1} 系数.

易错点

奇偶性分析是关键捷径：e^{3/z^2} 只含偶次幂，只有乘上奇次项 $2z$ 才能产生 z^{-1}. 不要试图写出整个乘积.

【高校公开试题 9】UC Berkeley：用洛朗/留数计算闭路积分

- **来源：**UC Berkeley Math 185 Fall 2015，Midterm 2，第 2 题（官方课程主页）；**对应：**原作业第 13 题；**难度：**中等

题意（重述）. 计算 $\displaystyle\oint_{|z-3|=1}\frac{\cos z}{z(z-\pi)^2}\,\mathrm{d}z$. **解.** 奇点 0 与 π：$|0-3|=3>1$ 在外，$|\pi-3|\approx 0.14<1$ 在内. $z=\pi$ 为二阶极点. 在 $0<|z-\pi|<\pi$ 内，$f=\frac{g(z)}{(z-\pi)^2}$，$g(z)=\frac{\cos z}{z}$ 解析，$g(z)=g(\pi)+g'(\pi)(z-\pi)+\cdots$，所以 $c_{-1}=g'(\pi)$：

$$g'(z)=\frac{-z\sin z-\cos z}{z^2},\qquad g'(\pi)=\frac{0-(-1)}{\pi^2}=\frac{1}{\pi^2}.$$

积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{\pi^2}=\dfrac{2\mathrm{i}}{\pi}$（数值积分 0.63662i √）. **与本次作业的联系.** 展示了“c_{-1} = 解析部分泰勒系数”的思想：把 $\frac{1}{(z-\pi)^2}$ 以外的因子作泰勒展开，就能读出 c_{-1}.

易错点

忘记判断 $z=0$ 是否在圆内（圆心是 3 不是 0），或把二阶极点当成一阶处理得到 $\frac{\cos\pi}{\pi}$.

【高校公开试题 10】剑桥大学：有理函数在两个圆环内的洛朗展开

- **学校 / 课程：**University of Cambridge，Mathematical Tripos Part IB，Complex Analysis or Complex Methods；**年份：**2019；**类型：**Paper 1，Section I，Question 2F
- **来源：**剑桥大学数学系官方 Past Papers 页面（`paperib_1_2019.pdf`，官方直接来源）；**对应：**原作业第 11(1) 题；**难度：**基础—中等

题意（重述）. 说明什么是圆环上函数的洛朗级数，并求 $f(z)=\dfrac{10}{(z+2)(z^2+1)}$ 分别在 $A_1=\{0<|z|<1\}$ 与 $A_2=\{1<|z|<2\}$ 上的洛朗级数. **为什么选.** 与原作业第 11(1) 题几乎同构（一次因子 + z^2+1），且同时考查两个圆环. **解.** 部分分式：$A=\frac{10}{4+1}=2$；$10=2(z^2+1)+(Bz+C)(z+2)$：z^2 系数 $2+B=0\Rightarrow B=-2$，常数项 $2+2C=10\Rightarrow C=4$. 故 $f=\dfrac{2}{z+2}+\dfrac{4-2z}{z^2+1}$. 两圆环内 $|z|<2$，都有 $\dfrac{2}{z+2}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^n}{2^n}$.

- A_1（$|z|<1$）：$\dfrac{1}{z^2+1}=\sum(-1)^n z^{2n}$，$f=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^n}{2^n}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(4z^{2n}-2z^{2n+1}\right)$（无负幂，实为泰勒级数）.
- A_2（$|z|>1$）：$\dfrac{1}{z^2+1}=\sum\dfrac{(-1)^n}{z^{2n+2}}$，$f=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n z^n}{2^n}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{4}{z^{2n+2}}-\frac{2}{z^{2n+1}}\right)$.

检验. 数值核验误差 10^{-15}；A_2 中 $c_{-1}=-2$ 应等于 $\pm\mathrm{i}$ 处留数之和：$\frac{10}{(\mathrm{i}+2)2\mathrm{i}}+\frac{10}{(-\mathrm{i}+2)(-2\mathrm{i})}=\frac{5}{\mathrm{i}}\cdot\frac{(2-\mathrm{i})-(2+\mathrm{i})}{5}=\frac{5}{\mathrm{i}}\cdot\frac{-2\mathrm{i}}{5}=-2$ √. **课程体系差异.** 剑桥 Section I 为短题，常把“叙述定义”（explain what is meant by...）与计算合在一起，重视概念表述；国内教材习题更侧重计算本身.

易错点

A_1 上 f 实际上在 $z=0$ 解析，“洛朗级数”退化为泰勒级数——不要为了“像洛朗级数”而硬造负幂项.

【同型仿真题】（自行设计，不声称来自任何高校）

仿真题 1（对照北航大纲“间接法求洛朗展开”要求）. 求 $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)}$ 在 $1<|z-1|<+\infty$ 内的洛朗展开，并计算 $\oint_{|z-1|=2} f\,\mathrm{d}z$. **解.** $w=z-1$，$f=\frac{1}{w(1+w)}=\frac{1}{w^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{w}}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+2}}$. 最高次为 $(z-1)^{-2}$，$c_{-1}=0$，积分为 0（留数 $-1+1=0$ √）.

仿真题 2（综合）. 判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(3+4\mathrm{i})^n}{6^n n}$ 的敛散性. **解.** $\left|\frac{3+4\mathrm{i}}{6}\right|=\frac{5}{6}<1$，$\left|\frac{(3+4\mathrm{i})^n}{6^n n}\right|=\frac{(5/6)^n}{n}\le\left(\frac{5}{6}\right)^n$，绝对收敛.

同知识点跨校横向比较

核心知识点	学校 / 年份	题型	主要方法	难点 / 易错	原作业
收敛半径	MIT 2018 PS6-2,3	计算	整体代换、根值公式	缺项；$\sqrt{R}$ 而非 R^2	5、8(1)
一般中心泰勒	Berkeley 2015 MT2-3	计算	凑几何级数	$R=\lvert z_0\rvert$	9(3)(4)
多圆环洛朗	MIT 2018 PS6-8；剑桥 2019 IB 1/I/2F	计算 + 定义	部分分式、内负外正	选错展开方向	1(5)、11
c_{-1} 求积分	Berkeley 2015 MT2-2,4	计算	奇偶性、导数读系数	圆心不在原点；本性奇点	13
主要部分 / 留数	MIT 2018 PS6-6；PE2-3	计算 + 概念	代入 e^u；待定系数	主要部分只含负幂	11(3)、9(8)

高频母题结构

母题 A：一次分母的展开. *识别信号*：$\frac{1}{\alpha-\beta z}$ 或能部分分式化. *核心模型*：几何级数. *标准方法*：换元凑 $\frac{1}{1-u}$，$|u|<1$ 定区域. *常见变化*：一般中心、求导得高次分母、圆环. *最易错*：半径漏除系数、展开方向. *典型来源*：Berkeley MT2-3、MIT PS6-8. *对应本次*：8(5)、9(1)(3)(4)、11(1)(2)(7)(8).

母题 B：本性奇点的洛朗展开与积分. *识别信号*：$\mathrm{e}^{g(1/(z-z_0))}$、$\sin\frac{1}{z-z_0}$. *标准方法*：把自变量拆成“常数 + $\frac{1}{z-z_0}$”，代入整函数展开，只提取所需系数. *最易错*：直接对整体代入；漏项. *典型来源*：MIT PS6-6(a)、Berkeley MT2-4. *对应本次*：11(3)(4)(6)、13(4).

母题 C：收敛域的几何. *识别信号*：“收敛半径”“收敛圆环”“能否…又…”. *标准方法*：阿贝尔定理、柯西—阿达马公式、两部分收敛域取交. *典型来源*：MIT PS6-2,3、PE2-4. *对应本次*：4、5、6、10、12.

考试迁移总结

国内课程要求（依据北航官方大纲归纳）. 大纲明确要求：掌握收敛半径与收敛圆域；掌握直接法与间接法求泰勒展开；掌握用间接法求简单函数在解析圆环内的洛朗展开. 这与本次作业第 8、9、11 题的结构完全对应，侧重计算的熟练度.

国外课程考法（依据上述 MIT、Berkeley、剑桥题目归纳）. 同样以计算为主，但更常见（i）同一函数多区域展开（MIT PS6-8，剑桥 2019）；（ii）把洛朗系数与奇点分类、主要部分、留数直接挂钩（MIT PS6-6、PE2-3）；（iii）要求先叙述定义再计算（剑桥）.

共同核心. 无论哪种课程体系，不变的只有两条：**几何级数 + “奇点决定区域”**.

对本次作业的启示. 把本次作业题换成任何一所大学的考试语言，“换元—凑几何级数—标注区域—c_{-1} 读积分—留数复核”这条流程都完全有效.

复习优先级. 必须掌握的母题：A、B、C；必须会辨析的概念：收敛/绝对收敛、圆内/圆上、泰勒/洛朗、c_{-1}/留数；必须会检查的易错点：展开方向、积分常数、圆环选择；值得挑战的公开题：MIT PS6 第 8 题、Berkeley MT2 第 4 题.


第十一章　本次作业学习总结

本次必须掌握. 几何级数及其收敛条件；阿贝尔定理与收敛半径；$\mathrm{e}^z, \sin z, \cos z, \frac{1}{1\pm z}, \ln(1+z)$ 五个基本展开；间接展开法（代换、逐项求导/积分、部分分式）；洛朗展开“内负外正”；$\oint_C f\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$.

建议重点复习. 柯西积分公式（泰勒、洛朗定理的来源）；复数的模与辐角计算（第 2、9(4)、11(5) 题）；实级数判敛方法（第 3 题）.

必须避免的错误. 把收敛半径等同于收敛域；只看一半的复级数；积分后忘加常数；用错圆环；i 的幂次算错.

做题时的识别流程.



最终形成的思维链是：**看到“展开/收敛”→ 想到奇点 → 选择几何级数或标准展开 → 用奇点距离与留数检查答案.**

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 24–25 日. 下列资料均在本文编写过程中实际查阅，用途在每条末尾注明.

教材与课程资料

[1] 学生所用教材《复变函数与积分变换》第一部分“复变函数”第 4 章“复级数”，习题 4（第 80–82 页，原题图片）. *用途：原题识别与重编码.*

[2] MIT OpenCourseWare, 18.04 Complex Variables with Applications, Spring 2018 (J. Orloff), *Topic 7: Taylor and Laurent series*. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/resources/mit18_04s18_topic7/. *用途：核验泰勒定理、洛朗定理、收敛半径与最近奇点的关系.*

[3] 北京航空航天大学数学科学学院，《复变函数与积分变换》课程教学大纲（课程编号 B1A092060，使用教材：高宗升、滕岩梅《复变函数与积分变换》第 2 版，北京航空航天大学出版社）. https://math.buaa.edu.cn/__local/9/B4/91/B953D0F161D0CD3AB07E1D67915_6F5EC994_2F32B.pdf. *用途：国内课程对本章的教学要求.*

[4] Encyclopedia of Mathematics, “Laurent series”. https://encyclopediaofmath.org/wiki/Laurent_series. *用途：核验洛朗定理（1843）.*

高校公开试题原始来源

[5] MIT 18.04 Spring 2018, Problem Set 6 及其解答. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset06.pdf；解答 https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset06_sol.pdf. *用途：公开试题 1–4（第 2、3、6(a)、8 题）.*

[6] MIT 18.04 Spring 2018, Practice problems exam 2 及其解答. 课程资源页 https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/download/. *用途：公开试题 5、6（第 3(b)、4 题）.*

[7] UC Berkeley, Math 185 Introduction to Complex Analysis, Fall 2015, Midterm 2 及解答（教师课程主页）. https://math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/midterm2.pdf；https://math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/mt2sol.pdf. *用途：公开试题 7–9（第 2、3、4 题）.*

[8] University of Cambridge, Mathematical Tripos Part IB 2019, Paper 1, Section I, Question 2F. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2019/paperib_1_2019.pdf；年度索引 https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/maths-ib/2019. *用途：公开试题 10.*

数学史资料

[9] D. Laugwitz, E. Neuenschwander, “Riemann and the Cauchy–Hadamard formula for the convergence of power series”, *Historia Mathematica* 21(1), 1994. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0315086084710081. *用途：黎曼 1856 年讲课、柯西 1821 年公式的史实.*

[10] Wikipedia, “Cauchy–Hadamard theorem”. https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy-Hadamard_theorem. *用途：柯西 1821、阿达马 1888/1892.*

[11] Wikipedia, “Laurent series”. https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_series. *用途：洛朗 1843 发表；魏尔斯特拉斯 1841 年写成、1894 年发表.*

[12] Wikipedia, “Abel’s theorem”. https://en.wikipedia.org/wiki/Abel's_theorem. *用途：阿贝尔 1826 年论文（J. Reine Angew. Math. 1: 311–339）.*

[13] Wikipedia, “Brook Taylor”. https://en.wikipedia.org/wiki/Brook_Taylor. *用途：泰勒 1715 年《Methodus Incrementorum》及拉格朗日 1772 年评价.*

[14] Wikipedia, “Augustin-Louis Cauchy”. https://en.wikipedia.org/wiki/Augustin-Louis_Cauchy. *用途：柯西积分定理（1814 雏形、1825 完整形式）与留数定义（1826）.*

核验方法说明

全部原作业答案、举一反三题与公开试题答案，均用 Python（`cmath`）做数值核验：级数展开取收敛区域内的测试点，截断到数百项后与原函数比较（误差 $\le 10^{-15}$）；闭路积分用圆周等分梯形公式（4000–6000 个节点）计算，与 $2\pi \mathrm{i}\, c_{-1}$ 比较，结果一致到小数点后 12 位以上.