


Matrix Product States

Tensor Network cho hệ lượng tử

VinhPX

2026

Tổng quan



Ba góc nhìn xuyên suốt:

- ▶ **Toán học** Đại số tuyến tính, SVD, đa tạp, xấp xỉ hạng thấp
- ▶ **Khoa học máy tính** Thuật toán, độ phức tạp, nén dữ liệu
- ▶ **Vật lý lượng tử** Entanglement, trạng thái cơ bản, định luật diện tích

Không gian Hilbert và ký hiệu Dirac

Ký hiệu Dirac

Trạng thái lượng tử được viết dưới dạng **ket**:

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H}$$

$\mathcal{H}$: không gian Hilbert — không gian vector với tích vô hướng $\langle\phi|\psi\rangle$.

Qubit — đơn vị nhỏ nhất

Một qubit sống trong $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$: biên độ xác suất.

Đo được $|0\rangle$ với xác suất $|\alpha|^2$, $|1\rangle$ với $|\beta|^2$.

Nhiều qubit — tích tensor

N qubit sống trong tích tensor:

$$\mathcal{H} = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_N = \mathbb{C}^{2^N}$$

Trạng thái tổng quát:

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N \in \{0,1\}} c_{s_1 \dots s_N} |s_1 \dots s_N\rangle$$

Cần 2^N số phức $c_{s_1 \dots s_N}$ để mô tả đầy đủ.


Ví dụ:

$N = 40$ qubit $\rightarrow 2^{40} \approx 10^{12}$ số phức

$N = 300$ qubit $\rightarrow 2^{300} >$ số nguyên tử trong vũ trụ

Bùng nổ không gian trạng thái

Mô tả đầy đủ trạng thái lượng tử N hạt cần d^N số phức.



$N = 10$ qubit $\rightarrow 2^{10} = 1024$ số dễ dàng
 $N = 40$ qubit $\rightarrow 2^{40} \approx 10^{12}$ số vượt RAM thông thường
 $N = 100$ qubit $\rightarrow 2^{100} \approx 10^{30}$ số không máy nào chứa nổi

Các phương pháp mô phỏng cổ điển


Nhà vật lý muốn tính gì?

- ▶ **Trạng thái cơ bản:** năng lượng thấp nhất E_0 , tính chất vật liệu
- ▶ **Diễn tiến thời gian:** hệ thay đổi ra sao sau kích thích
- ▶ **Hàm tương quan:** $\langle O_i O_j \rangle$ — cấu trúc trật tự
- ▶ **Chuyển pha:** khi nào vật liệu đổi trạng thái

Các phương pháp cổ điển

Chéo hóa chính (ED) Lưu toàn bộ d^N hệ số, chéo hóa H . Chính xác nhưng **giới hạn** $N \lesssim 20$.

Quantum Lấy mẫu ngẫu nhiên thay vì




Ưu thế của MPS

- ▶ Không lưu d^N số — chỉ $O(ND^2d)$
- ▶ Khai thác **cấu trúc entanglement**: đa số trạng thái vật lý có entanglement thấp

Biểu diễn MPS

Ý tưởng: thay vì lưu d^N số, ta phân tích thành **tích chuỗi ma trận**:


$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N} A_1^{s_1} A_2^{s_2} \cdots A_N^{s_N} |s_1 s_2 \cdots s_N\rangle$$



Chỉ cần $O(ND^2d)$ tham số — **tuyến tính** theo N , thay vì hàm mũ.

Toán: phân tích tensor thành tích ma trận. **KHMT:** nén từ hàm mũ xuống đa thức. **Vật lý:** biểu diễn trạng thái lượng tử.

Cấu trúc tensor MPS



Chỉ số vật lý s_i	: $\{0, \dots, d-1\}$ — kết quả đo tại site i	Vật lý
Chỉ số ảo	: nối tensor i với $i \pm 1$, kích thước D	Toán
Bond dimension D	: tham số nén — D lớn $\rightarrow$ chính xác hơn	KHMT
Biên mở	: $A_1 \in \mathbb{C}^{1 \times D}$, $A_N \in \mathbb{C}^{D \times 1}$	

- ▶ $D = 1$: trạng thái tích (product state) — không có vướng víu
- ▶ D tăng $\rightarrow$ entanglement tăng, nhưng luôn bị chặn: $S \leq \log D$

Tính không giao hoán và entanglement

Nhắc lại: MPS là tích ma trận

Hệ số của mỗi trạng thái cơ sở:

$$c_{s_1 \dots s_N} = A^{s_1} A^{s_2} \dots A^{s_N}$$

Mỗi A^{s_i} là ma trận $D \times D$. Nói chung:

$$A^{s_i} A^{s_j} \neq A^{s_j} A^{s_i}$$

Không giao hoán = có tương quan

Nếu tất cả A^{s_i} giao hoán $\Rightarrow$ thứ tự không quan trọng $\Rightarrow$ các site **độc lập** $\Rightarrow$ product state (không entanglement).

Chính vì $[A^{s_i}, A^{s_j}] \neq 0$ mà MPS mã hóa được **tương quan lượng tử** giữa các site.

Giao hoán:

$$\boxed{A} \boxed{B} = \boxed{B} \boxed{A}$$

$\Rightarrow$ không tương quan

Không giao hoán:

$$\boxed{A} \boxed{B} \neq \boxed{B} \boxed{A}$$

$\Rightarrow$ entanglement

Hệ quả sâu hơn

- ▶ D lớn hơn $\rightarrow$ ma trận lớn hơn $\rightarrow$ không gian cho tính không giao hoán $\rightarrow$ entanglement mạnh hơn
- ▶ Đây cũng là lý do MPS gắn với **thứ tự 1D**: chuỗi tích có thứ tự tự nhiên trái $\rightarrow$ phải

Phân tích Schmidt và entanglement entropy

Chia hệ làm đôi


Cắt chuỗi N site thành hai phần A và B . Phân tích Schmidt:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^r \lambda_k |a_k\rangle_A \otimes |b_k\rangle_B$$

- ▶ $\lambda_k \geq 0$: hệ số Schmidt, $\sum_k \lambda_k^2 = 1$
- ▶ $|a_k\rangle, |b_k\rangle$: cơ sở trực chuẩn của mỗi phần
- ▶ r : hạng Schmidt — số kênh liên kết giữa A và B

Entanglement entropy

$$S = - \sum_k \lambda_k^2 \log \lambda_k^2$$



Cần nổi quan trọng

Nếu reshape $|\psi\rangle$ thành ma trận (A vs B) rồi tính SVD:

- ▶ λ_k chính là **singular values**
- ▶ Schmidt decomposition = SVD trên state vector

Đây là lý do SVD là công cụ tự nhiên để xây dựng MPS.

Mục tiêu: nén d^N số phức xuống $O(ND^2d)$
với sai số nhỏ nhất có thể (**tối ưu**).

Singular Value Decomposition (SVD)

Phân tích giá trị suy biến (SVD) cung cấp công cụ toán học cho xấp xỉ hạng thấp tối ưu.

Phân tích giá trị suy biến (SVD)

Mọi ma trận $M \in \mathbb{C}^{m \times n}$ đều phân tích được thành:

$$M = U \Sigma V^\dagger$$

$U \in \mathbb{C}^{m \times r}$: cột trực chuẩn (left singular vectors)

$\Sigma \in \mathbb{R}^{r \times r}$: đường chéo, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$

$V^\dagger \in \mathbb{C}^{r \times n}$: hàng trực chuẩn (right singular vectors)

$r = \text{rank}(M)$: số singular values khác không

The diagram shows the SVD decomposition of a matrix M . On the left is a grey box labeled M with dimensions $m \times n$ below it. To its right is an equals sign. Then there are three boxes: a blue box labeled U with dimensions $m \times r$ below it, a purple box labeled Σ with dimensions $r \times r$ below it, and a green box labeled $V^\dagger$ with dimensions $r \times n$ below it.

Ý nghĩa hình học của singular values

Ý nghĩa hình học

Ma trận M biến đổi một vector đầu vào bằng cách **xoay** ($V^\dagger$) rồi **co giãn** (Σ) rồi **xoay lần nữa** (U). Singular value σ_k chính là *hệ số co giãn* theo phương thứ k : σ_1 là phương bị kéo giãn mạnh nhất, σ_r yếu nhất.

- ▶ Liên hệ với trị riêng: $\sigma_k = \sqrt{\lambda_k(M^\dagger M)}$ — căn bậc hai của trị riêng ma trận $M^\dagger M$
- ▶ Khác trị riêng: singular values **luôn thực, không âm**, trong khi trị riêng có thể âm hoặc phức
- ▶ Tồn tại cho **mọi** ma trận (không cần vuông) — đây là ưu thế then chốt so với phân tích trị riêng

Liên hệ với MPS

Khi reshape state vector thành ma trận rồi SVD:

- ▶ σ_k = hệ số Schmidt = đo lượng entanglement qua mỗi “kênh”
- ▶ Bỏ σ_k nhỏ $\equiv$ bỏ kênh entanglement yếu nhất
- ▶ Bond dimension D = số kênh giữ lại

Định lý Eckart–Young

Định lý Eckart–Young

Giữ D singular values lớn nhất cho xấp xỉ hạng- D **tốt nhất có thể** — theo cả Frobenius và operator norm:

$$M_D = U_{:,D} \Sigma_{:,D} V_{:,D}^\dagger$$

Sai số truncation đo được chính xác:

$$\|M - M_D\|_F = \sqrt{\sum_{k>D} \sigma_k^2}$$

Nghĩa là: bỏ các σ_k nhỏ = bỏ các phương co giãn yếu nhất. **Không có cách nào khác** cho sai số nhỏ hơn ở cùng hạng D .

So sánh với các phân tích khác

Phương pháp	Hạn chế
Trị riêng	chỉ ma trận vuông
QR	tách được, nhưng không biết cắt tối ưu ở đâu
LU	không ổn định số học, không trực chuẩn
SVD	mọi ma trận, cắt tối ưu, trực chuẩn, ổn định

⇒ SVD là công cụ vừa **tách** ma trận vừa cho biết chính xác **cắt ở đâu** và **mất bao nhiêu**.

Xây dựng MPS bằng SVD

Bước 1: Reshape state vector thành ma trận

Trạng thái N site sống trong không gian d^N chiều.

Reshape thành ma trận $(d \times d^{N-1})$ — chia hệ thành **1 site** | **phần còn lại**.

Bước 2: SVD + truncation

SVD trên ma trận đó:

- ▶ $U \rightarrow$ tensor của site đầu tiên
- ▶ $\Sigma V^\dagger \rightarrow$ phần còn lại, tiếp tục reshape rồi SVD cho site kế tiếp

Lặp $N-1$ lần $\Rightarrow$ tách xong toàn bộ.

Bước 3: Singular values = entanglement

σ_k tại bond $(i, i+1)$ chính là **hệ số Schmidt** của phân hoạch trái-phải:

Tại sao SVD là lựa chọn tự nhiên?

- ▶ **Truncation tối ưu**: bỏ σ_k nhỏ = bỏ kênh entanglement yếu nhất, sai số nhỏ nhất (Eckart–Young)
- ▶ **Left-canonical miễn phí**: cột U trực chuẩn nên $\sum_s A^{s\dagger} A^s = \mathbb{I}$ — không cần xử lý thêm
- ▶ **Kiểm soát sai số**: phổ $\{\sigma_k\}$ cho biết chính xác bao nhiêu entanglement bị bỏ khi cắt tại D
- ▶ **Đọc entanglement trực tiếp**: entropy tính ngay từ singular values — không cần bước trung gian

Thuật toán SVD liên tiếp

Ý tưởng: reshape + SVD tại từng vị trí, cắt bớt bond dimension xuống $D_{\max}$.

```
1 def state_to_mps(psi, N, d, D_max):
2     tensors = []
3     remainder = psi.reshape(1, d**N)
4     D_left = 1
5
6     for i in range(N - 1):
7         remainder = remainder.reshape(D_left * d, d**(N-1-i))
8         U, S, Vh = svd(remainder)
9         D = min(len(S), D_max)
10        U, S, Vh = U[:, :D], S[:D], Vh[D:, :]
11
12        tensors.append(U.reshape(D_left, d, D))
13        remainder = diag(S) @ Vh
14        D_left = D
15
16    tensors.append(remainder.reshape(D_left, d, 1))
17    return tensors
```

Độ phức tạp: $O(Nd^N D)$ — mục đích là $D \ll d^{N/2}$. Left-canonical: $\sum_s A^{s\dagger} A^s = \mathbb{I}$ tự động từ cột U .

SVD liên tiếp — giải thích

`psi` : state vector (d^N) — đầu vào
`remainder` : phần chưa phân tích, co dần sau mỗi bước
`D_left` : bond dim trái site hiện tại (khởi đầu = 1)
`D_max` : ngưỡng cắt bond dim — cân bằng chính xác vs chi phí
`U, S, Vh` : SVD: U trực chuẩn, S singular values, $V^†$
`tensors[i]` : tensor 3 chỉ số ($D_{\text{left}}, d, D_{\text{right}}$)

Quy trình tại mỗi site i :

1. **Reshape** remainder thành ma trận $(D_{\text{left}} \cdot d) \times d^{N-1-i}$
2. **SVD** $\rightarrow U \Sigma V^†$, giữ $D = \min(\text{rank}, D_{\text{max}})$ singular values lớn nhất
3. U reshape thành tensor 3-chỉ số $\rightarrow$ lưu vào `tensors`
4. $\Sigma V^†$ trở thành `remainder` mới cho bước tiếp

Sau $N-1$ bước SVD, toàn bộ state vector được phân tích thành chuỗi tensor. Tensor cuối cùng là phần remainder còn lại.

Dạng chính tắc (canonical forms)

Left-canonical

Mỗi tensor thỏa $\sum_s A^{s\dagger} A^s = \mathbb{I}$. Thu được từ SVD trái→phải (thuật toán `state_to_mps`).

Right-canonical


Mỗi tensor thỏa $\sum_s A^s A^{s\dagger} = \mathbb{I}$. SVD phải→trái.

Mixed-canonical

Chọn 1 site k làm “tâm trực giao”:

- ▶ Site $i < k$: left-canonical
- ▶ Site $i > k$: right-canonical
- ▶ Site k : chứa toàn bộ thông tin chuẩn hóa

Hệ quả: $\langle \psi | \psi \rangle = \sum_s \text{Tr}(A_k^{s\dagger} A_k^s)$ — chỉ cần tính tại 1 site!



Tại sao quan trọng?

DMRG cần mixed-canonical: environment tự trở thành $\mathbb{I}$, chỉ cần giải trị riêng tại tâm. Schmidt values đọc trực tiếp từ singular values.

Dạng chính tắc — cài đặt

```
1 def left_canonicalize(tensors):
2     for i in range(len(tensors) - 1):
3         D_l, d, D_r = tensors[i].shape
4         M = tensors[i].reshape(D_l * d, D_r)
5         U, S, Vh = svd(M, full_matrices=False)
6         tensors[i] = U.reshape(D_l, d, -1)
7         # Absorb S*Vh into next tensor
8         SV = diag(S) @ Vh
9         tensors[i+1] = einsum('ij,jkl->ikl', SV, tensors[i+1])
10    return tensors
11
12 def mixed_canonical(tensors, center):
13     left_canonicalize(tensors[:center+1])
14     right_canonicalize(tensors[center:])
15    return tensors
```

left_canonicalize: quét trái→phải, SVD + hấp thụ $\Sigma V^\dagger$ sang phải. right_canonicalize: tương tự, phải→trái. mixed_canonical: kết hợp hai chiều.

Toán tử tích ma trận (MPO)

Toán tử tích ma trận (MPO)

Hamiltonian H biểu diễn dạng chuỗi tensor, giống MPS nhưng có **2 chỉ số vật lý** (vào và ra):


$$H = \sum_{\{s,s'\}} W_1^{s_1 s'_1} \dots W_N^{s_N s'_N} |s_1 \dots\rangle \langle s'_1 \dots|$$

Mỗi W_i là tensor 4 chỉ số: (D_W^L, d, d, D_W^R) .

Ví dụ: Ising $H = -\sum_i Z_i Z_{i+1} - h \sum_i X_i$

MPO bond dimension $D_W = 3$:

$$W = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 & 0 \\ Z & 0 & 0 \\ -hX & -Z & \mathbb{I} \end{pmatrix}$$



Ứng dụng

- ▶ DMRG: xây dựng H_{eff} từ MPO + environment
- ▶ TEBD/TDVP: áp dụng $e^{-iH\delta t}$ lên MPS
- ▶ Nhiệt độ hữu hạn: ma trận mật độ ρ dạng MPO
- ▶ Nén mô hình ML: W trong neural network $\rightarrow$ MPO

Giá trị kỳ vọng $\langle \psi | O_k | \psi \rangle$

Co rút MPS từ trái sang phải, chèn toán tử tại site k . Chi phí: $O(ND^3d)$.

```
1 def expect_single_site(tensors, O, k):
2     """<psi| O_k |psi> for single-site operator O at site k."""
3     N = len(tensors)
4     E = ones((1, 1))          # left environment
5
6     for i in range(N):
7         A = tensors[i]        # shape (D_l, d, D_r)
8         if i == k:
9             # E[a,b] A*[a,s',c] O[s',s] A[b,s,d] -> E[c,d]
10            OA = einsum('st,btd->bsd', O, A)
11            E = einsum('ab,asc,bsd->cd', E, A.conj(), OA)
12        else:
13            # E[a,b] A*[a,s,c] A[b,s,d] -> E[c,d]
14            E = einsum('ab,asc,bsd->cd', E, A.conj(), A)
15
16    return E[0, 0].real
```

E: transfer matrix tích lũy — “environment trái”. Tại site k , toán tử O được chèn giữa bra $\langle \psi |$ và ket $|\psi\rangle$. Nếu MPS ở left-canonical, $E = \mathbb{I}$ cho mọi site trước k .

Sai số truncation và phổ Schmidt

Cắt bond dimension từ D_{full} xuống D : bỏ các singular values nhỏ. Sai số đo chính xác bằng Eckart–Young:

$$\varepsilon = \sqrt{\sum_{k>D} \sigma_k^2}$$

```
1 def truncation_error(psi, N, d, D_values)
2 :
3   """Compute ||psi - psi_D|| for each D
4   ."""
5   errors = []
6   for D in D_values:
7     mps = state_to_mps(psi, N, d, D)
8     psi_D = mps_to_state(mps)
9     err = norm(psi - psi_D)
10    errors.append(err)
11 return errors
```



- ▶ **Hệ gapped:** σ_k giảm theo hàm mũ $\rightarrow D$ nhỏ đã chính xác
- ▶ **Hệ tới hạn:** σ_k giảm lũy thừa $\rightarrow$ cần D lớn hơn
- ▶ Phổ $\{\sigma_k\}$ là thước đo chất lượng xấp xỉ

Tập hợp tất cả MPS với bond dimension D
tạo thành một *đa tạp* $\mathcal{M}_D$ trong không gian Hilbert.
Cấu trúc hình học này giải thích hiệu quả của MPS.

Thuật toán
SVD liên tiếp




Hình học
Đa tạp $\mathcal{M}_D$



Vật lý
Định luật điện tích

Đa tập $\mathcal{M}_D$ trong không gian Hilbert



Tập hợp tất cả MPS với bond dimension D tạo thành một **mặt cong** $\mathcal{M}_D$ bên trong không gian Hilbert d^N chiều.

Không phải không gian con

Cộng hai MPS: $|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle$ có bond $2D$ — thoát ra ngoài $\mathcal{M}_D$.

Đây là mặt cong, không phải mặt phẳng.

Tìm $|\psi^*\rangle$ gần $|\phi\rangle$ nhất là bài toán phi tuyến

Không thể dùng phép chiếu tuyến tính thông thường.
Cần thuật toán lặp.

Bài toán trạng thái cơ bản

Hamiltonian là gì?

Hamiltonian H : ma trận Hermitian mô tả **năng lượng** của hệ.

Với hệ N site, H có kích thước $d^N \times d^N$. Ví dụ $N = 40$ qubit: ma trận $10^{12} \times 10^{12}$ — không thể lưu trữ.

Trạng thái cơ bản (ground state)

Vector riêng ứng với trị riêng nhỏ nhất:

$$H|\psi_0\rangle = E_0|\psi_0\rangle$$

E_0 : năng lượng thấp nhất.

$|\psi_0\rangle$: trạng thái ổn định nhất — quan trọng nhất trong vật lý.

Tại sao khó?

- ▶ Giải trực tiếp $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$: tốn $O(d^{3N})$ — bất khả thi
- ▶ Nhưng $|\psi_0\rangle$ thường có cấu trúc đặc biệt: entanglement thấp (xem định luật diện tích)


Ý tưởng

Thay vì giải trên toàn bộ $\mathcal{H}$ (d^N chiều), tìm $|\psi_0\rangle$ trên đa tạp MPS $\mathcal{M}_D$ chỉ có $O(ND^2d)$ tham số:

$$\min_{|\psi\rangle \in \mathcal{M}_D} \langle \psi | H | \psi \rangle$$

Đây là bài toán mà DMRG giải.

DMRG — tối ưu hóa trên $\mathcal{M}_D$



DMRG (White, 1992) tìm trạng thái cơ bản bằng cách tối ưu **từng tensor một**, quét qua lại:

1. Chọn site i , cố định tất cả tensor khác
2. Giải bài toán trị riêng nhỏ cho tensor tại i
3. Di chuyển sang site $i+1$, lặp lại
4. Quét trái $\rightarrow$ phải $\rightarrow$ trái cho đến khi hội tụ

Tương đương tối ưu hóa tọa độ

Mỗi bước là bài toán tuyến tính (trị riêng), nhưng tổng thể là phi tuyến vì các tensor phụ thuộc nhau.

DMRG — Hamiltonian hiệu dụng H_{eff}

Mixed-canonical tại site i

Đưa MPS về dạng mixed-canonical với tâm tại site i . Mọi tensor trái đã left-canonical, phải đã right-canonical.

Environment trái L_i và phải R_i

Co rút tất cả tensor trái (phải) site i với MPO:


$$L_i = \text{contract}(A_1^\dagger W_1 A_1 \cdots A_{i-1}^\dagger W_{i-1} A_{i-1})$$

L_i , R_i là tensor 3 chỉ số: $(D_{\text{MPS}}, D_W, D_{\text{MPS}})$.

Hamiltonian hiệu dụng

Tại site i , bài toán tối ưu trở thành:

$$H_{\text{eff}} \vec{A}_i = E \vec{A}_i$$



Quy trình sweep


1. Co rút L_i , R_i từ environment cũ: $O(D^3 D_W d)$
2. Xây H_{eff} từ $L_i W_i R_i$
3. Giải trị riêng nhỏ nhất (Lanczos):
 $O(D^3 D_W d)$

DMRG — cài đặt

```
1 def dmrg(mps, mpo, n_sweeps, D_max):
2     N = len(mps)
3     L_env, R_env = build_environments(mps, mpo)
4
5     for sweep in range(n_sweeps):
6         # Sweep left -> right
7         for i in range(N - 1):
8             H_eff = build_H_eff(L_env[i], mpo[i], R_env[i])
9             E, v = eigsh(H_eff, k=1, which='SA')
10            mps[i] = v.reshape(mps[i].shape)
11            # Move canonical center right
12            U, S, Vh = svd(mps[i].reshape(-1, mps[i].shape[-1]))
13            D = min(len(S), D_max)
14            mps[i] = U[:, :D].reshape(mps[i].shape[0], -1, D)
15            mps[i+1] = einsum('ij,jkl', diag(S[:D]) @ Vh[:D, :],
16                               mps[i+1])
17            L_env[i+1] = update_left_env(L_env[i], mps[i], mpo[i])
18        # Sweep right -> left (symmetric)
19    return E, mps
```

Chi phí mỗi sweep: $O(ND^3D_Wd + ND^3d^2)$. Thường hội tụ sau 5–10 sweeps cho hệ gapped.

TDVP — phép chiếu tiếp tuyến



Phương trình Schrödinger: $i\partial_t |\psi\rangle = H|\psi\rangle$.

Nhưng $H|\psi\rangle$ thường *thoát ra ngoài* $\mathcal{M}_D$.

TDVP chiếu $H|\psi\rangle$ lên không gian tiếp tuyến:


$$i\partial_t |\psi\rangle = \hat{P}_{T_{\psi}\mathcal{M}} H|\psi\rangle$$

- ▶ Tại mỗi thời điểm: phép chiếu **tuyến tính**
- ▶ Theo thời gian: không gian tiếp tuyến **địch chuyển** theo $|\psi(t)\rangle$
- ▶ Không có sai số Trotter (khác TEBD)

Hệ có khe và hệ tới hạn

Hệ có khe (gapped)


Khe năng lượng: $\Delta = E_1 - E_0 > 0$



- ▶ Tương quan suy giảm **theo hàm mũ**: $\langle O_i O_j \rangle \sim e^{-|i-j|/\xi}$
- ▶ Entanglement **thấp**: $S = O(1)$
- ▶ MPS hoạt động **rất tốt**

Hệ tới hạn (critical)



Khe đóng lại: $\Delta \rightarrow 0$



- ▶ Tương quan giảm chậm (**lũy thừa**): $\langle O_i O_j \rangle \sim |i-j|^{-\eta}$
- ▶ Entanglement **logarithmic**: $S \sim \frac{c}{3} \log N$
- ▶ c : central charge — đặc trưng của lớp phổ quát
- ▶ MPS cần $D \sim N^{c/6}$ — **đắt hơn**

Phân biệt gapped/critical quyết định MPS hoạt động tốt đến đâu — và khi nào cần biến thể khác.

Định luật diện tích (area law)



Định luật diện tích (1D)

Trạng thái cơ bản của Hamiltonian có khe năng lượng: entanglement entropy giữa hai nửa chuỗi là **hằng số** — không tăng theo N .

$$S(\rho_A) = O(1)$$

Hệ quả cho MPS

Vì $S \leq \log D$, chỉ cần $D = O(1)$ là đủ biểu diễn ground state!

Ground state “sống gần” $\mathcal{M}_D$ ngay cả khi $D \ll d^{N/2}$.

Đối chiếu: 2D

$S \sim L$ (tỉ lệ biên cắt) $\Rightarrow D \sim e^L$ — MPS không đủ.

Vật lý (area law) biện minh cho **Toán** (xấp xỉ hạng

Hệ quả của tính không giao hoán

Vấn đề 2D: không có thứ tự tự nhiên

Tích ma trận yêu cầu sắp xếp các site thành **một hàng**. Mạng 2D không có thứ tự duy nhất.


Hai cách cuộn khác nhau cho kết quả khác nhau — vì ma trận không giao hoán. PEPS giải quyết bằng cách dùng tensor nhiều chỉ số thay vì tích ma trận.

Fermion: phản giao hoán

Toán tử Fermion thỏa:

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$$

Khác bản chất so với giao hoán boson. Chuỗi Jordan–Wigner chuyển đổi được ở 1D, nhưng



Hai cách cuộn mạng 2D thành 1D cho kết quả khác nhau vì $AB \neq BA$.

Tóm lại

Tính không giao hoán vừa là **sức mạnh** (mã hóa entanglement) vừa là **nguồn gốc** các giới hạn (phụ thuộc thứ tự, chỉ tự nhiên ở 1D).

Các biến thể được thiết kế để *vượt qua* ràng buộc này.

Định luật diện tích xác định *khi nào MPS hoạt động tốt.*

Tính không giao hoán giải thích *tại sao MPS gắn với 1D.*

Phần tiếp theo: *sáu giới hạn cụ thể* của biểu diễn MPS.

Mỗi giới hạn dẫn đến một biến thể tensor network tương ứng.

Cận trên entanglement: $S \leq \log D$

MPS với bond dimension D chỉ chứa được:


$$S \leq \log D$$

Khi hệ vật lý có entanglement cao hơn, D phải tăng để bù:

Hệ tới hạn 1D $S \sim \frac{c}{3} \log N$
 $\Rightarrow D \sim N^{c/6}$ (đa thức, nhưng đắt)

Hệ 2D $S \sim L$
 $\Rightarrow D \sim e^L$ (hàm mũ)

$\hookrightarrow$ **MERA** cho hệ tới hạn, **PEPS** cho 2D, **Hybrid MPS+NQS** cho entanglement cao.



Bức tường entanglement: $S(t) \sim \alpha t$

Quench: thay đổi đột ngột Hamiltonian $H_1 \rightarrow H_2$ tại $t = 0$.

Sau quench, entanglement tăng tuyến tính theo thời gian:

$$S(t) \sim \alpha t$$

Do đó bond dimension cần thiết tăng theo hàm mũ:


$$D(t) \sim e^{\alpha t}$$

MPS **thất bại** sau thời gian ngắn:

$$t^* \sim \frac{\log D}{\alpha}$$


Đây là giới hạn **cơ bản** — không phải do thuật toán yếu, mà do cấu trúc MPS không đủ chứa entanglement phát sinh.

↔ **MERA**, **NQS** — không bị giới hạn bởi cấu trúc chuỗi.



Giới hạn chiều không gian

MPS là chuỗi tuyến tính. Muốn dùng cho 2D phải “cuộn” thành 1D.



Bond dimension phải tăng theo **hàm mũ của chu vi** — nhanh chóng không khả thi.

↪ **PEPS** (tensor network 2D tự nhiên), **isoTNS** (PEPS + ràng buộc isometric).

MPS (1D)

Tính $\langle \psi | O | \psi \rangle$ chỉ tốn:

$$O(ND^3)$$

Co rút tuần tự từ trái sang phải — hoàn toàn khả thi.

↪ **isoTNS** — co rút chính xác nhờ ràng buộc isometric (đổi lại: BQP-complete).

PEPS (2D)

Ngay cả tính norm $\langle \psi | \psi \rangle$ đã là:

#P-khó

Không có thuật toán đa thức chính xác. Mọi tính toán đều phải xấp xỉ.

#P: lớp bài toán đếm — khó hơn NP. Ngay cả xấp xỉ cũng không có thuật toán đa thức tổng quát.

Trạng thái kích thích

MPS tối ưu cho ground state. Muốn tìm trạng thái kích thích thứ k :

- ▶ Cần ràng buộc trực giao với $k-1$ trạng thái trước
- ▶ Chi phí tăng theo số trạng thái cần tìm
- ▶ Thuật toán phức tạp hơn đáng kể

↪ **Hybrid MPS+NQS** — mạng neural hiệu chỉnh phần MPS bỏ sót.

Nhiệt độ hữu hạn ($T > 0$)

Cần biểu diễn ma trận mật độ ρ thay vì trạng thái thuần:

- ▶ Dùng toán tử tích ma trận (MPO)
- ▶ Chi phí: D^2 lần hơn MPS thuần
- ▶ Tương đương “hai tầng” MPS

Fermion và hệ frustrated

Vấn đề Fermion

Fermion phản giao hoán: $\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$ — khác boson (giao hoán).

Biến đổi Jordan–Wigner ánh xạ fermion $\rightarrow$ spin:

$c_j \rightarrow (\prod_{k < j} (-1)^{n_k}) \sigma_j^-$ — chuỗi dấu dài j site.

- ▶ **1D**: chuỗi dấu vẫn cục bộ — xử lý được
- ▶ **2D**: chuỗi dấu phá vỡ tính cục bộ — bond dimension **bùng nổ**


$\hookrightarrow$ **fPEPS** (Fermion PEPS — Corboz), **Hybrid MPS+NQS** (vượt vấn đề dấu bằng mạng neural).

Hệ thất vọng (frustrated)

Mạng tinh thể thất vọng (ví dụ: tam giác, kagome):

- ▶ Cảnh quan năng lượng phức tạp
- ▶ Nhiều cực tiểu gần suy biến
- ▶ Thuật toán dễ mắc kẹt tại cực tiểu địa phương

Các biến thể tensor network




Ba hướng phát triển từ MPS: **mở rộng không gian** (entanglement mạnh hơn), **thuật toán thời gian** (động lực học), **mở rộng chuyên biệt** (vô hạn, fermion, liên tục, ứng dụng).

Giới hạn và biến thể tương ứng

Giới hạn của MPS	→	Biến thể giải quyết
Entanglement logarithmic (hệ tới hạn)	→	MERA
Cấu trúc thuần túy 1D	→	PEPS, isoTNS
Co rút #P-khó ở 2D	→	isoTNS
Entanglement cao / hệ thất vọng	→	Hybrid MPS+NQS
Bức tường thời gian $S(t) \sim \alpha t$	→	TEBD, TDVP (giảm nhẹ, không triệt để)
Hệ vô hạn đồng nhất	→	iMPS
Dấu Fermion trong 2D	→	fPEPS, Fermionic MPS

Ta sẽ đi qua ba nhóm: biến thể không gian → thuật toán thời gian → mở rộng chuyên biệt.



$O(\log N)$ tầng

W : isometry

U : disentangler

Ý tưởng (Vidal, 2007)


Hệ tối hạn: $S \sim \frac{c}{3} \log L$ — MPS cần $D \rightarrow \infty$.

MERA xen **disentangler** U (loại bỏ vướng víu tầm ngắn) trước mỗi bước **thô hóa** W (gộp 2 site $\rightarrow$ 1):

$$|\psi_{\text{MERA}}\rangle = \left(\prod_{\tau} U_{\tau} W_{\tau} \right) |0\rangle^{\otimes N}$$

- ▶ Nón nhân quả chỉ $O(\log N)$ tensor $\Rightarrow$ tính quan sát cục bộ nhanh
- ▶ Bắt được entropy log với D hữu hạn
- ▶ Liên hệ AdS/CFT: hình học hyperbolic

Hạn chế: chi phí $O(\chi^8)$ /vòng quét — đắt hơn DMRG rất nhiều.



vs. MPS:



Từ chuỗi sang lưới

Mỗi tensor có 5 chỉ số: $T_{l,r,u,d}^s$ (1 vật lý + 4 ảo).

Tôn trọng area law 2D: $S \leq |\partial A| \log D$.

- ▶ Biểu diễn chính xác trật tự tô pô (toric code, string-net)
- ▶ Fermion 2D: fPEPS (Corboz) — giải quyết giới hạn 6
- ▶ iPEPS + autodiff (2024): tối ưu hóa tự động

Cái giá phải trả

- ▶ Co rút chính xác: #P-khó — mọi tính toán đều xấp xỉ
- ▶ Sai số co rút khó ước lượng
- ▶ Tối ưu hóa kém ổn định hơn MPS

Ý tưởng (Zaletel–Pollmann, 2020)

Thêm ràng buộc **isometric** vào PEPS:

$$\sum_s A^{s\dagger} A^s = \mathbb{I}$$

theo một hướng. Hệ quả:

- ▶ Co rút **chính xác** — không cần xấp xỉ
- ▶ Biểu diễn string-net liquid chính xác
- ▶ Mở rộng sang 2D mà vẫn tính toán được

Hai kết quả quan trọng

1. **Không có barren plateau** (Barthel–Miao 2024)

Gradient không tắt theo hàm mũ:

$\text{Var}(\partial_\theta E) \geq \Omega(1/\text{poly}(N))$. Áp dụng cho mọi isoTN: MPS, TTNS, MERA.

2. **BQP-complete** (Malz–Trivedi 2025)

Tính quan sát isoTNS khó bằng mọi bài toán máy lượng tử giải được. Đổi lại: máy lượng tử có thể co rút nhanh.

MPS + Neural quantum states

MPS cho khung xương cấu trúc, mạng neural bổ sung phần vướng víu bị bỏ sót:

$$\psi(\mathbf{s}) = \underbrace{\langle L | A^{s_1} \dots A^{s_N} | R \rangle}_{\text{MPS}} \cdot \underbrace{f_{\theta}(\mathbf{s})}_{\text{neural}}$$

Ưu điểm

- ▶ Phân cấp: $\text{MPS} \subsetneq \text{PEPS} \subsetneq \text{Deep NQS}$
- ▶ ANTNN (NeurIPS 2023): sai số $< 10^{-4}$ cho hệ frustrated
- ▶ Sampling tự hồi quy — không cần MCMC

Đánh đổi

- ▶ Mất tính diễn giải của cấu trúc tensor
- ▶ Huấn luyện không ổn định, cực tiểu địa phương
- ▶ Khó định lượng sai số — mạng neural là “hộp đen”

Các biến thể không gian mở rộng *phạm vi* của MPS.

Hai thuật toán chính cho *động lực học*: TEBD và TDVP.


Cả hai đều giữ cấu trúc MPS nhưng tiến hóa trạng thái theo thời gian: $|\psi(0)\rangle \rightarrow |\psi(t)\rangle$.

Vidal (2003): phân rã toán tử thời gian bằng công thức Trotter:

$$e^{-iH\delta t} \approx \prod_{\langle i,j \rangle} e^{-ih_{ij}\delta t}$$

Mỗi cổng chỉ tác dụng lên 2 site — áp dụng rồi cắt bớt bằng SVD.

- ▶ Đơn giản, dễ cài đặt
- ▶ Song song hóa tốt (cổng chẵn/lẻ độc lập)
- ▶ Sai số Trotter $O(\delta t^2)$ hoặc $O(\delta t^3)$
- ▶ Chi phí: $O(ND^3d^\beta)$ mỗi bước



Vật lý: toán tử thời gian. **Toán:**

Trotter-Suzuki **KHMT:** cổng cục bộ + SVD

TEBD — cài đặt

```
1 def tebd_step(mps, H_bonds, dt, D_max):
2     """One second-order Trotter step."""
3     N = len(mps)
4     # Even bonds: (0,1), (2,3), ...
5     for i in range(0, N-1, 2):
6         gate = expm(-1j * H_bonds[i] * dt / 2) #  $d^2 \times d^2$ 
7         apply_two_site_gate(mps, gate, i, D_max)
8     # Odd bonds: (1,2), (3,4), ...
9     for i in range(1, N-1, 2):
10        gate = expm(-1j * H_bonds[i] * dt)
11        apply_two_site_gate(mps, gate, i, D_max)
12    # Even bonds again (symmetric Trotter)
13    for i in range(0, N-1, 2):
14        gate = expm(-1j * H_bonds[i] * dt / 2)
15        apply_two_site_gate(mps, gate, i, D_max)
```

apply_two_site_gate: co rút 2 tensor liền kề $\rightarrow$ áp gate $\rightarrow$ SVD tách lại + truncate tại $D_{\max}$. Sai số mỗi bước: $O(\delta t^3)$ (Trotter bậc 2).

TDVP cho động lực học

Haegeman (2011): thay vì phân rã Trotter, chiếu phương trình Schrödinger lên đa tạp MPS:


$$i\partial_t |\psi\rangle = \hat{P}_{T_{|\psi\rangle}\mathcal{M}} H |\psi\rangle$$

- ▶ **Không có sai số Trotter** — chính xác hơn TEBD
- ▶ **1TDVP**: D cố định, bảo toàn năng lượng chính xác
- ▶ **2TDVP**: D thích ứng, linh hoạt hơn
- ▶ Chi phí tương đương TEBD: $O(ND^3d^3)$

	TEBD	TDVP
Sai số Trotter	có	không
Bảo toàn E	xấp xỉ	chính xác
D thích ứng	không	có (2TDVP)
Cài đặt	đơn giản	phức tạp hơn
Song song	tốt	kém hơn

Giới hạn thời gian mô phỏng

Cả TEBD và TDVP đều vấp phải cùng một bức tường:



Sau quench: $S(t) \sim \alpha t \Rightarrow D(t) \sim e^{\alpha t}$.

Đây **không phải lỗi thuật toán** — mà là giới hạn cấu trúc của MPS. Không thuật toán nào trên MPS có thể vượt qua.

Hướng mở: influence functional (“tích phân ảnh hưởng” — mô hình hóa môi trường thay vì hệ), temporal entanglement (vướng víu theo thời gian thay vì không gian).

Ngoài biến thể không gian và thuật toán thời gian,
MPS còn được mở rộng theo ba hướng chuyên biệt:

iMPS	hệ vô hạn đồng nhất — không cần biên
Fermionic & đối xứng	khai thác cấu trúc đại số để tăng tốc
cMPS	giới hạn liên tục — lý thuyết trường lượng tử
Phần cứng & Học máy	ứng dụng bên ngoài vật lý truyền thống

MPS vô hạn (iMPS)



cùng một tensor A lặp lại

Không cần biên hữu hạn $\Rightarrow$ nhiệt động lực học chính xác.

- ▶ Transfer matrix $\mathbb{T}$: tính norm, tương quan
- ▶ Độ dài tương quan: $\xi = -1/\ln |\lambda_2|$
- ▶ VUMPS (2018): hội tụ nhanh hơn iDMRG

Kích thích

Ansatz quasiparticle — thay 1 tensor A bằng B :

$$|\Phi_p(B)\rangle = \sum_n e^{ipn} \dots A B^{s_n} A \dots$$

Tính được quan hệ tán sắc $E(p)$ và ma trận tán xạ S .

Hạn chế

- ▶ Chỉ cho hệ đồng nhất (translation invariant)
- ▶ Chuyển pha: cần cẩn thận về vỡ đối xứng tự phát
- ▶ Không mô phỏng biên hay tạp chất

Fermionic MPS, đối xứng, cMPS

Fermionic MPS

Đại số $\mathbb{Z}_2$ -graded:

$$a \otimes b \rightarrow (-1)^{|a||b|} b \otimes a$$

Không cần chuỗi JW tường minh ở 1D. Nhưng 2D vẫn khó (chuỗi dấu phá cục bộ).

Đối xứng

- ▶ $U(1)$: tensor block-diagonal
→ tăng tốc $\sim Q^2$ lần
- ▶ $SU(2)$: Wigner–Eckart → thêm $\bar{d}^3$ lần
- ▶ Đọc trật tự SPT trực tiếp

cMPS — Giới hạn liên tục

Thay tensor rời rạc bằng ma trận liên tục $Q(x), R_\alpha(x)$:

$$|\psi\rangle = \text{Tr}_{\text{aux}} \left[\mathcal{P} \exp \int_0^L dx (\cdots) \right] |\Omega\rangle$$

- ▶ Biểu diễn trạng thái trường — không cần mạng tinh thể
- ▶ Lieb–Liniger: $\sim 10^{-6}$ với $D=64$
- ▶ Bất biến gauge tự nhiên
- ▶ cMERA $\leftrightarrow$ holographic RG

Phần cứng lượng tử

Ba thể hệ chuẩn bị MPS:

- ▶ Sequential: $O(N)$ depth
- ▶ Log-depth: $O(\log N)$
- ▶ Constant: $O(1)$

2026: 100 qubit, $\chi=40$,
> 97% fidelity.

Học máy

- ▶ MNIST > 99% accuracy
- ▶ Nén LLaMA-2 7B: -93% bộ nhớ (CompactifAI)

Ba câu hỏi nền tảng

Dù tensor network có nhiều biến thể,
ba câu hỏi nền tảng luôn quay lại:

Huấn luyện

Tối ưu hóa có hội tụ?

Chuẩn bị

Tạo trạng thái trên chip?

Độ phức tạp

Tính toán có khả thi?

Các kết quả gần đây (2024–2025) đã đưa ra câu trả lời bất ngờ cho cả ba câu hỏi này.

Kết quả gần đây (2024–2025)

Barthel–Miao (2024)

Mọi isometric TN optimization

không có barren plateaus

$$\text{Var}(\partial_{\theta} E) \geq \Omega\left(\frac{1}{\text{poly}(N)}\right)$$

Áp dụng: MPS, TTNS, MERA

Log-depth Prep (2024)

Bất kỳ MPS bond dim D
chuẩn bị trong $O(\log N)$ depth

Hoặc $O(1)$ với adaptive circuits

100 qubit, $\chi = 40$, fid $> 97\%$

Complexity (2025)

Phase transition sắc nét:

MPS: **P**

isoTNS: **BQP-c**

PEPS: **#P-hard**

Tham số: injectivity strength
(tensor càng “đầy đủ” $\rightarrow$ bài toán càng khó)

Ba kết quả này cùng vẽ nên bức tranh: TN **trainable**, **preparable** trên quantum hardware, và có **complexity landscape** rõ ràng.

Vấn đề mở: lý thuyết

1. Sai số co rút PEPS

Co rút PEPS là #P-khó — nhưng xấp xỉ thì sai bao nhiêu? Hiện chưa có cận sai số nghiêm ngặt cho boundary MPS hay corner transfer matrix.

2. Fermionic PEPS không vấn đề dấu

fPEPS xử lý Fermion 2D, nhưng vấn đề dấu (sign problem) vẫn có thể xuất hiện trong quá trình co rút. Liệu có thiết kế fPEPS nào tránh hoàn toàn?

3. Phá bức tường entanglement cho động lực học

$S(t) \sim \alpha t$ là giới hạn cơ bản cho MPS. Influence functional và temporal entanglement đang là hướng tiếp cận — nhưng chưa có đột phá.

Vấn đề mở: thực nghiệm

1. Chuẩn bị MPS trên chip > 100 qubit

Các giao thức log-depth và constant-depth đã được chứng minh lý thuyết. Nhưng thực hiện trên phần cứng thật với error correction vẫn là thách thức lớn.

2. Quantum advantage cho co rút tensor network

Co rút PEPS là $\#P$ -khó trên máy tính cổ điển. Liệu máy tính lượng tử có thể co rút nhanh hơn? IsoTNS gợi ý là có (BQP-complete), nhưng cần chứng minh lợi thế thực tế.

3. Tensor network cho hiệu chuẩn nhiễu lượng tử

Dùng MPS/MPO để mô hình hóa và sửa lỗi nhiễu tương quan trên chip lượng tử — hướng ứng dụng gần nhất.

Học máy

- ▶ **TN cho transformers:** cấu trúc attention có thể biểu diễn dạng tensor không?
- ▶ **Born machine:** sinh mẫu chính xác cho dữ liệu cao chiều
- ▶ **Nén LLM:** từ MPO đến tensor network tổng quát — giảm tham số mà giữ chất lượng

Lý thuyết trường lượng tử

- ▶ **cPEPS cho QFT 2+1D:** mở rộng cMPS sang không gian cao hơn
- ▶ **QCD phi nhiễu loạn:** tensor network có thể mô phỏng QCD ở vùng tương tác mạnh?
- ▶ Kết nối TN $\leftrightarrow$ AdS/CFT: từ MERA đến lý thuyết hấp dẫn lượng tử

- ▶ Schollwöck, *Ann. Phys.* 326, 96 (2011) — DMRG & MPS review
- ▶ Vidal, *PRL* 91, 147902 (2003) — TEBD; *PRL* 99, 220405 (2007) — MERA
- ▶ Schuch et al., *PRL* 98, 140506 (2007) — PEPS complexity
- ▶ Vanderstraeten et al., *SciPost Phys. Lect. Notes* 7 (2019) — Tangent-space iMPS
- ▶ Zauner-Stauber et al., *PRB* 97, 045145 (2018) — VUMPS
- ▶ Haegeman et al., *PRB* 88, 085118 (2013) — Calculus of cMPS
- ▶ Barthel–Miao, *PRA* 109, L050402 (2024) — No barren plateaus
- ▶ Malz et al., *PRL* 132, 040404 (2024) — Log-depth MPS preparation
- ▶ Tilloy, *PRD* 104, 096007 (2021) — Relativistic cMPS
- ▶ Zaletel–Pollmann (2020) — isoTNS; Malz–Trivedi (2025) — BQP-completeness
- ▶ Stoudenmire–Schwab, *NeurIPS* (2016) — TN supervised learning
- ▶ CompactifAI, arXiv:2401.14109 (2024) — LLM compression via MPO