

# Matrix Product States

Nghiên cứu lung tung

---


VinhPX

2026

# Matrix Product States là gì?

Trạng thái lượng tử  $N$  hạt đòi hỏi  $d^N$  số phức để mô tả đầy đủ — **bùng nổ tổ hợp**. MPS biểu diễn hiệu quả qua tích chuỗi ma trận:

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N} A_1^{s_1} A_2^{s_2} \cdots A_N^{s_N} |s_1 s_2 \cdots s_N\rangle$$



- ▶  $A_i^{s_i} \in \mathbb{C}^{D \times D}$ : ma trận với **bond dimension**  $D$
- ▶ Tham số:  $O(ND^2d)$  thay vì  $O(d^N)$

- ▶ Chỉ số vật lý  $s_i \in \{0, \dots, d-1\}$ , chỉ số ảo nối các tensor
- ▶ Biên mở:  $A_1 \in \mathbb{C}^{1 \times D}$ ,  $A_N \in \mathbb{C}^{D \times 1}$

$D = 1$ : product state.  $D$  tăng  $\rightarrow$  entanglement tăng. Entanglement entropy bị chặn:  $S \leq \log D$ .

# Xây dựng MPS từ state vector — SVD liên tiếp


Ý tưởng: reshape + SVD tại từng vị trí, cắt bớt bond dimension xuống  $D_{\max}$ .

```
1 import numpy as np
2
3 def state_to_mps(psi, N, d, D_max=32):
4     """
5     psi      : state vector, shape (d**N,)
6     N, d     : số site, kích thước không gian cục bộ
7     D_max    : bond dimension tối đa (truncation)
8     Tra về   : list N tensor A[i], shape (D_left, d, D_right)
9     """
10    tensors = []
11    remainder = psi.reshape(1, d**N) # (D_left=1, d^N)
12    D_left = 1
13
14    for i in range(N - 1):
15        # Gộp chỉ số trái + vật lý, để SVD
16        remainder = remainder.reshape(D_left * d, d**(N - 1 - i))
17
18        U, S, Vh = np.linalg.svd(remainder, full_matrices=False)
19
20        D = min(len(S), D_max) # cắt bớt singular values nhỏ
21        U, S, Vh = U[:, :D], S[:D], Vh[:D, :]
22
23        A = U.reshape(D_left, d, D) # tensor site i: (D_left, d, D)
24        tensors.append(A)
25
26        remainder = np.diag(S) @ Vh # phần còn lại, chuyển sang site kế
27        D_left = D
28
29    # Site cuối: không cần SVD nữa
30    tensors.append(remainder.reshape(D_left, d, 1))
31    return tensors # [A_1, A_2, ..., A_N]
```

Độ phức tạp:  $O(Nd^N D)$  lần đầu — nhưng mục đích là để  $D \ll d^{N/2}$ , tránh bùng nổ. Left-canonical:

$$\sum_s A^{s\dagger} A^s = \mathbb{I} \text{ tự động từ cột của } U.$$

# Bản chất của MPS



## Không phải không gian con

$|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle$  có bond  $2D$  — thoát ra ngoài  $\mathcal{M}_D$ .

## Tìm $|\psi^*\rangle$ là bài toán phi tuyến

SVD greedy tối ưu từng bond, không đảm bảo global minimum.

DMRG lặp sweep đến khi hội tụ.

## TDVP mới thực sự là phép chiếu

$\hat{P}_{T_{|\psi\rangle}\mathcal{M}}$  chiếu  $H|\psi\rangle$  lên tangent space — tuyến tính tại mỗi thời điểm, nhưng không gian tiếp tuyến dịch chuyển theo  $|\psi(t)\rangle$ .

## Định luật diện tích đảm bảo $D$ nhỏ là đủ

$S(\rho_A) = O(1) \Rightarrow$  ground state nằm sát  $\mathcal{M}_D$  ngay cả khi  $D \ll d^{N/2}$ .

# Giới hạn của MPS

## 1. Entanglement bị chặn

$S \leq \log D$  — MPS chỉ biểu diễn trạng thái có vướng víu thấp.

Vi phạm định luật diện tích  $\Rightarrow D$  tăng theo hàm mũ:

- ▶ Critical 1D:  $S \sim \frac{c}{3} \log N \Rightarrow D \sim N^{c/6}$
- ▶ 2D bất kỳ:  $S \sim L \Rightarrow D \sim e^L$

## 2. Bức tường vướng víu trong diễn tiến thời gian

Sau sự thay đổi đột ngột của tham số Hamiltonian:  $S(t) \sim \alpha t$ , nên  $D(t) \sim e^{\alpha t}$ .

MPS **thất bại** sau thời gian ngắn  $t^* \sim \frac{\log D}{\alpha}$ .

## 3. Thuần túy 1D

## 4. Co rút hiệu quả — chỉ may mắn ở 1D

MPS:  $O(ND^3)$  — khả thi.

Mở rộng sang PEPS 2D: **#P-khó** — mọi tính toán đều phải xấp xỉ.

## 5. Trạng thái kích thích & hỗn hợp

Tối ưu tốt nhất cho trạng thái cơ bản.

Trạng thái kích thích cần bổ sung điều kiện trực giao — chi phí tăng theo số trạng thái.


Nhiệt độ hữu hạn: cần toán tử tích ma trận (MPO), tốn  $D^2$  lần hơn.

## 6. Dấu Fermion & hệ thất vọng

Cần chuỗi Jordan–Wigner cho Fermion — tính cục bộ bị phá vỡ trong 2D.

# Các biến thể

Mọi phương pháp tensor network hiện đại đều **bắt nguồn** từ MPS.



Đi từ trái sang phải: **entanglement tăng**, **complexity tăng**, nhưng khả năng biểu diễn mạnh hơn.

# MERA — Vướng víu logarithmic

Hệ tới hạn:  $S(L) \sim \frac{\epsilon}{3} \log L$  — MPS cần  $D \rightarrow \infty$ . Vidal (2007): xen **disentangler**  $U$  trước mỗi bước thô hóa isometry  $W$ :

$$|\psi_{\text{MERA}}\rangle = \left( \prod_{\tau} U_{\tau} W_{\tau} \right) |0\rangle^{\otimes N}$$

## Cải tiến cốt lõi

- ▶  $U$  loại bỏ vướng víu tầm ngắn trước khi coarse-grain
- ▶ Nón nhân quả  $O(\log N)$  tensor — tính quan sát cục bộ hiệu quả
- ▶ Bắt được entropy logarithmic với  $D$  hữu hạn

## Hiệu quả

- ▶ Trích xuất  $\Delta$ ,  $c$  của CFT từ siêu toán tử chuyển
- ▶ MERA  $\leftrightarrow$  AdS/CFT: hình học hyperbolic tự nhiên
- ▶ Thực nghiệm: Trotterized MERA trên Quantinuum H1 (2023)

## Hạn chế

- ▶ Chi phí  $O(\chi^8)$  mỗi vòng quét — đắt hơn DMRG nhiều lần
- ▶ Khó mở rộng sang 2D
- ▶ Tối ưu hóa không ổn định với  $\chi$  lớn

Mỗi tensor rank-5:  $T_{l,r,u,d}^s$ . Biểu diễn được **định luật diện tích 2D**:  $S \leq |\partial A| \log D$ .

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Mở rộng cấu trúc MPS sang mạng 2D tự nhiên
- ▶ Biểu diễn chính xác trật tự tôpô: toric code, string-net qua  $G$ -injective PEPS
- ▶ Fermion 2D qua fPEPS (Corboz)

## Hiệu quả

- ▶ Co rút xấp xỉ boundary MPS:  $O(\chi_{\text{env}}^3 D^4)$
- ▶ AD-based iPEPS (2024): tự vi phân, tối ưu hóa tự động
- ▶ Mô phỏng Hubbard 2D vượt QMC về đầu

## Hạn chế

- ▶ Co rút chính xác: **#P-khó** — mọi tính toán đều xấp xỉ
- ▶ Lỗi co rút khó kiểm soát, khó ước lượng sai số
- ▶ Tối ưu hóa kém ổn định hơn MPS



# Hybrid MPS + NQS

MPS: cấu trúc rõ, nhưng bị chặn entanglement. NQS: linh hoạt, nhưng thiếu cấu trúc. Kết hợp:

$$\psi(\mathbf{s}) = \underbrace{\langle L | A^{s_1} \dots A^{s_N} | R \rangle}_{\text{khung xương MPS}} \cdot \underbrace{f_{\theta}(\mathbf{s})}_{\text{hiệu chỉnh neural}}$$

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Mạng neural hiệu chỉnh phần vướng víu mà MPS bỏ sót
- ▶ Phân cấp chặt:  $\text{MPS} \subsetneq \text{PEPS} \subsetneq \text{Deep NQS}$
- ▶ Born machine: sampling chính xác  $O(ND^2d)$

## Hiệu quả

- ▶ ANTN (NeurIPS 2023): sai số  $< 10^{-4}$  cho hệ frustrated
- ▶ Neuralized fermionic TN (2026): vượt fPEPS trên Hubbard 2D
- ▶ Sampling tự hồi quy không cần MCMC

## Hạn chế

- ▶ Mất tính diễn giải của cấu trúc tensor
- ▶ Huấn luyện không ổn định, dễ gặp cực tiểu địa phương
- ▶ Khó kiểm soát và định lượng sai số

# Isometric TN — Ràng buộc mở ra hai kết quả lớn

PEPS + ràng buộc isometric  $\sum_s A^{s\dagger} A^s = \mathbb{I}$  theo một hướng  $\Rightarrow$  có rút hiệu quả (Zaletel–Pollmann 2020).

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Ràng buộc isometric giữ nguyên norm khi co rút một chiều
- ▶ Mở rộng được sang 2D mà vẫn tính được quan sát
- ▶ Biểu diễn chính xác string-net liquid

## Hiệu quả

- ▶ Co rút khả thi — không cần xấp xỉ như PEPS
- ▶ Không có barren plateau (Barthel–Miao 2024):  
 $\text{Var}(\partial_\theta E) \geq \Omega\left(\frac{1}{\text{poly}(N)}\right)$
- ▶ Áp dụng cho mọi isoTN: MPS, TTNS, MERA

## Hạn chế

- ▶ Tính quan sát isoTNS: **BQP-complete** (Malz–Trivedi 2025)
- ▶ Khả năng biểu diễn kém hơn PEPS đầy đủ
- ▶ Ràng buộc isometric khó duy trì trong tối ưu hóa

# MPS trên phần cứng lượng tử

Chuẩn bị  $|\psi_{\text{MPS}}\rangle$  trên chip — ba thể hệ giải pháp:

| Giao thức                   | Độ sâu      | Ancilla                  | Cơ chế                            |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Sequential (Schön 2005)     | $O(N)$      | $\lceil \log_2 D \rceil$ | tuần tự, đơn giản                 |
| Log-depth (Malz 2024)       | $O(\log N)$ | $O(N)$                   | CNOT fan-out + đo giữa mạch       |
| Constant-depth (Smith 2024) | $O(1)$      | $O(N)$                   | dịch chuyển lượng tử, feedforward |

## Hiệu quả

- ▶  $D = 64$  chỉ cần 6 ancilla qubit ( $\lceil \log_2 64 \rceil$ )
- ▶ Thực nghiệm 2026: 100 qubit,  $\chi = 40$ , độ trung thực  $> 97\%$  trên IBM

## Hạn chế

- ▶ Constant-depth cần feedforward cổ điển thời gian thực — khó trên phần cứng hiện tại
- ▶ Lỗi cổng tích lũy theo  $N$ , độ trung thực giảm nhanh

# Tensor Network cho Học máy

Ảnh xạ đặc trưng  $\rightarrow$  MPS  $\rightarrow$  quyết định (Stoudenmire–Schwab 2016):  $f(\mathbf{x}) = \langle \psi_W | \bigotimes_i |\Phi(x_i)\rangle$ , với  $|\Phi(x)\rangle = \cos \frac{\pi x}{2} |0\rangle + \sin \frac{\pi x}{2} |1\rangle$ .

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Tham số ít, cấu trúc rõ, có thể diễn giải qua phổ vướng víu
- ▶ Bond dimension kiểm soát trực tiếp độ phức tạp mô hình
- ▶ Born machine: sinh mẫu chính xác, không cần MCMC

## Hiệu quả

- ▶ MNIST:  $> 99\%$  độ chính xác với bond dimension nhỏ
- ▶ CompactifAI (2024): nén LLaMA-2 7B bằng MPO — giảm **93%** bộ nhớ
- ▶ TT-decomposition: giảm  $1000\times$  tham số tầng kết nối đầy đủ

## Hạn chế

- ▶ Cấu trúc 1D không tự nhiên với dữ liệu thực
- ▶ Kém linh hoạt hơn mạng neural sâu trên dữ liệu phức tạp
- ▶ Nén mô hình có thể mất độ chính xác đáng kể

# Diễn tiến thời gian — TEBD vs TDVP

## Cải tiến cốt lõi

**TEBD** (Vidal 2003): Trotter phân rã  $e^{-iH\delta t}$ , mỗi cổng áp lên bond rồi cắt bớt SVD.

**TDVP** (Haegeman 2011): chiếu Schrödinger lên không gian tiếp tuyến  $\mathcal{M}_D$ :

$$i\partial_t |\psi\rangle = \hat{P}_{T_{|\psi\rangle}\mathcal{M}} H |\psi\rangle$$

1TDVP bảo toàn năng lượng;  
2TDVP cho  $D$  thích ứng.

## Hiệu quả

- ▶ TDVP: không lỗi Trotter, bảo toàn các đại lượng bảo toàn
- ▶ TEBD: đơn giản, song song hóa tốt
- ▶ Chi phí  $O(ND^3d^3)$  — cạnh tranh cho hệ 1D

## Hạn chế cơ bản

- ▶ Sau sự thay đổi đột ngột của tham số Hamiltonian:  
 $S(t) \sim \alpha t \Rightarrow D(t) \sim e^{\alpha t}$
- ▶ MPS **thất bại** sau  
 $t^* \sim \frac{\log D}{\alpha}$
- ▶ Hướng mở: influence functional, temporal entanglement

# MPS vô hạn đồng nhất (iMPS)

MPS đồng nhất:  $\dots A^{s_{-1}} A^{s_0} A^{s_1} \dots$  — cùng một tensor  $A$  lặp lại. Không cần giới hạn hệ hữu hạn.

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Nhiệt động lực học chính xác không có sai số finite-size
- ▶ Transfer matrix  
 $\mathbb{T} = \sum_s A^s \otimes \bar{A}^s$ : độ dài tương quan  $\xi = -1/\ln |\lambda_2|$
- ▶ Quasiparticle ansatz cho kích thích:  
 $|\Phi_p(B)\rangle = \sum_n e^{ipn} \dots B^{s_n} \dots$

## Hiệu quả

- ▶ VUMPS (2018): hội tụ nhanh hơn iDMRG đáng kể
- ▶ Tính dispersion  $E(p)$  và ma trận  $S$  từ ansatz quasiparticle
- ▶ Fixed-point:  
 $A_C = C A_R = A_L C$  — canonical form rõ ràng

## Hạn chế

- ▶ Chỉ áp dụng cho hệ đồng nhất (translation invariant)
- ▶ Chuyển pha: cần cẩn thận về vỡ đối xứng tự phát
- ▶ Không trực tiếp mô phỏng biên và tạp chất

Khai thác đối xứng trong cấu trúc tensor để giảm chi phí tính toán theo hàm mũ.

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Fermion: đại số  $\mathbb{Z}_2$ -graded,  $a \otimes b \rightarrow (-1)^{|a||b|} b \otimes a$  — không cần chuỗi Jordan–Wigner tường minh
- ▶ U(1):  $[Q, H] = 0 \Rightarrow$  tensor block-diagonal
- ▶ SU(2): Wigner–Eckart — chỉ lưu phần tử rút gọn

## Hiệu quả

- ▶ U(1): tăng tốc  $\sim Q^2$  lần
- ▶ SU(2): thêm  $\bar{d}^\beta$  lần — tổng hợp rất lớn
- ▶ Đọc trực tiếp tham số trật tự SPT từ biểu diễn chiều trên chỉ số ảo

## Hạn chế

- ▶ Chuỗi Jordan–Wigner vẫn phá tính cục bộ trong 2D
- ▶ Non-Abelian phức tạp khi lập trình, dễ sai
- ▶ Đối xứng không khả nghịch (2026) vẫn là hướng mở

# cMPS — MPS trong giới hạn liên tục

Giới hạn liên tục của MPS: thay tensor rời rạc bằng ma trận  $Q, R_\alpha \in M_D(\mathbb{C})$  phụ thuộc vị trí:

$$|\psi_{\text{cMPS}}\rangle = \text{Tr}_{\text{aux}} \left[ \mathcal{P} \exp \int_0^L dx \left( Q \otimes \mathbb{I} + \sum_{\alpha} R_{\alpha} \otimes \hat{\psi}_{\alpha}^{\dagger}(x) \right) \right] |\Omega\rangle$$

## Cải tiến cốt lõi

- ▶ Biểu diễn trực tiếp trạng thái trường lượng tử — không cần mạng tinh thể
- ▶ Bất biến gauge:  
 $Q \rightarrow G Q G^{-1} + (\partial G) G^{-1}$
- ▶ RCMPS (Tilloy 2021): thỏa mãn mọi tiên đề Feynman, không cần cutoff UV

## Hiệu quả

- ▶ Lieb–Liniger: độ chính xác  $\sim 10^{-6}$  với  $D \approx 64$
- ▶ cMERA: nhóm tái chuẩn hóa vướng víu liên tục  $\leftrightarrow$  holographic RG
- ▶ Tính toán non-perturbative cho QFT 1+1D

## Hạn chế

- ▶ cPEPS cho QFT 2+1D vẫn là bài toán mở
- ▶ Tối ưu hóa phức tạp hơn MPS rời rạc
- ▶ Chưa có ứng dụng thực tiễn ngoài 1+1D



# Ba kết quả xuyên suốt

## Barthel–Miao (2024)

Mọi isometric TN optimization

không có barren plateaus

$$\text{Var}(\partial_{\theta} E) \geq \Omega\left(\frac{1}{\text{poly}(N)}\right)$$

Áp dụng: MPS, TTNS, MERA

## Log-depth Prep (2024)

Bất kỳ MPS bond dim  $D$   
chuẩn bị trong  $O(\log N)$  depth

Hoặc  $O(1)$  với adaptive circuits

100 qubit,  $\chi = 40$ , fid  $> 97\%$

## Complexity (2025)

Phase transition sắc nét:

MPS: P

isoTNS: BQP-c

PEPS: #P-hard

Tham số: injectivity strength

Ba kết quả này cùng vẽ nên bức tranh: TN **trainable**, **preparable** trên quantum hardware, và có **complexity landscape** rõ ràng.

# Các vấn đề mở lớn

## Lý thuyết & Tính toán

- ▶ PEPS contraction: error bounds nghiêm ngặt?
- ▶ Fermionic PEPS không sign problem?
- ▶ Phá rào cản entanglement cho dynamics

## Thực nghiệm

- ▶ MPS preparation  $> 100$  qubit, error-corrected
- ▶ Quantum advantage cho TN contraction?

## ML & Ứng dụng

- ▶ TN architecture cho transformers?
- ▶ Born machine cho dữ liệu cao chiều
- ▶ Nén LLM: từ MPO đến TN tổng quát

## Lý thuyết trường

- ▶ cPEPS cho QFT 2+1D
- ▶ Non-perturbative QCD qua TN

## Tài liệu tham khảo chính

- ▶ Schollwöck, *Ann. Phys.* 326, 96 (2011) — DMRG & MPS review
- ▶ Vidal, *PRL* 91, 147902 (2003) — TEBD; *PRL* 99, 220405 (2007) — MERA
- ▶ Schuch et al., *PRL* 98, 140506 (2007) — PEPS complexity
- ▶ Vanderstraeten et al., *SciPost Phys. Lect. Notes* 7 (2019) — Tangent-space iMPS
- ▶ Zauner-Stauber et al., *PRB* 97, 045145 (2018) — VUMPS
- ▶ Haegeman et al., *PRB* 88, 085118 (2013) — Calculus of cMPS
- ▶ Barthel–Miao, *PRA* 109, L050402 (2024) — No barren plateaus
- ▶ Malz et al., *PRL* 132, 040404 (2024) — Log-depth MPS preparation
- ▶ Tilloy, *PRD* 104, 096007 (2021) — Relativistic cMPS
- ▶ Zaletel–Pollmann (2020) — isoTNS; Malz–Trivedi (2025) — BQP-completeness
- ▶ Stoudenmire–Schwab, *NeurIPS* (2016) — TN supervised learning
- ▶ CompactifAI, arXiv:2401.14109 (2024) — LLM compression via MPO