

1 复数

第一章主要介绍复数的基本性质。

1.1 复数的运算

我们从一个二次方程开始：

$$z^2 + 1 = 0.$$

该方程的解为：

$$\pm\sqrt{-1}.$$

记 $i = \sqrt{-1}$ 称为虚数单位，相应的 $ai, a \in \mathbb{R}$ 称为纯虚数。虚数的概念由卡尔达诺于16世纪引入，当时主要为了解三次方程。卡尔达诺公式：解 $z^3 + pz + q = 0$ ，设 $\Delta = (\frac{q}{2})^2 + (\frac{p}{3})^3$ ， $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ，则方程的解为

$$\begin{aligned} & \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}}. \\ & \omega \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \omega^2 \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}}. \\ & \omega^2 \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}} + \omega \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}}. \end{aligned}$$

因为看不见，摸不着，甚至很难想象，因而笛卡尔将这种数称为虚数，与实数相对应。莱布尼兹的说法最有代表性：“圣灵在分析的奇观中找到了超凡的显示，这就是那个理想世界的端兆，那个介于存在与不存在之间的两栖物，那个我们称之为虚的-1的平方根。”

欧拉公式：“美” $e^{\pi i} + 1 = 0$ ；“应用”：傅里叶变换。

复数 (complex number)， $z = x + yi$ ， $x, y \in \mathbb{R}$ 。

复数可以表示为：

代数表示： $z = x + iy$ ，其中 x, y 为实数， x 称为 z 的实部记为 $\operatorname{Re} z = x$ ； y 称为 z 的虚部记为 $\operatorname{Im} z = y$ ；

向量表示： z 看作复平面上的一向量，作为向量其最大好处是可以任意平移向量。向量的长度称为复数的模长，记为 $|z|$ ；其取值为 $(\sqrt{x^2 + y^2})$ ；向量的倾角称为复数的辐角，可以看出给定一个非零复数，其辐角的取值有无穷多并且以 2π 为周期，我们经常约定位于区间 $(-\pi, \pi]$ 之间的辐角取值称为 z 的辐角的主值；用 $\arg(z)$ 表示辐角主值，用 $\operatorname{Arg}(z)$ 表示辐角全体，他们仅对 $z \neq 0, \infty$ 有定义；辐角与辐角主值有如下关系：

$$\operatorname{Arg}(z) = \arg(z) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

辐角有如下表达式：设 $z = x + yi$ ， $xy \neq 0$ ，则

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第一象限;} \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第二象限;} \\ -\pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第三象限;} \\ \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第四象限.} \end{cases}$$

作为向量是没法比较大小的（复数之间没法比较大小），但可以比较向量的长度，也就是模长；

指数表示、三角表示： $z = re^{i\theta} = r \cos \theta + ir \sin \theta$, $r \in [0, +\infty), \theta \in \mathbb{R}$, r 为复数的模长； θ 为复数的辐角。

注记：容易看出，要说明两复数相等，只要说明他们的实部和虚部分别相等；或者说明模长和辐角分别相等。

复数的运算：

- 复数运算满足一般实数运算的所有法则（交换律，结合律，分配律等，仅需注意 $i^2 = -1$ ），需要注意的是除法；例子： $\frac{1+i}{1+2i} = \frac{(1+i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{3-i}{5}$ ，在计算除法的时候，往往要分子分母同时乘以一个特定的复数（分母的共轭）。
- 如果将复数看成向量，则加法减法满足平行四边形法则或者三角形法则；容易看出复数的模满足三角不等式，即

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

除此之外还满足

$$|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||.$$

- 如果用指数形式表示复数，则复数的乘法（除法）有简单的形式（模相乘（相除），辐角相加（相减）——棣莫弗定理）；如果用指数表示复数，则幂次有如下公式

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, n \in \mathbb{Z}.$$

例子： $(1+i)^{2020} = (\sqrt{2})^{2020} e^{i\frac{\pi}{4} \times 2020} = -2^{1010}$. 利用复数的乘法可以轻松获得很多三角等式，例如：

$$e^{i\theta} e^{i\phi} = \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi + i(\cos \theta \sin \phi + \sin \theta \cos \phi) = e^{i(\theta+\phi)} = \cos(\theta+\phi) + i \sin(\theta+\phi).$$

通过对照，可以得到：

$$\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi = \cos(\theta + \phi)$$

和

$$\cos \theta \sin \phi + \sin \theta \cos \phi = \sin(\theta + \phi).$$

- 复数的开方的取值一般并不唯一（0 是例外），例如 $\sqrt[n]{z}, n \in \mathbb{N}$ 表示复数范围内所有满足以下方程的 w ,

$$w^n = z.$$

假设 w 的指数表示为 $w = re^{i\theta}$ （ θ 为辐角主值，当然也可以是其他辐角），则

$$r^n = |z|, n\theta = \text{Arg}(z) = 2k\pi + \arg(z).$$

当 $z = 0$ 时候， $w = 0$ ；而当 $z \neq 0$ 的时候，有 n 个解

$$(\sqrt[n]{|z|})e^{(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})i}, k = 0, 1, \dots, n-1.$$

需要注意前后 $\sqrt[n]{}$ 的含义是不一样的,我们用圆括号加以区分,在没有混淆的情况下,并不需要特别说明。

例子1. (1) 求 $\sqrt[3]{1}$ 的所有取值; (2) 解方程, $z^5 = 10 + i$ 。

解. (1) 1 的模为1, 辐角主值为0。所以

$$\sqrt[3]{1} = (\sqrt[3]{1})e^{\frac{2k\pi}{3}i} = e^{\frac{2k\pi}{3}i}, k = 0, 1, 2.$$

即: $1; -\frac{(\sqrt{3})}{2} + \frac{1}{2}i; -\frac{(\sqrt{3})}{2} - \frac{1}{2}i$ 。

(2) 设 $z = re^{i\theta}$, 则

$$r^5 = (\sqrt[5]{101}), 5\theta = \arctan \frac{1}{10} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

解得

$$r = (\sqrt[5]{101}), \theta = \frac{1}{5} \arctan \frac{1}{10} + \frac{2k\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}.$$

所以

$$z = (\sqrt[5]{101})e^{i(\frac{1}{5} \arctan \frac{1}{10} + \frac{2k\pi}{5})}, k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

- 共轭是复数特有的运算形式, 其符号是复数上面加一横 ($z \rightarrow \bar{z}: \overline{x+iy} = x-iy$); 其几何意义是复数关于实轴的对称点。共轭有以下运算规律

$$- \bar{\bar{z}} = z;$$

$$- \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2;$$

$$- \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2; \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2};$$

$$- |z|^2 = z\bar{z};$$

$$- \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}; \text{一般会依此计算复数的除法; 例子: } \frac{1+i}{1-2i} = \frac{(1+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{-1+3i}{5};$$

- 需要注意的是 $\overline{f(z)} = f(\bar{z})$ 一般并不成立, 最简单的例子就是 $f(z) = iz$;

- 指数表示下, $re^{i\theta}$ 的共轭为 $re^{-i\theta}$ 。

用共轭可以表示复数的实部, 虚部和模

$$- \operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}, z \text{ 为实数等价于 } z = \bar{z};$$

$$- \operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}, z \text{ 为虚数等价于 } z = -\bar{z};$$

$$- |z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2 \quad (z = x + iy).$$

例子2. 求解以下方程:

$$z^{2020} = 2020\bar{z}.$$

解. 不妨设 $z = re^{i\theta}$, 则有

$$r^{2020} e^{i2020\theta} = 2020 r e^{-i\theta}.$$

所以

$$r^{2019} = 2020 \text{ 并且 } 2021\theta = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

解得: $r = 0$ 或者 $r = (\sqrt[2019]{2020})$; $r = 0$ 的时候, $z = 0$; $r \neq 0$ 的时候 $\theta = \frac{2k\pi}{2021}, k = 0, 1, 2, \dots, 2020$ 。
所以

$$z = (\sqrt[2019]{2020})e^{i\frac{2k\pi}{2021}}, k = 0, 1, 2, \dots, 2020.$$

例子3. 设 $z = x + iy, y \neq 0, z \neq \pm i$ 。证明: 当且仅当 $x^2 + y^2 = 1$ 的时候, $\frac{z}{1+z^2}$ 是实数。

Proof. $\frac{z}{1+z^2}$ 是实数等价于 $\frac{z}{1+z^2} = \overline{\left(\frac{z}{1+z^2}\right)} = \frac{\bar{z}}{1+\bar{z}^2}$ 。即

$$z + z\bar{z}^2 = \bar{z} + \bar{z}z^2.$$

即

$$(z - \bar{z})(1 - z\bar{z}) = 0.$$

所以要么 $z = \bar{z}$ 此时 z 为实数, 但是 $y = 0$ 与条件不符舍去; 要么 $\bar{z}z = 1 = |z|^2$, 即 z 位于单位圆周上。□

例子4. 证明平行四边形对角线的平方和等于边的平方和。

Proof. 不妨设平行四边形的四个顶点分别为 $0, z_1, z_2, z_1 + z_2$ 。则仅需说明

$$2|z_1|^2 + 2|z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2.$$

实际上

$$|z_1 - z_2|^2 = (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 - z_1\bar{z}_2 - \bar{z}_1z_2.$$

同理

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2.$$

两式相加既得。□

例子5. 已知正三角形的两个顶点为 z_1, z_2 , 求第三个顶点 z_3 ?

解. $z_3 - z_1 = (z_2 - z_1)e^{\pm\frac{\pi}{3}i}$ 。所以

$$z_3 = z_1 + (z_2 - z_1)\left(\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$

所以

$$z_3 = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z_1 + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z_2 \text{ 或者 } \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)z_2.$$

1.2 复数列的极限

定义. 设 z_n 为复数列, z_0 为复数。

- 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n - z_0| = 0$, 就称 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$, 也就是在复平面上 z_n 无限靠近 z_0 ;
- 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$, 就称 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty$, 也就是在复平面上 z_n 无限远离 0。

当然我们也可以用极限语言来表述:

- 对任意 $\epsilon > 0$, 存在自然数 N 使得 $|z_n - z_0| < \epsilon$ 对任意 $n > N$ 成立;
- 对任意 $M > 0$, 存在自然数 N 使得 $|z_n| > M$ 对任意 $n > N$ 成立。

定义(邻域). 设 z_0 为复数, z_0 的邻域是指包含 z_0 的开集; ∞ 的邻域是指包含 “ ∞ ” 的开集。例如,

$$\{z : |z| < 1\} \text{ 是 } 0 \text{ 的邻域;}$$

$$\{z : |z| > 1\} \text{ 是 } \infty \text{ 的邻域.}$$

用邻域的概念可以对极限有更直观的了解:

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n \rightarrow z_0$ 当且仅当对 z_0 的任何邻域 U , 仅有有限个 $z_n \notin U$; 也就是说从某个 z_n 开始其后面的所有元素都在该邻域内。

定理. 设 $z_n = x_n + iy_n, z_0 = x_0 + iy_0$ 为复数, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n \rightarrow z$ 等价于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \rightarrow x$ 并且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n \rightarrow y$ 。但这对于极限是无穷的情况并不成立, 例如:

$$z_{2k} = 2k, z_{2k+1} = (2k+1)i.$$

要看 $z_n \rightarrow \infty$ 是否成立, 只要看它的模是否趋于 “ $+\infty$ ”: 即,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \infty \text{ 等价于 } \lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = +\infty.$$

同样地, 要看 $z_n \rightarrow 0$ 是否成立, 只要看它的模是否趋于 “0”: 即,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = 0 \text{ 等价于 } \lim_{n \rightarrow +\infty} |z_n| = 0.$$

一般而言我们将常规复平面加上 ∞ 组成一个新的空间, 称为闭复平面。

复平面: 所有复数的集合; **闭复平面:** 所有复数加上一个 “ ∞ ”。

我们有以下约定

- $\infty + z = \infty, \forall z \neq \infty$; $\infty + \infty$ 没有意义;
- $\infty \times z = \infty, \forall z \neq 0$; $\infty \times 0$ 没有意义;
- $\frac{z}{\infty} = 0, \forall z \neq \infty$; $\frac{\infty}{\infty}$ 没有意义;
- $\frac{z}{0} = \infty, \forall z \neq 0$; $\frac{0}{0}$ 没有意义。

闭复平面与球面 (称为复球面) 存在连续一一对应的关系, 因为球面是闭的, 因而闭复平面是 “闭” 的。

例子6. 设 $z_n \rightarrow z_0$, $\arg z$ 表示主值。证明

$$(1) \bar{z}_n \rightarrow \bar{z}_0;$$

$$(2) \text{ 当 } z_0 \neq 0 \text{ 和负数的时候, } \arg z_n \rightarrow \arg z_0;$$

$$(3) z_0 = \infty \text{ 呢?}$$

证明. (1) 设 $z_n = x_n + y_n i$, 则 $\bar{z}_n = x_n + (-y_n)i$. 所以 $\bar{z}_n \rightarrow z_0$ 等价于 $x_n \rightarrow x_0$ 并且 $-y_n \rightarrow -y_0$ 等价于 $x_n \rightarrow x_0$ 并且 $y_n \rightarrow y_0$ 等价于 $z_n \rightarrow z_0$.

(2) 可以用极限语言. 当 ϵ 足够小的时候, 当 $z_0 \neq 0$ 和负数的时候, 与 z_0 的辐角主值相差小于 ϵ 的复数全体其实是 z_0 的一个角形邻域. 由极限的定义马上可以说明结论. 同时也可以看到, 当 $z_0 = 0$ 的时候, 辐角主值不存在, 而当 z_0 位于负半轴的时候, 与 z_0 的辐角主值相差小于 ϵ 的复数全体并不是 z_0 的一个角形邻域, 此时可以举例说明结论不成立.

(3) 当 $z_0 = \infty$ 的时候, 辐角主值的定义没有意义. 但 (1) 依然是正确的.

1.3 区域与曲线

定义(区域). 复平面的一个子集 D 称为区域如果 (1) 它是开集; (2) 它是连通的; 根据连通性的不同, 又分为单连通区域 (没有洞) 和多连通区域 (带洞).

例如: 单位圆内部 $|z| < 1$ 是单连通区域; 但是如果我们把 $|z| < 1$ 的零点挖掉, 那它就变成了多连通区域. 一般区域都是曲线围成的:

定义(约当曲线: 曲线的参数表示). 复平面上的曲线是指连续映射 $z(t) = x(t) + iy(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$; 如果曲线的取值除首尾可能一样外其他都不同, 称之为若当曲线或简单曲线; 特别地, 如果若当曲线首尾相连, 则称之为若当闭曲线或简单闭曲线.

例子7. 用参数表示直线, 圆周, 折线等.

- 直线: $z(t) = z_0 t + z_1, t \in \mathbb{R}$ 表示过 z_1 , 方向为 z_0 的直线;
- $z(\theta) = r e^{i\theta}, r > 0, \theta \in [0, 2\pi]$ 表示半径为 r 的圆周, 是简单闭曲线;
- 折线往往需要分开表示, 例如表示一个正方形:

$$z(t) = \begin{cases} t, & t \in [0, 1]; \\ 1 + i(t-1), & t \in (1, 2]; \\ 1 + i - (t-2), & t \in (2, 3]; \\ i - (t-3)i, & t \in (3, 4]. \end{cases}$$

例如用参数表示一个正三角形:

$$z(t) = \begin{cases} -0.5 + t, & t \in [0, 1]; \\ 0.5 + (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)(t-1), & t \in (1, 2]; \\ \frac{\sqrt{3}}{2}i + (-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)(t-2), & t \in (2, 3]. \end{cases}$$

简单闭曲线把复平面分成内外两个区域 (看起来理所当然但证明及其困难).

复平面上的区域通常用复数的运算和不等式表示: 例如:

- 上半平面: $\text{Im} z > 0$;
- 单位圆内部: $|z| < 1$;
- 单位圆内部去掉 0 点: $0 < |z| < 1$;

- 带状区域: $1 < \operatorname{Re} z < 2$;
- 圆环: $r < |z - a| < R$;
- 椭圆区域: $|z - a| + |z - b| < c$.

用复数表示曲线:

例子8. 用复数表示直线 $ax + by + c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}$; 求 $\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \alpha$ 所代表的曲线。

解. (1) 设 $z = x + iy$, 则

$$x = \operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, y = \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

所以

$$a \frac{z + \bar{z}}{2} + b \frac{z - \bar{z}}{2i} + c = 0.$$

整理得:

$$\frac{a - ib}{2} z + \frac{a + ib}{2} \bar{z} + c = 0.$$

如果我们用 $\alpha = \frac{a+ib}{2}$, 则上式写为

$$\bar{\alpha} z + \alpha \bar{z} + c = 0.$$

(2) 设 $z = x + iy$, 则

$$\operatorname{Re} \frac{1}{z} = \operatorname{Re} \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} = \alpha.$$

如果 $\alpha = 0$, 则所代表曲线为 $x = 0, y \neq 0$ 的直线 (去掉0点)。如果 $\alpha \neq 0$, 则、

$$\left(x - \frac{1}{2\alpha}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{1}{2\alpha}\right)^2.$$

为一个圆心在 $\frac{1}{2\alpha}$, 半径为 $\frac{1}{2|\alpha|}$ 的圆。

作业: 1; 4; 15; 21。